

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
2. März 2006 (02.03.2006)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2006/021379 A1


- (51) Internationale Patentklassifikation:
C07D 475/04 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01)
A61K 31/4375 (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/008991
- (22) Internationales Anmeldedatum:
19. August 2005 (19.08.2005)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
04020124.6 25. August 2004 (25.08.2004) EP
- (71) Anmelder (nur für AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BE, BF, BG, BJ, BR, BW, BY, BZ, CA, CF, CG, CH, CI, CM, CN, CO, CR, CU, CY, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, FR, GA, GB, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GR, GW, HR, HU, ID, IE, IL, IN, IS, IT, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MC, MD, MG, MK, ML, MN, MR, MW, MX, MZ, NA, NE, NG, NI, NL, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG): BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH [DE/DE]; Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM (DE).
- (71) Anmelder (nur für DE): BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG [DE/DE]; Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GRAUERT, Matthias [DE/DE]; Osterbergstr. 10, 88400 BIBERACH (DE).

- HOFFMANN, Matthias [DE/DE]; Sonnenweg 17, 88441 MITTELBIERACH (DE). STEEGMAIER, Martin [DE/AT]; Pasteurgasse 4/13, A-1090 WIEN (AT). SOLCA, Flavio [CH/AT]; Gesslgasse 10/6, A-1230 WIEN (AT). QUANT, Jens Juergen [DE/AT]; Hafergasse 32, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH; Binger Strasse 173, 55216 INGELHEIM (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DIHYDROPTERIDINONE DERIVATIVES, METHODS FOR THE PRODUCTION THEREOF AND THEIR USE AS MEDICAMENTS

(54) Bezeichnung: DIHYDROPTERIDINONDERIVATE, VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG UND DEREN VERWENDUNG ALS ARZNEIMITTEL



(57) Abstract: The invention relates to novel dihydropteridinones of general formula (I), in which the radicals L, R¹, R², R³, R⁴ and R⁵ have the meanings cited in the claims and description, to isomers thereof, methods for producing these dihydropteridinones, and to their use as medicaments.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft neue Dihydropteridinone der allgemeinen Formel (I), wobei die Reste L, R¹, R², R³, R⁴ und R⁵ die in den Ansprüchen und der Beschreibung genannten Bedeutungen haben, deren Isomere, Verfahren zur Herstellung dieser Dihydropteridinone sowie deren Verwendung als Arzneimittel.


WO 2006/021379 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

DIHYDROPTERIDINONDERIVATIVE, VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG UND DEREN VERWENDUNG
ALS ARZNEIMITTEL

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Dihydropteridinone der allgemeinen Formel (I)



5

(I)

wobei die Reste L, R¹, R², R³, R⁴ und R⁵ die in den Ansprüchen und der Beschreibung genannten Bedeutungen haben, deren Isomere, Verfahren zur Herstellung dieser Dihydropteridinone sowie deren Verwendung als Arzneimittel.

10

Hintergrund der Erfindung

Pteridinon-Derivate sind als Wirkstoffe mit antiproliferativer Wirkung aus dem Stand der Technik bekannt. WO 01/019825 und WO 03/020722 beschreiben die Verwendung von Pteridinonderivaten zur Behandlung von Tumorerkrankungen.

15

Tumorzellen entziehen sich teilweise oder völlig der Regulation und Kontrolle durch den Organismus und zeichnen sich durch ein unkontrolliertes Wachstum aus. Dies beruht einerseits auf dem Verlust von Kontroll-Proteinen, wie z.B. Rb, p16, p21 und p53 als auch auf der Aktivierung von so genannten Beschleunigern des Zellzykluses, den cyclin-abhängigen Kinasen (CDK's).

20

Darüber hinaus wird auch für die Proteinkinase Aurora B eine essentielle Funktion beim Eintritt in die Mitose beschrieben. Aurora B phosphoryliert Histon H3 an Ser10 und leitet damit die Chromosomenkondensation ein (Hsu et al. 2000, *Cell* **102**:279-91). Ein spezifischer Zellzyklusarrest in der G2/M Phase kann aber auch z.B. durch Inhibition

von spezifischen Phosphatasen wie z.B. Cdc25C (Russell and Nurse 1986, *Cell* **45**:145-53) ausgelöst werden. Hefen mit defektem Cdc25 Gen arretieren in der G2 Phase, während eine Überexpression von Cdc25 zu einem verfrühten Eintritt in die Mitosephase führt (Russell und Nurse 1987, *Cell* **49**:559-67). Desweiteren kann ein

5 Arrest in der G2/M Phase auch durch Inhibition von bestimmten Motorproteinen, den sogenannten Kinesinen wie z.B. Eg5 (Mayer et al. 1999, *Science* **286**:971-4), oder durch Mikrotubuli stabilisierende oder destabilisierende Agentien (z.B. Colchicin, Taxol, Etoposid, Vinblastin, Vincristin) ausgelöst werden (Schiff und Horwitz 1980, *Proc Natl Acad Sci U S A* **77**:1561-5).

10 Neben den Cyclin-abhängigen und den Aurora Kinasen spielen des weiteren die sogenannten Polo-like Kinasen, eine kleine Familie von Serin/Threonin-Kinasen, eine wichtige Rolle bei der Regulation des eukaryontischen Zellzykluses. Bisher wurden die Polo-like Kinasen PLK-1, PLK-2, PLK-3 und PLK-4 in der Literatur beschrieben.

15 Besonders für PLK-1 wurde eine zentrale Rolle in der Regulation der Mitosephase gezeigt. PLK-1 ist für die Reifung der Zentrosomen, für die Aktivierung der Phosphatase Cdc25C, sowie für die Aktivierung des Anaphase Promoting Complex verantwortlich (Glover et al. 1998, *Genes Dev.* **12**:3777-87; Qian et al. 2001, *Mol Biol Cell.* **12**:1791-9). Die Injektion von PLK-1 Antikörpern führt zu einem G2 Arrest in

20 nicht transformierten Zellen, während Tumorzellen in der Mitosephase arretieren (Lane und Nigg 1996, *J Cell Biol.* **135**:1701-13). Überexpression von PLK-1 konnte für verschiedene Tumorarten, wie nicht kleinzelliges Lungenkarzinom, Plattenepithelkarzinom, Brust- und kolorektales Karzinom (Wolf et al. 1997, *Oncogene* **14** :543 -549; Knecht et al. 1999, *Cancer Res.* **59**:2794 -2797; Wolf et al. 2000, *Pathol. Res. Pract.* **196**:753 -759; Takahashi et al. 2003, *Cancer Sci.* **94**:148-52) gezeigt

25 werden. Daher stellt diese Klasse von Proteinen ebenfalls einen interessanten Angriffspunkt zur therapeutischen Intervention proliferativer Krankheiten dar (Liu and Erikson 2003, *Proc Natl Acad Sci U S A* **100**:5789-5794).

Die Resistenz vieler Tumorarten erfordert die Entwicklung neuer Arzneimittel zur

30 Tumorbekämpfung.


Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, neue Verbindungen mit antiproliferativer Wirkung bereitzustellen.

Beschreibung der Erfindung

5

Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch die nachstehenden Verbindungen der Formel (I) gelöst.

10 Dementsprechend betrifft die vorliegende Erfindung Dihydropteridinone der allgemeinen Formel (I)



worin

L eine Einfachbindung, oder eine verbrückende zweibindige Gruppe ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkylen, C₂-C₆-Alkenylen, C₂-C₆-Alkinylen, C₃-C₇-Cycloalkylen, C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen-C₁-C₄-Alkylen, C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen, -O-, -O-C₁-C₆-Alkylen, -O-C₃-C₆-Alkenylen, -O-C₃-C₆-Alkinylen, -O-C₃-C₇-Cycloalkylen, -O-C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen-C₁-C₄-Alkylen, -O-C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen, -NR⁷- und -NR⁷-C₁-C₆-Alkylen, -NR⁷-C₃-C₆-Alkenylen, -NR⁷-C₃-C₆-Alkinylen, -NR⁷-C₃-C₇-Cycloalkylen, -NR⁷-C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen-C₁-C₄-Alkylen, -NR⁷-C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen, welche gegebenenfalls substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;

R¹ und R², gleich oder verschieden, Wasserstoff, oder ein Rest ausgewählt aus der

Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl und C₂-C₆-Alkynyl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder

R¹ und R² gemeinsam C₂-C₆-Alkylen, in welchem gegebenenfalls ein oder zwei

5 Methylengruppen ersetzt sein können durch eine der Gruppen -O- oder -NR⁷-, und welches gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;

R³ Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus C₁-C₈-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₂-C₈-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl und C₆-C₁₄-Aryl, der gegebenenfalls ein- oder

10 mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹; oder

R³ und R² oder R³ und R¹ gemeinsam C₂-C₆-Alkylen, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;

R⁴ Wasserstoff, Halogen, CN, OH, -NR⁷R⁸ oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkyloxy, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkenyloxy, C₂-C₆-Alkynyl und C₂-C₆-Alkinyloxy, der gegebenenfalls ein- oder

15 mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R¹⁰;

R⁵ C₃-C₈-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁶, oder

R⁵ C₃-C₈-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann

20 durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder

R⁵ eine 5-10 gliedrige Heteroarylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder

25 mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹, oder

R⁵ eine 5-10 gliedrige Heterocycloalkylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder

oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹;

R⁶ -NR⁷R⁸ oder eine 5-10 gliedrige Heterocycloalkylgruppe, die ein-, zwei oder

30 drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die

gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R^{12} ;

R^7 und R^8 , gleich oder verschieden, Wasserstoff oder C_1 - C_6 -Alkyl,

R^9 Halogen, CN, OH oder CF_3 ;

5 R^{10} Halogen, OH, CN, =O, C_1 - C_6 -Alkyloxy, $COOR^7$, NR^7R^8 , $CONR^7R^8$, SO_2R^7 , CHF_2 oder CF_3 ;

R^{11} Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, OH, CF_3 , C_6 - C_{10} -Aryl oder C_1 - C_6 -Alkylen- C_6 - C_{10} -Aryl;

R^{12} Halogen, CF_3 , C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl oder C_1 - C_6 -Alkylen- C_3 - C_8 -Cycloalkyl;

10 bedeuten, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin

15 L eine Einfachbindung, oder eine verbrückende zweibindige Gruppe ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C_1 - C_6 -Alkylen, C_2 - C_6 -Alkenylen, C_2 - C_6 -Alkinylen, C_3 - C_7 -Cycloalkylen, C_1 - C_4 -Alkylen- C_6 - C_{10} -Arylen- C_1 - C_4 -Alkylen, -O-,

-O- C_1 - C_4 -Alkylen, - NR^7 - und - NR^7 - C_1 - C_4 -Alkylen, welche gegebenenfalls
20 substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R^9 ;

R^1 und R^2 , gleich oder verschieden, Wasserstoff, oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C_1 - C_6 -Alkyl, C_2 - C_6 -Alkenyl und C_2 - C_6 -Alkynyl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R^9 , oder

25 R^1 und R^2 gemeinsam C_2 - C_6 -Alkylen, in welchem gegebenenfalls ein oder zwei Methylengruppen ersetzt sein können durch eine der Gruppen -O- oder - NR^7 -, und welches gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R^9 ;

R^3 Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus C_1 - C_8 -Alkyl, C_2 - C_8 -Alkenyl, C_2 - C_8 -Alkynyl, C_3 - C_8 -Cycloalkyl und C_6 - C_{14} -Aryl, der gegebenenfalls ein- oder
30 mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R^9 ; oder

- R³ und R² oder R³ und R¹ gemeinsam C₂-C₆-Alkylen, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- R⁴ Wasserstoff, Halogen, CN, OH, -NR⁷R⁸ oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkyloxy, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkenyloxy, C₂-C₆-Alkynyl und C₂-C₆-Alkinyloxy, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R¹⁰;
- 5 R⁵ C₃-C₈-Cycloalkyl, das gegebenenfalls einfach substituiert sein kann durch einen Rest R⁶, oder
- R⁵ C₃-C₈-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder
- 10 R⁵ eine 5-10 gliedrige Heteroarylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹, oder
- 15 R⁵ eine 5-10 gliedrige Heterocycloalkylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹;
- R⁶ -NR⁷R⁸ oder eine 5-10 gliedrige Heterocycloalkylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹²;
- 20 R⁷ und R⁸, gleich oder verschieden, Wasserstoff oder C₁-C₆-Alkyl,
- 25 R⁹ Halogen, CN, OH oder CF₃;
- R¹⁰ Halogen, OH, CN, =O, C₁-C₆-Alkyloxy, COOR⁷, CONR⁷R⁸, SO₂R⁷, CHF₂ oder CF₃;
- R¹¹ Halogen, C₁-C₄-Alkyl, OH, CF₃, C₆-C₁₀-Aryl oder C₁-C₆-Alkylen-C₆-C₁₀-Aryl;
- R¹² Halogen, CF₃, C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₈-Cycloalkyl oder C₁-C₆-Alkylen-C₃-C₈-Cycloalkyl;
- 30

bedeuten, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

- 5 Bevorzugt sind ferner Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin
- L eine Einfachbindung, -O-, -O-C₁-C₃-Alkylen, -NR⁷-, -NR⁷-C₁-C₃-Alkylen oder C₁-C₄-Alkylen, welches gegebenenfalls substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- R¹ und R², gleich oder verschieden, Wasserstoff, oder ein Rest ausgewählt aus der
- 10 Gruppe bestehend aus C₁-C₄-Alkyl, C₂-C₄-Alkenyl und C₂-C₄-Alkinyl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder
- R¹ und R² gemeinsam C₂-C₄-Alkylen, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- 15 R³ Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₇-Cycloalkyl und C₆-C₁₀-Aryl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹; oder
- R³ und R² oder R³ und R¹ gemeinsam C₂-C₄-Alkylen, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- 20 R⁴ Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, -NR⁷R⁸ oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkyloxy, C₂-C₄-Alkenyloxy und C₂-C₄-Alkinyloxy, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R¹⁰;
- R⁵ C₃-C₇-Cycloalkyl, das gegebenenfalls einfach substituiert sein kann durch einen
- 25 Rest R⁶, oder
- R⁵ C₃-C₇-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder
- R⁵ ein Heteroaryl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Imidazolyl, Oxazolyl,
- 30 Pyrimidinyl, Indolyl, Chinolinyl, Isochinolinyl, Benzimidazolyl, Purinyl und Pteridinyl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹, oder

- R⁵ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Piperazinyl, Pyrrolinyl, Pyrrolidinyl, Pyrazolinyl, Pyrazolidinyl, Imidazolinyll, Imidazolidinyl und Morpholinyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹;
- 5 R⁶ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Piperazinyl, Pyrrolinyl, Pyrrolidinyl, Pyrazolinyl, Pyrazolidinyl, Imidazolinyll, Imidazolidinyl und Morpholinyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹²;
- R⁷ und R⁸, gleich oder verschieden, Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl,
- 10 R⁹ Halogen, OH, =O oder CF₃;
- R¹⁰ Halogen, OH, =O, C₁-C₄-Alkyloxy oder CF₃;
- R¹¹ Halogen, C₁-C₄-Alkyl, OH, CF₃, Phenyl oder C₁-C₄-Alkylen-Phenyl;
- R¹² C₁-C₄-Alkyl, C₃-C₆-Cycloalkyl oder C₁-C₄-Alkylen-C₃-C₆-Cycloalkyl;
- bedeuten, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere,
- 15 ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.
- Bevorzugt sind ferner Verbindungen der allgemeinen Formel (I),
worin
- 20 L eine Einfachbindung, C₁-C₄-Alkylen, -O- oder NH-;
- R¹ und R², gleich oder verschieden, Wasserstoff, oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₄-Alkyl, C₂-C₄-Alkenyl und C₂-C₄-Alkinyll, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, OH und CF₃;
- 25 oder
- R³ Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₇-Cycloalkyl und C₆-C₁₀-Aryll, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, OH und CF₃;
- oder
- 30 R⁴ Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, -NR⁷R⁸ oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkyloxy, C₂-C₄-Alkenyloxy und C₂-C₄-Alkinyloxy, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann

- durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, OH, Methoxy, Ethoxy und CF₃;
- R⁵ C₃-C₇-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methyl, Ethyl, Propyl OH, Fluor, Chlor, CF₃ und R⁶, oder
- 5 R⁵ ein Heteroaryl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Imidazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Pyrrolyl, Pyrazolyl, Oxadiazol, Pyridyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Pyrimidinyl, Indolyl, Chinolinyll, Isochinolinyll, Benzimidazolyl, Purinyl und Pteridinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, OH, CF₃, Methyl, Ethyl, Propyl, Phenyl, Benzyl oder Phenethyl,
- 10 R⁵ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Piperazinyl, Pyrrolinyl, Pyrrolidinyl, Pyrazolinyl, Pyrazolidinyl, Imidazolinyll, Imidazolidinyl und Morpholinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, OH, CF₃, Methyl, Ethyl, Propyl, Phenyl, Benzyl oder Phenethyl;
- 15 R⁶ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Piperazinyl, Pyrrolinyl, Pyrrolidinyl, Pyrazolinyl, Pyrazolidinyl, Imidazolinyll, Imidazolidinyl und Morpholinyl, der ein- oder zweifach substituiert sein kann durch Methyl, Ethyl, Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl;
- 20 R⁷ und R⁸, gleich oder verschieden, Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl, bedeuten, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.
- 25 Bevorzugt sind ferner Verbindungen der allgemeinen Formel (I),
worn
L eine Einfachbindung, -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -O- oder NH-;
R¹ und R², gleich oder verschieden Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus der
30 Gruppe

- bestehend aus Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Allyl und Propargyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor und CF₃;
- 5 R³ Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl und Phenyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor und CF₃;
- R⁴ Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Methoxy, Ethoxy oder Propoxy;
- 10 R⁵ C₃-C₆-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Methyl, Ethyl, Propyl OH, Fluor, Chlor, CF₃ oder R⁶, oder
- R⁵ ein Heteroaryl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Pyridyl, Pyrrolyl und Pyrimidinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, OH, CF₃, Methyl, Ethyl, Propyl,
- 15 Phenyl, Benzyl oder Phenethyl,
- R⁵ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Piperazinyl, Pyrrolidinyl und Morpholinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, OH, CF₃, Methyl, Ethyl, Propyl, Phenyl, Benzyl oder Phenethyl,
- 20 R⁶ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Morpholinyl, Pyrrolidinyl und Piperazinyl, das gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch Methyl, Ethyl, Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl,
- bedeuten, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin

- 30 L eine Einfachbindung, oder eine verbrückende zweibindige Gruppe ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₄-Alkylen, C₂-C₄-Alkenylen, C₂-C₄-Alkinylen, C₃-C₆-Cycloalkylen, -O-, -O-C₁-C₃-Alkylen, -NR⁷- und -NR⁷-C₁-C₃-

Alkylen, welche gegebenenfalls substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R^9 , bedeuten und die Reste R^1 , R^2 , R^3 , R^4 und R^5 und R^9 eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind ferner Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin L eine Einfachbindung, -O-, -NH- oder C_1 - C_4 -Alkylen, bevorzugt eine Einfachbindung -NH-, - CH_2 - oder - CH_2 - CH_2 -, besonders bevorzugt eine Einfachbindung oder -NH- bedeuten und die Reste R^1 , R^2 , R^3 , R^4 und R^5 eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin R^1 Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Allyl oder Propargyl, bevorzugt Wasserstoff oder Methyl, besonders bevorzugt Wasserstoff bedeuten und die Reste L, R^2 , R^3 , R^4 und R^5 eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin R^2 Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Allyl oder Propargyl, bevorzugt Methyl oder Ethyl bedeuten und die Reste L, R^1 , R^3 , R^4 und R^5 eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer

Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen

5 Formel (I) , worin

R^3 Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl, bevorzugt Propyl, Butyl, Pentyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl, besonders bevorzugt Propyl, Butyl, Pentyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl, bedeuten, wobei

10 Cyclohexyl von besonderer Bedeutung sind,

und die Reste L, R^1 , R^2 , R^4 und R^5 eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder

15 Hydrate.

Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen

Formel (I) , worin

R^4 Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Methyloxy oder Ethyloxy, bevorzugt Wasserstoff, Methyl oder Methyloxy, besonders bevorzugt Wasserstoff oder Methyloxy bedeuten,

20 und die Reste L, R^1 , R^2 , R^3 und R^5 eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen

Formel (I), worin

30 R^5 ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Methyl, Ethyl, OH, Fluor, Chlor, CF_3 , Piperidinyll,

- Morpholinyl, Pyrrolidinyl oder Piperazinyl, wobei vorstehend genannte gegebenenfalls vorhandene Substituenten Piperidinyl, Morpholinyl, Pyrrolidinyl und Piperazinyl ihrerseits ein- oder zweifach substituiert sein können durch Methyl, Ethyl, Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl, bedeuten
- 5 und die Reste L, R¹, R², R³ und R⁴ eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.
- 10 Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin
- R⁵ ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Cyclopentyl oder Cyclohexyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann
- 15 durch Methyl, Fluor, CF₃, Morpholinyl oder Piperazinyl, wobei vorstehend genannte gegebenenfalls vorhandene Substituenten Morpholinyl und Piperazinyl ihrerseits ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein können durch Methyl, Ethyl oder Cyclopropylmethyl, bedeuten
- und die Reste L, R¹, R², R³ und R⁴ eine der vor- oder nachstehend genannten
- 20 Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.
- 25 Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin
- R⁵ ein Heteroaryl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Imidazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Pyrolyl, Pyrazolyl, Oxadiazolyl, Pyridyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Pyrimidinyl, Indolyl, Chinolinyl, Isochinolinyl, Benzimidazolyl, Purinyl und
- 30 Pteridinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, OH, CF₃, Methyl, Ethyl, Propyl, Phenyl, Benzyl oder Phenethyl, bedeuten,

und die Reste L, R¹, R², R³ und R⁴ eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder
5 Hydrate.

Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin

R⁵ ein Heteroaryl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Imidazolyl, Pyrolyl,
10 Pyridyl, Pyrimidinyl, Chinolinyll, Isochinolinyll und Benzimidazolyl, bevorzugt ausgewählt aus Pyridyl, Pyrolyl und Pyrimidinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, CF₃, Methyl, Ethyl, Phenyl oder Benzyl, bedeuten,

und die Reste L, R¹, R², R³ und R⁴ eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder
15 Hydrate.

20 Erfindungsgemäß von besonderer Bedeutung sind Verbindungen der allgemeinen Formel (I), worin

R⁵ ein Heteroaryl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Imidazolyl, Pyrolyl, Pyridyl, Pyrimidinyl, Chinolinyll, Isochinolinyll und Benzimidazolyl, bevorzugt ausgewählt aus Pyridyl, Pyrolyl und Pyrimidinyl, der gegebenenfalls ein- oder
25 zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, CF₃, Methyl, Ethyl, Phenyl oder Benzyl, bedeuten,

und die Reste L, R¹, R², R³ und R⁴ eine der vor- oder nachstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder
30 Hydrate.

Als Alkylgruppen sowie Alkylgruppen, welche Bestandteil anderer Reste sind, werden verzweigte und unverzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen bevorzugt 1 – 6, besonders bevorzugt 1-4 Kohlenstoffatomen bezeichnet. Beispielsweise werden genannt: Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl und Octyl. Sofern nicht
5 anders genannt, sind von den vorstehend genannten Bezeichnungen Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl und Octyl sämtliche der möglichen isomeren Formen umfaßt. Beispielsweise umfaßt die Bezeichnung Propyl die beiden isomeren Reste n-Propyl und iso-Propyl, die Bezeichnung Butyl n-Butyl, iso-Butyl, sec. Butyl und tert.-Butyl, die Bezeichnung Pentyl, iso-Pentyl, Neopentyl etc.

10 In den vorstehend genannten Alkylgruppen können sofern nicht gegenteilig oder ergänzend definiert gegebenenfalls ein oder mehrere Wasserstoffatome durch andere Reste ersetzt sein. Beispielsweise können diese Alkylgruppen durch Fluor substituiert sein. Es können gegebenenfalls auch alle Wasserstoffatome der Alkylgruppe ersetzt sein.

15 Als Alkyloxygruppen, gegebenenfalls auch Alkoxygruppen oder -O-Alkylgruppen genannt, werden vorstehend genannte Alkylgruppen bezeichnet, die über eine Sauerstoffbrücke verknüpft sind. Beispielsweise werden genannt: Methyloxy, Ethyloxy, Propyloxy, Butyloxy, Pentyloxy, Hexyloxy, Heptyloxy und Octyloxy, die
20 gegebenenfalls auch als Methoxy, Ethoxy, Propoxy etc. bezeichnet werden.

Als Alkylenbrücke oder Alkylengruppe werden, soweit nicht anders angegeben, verzweigte und unverzweigte Alkylgruppen mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, beispielsweise Methylen, Etyhlen, Propylen, Isopropylen, n-Butylen, iso-Butyl, sec.
25 Butyl und tert.-Butyl etc. Brücken bezeichnet. Besonders bevorzugt sind Methylen, Etyhlen, Propylen- und Butylen-Brücken. In den genannten Alkylenbrücken können sofern nicht gegenteilig oder ergänzend definiert gegebenenfalls 1 bis 2 C-Atome durch ein oder mehrere Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel ersetzt sein

30 Als Alkenylgruppen (auch soweit sie Bestandteil anderer Reste sind) werden verzweigte und unverzweigte Alkylengruppen mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen, bevorzugt 2 - 6

Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt 2 - 3 Kohlenstoffatomen betrachtet, soweit sie mindestens eine Doppelbindung aufweisen. Beispielsweise werden genannt: Ethenyl, Propenyl, Butenyl, Pentenyl etc. Sofern nicht anders genannt, sind von den vorstehend genannten Bezeichnungen Propenyl, Butenyl etc. sämtliche der möglichen isomeren

5 Formen umfaßt. Beispielsweise umfaßt die Bezeichnung Butenyl 1-Butenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-1-Propenyl, 1-Methyl-2-Propenyl, 2-Methyl-1-Propenyl, 2-Methyl-2-Propenyl und 1-Ethyl-1-Ethenyl.

In den vorstehend genannten Alkenylgruppen können, soweit nicht anders beschrieben, gegebenenfalls ein oder mehrere Wasserstoffatome durch andere Reste ersetzt sein.

10 Beispielsweise können diese Alkylgruppen durch die Halogenatome Fluor substituiert sein. Es können gegebenenfalls auch alle Wasserstoffatome der Alkenylgruppe ersetzt sein.

Als Alkenyloxygruppen, gegebenenfalls auch Alkenoxygruppen oder -O-

15 Alkenylgruppen genannt, werden vorstehend genannte Alkenylgruppen bezeichnet, die über eine Sauerstoffbrücke verknüpft sind. Beispielsweise werden genannt: Ethylenoxy, Propylenoxy, Butylenoxy.

Als Alkenylengruppen (auch soweit sie Bestandteil anderer Reste sind) werden

20 verzweigte und unverzweigte, verbrückende Alkylengruppen mit 2 bis 6 Kohlenstoffatomen, bevorzugt 2 - 4 Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt 2 - 3 Kohlenstoffatomen betrachtet, soweit sie mindestens eine Doppelbindung aufweisen. Beispielsweise werden genannt: Ethenylen, Propenylen etc. Sofern nicht anders genannt, sind von den vorstehend genannten Bezeichnungen Propenylen, Butenylen etc.

25 sämtliche der möglichen isomeren Formen umfaßt.

Als Alkinyllgruppen (auch soweit sie Bestandteil anderer Reste sind) werden verzweigte und unverzweigte Alkinyllgruppen mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen bezeichnet, soweit sie mindestens eine Dreifachbindung aufweisen, beispielsweise Ethinyl, Propargyl, Butinyl,

30 Pentinyl, Hexinyl etc., vorzugsweise Ethinyl oder Propinyl.

In den vorstehend genannten Alkinyllgruppen können, soweit nicht anders beschrieben, gegebenenfalls ein oder mehrere Wasserstoffatome durch andere Reste ersetzt sein.

Beispielsweise können diese Alkinyllgruppen Fluor substituiert sein. Es können gegebenenfalls auch alle Wasserstoffatome der Alkinyllgruppe ersetzt sein.

Als Alkinyloxygruppen, gegebenenfalls auch Alkinoxygruppen oder -O-Alkinyllgruppen
5 genannt, werden vorstehend genannte Alkinyllgruppen bezeichnet, die über eine Sauerstoffbrücke verknüpft sind.

Als Alkinyllengruppen (auch soweit sie Bestandteil anderer Reste sind) werden verzweigte und unverzweigte, verbrückende Alkinyllgruppen mit 2 bis 6
10 Kohlenstoffatomen bezeichnet, soweit sie mindestens eine Dreifachbindung aufweisen, beispielsweise Ethinylen, Propargylen etc. In den vorstehend genannten Alkinyllengruppen können, soweit nicht anders beschrieben, gegebenenfalls ein oder mehrere Wasserstoffatome durch andere Reste ersetzt sein. Sofern nicht anders genannt, sind von den vorstehend genannten Bezeichnungen Propargylen etc. sämtliche der
15 möglichen isomeren Formen umfasst.

Der Begriff Aryl steht für ein aromatisches Ringsystem mit 6 bis 14 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 6 oder 10 Kohlenstoffatomen, bevorzugt Phenyl oder Naphthyl, besonders bevorzugt Phenyl.

20 Als 5-10 gliedrige Heteroarylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann, werden mono- oder bicyclische aromatische Ringsysteme verstanden, die beispielsweise ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus
25 Imidazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Pyrolyl, Pyrazolyl, Oxadiazol, Pyridyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Pyrimidinyl, Indolyl, Chinolinyl, Isochinolinyl, Benzimidazolyl, Purinyl, Pyrimidopyrimidinyl, Benzoxazolyl, Benzisoxazolyl, Pyridopyrimidinyl und Pteridinyl.

Als Cycloalkylgruppen werden Cycloalkylreste mit 3 - 8 Kohlenstoffatomen
30 beispielsweise Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl oder Cyclooctyl, vorzugsweise Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl bezeichnet. Bis auf Cyclopropyl und Cyclobutyl, können die genannten Cycloalkylgruppen

gegebenenfalls auch partiell ungesättigt sein, das bedeutet wenigstens eine Doppelbindung enthalten wie beispielsweise Cyclohexen. Die Bezeichnung Cycloalkylengruppe steht für verbrückende, zweibindige Cycloalkylgruppen.

5 "=O" bedeutet ein über eine Doppelbindung verknüpftes Sauerstoffatom.


Als 5-10 gliedrige Heterocycloalkylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann, werden, soweit in den Definitionen nicht anders
10 beschrieben, beispielsweise genannt Tetrahydrofuranyl, Tetrahydrofuranonyl, γ -Butyrolactonyl, α -Pyranyl, γ -Pyranyl, Dioxolanyl, Tetrahydropyranyl, Dioxanyl, Dihydrothiophenyl, Thiolanyl, Dithiolanyl, Pyrrolinyl, Pyrrolidinyl, Pyrazolinyl, Pyrazolidinyl, Imidazolinyl, Imidazolidinyl, Piperidinyl, Piperazinyl, Morpholinyl, Thiomorpholinyl, Diazepanyl, Oxazinyl, Tetrahydrooxazinyl, Pyrazolidinyl genannt,
15 vorzugsweise Morpholinyl, Pyrrolidinyl, Piperidinyl oder Piperazinyl, genannt.

Als Halogen wird im allgemeinen Fluor, Chlor, Brom oder Jod bezeichnet, vorzugsweise Fluor, Chlor oder Brom, besonders bevorzugt Fluor oder Chlor.

20 Die erfindungsgemäßen Verbindungen können in Form der einzelnen optischen Isomeren, Mischungen der einzelnen Enantiomeren, Diastereomeren oder Racemate, in Form der Tautomere sowie in Form der freien Basen oder der entsprechenden Säureadditionssalze mit pharmakologisch unbedenklichen Säuren vorliegen. Unter Säureadditionssalzen mit pharmakologisch unbedenklichen Säuren werden dabei
25 beispielsweise Salze ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Hydrochlorid, Hydrobromid, Hydroiodid, Hydrosulfat, Hydrophosphat, Hydromethansulfonat, Hydronitrat, Hydromaleat, Hydroacetat, Hydrobenzoat, Hydrocitrat, Hydrofumarat, Hydrotartrat, Hydrooxalat, Hydrosuccinat, Hydrobenzoat und Hydro-p-toluolsulfonat, bevorzugt Hydrochlorid, Hydrobromid, Hydrosulfat, Hydrophosphat, Hydrofumarat
30 und Hydromethansulfonat verstanden.

Von den vorstehend genannten Säureadditionssalzen sind die Salze der Chlorwasserstoffsäure, der Methansulfonsäure, der Benzoesäure und der Essigsäure erfindungsgemäß besonders bevorzugt.

- 5 Von den gegebenenfalls existierenden Enantiomeren und Diastereomeren Verbindungen der allgemeinen Formel (I) sind erfindungsgemäß diejenigen optischen Isomere bevorzugt, die am die beiden Reste R¹ und R² tragenden Kohlenstoffzentrum R-Konfiguration aufweisen.
- 10 Der Rest R⁴ kann, sofern er nicht Wasserstoff bedeutet, in den Verbindungen der allgemeinen Formel (I) bezüglich der an das Pteridinon-gerüst verknüpften NH-Gruppe ortho- oder meta-ständig verknüpft sein. Besonders bevorzugt sind diejenigen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) in denen R⁴ zur genannten NH-Gruppe ortho-ständig konfiguriert ist. Diese bevorzugten Verbindungen sind gekennzeichnet durch
- 15 die allgemeine Formel (I')



- wobei die Reste L, R¹, R², R³, R⁴ und R⁵ die vorstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer
- 20 pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen kann nach den im folgenden beschriebenen Syntheseverfahren A erfolgen, wobei die Substituenten der allgemeinen


Formeln (A1) bis (A9) die zuvor genannten Bedeutungen haben. Dieses Verfahren ist als Erläuterung der Erfindung zu verstehen ohne selbige auf deren Gegenstand zu beschränken.

5 Verfahren A

Stufe 1A

Eine Verbindung der Formel (A1) wird mit einer Verbindung der Formel (A2) zu einer Verbindung der Formel (A3) umgesetzt (Schema 1A). Diese Reaktion kann gemäß WO 0043369 oder WO 0043372 durchgeführt werden. Verbindung (A1) ist kommerziell,
 10 beispielsweise bei City Chemical LLC, 139 Allings Crossing Road, West Haven, CT, 06516, USA, erhältlich. Verbindung (A2) kann nach literaturbekannten Vorschriften (a) F. Effenberger, U. Burkhardt, J. Willfahrt *Liebigs Ann. Chem.* **1986**, 314-333. b) T. Fukuyama, C.-K. Jow, M. Cheung, *Tetrahedron Lett.* **1995**, 36, 6373-6374. c) R. K. Olsen, *J. Org. Chem.* **1970**, 35, 1912-1915. d) F.E. Dutton, B.H. Byung *Tetrahedron*
 15 *Lett.* **1998**, 30, 5313-5316. e) J. M. Ranajuhi, M. M. Joullie *Synth. Commun.* **1996**, 26, 1379-1384 hergestellt werden.

Schema 1A



20

In Stufe 1A werden 1 Äquivalent der Verbindung (A1) und 1 bis 1,5 Äquivalente, bevorzugt 1,1 Äquivalente einer Base, vorzugsweise Kaliumcarbonat,

Kaliumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat,

Calciumcarbonat, besonders bevorzugt Kaliumcarbonat, in einem Verdünnungsmittel

25 gegebenfalls mit Wasser gemischt, beispielsweise Aceton, Tetrahydrofuran,

Diethylether, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Petrolether oder Dioxan, vorzugsweise Cyclohexan oder Diethylether, gerührt.

- Bei einer Temperatur von 0 bis 15 °C, bevorzugt 5 bis 10 °C, wird 1 Äquivalent einer Aminosäure der Formel (A2) gelöst in einem organischen Lösungsmittel, beispielsweise Aceton, Tetrahydrofuran, Diethylether, Cyclohexan oder Dioxan, zugetropft. Das
- 5 Reaktionsgemisch wird unter Rühren auf eine Temperatur von 18°C bis 30 °C, vorzugsweise etwa 22°C, erwärmt und anschließend weitere 10 bis 24 Stunden, vorzugsweise etwa 12 Stunden, weitergerührt. Danach wird das Verdünnungsmittel abdestilliert, der Rückstand mit Wasser versetzt und das Gemisch zwei bis dreimal eines organischen Lösungsmittels beispielsweise, Diethylether oder Ethylacetat,
- 10 vorzugsweise Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten organischen Extrakte werden getrocknet und das Lösungsmittel abdestilliert. Der Rückstand (Verbindung A3) kann ohne vorherige Aufreinigung in Stufe 2 eingesetzt werden.

Stufe 2A

- 15 Die in Stufe 1A erhaltene Verbindung (A3) wird an der Nitrogruppe reduziert und zur Verbindung der Formel (A4) zyklisiert (Schema 2A).

Schema 2A



- 20 In Stufe 2A werden 1 Äquivalent der Nitroverbindung (A3) in einer Säure gelöst, vorzugsweise Eisessig, Ameisensäure oder wässrige Salzsäure, bevorzugt Eisessig, und auf 50 bis 70 °C, vorzugsweise etwa 60 °C, erwärmt. Anschließend wird ein Reduktionsmittel, beispielsweise Zink, Zinn, oder Eisen, bevorzugt Eisenpulver, bis zum Abschluß der exothermen Reaktion hinzugefügt und 0,2 bis 2 Stunden,
- 25 vorzugsweise 0,5 Stunden, bei 100 bis 125 °C, vorzugsweise bei etwa 115 °C, gerührt. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur wird das Eisensalz abfiltriert und das Lösungsmittel abdestilliert. Der Rückstand wird in einem Lösungsmittel oder


Lösungsmittelgemisch, beispielsweise Ethylacetat oder Dichlormethan/ Methanol 9/1 und halbgesättigte NaCl-Lösung, aufgenommen und beispielsweise über Kieselgur filtriert. Die organische Phase wird getrocknet und eingeengt. Der Rückstand (Verbindung (A4)) kann chromatographisch oder mittels Kristallisation gereinigt oder als Rohprodukt in Stufe 3A der Synthese eingesetzt werden.

Stufe 3A

Die in Stufe 2A erhaltene Verbindung (A4) kann durch elektrophile Substitution gemäß Schema 3A zur Verbindung der Formel (A5) umgesetzt werden.

10

Schema 3A




In Stufe 3A werden 1 Äquivalent des Amides der Formel (A4) in einem organischen Lösungsmittel, beispielsweise Dimethylformamid oder Dimethylacetamid, vorzugsweise Dimethylacetamid, gelöst und auf etwa -5 bis 5 °C, vorzugsweise 0°C, abgekühlt.

Anschließend wird 0,9 bis 1,3 Äquivalente Natriumhydrid und 0,9 bis 1,3 Äquivalente eines Methylierungsreagenzes, beispielsweise Methyljodid zugegeben. Das Reaktionsgemisch wird 0,1 – 3 Stunden, vorzugsweise etwa 1 Stunde, bei etwa 0 bis 10 °C, vorzugsweise bei etwa 5 °C, gerührt und kann gegebenenfalls weitere 12 Stunden bei diesem Temperaturbereich stengelassen werden. Die Reaktionsmischung wird auf Eiswasser gegossen und der Niederschlag isoliert. Der Rückstand (Verbindung (A5)) kann chromatographisch, vorzugsweise über Kieselgel, oder mittels Kristallisation gereinigt oder als Rohprodukt in Stufe 4A der Synthese eingesetzt werden.

25

Stufe 4A

- Die Aminierung der in Stufe 3A erhaltenen Verbindung (A5) zur Verbindung der Formel (I) (Schema 4A) kann nach den literaturbekannten Methoden der Varianten 4.1A (a) M.P.V. Boarland, J.F.W. McOmie *J. Chem. Soc.* 1951, 1218-1221; b) F. H. S. Curd, F. C. Rose *J. Chem. Soc.* 1946, 343-348 oder 4.2A (a) Banks *J. Am. Chem. Soc.* 1944, 66, 1131; b) Ghosh and Dolly *J. Indian Chem. Soc.* 1981, 58, 512-513. c) N. P. Reddy and M. Tanaka *Tetrahedron Lett.* 1997, 38, 4807- 4810 durchgeführt werden.


10 Schema 4A

- Beispielsweise werden in Variante 4.1A 1 Äquivalent der Verbindung (A5) und 1 bis 3 Äquivalente, vorzugsweise etwa 1 Äquivalent der Verbindung (A6) ohne Lösungsmittel oder einem organischen Lösungsmittel wie beispielsweise Sulfolan, Dimethylformamid, Dimethylacetamid, Toluol, N-Methylpyrrolidon, Dimethylsulfoxid, oder Dioxan, bevorzugt Sulfolan über 0,1 bis 4 Stunden, vorzugsweise 1 Stunde, bei 100 bis 220 °C, vorzugsweise bei etwa 160 °C erhitzt. Nach dem Abkühlen wird durch Zugabe von org. Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen beispielsweise Diethylether/Methanol,

Ethylacetat, Methylenchlorid, oder Diethylether, vorzugsweise Diethylether/Methanol 9/1, das Produkt (A9) kristallisiert oder chromatographisch gereinigt.

Wie in Schema 4A ersichtlich, sind für die Synthese der erfindungsgemäßen

- 5 Verbindungen der allgemeinen Formel (I) die Verbindungen der Formel (A5) von zentraler Bedeutung. Dementsprechend betrifft die vorliegende Erfindung ferner Zwischenverbindungen der allgemeinen Formel (A5)



- 10 worin die Reste R^1 , R^2 und R^3 die vorstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

- 15 Beispielsweise wird in Variante 4.2A 1 Äquivalent der Verbindung (A5) und 1 bis 3 Äquivalente der Verbindung (A6) mit Säure, beispielsweise 1-10 Äquivalente 10-38%ige Salzsäure und/oder einem Alkohol beispielsweise Ethanol, Propanol, Dioxan, Butanol, bevorzugt Ethanol unter Rückfluss 1 bis 48 Stunden, vorzugsweise etwa 5 Stunden, gerührt.

- 20 Das ausgefallene Produkt der Formel (I) wird abfiltriert und gegebenenfalls mit Wasser gewaschen, getrocknet und aus einem geeigneten org. Lösungsmittel kristallisiert.

Analog zu den beschriebenen Verfahren werden die Produkte der Formel (A7) erhalten, die durch weitere Umsetzungen in die Produkte der Formel (I) überführt werden.

25 Stufe 5A

Nachfolgend der Aminierung in Stufe 4A können die Produkte der Formel (A9) auch über eine Abspaltung einer beispielsweise säure- oder basenlabilen Gruppe von Verbindungen des Types (A7) oder durch Reduktion einer Nitrogruppe zum Amin (A8)

und anschließende Umsetzung zu Amiden (A9a), Urethanen (A9b) oder Harnstoffen (A9c) erhalten werden (vgl. Schema 5A).


Variante 5.1A:

- 5 Beispielsweise werden 1 Äquivalent einer Verbindung (A7a) mit einer säurelabilen Schutzgruppe beispielsweise tert-Butyloxycarbonyl mit 1- 50 Äquivalenten einer Säure bevorzugt HCl oder Trifluoressigsäure in einem organischem Lösungsmittel z.B. Methylenchlorid, Ether, Dioxan, Tetrahydrofuran, bevorzugt Methylenchlorid versetzt und bei 20-100°C, bevorzugt 20°C für 1 bis 24h gerührt. Die Reaktionsmischung wird
- 10 beispielsweise über Kieselgel getrennt oder durch geeignete Kristallisation erhalten.

Variante 5.2B:

- Beispielsweise werden 1 Äquivalent einer Verbindung (A7b) in einem Lösungsmittel z.B. Methanol, Ethanol, THF, Essigester, Wasser gelöst und mit 0,001 bis 0,1
- 15 Äquivalent Pd/C (10%) versetzt und mit Wasserstoff für 1-24 h hydriert. Nach Filtration des Katalysators erhält man das Produkt (A8) welches eventuell durch Kieselgelchromatographie oder durch eine geeignete Kristallisation aufgereinigt wird.

Schema 5A



- Als Gruppe PG, wie sie in vorstehendem Schema bei den Verbindungen (A7a) genannt
- 5 ist, kommen im Stand der Technik bekannte Aminoschutzgruppen in Betracht. Geeignete Methoden zur Abspaltung der Gruppe PG und damit zur Überführung in die Verbindungen der Formel (A8) sind im Stand der Technik bekannt (vgl. T.W. Greene, "Protective Groups in Organic Synthesis", 2nd Edition).

Die in Schema 5A genannten Verbindungen der Formeln (A9a), (A9b) und (A9c) sind spezifische Vertreter der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I). In den Verbindungen der Formel (A9a) steht L dabei nicht für eine Gruppe L, die an den Carbonylkohlenstoff über ein -NH- oder -O- Brücke verknüpft ist. Diese Verbindungen sind vielmehr durch die Formeln (A9b) und (A9c) wiedergegeben.

Herstellung der Amide (A9a):

Beispielsweise wird 1 Äquivalent der Verbindung (A8) mit 1 Äquivalent eines Aktivierungsreagenzes, beispielsweise O-Benzotriazolyl-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat (TBTU) und einer Base, beispielsweise etwa 1,5 Äquivalente, Diisopropylethylamin (DIPEA) in einem organischen Verdünnungsmittel, beispielsweise Dichlormethan, Tetrahydrofuran, Dimethylformamid, N-Methylpyrrolidion, Dimethylacetamid, vorzugsweise Dichlormethan oder Dimethylformamid, gelöst. Nach Zugabe von 1 Äquivalent des Amins (A10) wird das Reaktionsgemisch 0,1 bis 24 Stunden, vorzugsweise etwa 2 Stunden bei 20°C bis 100°C gerührt. Über beispielsweise Kristallisation oder chromatographische Reinigung wird das Produkt der Formel (A9a) erhalten.

Herstellung der Harnstoffe (A9b):

Die in Schema 5A genannten Verbindungen A9b stellen Verbindungen dar, in denen L für eine NH Gruppe steht. Die nachstehend beschriebenen Vorgehensweisen sind, wie für den Fachmann klar ersichtlich, auch anwendbar, wenn L nicht lediglich NH, sondern beispielsweise -NH-Alkylen bedeutet.

25

Variante A:

1 Äquivalent Amin (A8) wird in einem organischen Lösungsmittel beispielsweise Dichlormethan, THF, Dimethylformamid und einer Base beispielsweise Pyridin, Triethylamin, Diisopropylethylamin gelöst und mit 1-2 Äquivalenten Chlorameisensäure-4-nitrophenylester, bevorzugt 1 Äquivalent versetzt. Nach 1-24 h, bevorzugt 2-5 h wird 1 Äquivalent $H_2N-L_n-R^5$, gelöst in einem organischen Lösungsmittel, zugegeben und 4-24h bei 20°C gerührt. Über beispielsweise

30

Kristallisation oder chromatographische Reinigung wird das Produkt der Formel (A9b) erhalten.

Variante B:

- 5 1 Äquivalent des Amines (A8) wird zusammen mit 1-3 Äquivalenten eines Isocyanates in einem organischen Lösungsmittel beispielsweise Dimethylformamid, THF, Dimethylacetamid gelöst und 1-24 h bei 40-70°C gerührt. Nach Entfernen des Lösungsmittels wird das Produkt (A9b) beispielsweise über Kristallisation oder chromatographische Reinigung erhalten.

10


Herstellung der Urethane (A9c):

Die in Schema 5A genannten Verbindungen A9c stellen Verbindungen dar, in denen L für eine -O- Gruppe steht. Die nachstehend beschriebenen Vorgehensweisen sind, wie für den Fachmann klar ersichtlich, auch anwendbar, wenn L nicht lediglich O, sondern

- 15 beispielsweise -O-Alkylen bedeutet.

- 1 Äquivalent des Amines (A7) wird in organischem Lösungsmittel beispielsweise Dichlormethan, Dimethylformamid, THF gelöst und mit 1-3 Äquivalenten Base beispielsweise Diisopropylethylamin, Triethylamin versetzt. Anschliessend wird 1-3
- 20 Äquivalente eines Chlorformiats zugegeben und für 1-24 h bei 20-60°C gerührt. Nach Entfernen des Lösungsmittels wird das Produkt (A9c) beispielsweise über Kristallisation oder chromatographische Reinigung erhalten

- Wie in Schema 5A ersichtlich, sind für die Synthese der erfindungsgemäßen
- 25 Verbindungen der allgemeinen Formel (I) die Verbindungen der Formel (A8) von zentraler Bedeutung. Dementsprechend betrifft die vorliegende Erfindung ferner Zwischenverbindungen der allgemeinen Formel (A8)




- worin die Reste R^1 , R^2 , R^3 und R^4 die vorstehend genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer
- 5 Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Als Säureadditionssalze kommen hierbei insbesondere diejenigen Salze in Betracht, die vorstehend für die Verbindungen der Formel (I) als pharmakologisch verträgliche Säureadditionssalze aufgeführt werden.

10

Wie in Schema 5A ersichtlich, sind für die Synthese der erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) ferner die Verbindungen der Formel (A7a) als Ausgangsverbindungen von großer Bedeutung. Dementsprechend betrifft die vorliegende Erfindung ferner Zwischenverbindungen der allgemeinen Formel (A7a)

15




worin die Reste R^1 , R^2 , R^3 und R^4 die vorstehend genannten Bedeutungen haben können und worin PG für eine Aminoschutzgruppe steht, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer

Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formel (A7a), worin

- 5 PG ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus tert-Butyloxycarbonyl-, Acetyl-, Trifluormethyl, 9-Fluorenylmethyloxycarbonyl, Allyloxycarbonyl und Benzyloxycarbonyl, bevorzugt tert-Butyloxycarbonyl-, Acetyl und Trifluormethyl,
- 10 bedeutet, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.


- Wie in Schema 5A ersichtlich, sind für die Synthese der erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) ferner die Verbindungen der Formel (A7b)
- 15 als Ausgangsverbindungen von großer Bedeutung. Dementsprechend betrifft die vorliegende Erfindung ferner Zwischenverbindungen der allgemeinen Formel (A7b)



- worin die Reste R¹, R², R³ und R⁴ die vorstehend genannten Bedeutungen haben
- 20 können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

Die Herstellung eines zur Synthese spezifischer Intermediate der allgemeinen Formel (A8), der Zwischenverbindungen Z1 – Z7, eingesetzten Eduktes wird im folgenden beschrieben.


- 5 Herstellung von 4-Amino-3-methoxy-phenyl-carbaminsäure tert-butylester:



- 15g 4-Nitro-3-methoxybenzoesäure wurde in 35 g tert-Butanol, 16 mL Disopropylethylamin und 15 mL Toluol gelöst, anschliessend mit 17,5 mL Diphenylphosphorylazid versetzt und 7h unter Rückfluss erhitzt. Anschliessend wurde der Ansatz eingengt und mit 500 mL Essigester versetzt und mit 3x je 200 mL Wasser extrahiert. Die org. Phase wurde getrocknet und die Reaktionsmischung über eine Kieselgelchromatographie (Petrolether: Essigester 3:1) getrennt, geeignete Fraktionen wurden vereinigt.
- 15 Ausbeute: 16,1 g einer Verbindung B1 (hellgelbe Kristalle)

- 16g der Verbindung B1 wurde in 400 mL Ethanol gelöst und mit 6 g 10%iger Pd/C mit Wasserstoff bei 20°C umgesetzt. Die Reaktionslösung wurde eingengt und der Feststoff mit Diethylether verrieben.
- 20 Ausbeute: 10,5 g 4-Amino-3-methoxy-phenyl-carbaminsäure tert-butylester (farblose Kristalle)

Zur Synthese der Beispiele 1 bis 3 wird zunächst eine Zwischenverbindung Z1 wie im folgenden beschrieben hergestellt.



- 50.0 g D-Alaninmethylester x HCl und 49.1 g Cyclohexanon wurden in 300 mL Dichlormethan vorgelegt und anschließend mit 41.0 g Natriumacetat und 159.0 g Natriumtriacetoxyborhydrid versetzt. Es wurde über Nacht gerührt und dann 300 mL
- 5 10%ige Natriumhydrogencarbonat-Lösung zugegeben. Die wässrige Phase wurde mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinten organischen Phasen wurden mit 10%iger Natriumhydrogencarbonat-Lösung gewaschen, über Na_2SO_4 getrocknet und eingengt. Ausbeute: 72.5 g einer Verbindung Z1a (klare Flüssigkeit)
- 10 72.5 g der Verbindung Z1a wurden in 500 mL Wasser vorgelegt und 76.6 g (0.39 mol) 2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin in 500 mL Diethylether zugegeben. Bei einer Temperatur von -5°C wurden 100 mL 10%ige Kaliumhydrogencarbonat-Lösung zugetropft. Es wurde 3 h bei -5°C und weitere 12 h bei Raumtemperatur gerührt. Die organische Phase wurde abgetrennt und über Na_2SO_4 getrocknet. Beim Einengen kristallisierte das
- 15 Produkt aus.
Ausbeute: 48.0 g einer Verbindung Z1b (gelbe Kristalle)
- 48.0 g der Verbindung Z1b wurden in 350 mL Eisessig gelöst und auf 60°C erwärmt. Es wurden portionsweise 47.5 g Eisen-Pulver zugegeben, wobei die Temperatur auf 105°C
- 20 stieg. Das Reaktionsgemisch wurde drei Stunden bei 80°C gerührt, anschließend heiß über Cellulose filtriert und eingengt. Der Rückstand wurde in Wasser und Essigsäureethylester ausgerührt, abgesaugt und der hellgraue Niederschlag mit Essigsäureethylester gewaschen. Das Filtrat wurde mit verdünntem Ammoniak und Wasser gewaschen, die organische Phase über Na_2SO_4 getrocknet, über Aktivkohle
- 25 filtriert und eingengt.

Ausbeute: 29.5 g einer Verbindung Z1c (hellgraue Kristalle)

32.1 g der Verbindung Z1c wurden in 300 mL Dimethylacetamid vorgelegt und mit 13 mL (0.2 mol) Methyljodid versetzt. Bei -5°C wurden portionsweise 6.4 g (0.16 mol)


- 5 Natriumhydrid als 60%ige Dispersion in Mineralöl zugegeben. Nach 2 h wurde das Reaktionsgemisch auf 800 mL Eiswasser gegossen. Der ausgefallene Niederschlag wurde abgesaugt und mit Petrolether gewaschen.

Ausbeute: 33.0 g einer Verbindung Z1d (beige Kristalle)

- 10 8 g Z1d wurden zusammen mit 5,54 g 4-Trifluoracetyl-p-phenylendiamin in einer Lösung von 40 mL Ethanol, 40 mL Wasser und 10 mL Salzsäure für 12 h unter Rückfluss erhitzt. Anschliessend wurde das Ethanol unter Vakuum entfernt, die Reaktionsmischung abgekühlt und der ausfallende Niederschlag abfiltriert. Die Mutterlauge wurde eingengt und der Rückstand mit Ethanol verrieben.

- 15 Ausbeute: 5,86 g der Zwischenverbindung Z1 als beiger Feststoff

Zur Synthese der Beispiele 17 bis 20 wird zunächst eine Zwischenverbindung Z2 wie im folgenden beschrieben hergestellt.



20

Eine Lösung von 128.2 g (0.83 mol) D-Alaninethylester x HCl und 71.5 g (0.85 mol) Cyclopentanon in 1500 mL Dichlormethan wurde mit 70.1 (0.85 mol) Natriumacetat und 265.6 g (1.25 mol) Natriumtriacetoxyborhydrid versetzt. Die Reaktionsmischung wurde 12 h gerührt und dann in 1.5 L einer 10%igen Natriumhydrogencarbonat-Lösung

gegossen. Die wässrige Phase wurde mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinten organischen Phasen wurden über Na_2SO_4 getrocknet und eingengt.

Ausbeute: 143.4 g einer Verbindung Z2a (farbloses Öl)

- 5 66.0 g der Verbindung Z2a wurden in 500 mL Wasser vorgelegt und mit 85.0 g (0.44 mol) 2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin in 500 mL Diethylether versetzt. Bei -5°C wurden 100 mL 10%ige Kaliumhydrogencarbonat-Lösung zugetropft und die Reaktionsmischung 48 h bei Raumtemperatur gerührt. Die wässrige Phase wurde mit Diethylether extrahiert, die vereinten organischen Phasen über Na_2SO_4 getrocknet und
10 eingengt. Der dunkelrote Feststoff wurde mit Petrolether ausgerührt und abgesaugt.
Ausbeute: 88.0 g einer Verbindung Z2b (gelbe Kristalle)

88.0 g der Verbindung Z2b wurden in 1000 mL Eisessig gelöst und bei 60°C portionsweise mit 85 g Eisen-Pulver versetzt, wobei die Temperatur auf 110°C anstieg.

- 15 Es wurde 1 h bei 60°C gerührt, anschließend heiß über Cellulose abgesaugt und eingengt. Der braune Feststoff wurde mit 700 mL Wasser ausgerührt und abgesaugt.
Ausbeute: 53.3 g einer Verbindung Z2c (leicht braune Kristalle)

53.3 g der Verbindung Z2c wurden in 300 mL Dimethylacetamid gelöst und mit 13 mL
20 (0.21 mol) Methyljodid versetzt. Bei -5°C wurden 5.0 g (0.21 mol) Natriumhydrid als 60%ige Dispersion in Mineralöl portionsweise zugegeben. Nach 12 h wurde das Reaktionsgemisch auf 1000 mL Eiswasser gegossen und der entstandene Niederschlag abgesaugt.

Ausbeute: 40.0 g einer Verbindung Z2d (farblose Kristalle)


- 25 1,95 g Z2d und 1,66 g 4-Amino-3-methoxy-phenyl-carbaminsäure tert-butylester wurde bei 120°C für 4,5h zusammengeschmolzen. Nach dem Abkühlen wurde die Reaktionsmischung in Dichlormethan gelöst und 1x mit Kaliumcarbonat-Lösung und 2x mit Wasser extrahiert. Nach dem Trocknen der org. Phase wurde die Mischung mittels
30 Kieselgelchromatographie (Fließmittel 99:1, CH_2Cl_2 : MeOH) getrennt und die Produktfraktionen vereinigt.

Ausbeute: 1,76 g der Verbindung Z2e (brauner Feststoff)

1,75 g Z2e wurde in 100 mL Methylenchlorid gelöst und die Lösung mit 20 mL Trifluoressigsäure versetzt. Nach 12 h Rühren bei 25°C wurde der Reaktionsansatz unter Kühlung auf halbkonzentrierte Ammoniak-Lösung gegeben und die org. Phase
5 abgetrennt und mit Wasser extrahiert. Nach dem Entfernen des Lösungsmittels wurde in Aceton gelöst und mit etherischer HCl versetzt. Der entstandene Niederschlag wurde abfiltriert und getrocknet.

Ausbeute: 1,32 g der Zwischenverbindung Z2

10 Zur Synthese der Beispiele 13 und 21 bis 23 wird zunächst eine Zwischenverbindung Z3 wie im folgenden beschrieben hergestellt.



54.0 g (0.52 mol) D-2-Aminobuttersäure wurden in 540 mL Methanol suspendiert und unter Eiskühlung langsam mit 132 g (1.1 mol) Thionylchlorid versetzt. Es wurde 1.5 h
15 unter Rückfluß gekocht und anschließend eingengt. Das verbliebene Öl wurde mit 540 mL tert-Butylmethylether versetzt und die entstandenen farblosen Kristalle abgesaugt.
Ausbeute: 78.8 g einer Verbindung Z3a (farblose Kristalle)

74.2 g der Verbindung Z3a und 43.5 mL (0.49 mol) Cyclopentanon wurden in 800 mL
20 Dichlormethan gelöst. Nach Zugabe von 40.0 g (0.49 mol) Natriumacetat und 150.0 g (0.71 mol) Natriumtriacetoxyborhydrid bei 0°C wurde 12 h bei Raumtemperatur gerührt und dann 500 mL 20%ige Natriumhydrogencarbonat-Lösung zugegeben. Die wässrige Phase wurde mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinten organischen Phasen wurden mit Wasser gewaschen, über MgSO₄ getrocknet und eingengt.
25 Ausbeute: 85.8 g einer Verbindung Z3b (leicht gelbes Öl)

40.0 g der Verbindung Z3b und 30.0 g (0.22 mol) Kaliumcarbonat wurden in 600 mL Aceton suspendiert und unter Eiskühlung mit 45.0 g (0.23 mol) 2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin in 200 mL Aceton versetzt. Nach 12 h wurden weitere 5.0 g 2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin zugegeben und 3 h gerührt. Die Reaktionsmischung wurde eingengt, in 800 mL Essigsäureethylester und 600 mL Wasser aufgenommen und die wässrige Phase mit Essigsäureethylester extrahiert. Die vereinten organischen Phasen wurden mit Wasser gewaschen, über $MgSO_4$ getrocknet und eingengt.

Ausbeute: 75.0 g einer Verbindung Z3c (braunes Öl)

10

100 g der Verbindung Z3c wurden in 650 mL Eisessig gelöst und bei 70°C mit 20 g Eisen-Pulver portionsweise versetzt. Es wurde 1 h bei 70°C, dann 1.5 h bei 100°C gerührt und anschließend heiß über Kieselgur abfiltriert. Die Reaktionsmischung wurde eingengt, in Methanol/Dichlormethan aufgenommen, auf Kieselgel aufgezogen und durch Soxhlet-Extraktion mit Essigsäureethylester gereinigt. Das Lösungsmittel wurde entfernt und der Rückstand mit Methanol ausgerührt.

15

Ausbeute: 30.0 g einer Verbindung Z3d (hellbraune Kristalle)

25.0 g der Verbindung Z3d und 6.5 mL (0.1 mol) Methyljodid wurden in 250 mL Dimethylacetamid vorgelegt und bei -10°C mit 3.8 g (0.95 mol) Natriumhydrid als 60%ige Dispersion in Mineralöl versetzt. Es wurde 20 min bei 0°C, dann 30 min bei Raumtemperatur gerührt und schließlich Eis zugegeben. Die Reaktionsmischung wurde eingengt und mit 300 mL Wasser versetzt. Der entstandene Niederschlag wurde abgesaugt und mit Petrolether gewaschen.

20

25 Ausbeute: 23.0 g einer Verbindung Z3e (farbloser Feststoff)

1,5 g Z3e und 1,22 g 4-Amino-3-methoxy-phenyl-carbaminsäure tert-butylester wurde bei 120°C für 5h zusammengeschmolzen. Nach dem Abkühlen wurde die Reaktionsmischung in Dichlormethan gelöst und 2x mit Kaliumcarbonat-Lösung und 2x mit Wasser extrahiert. Nach dem Trocknen der org. Phase wurde die Mischung mittels Kieselgelchromatographie (Fließmittel 99:1, CH_2Cl_2 : MeOH) getrennt und die Produktfraktionen vereinigt.

30


Ausbeute: 0,92 g einer Verbindung Z3f (hellbraune Kristalle)

0,92 g Z3f wurden in 100 mL Methylenchlorid gelöst, 15 mL Trifluoressigsäure zugegeben und für 3 h bei 20°C gerührt. Dann wurde die Lösung in eine Mischung aus
5 10g Eis und 100 mL einer 25%igen Ammoniak-Lösung gegeben und die org. Phase mit Wasser extrahiert und nach dem Trocknen eingeeengt. Der Rückstand wurde in Aceton gelöst und mit etherischer HCl versetzt. Die ausgefallenen Kristalle wurden abfiltriert und getrocknet.

Ausbeute: 0,54g der Zwischenverbindung Z3 (hellbraune Kristalle)

10

Zur Synthese der Beispiele 7 bis 9 und 15 wird zunächst eine Zwischenverbindung Z4 wie im folgenden beschrieben hergestellt.




Eine Mischung aus 73.4 mL 2-Bromisobuttersäureethylester, 87.1 mL 3-Methyl-1-butylamin, 82.5 g (0.6 mol) Natriumiodid und 76.0 g (0.6 mol) Kaliumcarbonat in 1000
15 mL Essigsäureethylester wurde 3 Tage unter Rückfluss gekocht. Vorhandene Salze wurden abfiltriert und das Filtrat eingeeengt.

Ausbeute: 97.0 g einer Verbindung Z4a (rotes Öl)

20 49.0 g 2,4-Dichlor-5-nitropyrimidin und 38.3 g Kaliumcarbonat wurden in 500 mL Aceton suspendiert und bei 0°C mit 93.0 g der Verbindung Z4a in 375 mL Aceton versetzt. Die Reaktionsmischung wurde über Nacht bei Raumtemperatur gerührt, filtriert und eingeeengt. Der in Essigsäureethylester gelöste Rückstand wurde mit Wasser gewaschen und die organische Phase über MgSO₄ getrocknet und eingeeengt.

25 Ausbeute: 102.7 g einer Verbindung Z4b (braunes Öl)

- 22.7 g der Verbindung Z4b wurden in 350 mL Eisessig gelöst und bei 60°C mit 17.4 g Eisen-Pulver portionsweise versetzt. Nach beendeter Zugabe wurde 0.5 h unter Rückfluss gekocht, heiß abfiltriert und eingeeengt. Der Rückstand wurde in 200 mL
- 5 Dichlormethan/Methanol (9:1) aufgenommen und mit Natriumchlorid-Lösung gewaschen. Die organische Phase wurde über Kieselgur abgesaugt, über MgSO₄ getrocknet, eingeeengt und mittels Säulenchromatographie (Laufmittel: Essigsäureethylester/Cyclohexan 1:1) getrennt und geeignete Fraktionen vereinigt. Ausbeute: 1.9 g einer Verbindung Z4c (farblose Kristalle)
- 10
- 1.9 g der Verbindung Z4c wurden in 32 mL Dimethylacetamid gelöst und unter Eiskühlung mit 0.3 g (7 mmol) Natriumhydrid als 60%ige Dispersion in Mineralöl versetzt. Nach 10 min wurden 0.5 mL (7 mmol) Methyljodid zugegeben und 3 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Reaktionsmischung wurde eingeeengt und mit Wasser
- 15 versetzt. Der entstandene Niederschlag wurde abgesaugt und mit Petrolether gewaschen. Ausbeute: 1.6 g einer Verbindung Z4d (farblose Kristalle)
- 1,5 g Z4d und 1,21 g 4-Amino-3-methoxy-phenyl-carbaminsäure tert-butylester wurde
- 20 bei 120°C für 4,5h zusammengeschmolzen. Nach dem Abkühlen wurde die Reaktionsmischung in Dichlormethan gelöst und 1x mit Kaliumcarbonat-Lösung und 1x mit Wasser extrahiert. Nach dem Trocknen der org. Phase wurde die Mischung mittels Kieselgelchromatographie (Fließmittel 98:2, CH₂Cl₂ : MeOH) getrennt und die Produktfraktionen vereinigt.
- 25 Ausbeute: 1,12 g einer Verbindung Z4e (hellbrauner Feststoff)
- 1,12 g Z4e wurde in 100 mL Methylenchlorid gelöst, 18 mL Trifluoressigsäure zugegeben und für 12 h bei 20°C gerührt. Dann wurde die Lösung auf eine halbkonz. Ammoniaklösung gegeben und die org. Phase mit Wasser extrahiert und eingeeengt.
- 30 Ausbeute: 0,84g der Zwischenverbindung Z4 (beiger Feststoff)





- 450 mg 4-Amino-cyclohexancarbonsäuremethylester*Hydrochlorid (z.B. über folgende Literatur erhalten: Johnston, Thomas P.; McCaleb, George S.; Clayton, Sarah D.; Frye, Jerry L.; Krauth, Charles A.; Montgomery, John A. Journal of Medicinal Chemistry (1977), 20(2), 279-90), 0,345 mL Bis-(2-Chloroethyl)ether und 1,4 g Kaliumcarbonat wurden in 4 mL Dimethylformamid gelöst und zusammen mit 50 mg Kaliumiodid für 3 h auf 100°C erhitzt. Dann wurden 30 mL Wasser zugegeben und mit Essigsäure neutralisiert. Die wässrige Phase wurde mit Dichlormethan extrahiert. Nach dem Einengen wurde das Gemisch mittels Kieselgelchromatographie (Methylenchlorid: MeOH 15 :1) getrennt und die geeigneten Fraktionen vereinigt.
- Ausbeute: 259 mg eines Produktes Z8a.

- 233,3 mg Z8a wurde in 5 mL 1 M Natronlauge und 4 mL Methanol gelöst und für 12 h bei 20°C gerührt. Nach dem Entfernen des Methanols wurde mit 1M Salzsäure neutralgestellt, vollständig eingeeengt, die Mischung in Methanol suspendiert und das Produkt abfiltriert. Anschliessend wurde erneut in Ethanol suspendiert, der unlösliche Rückstand abfiltriert und die Mutterlauge eingeeengt.
- Ausbeute: 206 mg der Säure Z8b (weisser Feststoff)

- 206 mg Z8b wurde in 150 µL Thionylchlorid und 5 mL Toluol 3 h unter Rückfluss erhitzt. Anschliessend wurde bis zur Trockne eingeeengt, der Niederschlag mit Ether über Nacht gerührt und abfiltriert.
- Ausbeute: 204 mg der Zwischenstufe Z8

- 25 Die Verbindung Z8 ist noch nicht im Stand der Technik bekannt. Aufgrund ihrer Wichtigkeit als Ausgangsmaterial für zahlreiche erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I), betrifft die vorliegende Erfindung ferner die Verbindung der Formel Z8




trans-4-(4-Cyclopropylmethyl-piperazin-1-yl)-cyclohexylamin

- 5 9,8 g 4-Dibenzylcyclohexanon wurde in 100 mL Dichlormethan gelöst und mit 5,6 g N-Cyclopropylmethylpiperazin und 8,5 g NaBH(OAc)₃ 12 h bei RT gerührt. Anschließend wurde mit Wasser und Kaliumcarbonat versetzt, die org. Phase abgetrennt, getrocknet und das Lösungsmittel im Vakuum abgezogen. Der Rückstand wurde über Kieselgelsäule getrennt (ca. 50 mL Kieselgel, ca. 3 L Essigester 95/
- 10 Methanol 5 + 0,25% konz. Ammoniak. Die geeigneten Fraktionen wurden im Vakuum eingengt. Die gewünschte Verbindung wurde aus Ethanol + konz. HCl kristallisiert. Ausbeute: 8,5 g der Verbindung Z9a.

- 8,5 g Z14a wurden in 170 mL MeOH gelöst und an 1,7 g Pd/C (10%) bei 30-50 °C
- 15 hydriert. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum abgezogen und der Rückstand aus Ethanol und konz. HCl kristallisiert. Ausbeute: 4,4 g der Zwischenstufe Z9.

trans-4-(2,6-Dimethyl-morpholin-4-yl)-cyclohexylamin

20



- 110 mL Benzylamin und 156 g Cyclohexandionmonoethylenketal wurden in 800 mL Toluol unter Verwendung eines Wasserabscheiders erhitzt. Dann wurde die Lösung
- 25 eingengt und das Reaktionsgemisch in 1000 mL Ethanol aufgenommen und unter Kühlung bei 15°C portionsweise mit insgesamt 23 g Natriumborhydrid versetzt. Nach

12 h wurde die Reaktionslösung eingengt und der Rückstand mit 500 mL Wasser versetzt, 2x mit je 400 mL Ether extrahiert, anschliessend die org. Phase mit Wasser gewaschen, getrocknet, eingengt und der Rückstand im Hochvakuum destilliert.

Ausbeute: 208 g eines Produktes Z10a

5

208 g Z10a wurden zusammen mit 114 g Benzylchlorid, 138 g Kaliumcarbonat, 14 g Kaliumiodid in 400 mL N-Methylpyrrolidon für 24h bei 80°C erhitzt. Anschliessend wurde 5 L Wasser zugegeben und der gebildete Feststoff abfiltriert und mit Wasser nachgewaschen. Dann wurde in 1 L Methylenchlorid gelöst, die org. Phase getrocknet und eingengt. Der Rückstand wurde aus Methanol kristallisiert.

10

Ausbeute: 260g eines Produktes Z10b

260g Z10b wurde in 400 mL Wasser und 100 mL 37%iger HCl gelöst und 4 h bei 100° gerührt. Nach dem Abkühlen wurde mit Kaliumcarbonat alkalisch gestellt und die ausgefallenen Kristalle abfiltriert und mit Wasser gewaschen. Der Feststoff wurde in Dichlormethan gelöst, die org. Phase getrocknet und eingengt. Der Rückstand wurde aus Petrolether umkristallisiert.

15

Ausbeute: 216 g eines Produktes Z10c.

44 g Z10c und 23 g cis-2,6 Dimethylmorpholin wurden in 100 mL Toluol und 0,1 mL Methansulfonsäure 2 h unter Rückfluss und unter Verwendung eines Wasserabscheiders erhitzt. Anschliessend wurde abgekühlt, das Lösungsmittel entfernt, 400 mL Ethanol und portionsweise 8 g Natriumborhydrid zugegeben. Die Reaktionstemperatur stieg dabei auf 45°C an, nach Abklingen der exothermen Reaktion wurde für 3 h auf 60°C erwärmt, abgekühlt und mit 400 mL Wasser versetzt und unter Kühlung mit 300 mL 2N HCl versetzt. Anschliessend wurde Ethanol zugegeben und mit 400 mL 2N NaOH versetzt. Der Rückstand wurde mit 2x je 300 mL Dichlormethan extrahiert. Die org. Phase getrocknet, eingengt und mit 100 mL Methanol versetzt, der Feststoff abfiltriert und die Mutterlauge eingengt. Der Rückstand wurde durch eine

25

30

Kieselgelchromatografie getrennt und geeignete Fraktionen vereinigt.

Ausbeute: 35,2 eines Produktes Z10d

35 g Z10d wurde in 400 mL Methanol gelöst und mit 7 g Pd/C (10%) bei 50 psi Wasserstoff und 50°C für 4 h hydriert. Anschliessend wurde eingengt, in 200 mL Ethanol suspendiert, 10 mL 37%ige Salzsäure zugetropft, 30 Minuten im Eisbad gerührt und die Kristalle abfiltriert und mit kaltem Ether und Ethanol nachgewaschen.

5 Ausbeute: 24 g des Zwischenproduktes Z10

Die neuen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) können in Analogie zu nachfolgenden Synthesebeispielen synthetisiert werden. Diese Beispiele sind allerdings nur als exemplarische Vorgehensweise zur weitergehenden Erläuterung der Erfindung zu verstehen, ohne selbige auf dessen Gegenstand zu beschränken.

Synthese der Beispiele

Beispiel 1

15 0,1 g Z1, 82 mg Nicotinsäurechlorid, 0,2 mL Triethylamin wurden 1 h in 10 mL Dichlormethan bei 20°C gerührt, dann wurde mit Wasser extrahiert und die getrocknete org. Phase eingengt. Der Rückstand wurde aus Methanol kristallisiert und abfiltriert.
Ausbeute: 0,025 g eines weissen Feststoffes

20 Beispiel 7

0,1 g Z4, 23 µL Cyclopropylcarbonsäurechlorid, 0,15 mL Triethylamin wurden 2 h in 2 mL Dichlormethan bei 20°C gerührt, dann wurde die org. Phase mit 20 mL 5%ige wässrige Kaliumcarbonat-Lösung extrahiert. Die org. Phase wurde eingengt und die Mischung durch eine Kieselchromatographie getrennt. Die geeigneten Fraktionen
25 wurden vereinigt, eingengt und der Rückstand aus Ethylacetat und Petrolether kristallisiert.
Ausbeute: 0,071 g weisse Kristalle

Beispiel 16

30 0,1 g Z6, 65 mg 1-Benzyl-piperidin-4-carbonsäurechlorid, 0,2 mL Triethylamin wurden 2 h in 2 mL Dichlormethan bei 20°C gerührt, dann die org. Phase mit 20 mL 5%iger wässrige Kaliumcarbonat-Lösung extrahiert. Die org. Phase wurde eingengt und die

Mischung durch eine Kieselchromatographie getrennt. Die geeigneten Fraktionen wurden vereinigt, eingeengt und der Rückstand aus Ethylacetat und Petrolether kristallisiert.

Ausbeute: 0,067 g weisse Kristalle

5

Beispiel 23

0,1 g Z3, 76 mg 1-Methyl-piperidin-4-carbonsäurechlorid, 0,3 mL Triethylamin wurden 2 h in 2 mL Dichlormethan bei 20°C gerührt, dann wurde die org. Phase mit 20 mL 5%ige wässrige Kaliumcarbonat-Lösung extrahiert. Die org. Phase wurde eingeengt und

10 die Mischung durch eine Kieselchromatographie getrennt. Die geeigneten Fraktionen wurden vereinigt, eingeengt und der Rückstand aus Ethylacetat und Petrolether kristallisiert.

Ausbeute: 0,064 g weisse Kristalle

15

Beispiel 27


0.2 g Z5 wird in 2 mL Dichlormethan, 0,5 mL THF und 0,5 mL Pyridin gelöst, dann wurde 144 mg Chlorameisensäure-4-nitrophenylester, gelöst in 1 mL Dichlormethan, zugegeben. Nach 3 h wurde 111 mg 1-Methyl-piperidin-4-ylamin in 0,5 mL Dichlormethan gelöst zugegeben und 12 h bei 20°C gerührt. Dann wurde

20 Dichlormethan zugegeben und 3x mit Wasser extrahiert. Die getrocknete org. Phase wird eingeengt und die Mischung durch Kieselgelchromatographie getrennt. Geeignete Fraktionen wurden vereinigt, eingeengt und aus Ethylacetat und Petrolether kristallisiert
Ausbeute: 97 mg als grauer Feststoff

25 Analog zu vorstehend beschriebenen Vorgehensweisen werden u.a. die in Tabelle 1 aufgeführten Verbindungen der Formel (I) erhalten.



















Die vorliegende Erfindung betrifft in besonders bevorzugten Ausführungsformen, die Verbindungen der Formel (I), wie sie in Tabelle 1 genannt sind, als solche,
30 gegebenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.



















Tabelle 1:



















(I')

Beispiel	Konfig. -C*(R ¹ R ²)-	-R ¹	-R ²	-R ³	-R ⁴	-L-	-R ⁵	Schmp. [°C]
1	R	-H	-Me		-H	-		276 (Zers.)
2	R	-H	-Me		-H	-		219
3	R	-H	-Me		-H	-		211
4	R	-H	-Me		-OMe	-		178

Beispiel	Konfig. -C*(R ¹ R ²)-	-R ¹	-R ²	-R ³	-R ⁴	-L-	-R ⁵	Schmp. [°C]
5	R	-H	-Me		-OMe	-		171
6	R	-H	-Me		-OMe	-		88
7	-	-Me	-Me		-OMe	-		148
8	-	-Me	-Me		-OMe	-		152
9	-	-Me	-Me		-OMe	-		205
10	R	-H	-Me		-OMe	-		157
11	R	-H	-Me		-OMe	-		156
12	R	-H	-Me		-OMe	-		161
13	R	-H	-Et		-OMe	-		120

Beispiel	Konfig. -C*(R ¹ R ²)-	-R ¹	-R ²	-R ³	-R ⁴	-L-	-R ⁵	Schmp. [°C]
14	R	-H	-Me		-OMe	-		180
15	-	-Me	-Me		-OMe	-		180
16	R	-H	-Me		-OMe	-		136
17	R	-H	-Me		-OMe	-		135
18	R	-H	-Me		-OMe	-		230
19	R	-H	-Me		-OMe	-		197
20	R	-H	-Me		-OMe	-		204
21	R	-H	-Et		-OMe	-		136
22	R	-H	-Et		-OMe	-		170

Beispiel	Konfig. -C*(R ¹ R ²)-	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	-L-	-R ⁵	Schmp. [°C]
23	R	-H	-Et		-OMe	-		112
24	R	-H	-Et		-OMe	-		112
25	R	-H	-Et		-OMe	-		134
26	R	-H	-Et		-OMe	-		157
27	R	-H	-Et		-OMe	-NH-		158
28	R	-H	-Et		-OMe	-NH-		142
29	R	-H	-Et		-OMe	-NH-		148
20	R	-H	-Et		-OMe	-NH-		164

Wie gefunden wurde, zeichnen sich die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten auf therapeutischem Gebiet aus. Hervorzuheben sind solche Anwendungsmöglichkeiten, für welche die Inhibition spezifischer Zellzykluskinasen, insbesondere die inhibierende Wirkung auf die Proliferation kultivierter humaner Tumorzellen, aber auch auf die Proliferation anderer Zellen, wie z.B. Endothelzellen, eine Rolle spielen.

Wie durch DNA-Färbung mit darauf folgender FACS Analyse gezeigt werden konnte, ist die, durch die erfindungsgemäßen Verbindungen bewirkte, Proliferationsinhibition vermittelt durch einen Arrest der Zellen vor allem in der G2/M Phase des Zellzyklus. Die Zellen arretieren abhängig von den verwendeten Zellen für eine bestimmte Zeitspanne in dieser Zellzyklus Phase, bevor der programmierte Zelltod eingeleitet wird. Ein Arrest in der G2/M Phase des Zellzyklus wird z.B. durch die Inhibition spezifischer Zellzykluskinasen ausgelöst. Auf Grund ihrer biologischen Eigenschaften eignen sich die erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel I, deren Isomere und deren physiologisch verträgliche Salze zur Behandlung von Erkrankungen, die durch exzessive oder anomale Zellproliferation charakterisiert sind.

Zu solchen Erkrankungen gehören beispielsweise: Virale Infektionen (z.B. HIV und Kaposi Sarkoma); Entzündung und Autoimmun-Erkrankungen (z.B. Colitis, Arthritis, Alzheimer Erkrankung, Glomerulonephritis und Wund-Heilung); bakterielle, fungale und/oder parasitäre Infektionen; Leukämien, Lymphoma und solide Tumore; Haut-Erkrankungen (z.B. Psoriasis); Knochen-Erkrankungen; kardiovaskuläre Erkrankungen (z.B. Restenose und Hypertrophie). Ferner sind sie nützlich als Schutz von proliferierenden Zellen (z.B. Haar-, Intestinal-, Blut- und Progenitor-Zellen) gegen DNA-Schädigung durch Strahlung, UV-Behandlung und/oder zytostatischer Behandlung (Davis et al., 2001). Die neuen Verbindungen können zur Prävention, Kurz- oder Langzeitbehandlung der vorstehend genannten Erkrankungen, auch in Kombination mit anderen Wirkstoffen, die für dieselben Indikationen Verwendung finden, z.B. Cytostatika, Hormone oder Antikörper verwendet werden.

Die Wirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen wurde im PLK1 Inhibitionsassay, im Cytotoxizitätstest an kultivierten humanen Tumorzellen und/oder in einer FACS-Analyse, beispielsweise an HeLa S3-Zellen, bestimmt. Die Verbindungen zeigten in beiden Testmethoden eine gute bis sehr gute Wirksamkeit, d.h. beispielsweise einen EC₅₀-Wert im HeLa S3-Cytotoxizitätstest kleiner 5 µmol/L, in der Regel kleiner 1 µmol/L und einen IC₅₀-Wert im PLK1-Inhibitionsassay kleiner 1 µmol/L.

PLK1 Kinaseassay

Enzymherstellung:

- 10 Rekombinantes humanes und an seinem N-terminalen Ende mit GST verbundenes PLK1 Enzym wird aus Bakulovirus infizierten Insektenzellen (Sf21) isoliert. Die Reinigung erfolgt durch Affinitätschromatographie an Glutathion Sepharose Säulen.
- 4x10⁷ Sf21 Zellen (*Spodoptera frugiperda*) in 200 ml Sf900 II Serum freien Insektenzellmedium (Life Technologies) werden in eine Spinnerflasche ausgesät. Nach 72 Stunden Inkubation bei 27°C und 70 rpm werden 1x10⁸ Sf21 Zellen in insgesamt 180 ml Medium in eine neue Spinnerflasche ausgesät. Nach weiteren 24 Stunden werden 20 ml rekombinanter Baculovirus Stammsuspension zugesetzt und die Zellen 72 Stunden bei 27°C bei 70 rpm kultiviert. 3 Stunden vor dem Ernten wird Okadainsäure zugesetzt
- 20 (Calbiochem, Endkonzentration 0,1 µM) und die Suspension weiter inkubiert. Die Zellzahl wird bestimmt, die Zellen abzentrifugiert (5 Minuten, 4°C, 800 rpm) und 1x mit PBS (8 g NaCl/l, 0,2 g KCl/l, 1,44 g Na₂HPO₄/l, 0,24 g KH₂PO₄/l) gewaschen. Nach nochmaligem Abzentrifugieren wird das Pellet in flüssigem Stickstoff Schock gefroren. Danach wird das Pellet rasch aufgetaut und in eiskaltem Lysispuffer (50 mM HEPES pH 7,5, 10 mM
- 25 MgCl₂, 1 mM DTT, 5 µg/ml Leupeptin, 5 µg/ml Aprotinin, 100 µM NaF, 100 µM PMSF, 10 mM β-Glycerolphosphat, 0.1 mM Na₃VO₄, 30 mM 4-Nitrophenylphosphate) zu 1x10⁸ Zellen/ 17,5 ml resuspendiert. Die Zellen werden 30 Minuten auf Eis lysiert. Nachdem Entfernen der Zelltrümmer durch Zentrifugation (4000 rpm, 5 Minuten) wird der klare Überstand mit Glutathion Sepharosebeads versetzt (1 ml resuspendierte und gewaschene
- 30 Beads für 50 ml Überstand) und 30 Minuten bei 4°C auf einem Rotationsbrett inkubiert. Danach werden die Beads mit Lysispuffer gewaschen und das rekombinante Protein mit 1

ml Elutionspuffer/ ml resuspendierte Beads (Elutionspuffer: 100 mM Tris/HCl pH=8,0, 120 mM NaCl, 20 mM reduziertes Glutathion (Sigma G-4251), 10 mM MgCl₂, 1 mM DTT) von den Beads eluiert. Die Proteinkonzentration wird mittels Bradford Assay bestimmt.

5

Assaydurchführung:

In einem Napf einer 96-Loch Rundbodenplatte (Fa. Greiner bio-one, PS-Microtiterplatte Nr.650101) werden folgende Komponenten zusammengefügt:

- 10 µl zu testende Verbindung in variabler Konzentration (z.B. beginnend bei 300 µM, und Verdünnung in 1:3) in 6% DMSO, 0,5 mg/ml Casein (Sigma C-5890), 60 mM β-Glycerophosphat, 25 mM MOPS pH=7,0, 5 mM EGTA, 15 mM MgCl₂, 1 mM DTT
- 20 µl Substratlösung (25 mM MOPS pH=7,0, 15 mM MgCl₂, 1 mM DTT, 2,5 mM EGTA, 30 mM β-Glycerophosphat, 0,25 mg/ml Casein)
- 20 µl Enzymverdünnung (1:100 Verdünnung des Enzymstocks in 25 mM MOPS pH=7,0, 15 mM MgCl₂, 1 mM DTT)
- 10 µl ATP Lösung (45 µM ATP mit 1,11x10⁶ Bq/ml gamma-P33-ATP).

- Durch Zusatz der ATP Lösung wird die Reaktion gestartet und 45 Minuten bei 30 °C unter leichtem Schütteln (650 rpm auf IKA Schüttler MTS2) durchgeführt. Die Reaktion wird durch Zusatz von 125 µl eiskalter 5%iger TCA pro Napf gestoppt und mindestens 30 Minuten auf Eis inkubiert. Das Präzipitat wird durch Ernten auf Filterplatten (96-well-Microtiter-Filterplatte: UniFilter-96, GF/B; Fa. Packard; Nr.6005177) übertragen, dann viermal mit 1%iger TCA gewaschen und bei 60°C getrocknet. Nach Zugabe von 35µl Szintillationslösung (Ready-Safe; Beckmann) pro Napf wird die Platte mit Sealing-tape zugeklebt und die präzipitierte Menge P33 mit dem Wallac Betacounter gemessen.
- Die Messdaten werden mit der Standard Graphpad Software (Levenburg-Marquard Algorhythmus) ausgewertet.

Messung der Cytotoxizität an kultivierten humanen Tumorzellen

- Zur Messung der Cytotoxizität an kultivierten humanen Tumorzellen wurden Zellen der zervikalen Carcinoma Tumorzell-Linie HeLa S3 (erhalten von American Type Culture Collection (ATCC)) in Ham's F12 Medium (Life Technologies) und 10% fötalem

30

Rinderserum (Life Technologies) kultiviert und in der log-Wachstumsphase geerntet. Anschließend wurden die HeLa S3 Zellen in 96-well Platten (Costar) mit einer Dichte von 1000 Zellen pro well eingebracht und über Nacht in einem Inkubator (bei 37°C und 5 % CO₂) inkubiert, wobei auf jeder Platte 6 wells nur mit Medium gefüllt wurden (3 wells zur
5 Mediumkontrolle, 3 wells zur Inkubation mit reduzierten AlamarBlue Reagenz). Die Wirksubstanzen wurden in verschiedenen Konzentrationen (gelöst in DMSO; DMSO-Endkonzentration: 0.1%) zu den Zellen zugegeben (jeweils als Dreifachbestimmung). Nach 72 Stunden Inkubation wurden zu jeden well 20 µl AlamarBlue Reagenz(AccuMed International) zugesetzt, und die Zellen für weitere 7 Stunden inkubiert. Zur Kontrolle
10 wurde zu 3 wells je 20 µl reduziertes AlamarBlue Reagenz gegeben (AlamarBlue Reagenz, das für 30 min autoklaviert wurde). Nach 7 h Inkubation wurde der Farbumsatz des AlamarBlue Reagenz in den einzelnen wells in einem Perkin Elmer Fluoreszenzspektrophotometer bestimmt (Excitation 530 nm, Emission 590 nm, Slits 15, Integrate time 0.1). Die Menge an umgesetzten AlamarBlue Reagenz repräsentiert die
15 metabolische Aktivität der Zellen. Die relative Zellaktivität wurde in Prozent der Kontrolle (HeLa S3 Zellen ohne Inhibitor) berechnet und die Wirkstoffkonzentration, die die Zellaktivität zu 50% hemmt (IC₅₀) abgeleitet. Die Werte wurden hierbei aus dem Mittelwert von drei Einzelbestimmungen - unter Korrektur des Leerwertes (Mediumkontrolle)- berechnet.

20

FACS- Analyse

Propidium Iodid (PI) bindet stöchiometrisch an doppelsträngige DNA, und ist damit geeignet den Anteil an Zellen in der G1, S, und G2/M Phase des Zellzykluses auf der Basis des zellulären DNA Gehaltes zu bestimmen. Zellen in der G0 und G1 Phase haben einen
25 diploiden DNA Gehalt (2N) , während Zellen in der G2 oder Mitose einen 4N DNA Gehalt haben.

Für eine PI-Färbung wurden beispielsweise 0.4 Mio HeLa S3 Zellen auf eine 75 cm² Zellkulturflasche ausgesät, nach 24 h wurde entweder 0.1 % DMSO als Kontrolle zugesetzt, bzw. die Substanz in verschiedenen Konzentrationen (in 0.1% DMSO). Die
30 Zellen wurden für 24 h mit der Substanz bzw. mit DMSO inkubiert, bevor die Zellen 2 x mit PBS gewaschen und dann mit Trypsin /EDTA abgelöst wurden. Die Zellen wurden

zentrifugiert (1000 Upm, 5 min, 4°C), und das Zellpellet 2 x mit PBS gewaschen, bevor die Zellen in 0.1 ml PBS resuspendiert wurden. Anschließend wurden die Zellen für 16 Stunden bei 4°C oder alternativ für 2 Stunden bei -20°C mit 80% Ethanol fixiert. Die fixierten Zellen (10⁶ Zellen) wurden zentrifugiert (1000 Upm, 5min, 4°C), mit PBS
5 gewaschen und anschließend nochmals zentrifugiert. Das Zellpellet wurde in 2 ml Triton X-100 in 0.25 % PBS resuspendiert, und 5 min auf Eis inkubiert, bevor 5 ml PBS zugeben wurden und erneut zentrifugiert wurde. Das Zellpellet wurde in 350 µl PI Färbelösung (0.1 mg/ml RNase A, 10 µg/ml Proidium Iodid in 1 x PBS) resuspendiert. Die Zellen wurden für
10 20 min im Dunkeln mit dem Färbepuffer inkubiert, bevor sie in Probenmessgefäße für das FACS Scan überführt werden. Die DNA Messung erfolgte in einem Becton Dickinson FACS Analyzer, mit einen Argonlaser (500 mW, Emission 488 nm), und dem DNA Cell Quest Programm (BD). Die logarithmische PI Fluoreszenz wurde mit einem band-pass Filter (BP 585/42) bestimmt. Die Quantifizierung der Zellpopulationen in den einzelnen Zellzyklusphasen erfolgte mit dem ModFit LT Programm von Becton Dickinson.

15

Entsprechend, wurden erfindungsgemäße Verbindungen auf weiteren Tumorzellen getestet. Beispielsweise sind diese Verbindungen auf Karzinomen verschiedenster Gewebe (z. Bspl. Brust (MCF7); Colon (HCT116), Kopf-Hals (FaDu), Lunge (NCI-H460), Pankreas (BxPC-3), Prostata (DU145)), Sarkome (z. Bspl. SK-UT-1B), Leukämien und
20 Lymphome (z. Bspl. HL-60; Jurkat, THP-1) und anderen Tumoren (z. Bspl. Melanome (BRO), Gliome (U-87MG)) aktiv und könnten in solchen Indikationen eingesetzt werden. Dies belegt die breite Anwendbarkeit der erfindungsgemäßen Verbindungen zur Behandlung verschiedenster Tumortypen.

25 Die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) können allein oder in Kombination mit anderen erfindungsgemäßen Wirkstoffen, gegebenenfalls auch in Kombination mit weiteren pharmakologisch aktiven Wirkstoffen, zur Anwendung gelangen. Geeignete Anwendungsformen sind beispielsweise Tabletten, Kapseln, Zäpfchen, Lösungen, - insbesondere Lösungen zur Injektion (s.c., i.v., i.m.) und Infusion - Säfte, Emulsionen
30 oder dispersible Pulver. Hierbei soll der Anteil der pharmazeutisch wirksamen Verbindung(en) jeweils im Bereich von 0,1 - 90 Gew.-%, bevorzugt 0,5 - 50 Gew.-% der

Gesamtzusammensetzung liegen, d.h. in Mengen die ausreichend sind, um den unten angegebenen Dosierungsbereich zu erreichen. Die genannten Dosen können, falls erforderlich, mehrmals täglich gegeben werden.

- Entsprechende Tabletten können beispielsweise durch Mischen des oder der Wirkstoffe mit bekannten Hilfsstoffen, beispielsweise inerten Verdünnungsmitteln, wie Calciumcarbonat, Calciumphosphat oder Milchzucker, Sprengmitteln, wie Maisstärke oder Alginsäure, Bindemitteln, wie Stärke oder Gelatine, Schmiermitteln, wie Magnesiumstearat oder Talk, und/oder Mitteln zur Erzielung des Depoteffektes, wie Carboxymethylcellulose, Celluloseacetatphthalat, oder Polyvinylacetat erhalten werden.
- 10 Die Tabletten können auch aus mehreren Schichten bestehen.

- Entsprechend können Dragees durch Überziehen von analog den Tabletten hergestellten Kernen mit üblicherweise in Drageeüberzügen verwendeten Mitteln, beispielsweise Kollidon oder Schellack, Gummi arabicum, Talk, Titandioxid oder Zucker, hergestellt werden. Zur Erzielung eines Depoteffektes oder zur Vermeidung von Inkompatibilitäten kann der Kern auch aus mehreren Schichten bestehen. Desgleichen kann auch die Drageehülle zur Erzielung eines Depoteffektes aus mehreren Schichten bestehen wobei die oben bei den Tabletten erwähnten Hilfsstoffe verwendet werden können.

- 20 Säfte der erfindungsgemäßen Wirkstoffe beziehungsweise Wirkstoffkombinationen können zusätzlich noch ein Süßungsmittel, wie Saccharin, Cyclamat, Glycerin oder Zucker sowie ein geschmacksverbesserndes Mittel, z.B. Aromastoffe, wie Vanillin oder Orangenextrakt, enthalten. Sie können außerdem Suspendierhilfsstoffe oder Dickungsmittel, wie Natriumcarboxymethylcellulose, Netzmittel, beispielsweise Kondensationsprodukte von Fettalkoholen mit Ethylenoxid, oder Schutzstoffe, wie
- 25 p-Hydroxybenzoate, enthalten.

- Injektions- und Infusionslösungen werden in üblicher Weise, z.B. unter Zusatz von Isotonantien, Konservierungsmitteln, wie p-Hydroxybenzoaten, oder Stabilisatoren, wie
- 30 Alkalisalzen der Ethylendiamintetraessigsäure, gegebenenfalls unter Verwendung von Emulgiermitteln und /oder Dispergiermitteln, wobei beispielsweise bei der Verwendung

von Wasser als Verdünnungsmittel gegebenenfalls organische Lösemittel als Lösevermittler bzw. Hilfslösemittel eingesetzt werden können, hergestellt und in Injektionsflaschen oder Ampullen oder Infusionsflaschen abgefüllt.

- 5 Die eine oder mehrere Wirkstoffe enthaltenden Kapseln können beispielsweise hergestellt werden, indem man die Wirkstoffe mit inerten Trägern, wie Milchzucker oder Sorbit, mischt und in Gelatinekapseln einkapselt. Geeignete Zäpfchen lassen sich beispielsweise durch Vermischen mit dafür vorgesehenen Trägermitteln, wie Neutralfetten oder Polyäthylenglykol beziehungsweise dessen Derivaten, herstellen.
- 10 Als Hilfsstoffe seien beispielsweise Wasser, pharmazeutisch unbedenkliche organische Lösemittel, wie Paraffine (z.B. Erdölfraktionen), Öle pflanzlichen Ursprungs (z.B. Erdnuß- oder Sesamöl), mono- oder polyfunktionelle Alkohole (z.B. Ethanol oder Glycerin), Trägerstoffe wie z.B. natürliche Gesteinsmehle (z.B. Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide) synthetische Gesteinsmehle (z.B. hochdisperse Kieselsäure und Silikate), Zucker (z.B.
- 15 Rohr-, Milch- und Traubenzucker) Emulgiermittel (z.B. Lignin, Sulfitablaugen, Methylcellulose, Stärke und Polyvinylpyrrolidon) und Gleitmittel (z.B. Magnesiumstearat, Talkum, Stearinsäure und Natriumlaurylsulfat) erwähnt.

- Die Applikation erfolgt in üblicher Weise, vorzugsweise oral oder transdermal,
- 20 insbesondere bevorzugt oral. Im Falle der oralen Anwendung können die Tabletten selbstverständlich außer den genannten Trägerstoffen auch Zusätze, wie z.B. Natriumcitrat, Calciumcarbonat und Dicalciumphosphat zusammen mit verschiedenen Zuschlagstoffen, wie Stärke, vorzugsweise Kartoffelstärke, Gelatine und dergleichen enthalten. Weiterhin können Gleitmittel, wie Magnesiumstearat, Natriumlaurylsulfat und Talkum zum
- 25 Tablettieren mitverwendet werden. Im Falle wäßriger Suspensionen können die Wirkstoffe außer den obengenannten Hilfsstoffen mit verschiedenen Geschmacksaufbesserern oder Farbstoffen versetzt werden.

- Für den Fall der parenteralen Anwendung können Lösungen der Wirkstoffe unter Verwendung geeigneter flüssiger Trägermaterialien eingesetzt werden.
- 30 Die Dosierung für die intravenöse Anwendung liegt bei 1 - 1000 mg pro Stunde, vorzugsweise zwischen 5 - 500 mg pro Stunde.

Trotzdem kann es gegebenenfalls erforderlich sein, von den genannten Mengen abzuweichen, und zwar in Abhängigkeit vom Körpergewicht bzw. der Art des Applikationsweges, vom individuellen Verhalten gegenüber dem Medikament, der Art von
 5 dessen Formulierung und dem Zeitpunkt bzw. Intervall, zu welchen die Verabreichung erfolgt. So kann es in einigen Fällen ausreichend sein, mit weniger als der vorgenannten Mindestmenge auszukommen, während in anderen Fällen die genannte obere Grenze überschritten werden muß. Im Falle der Applikation größerer Mengen kann es empfehlenswert sein, diese in mehreren Einzelgaben über der Tag zu verteilen.

10

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft pharmazeutische Formulierungen, vorzugsweise pharmazeutische Formulierung der vorstehend genannten Beschaffenheit, gekennzeichnet durch einen Gehalt an einer oder mehrerer Verbindungen der allgemeinen Formel (I).

15

Die nachfolgenden Formulierungsbeispiele illustrieren die vorliegende Erfindung ohne sie jedoch in ihrem Umfang zu beschränken:

Pharmazeutische Formulierungsbeispiele

20

A)	<u>Tabletten</u>	<u>pro Tablette</u>
	Wirkstoff	100 mg
	Milchzucker	140 mg
25	Maisstärke	240 mg
	Polyvinylpyrrolidon	15 mg
	Magnesiumstearat	5 mg
		<hr/> <hr/> 500 mg

30

Der feingemahlene Wirkstoff, Milchzucker und ein Teil der Maisstärke werden miteinander vermischt. Die Mischung wird gesiebt, danach mit einer Lösung von Polyvinylpyrrolidon in Wasser befeuchtet, geknetet, feuchtgranuliert und getrocknet. Das Granulat, der Rest der Maisstärke und das Magnesiumstearat werden gesiebt und
 5 miteinander vermischt. Das Gemisch wird zu Tabletten geeigneter Form und Größe verpreßt.

	<u>Tabletten</u>	<u>pro Tablette</u>
10	Wirkstoff	80 mg
	Milchzucker	55 mg
	Maisstärke	190 mg
	Mikrokristalline Cellulose	35 mg
15	Polyvinylpyrrolidon	15 mg
	Natrium-carboxymethylstärke	23 mg
	Magnesiumstearat	2 mg
		<hr/> <hr/> 400 mg

20 Der feingemahlene Wirkstoff, ein Teil der Maisstärke, Milchzucker, mikrokristalline Cellulose und Polyvinylpyrrolidon werden miteinander vermischt, die Mischung gesiebt und mit dem Rest der Maisstärke und Wasser zu einem Granulat verarbeitet, welches getrocknet und gesiebt wird. Dazu gibt man die Natriumcarboxymethylstärke und das
 25 Magnesiumstearat, vermischt und verpreßt das Gemisch zu Tabletten geeigneter Größe.


	<u>Ampullenlösung</u>	
30	Wirkstoff	50 mg
	Natriumchlorid	50 mg
	Aqua pro inj.	5 ml

Der Wirkstoff wird bei Eigen-pH oder gegebenenfalls bei pH 5,5 - 6,5 in Wasser gelöst und mit Natriumchlorid als Isotonans versetzt. Die erhaltene Lösung wird pyrogenfrei filtriert und das Filtrat unter aseptischen Bedingungen in Ampullen abgefüllt, die

5 anschließend sterilisiert und zugeschmolzen werden. Die Ampullen enthalten 5 mg, 25 mg und 50 mg Wirkstoff.

Patentansprüche

1. Verbindungen der allgemeinen Formel (I)



5 worin

L eine Einfachbindung, oder eine verbrückende zweibindige Gruppe ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkylen, C₂-C₆-Alkenylen, C₂-C₆-Alkinylen, C₃-C₇-Cycloalkylen, C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen-C₁-C₄-Alkylen, C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen, -O-, -O-C₁-C₆-Alkylen, -O-C₃-C₆-Alkenylen, -O-C₃-C₆-Alkinylen, -O-C₃-C₇-Cycloalkylen, -O-C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen-C₁-C₄-Alkylen, -O-C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen, -NR⁷- und -NR⁷-C₁-C₆-Alkylen, -NR⁷-C₃-C₆-Alkenylen, -NR⁷-C₃-C₆-Alkinylen, -NR⁷-C₃-C₇-Cycloalkylen, -NR⁷-C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen-C₁-C₄-Alkylen, -NR⁷-C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen, welche gegebenenfalls substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;

15 R¹ und R², gleich oder verschieden, Wasserstoff, oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl und C₂-C₆-Alkynyl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder

20 R¹ und R² gemeinsam C₂-C₆-Alkylen, in welchem gegebenenfalls ein oder zwei Methylengruppen ersetzt sein können durch eine der Gruppen -O- oder -NR⁷-, und welches gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;

- R³ Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus C₁-C₈-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₂-C₈-Alkynyl, C₃-C₈-Cycloalkyl und C₆-C₁₄-Aryl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹; oder
- R³ und R² oder R³ und R¹ gemeinsam C₂-C₆-Alkylen, das gegebenenfalls ein- oder
5 mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- R⁴ Wasserstoff, Halogen, CN, OH, -NR⁷R⁸ oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkyloxy, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkenyloxy, C₂-C₆-Alkynyl und C₂-C₆-Alkynyloxy, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R¹⁰;
- 10 R⁵ C₃-C₈-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁶, oder
- R⁵ C₃-C₈-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder
- R⁵ eine 5-10 gliedrige Heteroarylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome
15 ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹, oder
- R⁵ eine 5-10 gliedrige Heterocycloalkylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome
20 ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹;
- R⁶ -NR⁷R⁸ oder eine 5-10 gliedrige Heterocycloalkylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein-
25 oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹²;
- R⁷ und R⁸, gleich oder verschieden, Wasserstoff oder C₁-C₆-Alkyl,
- R⁹ Halogen, CN, OH oder CF₃;
- R¹⁰ Halogen, OH, CN, =O, C₁-C₆-Alkyloxy, COOR⁷, NR⁷R⁸, CONR⁷R⁸, SO₂R⁷, CHF₂ oder CF₃;
- 30 R¹¹ Halogen, C₁-C₄-Alkyl, OH, CF₃, C₆-C₁₀-Aryl oder C₁-C₆-Alkylen-C₆-C₁₀-Aryl;

- R¹² Halogen, CF₃, C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₈-Cycloalkyl oder C₁-C₆-Alkylen-C₃-C₈-Cycloalkyl;
bedeuten, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer
5 pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.
2. Verbindungen der allgemeinen Formel (I) nach Anspruch 1,
worin
- L eine Einfachbindung, oder eine verbrückende zweibindige Gruppe ausgewählt aus
10 der Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkylen, C₂-C₆-Alkenylen, C₂-C₆-Alkinylen, C₃-C₇-Cycloalkylen, C₁-C₄-Alkylen-C₆-C₁₀-Arylen-C₁-C₄-Alkylen, -O-,
-O-C₁-C₄-Alkylen, -NR⁷- und -NR⁷-C₁-C₄-Alkylen, welche gegebenenfalls substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- R¹ und R², gleich oder verschieden, Wasserstoff, oder ein Rest ausgewählt aus der
15 Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl und C₂-C₆-Alkinyl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder
- R¹ und R² gemeinsam C₂-C₆-Alkylen, in welchem gegebenenfalls ein oder zwei
Methylengruppen ersetzt sein können durch eine der Gruppen -O- oder -NR⁷-, und
20 welches gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- R³ Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus C₁-C₈-Alkyl, C₂-C₈-Alkenyl, C₂-C₈-Alkinyl, C₃-C₈-Cycloalkyl und C₆-C₁₄-Aryl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹; oder
- 25 R³ und R² oder R³ und R¹ gemeinsam C₂-C₆-Alkylen, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- R⁴ Wasserstoff, Halogen, CN, OH, -NR⁷R⁸ oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₆-Alkyl, C₁-C₆-Alkyloxy, C₂-C₆-Alkenyl, C₂-C₆-Alkenyloxy, C₂-C₆-Alkinyl und C₂-C₆-Alkinyloxy, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach
30 substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R¹⁰;

- R⁵ C₃-C₈-Cycloalkyl, das gegebenenfalls einfach substituiert sein kann durch einen Rest R⁶, oder
- R⁵ C₃-C₈-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder
- 5 R⁵ eine 5-10 gliedrige Heteroarylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹, oder
- R⁵ eine 5-10 gliedrige Heterocycloalkylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome
 10 ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel, bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹;
- R⁶ -NR⁷R⁸ oder eine 5-10 gliedrige Heterocycloalkylgruppe, die ein-, zwei oder drei Heteroatome ausgewählt aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel,
 15 bevorzugt Stickstoff oder Sauerstoff, enthalten kann und die gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹²;
- R⁷ und R⁸, gleich oder verschieden, Wasserstoff oder C₁-C₆-Alkyl,
- R⁹ Halogen, CN, OH oder CF₃;
- R¹⁰ Halogen, OH, CN, =O, C₁-C₆-Alkyloxy, COOR⁷, CONR⁷R⁸, SO₂R⁷, CHF₂ oder
 20 CF₃;
- R¹¹ Halogen, C₁-C₄-Alkyl, OH, CF₃, C₆-C₁₀-Aryl oder C₁-C₆-Alkylen-C₆-C₁₀-Aryl;
- R¹² Halogen, CF₃, C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₈-Cycloalkyl oder C₁-C₆-Alkylen-C₃-C₈-Cycloalkyl;
- bedeuten, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere,
 25 ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

3. Verbindungen der allgemeinen Formel (I) nach Anspruch 1 oder 2,
 worin

- 30 L eine Einfachbindung, -O-, -O-C₁-C₃-Alkylen, -NR⁷-, -NR⁷-C₁-C₃-Alkylen oder


- C₁-C₄-Alkylen, welches gegebenenfalls substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- R¹ und R², gleich oder verschieden, Wasserstoff, oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C₁-C₄-Alkyl, C₂-C₄-Alkenyl und C₂-C₄-Alkinyl, der
5 gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder
- R¹ und R² gemeinsam C₂-C₄-Alkylen, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- R³ Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus C₁-C₆-Alkyl, C₃-C₇-Cycloalkyl und C₆-
10 C₁₀-Aryl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹; oder
- R³ und R² oder R³ und R¹ gemeinsam C₂-C₄-Alkylen, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹;
- R⁴ Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, -NR⁷R⁸ oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe
15 bestehend aus C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkyloxy, C₂-C₄-Alkenyloxy und C₂-C₄-Alkinyl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R¹⁰;
- R⁵ C₃-C₇-Cycloalkyl, das gegebenenfalls einfach substituiert sein kann durch einen Rest R⁶, oder
- 20 R⁵ C₃-C₇-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere Reste R⁹, oder
- R⁵ ein Heteroaryl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Imidazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Pyrolyl, Pyrazolyl, Oxadiazolyl, Pyridyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Pyrimidinyl, Indolyl, Chinolinyl, Isochinolinyl, Benzimidazolyl, Purinyl und
25 Pteridinyl, der gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹, oder
- R⁵ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Piperazinyl, Pyrrolinyl, Pyrrolidinyl, Pyrazolinyl, Pyrazolidinyl, Imidazolindinyl, Imidazolidinyl und Morpholinyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert
30 sein kann durch einen oder mehrere der Reste R¹¹;

- R^6 ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Piperazinyl, Pyrrolinyl, Pyrrolidinyl, Pyrazolinyl, Pyrazolidinyl, Imidazolinyll, Imidazolidinyl und Morpholinyl, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach substituiert sein kann durch einen oder mehrere der Reste R^{12} ;
- 5 R^7 und R^8 , gleich oder verschieden, Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl,
 R^9 Halogen, OH, =O oder CF_3 ;
 R^{10} Halogen, OH, =O, C_1 - C_4 -Alkyloxy oder CF_3 ;
 R^{11} Halogen, C_1 - C_4 -Alkyl, OH, CF_3 , Phenyl oder C_1 - C_4 -Alkylen-Phenyl;
 R^{12} C_1 - C_4 -Alkyl, C_3 - C_6 -Cycloalkyl oder C_1 - C_4 -Alkylen- C_3 - C_6 -Cycloalkyl;
- 10 bedeuten, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.
4. Verbindungen der allgemeinen Formel (I) nach Anspruch 1, 2 oder 3,
15 worin
L eine Einfachbindung, C_1 - C_4 -Alkylen, -O- oder NH-;
 R^1 und R^2 , gleich oder verschieden, Wasserstoff, oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C_1 - C_4 -Alkyl, C_2 - C_4 -Alkenyl und C_2 - C_4 -Alkinyll, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest
20 ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, OH und CF_3 ;
oder
 R^3 Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus C_1 - C_6 -Alkyl, C_3 - C_7 -Cycloalkyl und C_6 - C_{10} -Aryl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, OH und CF_3 ; oder
25 R^4 Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, $-NR^7R^8$ oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus C_1 - C_4 -Alkyl, C_1 - C_4 -Alkyloxy, C_2 - C_4 -Alkenyloxy und C_2 - C_4 -Alkinyloxy, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, OH, Methoxy, Ethoxy und CF_3 ;

- R⁵ C₃-C₇-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methyl, Ethyl, Propyl OH, Fluor, Chlor, CF₃ und R⁶, oder
- 5 R⁵ ein Heteroaryl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Imidazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl, Pyrolyl, Pyrazolyl, Oxadiazolyl, Pyridyl, Pyridazinyl, Pyrazinyl, Pyrimidinyl, Indolyl, Chinolyl, Isochinolyl, Benzimidazolyl, Purinyl und Pteridinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, OH, CF₃, Methyl, Ethyl, Propyl, Phenyl, Benzyl oder Phenethyl,
- 10 R⁵ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Piperazinyl, Pyrrolinyl, Pyrrolidinyl, Pyrazolinyl, Pyrazolidinyl, Imidazolyl, Imidazolidinyl und Morpholinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, OH, CF₃, Methyl, Ethyl, Propyl, Phenyl, Benzyl oder Phenethyl;
- 15 R⁶ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl, Piperazinyl, Pyrrolinyl, Pyrrolidinyl, Pyrazolinyl, Pyrazolidinyl, Imidazolyl, Imidazolidinyl und Morpholinyl, der ein- oder zweifach substituiert sein kann durch Methyl, Ethyl, Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl;
- R⁷ und R⁸, gleich oder verschieden, Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl, bedeuten,
- 20 gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.
5. Verbindungen der allgemeinen Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
- 25 worin
- L eine Einfachbindung, -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -O- oder NH-;
- R¹ und R², gleich oder verschieden Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Allyl und Propargyl, der
- gegebenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest
- 30 ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor und CF₃;


- R³ Wasserstoff oder ein Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl und Phenyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach substituiert sein kann durch einen Rest ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor und CF₃;
- 5 R⁴ Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Methoxy, Ethoxy oder Propoxy;
R⁵ C₃-C₆-Cycloalkyl, das gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Methyl, Ethyl, Propyl OH, Fluor, Chlor, CF₃ oder R⁶,
oder
- R⁵ ein Heteroaryl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Pyridyl, Pyrrolyl und
10 Pyrimidinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach, bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, OH, CF₃, Methyl, Ethyl, Propyl, Phenyl, Benzyl oder Phenethyl,
- R⁵ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl,
Piperazinyl, Pyrrolidinyl und Morpholinyl, der gegebenenfalls ein- oder zweifach,
15 bevorzugt einfach substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, OH, CF₃, Methyl, Ethyl, Propyl, Phenyl, Benzyl oder Phenethyl,
- R⁶ ein Heterocycloalkyl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperidinyl,
Morpholinyl, Pyrrolidinyl und Piperazinyl, das gegebenenfalls ein- oder zweifach
substituiert sein kann durch Methyl, Ethyl, Cyclopropyl oder Cyclopropylmethyl,
20 bedeuten, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer pharmakologisch unbedenklichen Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.
6. Pharmazeutische Formulierung enthaltend wenigstens eine Verbindung der Formel
25 (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 5.
7. Verbindung der Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 als Arzneimittel.
8. Verwendung einer Verbindung der Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 5
30 zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Erkrankungen, die durch exzessive oder anomale Zellproliferation charakterisiert sind.

9. Zwischenverbindungen der allgemeinen Formel (A8)




- 5 worin die Reste R^1 , R^2 , R^3 und R^4 die in den Ansprüchen 1 bis 5 genannten Bedeutungen haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

10. 10. Zwischenverbindungen der allgemeinen Formel (A7a)



- 15 worin die Reste R^1 , R^2 , R^3 und R^4 die in den Ansprüchen 1 bis 5 genannten Bedeutungen haben können und worin PG für eine Aminoschutzgruppe steht, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.


11. Zwischenverbindungen der allgemeinen Formel (A7b)



worin die Reste R^1 , R^2 , R^3 und R^4 die in den Ansprüchen 1 bis 5 genannten Bedeutungen
 5 haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer
 Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer
 Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.


12. Zwischenverbindungen der Formel (A5)

10



worin die Reste R^1 , R^2 und R^3 die in den Ansprüchen 1 bis 5 genannten Bedeutungen
 haben können, gegebenenfalls in Form ihrer Tautomeren, ihrer Racemate, ihrer
 Enantiomere, ihrer Diastereomere und ihrer Gemische, sowie gegebenenfalls in Form ihrer
 15 Säureadditionssalze, Solvate und oder Hydrate.

13. Verbindung der Formel



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP2005/008991

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 C07D475/04 A61K31/4375 A61P35/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
 Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 C07D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)
 EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data, BEILSTEIN Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	WO 2004/076454 A (STEEGMAIER MARTIN ; BAUM ANKE (AT); SOLCA FLAVIO (AT); QUANT JENS JUER) 10 September 2004 (2004-09-10) claim 1; table 1	1-13
X	WO 03/020722 A (STEEGMAIER MARTIN ; QUANT JENS JUERGEN (AT); BOEHRINGER INGELHEIM PHAR) 13 March 2003 (2003-03-13) cited in the application table 1	1-13
A	WO 01/19825 A (DENNY WILLIAMS ALEXANDER ; REWCASTLE GORDON WILLIAM (NZ); DOBRUSIN ELL) 22 March 2001 (2001-03-22) cited in the application claim 1	1-13

Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

<p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier document but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p>	<p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>
--	--

Date of the actual completion of the international search 7 December 2005	Date of mailing of the international search report 15/12/2005
---	---

Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Baston, E
--	--

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP2005/008991

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 2004076454	A	10-09-2004	AU	2003215591 A1	17-09-2004
			CA	2517020 A1	10-09-2004
			EP	1599478 A1	30-11-2005
WO 03020722	A	13-03-2003	CA	2458699 A1	13-03-2003
			CN	1551881 A	01-12-2004
			EP	1427730 A1	16-06-2004
			HR	20040213 A2	28-02-2005
			HU	0401293 A2	28-10-2004
			JP	2005501904 T	20-01-2005
			MX	PA04002067 A	07-06-2004
			NZ	531928 A	28-10-2005
			ZA	200401365 A	27-05-2005
			WO 0119825	A	22-03-2001
AU	5629500 A	17-04-2001			
BG	106594 A	29-12-2002			
BR	0013952 A	14-05-2002			
CA	2393896 A1	22-03-2001			
CN	1373763 A	09-10-2002			
CZ	20020846 A3	12-02-2003			
EA	5287 B1	30-12-2004			
EE	200200140 A	15-04-2003			
EP	1409487 A1	21-04-2004			
HU	0202713 A2	28-12-2002			
JP	2003509425 T	11-03-2003			
MA	26819 A1	20-12-2004			
MX	PA02001108 A	20-08-2002			
NO	20021239 A	13-03-2002			
NZ	516872 A	31-10-2003			
PL	353269 A1	03-11-2003			
SK	3542002 A3	01-04-2003			
ZA	200200896 A	30-04-2003			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP2005/008991

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C07D475/04 A61K31/4375 A61P35/00		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) C07D		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data, BEILSTEIN Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P, X	WO 2004/076454 A (STEEGMAIER MARTIN ; BAUM ANKE (AT); SOLCA FLAVIO (AT); QUANT JENS JUER) 10. September 2004 (2004-09-10) Anspruch 1; Tabelle 1	1-13
X	WO 03/020722 A (STEEGMAIER MARTIN ; QUANT JENS JUERGEN (AT); BOEHRINGER INGELHEIM PHAR) 13. März 2003 (2003-03-13) in der Anmeldung erwähnt Tabelle 1	1-13
A	WO 01/19825 A (DENNY WILLIAMS ALEXANDER ; REWCASTLE GORDON WILLIAM (NZ); DOBRUSIN ELL) 22. März 2001 (2001-03-22) in der Anmeldung erwähnt Anspruch 1	1-13
<input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
° Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 7. Dezember 2005		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 15/12/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Baston, E

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP2005/008991

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 2004076454	A	10-09-2004	AU	2003215591 A1	17-09-2004
			CA	2517020 A1	10-09-2004
			EP	1599478 A1	30-11-2005
WO 03020722	A	13-03-2003	CA	2458699 A1	13-03-2003
			CN	1551881 A	01-12-2004
			EP	1427730 A1	16-06-2004
			HR	20040213 A2	28-02-2005
			HU	0401293 A2	28-10-2004
			JP	2005501904 T	20-01-2005
			MX	PA04002067 A	07-06-2004
			NZ	531928 A	28-10-2005
			ZA	200401365 A	27-05-2005
			WO 0119825	A	22-03-2001
AU	5629500 A	17-04-2001			
BG	106594 A	29-12-2002			
BR	0013952 A	14-05-2002			
CA	2393896 A1	22-03-2001			
CN	1373763 A	09-10-2002			
CZ	20020846 A3	12-02-2003			
EA	5287 B1	30-12-2004			
EE	200200140 A	15-04-2003			
EP	1409487 A1	21-04-2004			
HU	0202713 A2	28-12-2002			
JP	2003509425 T	11-03-2003			
MA	26819 A1	20-12-2004			
MX	PA02001108 A	20-08-2002			
NO	20021239 A	13-03-2002			
NZ	516872 A	31-10-2003			
PL	353269 A1	03-11-2003			
SK	3542002 A3	01-04-2003			
ZA	200200896 A	30-04-2003			