



(19) **RU** ⁽¹¹⁾ **2 153 490** ⁽¹³⁾ **C2**
(51) МПК⁷ **C 07 C 279/22, 311/46, A 61 K 31/155**

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**


(21), (22) Заявка: 95114440/04, 25.08.1995
(24) Дата начала действия патента: 25.08.1995
(30) Приоритет: 28.08.1994 DE P 4430213.4
(46) Дата публикации: 27.07.2000
(56) Ссылки: EP 0416499 A1, 20.09.1990. EP 0556672 A1, 25.08.1993. EP 0556673 A1, 25.08.1993. EP 0556674 A1, 25.08.1993. EP 0602522 A1, 22.06.1994. EP 0603650 A1, 29.06.1994. DE 3929582 A1, 07.03.1991. SU 1836338 A3, 23.08.1993.
(98) Адрес для переписки:
129010, Москва, ул. Большая Спасская 25,
стр.3, ООО "Городисский и Партнеры",
Лебедевой Н.Г.

(71) Заявитель:
МЕРК ПАТЕНТ ГмбХ (DE)
(72) Изобретатель: Рольф ГЕРИКЕ (DE),
Дитер ДОРШ (DE), Манфред БАУМГАРТ
(DE), Клаус-Отто МИНК (DE), Норберт БАЙЕР
(DE)
(73) Патентообладатель:
МЕРК ПАТЕНТ ГмбХ (DE)

(54) **АРИЛБЕНЗОИЛГУАНИДИНЫ, СПОСОБ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ**

(57)
Изобретение относится к новым орто-замещенным арилбензоилгуанидинам формулы (I), где R¹ обозначает А, CF₃, Гал; R² и R³ каждый независимо друг от друга обозначают Н, Гал, А, SO_n-R⁶, -SO₂NR⁴R⁵, Ph; R⁴ обозначает Н, А, CF₃, Ph; R⁵ обозначает Н или А; R⁶ обозначает А; А обозначает алкил с 1-6 С-атомами; Ph обозначает незамещенный или одно-, двух- или трехкратно замещенный с помощью А, F, Cl, Br, J или CF₃ фенил; n равно 1 или 2; Гал обозначает фтор, хлор, бром или иод, их физиологически приемлемым солям, которые обладают хорошим кардиозащитным действием и поэтому особенно пригодны для лечения инфаркта, профилактики инфаркта и для лечения стенокардии. Вещества

противодействуют любому патологическим гипоксическим и ишемическим повреждениям, так что можно лечить вызываемые благодаря этому первичные или вторичные заболевания. Биологически активные вещества также хорошо пригодны для профилактики применений. Описывается также способ их получения и фармацевтическая композиция на основе соединений формулы (I). 3 с. и 2 з.п. ф-лы, 1 табл.





(19) **RU** ⁽¹¹⁾ **2 153 490** ⁽¹³⁾ **C2**
 (51) Int. Cl.⁷ **C 07 C 279/22, 311/46, A 61 K 31/155**

RUSSIAN AGENCY
FOR PATENTS AND TRADEMARKS

(12) **ABSTRACT OF INVENTION**

(21), (22) Application: 95114440/04, 25.08.1995

(24) Effective date for property rights: 25.08.1995

(30) Priority: 28.08.1994 DE P 4430213.4

(46) Date of publication: 27.07.2000

(98) Mail address:
129010, Moskva, ul. Bol'shaja Spasskaja 25,
str.3, OOO "Gorodisskij i Partnery", Lebedevoy N.G.

(71) Applicant:
MERK PATENT GmbH (DE)


(72) Inventor: Rol'f GERIKE (DE),
Diter DORSh (DE), Manfred BAUMGART
(DE), Klaus-Otto MINK (DE), Norbert BAJER (DE)

(73) Proprietor:
MERK PATENT GmbH (DE)

(54) **ARYLBENZOYLGUANIDINES, METHOD OF THEIR SYNTHESIS AND PHARMACEUTICAL COMPOSITION**

(57) Abstract:


FIELD: organic chemistry, pharmacy.
SUBSTANCE: invention relates to the novel
ortho-substituted arylbenzoylguanidines of
the formula



R¹ means A, CF₃, Hal; R² and R³ each
independently means H, Hal, A, -SO_n-R⁶,

-SO₂NR⁴R⁵, Ph; R⁴ means H, A, CF₃, Ph;
R⁵ means H or A; R⁶ means A; A means alkyl
with 1-6 C-atoms; Ph means unsubstituted or
mono-, di- or tri-substituted phenyl with A,
F, Cl, Br, J or CF₃; n = 1 or 2; Hal means
fluorine, chlorine, bromine or iodine atom,
their physiologically acceptable salts.
Compounds show good cardioprotective effect
and therefore are useful for treatment of
patients with infarction, for infarction
prophylaxis and for stenocardia treatment.
Substances counteract to any pathological
hypoxic and ischemic damages and can be used
for treatment of patients with primary and
secondary diseases. Biologically active
substances are useful for prophylaxis also.
Invention describes method of their
synthesis and pharmaceutical composition
based on compounds of the formula (I).
EFFECT: new compounds indicated above,
improved method of synthesis, valuable
pharmacological properties. 5 cl, 1 tbl, 7 ex

Изобретение относится к орто-замещенным арилбензоилгуанидинам формулы (I):



где R¹ - обозначает A, CF₃, Гал,

R² и R³ каждый независимо друг от друга обозначают H, Гал, A, -SO_n-R⁶, -SO₂NR⁴R⁵, Ph,

R⁴ обозначает H, A, CF₃, Ph,

R⁵ обозначает H или A,

R⁶ обозначает A,

A обозначает алкил с 1-6 C-атомами;

X обозначает O, S или NR⁵;

Ph обозначает незамещенный или одно-, двух- или трехкратно замещенный с помощью A,

F, Cl, Br, I или CF₃ фенил,

n равно 1 или 2; и

Гал обозначает фтор, хлор, бром или иод, а также к их физиологически приемлемым солям.

В основу изобретения положена задача получения новых соединений с ценными свойствами, в особенности таких, которые можно применять для приготовления лекарственных средств.

Найдено, что соединения формулы (I) и их физиологически приемлемые соли при хорошей совместимости обладают ценными фармакологическими свойствами.

В случае новых соединений речь идет об ингибиторах клеточного Na⁺/H⁺-антиносителя (Antiporters), т.е. о биологически активных веществах, которые подавляют механизм обмена Na⁺/H⁺ в клетках (Dusing и др. Med. Klin. 87, 378-384 (1992)) и которые таким образом представляют хорошие антиаритмические средства, пригодные в особенности для лечения аритмий, которые появляются как следствие недостатка кислорода.

Самым известным биологически активным веществом группы ацилгуанидинов является Амилорид. Это вещество, однако, обладает понижающим кровяное давление и салуретическим действием, что в особенности нежелательно при лечении нарушений ритма сердца, в то время как антиаритмические свойства выражены только очень слабо. Сверх того, подобные по структуре соединения известны, например, из европейского патента 0416499.

Предметом изобретения являются соединения формулы (I), а также их фармацевтически приемлемые соли.

Предлагаемые согласно изобретению вещества настоящего изобретения обладают хорошим кардиозащитным действием и поэтому особенно пригодны для лечения инфаркта, профилактики инфаркта и для лечения стенокардии. Далее, вещества противодействуют любым патологическим гипоксическим и ишемическим повреждениям, так что можно лечить вызываемые благодаря этому первичные или вторичные заболевания. Биологически активные

вещества также хорошо пригодны для профилактики применений.

На основании защитных действий этих веществ при патологических гипоксических или ишемических ситуациях следуют дальнейшие возможности применения при хирургических вмешательствах с целью защиты временно недостаточно снабжаемых органов; при трансплантациях органов для защиты извлекаемых органов; при ангиопластических вмешательствах в сосуды и сердце; при ишемиях нервной системы; при терапии шоковых состояний и для предохранительного предотвращения эссенциальной гипертонии.

Далее, эти соединения также можно использовать в качестве терапевтических средств при обусловленных пролиферацией клеток заболеваниях, как артериосклероз, вызываемые диабетом более поздние осложнения, опухолевые заболевания, фибротические заболевания, в особенности легких, печени и почек, а также гипертрофии и гиперплазии органов. Сверх того, вещества пригодны для диагностики с целью распознавания заболеваний, которые сопровождаются повышенной активностью Na⁺/H⁺-антиносителя, например в эритроцитах, тромбоцитах или лейкоцитах.

Действия соединений можно определить с помощью само по себе известных методов, которые указаны, например, N.Escobales и I.Figueroa в I.Membrane Biol. 120,41-49 (1991) или L.Counillon, W.Scholz, H.I.Lang и I.Pouyssegur в Mol. Pharmacol 44, 1041-1045 (1993).

В качестве подопытных животных пригодны, например, мыши, крысы, морские свинки, собаки, кошки, обезьяны или свиньи.

Соединения поэтому можно применять в качестве биологически активных веществ лекарственных средств в медицине человека и ветеринарии. Далее, они могут найти применение в качестве промежуточных продуктов для получения других биологически активных веществ лекарственных средств.

В указанных формулах:


A обозначает разветвленную или неразветвленную алкильную группу с 1-6, предпочтительно 1-4, в особенности 1,2 или 3 C-атомами, в особенности предпочтительно метил, далее предпочтительно этил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, далее предпочтительно втор- бутил, трет-бутил, пентил, изопентил (3-метилбутил), гексил или изогексил (4-метилпентил);

R¹ обозначает предпочтительно A, или Гал, в особенности Br или Cl, далее, однако, также предпочтительно CF₃;

R² и R³ предпочтительно обозначают, независимо друг от друга, H, A, Cl, Br, особенно предпочтительно один из обоих остатков обозначает H₃C-SO₂- в то время как другой предпочтительно является водородом.

R⁴ обозначает предпочтительно, также как и R⁵, H или A.


Предметом изобретения далее является способ получения соединений вышеуказанной формулы (I), а также их солей, отличающийся тем, что соединение формулы (II):



где R^1 , R^2 , R^3 и Ph имеют вышеуказанные значения и

Q, обозначает Cl, Br, OA, O-CO-A, O-CO-Ph, OH или другую реакционноспособную, этерифицированную до сложноэфирной

ОН-группу, соответственно легко нуклеофильно замещаемую удаляемую группу, вводят во взаимодействие с гуанидином; или бензоилгуанидин формулы (III):



где R^1 , R^2 и R^3 имеют вышеуказанные значения, и

R^7 обозначает Cl, Br, I или O-SO₂-R⁸; и

R^8 обозначает A, Ph или CF₃;

вводят во взаимодействие с соединением формулы (IV):

Ph-B(OR⁹)₂

где R⁹, смотря по обстоятельствам, обозначает H, A или вместе обозначают алкилен с 2-4 C-атомами;

или иначе соответствующее формуле (I) соединение, которое, однако, вместо одного или нескольких атомов водорода содержит одну или несколько восстанавливаемых групп и/или одну или несколько дополнительных C-C- и/или C-N- связей, обрабатывают восстановителем;

или иначе соответствующее формуле (I) соединение, которое, однако, вместо одного или нескольких атомов водорода содержит одну или несколько сольволизуемых групп, обрабатывают сольволизующим средством; и/или полученное основание формулы (I) путем обработки кислотой превращают в одну из его солей. Соединение формулы (I), впрочем, получают само по себе известными способами, которые описаны в литературе (например, в справочных изданиях, как Губен-Вейль "Методы органической химии", изд. Georg-Thieme, Штутгарт; Organic Reactions, John Wiley & Sons, Inc., New York; а также в вышеуказанной заявке на патент), а именно при реакционных условиях, которые известны и пригодны для указанных взаимодействий. При этом также можно использовать само по себе известные, здесь подробнее не упомянутые, варианты.

Исходные вещества в желательном случае также можно получать in situ, таким образом, что их не выделяют из реакционной смеси, а тотчас вводят во взаимодействие далее до получения соединений формулы (I).

Предпочтительно соединения формулы (I) получают тем, что активированное производное карбоновой кислоты формулы (II), причем Q особенно предпочтительно обозначает Cl или -O-CH₃, вводят во

взаимодействие с гуанидином. Особенно пригодны варианты реакции, при которых свободную карбоновую кислоту формулы (II) (Q=OH) само по себе известным образом превращают в соответствующее активированное производное и его затем непосредственно, без промежуточного выделения, вводят во взаимодействие с гуанидином. Способы, при которых не нужно осуществлять промежуточного выделения, представляют собой, например, активирование с помощью карбонилдиимидозола, дициклогексилкарбодиимида или варианты Mukayama (Angew. Chem. 91, 788-812 (1979)).

Карбоновые кислоты формулы (II) как правило известны. Их в особенности получают путем перекрестных сочетаний в присутствии катализатора на основе палладия, как, например сочетание по Suzuki (Synlett. 207, 1992). Предпочтительными катализаторами являются, например, Pd(PPh₃)₄ или (Ph₃P)₂PdCl₂.

Карбоновые кислоты формулы (II) далее получают путем нуклеофильного ароматического замещения, исходя из пригодных производных бензойной кислоты, путем введения их во взаимодействие с соответствующими арилборными кислотами или сложными эфирами арилборных кислот формулы (IV). Взаимодействие осуществляют по аналогии с реакцией соединений формул (III) и (IV). Это взаимодействие описывается ниже.

Особенно пригодными соединениями формулы (IV) являются, например, фенилборная кислота и 2-, 3- или 4-алкилфенилборные кислоты или их сложные алкиловые эфиры, которые в случае необходимости могут содержать дополнительные заместители.

Взаимодействие реакционноспособного производного карбоновой кислоты формулы (II) с гуанидином осуществляют само по себе известным образом, предпочтительно в протонном или апротонном, полярном или неполярном, инертном органическом растворителе.

Пригодные растворители указываются ниже для взаимодействия соединений формул (III) и (IV). Особенно предпочтительными растворителями, однако, являются метанол, ТГФ, диметоксиметан, диоксан или получаемые из них смеси, а также вода. В качестве реакционной температуры пригодны, например, температуры от 20°C до температуры кипения растворителя. Время реакции составляет от 5 минут до 12 часов. При реакции целесообразно использовать акцептор кислоты. Для этой цели пригодны любые виды оснований, которые сами не мешают протеканию реакции. Особенно пригодно, однако, применение неорганических оснований, как карбонат калия, или органических оснований, как триэтиламин или пиридин, или, однако, избыток гуанидина.

Соединения формулы (I) по п.1 формулы изобретения далее можно получать тем, что бензоилгуанидин формулы (III) вводят во взаимодействие с соединением формулы (IV). Исходные вещества формулы (III) можно получать простым образом путем взаимодействия соответственно замещенных бензойных кислот или получаемых из них

реакционноспособных производных кислот, как, например, галоидангидриды кислоты, сложные эфиры или ангидриды, с гуанидином при реакционных условиях, которые само по себе известны и общеупотребительны для получения амидов. Особенно пригодны опять такие варианты реакции, которые указаны выше для взаимодействия соединения формулы (II) с гуанидином.

Соединения формулы (IV), так же как и способы их получения, само по себе известны. Если они неизвестны, то их можно получать само по себе известными способами.

Получение соединения формулы (II), а также взаимодействие соединения формулы (III) с соединением формулы (IV), осуществляют само по себе известным образом, предпочтительно в протонном или апротонном, полярном инертном органическом растворителе.

При получении соединения формулы (II), при взаимодействии соединения формулы (II) с гуанидином или при взаимодействии соединения формулы (III) с соединением формулы (IV) также целесообразно работать в присутствии основания или с избытком основной компоненты. В качестве оснований предпочтительно пригодны, например, гидроксиды, карбонаты, алкоголяты щелочных или щелочноземельных металлов или органические основания, как триэтиламин или пиридин, которые также могут применяться в избытке и тогда одновременно могут служить в качестве растворителя.

В качестве инертных растворителей пригодны в особенности спирты, как метанол, этанол, изопропанол, н-бутанол или трет-бутанол; простые эфиры, как диэтиловый эфир, диизопропиловый эфир, тетрагидрофуран (ТГФ) или диоксан; простые гликолевые эфиры, как этиленгликольмонометилловый или -моноэтиловый простой эфир (метилгликоль или этилгликоль), этиленгликольдиметилловый простой эфир (диглим); кетоны, как ацетон или бутанон; нитрилы, как ацетонитрил; нитросоединения, как нитрометан или нитробензол; сложные эфиры, как этилацетат; амиды, как гексаметилтриамид фосфорной кислоты; сульфоксиды, как диметилсульфоксид (ДМСО); хлорированные углеводороды, как дихлорметан, хлороформ, трихлорэтилен, 1,2-дихлорэтан или четыреххлористый углерод; углеводороды, как бензол, толуол или ксилол. Далее, пригодны смеси этих растворителей друг с другом.

Особенно предпочтительная методика работы при введении во взаимодействие соединений формул (III) с соединениями формулы (IV) состоит в том, что соответствующий бензоилгуанидин суспендируют в инертном растворителе, как, например, толуол, обрабатывают с помощью тетракис(трифенилфосфин) палладия-(O) и затем прикапывают борную кислоту или соответствующий сложный эфир борной кислоты (сочетание по Suzuki).

Далее, соединения формулы (I) можно получать тем, что их высвобождают из их функциональных производных путем сольволиза, в особенности путем гидролиза или путем гидрогенолиза.

Предпочтительными исходными

веществами для сольволиза, соответственно гидрогенолиза, являются такие, которые иначе соответствуют формуле (I), однако, вместо одной или нескольких свободных amino- и/или гидроксильных групп содержат соответствующие защищенные amino- и/или гидроксильные группы, предпочтительно такие, которые вместо H-атома, который связан с N-атомом, содержат защитную для amino-функции группу, в особенности такие, которые вместо HN-группы содержат R'-N-группу, где R' обозначает защитную для amino-функции группу, и/или такие, которые вместо H-атома гидроксильной группы содержат защитную для гидроксильной функции группу, например такие, которые соответствуют формуле (I), однако вместо OH-группы содержат OR"-группу, где R" обозначает защитную для гидроксильной функции группу.

В молекуле исходного вещества могут находиться также несколько одинаковых или разных защищенных amino- и/или гидроксильных групп. Если имеющиеся защитные группы отличаются друг от друга, то их можно отщеплять во многих случаях селективно.

Выражение "защитная для amino-функции группа" общеизвестно и относится к группам, которые пригодны для защиты (блокирования) amino-группы от химических взаимодействий, которые, однако, легко удаляются после того, как в другом месте молекулы прошла желательная химическая реакция. Типичными для таких групп являются в особенности незамещенные или замещенные ацильные, арильные (например, 2,4-динитрофенил (DNP)), аралкоксиметильные (например, бензоилоксиметил (BOM))) или аралкильные группы (например, бензил, 4-нитробензил, трифенилметил). Так как защитные для amino-функции группы после желательной реакции (или последовательности реакций) удаляются, их род и величина, впрочем, не критические; однако, предпочтительны таковые с 1-20, в особенности 1-8, C-атомами. Выражение "ацильная группа" в связи с настоящим способом нужно понимать в самом широком смысле. Оно охватывает производимые от алифатических, аралифатических, ароматических или гетероциклических карбоновых кислот или сульфокислот ацильные группы, а также в особенности алкоксикарбонильные, арилоксикарбонильные и прежде всего аралкоксикарбонильные группы. Примерами такого рода ацильных групп являются алканоил, как ацетил, пропионил, бутирил; аралканоил, как фенилацетил; ароил, как бензоил или толуил; арилоксиалканоил, как феноксиацетил; алкоксикарбонил, как метоксикарбонил, этоксикарбонил, 2,2,2-трихлорэтоксикарбонил, изопропоксикарбонил, трет-бутоксикарбонил (BOC), 2-иодэтоксикарбонил; аралкилоксикарбонил, как бензилоксикарбонил (CBZ), 4-метоксибензилоксикарбонил, 9-флуоренилметоксикарбонил (Fmoc). Предпочтительными защитными для amino-функции группами являются BOC, DNP и BOM, далее CBZ, бензил и ацетил.

Выражение "защитная для гидроксильной функции группа" также общеизвестно и относится к группам, которые пригодны для

защиты гидроксильной группы от химических взаимодействий, которые, однако, легко удаляются после того, как в другом месте молекулы прошла желательная химическая реакция. Типичными для таких групп являются вышеуказанные, незамещенные или замещенные, арильные, аралкильные или ацильные группы, далее также алкильные группы. Природа и величина защитных для гидроксильной функции групп не критические, так как после желательной химической реакции или последовательности реакций их снова удаляют; предпочтительны группы с 1-20, в особенности 1-10, C-атомами. Примерами защитных для гидроксильной функции групп, между прочим, являются трет-бутил, бензил, п-нитробензоил, п-толуолсульфонил и ацетил, причем особенно предпочтительны бензил и ацетил.

Используемые в качестве исходных веществ функциональные производные соединений формулы (I) можно получить обычными способами, которые описаны, например, в указанных стандартных работах и заявках на патенты, например путем введения во взаимодействие соединений, которые соответствуют формулам (II) и (III), причем однако по меньшей мере одно из этих соединений вместо одного H-атома содержит защитную группу.

Вывосвобождение соединений формулы (I) из их функциональных производных осуществляют в зависимости от используемой защитной группы, например, с помощью сильных кислот, целесообразно с помощью трифторуксусной кислоты или хлорной кислоты, однако, также с помощью других сильных неорганических кислот, как соляная кислота или серная кислота; сильных органических карбоновых кислот, как трихлоруксусная кислота; или сульфокислот, как бензол- или п-толуолсульфокислота. Присутствие дополнительного инертного растворителя возможно, однако не всегда необходимо.

В качестве инертных растворителей предпочтительно пригодны органические, например карбоновые, кислоты, как уксусная кислота; простые эфиры, как тетрагидрофуран (ТГФ) или диоксан; амиды, как диметилформамид (ДМФ); галогенированные углеводороды, как дихлорметан; далее также спирты, как метанол, этанол или изопропанол; а также вода. Далее, принимают во внимание смеси вышеуказанных растворителей. Трифторуксусную кислоту предпочтительно применяют в избытке без добавки другого растворителя; перхлорную кислоту используют в форме смеси из уксусной кислоты и 70%-ной перхлорной кислоты в соотношении 9: 1. Температуры реакции расщепления целесообразно составляют примерно 0°-50°C; предпочтительно работают при 15°-30°C (комнатная температура).

ВОС-группу можно отщеплять, например, предпочтительно с помощью 40%-ной трифторуксусной кислоты в дихлорметане или с помощью примерно 3-5 Н НСl в диоксане при 15°-60°C; FMOC-группу можно отщеплять с помощью примерно 5-20%-ного раствора диметиламина, диэтиламина или пиперидина в ДМФ при 15- 50°C. Отщепление DNP-группы осуществляют, например, также с

помощью примерно 3-10%-ного раствора 2-меркаптоэтанола в смеси ДМФ с водой при 15-30°C.

Гидрогенолитически удаляемые защитные группы (например, BOM, CBZ или бензил) можно отщеплять, например, путем обработки с помощью водорода в присутствии катализатора (например, катализатора на основе благородного металла, как палладий, целесообразно на носителе, как уголь). В качестве растворителей при этом пригодны вышеуказанные, в особенности, например, спирты, как метанол или этанол, или амиды, как ДМФ. Гидрогенолиз как правило осуществляют при температурах примерно 0-100°C и давлениях примерно 1-200 бар, предпочтительно при 20 -30°C и давлении 1-10 бар. Гидрогенолиз CBZ-группы хорошо протекает, например, в присутствии 5-10%-ного палладия-на-угле в метаноле при 20-30°C.

Основание формулы (I) далее с помощью кислоты можно переводить в соответствующую соль присоединения кислоты. Для этого превращения принимают во внимание кислоты, которые дают физиологически приемлемые соли. Так, можно применять неорганические кислоты, например серную кислоту, азотную кислоту; галогенводородные кислоты, как соляная кислота или бромоводородная кислота; фосфорные кислоты, как ортофосфорная кислота; сульфаминовую кислоту; далее органические кислоты, в особенности алифатические, алициклические, арилифатические, ароматические или гетероциклические одно- или многоосновные карбоновые, сульфоновые или серные кислоты, например, как муравьиная кислота, уксусная кислота, пропионовая кислота, пивалиновая кислота, диэтилуксусная кислота, малоновая кислота, янтарная кислота, пимелиновая кислота, фумаровая кислота, малеиновая кислота, молочная кислота, винная кислота, яблочная кислота, бензойная кислота, салициловая кислота, 2-или 3-фенилпропионовая кислота, лимонная кислота, глюконовая кислота, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, изоникотиновая кислота, метан- или этансульфокислота, этандисульфокислота, 2-гидроксиэтансульфокислота, бензолсульфокислота, п-толуолсульфокислота, нафталинмоно- и -дисульфокислоты, лаурилсерная кислота.

Соединения формулы (I) и их физиологически приемлемые соли можно применять для приготовления фармацевтических композиций, в особенности не химическим путем. При этом их вместе по меньшей мере с одним твердым, жидким и/или полужидким носителем или вспомогательным веществом и в случае необходимости в комбинации с одним или несколькими другими биологически активными веществами можно доводить до пригодной дозировочной формы.

Предметом изобретения, далее, являются средства, в особенности фармацевтические композиции, содержащие по меньшей мере одно соединение формулы (I) и/или одну из его физиологически приемлемых солей.

Эти композиции можно применять в качестве лекарственного средства в медицине или ветеринарии. В качестве

носителей применяют органические или неорганические вещества, которые пригодны для кишечного (например, орального), парентерального или топического введения и не реагируют с новыми соединениями, например, как вода, растительные масла, бензиловые спирты, полиэтиленгликоли, триацетат глицерина, желатина, углеводы, как лактоза или крахмал, стеарат магния, тальк, ланолин, вазелин. Для орального применения служат в особенности таблетки, драже, капсулы, сиропы, соки или капли; для ректального применения служат свечи; для парентерального применения служат растворы, предпочтительно масляные или водные растворы, далее суспензии, эмульсии или имплантаты; для топического применения служат мази, кремы, пасты, лосьоны, гели, распыляемые препараты, пены, аэрозоли, растворы (например, растворы в спиртах, как этанол или изопропанол, ацетонитриле, ДМФ, диметилацетамиде, 1,2-пропандиоле или их смесях друг с другом и/или с водой) или порошки (пудры). Новые соединения можно также лиофилизировать и полученные лиофилизаты применять, например, для приготовления препаратов для инъекции.

В особенности для топического применения принимают во внимание также липосомные композиции. Указанные композиции могут быть стерилизованы и/или могут содержать вспомогательные вещества, как консерванты, стабилизаторы и/или смачиватели, эмульгаторы, соли для влияния на осмотическое давление, буферные вещества, красители, придающие скользкость (таблеткам) вещества, вкусовые вещества и/или ароматизирующие вещества. Если желательно, они также могут содержать одно или несколько других биологически активных веществ, например, один или несколько витаминов.

Соединения формулы (I) и их физиологически приемлемые соли можно вводить людям или животным, в особенности млекопитающим, как обезьяны, собаки, кошки, крысы или мыши, и применять при лечении человеческого или животного организма, а также при борьбе с заболеваниями, в особенности при терапии и/или профилактике нарушений сердечно-сосудистой системы. Поэтому они пригодны для лечения аритмий, в особенности, когда они вызываются недостатком кислорода, стенокардии, инфарктов, ишемий нервной системы, как, например, инсульт или отек головного мозга, шоковых состояний, и для профилактики.

Вещества далее можно использовать в качестве терапевтических средств при заболеваниях, при которых играют роль пролиферации клеток, как артериосклероз, поздние осложнения вследствие диабета, опухолевые заболевания, фиброзы, а также гипертрофии и гиперплазии органов.


При этом предлагаемые согласно изобретению вещества как правило вводят по аналогии с известными антиаритмическими средствами, например как Апридин, предпочтительно в дозах примерно 0,01-5 мг, в особенности 0,02-0,5 мг, на дозирочную единицу. Суточная доза предпочтительно составляет 0,0001-0,1, в особенности 0,0003-0,01 мг/кг веса тела. Специфическая доза для каждого определенного пациента, однако, зависит от самых различных

факторов, например от эффективности используемого специального соединения, возраста, веса тела, общего состояния здоровья, пола, стоимости, момента и пути введения, скорости выделения, комбинации лекарственных средств и тяжести соответствующего заболевания, которая имеет значение для терапии. Предпочтительно оральное введение.

Фармакологические данные

Фармакологическую активность предлагаемых соединений определяли *in vitro*, величина IC_{50} соответствует 50% ингибирования Na^+/H^+ -антипорта (Na^+ -поглощения). Все соединения являются ингибиторами Na^+ -поглощения, определяемого Na^+/H^+ -антипорта, в наномолярной области.

Общая формула



Далее см. таблицу (в конце описания).

В нижеследующих примерах выражение "обычная обработка" обозначает: добавляют, если необходимо, воду; экстрагируют органическим растворителем, как этилацетат; разделяют; органическую фазу сушат над сульфатом натрия, отфильтровывают, выпаривают и очищают путем хроматографии и/или кристаллизации.

Пример 1.

Раствор 1,8 г метилового эфира 2-метил-4-(4-метилфенил)-5-метил-сульфонилбензойной кислоты (получают путем взаимодействия метилового эфира 3-метилсульфонил-4-бром-6-метилбензойной кислоты с толилборной кислотой) и 1,5 г гуанидина в 50 мл метанола кипятят в течение 5 часов и затем растворитель удаляют. Остаток обрабатывают водой, остающийся кристаллизат отсасывают и обрабатывают разбавленным раствором гидроксида натрия. Твердый остаток отфильтровывают, перекристаллизуют из этанола и получают N-диаминометилен-2-метил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид. Т.пл. 222-224 °C.

Аналогичным образом, путем взаимодействия гуанидина с метиловым эфиром 2-этил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонил-бензойной кислоты получают

N-диаминометилен-2-этил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром 2-пропил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонил-бензойной кислоты получают N-диаминометилен-2-пропил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром 2-изопропил-4-(4-метилфенил)-5-метил-сульфонилбензойной кислоты получают N-диаминометилен-2-изопропил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром 2-бутил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонил-бензойной кислоты получают

N-диаминометилден-2-бутил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-(2-бутил)-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-(2-бутил)-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-этил-4-фенил-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-этил-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-пропил-4-фенил-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-пропил-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-изопропил-4-фенил-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-изопропил-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-бутил-4-фенил-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-бутил-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-(2-бутил)-4-фенил-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-(2-бутил)-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-этил-4-(3-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-этил-4-(3-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-хлор-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-хлор-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-бром-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-бром-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-фторметил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-фторметил-4-(4-фенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-трифторметил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-трифторметил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-пентафторэтил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-пентафторэтил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
2-метокси-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-метокси-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром

2-циан-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-циан-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
5 2-нитро-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-нитро-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;
с метиловым эфиром
10 2-этинил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилден-2-этинил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид.
Пример 2.
700 мг N-диаминометилден-2-метил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамида (получают согласно примеру 1) суспендируют в 50 мл воды и при перемешивании смешивают с 1,8 мл 1 Н раствора HCl. После фильтрации и лиофилизации получают N-диаминометилден-2-метил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид в виде гидрохлорида. Т.пл. 205°C.
Аналогичным образом, из свободных оснований получают следующие гидрохлориды:
25 N-диаминометилден-2-этио-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-пропил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
30 N-диаминометилден-2-изопропил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-бутил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
35 N-диаминометилден-2-(2-бутил)-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-этил-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
40 N-диаминометилден-2-пропил-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-изопропил-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-бутил-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
45 N-диаминометилден-2-(2-бутил)-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-метил-4-фенил-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
50 N-диаминометилден-2-хлор-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-бром-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
55 N-диаминометилден-2-трифторметил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-пентафторэтил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
60 N-диаминометилден-2-метокси-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-циан-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;
N-диаминометилден-2-нитро-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-

гидрохлорид;

N-диаминотилеилен-2-этинил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид.

Пример 3.

К суспензии 6,02 г N-диаминотилеилен-2-метил-4-бром-5-метилсульфонилбензамида (получают путем взаимодействия 2-метил-4-бром-5-метилсульфонилбензоилхлорида с гуанидином в присутствии триэтиламина) в 100 мл толуола последовательно добавляют 10 мг тетраакис-(трифенилфосфин)-Pd(0), а также 1,8 г Na₂CO₃, растворенных в 15 мл воды, и реакционную смесь нагревают до 50 - 60°C. Затем прикапывают 3 г 3-метилфенилборной кислоты, растворенных в 20 мл этанола, и перемешивают 2 часа при 90°C. После фильтрации, удаления растворителя и обычной обработки получают N-диаминотилеилен-2-метил-(3-метил-фенил)-5-метилсульфонилбензамид, из которого после обработки с помощью разбавленного водного раствора HCl или метансульфокислоты и сушки вымораживанием получают соответствующий гидрохлорид или метансульфонат.

Аналогичным образом, исходя из N-диаминотилеилен-2-метил-4-бром-5-метилсульфонилбензамида, путем введения его во взаимодействие с 2,4-диметилфенилборной кислотой получают N-диаминотилеилен-2-метил-4-(2,4-диметилфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;

с 2,4-дихлорфенилборной кислотой получают N-диаминотилеилен-2-метил-4-(2,4-дихлорфенил)-5-метилсульфонилбензамид, т.пл. 209-211°C;

с 4-метоксифенилборной кислотой получают N-диаминотилеилен-2-метил-4-(4-метоксифенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;

с 4-фторфенилборной кислотой получают N-диаминотилеилен-2-метил-4-(4-фторфенил)-5-метилсульфонилбензамид с т. пл. 235-237°C; метансульфонат его имеет т.пл. 191-194°C;

с 3,5-бис-(трифторметилфенил)борной кислотой получают N-диаминотилеилен-2-метил-4-(3,5-бис-(трифторметилфенил))-5-метилсульфонилбензамид с т. пл. 190-194°C; его метансульфонат имеет т.пл. 150°C;

с 3-бромфенилборной кислотой получают N-диаминотилеилен-2-метил-4-(3-бромфенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;

с 2,4-диметоксифенилборной кислотой получают N-диаминотилеилен-2-метил-4-(2,4-диметоксифенил)-5-метилсульфонилбензамид-гидрохлорид;

с 3,5-дихлорфенилборной кислотой получают N-диаминотилеилен-2-метил-4-(3,5-дихлорфенил)-5-метилсульфонилбензамид с т. пл. 215-218°C; его метансульфонат имеет т.пл. 231-233°C.

Пример 4.

1,0 г 2-этил-3-метилсульфонил-4-фенилбензойной кислоты (получают путем взаимодействия метилового эфира 2-этил-3-метилсульфонил-4-бромбензойной кислоты с фенилборной кислотой в присутствии

тетраакис-(трифенилфосфин)-Pd(0) и последующего омыления) растворяют в 15 мл 1-метилпирролидона, смешивают с 0,67 г 1-метил-2-хлорпиридинийхлорида и перемешивают в течение 15 минут. После этого добавляют 0,9 г гуанидиний-хлорида, а также 2,6 мл диизопропилэтиламина и перемешивают в течение 1 часа при комнатной температуре. После обычной обработки получают

5 N-диаминотилеилен-2-этил-3-метилсульфонил-4-фенилбензамид.

10 Аналогичным образом, из 2-метил-3-метилсульфонил-4-(3-хлорфенил)бензойной кислоты получают N-диаминотилеилен-2-метил-3-метилсульфонил-4-(3-хлорфенил)-бензамид ;

15 из сложного эфира 2-нитро-3-метилсульфонил-4-(4-метоксифенил)-бензойной кислоты получают N-диаминотилеилен-2-нитро-3-метилсульфонил-4-(4-метоксифенил)-бензамид;

20 из 2-циан-3-метилсульфонил-4-фенилбензойной кислоты получают N-диаминотилеилен-2-циан-3-метилсульфонил-4-фенилбензамид;

25 из 2-этинил-3-метилсульфонил-4-(4-хлорфенил)-бензойной кислоты получают N-диаминотилеилен-2-этинил-3-метилсульфонил-4-(4-хлорфенил)-бензамид;

30 из 2-фтор-3-метилсульфонил-4-фенилбензойной кислоты получают N-диаминотилеилен-2-фтор-3-метилсульфонил-4-фенилбензамид;

35 из 2-дифторметил-3-метилсульфонил-4-фенилбензойной кислоты получают N-диаминотилеилен-2-дифторметил-3-метилсульфонил-4-фенилбензамид;

40 из 2-фторметил-3-метилсульфонил-4-(4-метилфенил)-бензойной кислоты получают N-диаминотилеилен-2-фторметил-3-метилсульфонил-4-(4-метилфенил)-бензамид;

Пример 5.

Аналогично примеру 4, путем взаимодействия 1,0 г 2-этил-3-аминотилеилен-4-фенилбензойной кислоты (получают путем взаимодействия метилового эфира 2-этил-3-аминотилеилен-4-бромбензойной кислоты с фенилборной кислотой в присутствии тетраакис-(трифенилфосфин)-Pd(0) и последующего омыления) с 0,9 г гуанидинийхлорида получают N-диаминотилеилен-2-этил-3-аминотилеилен-4-фенилбензамид.

55 Аналогичным образом, из метилового эфира 2-метил-3-аминотилеилен-4-(3-хлорфенил)-бензойной кислоты получают N-диаминотилеилен-2-метил-3-аминотилеилен-4-(3-хлорфенил)-бензамид;

60 из 2-нитро-3-аминотилеилен-4-(4-метоксифенил)-бензойной кислоты получают N-диаминотилеилен-2-нитро-3-аминотилеилен-4-(4-метоксифенил)-бензамид;

из 2-циан-3-аминотилеилен-4-фенилбензойной кислоты получают

N-диаминометилен-2-циан-3-аминосульфонил
-4- фенилбензамид;
из

2-этилнл-3-аминосульфонил-4-(4-хлорфенил)-
бензойной кислоты получают
N-диаминотилнл-2-этилнл-3-аминосульфон
ил-4-(4-хлорфенил)- бензамид;

2-фтор-3-аминсульфонил-4-фенилбензойной кислоты получают

из

2-диформетил-3-аминсульфонил-4-фенилбензойной кислоты получают N-диаминометилен-2-диформетил-3-аминсульфонил-4-фенилбензамид;

2-форметил-3-аминосультфонил-4-(4-метилфенил)бензойной кислоты получают N-диаминометилен-2-форметил-3-аминосультфонил-4-(4-метилфенил)-бензамид.

Пример 6.

Аналогично примеру 1, путем взаимодействия 1,8 г метилового эфира 2-метил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфонил-бензойной кислоты (получают путем взаимодействия метилового эфира 3-аминосульфонил-4-бром-6-метилбензойной кислоты с толилборной кислотой) с 1,5 г гуанидина в метаноле получают N-диаминометилен-2-метил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфонил-бензамид.

Аналогичным образом, путем взаимодействия гуанидина с метиловым эфиром

2-этил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфони́лбензойной кислоты получают N-диаминометилен-2-этил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфони́л бензамид:

с амминосulьфонилбензойной, метиловым эфиром 2-пропил-4-(4-метилфенил)-5-аминосulьфонилбензойной кислоты получают N-диаминометилен-2-пропил-4-(4-метилфенил)-5-аминосulьфонилб-
ензамид;

с метиловым эфиром
2-изопропил-4-(4-метилфенил)-5-
аминосulьфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2-изопропил-4-
(4-метилфенил)-5-аминосulьфонилбензамид:

с метиловым эфиром
2-бутил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфонил
бензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2-бутил-4-(4-метилфенил)
-5- аминосульфонилбензамид:

с метиловым эфиром 2-(2-бутил)-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфони́лбензойной кислоты получают N-диаминометилен-2-(2-бутил)-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфони́лбензамид:

с метиловым эфиром
2-этил-4-фенил-5-аминосульфонилбензойной
кислоты получают
N-диаминометилен-2-этил-4-фенил-5-
аминосульфонилбензамид:

с метиловым эфиром
2-пропил-4-фенил-5-аминосульфилбензой-
ой кислоты получают
N-диаминометилден-2-пропил-4-фенил-5-
аминосульфилбензамид;

с метиловым эфиром
2-изопропил-4-фенил-5-аминосульфилбенз

ойной кислоты получают N-диаминометил-2-изопропил-4-фенил-5-аминосульфонибензамид:

с метиловым эфиром
2-бутил-4-фенил-5-аминосульфонибензойно
й кислоты получают
N-диаминометилен-2-бутил-4-фенил-5-аминос
ульфонибензамид:

с метиловым эфиром
2-(2-бутил)-4-фенил-5-аминосульфонибензо
йной кислоты получают
N-диаминометилбен-2-(2-бутил)-4-фенил-5-
аминосульфонибензамид:

с метиловым эфиром
2-этил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфони-
лбензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2-этил-4-(4-метилфенил)-
5-аминосульфониламинамида:

с метиловым эфиром
2-хлор-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфилб
ензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2-хлор-4-(4-метилфенил)-
5-аминосульфилбензамид:

с метиловым эфиром
2-бром-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфилб
ензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2-бром-4-(4-метилфенил)-
5- аминосульфилбензамид:

с метиловым эфиром
2-фторметил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульф
онилбензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2- фторметил-4-
(4-метилфенил) -5-аминосульфонилбензамид:

с метиловым эфиром 2-трифторметил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфонибензойной кислоты получают N-диаминометилен-2-трифторметил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфонибензамида:

с метиловым эфиром 2-пентафторэтил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфонибензойной кислоты получают N-диаминометилен-2-пентафторэтил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфонибензамид;

с метиловым эфиром
2-метокси-4-(4-метилфенил)-5-
аминосульфонилбензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2-метокси-
4-(4-метилфенил)-5-аминосульфонилбензами
д;

с метиловым эфиром
2-циан-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфонилб
ензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2-циан-4-(4-метилфенил)-
5-аминосульфонилбензамид;

с метиловым эфиром
2-нитро-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфил
бензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2-нитро-4-(4-метилфенил)-
-5- аминосульфилбензамид;

с метиловым эфиром
2-этинил-4-(4-метилфенил)-5-аминосульфони
лбензойной кислоты получают
N-диаминометилен-2-этинил-4-(4-метилфенил)-
5-аминосульфонилбензамид.

Пример 7.

Аналогично примеру 1, путем взаимодействия гуанидина с метиловым эфиром 2-трифторметил-5-фенилбензойной кислоты получают

N-диаминометилден-2-трифторметил-5-фенил бензамид, т.пл. 195°C (гидрохлорид):

с метиловым эфиром 2-бром-5-фенилбензойной кислоты получают

N-диаминометил-2-бром-5-фенилбензамид, т.пл. 204°C (гидрохлорид);
с этиловым эфиром
2-метил-5-фенилбензойной кислоты получают N-диаминометил-2-метил-5-фенилбензамид, т.пл. 184°C (гидрохлорид);
с метиловым эфиром
2-метил-5-(4-метилфенил)-бензойной кислоты получают N-диаминометил-2-метил-5-(4-метилфенил)-бензамид, т.пл. 168°C (гидрохлорид).

Нижеследующие примеры относятся к фармацевтическим композициям:

Пример А. Стекланные пузырьки с препаратом для инъекции

В растворе из 100 г биологически активного вещества формулы (I) и 5 г динатрийгидрофосфата в 3 л дважды перегнанной (бидистиллированной) воды с помощью 2 Н соляной кислоты устанавливают рН 6,5, раствор стерильно фильтруют, заполняют им стекланные пузырьки для препарата для инъекции, в стерильных условиях лиофилизируют и стерильно закрывают. Каждый стекланный пузырек с препаратом для инъекции содержит 5 мг биологически активного вещества.

Пример Б. Свечи

Расплавляют смесь из 20 г биологически активного вещества формулы (I) со 100 г соевого лецитина и 1400 г масла какао, выливают в формы и оставляют охлаждаться. Каждая свеча содержит 20 мг биологически активного вещества.

Пример В. Раствор

Готовят раствор из 1 г биологически активного вещества формулы (I), 9,38 г $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 28,48 г $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ и 0,1 г бензалконийхлорида в 940 мл дважды перегнанной воды. Устанавливают рН 6,8, доливают до 1 л и стерилизуют путем облучения. Этот раствор можно применять, например, в форме глазных капель.

Пример Г. Мазь

500 мг биологически активного вещества формулы (I) смешивают с 99,5 г вазелина в асептических условиях.

Пример Д. Таблетки

Смесь из 1 кг биологически активного вещества формулы (I), 4 кг лактозы, 1,2 кг картофельного крахмала, 0,2 кг талька и 0,1 кг стеарата магния обычным образом прессуют в таблетки, таким образом, что каждая таблетка содержит 10 мг биологически активного вещества.

Пример Е. Драже

Аналогично примеру Д прессуют таблетки, на которые затем обычным образом наносят покрытие из сахарозы, картофельного крахмала, талька, траганта и красителя.

Пример Ж. Капсулы


2 кг биологически активного вещества формулы (I) обычным образом вносят в капсулы из твердой желатины так, что каждая капсула содержит 20 мг биологически активного вещества.

Пример З. Ампулы

Раствор из 1 кг биологически активного вещества формулы (I) в 60 л дважды перегнанной воды стерильно фильтруют, заполняют им ампулы, лиофилизируют в стерильных условиях и стерильно закрывают (запаивают). Каждая ампула содержит 10 мг биологически активного вещества.

Формула изобретения:

1. Арилбензоилгуанидины I



где R^1 - обозначает A, CF_3 , Гал;

R^2 и R^3 каждый независимо друг от друга обозначает H, Гал, A, $\text{SO}_n\text{-R}^6$, $\text{SO}_2\text{NR}^4\text{R}^5$, Ph;

R^4 обозначает H, A, CF_3 , Ph;

R^5 обозначает H или A;

R^6 обозначает A;

A обозначает алкил с 1 - 6 C-атомами;

Ph обозначает незамещенный или одно-, двух- или трехкратно замещенный с помощью A, F, Cl, Br, I или CF_3 фенил,

n обозначает 1 или 2, Гал обозначает фтор, хлор, бром или иод и их физиологически приемлемые соли.

2. Арилбензоилгуанидины по п.1, представляющие собой

(а)

N-диаминометил-2-метил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;

(б)

N-диаминометил-2-этил-4-(4-метилфенил)-5-метилсульфонилбензамид;

(в)

N-диаминометил-2-метил-3-метилсульфонил-4-(2-метилфенил)-бензамид;


(г)

N-диаминометил-2-этил-3-метилсульфонил-4-фенилбензамид.

3. Арилбензоилгуанидины по пп.1 и 2 в качестве ингибитора клеточного Na^+/H^+ -антиносителя.

4. Способ получения

арилбензоилгуанидинов формулы I по п.1, а также их солей, отличающийся тем, что соединение формулы II



где R^1 , R^2 , R^3 и Ph имеют вышеуказанные значения;

Q обозначает Cl, Br, OA, O-CO-A, O-CO-Ph, OH или другую реакционноспособную, этерифицированную до сложноэфирной OH-группу, соответственно легко нуклеофильно замещаемую удаляемую группу,

вводят во взаимодействие с гуанидином и, в случае необходимости, полученное основание формулы I путем обработки кислотой превращают в одну из его солей.

5. Фармацевтическая композиция, обладающая свойством ингибитора клеточного Na^+/H^+ -антиносителя, содержащая биологически активное вещество, носитель и вспомогательное вещество, отличающаяся тем, что в качестве биологически активного вещества она содержит по меньшей мере одно соединение общей формулы I по п.1 и/или одну из его

физиологически приемлемых солей в эффективном количестве.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

RU 2153490 C2

RU 2153490 C2

Таблица

Пример	$T_{пл}$ [°C]	R^2	R^1	Ph	IC_{50} [нМ] ¹
2	205	5-SO ₂ Me	Me	4-(4-Me-Ph)	25
7	195	H	CF ₃	4-Ph	19
7	204	H	Br	4-Ph	12
7	184	H	Me	4-Ph	11
3	191-194	5-SO ₂ Me	Me	4-(4-F-Ph)	32

$R^3 = H$

¹⁾ 50 % ингибирования Na⁺/H⁺-антипорта (Na⁺-поглощения)

RU 2 1 5 3 4 9 0 C 2

RU 2 1 5 3 4 9 0 C 2