(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103690858 B
(45)授权公告日 2016.06.22

(21)申请号 201310670115.7

(22)申请日 2013.12.09

(73)专利权人 朱育盼
地址 315137 浙江省宁波市鄞州区云龙镇丽云路10号

(72)发明人 华洪萍

(51)Int.Cl.
A61K 36/9062(2006.01)
A61P 1/16(2006.01)

(56)对比文件
CN 102526502 A,2012.07.04,
CN 103005248 A,2013.04.03,

审查员 田丽丽

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗胆管良性狭窄的中药

(57)摘要

本发明涉及一种治疗胆管良性狭窄的中药，由以下重量配比的药材制备而成：女金丹14份、淫羊藿10份、抓地虎10份、制马钱子14份、金丝带16份、余甘子12份、柏树12份、黄刺皮8份、星星草13份、下果藤15份、果上叶12份、廉姜14份、扇子七15份、羊奶子15份、岩筋菜12份、大乌爪金10份、窃衣8份。临床实验证明，本发明能够安全有效治疗胆管良性狭窄。

CN 103690858 B

1.一种治疗胆管良性狭窄的中药，其特征在于，由以下重量配比的药材制备而成：女金丹14份、淫羊藿10份、抓地虎10份、制马钱子14份、金丝带16份、余甘子12份、柏树12份、黄刺皮8份、星星草13份、下果藤15份、果上叶12份、廉姜14份、扇子七15份、羊奶子15份、岩筋菜12份、大乌爪金10份、窃衣8份。

一种治疗胆管良性狭窄的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药，具体涉及一种治疗胆管良性狭窄的中药。

背景技术

[0002] 胆管良性狭窄是指胆管损伤和复发性胆管炎所致的胆管腔瘢痕性缩窄。可由医源性损伤、腹部外伤和胆管结石、感染引起。胆管因反复炎症、胆盐刺激，导致纤维组织增生、管壁变厚、胆管腔缩窄，进而出现胆道梗阻感染的病理和临床表现。

[0003] 对于胆管良性狭窄目前尚缺少公认安全有效的治疗药物。

[0004] 本发明中药所涉及药材的研究现状如下：

[0005] 女金丹【来源】豆科胡枝子属植物绿叶胡枝子 Lespedeza buergeri Miq.，以根、叶入药。全年可采，切片晒干。【功能主治】解表祛湿，止痛，止血。用于感冒咳嗽，头痛，小儿痰哮，胃痛，黄疸，心绞痛，腰痛，子宫出血，乳癌初起，风湿性关节炎，疔疮，毒蛇咬伤。

[0006] 淫羊藿【来源】为小檗科植物淫羊藿、箭叶淫羊藿、巫山淫羊藿 [1] 和柔毛淫羊藿等的干燥地上部分。【功能主治】阳痿遗精；虚冷不育；尿频失禁；肾虚喘咳；腰膝酸软；风湿痹痛；半身不遂；四肢不仁。

[0007] 抓地虎【来源】蕨类阴地蕨科植物抓地虎 Botrychium strictum Und.，以全草入药。【功能主治】清热解毒。治毒蛇咬伤。

[0008] 制马钱子【来源】马钱科植物云南马钱的干燥成熟种子。主要成分是士的宁。【功能主治】治伤寒热病，咽喉痹痛，消痞块，散血热，消肿毒。治痈疽，恶疮。

[0009] 金丝带【来源】地衣类松萝科树发属植物绿树发 Alectoria virens Tayl.，以叶状体入药。四季可采，去杂质，晒干。【功能主治】祛风活络，补肾壮阳，调经止血。用于腰腿疼痛，半身不遂，肾虚腰痛，阳痿，头晕，月经不调，白带；外用治创伤出血。

[0010] 余甘子【来源】本品系藏族习用药材，为大戟科植物余甘子 Phyllanthus emblica L. 的干燥成熟果实。冬季至次春果实成熟时采收，除去杂质，干燥。【功能与主治】清热凉血，消食健胃，生津止咳。用于血热血瘀，肝胆病，消化不良，腹痛，咳嗽，喉痛，口干。

[0011] 柏树【来源】柏科柏属植物柏木 Cupressus funebris Endl.，以种子、叶和树脂等入药。种子于球果秋季未裂开前采摘；树脂在夏秋采收；叶四季可采。【功能主治】子：祛风清热，安神，止血。用于发热烦躁，小儿高热，吐血。叶：止血生肌。外用治外伤出血。树脂：解发热，燥湿，镇痛。用于发热头痛，白带；外用治外伤出血。

[0012] 黄刺皮【来源】为小檗科植物直穗小檗的茎皮。【功用主治】清热燥湿，泻火解毒。治热痢便血，湿热黄疸，下肢肿痛，潮热盗汗，风火目痛，口糜，舌疮，乳腺炎及痈疮初起。

[0013] 星星草【来源】禾本科画眉草属植物大画眉草的全草，其花序亦可药用。全草夏秋采收，花序在花期采，洗净切段，晒干。【功能主治】全草：疏风清热，利尿。用于膀胱结石，肾结石，肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，结膜炎，角膜炎。花序：解毒，止痒。用于黄水疮。

[0014] 下果藤【来源】为鼠李科嘴签属植物大苞嘴签 Gouania leptostachya DC.var. tonkinensis Pitard.，以茎、叶入药。全年可采。【功能主治】凉血解毒，舒筋活络。用于肢

体麻木；外用治烧烫伤，疮疡。

[0015] 果上叶【来源】兰科石豆兰属植物极香石豆兰 Bulbophyllum odoratissimum(Swartz)Lindl.，以全草入药。四季可采，洗净，鲜用或晒干。【功能主治】润肺化痰，舒筋活络，消炎。用于肺结核咯血，慢性气管炎，慢性咽炎，风湿筋骨疼痛；外用治骨折，跌打挫伤，刀伤。

[0016] 廉姜【来源】为姜科植物华良姜的根茎。【功用主治】温胃散寒，消食止痛。治胃痛胀闷，晴膈吐逆，腹痛泄泻，风湿关节冷疼。

[0017] 扇子七【来源】兰科杓兰属植物扇脉杓兰 Cypripedium japonicum Thunb.，以根状茎和带根全草入药。四季可采，洗净晒干或用米泔水漂后，晒干，用酒炒后用。【功能主治】活血调经，祛风镇痛，截疟。用于月经不调，跌打损伤疼痛，间日疟；外用治皮肤搔痒。

[0018] 羊奶子【来源】胡颓子科胡颓子属植物多花胡颓子 Elaeagnus multiflora Thunb.，以根、叶、果入药。春采叶，夏采果，秋挖根，晒干。【功能主治】平喘，活血，止痢。用于哮喘，痢疾，跌打损伤，痔疮。

[0019] 岩筋菜【来源】岩梅科岩筋菜属植物岩筋菜 Berneuxia thibetica Decne.【Shortia thibetica(Decne.)Frachn.】，以全草入药。夏秋采收，晒干。【功能主治】散寒，平喘。用于风寒感冒，咳嗽，哮喘，跌打损伤。

[0020] 大乌爪金【来源】葡萄科岩爬藤属植物大五爪金龙 Tetrastigma lenticellatum C.Y.Wu，以根和茎入药。全年可采，分别切片晒干。【功能主治】祛风，活血，消肿。风湿关节疼痛，口腔炎，鼻炎；外用治跌打损伤，骨折。

[0021] 窃衣【来源】伞形科窃衣属植物窃衣 Torilis japonica(Houtt.)DC.，以果实入药。秋季果实成熟时采集，去杂质。【功能主治】活血消肿，收敛杀虫。用于慢性腹泻，蛔虫病；外用治痈疮溃疡久不收口，阴道滴虫。

发明内容

[0022] 本发明旨在提供一种治疗胆管良性狭窄的中药，通过选择合适的药材及其配比，达到安全有效治愈胆管良性狭窄的目的。

[0023] 为了达到上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0024] 一种治疗胆管良性狭窄的中药，其特征在于，由以下重量配比的药材制备而成：女金丹 14 份、淫羊藿 10 份、抓地虎 10 份、制马钱子 14 份、金丝带 16 份、余甘子 12 份、柏树 12 份、黄刺皮 8 份、星星草 13 份、下果藤 15 份、果上叶 12 份、廉姜 14 份、扇子七 15 份、羊奶子 15 份、岩筋菜 12 份、大乌爪金 10 份、窃衣 8 份。

[0025] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果：

[0026] 1、一般资料

[0027] 发明人 2008 年 6 月 -2011 年 10 月间共收集 96 例胆管良性狭窄的门诊患者，年龄 22-59 岁，病程 1-7 年。随机分为：治疗组 66 例，空白组 30 例。两组年龄、病情等资料无显著性差异，具有可比性。

[0028] 2、试验方法

[0029] 2.1 治疗组口服本发明按照具体实施例 1 制得的胶囊，早晚各一次。疗程 20 天。

[0030] 2.2 空白组口服安慰剂胶囊，早晚各一次。疗程 20 天。

[0031] 3、疗效标准与治疗结果

[0032] 3.1 疗效标准

[0033] 痊愈：临床症状全部消失，试验室检查正常。好转：临床症状减轻，病情得到控制，实验室检查改善或正常。无效：临床症状无明显好转或加重。

[0034] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0035] 表 1 两组疗效比较

[0036]

组别	n	痊愈	好转	无效	不良反应例	总有效率（%）
治疗组	66	13(19.7%)	37(56.1%)	16(24.2%)	0	75.8%
空白组	30	0	9(30%)	21(70%)	0	30%

[0037] 可见，本发明制得的药物能够安全有效治胆管良性狭窄。

具体实施方式

[0038] 为了更好地理解和实施本发明，下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0039] 具体实施例 1

[0040] 称取：女金丹 14 克、淫羊藿 10 克、抓地虎 10 克、制马钱子 14 克、金丝带 16 克、余甘子 12 克、柏树 12 克、黄刺皮 8 克、星星草 13 克、下果藤 15 克、果上叶 12 克、廉姜 14 克、扇子七 15 克、羊奶子 15 克、岩筋菜 12 克、大乌爪金 10 克、窃衣 8 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，装入胶囊壳，即得符合正常成人 1 天用量的胶囊剂。

[0041] 用于治疗胆管良性狭窄。口服，每日分早晚两次服用。

[0042] 具体实施例 2

[0043] 称取：女金丹 14 克、淫羊藿 10 克、抓地虎 10 克、制马钱子 14 克、金丝带 16 克、余甘子 12 克、柏树 12 克、黄刺皮 8 克、星星草 13 克、下果藤 15 克、果上叶 12 克、廉姜 14 克、扇子七 15 克、羊奶子 15 克、岩筋菜 12 克、大乌爪金 10 克、窃衣 8 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，粉碎，即得符合正常成人 1 天用量的散剂。

[0044] 用于治疗胆管良性狭窄。口服，每日分早晚两次服用。

[0045] 具体实施例 3

[0046] 称取：女金丹 14 克、淫羊藿 10 克、抓地虎 10 克、制马钱子 14 克、金丝带 16 克、余甘子 12 克、柏树 12 克、黄刺皮 8 克、星星草 13 克、下果藤 15 克、果上叶 12 克、廉姜 14 克、扇子七 15 克、羊奶子 15 克、岩筋菜 12 克、大乌爪金 10 克、窃衣 8 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，再加入适量糊精和矫味剂，按照本领域常规工艺制粒，包装，即可制得符合正常成人 1 天用量的颗粒剂。

[0047] 用于治疗胆管良性狭窄。口服，每日分早晚两次服用。