

República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

(21) **PI0708912-0 A2**

(22) Data de Depósito: 14/03/2007
(43) Data da Publicação: 14/06/2011
(RPI 2110)



(51) *Int.Cl.:*
G01N 33/569 2006.01

(54) Título: **MÉTODOS PARA DETECÇÃO DE UMA
INFECÇÃO POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS**

(30) Prioridade Unionista: 14/03/2006 US 60/782,364

(73) Titular(es): Oregon Health And Science University, The
Government Of The United States Of America D.B.A The Department
Of Veterans Affairs

(72) Inventor(es): David Lewinsohn, Deborah Lewinsohn

(74) Procurador(es): Dannemann ,Siemens, Bigler &
Ipanema Moreira

(86) Pedido Internacional: PCT US2007006534 de 14/03/2007

(87) Publicação Internacional: WO 2007/106560 de 20/09/2007

(57) Resumo: MÉTODOS PARA DETECÇÃO DE UMA INFECÇÃO POR MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. A presente invenção refere-se a métodos para detecção de uma infecção com Mycobacterium tuberculosis (Mtb) em um indivíduo que são descritos. Os métodos incluem detecção da presença de células TCD8+ que especificamente reconhecem polipeptídio de Mtb. Os métodos incluem ensaios in vivo para detecção da presença de células T CD8+ em uma amostra biológica, e ensaios in vivo que detectam uma reação de hipersensibilidade do tipo retardado. Os métodos podem também incluir detecção de polipeptídios e polinucleotídeos de Mtb. Reagentes para detecção de uma infecção por Mtb são também descritos.

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "**MÉTODOS PARA DETECÇÃO DE UMA INFECÇÃO POR *MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS***".

REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE

5 O presente pedido reivindica o benefício do Pedido Provisório U.S. Nº 60/782.364 depositado em 14 de março de 2006, que é aqui incorporado a título de referência.

DECLARAÇÃO DE APOIO DO GOVERNO

10 A presente invenção foi feita com o apoio do governo dos Estados Unidos sob a Concessão Nº NIH-R01-AI48090 e Concessão Nº NIH NIAID HHSN266200400081 N01-AI-40081 do *National Institutes of Health*; o governo dos Estados Unidos tem certos direitos na invenção. A presente invenção foi também feita com apoio do *Department of Veterans Affairs*.

CAMPO

15 O presente pedido refere-se ao campo de diagnóstico, especificamente a métodos para detecção de uma infecção com *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) em um indivíduo.

ANTECEDENTES

20 Micobactérias são um gênero de organismos bacterianos intracelulares aeróbicos que, quando da infecção de um hospedeiro, sobrevivem dentro de compartimentos endossomais de monócitos e macrófagos. Doenças micobacterianas humanas incluem tuberculose (causada por *M. tuberculosis*), lepra (causada por *M. leprae*), úlceras de *Bairnsdale* (causadas por *M. ulcerans*) e várias infecções causadas por *M. marinum*, *M. kansasii*, *M. scrofulaceum*, *M. szulgai*, *M. xenopi*, *M. fortuitum*, *M. chelonae*, *M. haemophilum* e *M. intracellulare* (vide Wolinsky, E., capítulo 37 em *Microbiology: Including Immunology and Molecular Genetics*, 3ª Ed., Harper & Row, Filadélfia, 1980).

30 Um terço da população do mundo carrega *M. tuberculosis* e está sob risco de desenvolver tuberculose (TB). Em pacientes imunocomprometidos, tuberculose está aumentando em uma taxa quase logarítmica, e cepas resistentes a multifármaco estão aparecendo. Ainda, cepas micobacterianas

que foram previamente consideradas ser cepas não-patogênicas (por exemplo, *M. avium*) se tornaram agora matadoras principais de pacientes com AIDS imunocomprometidos. Além disso, vacinas Micobacterianas atuais são ou inadequadas (tal como a vacina BCG para *M. tuberculosis*) ou não-disponíveis (tal como para *M. leprae*) (Kaufmann, S., *Microbiol.*, 4:324-328, 1987; U.S. Congress, Office of Technology Assessment, *The Continuing Challenge of Tuberculosis*, PP. 62-67, OTA-H-574, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1993).

Inibição do espalhamento de tuberculose requer vacinação eficaz e diagnóstico precoce, eficaz, da doença. Atualmente, vacinação com bactérias vivas é o método mais eficiente para indução de imunidade protetora. A Micobactéria mais comum empregada para este propósito é *Bacillus Calmette-Guerin* (BCG), uma cepa avirulenta de *Mycobacterium bovis*. No entanto, a segurança e eficácia de BCG são uma fonte de controvérsia e alguns países, tal como os Estados Unidos, que não vacinam o público geral.

Diagnóstico de tuberculose é geralmente obtido usando um teste de pele; que envolve exposição transdermal à tuberculina PPD (derivado purificado de proteína) de tuberculina. Respostas de célula T específicas de antígeno resultam em endurecimento mensurável no sítio de injeção por 48 a 72 horas após injeção, o que indica exposição a antígenos Micobacterianos. No entanto, a sensibilidade e a especificidade deste teste não são ideais; indivíduos vacinados com BCG não podem ser distinguidos de indivíduos infectados. Deste modo, há uma necessidade na técnica de métodos de diagnóstico aperfeiçoados para detecção de tuberculose.

SUMÁRIO

Métodos para diagnóstico de uma infecção com *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) são descritos aqui. Os métodos podem incluir detecção de células T CD8⁺ e/ou CD4⁺ que se ligam especificamente a um polipeptídeo de Mtb de interesse. Os métodos podem também incluir detecção de uma reação de hipersensibilidade do tipo retardada em um indivíduo e/ou podem incluir detecção de polipeptídeos e polinucleotídeos de Mtb específicos. Os

ensaios descritos podem ser usados individualmente ou em combinação. A infecção com *Mycobacterium tuberculosis* pode ser uma infecção latente ou ativa.

Em várias modalidades, são providos métodos para detecção de *Mycobacterium tuberculosis* em um indivíduo. Esses métodos incluem contato de uma amostra biológica do indivíduo compreendendo células T, tal como células T CD8⁺ e/ou células T CD4⁺, com um ou mais polipeptídeos de *Mycobacterium*, ou uma célula apresentando antígeno apresentando o um ou mais polipeptídeos de *Mycobacterium*. O um ou mais polipeptídeos de *Mycobacterium* incluem uma seqüência de aminoácido mostrada como (a) uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:11 ou SEQ ID NO:12; ou (b) pelo menos nove a vinte aminoácidos consecutivos de pelo menos uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:11 ou SEQ ID NO:12, onde os nove a vinte aminoácidos consecutivos especificamente se ligam a complexo de histocompatibilidade principal (MHC) classe I. É determinado se as células T reconhecem especificamente o polipeptídeo de *Mycobacterium*.

Em modalidades adicionais, são providos métodos para detecção de *Mycobacterium tuberculosis* em um indivíduo, onde os métodos incluem administração ao indivíduo de uma quantidade eficaz de um polipeptídeo de *Mycobacterium* à pele, subcutaneamente ou intradermalmente. O polipeptídeo de *Mycobacterium* inclui uma seqüência de aminoácido mostrada como (a) uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:11 ou SEQ ID NO:12; ou (b) pelo menos nove a vinte aminoácidos consecutivos de pelo menos uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID

NO:5, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:11 ou SEQ ID NO:12, onde os nove a vinte aminoácidos consecutivos especificamente se ligam a complexo de histocompatibilidade principal (MHC) classe I. A presença de células T que especificamente reconhecem o polipeptídeo de *Mycobacterium* é detectada no indivíduo.

Em modalidades adicionais, são descritos métodos para detecção de uma infecção com *Mycobacterium tuberculosis* em um indivíduo, onde os métodos incluem detecção da presença de um polipeptídeo ou um polinucleotídeo de *Mycobacterium* codificando o polipeptídeo em uma amostra do indivíduo. O polipeptídeo de *Mycobacterium* inclui uma sequência de aminoácido mostrada como uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:11 ou SEQ ID NO:12.

Adicionalmente, reagentes para a detecção de uma infecção com *Mycobacterium* em um indivíduo são descritos.

O acima e outras características e vantagens se tornarão mais aparentes a partir da descrição detalhada que segue de várias modalidades, que acontece com referência às figuras acompanhantes.

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS

A Figura 1 são dois gráficos mostrando a determinação de freqüências de célula efetora humana *ex vivo* usando o ensaio ELISPOT IFN- γ . Células T CD8⁺ purificadas com conta magnética foram cultivadas com DC (20.000/cavidade) ou infectada com Mtb (H37Rv, MOT=50) ou pulsada com "pool" de peptídeo representando CFP10 (5 μ g/ml cada peptídeo; 15-mers sobreposição 11a) em um ensaio ELISPOT IFN- γ . Cada população de célula T respondedora foi testada em duplicata em quatro concentrações de célula diferentes. Para determinar a freqüência de célula efetora de células T específicas de antígeno, o número médio de manchas por cavidade para cada duplicata foi posto em gráfico contra o número de células respondedoras por cavidade. Análise de regressão linear foi usada para determinar a inclinação

da linha, que representa a freqüência de células T específicas de antígeno. O ensaio seria considerado positivo (refletindo a presença de uma resposta de célula T iniciada), se a probabilidade binominal para o número de manchas fosse significativamente diferente através de ensaios experimentais e controle.

A Figura 2 é um conjunto de gráficos mostrando freqüências de célula T CD8⁺ *ex vivo* para antígenos de Mtb que estão associados com infecção com Mtb. Conforme acima descrito (vide Figura), para determinar freqüências de célula T CD8⁺ *ex vivo*, DC autóloga ou infectada com Mtb ou pulsada com grupos de peptídeo cognato foi incubada com células T CD8⁺ em um ensaio ELISPOT IFN- γ . Indivíduos sem evidência de infecção com Mtb, aqueles com LTBI, e aqueles com TB ativa (cultura confirmou tuberculose pulmonar) foram avaliados. "Infectados com Mtb" inclui aqueles com LTBI e tuberculose ativa. Valores P são registrados onde $P = <0,05$ (Wilcoxon/Kruskal-Wallis).

As Figuras 3a a 3d são um conjunto de imagens digitais mostrando a definição de Especificidade Antigênica e Restrição de HLA (a caracterização de clone de célula T D466 D6). Para os resultados mostrados nas Figuras 3a-3c, para identificar o antígeno e epítipo mínimo reconhecidos pelo clone de célula T, D466 D6, células T (5000 células/cavidade) foram incubadas com LCL autólogo (20.000/cavidade) e 5 μ g/ml de antígeno. IFN- γ foi avaliado através de ELISPOT após dezoito horas de co-cultura. Para os resultados apresentados na Figura 3a, antígenos consistiam em "pool" de peptídeo representando antígenos de CD4⁺ conhecidos, feitos de peptídeos de até 15 aminoácidos (aa) se sobrepondo em 11 aa. Para os resultados apresentados na Figura 3b, antígenos consistiam em peptídeos CFP10 de 15 aa individuais que juntos constituíam o "pool" de peptídeo. Para os resultados apresentados na Figura 3c, antígenos consistiam em peptídeos CFP10₁₋₁₅ aninhados individuais (10 aa, 9 aa ou 8 aa), usados para mapear mais o epítipo. Para os resultados apresentados na Figura 3d, o alelo de restrição foi identificado usando LCL (20.000/cavidade) expressando alelos HLA igualando D466 em um ou dois alelos, pulsada com CFP10₂₋₁₀ (5 μ g/ml)

como APC. Após 2 horas, células foram lavadas e incubadas com células T (500 células/cavidade) em um ensaio ELISPOT IFN- γ .

A Figura 4 é um gráfico em linha mostrando a confirmação de mapeamento de epítipo mínimo de D466 D6. Para confirmar o epítipo mínimo, LCL autóloga (20.000/cavidade) foi pulsada com peptídeo na concentração indicada e co-culturada com células T (1000 células/cavidade). IFN- γ foi avaliado através de ELISPOT após dezoito horas de co-cultura. Cada ponto representa a média de determinações em duplicata.

A Figura 5 é um conjunto de gráficos em barra mostrando o perfil de padrão de imunodominância para CFP10. Para determinar as frequências de célula efetora, DC autólogas (20.000/cavidade) foram pulsadas ou com cada peptídeo de 15-mer individual (5 μ g/ml), o "pool" de peptídeo (PP; 5 μ g/cada peptídeo) ou o epítipo mínimo (ME) determinado de clones de célula T derivados de cada doador (D466:CFP102-11; D480:CFP103-11; D481:CFP1075-83; 5 μ g/ml) e testadas contra 250.000 células T CD8⁺ purificadas com conta magnética. Liberação de IFN- γ foi avaliada através de ELISPOT após dezoito horas de co-cultura. Cada ponto representa a média de determinações em duplicata.

A Figura 6 é um grupo de gráficos resumindo os dados de mapeamento de epítipo mínimo. Para determinar o epítipo mínimo, LCL autóloga (20.000/cavidade) foi pulsada com peptídeo na concentração indicada e co-cultura com células T (1000 células/cavidade). IFN- γ foi avaliado através de ELISPOT após dezoito horas de co-cultura. Cada ponto representa a média de determinações em duplicata.

A Figura 7 é um gráfico em linha mostrando o mapeamento de Epítipo Mínimo para Clones D504. Para determinar o epítipo mínimo, LCL autóloga (20.000/cavidade) foi co-culturada com clones de célula T (1.000 células/cavidade) e o peptídeo na concentração indicada. IFN- γ foi avaliado através de ELISPOT após dezoito horas de co-cultura. Cada ponto representa a média de determinações em duplicata.

LISTAGEM DE SEQUÊNCIA

As seqüências de ácido nucléico e aminoácido listadas na lista-

gem de seqüência acompanhante são mostradas usando abreviações de letra padrão para bases de nucleotídeo, e código de três letras para aminoácidos, conforme definido em 37 C.F.R. 1.822. Apenas um filamento de cada seqüência de ácido nucléico é mostrado, mas o filamento complementar é compreendido como incluído por qualquer referência ao filamento mostrado. Na listagem de seqüência acompanhante:

SEQ ID NOs: 1-12 são a seqüência de aminoácido de polipeptídeos de Mtb.

SEQ ID NOs: 13-14 são aminoácidos de peptídeos de Mtb.

SEQ ID NOs: 15-25 são as seqüências de ácido nucléico de polinucleotídeos codificando os polipeptídeos de Mtb.

SEQ ID NOs: 26-38 são as seqüências de aminoácido de epítopos de Mtb específicos.

DESCRIÇÃO DETALHADA

Métodos para detecção de uma infecção com *Mycobacterium tuberculosis* em um indivíduo são descritos. Os métodos incluem detecção da presença de células T, tal como, mas não limitado a, células T CD8⁺, que reconhecem especificamente um polipeptídeo de *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb). Os métodos incluem ensaios *in vitro* para detecção da presença de células T CD8⁺ em uma amostra biológica, e ensaios *in vivo* que detectam uma reação de hipersensibilidade do tipo retardada. Os métodos podem também incluir detecção de polipeptídeos e polinucleotídeos de Mtb. Reagentes para a detecção de uma infecção com Mtb são também descritos.

Termos

A menos que de outro modo mencionado, termos técnicos são usados aqui de acordo com uso convencional. Definições de termos comuns em biologia molecular podem ser encontrados em Benjamin Lewin, *Genes V*, publicado pela Oxford University Press, 1994 (ISBN 0-19-854287-9); Kendrew e outros (Eds.), *The Encyclopedia of Molecular Biology*, publicada pela Blackwell Science, Ltd., 1994 (ISBN 0-632-02182-9); e Robert A. Meyers (ed.), *Molecular Biology and Biotechnology: a Comprehensive Desk Reference*, publicado por VCH Publishers, Inc., 1995 (ISBN 1-56081-569-8).

A fim de facilitar revisão das várias modalidades da presente descrição, as explicações que seguem de termos específicos são providas:

Adjuvante: Um veículo usado para aumentar antigenicidade. Adjuvantes incluem uma suspensão de minerais (alume, hidróxido de alumínio ou fosfato) onde antígeno é absorvido; ou emulsão água-em-óleo onde solução de antígeno é emulsificada em óleo mineral (adjuvante incompleto de Freund), algumas vezes com a inclusão de micobactérias mortas (adjuvante completo de Freund) para aumentar mais a antigenicidade (inibe degradação de antígeno e/ou causa influxo de macrófago). Oligonucleotídeos imunoestimuladores (tal como aqueles incluindo um motivo CpG) podem ser também usados como adjuvantes (por exemplo, vide Patente U.S. Nº 6.194.388; Patente U.S. Nº 6.207.646; Patente U.S. 6.214.806; Patente U.S. Nº 6.218.371; Patente U.S. Nº 6.239.116; Patente U.S. Nº 6.339.068; Patente U.S. Nº 6.406.705; e Patente U.S. Nº 6.429.199). Adjuvantes incluem moléculas biológicas (um "adjuvante biológico"), tal como moléculas co-estimuladoras. Adjuvantes exemplares incluem IL-2, RANTES, GM-CSF, TNF- α , IFN- γ , G-CSF, LFA-3, CD72, B7-1, B7-2, OX-40L e 41 BBL.

Amplificação: De uma molécula de ácido nucléico (por exemplo, uma molécula de DNA ou RNA) refere-se ao uso de uma técnica que aumenta o número de cópias de uma molécula de ácido nucléico em um espécime. Um exemplo de amplificação é a reação em cadeia de polimerase, onde uma amostra biológica coletada de um indivíduo é contatada com um par de *iniciadores* de oligonucleotídeo, sob condições que permitem a hibridização dos *iniciadores* em um molde de ácido nucléico na amostra. Os *iniciadores* são estendidos sob condições adequadas, dissociados do molde e então reanelados, estendidos e dissociados para amplificar o número de cópias do ácido nucléico. O produto de amplificação pode ser caracterizado por eletroforese, padrões de clivagem de endonuclease de restrição, hibridização ou ligação de oligonucleotídeo; e/ou sequenciamento de ácido nucléico usando técnicas padrão. Outros exemplos de amplificação incluem amplificação por deslocamento de filamento, conforme descrito na Patente U.S. Nº 5.744.311; amplificação isotérmica livre de transcrição, conforme descrito na

Patente U.S. Nº 6.033.881; amplificação por reação em cadeia de reparo, conforme descrito no WO 90/01069; amplificação por reação em cadeia da ligase, conforme descrito na EP-A-320 308; amplificação por reação em cadeia da ligase de preenchimento de lacuna, conforme descrito na Patente U.S. Nº 5.427.930; e amplificação livre de transcrição de RNA NASBA®, conforme descrito na Patente U.S. Nº 6.025.134.

Antígeno: Um composto, composição ou substância que pode estimular a produção de anticorpos ou uma resposta de célula T em um animal, incluindo composições que são injetadas ou absorvidas no animal.

10 Um antígeno reage com os produtos de imunidade humoral ou celular específica, incluindo aqueles induzidos por imunógenos heterólogos. O termo "antígeno" inclui todos os epítopos antigênicos relacionados. "Epítopo" ou "determinante antigênico" refere-se a um sítio no antígeno ao qual células B e/ou T respondem. Em uma modalidade, células T respondem ao epítopo,

15 quando o epítopo está presente em conjunto com uma molécula de MHC. Epítopos podem ser formados ambos de aminoácidos contíguos ou aminoácidos não-contíguos justapostos pela estrutura terciária de uma proteína. Epítopos formados de aminoácidos contíguos são tipicamente retidos na exposição a solventes desnaturantes enquanto epítopos formados por do-

20 bramento terciário são tipicamente perdidos em tratamento com solventes desnaturantes. Um epítopo tipicamente inclui pelo menos 3, e, mais comumente, pelo menos 5, cerca de 9 ou cerca de 8-10 aminoácidos em uma conformação espacial única. Métodos de determinação de conformação espacial de epítopos incluem, por exemplo, cristalografia de raio X e ressonância

25 magnética nuclear 2-dimensional.

Um antígeno pode ser um antígeno específico de tecido, ou um antígeno específico de doença. Esses termos não são exclusivos, um antígeno específico de tecido pode ser um antígeno específico de doença. Um antígeno específico de tecido é expresso em um número limitado de tecidos,

30 tal como um tecido único. Um antígeno específico de tecido pode ser expresso por mais de um tecido, tal como, mas não limitado a, um antígeno que é expresso em mais de um tecido reprodutivo, tal como em tecido de

ambos próstata e útero. Um antígeno específico de doença é expresso coincidentemente com um processo de doença. Exemplos não-limitantes específicos de um antígeno específico de doença são um antígeno cuja expressão se relaciona com, ou é previsiva de, tuberculose. Um antígeno específico de

5 doença pode ser um antígeno reconhecido por células T ou células B.

Anticorpo: Moléculas de imunoglobulina e porções imunologicamente ativas de moléculas de imunoglobulina, isto é, moléculas que contêm um sítio de ligação de antígeno que especificamente liga (imunorreage com) um antígeno, tal como polipeptídeo de Mtb.

10 Um anticorpo de ocorrência natural (por exemplo, IgG, IgM, IgD) inclui quatro cadeias de polipeptídeo, duas cadeias pesadas (H) e duas cadeias leves (L) interconectadas por ligações dissulfeto. No entanto, foi mostrado que a função de ligação de antígeno de um anticorpo pode ser realizada por fragmentos de um anticorpo de ocorrência natural. Então, esses

15 fragmentos de ligação de antígeno pretendem ser também designados pelo termo "anticorpo". Exemplos não-limitantes, específicos, de fragmentos de ligação compreendidos dentro do termo anticorpo incluem (i) um fragmento Fab consistindo nos domínios V_L , V_H , C_L e C_H ; (ii) um fragmento F_d consistindo nos domínios V_H e C_H ; (iii) um fragmento F_v consistindo nos domínios V_L e V_H de um braço único de um anticorpo, (iv) um fragmento dAb (Ward e outros, *Nature* 341:544-546, 1989) que consiste em um domínio V_H ; (v) uma região de determinação de complementaridade isolada (CDR); e (vi) um

20 fragmento $F(ab')_2$, um fragmento bivalente compreendendo dois fragmentos Fab ligados por uma ponte dissulfeto na região de dobradiça.

25 Imunoglobulinas e certas variantes delas são conhecidas e podem ter sido preparadas em cultura de célula recombinante (por exemplo, vide Patente U.S. Nº 4.745.055; Patente U.S. Nº 4.444.487; WO 88/03565; EP 256.654; EP 120.694; EP 125.023; Faoukner e outros, *Nature* 298:286, 1982; Morrison, *J. Immunol.* 123:793, 1979; Morrison e outros, *Ann. Rev.*

30 *Immunol.* 2:239, 1984).

Animal: Organismos vertebrados multicelulares vivos, uma categoria que inclui, por exemplo, mamíferos e aves. O termo mamífero inclui

ambos mamíferos humanos em não-humanos. Similarmente, o termo "indivíduo" inclui ambos indivíduos humanos e veterinários.

Anticorpo: Moléculas de imunoglobulina e porções imunologicamente ativas de moléculas de imunoglobulina, isto é, moléculas que contêm
5 um sítio de ligação de antígeno que especificamente liga (imunorreage com) um antígeno.

Um anticorpo de ocorrência natural (por exemplo, IgG, IgM, IgD) inclui quatro cadeias de polipeptídeo, duas cadeias pesadas (H) e duas cadeias leves (L) interconectadas por ligações dissulfeto. No entanto, foi mos-
10 trado que a função de ligação de antígeno de um anticorpo pode ser realizada por fragmentos de um anticorpo de ocorrência natural. Então, esses fragmentos de ligação de antígeno pretendem ser também designados pelo termo "anticorpo". Exemplos não-limitantes, específicos, de fragmentos de ligação compreendidos dentro do termo anticorpo incluem (i) um fragmento
15 Fab consistindo nos domínios V_L , V_H , C_L e C_H ; (ii) um fragmento F_d consistindo nos domínios V_H e C_H ; (iii) um fragmento F_v consistindo nos domínios V_L e V_H de um braço único de um anticorpo, (iv) um fragmento dAb (Ward e outros, *Nature* 341:544-546, 1989) que consiste em um domínio V_H ; (v) uma região de determinação de complementaridade isolada (CDR); e (vi) um
20 fragmento $F(ab')_2$, um fragmento bivalente compreendendo dois fragmentos Fab ligados por uma ponte dissulfeto na região de dobradiça.

Imunoglobulinas e certas variantes delas são conhecidas e podem ter sido preparadas em cultura de célula recombinante (por exemplo, vide Patente U.S. Nº 4.745.055; Patente U.S. Nº 4.444.487; WO 88/03565;
25 EP 256.654; EP 120.694; EP 125.023; Faoukner e outros, *Nature* 298:286, 1982; Morrison, *J. Immunol.* 123:793, 1979; Morrison e outros, *Ann. Rev. Immunol.* 2:239, 1984).

Célula apresentando antígeno (APC): Uma célula que pode apresentar um antígeno para célula T, de modo que as células T são ativa-
30 das. Células dendríticas são as células apresentando antígeno principais (APCs) envolvidas em respostas imunes primárias. A sua principal função é obter antígeno em tecidos, migrar para órgãos linfóides e apresentar o anti-

geno a fim de ativar células T.

Quando um sinal de maturação apropriado é recebido, células dendríticas são sinalizadas para sofrer mudanças morfológicas e fisiológicas rápidas que facilitam o início e desenvolvimento de respostas imunes. Dentre essas estão a supra-regulagem de moléculas envolvidas em apresentação de antígeno; produção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo IL-12, chave para a geração de respostas Th1; e secreção de quimiocinas que ajudam a dirigir diferenciação, expansão e migração de células Th puras circundantes. Coletivamente, essas moléculas supra-reguladas facilitam a habilidade de células dendríticas em coordenar a ativação e função efetora de outros linfócitos circundantes que por fim provêm proteção para o hospedeiro.

cDNA (DNA complementar): Um pedaço de DNA sem segmentos de não-codificação, internos, (introns) e seqüências reguladoras que determinam transcrição. cDNA é sintetizado no laboratório através de transcrição reversa de RNA mensageiro extraído de células.

CD4: Grupo de fator de diferenciação 4, uma proteína de superfície de célula T que faz a mediação da interação com a molécula do MHC Classe II. CD4 também serve como um sítio receptor primário para HIV em células T durante infecção com HIV. Células que expressam CD4 são frequentemente células T auxiliares.

CD8: Grupos de fator de diferenciação 8, uma proteína de superfície de célula T que faz a mediação da interação com a molécula do MHC Classe II. Células que expressam CD8 são frequentemente células T citotóxicas. "Imunidade mediada por célula T CD8⁺" é uma resposta imune implementada pela apresentação de antígenos a células T CD8⁺.

cDNA (DNA complementar): Um pedaço de DNA sem segmentos de não-codificação, internos, (introns) e seqüências reguladoras que determinam transcrição. cDNA é sintetizado no laboratório através de transcrição reversa de RNA mensageiro extraído de células.

Variantes conservativas: Substituições de aminoácido "conservativas" são aquelas substituições que não afetam substancialmente ou dimi-

nuem uma atividade ou antigenicidade do polipeptídeo de *Mycobacterium*. Exemplos não-limitantes, específicos, de uma substituição conservativa incluem os exemplos que seguem:

Resíduo Original	Substituições Conservativas
Ala	Ser
Arg	Lys
Asn	Gln, His
Asp	Glu
Cys	Ser
Gln	Asn
Glu	Asp
His	Asn; Gln
Ile	Leu, Val
Leu	Ile; Val
Lys	Arg; Gln; Glu
Met	Leu; Ile
Phe	Met; Leu; Tyr
Ser	Thr
Thr	Ser
Trp	Tyr
Tyr	Trp; Phe
Val	Ile; Leu

- O termo variação conservativa também inclui o uso de um aminoácido substituído no lugar de um aminoácido de origem não-substituído, contanto que anticorpos criados para o polipeptídeo substancial também imunorreajam com o polipeptídeo não-substituído, ou que uma resposta imune possa ser gerada contra o polipeptídeo substituído que é similar à resposta imune contra o polipeptídeo não-substituído, tal como um antígeno de *Mycobacterium*. Então, em uma modalidade, substituições não-conservativas são aquelas que reduzem uma atividade ou antigenicidade.

Consiste essencialmente em/Consiste em: Com relação a um polipeptídeo, um polipeptídeo que consiste essencialmente em uma seqüên-

cia de aminoácido especificada se ele não incluir quaisquer resíduos de aminoácidos adicionais. No entanto, o polipeptídeo pode incluir componentes de não-peptídeo adicionais, tal como marcadores (por exemplo, marcadores fluorescentes, radioativos ou em partícula sólida), açúcares ou lipídeos. Um

5 polipeptídeo que consiste em uma seqüência de aminoácido especificada não inclui quaisquer resíduos de aminoácido adicionais, nem inclui componentes de não-peptídeo adicionais, tal como lipídeos, açúcares ou marcadores.

Contato: O processo de incubação de um agente na presença

10 de outro. Então, quando uma célula é contatada com um agente, a célula é incubada com o agente por um período de tempo suficiente para o agente e a célula interagirem.

Molécula co-estimuladora: Embora envolvimento do TCR com peptídeo-MHC libere um sinal para a célula T, este sinal sozinho pode ser

15 insuficiente para ativar a célula T. Moléculas co-estimuladoras são moléculas que, quando ligadas a seu ligante, aplicam um segundo sinal requerido para a célula T se tornar ativada. A molécula co-estimuladora mais bem-conhecida na célula T é CD28, que se liga a ou B7-1 (também chamada CD80) ou B7-2 (também conhecida como CD86). Uma molécula co-

20 estimuladora adicional é B7-3. Moléculas acessório que também provêm um segundo sinal para a ativação de células T incluem molécula de adesão intracelular (ICAM-1 e ICAM-2), antígeno associado a funcionamento de leucócito (LFA-1, LFA-2 e LFA-3). Integrinas e membros da superfamília de fator de necrose de tumor (TNF) podem também servir como moléculas co-

25 estimuladoras.

Citocina: Proteínas feitas pelas células que afetam o comportamento de outras células, tal como linfócitos. Em uma modalidade, uma citocina é uma quimiocina, uma molécula que afeta tráfego celular. Exemplos não-limitantes, específicos, de citocinas incluem as interleucinas (IL-2, IL-4,

30 IL-6, IL-10, IL-21, etc) e interferon (IFN)- γ .

Variante de degeneração: Um polinucleotídeo codificando um epítipo de um polipeptídeo de Mtb que inclui uma seqüência que é degene-

rada como um resultado do código genético. Existem 20 aminoácidos naturais, a maioria dos quais é especificada por mais de um códon. Então, todas as seqüências de nucleotídeo de degeneração estão incluídas nesta descrição contanto que a seqüência de aminoácido do polipeptídeo de Mtb codificada pela seqüência de nucleotídeo seja não-modificada.

Célula dendrítica (DC): Células dendríticas são as principais células apresentando antígeno (APCs) envolvidas em respostas imunes primárias. Células dendríticas incluem células dendríticas plasmocitóides e células dendríticas mielóides. Sua função principal é obter antígeno em tecidos, migrar para órgãos linfóides e apresentar o antígeno a fim de ativar células T. Células dendríticas imaturas se originam na medula óssea e residem na periferia como células imaturas.

Diagnóstico: Identificação da presença ou natureza de uma condição patológica, tal como, mas não limitado a, tuberculose. Métodos de diagnóstico diferem em sua sensibilidade e especificidade. A "sensibilidade" de um ensaio de diagnóstico é a porcentagem de indivíduos doentes que testam positivo (porcentagem de verdadeiros positivos). A "especificidade" de um ensaio de diagnóstico é 1 menos a taxa de falso positivo, onde a taxa de falso positivo é definida como a proporção daqueles sem a doença que testaram positivo. Embora um método de diagnóstico particular possa não prover um diagnóstico definido de uma condição, é suficiente se o método prover uma indicação positiva que auxilie em diagnóstico. "Prognóstico" significa previsão da probabilidade de desenvolvimento (por exemplo, severidade) de uma condição patológica, tal como tuberculose.

Mostra: O processo de localização de um complexo peptídeo:antígeno, ou um peptídeo, na superfície externa de uma célula onde o complexo peptídeo:antígeno ou peptídeo é acessível a uma segunda célula, moléculas mostradas por uma segunda célula, ou fatores solúveis. Um peptídeo, ou um complexo de peptídeo:antígeno, é "mostrado" por uma célula quando ele está presente na superfície externa da célula e é acessível a uma segunda célula, a moléculas mostradas pela segunda célula, ou a fatores solúveis.

Epítopo: Um determinante antigênico. Esses são grupos químicos ou seqüências de peptídeo particulares em uma molécula que são anti-gênicos, isto é, que elicitam uma resposta imune específica. Um anticorpo se liga especificamente a um epítopo antigênico particular em um polipeptídeo, tal como um polipeptídeo de *Mycobacterium*.

Seqüências de Controle de Expressão: Seqüências de ácido nucléico que regulam a expressão de uma seqüência de ácido nucléico heteróloga à qual elas estão operativamente ligadas. Seqüências de controle de expressão são operativamente ligadas a uma seqüência de ácido nucléico quando as seqüências de controle de expressão controlam e regulam a transcrição e, conforme apropriado, tradução da seqüência de ácido nucléico. Então seqüências de controle de expressão podem incluir promotores, aumentadores, terminadores de transcrição, um códon de início (isto é, ATG) em frente de um gene de codificação de proteína, sinal de união para introns, manutenção da estrutura de leitura correta daquele gene para permitir tradução apropriada de mRNA e códons de parada apropriados. O termo "seqüências de controle" pretende incluir, no mínimo, componentes cuja presença pode influenciar expressão, e pode também incluir componentes adicionais cuja presença é vantajosa, por exemplo, seqüências líder e seqüências de contraparte de fusão. Seqüências de controle de expressão podem incluir um promotor.

Um promotor é uma seqüência mínima suficiente para direcionar transcrição. Também incluídos estão aqueles elementos promotores que são suficientes para fazer expressão de gene dependente de promotor controlável para específico de tipo de célula, específico de tecido ou induzível por sinais ou agentes externos; tais elementos podem estar localizados na região 5' ou 3' do gene. Ambos promotores constitutivos e induzíveis estão incluídos (vide, por exemplo, Bitter e outros, *Methods in Enzymology* 153:516-544, 1987). Por exemplo, quando clonando em sistemas bacterianos, promotores induzíveis tal como pL de bacteriófago lambda, plac, ptrp, ptac (promotor híbrido ptrp-lac) e similar podem ser usados. Em uma modalidade, quando clonando em sistemas de célula de mamífero, promotores derivados do

genoma de células de mamífero (por exemplo, promotor de metalotioneína) ou de vírus de mamífero (por exemplo, repetição terminal longa de retrovírus; o promotor tardio de adenovírus; o promotor do vírus vaccínia 7,5K) podem ser usados. Promotores produzidos através de técnicas de DNA re-

5 combinante ou sintéticas podem ser também usados para prover transcrição das seqüências de ácido nucléico. Em uma modalidade, o promotor é um promotor de citomegalovírus.

Fracionamento: Submissão de uma amostra a condições ou procedimentos que separam os componentes da amostra com base em propri-

10 edades físicas ou químicas, mas não limitado a, tamanho, carga, solubilidade ou composição. Exemplos de procedimento de fracionamento incluem, mas não estão limitados a, precipitação seletiva, extração orgânica, diálise de exclusão de tamanho ou cromatografia, tal como cromatografia de troca de íon. Em uma modalidade, uma fração é um extrato solúvel ou um extrato

15 orgânico de um organismo, tal como uma *Mycobacterium*.

Funcionalmente Equivalente: Alterações de seqüência, tal como em um epítipo de um antígeno, que dão os mesmos resultados conforme aqui descrito. Tais alterações de seqüências podem incluir, mas não estão

limitadas a, substituições conservativas, deleções, mutações, *frameshifts* e

20 inserções.

Heterólogo: Originando de fontes ou espécies genéticas separadas. Um polipeptídeo que é heterólogo a um polipeptídeo de Mtb se origina de um ácido nucléico que não codifica o polipeptídeo de Mtb. Em um exemplo não-limitante, específico, um polipeptídeo compreendendo nove aminoá-

25 cidos consecutivos de um polipeptídeo de Mtb, ou no máximo 20 aminoácidos consecutivos do polipeptídeo de Mtb, e uma seqüência de aminoácido heteróloga inclui uma β -galactosidase, uma proteína de ligação de maltose e albumina, antígeno de superfície B de hepatite ou uma seqüência de aminoácido de imunoglobulina. Em geral, um anticorpo que especificamente se

30 liga a uma proteína de interesse não vai especificamente se ligar a uma proteína heteróloga.

Células hospedeiras: Células onde um vetor pode ser propagado

e seu DNA expresso. A célula pode ser procariótica ou eucariótica. A célula pode ser mamífero, tal como uma célula humana. O termo também inclui qualquer progênie da célula hospedeira objeto. É compreendido que toda a progênie pode não ser idêntica à célula de origem uma vez que pode haver

5 mutações que acontecem durante replicação. No entanto, tal progênie está incluída quando o termo "célula hospedeira" é usado.

Antígeno de Leucócito Humano (HLA): Uma designação genética do complexo de histocompatibilidade principal humano (MHC). Locais individuais são designados por letras maiúsculas, como em HLA-E, e alelos

10 são designados pelos números, como em HLA-A*0201. Os três genes do MHC classe I principais são chamados HLA-A, HLA-B e HLA-C. No entanto, existem muitos genes que codificam moléculas de superfície de célula associadas com microglobulina $\beta 2$ que estão ligados aos genes do MHC classe I. A expressão desses genes é variável, ambos na distribuição de tecido e na

15 quantidade expressa em células; esses genes foram chamados genes do MHC classe IB.

Resposta imune: Uma resposta de uma célula do sistema imune, tal como uma célula B, célula assassina natural, ou uma célula T, a um estímulo. Em uma modalidade, a resposta é específica para um antígeno particular (uma "resposta específica de antígeno"). Em uma modalidade, uma

20 resposta imune é uma resposta de célula T, tal como uma resposta Th1; Th2 ou Th3. Em outra modalidade, uma resposta imune é uma resposta de uma célula T supressora.

Peptídeo imunogênico: Um peptídeo que compreende um motivo específico de alelo ou outra seqüência de modo que o peptídeo vai ligar uma molécula do MHC e induzir uma resposta de célula T, tal como uma resposta de célula T CD8⁺, ou uma resposta de célula B (tal como produção de anti-

25 corpo) contra o antígeno do qual o peptídeo imunogênico é derivado.

Em uma modalidade, peptídeos imunogênicos são identificados

30 usando motivos de seqüência ou outros métodos, tal como determinações de rede neural ou polinomial, conhecidos na técnica. Tipicamente, algoritmos são usados para determinar o "limiar de ligação" de peptídeos para selecio-

nar aqueles com *scores* que dão a eles uma alta probabilidade de ligação em uma certa afinidade e serão imunogênicos. Os algoritmos são baseados ou nos efeitos sobre ligação de MHC de um aminoácido particular em uma posição particular, nos efeitos sobre ligação de anticorpo de um aminoácido particular em uma posição particular, ou nos efeitos sobre ligação de uma substituição particular em um peptídeo contendo motivo. Dentro do contexto de um peptídeo imunogênico, um "resíduo conservado" é um que aparece em uma frequência significativamente maior do que seria esperado por distribuição aleatória em uma posição particular em um peptídeo. Em uma modalidade, um resíduo conservado é um onde a estrutura do MHC pode prover um ponto de contato com o peptídeo imunogênico.

Peptídeos imunogênicos podem ser também identificados medindo sua ligação a uma proteína do MHC específica e pela sua habilidade em estimular CD4 e/ou CD8 quando apresentados no contexto da proteína do MHC. Em um exemplo, um "peptídeo de Mtb" imunogênico é uma série de resíduos de aminoácido contíguos da proteína de Mtb geralmente entre 9 e 20 aminoácidos de comprimento, tal como cerca de 8 a 11 resíduos de comprimento. Polipeptídeos imunogênicos específicos são descritos aqui que são resíduos de 9 ou 10 aminoácidos de comprimento, ou no máximo 12 aminoácidos de comprimento.

Geralmente, polipeptídeos de Mtb imunogênicos podem ser usados para induzir uma resposta imune em um indivíduo, tal como uma resposta de célula B ou uma resposta de célula T. Em um exemplo, um polipeptídeo de Mtb imunogênico, quando ligado a uma molécula do Complexo de Histocompatibilidade Principal Classe I, ativa células T CD8⁺, tal como linfócitos T citotóxicos (CTLs) contra Mtb. Indução de CTL usando peptídeos sintéticos e ensaios citotóxicos de CTL conhecidos na técnica, vide patente U.S. 5.662.907, que é aqui incorporada a título de referência. Em um exemplo, um peptídeo imunogênico inclui um motivo específico de alelo ou outra sequência de modo que o peptídeo ligará uma molécula do MHC e induz uma resposta CD8⁺ contra o antígeno do qual o peptídeo imunogênico é derivado. Uma célula T CD8⁺ que reconhece especificamente um polipeptídeo

de Mtb é ativada, prolifera e/ou secreta citocinas em resposta àquele polipeptídeo específico, e não para outros, polipeptídeos não-relacionados.

Composição imunogênica: Uma composição compreendendo um polipeptídeo de Mtb imunogênico ou um ácido nucléico codificando o polipeptídeo de Mtb imunogênico que induz uma resposta T mensurável contra Mtb, tal como uma resposta de célula T CD8⁺, ou induz uma resposta de célula B mensurável (tal como produção de anticorpos que especificamente ligam um polipeptídeo de Mtb). Para uso *in vitro*, a composição imunogênica pode consistir no ácido nucléico isolado, vetor incluindo o ácido nucléico/ou polipeptídeo imunogênico. Para uso *in vivo*, a composição imunogênica vai tipicamente compreender o ácido nucléico, vetor incluindo o ácido nucléico e/ou polipeptídeo imunogênico, em veículos farmacologicamente aceitáveis e/ou outros agentes. Uma composição imunogênica pode opcionalmente incluir um adjuvante, uma molécula co-estimuladora ou um ácido nucléico codificando uma molécula co-estimuladora. Um polipeptídeo de Mtb, ou ácido nucléico codificando o polipeptídeo, pode ser prontamente testado quanto à sua habilidade em induzir uma resposta de célula T CD8⁺.

Inibição ou tratamento de uma doença: Inibição de uma doença, tal como tuberculose, refere-se à inibição do desenvolvimento integral de uma doença. Em vários exemplos, inibição de uma doença refere-se à diminuição dos sintomas de uma tuberculose. "Tratamento" refere-se a uma intervenção terapêutica que melhora um sinal ou sintoma de uma doença ou condição patológica relacionada com a doença, tal como tuberculose.

Interferon gama (γ): IFN- γ é uma proteína dimérica com subunidades de 146 aminoácidos. A proteína é glicosilada em dois sítios, e o pI é 8,3-8,5. IFN- γ é sintetizado como uma proteína precursora de 166 aminoácidos incluindo uma sequência de sinal secretora de 23 aminoácidos. Duas formas moleculares da proteína biologicamente ativa de 20 e 25 kDa foram descritas. Ambas são glicosiladas na posição 25. A forma de 25 kDa é também glicosilada na posição 97. As diferenças observadas de IFN- γ natural com relação à massa molecular e carga são devido a padrões de glicosilação variáveis. Formas de 40-60 kDa observadas sob condições de não-

desnaturação são dímeros e tetrâmeros de IFN- γ . O gene humano tem um comprimento de aproximadamente 6 kb. Ele contém quatro exons e mapeia para cromossomo 12q24.1.

IFN- γ pode ser detectado através de imunoensaios sensíveis, tal como um teste ELISA que permite detecção de células individuais produzindo IFN- γ . Quantidades pequenas de IFN- γ podem ser detectadas indiretamente através da medição de proteínas induzidas por IFN- γ tal como proteína Mx. A indução da síntese de IP-10 tem sido usada para medir concentrações de IFN- γ . Ainda, bioensaios podem ser usados para detectar IFN- γ , tal como um ensaio que emprega indução de atividade de indolamina 2,3-dioxigenase em células 2D9. A produção de IFN- γ pode ser usada para avaliar a ativação de célula T, tal como ativação de uma célula T por um antígeno de *Mycobacterium* apresentado em HLA-E.

Isolado: Um ácido nucléico "isolado" foi substancialmente separado ou purificado de outras seqüências de ácido nucléico na célula dos organismos onde o ácido nucléico acontece naturalmente, isto é, outros DNA e RNA cromossomais e extracromossomais. O termo "isolado" então compreende ácidos nucléicos purificados por métodos de purificação de ácido nucléico padrão. O termo também compreende ácidos nucléicos preparados através da expressão recombinante em uma célula hospedeira bem como ácidos nucléicos quimicamente sintetizados.

Marcador: Um composto ou composição detectável que é conjugado diretamente ou indiretamente a outra molécula para facilitar detecção daquela molécula. Exemplos não-limitantes, específicos, de marcadores incluem *tags* fluorescentes, ligações enzimáticas e isótopos radioativos.

Seqüência ligante: Uma seqüência ligante é uma seqüência de aminoácido que liga covalentemente dois domínios de polipeptídeo. Seqüências ligantes podem ser incluídas entre os epítomos de Mtb descritos aqui para prover liberdade rotacional aos domínios de polipeptídeo ligados e então promover dobra de domínio apropriada e apresentação ao MHC. A título de exemplo, em um polipeptídeo recombinante compreendendo dois domínios de Mtb, seqüências ligantes podem ser providas entre eles, tal co-

mo um polipeptídeo compreendendo polipeptídeo de Mtb-ligante-polipeptídeo de Mtb. Sequências ligantes, que são geralmente entre 2 e 25 aminoácidos de comprimento, são bem-conhecidas na técnica e incluem, mas não estão limitadas a, o espaçador glicina(4)-serina (GGGGSx3) descrito por Chaudhary e outros, *Nature* 339:394-397, 1989.

Linfócitos: Um tipo de célula sanguínea branca que está envolvida nas defesas imunes do corpo. Existem dois tipos principais de linfócitos: células B e células T.

Mamífero: Este termo inclui ambos mamíferos humanos e não-humanos. Similarmente, o termo "paciente" ou "indivíduo" inclui ambos indivíduos humanos e veterinários.

Micobactérias: Um gênero de organismos bacterianos intracelulares. Quando da invasão de um hospedeiro, esses organismos sobrevivem dentro de compartimentos endossomais dos monócitos e macrófagos. Doenças micobacterianas humanas incluem tuberculose (causada por *M. tuberculosis*), Leprose (causada por *M. leprae*), úlceras de Barinsdale (causadas por *M. ulcerans*) e outras infecções que podem ser causadas por *M. marinum*, *M. kansasii*, *M. scrofulaceum*, *M. szulgai*, *M. xenopi*, *M. fortuitum*, *M. haemophilum*, *M. chelonae* e *M. intracellulare*. Cepas de *Mycobacterium* que foram anteriormente consideradas ser não-patogênicas (tal como *M. avium*) são também agora conhecidas ser assassinas principais de pacientes com AIDS imunossuprimidos.

A resposta principal a micobactérias envolve reações de hipersensibilidade mediada por célula (DTH) com células T e macrófagos desempenhando papéis principais na morte intracelular e enclausuramento (ou contenção) do organismo (formação de granuloma). Uma resposta de célula T principal envolve linfócitos CD4⁺ que reconhecem proteínas de choque térmico micobacterianas e antígenos imunodominantes.

Operavelmente ligado: Uma primeira sequência de ácido nucléico está operavelmente ligada com uma segunda sequência de ácido nucléico quando a primeira sequência de ácido nucléico é posta em uma relação funcional com a segunda sequência de ácido nucléico. Por exemplo, um

promotor está operavelmente ligado a uma seqüência de codificação se o promotor realizar a transcrição ou expressão da seqüência de codificação. Em geral, seqüências de DNA operavelmente ligadas são contíguas e, onde necessário unir duas regiões de codificação de proteína, as estruturas de leitura aberta são alinhadas.

ORF (estrutura de leitura aberta): Uma série de tripletos de nucleotídeo (códon) codificando aminoácidos sem quaisquer códon de terminação. Essas seqüências são geralmente traduzíveis em um polipeptídeo.

Modificações de peptídeo: Polipeptídeos de *Mycobacterium* incluem modalidades sintéticas de peptídeos descritos aqui. Ainda, análogos (moléculas orgânicas de não-peptídeo), derivados (moléculas de peptídeo quimicamente funcionalizadas obtidas começando com as seqüências de peptídeo descritas) e variantes (homólogos) dessas proteínas podem ser utilizados nos métodos descritos aqui. Cada polipeptídeo da invenção é compreendido de uma seqüência de aminoácidos, que podem ser ou L- e/ou D-aminoácidos, de ocorrência natural ou outro.

Peptídeos podem ser modificados por uma variedade de técnicas químicas para produzir derivados tendo essencialmente a mesma atividade que os peptídeos não-modificados, e opcionalmente tendo outras propriedades desejáveis. Por exemplo, grupos de ácido carboxílico da proteína, sejam carboxila-terminais ou cadeia lateral, podem ser providos na forma de um sal de um cátions farmaceuticamente aceitável ou esterificados para formar um C₁-C₁₆ éster, ou convertidos em uma amida de fórmula NR₁R₂ onde R₁ e R₂ são cada um independentemente H ou C₁-C₁₆ alquila, ou combinados para formar um anel heterocíclico, tal como um anel de 5 ou 6 membros. Grupos amino do peptídeo, sejam amino terminais ou de cadeia lateral, podem estar na forma de um sal de adição farmaceuticamente aceitável, tal como os sais de HCl, HBr, acético, benzóico, toluenossulfônico, maléico, tartárico e outros orgânicos, ou podem ser modificados para uma C₁-C₁₆ alquila ou dialquil amino ou convertidos mais em uma amida.

Grupos hidroxila das cadeias laterais de peptídeo podem ser convertidos em C₁-C₁₆ alcóxi ou em um C₁-C₁₆ éster usando técnicas bem-

reconhecidas. Anéis fenila e fenólicos das cadeias laterais de peptídeo podem ser substituídos com um ou mais átomos de halogênio, tal como flúor, cloro, bromo ou iodo, ou com C₁-C₁₆ alquila, C₁-C₁₆ alcóxi, ácidos carboxílicos e seus ésteres, ou amidas de tais ácidos carboxílicos. Grupos metileno das cadeias laterais de peptídeo podem ser estendidos para C₂-C₄ alquilenos homólogos. Tióis podem ser protegidos com qualquer um de vários grupos de proteção bem-reconhecidos, tal como grupos acetamida. Aqueles versados na técnica vão também reconhecer métodos para introdução de estruturas cíclicas nos peptídeos da presente invenção para selecionar e prover restrições conformacionais à estrutura que resultam em estabilidade aumentada.

Modalidades peptidomiméticas e organomiméticas são previstas, com o que a disposição tridimensional dos constituintes químicos de tais peptido- e organomiméticos imita a disposição tridimensional da estrutura principal de peptídeo e cadeias laterais de aminoácido componente, resultando em tais peptido- e organomiméticos de um polipeptídeo de *Mycobacterium* tendo habilidade mensurável ou aumentada em gerar uma resposta imune. Para aplicações de modelagem por computador, um farmacóforo é uma definição tridimensional, idealizada, das necessidades estruturais para atividade biológica. Peptido- e organomiméticos podem ser projetados para ajustar cada farmacóforo com *software* de modelagem por computador atual (usando projeto de fármaco auxiliado por computador ou CADD). Vide Walters, "Computer-Assisted Modeling of Drugs", em Klegerman & Groves, Eds., 1993, *Pharmaceutical Biotechnology*, Interpharm Press: Buffalo Grove; IL, pp. 165-174 e *Principles of Pharmacology Muson* (ed.) 1995, Cap. 102, para descrições de técnicas usadas em CADD. Também incluídos estão miméticos preparados usando tais técnicas.

Agente farmacêutico ou fármaco: Um composto químico ou composição capaz de indução de um efeito terapêutico ou profilático desejado quando apropriadamente administrado a um indivíduo.

Veículos farmaceuticamente aceitáveis: Os veículos farmaceuticamente aceitáveis úteis com os polipeptídeos e ácidos nucléicos descritos

aqui são convencionais. *Remington's Pharmaceutical Sciences*, de E.W. Martin, Mack Publishing Co., Easton, PA, 15ª Edição (1975), descreve composições e formulações adequadas para aplicação farmacêutica das proteínas de fusão aqui descritas.

5 Em geral, a natureza do veículo vai depender do modo de administração particular sendo empregado. Por exemplo, formulações parenterais geralmente compreendem fluidos injetáveis que incluem fluidos farmacêuticamente e fisiologicamente aceitáveis tal como água, solução salina fisiológica, soluções salinas equilibradas, dextrose aquosa, glicerol ou similar como um veículo. Para composições sólidas (por exemplo, formas em pó, pílula, comprimido ou cápsula), veículos sólidos não-tóxicos convencionais podem incluir, por exemplo, graus farmacêuticos de manitol, lactose, amido ou estearato de magnésio. Em adição a veículos biologicamente neutros, composições farmacêuticas a serem administradas podem conter quantidades
10 pequenas de substâncias auxiliares não-tóxicas, tal como agentes umectantes ou emulsificantes, preservantes e agentes de tamponamento de pH e similar, por exemplo, acetato de sódio ou monolaurato sorbitano.

Polinucleotídeo: Uma seqüência de nucleotídeo linear incluindo seqüências de mais do que 100 bases de nucleotídeo de comprimento.

20 Polipeptídeo: Qualquer cadeia de aminoácidos, sem importar o comprimento ou modificação pós-traducional (por exemplo, glicosilação ou fosforilação). Um "peptídeo" é uma cadeia de aminoácidos que é menos do que 100 aminoácidos de comprimento. Em uma modalidade, um "peptídeo" é uma porção de um polipeptídeo, tal como cerca de 10, 20, 30, 40, 50 ou
25 100 aminoácidos contíguos de um polipeptídeo que é maior do que 100 aminoácidos de comprimento.

Porção de uma seqüência de ácido nucléico: Pelo menos 10, 20, 30 ou 40 nucleotídeos contíguos da seqüência relevante, tal como uma seqüência codificando um antígeno. Em alguns casos seria vantajoso usar
30 uma porção consistindo em 50 ou mais nucleotídeos. Por exemplo, quando descrevendo uma porção de um antígeno (tal como um epítipo antigênico), pode ser vantajoso remover uma porção da seqüência relevante compreen-

dendo pelo menos 10, 20, 30, 40 ou 50 nucleotídeos até um comprimento.

Sondas e iniciadores: Sondas e iniciadores de ácido nucléico podem ser prontamente preparados com base nos ácidos nucléicos providos pela presente invenção. Uma sonda compreende um ácido nucléico isolado
5 ligado a um marcador detectável ou molécula repórter. Marcadores típicos incluem isótopos radioativos, ligantes, agentes quimioluminescentes e enzimas. Métodos para marcação e orientação na escolha de marcadores apropriados para vários propósitos são discutidos, por exemplo, em Sambrook e outros (1989) e Ausubel e outros (1987).

10 Iniciadores são ácidos nucléicos curtos, de preferência oligonucleotídeos de DNA de 15 nucleotídeos ou mais de comprimento. Iniciadores podem ser anelados para um filamento de DNA alvo complementar através de hibridização de ácido nucléico para formar um híbrido entre o *iniciador* e um filamento de DNA alvo, e então estendido ao longo do filamento de DNA
15 alvo por uma enzima de polimerase de DNA. Pares de *iniciador* podem ser usados para amplificação de uma seqüência de ácido nucléico, por exemplo, através da reação em cadeia de polimerase (PCR) ou outros métodos de amplificação de ácido nucléico conhecidos na técnica.

Métodos para preparação e uso de sondas e *iniciadores* são
20 descritos, por exemplo, em *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*, 2ª ed., vol. 1-3, ed. Sambrook e outros, Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY, 1989, e *Current Protocols in Molecular Biology*, ed. Ausubel e outros, Greene Publishing and Wiley-Interscience, Nova York, 1987 (com atualizações periódicas). Pares de *iniciador* de PCR podem ser deriva-
25 dos de uma seqüência conhecida, por exemplo, usando programas de computador pretendidos para este propósito tal como Iniciador (Versão 0.5, © 1991, Whitehead Institute for Biomedical Research, Cambridge, MA).

Prevenção ou tratamento de uma doença: "Prevenção" de uma doença refere-se à inibição do desenvolvimento integral de uma doença, por
30 exemplo, em uma pessoa que sabe estar sob risco de infecção com *M. tuberculosis* ou *M. leprae*. Um exemplo de uma pessoa com uma predisposição conhecida é alguém vivendo com uma pessoa diagnosticada com tuber-

culose, profissionais de cuidado de saúde, ou alguém da família, ou que foi exposta a *M. tuberculosis*. "Tratamento" refere-se a uma intervenção terapêutica que melhora um sinal ou sintoma de uma doença ou condição patológica, tal como tuberculose, após ela ter começado a se desenvolver.

5 Promotor: Um promotor é uma disposição de seqüências de controle de ácido nucléico que direciona transcrição de um ácido nucléico. Um promotor inclui seqüências de ácido nucléico necessárias próximo do sítio de início de transcrição, no caso de um promotor tipo polimerase II, um elemento TATA. Um promotor também opcionalmente inclui elementos aumentadores
10 res ou repressores distais que podem estar localizados mais de milhares de pares de base do sítio de início de transcrição. O promotor pode ser um promotor constitutivo ou induzível. Um exemplo não-limitante, específico, de um promotor é o promotor HCMV IE.

Purificado: O termo purificado não requer pureza absoluta; pelo
15 contrário, ele é pretendido ser um termo relativo. Então, por exemplo, uma preparação de antígeno purificada é uma onde o antígeno é mais puro do que a proteína em seu ambiente original dentro de uma célula. Uma preparação de um antígeno é tipicamente purificada de modo que o antígeno representa pelo menos 50% do teor de proteína total da preparação. No entanto,
20 preparações mais altamente purificadas podem ser requeridas para certas aplicações. Por exemplo, para tais aplicações, preparações onde o antígeno compreende pelo menos 75% o pelo menos 90% do teor de proteína total podem ser empregadas.

Recombinante: Um ácido nucléico ou polipeptídeo recombinante
25 é um que tem uma seqüência que não é de ocorrência natural ou tem uma seqüência que é feita através de uma combinação artificial de dois ou mais segmentos de seqüência de outro modo separados. Esta combinação artificial é freqüentemente conseguida através de síntese química ou, mais geralmente, através da manipulação artificial de segmentos isolados de ácidos
30 nucléicos, por exemplo, através de técnicas de engenharia genética.

Identidade de seqüência: A similaridade entre seqüências de aminoácido é expressa em termos da similaridade entre as seqüências, de

outro modo referida como identidade de seqüência. Identidade de seqüência é freqüentemente medida em termos de identidade percentual (ou similaridade ou homologia); quanto maior a porcentagem, mais similares são as duas seqüências. Variantes de polipeptídeos de antígeno vão possuir um grau relativamente alto de identidade de seqüência quando alinhadas usando métodos padrão.

Métodos de alinhamento de seqüências para comparação são bem-conhecidos na técnica. Altschul e outros (1994) apresentam uma consideração detalhada de métodos de alinhamento de seqüência e cálculos de homologia. A *NCBI Basic Local Alignment Search Tool* (BLAST) (Altschul e outros, 1990) está disponível de várias fontes, incluindo o *National Center for Biotechnology Information* (NCBI, Bethesda, MD) e na internet, para uso em conexão com os programas de análise de seqüência *blastp*, *blastn*, *blastx*, *tblastn* e *tblastx*. Ele pode ser acessado no website da NCBI. Uma descrição de como determinar identidade de seqüência usando este programa está disponível no website da NCBI, como estão os parâmetros *default*.

Variantes de polipeptídeos antigênicos, tal como polipeptídeo de *Mycobacterium*, são tipicamente caracterizadas por possuírem pelo menos 50% de identidade de seqüência contada em todo o alinhamento de comprimento completo com a seqüência de aminoácido de uma seqüência de antígeno nativa usando o NCBI Blast 2.0, conjunto *gapped blastp* para parâmetros *default*. Proteínas com similaridade ainda maior com as seqüências de referência vão mostrar identidades de porcentagem altas quando avaliadas através deste método, tal como pelo menos 60%, pelo menos 65%, pelo menos 70%, pelo menos 75%, pelo menos 80%, pelo menos 90% ou pelo menos 95% de identidade de seqüência. Quando menos do que a seqüência inteira está sendo comparado quanto à identidade de seqüência, variantes vão tipicamente possuir pelo menos 75% de identidade de seqüência na janela curta de 10-20 aminoácidos, e podem possuir identidades de seqüência de pelo menos 85% ou pelo menos 90% ou 95% dependendo de sua similaridade com a seqüência de referência. Métodos para determinação de identidade de seqüência em tais janelas curtas são mostrados no *website* da

NCBI. Variantes de polipeptídeos de domínio do MHC também retêm a atividade biológica do polipeptídeo nativo. Para os propósitos da presente invenção, esta atividade é convenientemente avaliada através da incorporação do domínio variante no polipeptídeo $\beta 1\alpha 1$ ou $\alpha 1\alpha 2$ e determinação da habilidade do polipeptídeo resultante em inibir proliferação de célula T específica de antígeno *in vitro*, ou induzir células supressoras T ou a expressão de IL-10 conforme descrito em detalhes abaixo.

Polipeptídeo terapeuticamente ativo: Um agente, tal como um epítopo de Mtb que causa indução de uma resposta imune, conforme medido através de resposta clínica (por exemplo, aumento em uma população de células imunes, atividade citolítica aumentada contra Mtb ou redução mensurável de um sintoma de uma infecção). Moléculas terapeuticamente ativas podem ser também feitas de ácidos nucleicos. Exemplos de uma molécula terapeuticamente ativa baseada em ácido nucleico é uma seqüência de ácido nucleico que codifica um epítopo de Mtb, onde a seqüência de ácido nucleico está operavelmente ligada a um elemento de controle tal como um promotor.

Em uma modalidade, uma quantidade terapeuticamente eficaz de um polipeptídeo de Mtb é uma quantidade usada para gerar uma resposta imune. Em vários exemplos, "tratamento" refere-se a uma intervenção terapêutica que melhora um sinal ou sintoma de tuberculose.

Dose terapeuticamente eficaz: Uma dose suficiente para prevenir avanço ou causar regressão da doença ou que é capaz de aliviar sintomas causados pela doença. Em uma modalidade, uma dose terapeuticamente eficaz é uma dose suficiente para prevenir avanço ou aliviar sintomas de tuberculose.

Transduzido e Transformado: Um vírus ou vetor "transduz" uma célula quando ele transfere ácido nucleico para a célula. Uma célula é "transformada" por um ácido nucleico transduzido na célula quando o DNA se torna estavelmente replicada pela célula, ou através da incorporação de ácido nucleico no genoma celular, ou através de replicação episossomal. Conforme aqui usado, o termo transformação compreende todas as técnicas a-

través das quais uma molécula de ácido nucléico seria introduzida em tal célula, incluindo transfecção com vetores virais, transformação com vetores de plasmídeo e introdução de DNA nu através de eletroporação, lipofecção e aceleração de pistola de partícula.

- 5 Tuberculose (TB): Uma doença que é geralmente causada por *Mycobacterium tuberculosis* que geralmente infecta os pulmões. No entanto, outras micobactérias "atípicas" tal como *K. kansasii* podem produzir um aparecimento clínico e patológico similar de doença.

- Transmissão de *M. tuberculosis* acontece por via oral em áreas
- 10 fechadas com pouca ventilação. Em mais de 90% dos casos, seguindo infecção com *M. tuberculosis*, o sistema imune previne desenvolvimento de doença a partir de *M. tuberculosis*, freqüentemente chamada tuberculose ativa. No entanto, nem todos os *M. tuberculosis* são mortos, e então cápsulas duras, minúsculas, são formadas. "Tuberculose primária" é vista doença
- 15 que se desenvolve seguindo uma infecção inicial, geralmente em crianças. O foco inicial de infecção é um granuloma subpleural pequeno acompanhado por infecção do nó linfático hilar granulomatoso. Juntos, esses formam o complexo Ghon. Em quase todos os casos, esses granulomas se decompõem e não há nenhum espalhamento adicional da infecção. "Tuberculose
- 20 secundária" é vista principalmente em adultos como uma reativação de infecção anterior (ou reinfecção), particularmente quando o estado de saúde declina. A inflamação granulomatosa é muito mais de coloração vermelho-brilhante e espalhada. Tipicamente, os lóbulos do pulmão superior são mais afetados, e cavitação pode acontecer. Disseminação de tuberculose fora dos
- 25 pulmões pode levar ao aparecimento de várias constatações incomuns com padrões características que incluem tuberculose esquelética, tuberculose do trato genital, tuberculose do trato urinário, tuberculose do sistema nervoso central (SNC), tuberculose gastrointestinal, tuberculose adrenal, escrófula e tuberculose cardíaca. Tuberculose "latente" é uma infecção com Mtb em um
- 30 indivíduo que pode ser detectada através de um ensaio de diagnóstico, tal como, mas não limitado a, teste de pele de tuberculina (TST) onde a infecção não produz sintomas naquele indivíduo. Tuberculose "ativa" é uma in-

fecção com *Mtb* sintomática em um indivíduo.

Microscopicamente, a inflamação produzida com infecção com TB é granulomatosa, com macrófagos epitelióides e células gigantes Langhans junto com linfócitos, células de plasma, talvez algumas células polimorfonucleares, fibroblastos com colágeno e necrose caseosa característica no centro. A resposta inflamatória é mediada por uma reação de hipersensibilidade do tipo IV, e teste de pele é baseado nesta reação. Em alguns exemplos, tuberculose pode ser diagnosticada por um teste de pele, um tingimento rápido com ácido, um tingimento com auramina ou uma combinação deles. O espécime mais comum avaliado é esputo, mas os tingimentos histo-

lógicos podem ser também realizados em tecidos ou outros fluidos do corpo. TB é uma complicação freqüente da infecção com HIV. Infecção com TB em indivíduos infectados com um vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode ser espalhar prontamente e progredir rapidamente para doença ativa. Sintomas específicos de doença pulmonar devido à infecção com *Mtb* incluem tosse crônica e cuspir sangue. Outros sintomas da doença TB incluem fadiga, perda de apetite, perda de peso, febre e suores noturnos de encharcar.

Vetor: Uma molécula de ácido nucléico é introduzida em uma célula hospedeira, deste modo produzindo uma célula hospedeira transformada. Um vetor pode incluir seqüências de ácido nucléico que permitem que ele replique em uma célula hospedeira, tal como uma origem de replicação. Um vetor pode também incluir um ou mais genes marcadores selecionável e outros elementos genéticos conhecidos na técnica. Vetores incluem vetores de plasmídeo, incluindo plasmídeos para expressão em célula bacteriana gram negativa e gram positiva. Vetores exemplares incluem aqueles para expressão em *E. coli* e *Salmonella*. Vetores também incluem vetores virais tão como, mas não limitado a, vetores de retrovírus, ortopox, avipox, fowlpox, capripox, suipox, adenoviral, herpes vírus, alfa vírus, baculovírus, vírus Sindbis, vírus vaccínia e poliovírus. Vetores também incluem vetores para expressão em células de levedura.

A menos que de outro modo explicado, todos os termos técnicos

e científicos usados aqui têm o mesmo significado como geralmente compreendido por um versado na técnica à qual a presente descrição pertence. Os termos no singular "um", "uma" e "o, a" incluem referentes no plural a menos que o contexto claramente indique de outro modo. Similarmente, a

5 palavra "ou" pretende incluir "e" a menos que o contexto claramente indique de outro modo. Deve ser ainda compreendido que todos os tamanhos de base ou tamanhos de aminoácido, e todos valores de peso molecular ou massa molecular, dados para ácidos nucleicos ou polipeptídeos são aproximados, e são providos para descrição. Embora métodos e materiais similares

10 ou equivalentes àqueles descritos aqui possam ser usados na prática ou teste da presente descrição, métodos e materiais adequados são descritos abaixo. O termo "compreende" significa "inclui". Todas as publicações, pedidos de patente, patentes e outras referências mencionadas aqui são incorporados a título de referência em sua totalidade. No caso de conflito, o presente relatório, incluindo explicações de termos, vai prevalecer. Ainda, os

15 materiais, métodos e exemplos são ilustrativos apenas e não pretendem ser limitantes.

Polipeptídeos de *Mycobacterium*

É aqui descrito que vários polipeptídeos de *Mycobacterium* podem ser usados para induzir uma resposta imune a Mtb, tal como uma resposta de célula T. Os polipeptídeos de *Mycobacterium* podem ser usados em ensaios de diagnóstico para identificar indivíduos infectados com uma *Mycobacterium* tal como Mtb. Em várias modalidades, o polipeptídeo compreende ou consiste na seqüência de aminoácido mostrada como:

- 25 1. MX1SRFMTDPHAMRDMAGRFEVHAQTVEDEARRMWASAQNISGAGW
SGMAEATSLDTMX2X3MNQAFRNIVNMLHGVRDGLVRDANNYEQQEQ
ASQQILS, (SEQ ID NO:1, onde X₁ é A ou T, X₂ é T ou A e X₃ é qualquer aminoácido, tal como Q ou nenhum aminoácido

Em vários exemplos, o polipeptídeo compreende ou consiste nas

30 seqüências de aminoácido mostradas como:

- a. MASRFMTDPHAMRDMAGRFEVHAQTVEDEARRMWASAQNISGAGW
SGMAEATSLDTMTQMNQAFRNIVNMLHGVRDGLVRDANNYEQQEQAS

QQILS (SEQ ID NO: 2) (Vide também TUBERCULIST N° Rv1038c, conforme disponível em 1 de março de 2007, incorporado aqui a título de referência, conhecido como EsxJ, *ES6_2, TB11.0, QILSS*)

b. MASRFMTDPHAMRDMAGRFEVHAQTVEDEARRMWASAQNISGAG

5 WSGMAEATSLDTMAQMNQAFRNIVNMLHGVRDGLVRDANNYEQQEQ
ASQQILSS (SEQ ID NO: 3, TUBERCULIST N° Rv1197, conforme disponível em 1 de março de 2007, incorporado aqui a título de referência, conhecido como EsxK, *ES6_3, TB11.0, QILSS*)

c. MASRFMTDPHAMRDMAGRFEVHAQTVEDEARRMWASAQNISGAG

10 WSGMAEATSLDTMT+MNQAFRNIVNMLHGVRDGLVRDANNYEQQEQA
SQQILSS (SEQ ID NO: 4, TUBERCULIST N° Rv1992, conforme disponível em 1 de março de 2007, incorporado aqui a título de referência, conhecido como EsxM, *TB11.0, QILSS*)

d. MATRFMTDPHAMRDMAGRFEVHAQTVEDEARRMWASAQNISGAG

15 WSGMAEATSLDTMAQMNQAFRNIVNMLHGVRDGLVRDANNYEQQEQ
ASQQILSS (SEQ ID NO: 5, TUBERCULIST N° Rv2347C, conforme disponível em 1 de março de 2007, incorporado aqui a título de referência, conhecido como EsxP, *ES6_7, QILSS*)

e. MTSRFMTDPHAMRDMAGRFEVHAQTVEDEARRMWASAQNISGAG

20 WSGMAEATSLDTMTQMNQAFRNIVNMLHGVRDGLVRDANNYEQQEQ
ASQQILSS (SEQ ID NO: 6, TUBERCULIST N° Rv3620, conforme disponível em 1 de março de 2007, incorporado aqui a título de referência, conhecido como EsxW, *ES6_10, QILSS*)

25 Em modalidades adicionais, o polipeptídeo compreende ou consiste na seqüência de aminoácido mostrada como:

2. MSYMIATPAALTAAATDIDGIGSAVSVANAAVAATTGVLAAGGDEVLA
IARLFNANAEEYHALSAQVAAFQTLFVRTLTGGCGVFRRRRRGRQCVTA
AEHRAAGAGRRQRRRRSGDGQWRLRQQRHFGCGGQPEFRQHSEHR
R (SEQ ID NO: 7, TUBERCULIST N° Rv1088, conforme disponível em 1
30 de março de 2007, incorporado aqui a título de referência, conhecido como PE9).

3. VSLVIATPQLLATAALDLASIGSQVSAANAAAAMPPTTEVVAAADEVSAAI

- AGLFGAHARQYQALSVQVAAFHEQFVQALTAAGRYASTEAAVERSLL
 GAVNAPTEALLGRPLIGNGADGTAPGQPGAAGGLLFGNGGNGAAGGF
 GQTGGSGGAAGLIGNGGNGGAGGTGAAGGAGGNG GWLWGNNGNG
 GVGGTSVAAGIGGAGGNGGNAGLFGHGGAGGTGGAGLAGANGVNPT
 5 PGPAASTGDSPADVSGIGDQTGGDGGTGGHGTAGTPTGGTGGDGAT
 ATAGSGKATGGAGGDGGTAAAGGGGGNGGDGGVAQGDIAAFGGD
 GGNGSDGVAAGSGGGSGGAGGGAFVHIATATSTGGSGGFGGNGAAS
 AASGADGGAGGAGGNGGAGGLLFGDGGNGGAGGAGGIGGDGATGG
 PGGSGGNAGIARFDSPDPEAEPDVVGKGGDGGKGGSGLGVGGAGG
 10 TGGAGGNGGAGGLLFGNGGNGGNAGAGGDGGAGVAGGVGGNNGG
 GGTATFHEDPVAGVWAVGGVGGDGGSGGSSLGVGGVGGAGGVGGK
 GGASGMLIGNGGNGGSGGVGGAGGVGGAGGDGGNGGSGGNASTFG
 DENSIGGAGGTGGNGGNGANGGNGGAGGIAGGAGGSGGFLSGAAGV
 SGADGIGGAGGAGGAGGAGGSGGEAGAGGLTNGPGSPGVSGTEGM
 15 AGAPG (SEQ ID NO: 8, TUBERCULIST N° Rv2487, conforme disponível
 em 1 de março de 2007, incorporado aqui a título de referência, conheci-
 do como PE_PGRS42)
4. MHQVDPNLTRRKGRRLAALIAAMASASLVTVAVPATANADPEPAPPVPT
 TAASPPSTAAAPPAPATPVAPPPAAANTPNAQPGDPNAAPPPADPNA
 20 PPPPVIAPNAPQPVRIDNPVGGFSFALPAGWVESDAAHFDYGSALLSKT
 TGDPPFPQQPPPVANDTRIVLGRDLQKLYASAEATDSKAAARLGSDMG
 EFYMPYPGTRINQETVSLDANGVSGSASYEYEVKFSKPNQIWTGVI
 GSPAANAPDAGPPQRWFVWLGTANNPVDKGAAKALAESIRPLVAPPP
 APAPAPAEP APAPAPAGEVAPTPTTPTPQRTLPA (SEQ ID NO: 9, TU-
 25 BERCULIST N° Rv1860, conforme disponível em 1 de março de 2007,
 incorporado aqui a título de referência, conhecido como *Apa, modD*;
mpt32)
5. MLLALLRQHIRPYRRLVAMLMMLQLVSTLASLYLPTVNAAIVDDGVAKG
 DTATIVRLGAVMLGVTGLQVLCAIGAVYLGSRGTAGFGRDLRSAMFEHII
 30 TFSERETARFGAPTLLTRSTNDVRQILFLVQMTATVLVTAPIMCVGGIIMA
 IHQEAALTWLLLVSVPILAVANYWIISHMLPLFRRMQSLIDGINRVMRDQL
 SGVRVVRAFTREGYERDKFAQANTALSNAALSAGNWQALMLPVTTLTI

- NASSVALIWFGGLRIDSGQMVGSLIAFLSYFAQILMAVLMATMTLAVLP
 RASVCAERITEVLSTPAALGNPDNPKFPTDGVTVGVRLAGATFTYPGAD
 CPVLQDISLTARPGTTTAIVGSTGSGKSTLVSLICRLYDVTAGAVLVDGID
 VREYHTERLWSAIGLVPQRSYLFSGTVADNLRYGGGPDQVVTEQEMW
 5 EALRVAAADGFVQTDGLQTRVAQGGVNFSGGQRQRLAIARAVIRRPAY
 VFDDAFSALDVHTDAKVHASLRQVSGDATIIVVTQRISNAAQADQVIVVD
 NGKIVGTGTHETLLADCPTYAEFAASQSLSATVGGVG (SEQ ID NO: 10,
 TUBERCULIST Nº Rv1273c, conforme disponível em 1 de março de
 2007, incorporado aqui a título de referência.
- 10 6. MSYVIAAPEMLATTAADVDGIGSAIRAASASAAGPTTGLLAAADEVSSA
 AAALFSEYARECQEVVKQAAAFHGEFTRALAAAGAAYAQAASNTAAM
 SGTAGSSGALGSGMLSGNPLTALMMGGTGEPILSDRVLAIDSAYIRPI
 FGPNNPVAQYTPEQWWPFIGNLSLDQSIAGQVTLNNGINAELQNGHD
 VVVFQYSQSAAVATNEIRALMALPPGQAPDPSRLAFTLIGNINNPNGGV
 15 LERYVGLYLPFLDMSFNGATPPDSPYQTYMYTGQYDGYAHNPQYPLNI
 LSDLNAFMGIRWVHNAYPFTAAEVANAVPLPTSPGYTGNTHYMFLTQ
 DLPLLQPIRAIPFVGTPIAELIQPDLRVLDLGYGYGYADVPTPASLFAPIN
 PIAVASALATGTVQGPQAALVSGLLPQSALPNTYPYLPSANPGLMFNFG
 QSSVTELSVLGALGSVARLIPPIA (SEQ ID NO: 11, TUBERCULIST Nº
 20 Rv0159c, conforme disponível em 1 de março de 2007, incorporado aqui
 a título de referência, conhecido como PE3 ou PE).
7. MEFPVLPPEINSVLMYSGAGSSPLLA AAAAWDGLAEELGSAAVSFGQV
 TSGLTAGVWQGA AAAAAMAAAAAPYAGWLGSVAAAAEAVAGQARVVV
 GVFEAALAATVDPALVAANRRLVALAVSNLLGQNTPAIAAAEAEYELM
 25 WAADVAAMAGYHSGASAAAAALPAFSPPAQALGGGVGAFLTALFASPA
 KALSLNAGLGNVGNYNVGLGNVG VFNLGAGNVGGQNLGFGNAGGTNV
 GFGNLGNVGNVGFNSGLGAGLAGLGNIGLGNAGSSNYGFANLGVGNI
 GFGNTGTNNVGVLGTGNHLTGIGGLNSGTGNIGLFNSGTGNVGVFFNSG
 TGNFGVFNSGNYNTGVGNAGTASTGLFNAGNFNTGVVNVGSYNTGSF
 30 NAGDTNTGGFNPGGVNTGWLNTGNTNTGIANSGNVNTGAFISGNFNN
 GVLWVG DYQGLFGVSAGSSIPAIPGLVLNGDIGPITIPIPIPLPTIPLSIHQ
 TVNLGPLVVPDIVIPAFGGGIGIPINIGPLTITPITLFAQQTFVNQLPFPTFS

LGKITIPQIQTFDSNGQLVSFIGPIVIDTTIPGPTNPQIDLTIRWDTPPITLFP
 NGISAPDNPLGLLVSVSISNPGFTIPGFSVPAQPLPLSIDIEGQIDGFSTPP
 ITIDRIPLTVGGGVITIGPITIQGLHIPAAPGVGNNTTAPSSGFFNSGAGGV
 SGFGNVGAGSSGWWNQAPSALLGAGSGVGNVGTLGSGVLNLGSGIS
 5 GFYNTSVLPFGTPAAVSGIGNLGQQLSGVSAAGTTLRSMLAGNLGLAN
 VGNFNTGFGNVGDVNLGAANIGGHNGLGNVGDGNLGLGNIGHGNLG
 FANLGLTAGAAGVGNVGFNAGINNYGLANMGVGNIGFANTGTGNIGI
 GLVGDHRTGIGGLNSGIGNIGLFNSGTGNVGGFFNSGTGNFGIGNSGRF
 NTGIGNSGTASTGLFNAGSFSTGIAN TG DYNTGSFNAGDTNTGGFNPG
 10 GINTGWFNTGHANTGLANAGTFGTGAFMTGDYSNGLLWRGGYEGLVG
 VRVGPTISQFPVTVHAIGGVGPLHVAPVPVPAVHVEITDATVGLGPFTVP
 PISIPSLPIASITGSVDLAANTISPIRALDPLAGSIGLFLEPFRLSDPFITIDAF
 QVVAGVLFLENIIVPGLTVSGQILVTPTPIPLTLNLDTPWTLPNGFTIPA
 QTPVTVGMEVANDGFTFFPGGLTFPRASAGVTGLSVGLDAFTLLPDGF
 15 TLDTVPATFDGTILIGDIPIDIIDVPAVPGFGNTTAPSSGFFNTGGGGGS
 GFANVGAGTSGWWNQGHDLVLAGAGSGVANAGTLSSGVLNVGSGISG
 WYNTSTLGAGTPAVVSGIGNLGQQLSGFLANGTVLNRSPIVNIGWADV
 GAFNTGLGNVGDNLNWAANIGAQNGLGNLGSNGVGFNIGAGNVGF
 ANSGPAVGLAGLGNVGLSNAGSNNWGLANLGVGNIGLANTGTGNIGIG
 20 LVGDYQTGIGGLNSGSGNIGLFNSGTGNVGGFFNTGTGNFGLFNSGSFN
 TGIGNSGTGSTGLFNAGNFNTGIANPGSYNTGSFNVGDTNTGGFNPGD
 INTGWFNTGIMNTGTRNTGALMSGTDSNGMLWRGDHEGLFGLSYGITI
 PQFPIRITTTGGIGPIVIPDTTILPPLHLQITGDADYSFTVPDIPIPAIHIGING
 VVTVGFTAPEATLLSALKNNGSFISFGPITLSNIDIPPMDFTLGLPVLGPIT
 25 GQLGPIHLEPIVVAGIGVPLEIEPIPLDAISLSESIPIRIPVDIPASVIDGISMS
 EVVPIDASVDIPAVTITGTTISAIPLGFDIRTSAGPLNIPIDIIPAAPGFGNST
 QMPSSGFFNTGAGGGSGIGNLGAGVSGLLNQAGAGSLVGTLSGLGNA
 GTLASGVLNSGTASGLFNVSTLDATTPAVISGFSNLGDHMSGV SIDGLI
 AILTFPPAESVFDQIIDAAIAELQHLDIGNALALGNVGGVNLGLANVGEFN
 30 LGAGNVGNINVGAGNLGGSNLGLGNVGTGNLGFNIGAGNFGFGNAG
 LTAGAGGLGNVGLGNAGSGSWGLANVGVGNIGLANTGTGNIGIGLTGD
 YRTGIGGLNSGTGNLGLFNSGTGNIGFFNTGTGNFGLFNSGSYSTGVG

NAGTASTGLFNAGNFNTGLANAGSYNTGSLNVGSFNTGGVNP GTVNT
 GWFNTGHTNTGLFNTGNVNTGAFNSGSFNNGALWTGDYHGLVGF SFS
 IDIAGSTLLDLNETLNLGPIHIEQIDIPGMSLFDVHEIVEIGPFTIPQVDVPAI
 PLEIHESIHMDPIVLVPATTIPAQTRTIPLDIPASPGSTMTLPLISMRFEGE
 5 DWILGSTAAIPNFGDPFPAPTQGITIHTGPGPGTTGELKISIPGFEIPQIAT
 TRFLLDVNISGGLPAFTLFAGGLTIPTNAIPLTIDASGALDPITIFPGGYTID
 PLPLHLALNLTVPDSSIPIIDVPPTPGFGNTTATPSSGFFNSGAGGVSGF
 GNVGSNLSGWWNQAASALAGSGSGVLNVGTLGSGVLNVGSGVSGIYN
 TSVLPLGTPAVLSGLGNVGHQLSGVSAAGTALNQIPILNIGLADVGNFNV
 10 GFGNVGDVNLGAANLGAQNLGLGNVGTGNLGFANVGHGNIGFGNSGL
 TAGAAGLGNTGFGNAGSANYGFANQGVNRNIGLANTGTGNIGIGLVGDN
 LTGIGGLNSGAGNIGLFNSGTGNIGFFNSGTGNFGIGNSGSFNTGIGNS
 GTGSTGLFNAGSFNTGVANAGSYNTGSFNAGDTNTGGFNPGTINTGW
 FNTGHTNTGIANSNGNVGTGAFMSGNFSNGLLWRGDHEGLFSLFYSLDV
 15 PRITIVDAHLDGGFGPVVLPPIPVPAVNAHLTGNVAMGAFTIPQIDIPALT
 PNITGSAAFRIVVGSVRIPPVSVIVEQIINASVGAEMRIDPFEMWTQGTN
 GLGITFYSGSADGSPYATGPLVFGAGTSDGSHLTISASSGAFTTPQLE
 TGPITLGFQVPGSVNAITLFPGGLTFPATSLNLDVTAGAGGVDPITWP
 EIAASADGSVYVLASSIPLINIPPTPGIGNSTITPSSGFFNAGAGGGSGFG
 20 NFGAGTSGWWNQAHTALAGAGSGFANVGTLHSGVLNLGSGVSGIYNT
 STLGVGTPALVSGLGNVGHQLSGLLSGGSVNPVTVLNIGLANVGS HN
 AGFGNVGEVNLGAANLGAHN LGFGNIGAGNLGFGNIGHGNVGVGNSG
 LTAGVPGLGNVGLGNAGGNNWGLANVGVGNIGLANTGTGNIGIGLTGD
 YQTGIGGLNSGAGNLGLFNSGAGNVGFFNTGTGNFGLFNSGSFNTGV
 25 GNSGTGSTGLFNAGSFNTGVANAGSYNTGSFNVGDTNTGGFNPGSIN
 TGWLNAGNANTGVANAGNVNTGAFVTGNFSNGILWRGDYQGLAGFAV
 GYTLPLFPAVGADVSGGIGPITVLPPIHIPPIPVGFAAVGGIGPIAIPDISVP
 SIHLGLDPAVHVGSITVNPITVRTPPVLVSYSQGAVTSTSGPTSEIWVKP
 SFFPGIRIAPSSGGGATSTQGAYFVGPIPSIPSGTVTFPGFTIPLDPIDIGLP
 30 VSLTIPGFTIPGGTLIPTLPLGLALSNGIPPVDIPAIVLDRILLDLHADTTIGPI
 NVPIAGFGGAPGFGNSTTLPSSGFFNTGAGGGSGFSNTGAGMSGLLN
 AMSDPLLGSASGFANFGTQLSGILNRGAGISGVYNTGALGVVTA AVVSG

FGNVGQQLSGLLFTGVGP (SEQ ID NO: 12, TUBERCULIST Nº 3350c, conforme disponível em 1 de março de 2007, incorporado aqui a título de referência, também conhecido como PPE56 ou PPE.

Em uma segunda modalidade, o polipeptídeo de Mtb de uso nos métodos descritos aqui tem uma seqüência pelo menos 75%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98% ou 99% homóloga à seqüência de aminoácido mostrada em uma das SEQ ID NOs: 1-12. Por exemplo, o polipeptídeo pode ter uma seqüência de aminoácido pelo menos 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98% ou 99% homóloga a uma das seqüências de aminoácido mostradas nas SEQ ID NOs: 1-12. Seqüências exemplares podem ser obtidas usando programas de computador que estão prontamente disponíveis na internet e as seqüências de aminoácido mostradas aqui. Em um exemplo, o polipeptídeo retém uma função da proteína de Mtb, tal como ligação a um anticorpo que especificamente liga o epítopo de Mtb.

Modificações pequenas de uma seqüência de aminoácido primária de polipeptídeo de Mtb podem resultar em peptídeos que têm atividade substancialmente equivalente comparado com o polipeptídeo contraparte não-modificado descrito aqui. Tais modificações podem ser deliberadas, como através de mutagênese direcionada a sítio, ou podem ser espontâneas. Todos os polipeptídeos produzidos por essas modificações estão incluídos aqui. Então, um exemplo não-limitante, específico, de um polipeptídeo de Mtb é uma variante conservativa do polipeptídeo de Mtb. Uma tabela de substituições conservativas é provida aqui. Substituições da seqüência de aminoácidos mostradas nas SEQ ID NOs: 1-12 podem ser feitas com base nesta tabela.

Polipeptídeos de Mtb são descritos aqui que podem ser usados para detectar uma resposta imune a Mtb. Esses peptídeos incluem ou consistem em pelo menos nove aminoácidos, tal como nove a vinte aminoácidos, aminoácidos consecutivos de um polipeptídeo de Mtb mostrado acima. Exemplos não-limitantes, específicos, são doze, onze, dez aminoácidos, ou nove aminoácidos consecutivos de um polipeptídeo de Mtb mostrado acima. Nesses exemplos, o polipeptídeo de Mtb não inclui as seqüências de amino-

ácido de comprimento completo mostradas como SEQ ID NOs: 1-12.

Um polipeptídeo isolado é descrito que inclui nove a doze aminoácidos consecutivos de um polipeptídeo de Mtb, onde o polipeptídeo isolado compreende a seqüência de aminoácido mostrada como QTVEDEAR-
 5 RMW (SEQ ID NO:13). Em algumas modalidades, o polipeptídeo é de nove, dez ou onze aminoácidos de comprimento. Em modalidades adicionais, o polipeptídeo consiste na seqüência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO:13. Um polipeptídeo isolado é descrito que inclui nove a doze aminoácidos consecutivos de um polipeptídeo de Mtb, onde o polipeptídeo isolado
 10 compreende a seqüência de aminoácido mostrada como VSAAIAGLF (SEQ ID NO: 14). Em algumas modalidades, o polipeptídeo é de nove, dez ou onze aminoácidos de comprimento. Em modalidades adicionais, o polipeptídeo consiste na seqüência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO:14.

Em várias modalidades, o polipeptídeo de Mtb isolado é incluído
 15 em uma proteína de fusão. Então, a proteína de fusão pode incluir o polipeptídeo de Mtb (vide acima) e uma segunda porção heteróloga, tal como uma proteína myc, uma enzima ou um veículo (tal como uma proteína carreadora da hepatite ou albumina de soro bovino) covalentemente ligado ao polipeptídeo de Mtb. Em vários exemplos, um polipeptídeo consistindo em nove a
 20 doze aminoácidos de uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NOs: 1-14 que liga MHC classe I é covalentemente ligado a um veículo. Em exemplo adicional, um polipeptídeo consistindo em uma das seqüências de aminoácido mostradas como uma das SEQ ID NOs: 1-14 é covalentemente ligado a um veículo.

25 Em exemplos adicionais, o polipeptídeo pode ser uma proteína de fusão e pode também incluir seqüências heterólogas a Mtb (tal como seqüências de aminoácido de pelo menos nove aminoácidos de comprimento que não estão incluídas na SEQ ID NO:1). Então, em vários exemplos não-limitantes específicos, o peptídeo imunogênico é um polipeptídeo de fusão,
 30 por exemplo, o polipeptídeo inclui seis resíduos de histidina sequenciais, uma seqüência de aminoácido de β -galactosidase ou uma seqüência de aminoácido de imunoglobulina. O polipeptídeo pode também ser covalente-

mente ligado a um veículo. Em modalidades adicionais, a proteína consiste no polipeptídeo de Mtb.

O polipeptídeo pode opcionalmente incluir repetições de um ou mais dos polipeptídeos de Mtb descritos aqui. Em um exemplo não-limitante, específico, o polipeptídeo inclui duas, três, quatro, cinco ou até dez repetições de um dos polipeptídeos de Mtb descritos acima. Alternativamente, mais de um polipeptídeo pode ser incluído em um polipeptídeo de fusão. Então, em vários exemplos, o polipeptídeo pode incluir pelo menos dois, pelo menos três, pelo menos quatro, pelo menos cinco ou pelo menos seis das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NOs: 1-14. Uma seqüência ligante pode ser opcionalmente incluída entre os polipeptídeos de Mtb.

Os polipeptídeos de Mtb descritos aqui podem ser quimicamente sintetizados através de métodos padrão ou podem ser produzidos recombinantemente. Um processo exemplar para produção de polipeptídeo é descrito em Lu e outros, *Federation of European Biochemical Societies Letters*. 429:31-35, 1998. Eles podem ser também isolados através de métodos incluindo cromatografia preparativa e separações imunológicas.

Se desejado, polipeptídeos podem ser também quimicamente sintetizados através de tecnologias emergentes. Um tal processo é descrito em W. Lu e outros, *Federation of European Biochemical Societies Letters*. 429:31-35, 1998. Polipeptídeos podem ser também produzidos usando técnicas genéticas moleculares, tal como através de inserção de um ácido nucleico codificando Mtb ou um epítipo dele em um vetor de expressão, introdução do vetor de expressão em uma célula hospedeira e isolamento do polipeptídeo (vide abaixo).

Polinucleotídeos codificando os polipeptídeos de Mtb descritos aqui são também providos. Seqüências de ácido nucléico exemplares são mostradas abaixo:

30 ESXJ (PROTEÍNA TIPO ESAT-6 2)

```
atggcctcgcgttttatgacggatccgcacgcgatgcgggacatggcgggcccgttttgag
gtgcacgcccagacgggtggaggacgaggctcgccggatgtgggctccgcgcaaaacatc
```

tcggg'gcg'ggg'ctgg'agtgg'catgg'ccgagg'cgac'ctcg'ctagac'acccatg'acccagatg
aatcagg'cg'ttttcg'aacatcg'tgaacatg'ctgcac'ggggtg'cgtgac'gggctgg'ttcgc
gacgcca'acaactac'gaacag'caagag'caggc'ctcccag'cagatc'ctcag'cagctga
(SEQ ID NO: 15)

5 ESXK (PROTEÍNA TIPO ESAT-6 3)

atggc'ctcac'gtttttat'gacggat'ccgcac'g'cgatg'cgggac'atggc'ggg'ccg'ttttgag
gtgcac'gcccag'acggtg'gaggac'gaggct'cgccg'gatgtg'ggcg'tccgc'gcaaa'acatt
tccgg'tgcgg'gctgg'agtgg'catgg'ccgagg'cgac'ctcg'ctagac'acccatg'gcccagatg
aatcagg'cg'ttttcg'aacatcg'tgaacatg'ctgcac'ggggtg'cgtgac'gggctgg'ttcgc
10 gacgcca'acaactac'gagcag'caagag'caggc'ctcccag'cagatc'ctcag'cagctaa
(SEQ ID NO: 16)

ESXM (PROTEÍNA TIPO ESAT-6 ESXM)

atggc'ctcac'gtttttat'gacggat'ccgcac'g'cgatg'cgggac'atggc'ggg'ccg'ttttgag
gtgcac'gcccag'acggtg'gaggac'gaggct'cgccg'gatgtg'ggcg'tccgc'gcaaa'acatt
15 tccgg'tgcgg'gctgg'agtgg'catgg'ccgagg'cgac'ctcg'ctagac'acccatg'acctagatg
aatcagg'cg'ttttcg'aacatcg'tgaacatg'ctgcac'ggggtg'cgtgac'gggctgg'ttcgc
gacgcca'acaactac'gaacag'caagag'caggc'ctcccag'cagatc'ctgag'cagctag
(SEQ ID NO: 17)

ESXP (PROTEÍNA TIPO ESAT-6 7)

20 atggc'aacac'gtttttat'gacggat'ccgcac'g'cgatg'cgggac'atggc'ggg'ccg'ttttgag
gtgcac'gcccag'acggtg'gaggac'gaggct'cgccg'gatgtg'ggcg'tccgc'gcaaa'acatc
tcggg'gcg'ggg'ctgg'agtgg'catgg'ccgagg'cgac'ctcg'ctagac'acccatg'gcccagatg
aatcagg'cg'ttttcg'aacatcg'tgaacatg'ctgcac'ggggtg'cgtgac'gggctgg'ttcgc
gacgcca'acaactac'gagcag'caagag'caggc'ctcccag'cagatc'ctcag'cagctaa
25 (SEQ ID NO: 18)

ESXW (PROTEÍNA TIPO ESAT-6 10)

atgac'ctcg'cgtttttat'gacggat'ccgcac'g'cgatg'cgggac'atggc'ggg'ccg'ttttgag
gtgcac'gcccag'acggtg'gaggac'gaggct'cgccg'gatgtg'ggcg'tccgc'gcaaa'acatt
tccgg'gcg'ggg'ctgg'agtgg'catgg'ccgagg'cgac'ctcg'ctagac'acccatg'acccagatg
30 aatcagg'cg'ttttcg'aacatcg'tgaacatg'ctgcac'ggggtg'cgtgac'gggctgg'ttcgc
gacgcca'acaactac'gaacag'caagag'caggc'ctcccag'cagatc'ctcag'cagctga
(SEQ ID NO: 19)

PE9 (PROTEÍNA DA FAMÍLIA PE)

atgtcatcatgattgccacaccagcggttgacggcgggcggaacggatatcgacggg
 attggctcggcggttagcggttgcaacgccgcggtcgccgcgacaaccggagtgctg
 gccgccggtggcgatgaagtgttgcgggccatcgctaggctgttcaacgcaaacgccgag
 5 gaatatcacgccctcagcgcgaggtggcggtttcaaaccctgtttgtgcgcaccttg
 actggggggtgaggagtccttcgccggcgccgaggccgccaatgcgtcacagctgcagag
 catcgcgcgaggtgagggcgccgtcaacgccgtcgccggtcaggtgacgggcaatgg
 cggctccggcaacagcggcacttcggctgcgggcgccaaccgaattccgacaacacagc
 Gagcatcgccgatag

10 (SEQ ID NO: 20)

PE_PGRS42 (PROTEÍNA DA FAMÍLIA PE-PGRS)

gtgtcggttggtgatcgcgacgccgcagctgctggcaactgcggctttggatttagcgagt
 attggttcgcaggtgagcgggctaatacgggccgcgcgatgccgacgacggaagtggg
 gctgcggtgccgatgaagtgtcgggcgcgattgcgggggttggtcggggcccatgctcgg
 15 cagtatcaggcgctcagcgtaacaggtggcagcggttcacgagcagtttgtgcaggcggtg
 actgcggccgcgggtcggtatgccagcactgaggccgctgttgagcggagtcgtggtg
 gcggtgaatgcgccaccgaggcgcttttggggcgcccgttgatcggaacggcgccgac
 gggacggcacccgggcagcctggcgcgggcgggcggttgctgtttggcaacgggtggcaac
 ggcgcggctggcggttcggtcaaaccggcgcgagcggaggcgggcggggttgatcggc
 20 aacggcggaacggcggggcccgggtggtaccggcgcgggcgggcggtgccggtgggaacggg
 ggggtggttggtggggcaacggcggaacggcggtgtcggcggcaccagcgtggccgcaggc
 atcgggggtgcgggcggttaacggcggaacgccgggctgttcggccatggcgggcgccggt
 ggtaccggcgggcgccggcctcgccggggcaaaccgggtcaatcccacgcccggccccgcg
 gccagcaccggggacagcccggcagatgtgtccggcatcggtgatcaaaccggcgggcgac
 25 ggcggcacggggcgcccatggcactgccggcacgccgaccggtggcaccggcgggcgacggt
 gccaccgcgacggcaggctcgggcaaggccaccggcggtgccggtggtgacggcggtacc
 gccgctgccggtggcgggcgggcggaacggcgggcgagtcgcgagggcgacatt
 gcgagcgccctttggcggtgatggtggcaacgggtccgacgggtgtagccggcgagtggtg
 ggtggttagcggcgggcgccggaggcggcgtttcgtacacatcgccactgccacctctacc
 30 ggtggttagcggcggtttcggtggtaacggggctgccagtgccgcctccggcgccgacggt
 ggcgcagggggagctggcggaatggtggcgccggcggggttgctattcggtgatggcggc
 aacggtggcgccggtggcgcggtggtatcggtggtgacggcgccacggggggggccggg

ggaagcggcggaacgctggcatcgcgaggtttgacagcccagaccccgaggcagaaccc
 gatgtggtcggcggaagggtggtgatggcggaaggcgagcggccttggtcgtcggc
 ggcgccggcgggaccggcgcgggcggaacggcgccggcggggttggtggtcggc
 aacggcggaacggcggaacgccggggcgggcggggatggcgcgccggcggttgccggt
 5 ggggttggtcggtaacggcgcggtggtggcaccgcgacgtttcacgaagacccggtcgt
 ggtgtctggcggtcggtaggtggtgatggtggctccggcgagctcgttggt
 gtcggcggggtggcgagccggtggcgtgggtggcaagggtggcgccagcggcatgttg
 atcggcaacggcggaacggtggcagcggcgagtcggtggggccggtggagtcggcggg
 gctggcggtgacggcggaacggcggtccggtggcaacgccagtacttttggtgatgag
 10 aactccatcgcgggggccggcgggacggcggaacgggggcaacggcgcaaacggcggt
 aacggtggcgctggcggtattgccggcggtgcgggtgggtccggagggttcctcagcgg
 gccgcaggagtcagcggcgctgacggtatcggtggcgggcgccgagcgggtgccggt
 ggcgcggcggttagcgcggtgaggcaggcgcgggggccctaccaacggccccgggtcc
 cctggcggtttccggcaccgaaggcatggccggcgcgcccggttag

15 (SEQ ID NO: 21)

Rv1860 (PROTEÍNA DE LIGAÇÃO DE FIBRONECTINA)

atgcatcaggtggacccaacttgacacgtcgcaaggagcattggcggcactggctatc
 gcggcgatggccagcgccagcctggtgaccgttgcggtgcccgcgaccgccaacgccgat
 ccggagccagcgcccccggtaccacaaacggccgcctcgccgccgtcgaccgtgcagcg
 20 ccacccgcaccggcgacacctgttgccccccaccaccggccgcccgaacacgccgaat
 gccagccggcgatcccaacgcagcacctccgcccggcaccgaacgcaccgccgcca
 cctgtcattgccccaaacgcacccaacctgtccggatcgacaacccgggttgaggattc
 agcttcgcgtgcctgctggctgggtggagtctgacgccgcccacttcgactacggttca
 gcactcctcagcaaaaccaccggggaccgcccatttcccggacagccgcccgggtggcc
 25 aatgacaccggtatcgtgctcgccggctagacaaaagctttacgccagcgccgaagcc
 accgactccaaggccgcggcccgggttggtcggacatgggtgagttctatatgccctac
 ccgggcacccggatcaaccaggaaaccgtctcgctcgacgccaacgggggtgtctggaagc
 gcgtcgtattacgaagtcaagttcagcgatccgagtaagccgaacggccagatctggacg
 ggcgtaatcggtcgcccgggcggaacgcaccggacgcccgggccccctcagcgctggttt
 30 gtggtatggctcgggaccgccaacaacccgggtggacaaggcgcgccgaaggcgctggcc
 gaatcgatccggcctttggtcgccccgcccggcgccggcaccggctcctgcagagccc
 gctccggcgccggcgccgggggaagtcgctcctaccccgacgacaccgacaccgcag

cggaccttaccggcctga

(SEQ ID NO: 22)

Rv1273c (TRANSPORTADOR ABC DE PROTEÍNA DE LIGAÇÃO DE ATP
DE TRANSMEMBRANA DE TRANSPORTE DE FÁRMACOS PROVÁVEL)

5 atgctcctggccctgctgcgccagcacatccgaccgtaccgccggctggcgcatgctg
atgatgctgcagctgggtcagcaccctggcttcgctatacctcccagcgggtcaacgccgca
atcgctgcagcagcggcgctcgccaagggcgacaccgccaccatcgtagcggctgggtgcggtg
atgcttggggtgaccggattgcaggtgctgtgcgcatcggggcgggtctatctgggtcc
cggaccggggcgggtttcggccgtgacctgcgctcggcaatgttcgaacacatcatcacc
10 ttctcggaacgcgagaccgcccgattcggcgctccgacgttggtgacccgcagcaccaac
gacgtccggcagatcctgttcctgggtccagatgaccgccaccgtgctgggtcaccgcaccg
atcatgtgcgctcggcggaatcatcatggccatccaccaggaggccgcgctgacatggctg
ctgctgggtcagcgttccgattctggccgtagcaaactactggatcatctcccacatgctg
ccgctcttccgccgcatgcagagcctgatcgacggcatcaaccgggtgatgcgcgatcag
15 ctgtccggggtgcgagtggtccgcgccttcacccgcgaaggctatgaacgcgacaagttc
gcgcaggccaatacggcgctgtcgaatgccgcactgagcgccggcaactggcaagcactg
atgctgccggtgaccacgctgaccatcaacgcacatccagcgtcgcactgatctgggtcgggt
gggctacgcatcgacagcggccagatgcaggtcgggtccctgatcgcttccctgtcctac
ttcgcccagatcctgatggcggtgttgatggcgaccatgacgctggccgtgctgccacga
20 gcgtcgggtctgcgccgaacgcacatcaccgaggtgctttccacgcccgcgcactcggtaac
cccgacaatcccaagttcccagcggacggggtcacgggcgtagtgcgcttggtggcgca
acctttacctatcctggcgccgactgcccgggtgctgcaggacatttcgttgactgcgcgg
cccgggtaccaccaccgcgatcgctcggcagtagcgggttcgggcaagtcgacactgggtgctg
ttgatctgccggctctacgacgtcaccgctggcgcggtccttggttgacgggtatcgacgtc
25 cgcgagtaccacaccgagcgggtctggtcagcgatcgggctgggtgccccagcgcagctac
ctcttctccggaaccgtcgcggacaacctgcgctacggcgggggcccagaccaggtagtc
accgagcaggagatgtgggaggcgctgcgggtcgccgcggccgacggctttgtacaaaca
gacgggctgcagacgcgtgtcgcccaaggtgggtgtcaacttctccggcgggcgacgcgcaa
cgggtggcgatagcccagcgggtcatccgacgtccggccatctatgtgttcgacgacgcg
30 ttctccgcacttgacgtgcacaccgacgccaaggtccacgcacatcgctgcgacaggtatct
gggtgatgcaaccatcattgttggttacacaacggatttcgaatgccgctcaggccgaccag
gtcatcggtgtcgataacggtaagatcgctcggcacgggcacccacgaaacgctgctggcc

gattgccccacctatgccgaattcgccgcctcacaatcgctgagcgccacggtcgggggt
gtaggggtga

(SEQ ID NO: 23)

Rv0159C (PROTEÍNA DA FAMÍLIA PE)

5 atgtcctacgtcatcgcgccccggagatggttggaacgacggccgaggacgtggacggg
atcggttcggcgatacgagcgggccagcgcgctccgctgcgggccaacgaccggactgctg
gccgcgccgcccgatgaggtgtcgctcgccgctgcagcgctgttcagcgaatacgcgcg
gaatgtcaagaggtcctaaagcaggctgcggcgttccatggcgagttcaccggggcgctg
gctgccgccccggggccgcctatgccagggtgaagccagcaacaccgctgctatgtcgggc
10 accgccccgggtccagcgggcgccctcggttctgtcgggatgctgtcaggcaaccggctaacc
gcgttgatgatgggcggcaccggggaaccgatccttagtgaccgcgctcttggcgatcatt
gacagcgcatatacttcggccattttcgggcccaacaaccggctcgcccagtaacgccc
gagcagtggtggccggtttatcgggaaacctgtcactggaccaatccatcgcccagggtgtc
acgctgctgaacaacggcatcaacgcgggaactacaaaatgggcatgacgtcgctggtttc
15 ggctactcgcaaagcgccgcggtagcgaccaatgaaatacgcgctcttatggcgttacca
ccgggccaagccccagatccaagccggctggctttcacgttgatcggtaatatcaataac
cccaacggcgggcgctcctcgagcggttacgtgggcctttacctcccgttcttgatatgtcg
ttcaacggtgcgactccaccggattccccctaccagacctacatgtacaccggccaatac
gacggctacgcccacaaccgcagtaaccgctcaatatcttgctcggaacctcaacgccttc
20 atgggcatcagatgggtgcacaacgcgtaccccttcaccgcgccgaggttgccaatgcc
gtgccgttgccacgtctccgggctacaccggcaacaccattactacatgtttctgacc
caggacctgccgctggtgcagccgattcgcgccatccccttcgtagggaccccaatagcc
gagctgattcagccccgacctacgggtgctagtcgacttgggctatggctacggctacgcc
gacgtacccaccccgccagcctgttcgcgccaatcaaccgatcgccgtggcctcgggc
25 ctggcgaccgggaccgtgcaaggcccccaagccgccctagtaagcatcggttggtaccg
cagtcgcgctacccaatacgtatccgtatcttcgctcggcgaatccgggcctgatgttc
aacttcggtcaatccagtgtgacggagttgtcggtgctcagtgggcgccctcggttcgta
gcgagattgattccaccgatcgcggtga

(SEQ ID NO: 24)

30 Rv3350C (PROTEÍNA DA FAMÍLIA PPE)

atggagtttccggtggtgccaccggaaatcaactccgtgctgatgtattcgggtgcgggg
tcgagccccgttgctggcgggcgccgcgcggtgggatgggctggctgaggagttggggctg

gcggcggtgtcgtttgggcaggtgacgtcgggcctgacggcgggggtgtggcaggggtgcg
 gcggcgccggcgatggcgcccgggcgggcgccgtatgcgggggtggttgggttcgggtggcg
 gccgcggccgaggcggtggccgggcaggcgcggtggtggtgggggtctttgaggcgggcg
 ttggcgggcgacggtggatccggcgctggtggcgggccaaccgggcgcggctggtggcggtg
 5 gcggtgtcgaatctgttggggcagaacacgccggcgatcgcgccgccgaggccgagtac
 gagctgatgtggggccgcatgtggcgggcgatggccggctaccattccggcgcgctcggt
 gctgccgcggcggttgccggcggttcagcccaccggcgagggcgctgggggggaggtgtcggc
 gcgttccttaccgccctgttcgccagccctgcgaaggcgctgagcctgaatgcggggttg
 ggcaatgtcggcaattacaacgtcgggttgggcaatgtcgggggtgttcaacctgggcgcg
 10 ggcaatgtgggtgggcagaatctgggtttcgggaatgccggtggcaccaatgtcgggttc
 ggcaacctcggtaacgggaatgtcgggttcggcaactccgggtctggggggcgggcctggcc
 ggcttgggcaatatcggttgggcaatgcgggcagcagcaactatggtttcgaaacctg
 ggtgtgggcaacatcggtttcggaacaccggcaccaacaacgtcggcgctcgggctcacc
 ggcaaccacctgacgggtatcgggggcctgaattcgggcaccgggaatatcggttgttc
 15 aactccggcaccgggaatgtggggttcttcaattcggggaccgggaacttcgggggtgttc
 aactcgggtaattacaacaccgggtgtcggtaatgcggggacggccagcacgggggtgttc
 aatgccggcaatttcaacaccggcggtggtgaacgtgggcagttacaacaccggcagtttc
 aacgccggcgacaccaacaccgggtggcttcaaccccgcggtgtgaacaccgggtggtg
 aacaccgggaacaccaacaccggcatcgccaactcgggcaacgtcaacaccggcgcggttc
 20 atctcgggcaacttcaacaacggcggtgctgtgggtgggtgactaccagggcctgttcggc
 gtctccgcccggctcgatccccgcaattcccatcggcctggtgtcaacggcgacatc
 ggcccgatcaccatccagcccatcccgatcctgcccaccatcccgtcagcattcaccaa
 accgtcaacttgggcccgtggtggttcccgacatcgatccccgccttcggcgggcggt
 atcggcatacccatcaacatcggcccgctgaccatcacacccatcacctgtttgcccaa
 25 cagacatttgtcaaccaattgccctttccaccttcagtttagggaaaatcacaattcca
 caaatccaaacctttgattctaacgggtcagcttgtcagctttatcgggccctatcggtatc
 gacaccaccattcccggaccaccaaaccacagattgatttaacgatcagatgggatacc
 cctccgatcacgctgttcccgaatggcatcagtgctcccgataatcctttgggggtgctg
 gtgagtgtgtcgatcagtaacccgggctttaccatcccgggatttagtggtcccgcgcag
 30 ccgttgccgttgtcgatcgatatcgagggccagatcgacgggttcagcaccgcccgatc
 acgatcgatcgatccccctgaccgtggggggcggggtcacgatcgggcccatcacgatc
 cagggccttcatatcccggcgggcgccgggagtggggaacaccaccacggccccgtcgctcg

ggattcttcaactccggtgcggggtgggggtgtcgggttttcggcaacgtcggcgcgggcagc
 tcgggctggtggaaccaggcgccgagcgcgctgttgggggcccgggttcgggtgttggaac
 gtgggcaccctgggctcgggtgtgctcaacctgggctcagggatctcggggttctacaac
 accagcgtgttgcttttcgggacaccggcgggcgggtgtcgggcatcggcaacctgggccag
 5 cagctgtcgggggtgtcggcgggcgggaaccacgctgcgctcgatgctcgccggcaacctc
 gggttggccaatgtgggcaacttcaacaccgggttcggaaatgtcggggacgtcaacctg
 ggtgcggccaacatcgggtgggcacaacctgggcctgggcaatgtcggggacggcaacctg
 gggttgggcaacatcgcccatggcaacctggggtttgccaacttgggcctgaccgccggc
 gcggcgggggtgggcaatgttgggttttggaatgccggcatcaacaactatggcttggcg
 10 aacatgggtgtgggcaatattgggtttgccaacaccggcacgggcaacatcgggatcggg
 ctggtcggggaccatcggaccgggatcgggggcttgaactccggcatcggcaatatcggg
 ttgttcaactccggcaccggcaacgtcgggttcttcaattccgggaccggcaacttcggc
 atcgggaactccggccgcttcaacaccgggatcggtaatagcggaacggccagcaccggg
 ctcttcaatgccggcagcttcagcaccggcatcgccaacactggtgactacaacacgggc
 15 agcttcaacgccggcgacaccaacaccgggtggcttcaacccgggcggcatcaacaccggc
 tggttcaacaccgggcatgccaacaccgggttgccaacgcgggcaccttcggcaccggc
 gccttcatgacgggcgactacagcaacggcctgttggtggcgggcggttacgagggcctg
 gtcggcgctccgcgtcgggcccacgatctcccaattcccggtcaccgtgcacgcgatcggc
 ggggtgggcccgtgcatgtggcgcccgtcccgggtacccgccgtgcacgtcgagatcacc
 20 gacgccaccgtcggcctgggtccgttcaccgtcccaccgatcagcattccctcacttccc
 atcgccagcatcaccggaagcgtggacctggccgcaaaccacatctcgccgattcgcgct
 cttgacccgctcgccggttcgatagggtttttctcgagccgttcgcctcagtgacca
 tttatcaccattgatgcgttccaagtgttgccgggtgtcttggttcctagagaacatcatt
 gtgcccggcctcacgggttagcgggtcagatattggtcaccccgacaccaattcccctaacc
 25 ctcaacttggacaccaccccgtggacgcttttcccgaatgggttcaccattcccgcgcaa
 acccccgtgacgggtgggtatggaggtcgccaacgacgggttcaccttcttcccgggtggg
 ctgaccttccgcgggcctccgccggggtcacggactgtccgtgggggtggacgcgttc
 acgctgttgcccgacgggttcaccctcgacaccgtgccggcgaccttcgacggcaccatc
 ctcatcggcgatatcccgatcccgatcatcgatgtgccggcggtgccgggggttcggcaac
 30 accaccacggccccatcgtcggggttcttcaacaccggcgggcggtggatcgggggttc
 gccaacgtcggcggggcacgtcgggctgggtggaaccaggggcacgacgtgtagcaggg
 gcgggctcgggagttgccaatgccggcacgctgagctcgggcgtgctgaacgtcggctcg

gggatctccgggtggtacaacaccagcaccctgggagcgggcaccccggcgggtggtctcg
 ggcacgcggcaacctcggccagcagctgtcggggttcttggcaaatgggaccgtgctcaac
 cggagccccattgtcaatatcgggtgggccgatgtgggcgcgttcaacaccgggttgggc
 aatgtgggggacctaactgggggtgcggccaacatcggcgcgcagaacctgggcctgggc
 5 aatctcggcagcgggaacgtcgggttcggcaacatcggtgccggcaacgtcgggttcgcc
 aactcgggtccggcgggtgggcctggccggcctgggcaacgtgggggttgagcaatgccggc
 agcaacaactgggggctggccaacctgggtgtgggcaacatcgggttggccaacaccggc
 acgggcaacatcgggatcgggctggtcggcgactaccagaccggcatcggcggcctcaac
 tcgggtagtggcaatatcggattgttcaattccggcaccggcaatgtcgggttcttcaac
 10 accggcaccggcaacttcggactgttcaactccggtagtttcaacaccggcatcggtaat
 agcggaaaccggcagtagtgggtcttcaatgccggcaatttcaacaccggcatcgccaac
 cccgggtcgtacaacacgggcagcttcaatgtcggtgataccaacaccgggtggtttcaac
 ccgggcgacatcaacaccggctggttcaacaccggcattatgaatacgggcacccgcaac
 accggcgccctcatgtcggggaccgacagcaacggcatgctgtggcgcggcgaccacgag
 15 ggcctgttcggcctgtcctatggcatcacgatcccgcaattcccgatccgcatcaccacg
 actggcgggtatcggccccatcgtcatcccggacaccacgatccttccgccgctgcacctg
 cagatcaccggcgacgcggactacagcttcaccgtgcccgcacatccccatccccgccatc
 cacatcggcatcaatggcgtcgtcacccgtcggcttcaccgccccggaagccacctgctg
 tccgccctgaagaataacggtagcttcatcagcttcggccccatcacgtctcgaatatc
 20 gatattccgcccattggatttcacgttaggcctgccggttcttggctctatcacgggcaa
 ctcggaccaattcatcttgagccaatcgtggtggccgggatcgggtgtgcccttgagatc
 gagcccatccccctggatgcgatttcgttgagtgcgattcctatccgcatacctggtt
 gatattccggcctcggatcatcgatgggatttcaatgtcgggaagtgggtgccgatcgatgcg
 tccgtggacatccccggcggtcacgatcacaggcaccaccatttccgcgatcccgtgggc
 25 ttcgacattcgcaccagtgccggacccctcaacatcccgatcatcgacatcccggcggcg
 ccgggcttcgggaactcgaccagatgccgtcgtcggggttcttcaacaccgggtgccggc
 ggccggatcgggcatcggcaacttgggtgcgggcgtgtcgggcctgtcaaccaggccggc
 gcgggggtcactggtggggacactctcggggctgggcaatgccggcaccctggcctcgggt
 gtgctgaactccggcaccgccatctccgggctgttcaacgtgagcacgctggacgccacc
 30 accccggcggtgatctcgggggttcagcaacctcggcgaccatatgtcgggggtgtccatc
 gatggcctgatcgcgatcctcaccttcccacctgccgagtcctgttcgatcagatcatc
 gacgcggccatcggcgagctgcagcacctcgacatcggcaacgctttggccttgggcaat

gtcggcggggtgaacctcggtttggctaacgtcggtaggttcaacctgggtgcgggcaac
 gtcggcaacatcaacgtcggcgccgggaacctcggcgccagcaacttgggggtgggcaac
 gtcgggaccgggaacctcgggttcgggaacatcggtgccggcaatttcggattcggcaac
 gcgggcctgaccgcgggcgcggggggcctgggcaatgtgggggtgggtaacgccggcagc
 5 ggcagctgggggttggccaacgtgggtgtgggcaatatcgggttggccaacaccggcacc
 ggcaacatcgggatcgggctgaccggggactatcggaccgggatcggcgccctgaactcg
 ggcaccgggaacctcgggttgttcaactcgggcaccgggaacatcgggttcttcaacacc
 gggaccgggaacttcgggctgttcaactcgggcagttacagcaccgggtgtggggaatgcg
 ggcacggccagcaccgggttgttcaacgcggggaacttcaacaccgggtctggccaatgcc
 10 ggctcctacaacaccggcagcctcaacgtgggcagcttcaacaccggcgccgtcaaccg
 ggcaccgtcaacaccggctgggttcaacaccggccacaccaacaccggcctgttcaacacc
 ggcaacgtcaacaccggcggttcaactccggcagcttcaacaacggggcgctgtggacc
 ggtgactaccacgggctgggtcggcttctccttcagcatcgacatcgccggcagcaccctg
 ctggacctcaacgaaacctcaacctgggccccatccacatcgagcagatcgacatcccc
 15 ggcatgtcgtgttgcaggtccacgaaatcgtcgagatcggacccttcaccatcccgcag
 gtcgatgttcccgcgataccgctagagatccacgaatcgatccacatggatcccatcgtc
 ctggtgcccgccaccacaattcccgcacagacgagaaccattccgctggacatccccgcc
 tcaccgggtcaaccatgacgcttccgctcatcgatgcgcttcgaaggcgaggactgg
 atcctcgggtcgaccgcggcgattcccaatttcggagaccccttcccggcgcccaccag
 20 ggcacaccattcacaccggccctggccccggaacgaccggcgagctcaagatatctatt
 ccgggtttcgagattccgcaaatacgtaccacgagattcctgttggacgtgaacatcagc
 ggtggtctgccggccttcaccttgttcgcgggtggcctgacgatccccacgaacgccatc
 ccgttaacgatcgatgcgtccggcgcgctggatccgatcacgattttcccgggtgggtac
 acgatcgaccgctgccgctgcacctggcgctgaatctcaccgtgcccagacagcagcatc
 25 ccgatcatcgatgtcccgcgacgccagggttcgggaacaccacggcgaccccgctcgtcg
 gggttcttcaactccggcgccgggtgggggtgtcgggggttcggaaacgtcgggtcgaacctg
 tcgggctggtggaaccaggcgggcgagcgcgctggcggggtcgggatcgggggtgttgaat
 gtcggcacgctgggctcgggtgtgctcaacgtcgggtcgggtgtctcggggatctaac
 accagcgtgttgccgctcgggacgccggcggtgctgtcgggcctcggcaacgtcggccat
 30 cagctgtcgggcgtgtctgcggccgggaccgcgttgaaccagatccccatcctcaacatc
 ggggttggcggtgtgggcaacttcaacgtcgggttcggcaacgtcggggacgttaacctg
 ggcgcggccaacctcgggtgcgcaaaacctggggctgggcaacgtcggcaccgggaacctc

ggcttcgccaacgtcggccacggcaatatcggtttcggcaattcgggtctgaccgccggc
 gcggccggcctgggcaacacggggttcggcaatgccggcagcgccaactatggtttcgcc
 aaccagggcggtgcgcaacatcgggttgccaacaccggcaccggcaacatcgggatcggg
 ctggtgggggacaacctcaccggcatcgggggcctgaactccggtgccggcaatatcggc
 5 ttgttcaactccggcaccggcaacatcgggttcttcaactccgggaccggcaacttcggc
 atcggtaactcgggcagcttcaacaccggcatcggcaatagcggaacgggcagcactggg
 ctcttcaatgccggcagcttcaacaccggcggtggccaacgccggcagctacaacaccggc
 agcttcaatgccggcgacaccaacaccgggggggttcaaccgggcaccatcaacaccggc
 tggttcaacaccggccacaccaataaccggcatcgccaactcgggcaacgtcggcaccggc
 10 gcgttcattgtcgggcaacttcagcaacggcctgttggtggcggggtgatcacgagggcctg
 ttcagcctgttctacagcctcgacgtgccccggatcaccatcgtggacgccacctcgac
 ggcggcttcggacccgtggctctcccgcccatcccggtgccggccgtaatgcgcacctg
 accggaaacgtcgcgatgggcgcattcaccattccgcagatcgacatccccgcactcacc
 ccaaacatcaccggaagcgccgccttccgcatcgttggtgggggtccgtgcgcattccgccg
 15 gtgagtgtcattgtggagcaaataatcaacgcctcgggtggggcgagatgaggatagat
 cccttcgaaatgtggactcaaggcactaatggccttggtataaccttctattcattcgga
 tcggccgacggttcgccctacgccaccggcccactcgttttcggcgccggcagagcgac
 ggaagccatctcaccatttccgcgtccagcggggcggtttaccactccgcagctcgaaact
 ggcccgatcacgttgggcttccaggtgcccggcagcgtcaacgcgatcacctcttcccc
 20 ggtggtttgacgttcccggcgacctcgctgctgaacctggacgtgaccgccggcgccggc
 ggcgtggacatcccggccatcacctggcccgagatcgcggcgagcgccgacggctcggtg
 tatgtcctcgccagcagcatcccgtgatcaacatcccggccacccgggcattgggaac
 agcaccatcaccccgctcgtcgggcttcttcaacgccggcgcgggcgggggatcgggcttc
 ggcaacttcggcgcgggcacctcgggctggtggaaccaggcgcacaccgcgctggcgggg
 25 gcgggctcggggttttgccaacggttggcacgctgcattccggtgtgctcaacctgggctcg
 ggtgtctcggggatctacaacaccagcacgctgggggtggggaccccgcgctggtctca
 ggcctgggcaacgtcggccaccaactgtcggggctgctttccggcggggtccgcggtgaac
 ccggtgaccgttctgaatatcgggttgccaacgtcggcagccacaacgccggtttcggc
 aatgtcggggaggtcaacctgggcgcggccaacctcggcgcgcaccaacctgggcttcgga
 30 aatatcggcgccggcaacctgggggttcggcaatattggccacggcaatgtcggagtcggc
 aactcgggtctgaccgcgggcgtgccgggcctgggcaatgtgggggtgggcaatgccggc
 ggcaacaactgggggttgccaacgtgggcgtgggcaatatcgggttgccaacaccggc

accggcaacattgggatcgggctgaccggcgactaccagaccggcatcggcggcctaaat
 tccggtgcccggcaacctgggggttggtcaactccggcgccggcaacgtcgggttcttcaac
 accgggaccgggaacttcgggttggtcaactccggcagcttcaacaccggcgctcggcaat
 agcgggaacgggcagcactgggctcttcaatgccggcagtttcaacaccgggtgtggccaac
 5 gccggcagctacaacacgggcagcttcaatgtcgggtgacaccaacaccgggggcttcaac
 ccgggcagcatcaacaccgggtggtcaacgccgggaacgccaacaccgggggtggccaac
 gcgggcaatgtcaacaccggcgcccttcgtcaccgggaacttcagcaacggcatcctgtgg
 cgcggcgactaccagggcctggccgggttcgccgtgggctacaccctcccgctgttcccc
 gcggtgggcgcccagctcagcggcgggatcgggccgattaccgtgctgccgcccattccac
 10 atcccgcccattccgggtcggcttcgcccggtcgggtggcatcggcccgatcgccatcccg
 gacatctctgttccatccattcacttgggcctcgaccccgccgtccatgtcgggtccatc
 accgtcaaccccattaccgtcaggaccccgcccggtgctcgtcagttactccaaggagcc
 gtcaccagcacgtccggaccaacctcagagatttggtcaagcccagcttcttccccgga
 atccggatcgcgccctctagcggcggggtgcaacgtccacgcaaggggcatactttgtg
 15 gggcccatctccatccccctccggcacgggtgaccttcccgggattcaccatccccctcgac
 ccgatcgacatcggcctgccggtgctcgtgaccatcccgggggttcaccatcccgggcggc
 accctgatccccaccctcccgctgggcctcgcggtgtccaatggcatcccggccgctcgac
 atcccggccatcggttctcgaccggatcttgcgtggacctgcacgccgacaccactatcggc
 ccgatcaacgtcccgatcgccgggttcggcggggcgccgggttcgggaactcgaccacg
 20 ctgccgtcgtcgggcttcttcaacaccggagctggcggcgggttcgggcttagcaacacc
 ggcgcgggcatgtcgggattgctcaacgcgatgtcggatccgctgctcgggtcggcgctcg
 ggcttcgccaacttcggcacccagctctccggcatcctcaaccggcgccggcatctcg
 ggctgtacaacaccggcgcgctgggtgtgtcaccggcgccgtcgtctcgggtttcggc
 aacgtcggccagcaactgtcgggcttgctcttcaccggcgctcgggccctaa
 25 (SEQ ID NO: 26)

Esses polinucleotídeos incluem seqüências de DNA, cDNA e
 RNA que codificam o polipeptídeo de interesse. Mutações silenciosas na
 seqüência de codificação resultam da degeneração (isto é, redundância) do
 código genético, com o que mais de um códon pode codificar o mesmo resí-
 30 duo de aminoácido. Então, por exemplo, leucina pode ser codificada por
 CTT, CTC, CTA, CTG, TTA ou TTG; serina pode ser codificada por TCT,
 TCC, TCA, TCG, AGT ou AGC; asparagina pode ser codificada por AAT ou

AAC; ácido aspártico pode ser codificado por GAT ou GAC; cisteína pode ser codificada por TGT ou TGC; alanina pode ser codificada por GCT, GCC, GCA ou GCG; glutamina pode ser codificada por CAA ou CAG; tirosina pode ser codificada por TAT ou TAC; e isoleucina pode ser codificada por ATT, ATC ou ATA. Tabelas mostrando o código genético padrão podem ser encontradas em várias fontes (por exemplo, L. Stryer, 1988, *Biochemistry*, 3ª Edição, W.H. Freeman e Co., NY).

Um ácido nucléico codificando um polipeptídeo de Mtb pode ser clonado ou amplificado através de métodos *in vitro*, tal como a reação em cadeia de polimerase (PCR), a reação em cadeia da ligase (LCR), o sistema de amplificação baseado em transcrição (TAS), o sistema de replicação de seqüência auto-sustentado (3SR) e o sistema de amplificação da Q β replicase (QB). Por exemplo, um polinucleotídeo codificando a proteína pode ser isolado através de reação em cadeia de polimerase de cDNA usando iniciadores com base na seqüência de DNA da molécula. Uma ampla variedade de metodologias de clonagem e amplificação *in vitro* é bem-conhecida da pessoa versada na técnica. Métodos de PCR são descritos na, por exemplo, Patente U.S. Nº 4.683.195; Mullis e outros, Cold Spring Harbor Symp. *Quant. Biol.* 51:263, 1987; e Erlich, ed., *PCR Technology* (Stockton Press, NY, 1989). Polinucleotídeos podem ser também isolados através de bibliotecas genômicas ou de cDNA com sondas selecionadas das seqüências do polinucleotídeo desejado sob condições de hibridização estridentes.

Os polinucleotídeos codificando um polipeptídeo de Mtb incluem um DNA recombinante que é incorporado em um vetor em um plasmídeo ou vírus autonomamente replicante ou no DNA genômico de um procarionte ou eucarionte, ou que exista como uma molécula separada (tal como um cDNA). Os nucleotídeos da invenção podem ser ribonucleosídeos, desoxirribonucleotídeos ou formas modificadas de qualquer nucleotídeo. O termo inclui formas simples ou duplas de DNA.

Em uma modalidade, vetores são usados para expressão em levedura tal como *S. cerevisiae* ou *Kluyveromyces lactis*. Vários promotores são conhecidos ser de utilidade em sistemas de expressão de levedura tal

como os promotores constitutivos da membrana de plasma H^+ -ATPase (*PMA1*), gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (*GPD*), fosfoglicerato cinase-1 (*PGK1*), álcool desidrogenase-1 (*ADH1*) e bomba resistente a fármaco pleitrópica (*PDR5*). Ainda, promotores induzíveis podem ser de utilidade, tal

5 como *GAL1-10* (induzido por galactose), *PHO5* (induzido por pouco fosfato inorgânico extracelular) e elementos HSE de choque térmico em tandem (induzidos por elevação da temperatura para 37° C). Promotores que direcionam expressão variável em resposta a indutor titulável incluem os promotores *MET3* e *MET25* responsivos à metionina e promotores *CUP1* dependentes de cobre. Qualquer um desses promotores pode ser clonado em

10 plasmídeos de multicópia (2 μ) ou cópia única (*CEN*) para dar um nível adicional de controle em nível de expressão. Os plasmídeos podem incluir marcadores nutricionais (tal como *URA3*, *ADE3*, *HIS1* e outros) para seleção em levedura e resistência a antibiótico (*AMP*) para propagação em bactérias.

15 Plasmídeos para expressão de *K. lactis* são conhecidos, tal como pKLAC1. Então, em um exemplo, após amplificação em bactérias, plasmídeos podem ser introduzidos nos auxótrofos de levedura correspondentes através de métodos similares à transformação bacteriana.

Os polipeptídeos de Mtb podem ser expressos em uma variedade de cepas de levedura. Por exemplo, sete transportadores resistentes a

20 fármaco pleiotrópicos, *YOR1*, *SNQ2*, *PDR5*, *YCF1*, *PDR10*, *PDR11* e *PDR15*, junto com seus fatores de transcrição de ativação, *PDR1* e *PDR3*, foram simultaneamente deletados em células hospedeiras de levedura, tornando a cepa resultante sensível a fármacos. Cepas de levedura com composição de lipídeo alterada da membrana do plasma, tal como o mutante *erg6*

25 defeituoso em biossíntese de ergosterol, podem ser também utilizadas. Proteínas que são altamente sensíveis à proteólise podem ser expressas em uma levedura sem a endopeptidase vacuolar máster Pep4, que controla a ativação de outras hidrolases vacuolares. Expressão heteróloga em cepas

30 carregando alelos de genes sensíveis à temperatura (*ts*) pode ser empregada se o mutante nulo correspondente for inviável.

Vetores virais podem ser também preparados codificando os

polipeptídeos de Mtb descritos aqui. Vários vetores virais foram construídos, incluindo polioma, SV40 (Madzak e outros, 1992, *J. Gen. Virol.*, 73:1533-1536), adenovírus (Berkner, 1992, *Cur. Top. Microbiol. Immunol.*, 158:39-6; Berliner e outros, 1988, *Bio Techniques*, 6:616-629; Gorziglia e outros, 1992, *J. Virol.*, 66:4407-4412; Quantin e outros, 1992, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, 89:2581-2584; Rosenfeld e outros, 1992, *Cell*, 68:143-155; Wilkinson e outros, 1992, *Nucl. Acids Res.*, 20:2233-2239; Stratford-Perricaudet e outros, 1990, *Hum. Gene Ther.*, 1:241-256), vírus vaccínia (Mackett e outros, 1992, *Biotechnology*, 24:495-499), vírus adenoassociado (Muzyczka, 1992, *Curr. Top. Microbiol. Immunol.*, 158:91-123; On e outros, 1990, *Gene*, 89:279-282), herpes víruses including HSV e EBV (Margolskee, 1992, *Curr. Top. Microbiol. Immunol.*, 158:67-90; Johnson e outros, 1992, *J. Virol.*, 66:2952-2965; Fink e outros, 1992, *Hum. Gene Ther.* 3:11-19; Breakfield e outros, 1987, *Mol. Neurobiol.*, 1:337-371; Fresse e outros, 1990, *Biochem. Pharmacol.*, 40:2189-2199), Sindbis vírus (H. Herweijer e outros, 1995, *Human Gene Therapy* 6:1161-1167; Patente U.S. Nº 5.091.309 e Patente U.S. Nº 5.2217.879), alfavírus (S. Schlesinger, 1993, *Trends Biotechnol.* 11: 18-22; I. Frolov e outros, 1996, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 93:11371-11377) e retrovírus de ave (Brandyopadhyay e outros, 1984, *Mol. Cell Biol.*, 4:749-754; Petropoulos e outros, 1992, *J. Virol.*, 66:3391-3397), murino (Miller, 1992, *Curr. Top. Microbiol Immunol.*, 158:1-24; Miller e outros, 1985, *Mol. Cell Biol.*, 5:431-437; Sorge e outros, 1984, *Mol. Cell Biol.*, 4:1730-1737; Mann e outros, 1985, *J. Virol.*, 54:401-407) e origem humana (Page e outros, 1990, *J. Virol.*, 64:5370-5276; Buchsachlcher e outros, 1992, *J. Virol.*, 66:2731-2739). Vetores de baculovírus (vírus de poliedrose multinuclear de *Autographa californica*; AcMNPV) também são conhecidos na técnica, e podem ser obtidos de fontes comerciais (tal como PharMingen, São Diego, Calif.; *Protein Sciences Corp.*, Meriden, Conn.; Stratagene, La Jolla, Calif.).

Vetores virais, tal como vetores poxvirais, que codificam um polipeptídeo de Mtb incluem pelo menos um elemento de controle de expressão operacionalmente ligado à sequência de ácido nucléico codificando o polipeptídeo Mtb. Os elementos de controle de expressão são inseridos no

vetor viral para controlar e regular a expressão da seqüência de ácido nucléico. Exemplos de elementos de controle de expressão de utilidade nesses vetores incluem, mas não estão limitados a, sistema lac, regiões operadoras e promotoras de fago lambda, promotores de levedura e promotores derivados de polioma, adenovírus, retrovírus ou SV40. Elementos operacionais adicionais incluem, mas não estão limitados a, seqüência líder, códons de terminação, sinais de poliadenilação e quaisquer outras seqüências necessárias para a transcrição apropriada e tradução subsequente das seqüências de ácido nucléico codificando o polipeptídeo de Mtb no sistema hospedeiro.

5 O vetor de expressão pode conter elementos adicionais necessários para a transferência e subsequente replicação do vetor de expressão contendo a seqüência de ácido nucléico no sistema hospedeiro. Exemplos de tais elementos incluem, mas não estão limitados a, origens de replicação e marcadores selecionáveis. Será ainda compreendido por um versado na técnica

10 que tais vetores são facilmente construídos usando métodos convencionais (Ausubel e outros (1987) e "Current Protocols in Molecular Biology", John Wiley and Sons, Nova York, N.Y.) e estão comercialmente disponíveis.

15

Seqüências de DNA codificando um polipeptídeo de Mtb podem ser expressas *in vitro* através de transferência de DNA para uma célula hospedeira adequada. A célula pode ser procariótica ou eucariótica. O termo também inclui qualquer progênie da célula hospedeira objeto. É compreendido que toda a progênie pode não ser idêntica à célula de origem uma vez que pode haver mutações que acontecem durante replicação. Métodos de transferência estável, significando que o DNA estrangeiro é continuamente

20 mantido no hospedeiro, são conhecidos na técnica.

25

Conforme acima mencionado, uma seqüência de polinucleotídeo codificando um polipeptídeo de Mtb pode ser operativamente ligada a seqüências de controle de expressão. Uma seqüência de controle de expressão operativamente ligada a uma seqüência de codificação é ligada de modo

30 que expressão da seqüência de codificação é conseguida sob condições compatíveis com as seqüências de controle de expressão. As seqüências de controle de expressão incluem, mas não estão limitadas a, promotores, au-

mentadores, terminadores de transcrição, um códon curto (isto é, ATG) em frente a um gene de codificação de proteína, sinal de união para introns, manutenção da estrutura de leitura correta daquele gene para permitir tradução apropriada de mRNA e códons de parada.

5 Células hospedeiras podem incluir células hospedeiras microbianas, de levedura, inseto e mamífero. Métodos de expressão de seqüências de DNA tendo seqüências eucarióticas ou virais em procariontes são bem-conhecidos na técnica. Exemplos não-limitantes de células hospedeiras adequadas incluem células de bactérias, archaea, inseto, fungos (por exemplo, 10 levedura), micobactéria (tal como *M. smegmatis*), planta e células animais (por exemplo, células de mamífero, tal como humano). Células exemplares de uso incluem *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Salmonella typhimurium*, células SF9, células C129, células 293, Neurospora, e cepas de células mielóide e linfóide de mamífero imortalizadas. Técnicas 15 para a propagação de células de mamífero em cultura são bem-conhecidas (vide Jakoby e Pastan (Eds.), 1979, *Cell Culture. Methods in Enzymology*, volume 58, Academic Press, Inc., Harcourt Brace Jovanovich, N.Y.). Exemplos de cepas de célula hospedeira de mamífero geralmente usadas são células VERO e HeLa, células CHO, e WI38, BHK, e cepas de 20 célula COS, embora cepas de célula possam ser usadas, tal como células planejadas para prover padrões de glicosilação desejáveis maiores, ou outras características. Conforme acima discutido, técnicas para a transformação de células de levedura, tal como transformação de polietileno glicol, transformação de protoplasto e as pistolas de gene são também conhecidas 25 na técnica (vide Gietz e Woods, *Methods in Enzymology* 350:87-96, 2002).

Transformação de uma célula hospedeira com DNA recombinante pode ser realizada através de técnicas convencionais como são bem-conhecidas daqueles versados na técnica. Onde o hospedeiro for procariótico, tal como, mas não limitado a, *E. coli*, células competentes que são capazes 30 de absorção de DNA podem ser preparadas a partir de células coletadas após fase de crescimento exponencial e subsequente tratadas através do método de CaCl_2 usando procedimentos bem-conhecidos na técnica. Al-

ternativamente, $MgCl_2$ ou $RbCl$ pode ser usado. Transformação pode ser também realizada após formação de um protoplasto da célula hospedeira se desejado, ou através de eletroporação.

Quando o hospedeiro é um eucarionte, tais métodos de trans-
 5 fecção de DNA como co-precipitados de fosfato de cálcio, procedimentos mecânicos convencionais tal como microinjeção, eletroporação, inserção ou plasmídeo envolvido em lipossomas, ou vetores virais podem ser usados. Células eucarióticas podem também ser co-transformadas com seqüências de polinucleotídeo codificando um polipeptídeo de *Mtb*, e uma segunda mo-
 10 lécula de DNA estrangeiro codificando um fenótipo selecionável, tal como gene timidina cinase de herpes simplex. Outro método é usar um vetor viral eucariótico, tal como vírus símio 40 (SV40) ou vírus papiloma bovino, para transientemente infectar ou transformar células eucarióticas e expressar a proteína (vide, por exemplo, *Eukaryotic Viral Vectors*, Cold Spring Harbor
 15 Laboratory, Gluzman ed., 1982).

Método para Detecção de uma Infecção com *Mtb*: Detecção de Células T

Métodos para detecção de uma infecção com *Mycobacterium* em um indivíduo são descritos aqui. Em várias modalidades, uma infecção com *Mycobacterium* pode ser detectada com base na presença de células T
 20 em uma amostra biológica, onde as células T especificamente reagem com um polipeptídeo de *Mtb* descrito aqui (vide acima).

Em várias modalidades, uma amostra biológica compreendendo células T é obtida de um indivíduo de interesse. Amostras biológicas adequadas incluem, mas não estão limitadas a, amostras de sangue, células
 25 mononucleares de sangue periférico, esputo, saliva, fluido do cordão espi-nhal ou amostras de célula T isoladas (tal como células T $CD8^+$ e/ou células $CD4^+$), tecido de nó linfático, tecido pulmonar ou outra amostra de tecido. Em um exemplo, a amostra é incubada com um polipeptídeo de *Mycobacte-rium*, conforme aqui descrito, um polinucleotídeo codificando o polipeptídeo
 30 de *Mtb* e uma APC que expressa o polipeptídeo de *Mtb* ou um fragmento dele que se liga a MHC. A presença ou ausência de ativação específica das células T é detectada.

As células T CD8⁺ e/ou células T CD4⁺ que reconhecem o peptídeo no método de detecção foram geralmente pré-sensibilizadas *in vivo* para o polipeptídeo de Mtb de interesse. Em várias modalidades, essas células T experientes em peptídeo estão geralmente presentes no sangue periférico de um hospedeiro que foi exposto ao antígeno em uma frequência de 1 a 10⁶ a 1 em 10³ células mononucleares de sangue periférico (PBMCs).

Em um exemplo, a amostra são células T isoladas. Por exemplo, células T podem ser isoladas de um indivíduo de interesse através de técnicas de rotina (tal como através de centrifugação de gradiente de densidade Ficoll/Hypaque de linfócitos de sangue periférico ou através de seleção de célula ativada por fluorescência). Em uma modalidade, as células T usadas no ensaio estão na forma de amostras não-processadas ou diluídas, ou são células T recém-isoladas (tal como na forma de células mononucleares recém-isoladas (MCs) ou células mononucleares de sangue periférico (PBMCs) que são usadas diretamente *ex vivo*, de modo que elas não são cultivadas antes de serem usadas no método. No entanto, as células T podem ser cultivadas antes do uso, por exemplo, na presença de um ou mais dos peptídeos, e geralmente também citocinas de promoção de crescimento exógenas. Durante cultura os peptídeos são tipicamente apresentados na superfície de células tal como APCs. Pré-cultura das células T pode levar a um aumento na sensibilidade do método. Então, as células T podem ser convertidas em cepas celulares, tal como cepas de célula de curto prazo.

Em várias modalidades, as células T são incubadas *in vitro* por dois a nove dias, tal como cerca de quatro dias, a 37° C com um polipeptídeo de Mtb ou fragmento dele que liga MHC. Em vários exemplos, o polipeptídeo de Mtb ou fragmento dele que liga MHC está incluído (em uma concentração de, por exemplo, cerca de 5 a cerca de 25 µg/ml, tal como cerca de 5, cerca de 10, cerca de 15 ou cerca de 20 µg/ml). Em vários exemplos, outra alíquota de uma amostra de célula T pode ser incubada na ausência do polipeptídeo de Mtb como um controle.

Em uma modalidade, células mononucleares (MCs) são separadas da amostra. As MCs incluem as células T e células apresentando anti-

geno (APCs). Então no método as APCs presentes nas MCs separadas podem apresentar o peptídeo às células T. Em outra modalidade apenas células T, tal como apenas células T CD8⁺, apenas células T CD4⁺ ou apenas células T CD3⁺, podem ser purificadas da amostra.

5 A APC usada no método pode ser qualquer célula que tenha moléculas do MHC Classe I em sua superfície. Ela pode ou não ser uma célula apresentando antígeno especializada, tal como uma célula B, célula dendrítica ou macrófago. A APC usada no método pode ser do mesmo hospedeiro que a célula T. Em geral, a APC é capaz de apresentar o peptídeo a
10 uma célula T. A APC pode ser uma célula *ex vivo* recém-isolada ou uma célula cultivada tal como a célula de uma cepa de célula.

 Células T derivadas de uma amostra do indivíduo de interesse podem ser postas em um ensaio com todos os polipeptídeos de Mtb (ou um grupo dos polipeptídeos de Mtb, ou um polipeptídeo de Mtb específico) que
15 é pretendido testar o painel relevante ou as células T podem ser divididas e postas em ensaios separados cada um dos quais contém um ou mais dos peptídeos. Em uma modalidade, um ou mais dos polipeptídeos com uma sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NOs: 1-12, ou um fragmento de um ou mais desses polipeptídeos que ligam MHC, são utilizados.
20 Dois ou mais de qualquer um dos peptídeos de Mtb descritos aqui podem ser usados para uso simultâneo, separado ou sequencial de células T que reconhecem esses polipeptídeos. Combinações adicionais de qualquer um dos polipeptídeos de MTb descritas aqui podem ser utilizadas.

 Em uma modalidade o um ou mais polipeptídeo(s) é(são) provido(s) a células apresentando na ausência da célula T. Esta célula é então provida a células T isoladas do indivíduo, tipicamente após serem deixadas apresentar o peptídeo em sua superfície.

 A duração que o peptídeo é contatado com as células vai variar dependendo do método usado para determinação do reconhecimento do
30 peptídeo. Tipicamente 10⁵ a 10⁷, tal como 5 x 10⁵ a 10⁶ PBMCs são adicionadas a cada ensaio. No caso onde peptídeo é adicionado diretamente ao ensaio sua concentração é tipicamente de a partir de 10⁻¹ a 10³ µg/ml, tal

como cerca de 0,5 a cerca de 50 µg/ml ou cerca de 1 a cerca de 10 µg/ml. A duração de tempo pela qual as células T são incubadas com o peptídeo pode ser de a partir de cerca de 4 a cerca de 24 horas, tal como de a partir de cerca de 6 a cerca de 16 horas, ou por cerca de 12 horas.

5 A determinação do reconhecimento específico do peptídeo pelas células T pode ser feita medindo a ligação do peptídeo às células T. Tipicamente células T que ligam o peptídeo podem ser selecionadas com base nesta ligação, por exemplo, usando uma técnica de seleção de célula ativada por fluorescência (FACS). A detecção da presença de células T que re-
10 conhecem o peptídeo será considerada ocorrer se a frequência de células selecionadas usando o peptídeo for acima de um valor controle.

 Determinação de se as células T reconhecem o peptídeo pode ser também feita através da detecção de uma mudança no estado das células T na presença do peptídeo ou determinação de se as células T ligam o
15 peptídeo. A mudança em estado é geralmente causada por atividade funcional específica de antígeno da célula T após o receptor de célula T ligar o peptídeo. Em geral quando ligando o receptor de célula T o peptídeo é ligado a uma molécula do MHC classe I, que pode estar presente na superfície de uma PBMC ou uma célula apresentando antígeno (APC).

20 A ativação de célula T pode ser detectada através de quaisquer meios conhecidos de um versado na técnica. Em um exemplo, ativação de célula T CD8⁺ é detectada através da varredura da atividade citolítica. Em outro exemplo, ativação de célula T CD8⁺ e/ou ativação de célula T CD4⁺ é detectada através de proliferação. Em vários exemplos, um nível de prolifera-
25 ção que é pelo menos duas vezes maior e/ou um nível de atividade citolítica que é pelo menos 20% maior do que em indivíduos não-infectados indica a presença de uma infecção com *Mycobacterium* no indivíduo de interesse.

 A mudança em estado da célula T pode ser o início de ou aumento em secreção de uma substância da célula T, tal como uma citocina,
30 tal como interferon (IFN)-γ, IL-2 ou TNF-α. Em um exemplo, a substância pode ser detectada permitindo que ela se ligue a um agente de ligação específico e então medição da presença do complexo agente de ligação espe-

cífico/substância. O agente de ligação específico é tipicamente um anticorpo, tal como anticorpos policlonais ou monoclonais que ligam a substância, tal como a citocina. Anticorpos para citocinas estão comercialmente disponíveis, ou podem ser feitos usando técnicas padrão.

5 Tipicamente o agente de ligação específico tal como o anticorpo é imobilizado em um apoio sólido. Após a citocina ser deixada ligar o apoio sólido pode opcionalmente ser lavado para remover material que não está especificamente ligado ao anticorpo. O complexo anticorpo/citocina pode ser detectado usando um segundo agente de ligação que ligará o complexo, tal
10 como um anticorpo que é marcado (ou diretamente ou indiretamente) com um marcador. Geralmente, o segundo agente liga a substância em um sítio que é diferente do sítio que liga o primeiro agente.

Em vários exemplos, o segundo agente de ligação pode ser detectado por um terceiro agente que é marcado diretamente ou indiretamente por um marcador detectável. Por exemplo, o segundo agente pode incluir
15 uma biotina, permitindo detecção de um terceiro agente que compreende uma estreptavidina e um marcador, tal como um marcador enzimático, radioativo ou fluorescente.

Em uma modalidade o sistema de detecção é um ensaio ELISPOT, tal como um ensaio descrito na publicação PCT N° WO 98/23960, incorporada aqui a título de referência. Em um exemplo, IFN- γ secretado da célula T é ligado por um primeiro anticorpo específico de IFN- γ que é imobilizado em um apoio sólido. O IFN- γ ligado é então detectado usando um segundo anticorpo específico de IFN- γ que é marcado com um marcador detectável. Anticorpos marcados exemplares estão comercialmente disponíveis, tal como da MABTECH® (Estocolmo, Suécia). Um ensaio ELISPOT exemplar é descrito na seção de Exemplos abaixo.

20
25

A mudança em estado da célula T que pode ser também medida pode ser o aumento na absorção de substâncias pela célula T, tal como a absorção de timidina. A mudança em estado pode ser também medida por
30 um aumento no tamanho das células T, ou proliferação das células T, ou uma mudança nos marcadores de superfície celular na célula T.

Reagentes são providos aqui para a detecção de células expressando CD8(CD8⁺) que especificamente ligam um polipeptídeo de Mtb conforme aqui descrito. Esses reagentes são complexos I do MHC Classe/polipeptídeo de TARP imunogênico tetraméricos. Esses complexos tetraméricos incluem um polipeptídeo de Mtb, tal como um polipeptídeo de nove a vinte aminoácidos de comprimento que especificamente liga MHC classe I.

Complexos de MHC Classe I/peptídeo tetraméricos podem ser sintetizados usando métodos bem-conhecidos na técnica (Altmann e outros, *Science* 274:94, 1996, que é aqui incorporado a título de referência). Em um exemplo não-limitante específico, polipeptídeo de cadeia pesada HLA purificado e β 2-microglobulina (β 2m) podem ser sintetizados por meio de um sistema de expressão procariótico. Um exemplo não-limitante, específico, de um sistema de expressão de utilidade é o sistema pET (R&D Systems, Minneapolis, MN). A cadeia pesada é modificada através de deleção da transmembrana e filamento citosólico e adição de terminal COOH de uma sequência contendo o sítio de biotilação enzimático de biotina proteína ligase (Bir-A). Cadeia pesada, β 2m, e peptídeo são então redobrados. O produto redobrado pode ser isolado através de quaisquer meios conhecidos na técnica, e então biotinilados por Bir-A. Um tetrâmero é então produzido através de contato do produto biotinilado com estreptavidina.

Em uma modalidade, a estreptavidina é marcada. Marcadores adequados incluem, mas não estão limitados a, enzimas, contas magnéticas, contas magnéticas coloidais, haptenos, fluorcromos, compostos de metal, compostos radioativos ou fármacos. As enzimas que podem ser conjugadas à estreptavidina incluem, mas não estão limitadas a, fosfatase alcalina, peroxidase, urease e β -galactosidase. Os fluorcromos que pode ser conjugados à estreptavidina incluem, mas não estão limitados a, fluoresceína isotiocianato, tetrametilrodamina isotiocianato, ficoeritrina, aloficocianinas e Texas Red. Para fluorcromos adicionais que podem ser conjugados à estreptavidina, vide Haugland, R.P. *Molecular Probes: Handbook of Fluorescent Probes and Research Chemicals* (1992-1994). Os compostos de metal

que podem ser conjugados à estreptavidina incluem, mas não estão limitados a, ferritina, ouro coloidal, e, particularmente, contas superparamagnéticas coloidais. Os haptenos que podem ser conjugados à estreptavidina incluem, mas não estão limitados a, biotina, digoxigenina, oxazalona e nitrofenol. Os compostos radioativos que podem ser conjugados à estreptavidina são conhecidos na técnica, e incluem, mas não estão limitados a, tecnécio 99m (^{99}Tc), ^{125}I e aminoácidos compreendendo quaisquer radionuclídeos, incluindo, mas não limitado a, ^{14}C , ^3H e ^{35}S . Em geral, estreptavidina marcada com um fluorcromo é utilizada nos métodos descritos aqui.

Em uma modalidade suspensão de células incluindo células T que especificamente reconhecem um polipeptídeo de Mtb é produzida, e as células são reagidas com o tetrâmero em suspensão. Em uma modalidade, esses reagentes são usados para marcar células, que são então analisadas através de seleção de célula ativada por fluorescência (FACS). Uma máquina para FACS emprega uma pluralidade de canais de cor, canais de detecção de pouco ângulo e espalhamento de luz obtuso, e canais de impedância, dentre outros níveis de detecção mais sofisticados, para separar ou selecionar células. Qualquer técnica FACS pode ser empregada contanto que ela não seja prejudicial para a detecção das células desejadas. (Quanto a métodos exemplares de FACS vide Patente U.S. Nº 5.061.620, incorporada aqui a título de referência).

Método para Detecção de Infecção com Mtb: Testes de Pele

Em outro aspecto, a presente invenção provê métodos para uso de um ou mais dos polipeptídeos descritos acima para diagnosticar infecção com *Mycobacterium*, e em particular tuberculose, usando um teste de pele. Um "teste de pele" é um ensaio realizado diretamente em um paciente onde uma reação de hipersensibilidade do tipo retardada (DTH) (tal como enrijecimento, inchaço, vermelhidão ou dermatite) é medida seguindo administração à pele, tal como a injeção intradermal de um ou mais polipeptídeos descritos acima. Tal injeção pode ser feita usando qualquer dispositivo adequado suficiente para contatar o polipeptídeo ou polipeptídeos com células dermais do paciente, tal como uma seringa tuberculina ou seringa de 1 ml. Em

vários exemplos, a reação é medida pelo menos 48 horas após injeção, tal como entre cerca de 48 e cerca de 72 horas após injeção.

Uma reação DTH é uma resposta imune mediada por célula que é maior em indivíduos que foram expostos previamente ao antígeno de teste (o polipeptídeo de Mtb, seu fragmento que liga MHC ou sua proteína de fusão). A resposta pode ser medida visualmente, tal como usando uma régua. Em vários exemplos, uma resposta que é maior do que cerca de 0,5 cm de diâmetro, tal como maior do que cerca de 1,0 de diâmetro, é uma resposta positiva, e é indicativa de infecção com *Mycobacterium*.

Os polipeptídeos de Mtb descritos aqui podem ser formulados para uso em um teste de pele como composições farmacêuticas contendo um polipeptídeo e um veículo fisiologicamente aceitável. Essas composições tipicamente contêm um ou mais dos polipeptídeos de Mtb descritos (ou um fragmento dele que liga MHC ou uma proteína de fusão dele) em uma quantidade variando de a partir de cerca de 1 µg a cerca de 100 µg, tal como de a partir de cerca de 10 µg a cerca de 50 µg em um volume de 0,1 ml. O veículo empregado em uma composição farmacêutica pode ser uma solução salina com preservativos apropriados, tal como fenol e/ou TWEEN80®.

Geralmente, o polipeptídeo empregado em um teste de pele é de tamanho suficiente de modo que ele permanece no sítio de injeção por toda a duração do período de reação. Em vários exemplos, um polipeptídeo que é pelo menos de nove aminoácidos de comprimento é suficiente. Sem ser limitado pela teoria, o polipeptídeo é quebrado por macrófagos dentro de horas de injeção para permitir apresentação a células T. Tais polipeptídeos podem conter repetições de uma ou mais das seqüências acima descritas e/ou outras seqüências imunogênicas ou não-imunogênicas.

Então, a determinação do reconhecimento do peptídeo pelas células T pode ser medida *in vivo*. Em vários exemplos, o peptídeo é administrado ao indivíduo e então uma resposta que indica reconhecimento do peptídeo pode ser medida. Em uma modalidade o peptídeo é administrado intradermalmente, tipicamente de uma maneira similar ao teste Mantoux. O peptídeo pode ser administrado epidermalmente. O peptídeo é tipicamente

administrado através de agulha, tal como através de injeção, mas pode ser administrado através de outros métodos tal como balística, por exemplo, as técnicas de balística que têm sido usadas para aplicar ácidos nucleicos. O pedido EPC Publicado Nº EP-A-0693119 descreve técnicas que podem tipicamente ser usadas para administrar o peptídeo. Em vários exemplos, de a partir de 0,001 a 1000 µg, por exemplo, de a partir de 0,01 a 100 µg ou 0,1 a 10 µg de peptídeo são administrados. Alternativamente um agente pode ser administrado que é capaz de prover o peptídeo *in vivo*. Então um polinucleotídeo capaz de expressar o polipeptídeo pode ser administrado. O polinucleotídeo tipicamente tem qualquer uma das características do polinucleotídeo que é discutido abaixo. Polipeptídeo é expresso do polinucleotídeo *in vivo* e reconhecimento do peptídeo *in vivo* pode ser medido. Tipicamente de a partir de 0,001 a 1000 µg, por exemplo, de a partir de 0,01 a 100 µg a 10 µg de polinucleotídeo são administrados.

15 *Método para Detecção de uma Infecção com Mtb: Detecção de Anticorpos*

São aqui descritos métodos onde os polipeptídeos descritos acima são usados para diagnosticar infecção com *Mycobacterium*, e, em particular, tuberculose. Nessas modalidades, são providos métodos para detecção de infecção com *Mycobacterium* em uma amostra biológica, usando um ou mais dos polipeptídeos acima, sozinhos ou em combinação. Em várias modalidades polipeptídeos múltiplos são empregados. O(s) polipeptídeo(s) é(são) usado(s) em um ensaio para determinar a presença ou ausência de anticorpos para o(s) polipeptídeo(s) em uma amostra biológica (tal como, mas não limitado a, sangue integral, esputo, soro, plasma, saliva ou fluido cerebroespinal) com relação a um controle. A presença de tais anticorpos indica sensibilização prévia a antígenos micobacterianos que pode ser indicativo de infecção Micobacteriana, e em particular tuberculose.

Em uma modalidade onde mais de um polipeptídeo é empregado, os polipeptídeos podem ser complementares, de modo que um polipeptídeo componente vai detectar infecção em amostras onde a infecção não seria detectada por outro polipeptídeo componente). Polipeptídeos complementares podem ser geralmente identificados usando cada polipeptídeo in-

dividualmente para avaliar amostras de soro obtidas de uma série de pacientes conhecidos estar infectados com *Mycobacterium*. Após determinação de quais amostras são corretamente identificadas como positivo com cada polipeptídeo, combinações de dois ou mais polipeptídeos podem ser formuladas que são capazes de detectar infecção na maioria, ou todas, as amostras testadas. Polipeptídeos complementares são de utilidade para melhorar sensibilidade de um teste de diagnóstico. Então, mais de um dos polipeptídeos de Mtb acima descritos pode ser incluído em um ensaio. Polipeptídeos adicionais de Mtb (aqueles não descritos aqui) opcionalmente podem ser incluídos no ensaio.

Existe uma variedade de formatos de ensaio que podem ser usados para detectar anticorpos em uma amostra (vide, por exemplo, Harlow e Lane, *Antibodies: A Laboratory Manual*, Cold Spring Harbor Laboratory (1988), que é incorporado aqui a título de referência). Em geral, a presença ou ausência de uma infecção com Mtb em um paciente pode ser determinada por (a) contato de uma amostra biológica obtida de um paciente com um ou mais polipeptídeos de Mtb; (b) detecção na amostra da presença (ou ausência) de um anticorpo que se liga ao(s) polipeptídeo(s); e (c) comparação do nível de anticorpo com um controle. O controle pode ser um valor padrão, tal como um valor de corte predeterminado. O controle pode ser a quantidade de anticorpos em um indivíduo conhecido estar infectado com Mtb, ou a quantidade de anticorpos que especificamente liga o(s) polipeptídeo(s) em um indivíduo conhecido estar infectado com Mtb.

Em várias modalidades, o ensaio envolve o uso de um polipeptídeo imobilizado em um apoio sólido. Anticorpos que especificamente ligam o(s) polipeptídeo(s) de interesse se ligam ao apoio sólido. O anticorpo ligado pode ser então detectado usando um reagente de detecção que inclui um marcador detectável. Reagentes de detecção adequados incluem anticorpo marcados que se ligam ao complexo anticorpo/polipeptídeo. Reagentes de detecção adequados também incluem segundos anticorpos não-marcados que se ligam ao complexo anticorpo peptídeo e um terceiro anticorpo que liga especificamente o segundo anticorpo. Reagentes de detecção adequa-

dos também incluem polipeptídeo não-ligado marcado com um grupo repórter (tal como em um ensaio semicompetitivo).

Alternativamente, um ensaio competitivo pode ser utilizado, onde um anticorpo que se liga ao polipeptídeo de interesse é marcado com um grupo repórter é incubado com a amostra. Seguindo incubação, o anticorpo é então deixado se ligar ao antígeno imobilizado após incubação do antígeno com a amostra. O ponto até o qual os componentes da amostra inibem a ligação do anticorpo marcado ao polipeptídeo imobilizado é indicativo da reatividade da amostra com o polipeptídeo imobilizado.

Um apoio sólido usado em um ensaio descrito aqui pode ser qualquer material sólido ao qual o antígeno pode ser ligado. Por exemplo, o apoio sólido pode ser uma cavidade de teste em uma placa de microtitulação ou uma membrana de nitrocelulose ou outra adequada. Alternativamente, o apoio sólido pode ser uma conta ou disco, tal como um vidro, fibra de vidro, látex ou um material plástico tal como um poliestireno ou cloreto de polivinila. O apoio pode ser também uma partícula magnética ou um sensor óptico de fibra, tal como aqueles descritos, por exemplo, na Patente U.S. Nº 5.359.681.

Os polipeptídeos podem ser ligados ao apoio sólido usando uma variedade de técnicas. A ligação dos polipeptídeos pode ser realizada através de uma associação não-covalente, tal como adsorção, ou ligação covalente, tal como uma ligação direta entre o antígeno e grupos funcionais no apoio ou uma ligação através de um agente de reticulação.

Para ligação através de adsorção, ligação pode ser conseguida através de contato de um ou mais polipeptídeo(s) de Mtb (geralmente em um tampão) com o apoio sólido por uma quantidade de tempo adequada. O tempo de contato para ligação é tipicamente entre cerca de 1 hora e 1 dia. Em geral, ligação é conseguida através de contato de um apoio sólido de poliestireno ou cloreto de polivinila com uma quantidade de um ou mais polipeptídeo(s) de Mtb variando de a partir de cerca de 10 mg a cerca de 1 µg, tal como cerca de 100 ng de antígeno.

Ligação covalente dos polipeptídeo(s) de Mtb de interesse a um

apoio sólido pode ser geralmente conseguida reagindo o apoio com um reagente bifuncional que reage com ambos o apoio e um grupo funcional, tal como um grupo hidroxila ou amino, no polipeptídeo. Por exemplo, um polipeptídeo de Mtb pode ser ligado a apoios tendo um revestimento de polímero apropriado usando benzoquinona ou através de condensação de um grupo aldeído no apoio com uma amina e um hidrogênio ativo no polipeptídeo (Pierce *Immunotechnology Catalog and Handbook*, em A12 A13, 1991).

Em certas modalidades, o ensaio é um ensaio imunoabsorvente ligado à enzima (ELISA). Este ensaio pode ser realizado primeiro contactando um antígeno de polipeptídeo que foi imobilizado em um apoio sólido (tal como na cavidade de uma placa de microtitulação) com a amostra de uma maneira de modo que os anticorpos presentes dentro da amostra que especificamente liga o polipeptídeo de interesse ligam o polipeptídeo imobilizado. Amostra não-ligada é então removida e um reagente de detecção capaz de ligação ao complexo anticorpo-polipeptídeo imobilizado é adicionado. A quantidade de reagente de detecção que permanece ligada é determinada usando um método apropriado para o reagente de detecção específico. Por exemplo, o método de detecção pode detectar fluorescência ou a presença de uma atividade enzimática.

Em algumas modalidades, o polipeptídeo é imobilizado no apoio; quaisquer sítios de ligação de proteína restantes no apoio são tipicamente bloqueados. Qualquer agente de bloqueio adequado pode ser usado para bloquear os sítios de ligação de proteína não-ligada, de modo que albumina de soro bovino ou TWEEN 20[®] pode ser empregado. O polipeptídeo imobilizado é então incubado com a amostra, e o anticorpo é deixado se ligar ao antígeno. A amostra pode ser diluída com um diluente adequado, por exemplo, um tampão tal como solução salina tamponada com fosfato (PBS) antes da incubação. Em geral, um tempo de contato apropriado (tempo de incubação) é um período de tempo que é suficiente para detectar a presença de anticorpo em uma amostra infectada por *Mycobacterium*. Em um exemplo não-limitante, específico, o tempo de contato é suficiente para atingir um nível de ligação que é pelo menos 95% daquele atingido em equilíbrio entre

anticorpo ligado e não-ligado. O tempo necessário para atingir equilíbrio pode ser determinado ensaiando o nível de ligação que acontece durante um período de tempo. Em temperatura ambiente, um tempo de incubação de cerca de 30 minutos é geralmente suficiente.

5 Amostra não-ligada pode ser então removida através de lavagem do apoio sólido com um tampão apropriado, tal como PBS contendo TWEEN 20® a 0,1%. Um reagente de detecção pode ser então adicionado ao apoio sólido. Um reagente de detecção pode ser qualquer composto que se ligue ao complexo anticorpo imobilizado-poli-peptídeo e possa ser detectado. Em várias modalidades, o reagente de detecção contém um agente de
10 ligação (tal como, por exemplo, Proteína A, Proteína G, imunoglobulina, lectina ou antígeno livre) conjugado a um marcador. Marcadores de utilidade incluem enzimas (tal como peroxidase de rábano silvestre), substratos, cofatores, inibidores, corantes, radionuclídeos, grupos luminescentes, grupos
15 fluorescentes e biotina. A conjugação de um agente de ligação a um marcador pode ser conseguida usando métodos conhecidos na técnica; agentes de ligação conjugados são também comercialmente disponíveis (tal como da Zymed Laboratories, São Francisco, Calif. e Pierce, Rockford, Ill.).

 O reagente de detecção é incubado com o complexo de anticorpo imobilizado-poli-peptídeo por uma quantidade de tempo suficiente para
20 detectar o anticorpo ligado. Uma quantidade apropriada de tempo pode geralmente ser determinada a partir das instruções do fabricante ou avaliando o nível de ligação que acontece durante um período de tempo. Reagente de detecção não-ligado é então removido e reagente de detecção ligado é detectado usando o marcador. Para marcadores radioativos, métodos de con-
25 tagem por cintilação ou autorradiográficos podem ser usados para detecção. Métodos espectroscópicos podem ser usados para detectar corantes, grupos luminescentes e grupos fluorescentes usados como marcadores. Biotina pode ser detectada usando uma avidina acoplada a um marcador diferente, tal
30 como um marcador radioativo, marcador fluorescente ou um marcador enzimático. Marcadores enzimáticos podem ser detectados através da adição de substrato (geralmente por um período de tempo específico), seguido por a-

nálise espectroscópica ou outra dos produtos de reação.

Para determinar a presença ou ausência de anticorpos anti-Micobacterianos na amostra, o sinal detectado do marcador que se liga ao apoio sólido é geralmente comparado com um controle. Em uma modalidade, o controle é um valor padrão, tal como o sinal médio obtido quando o antígeno imobilizado é incubado com amostras de um paciente não-infectado. Em geral, uma amostra gerando um sinal que está dois ou três desvios padrão acima do controle é considerada positiva para infecção com *Mycobacterium*. Em outra modalidade, o valor controle é determinado usando uma *Receiver Operator Curve*, de acordo com o método de Sackett e outros, *Clinical Epidemiology: A Basic Science for Clinical Medicine*, Little Brown and Co., pp. 106-107 (1985). Resumidamente, nesta modalidade, o valor controle é determinado a partir de um gráfico de pares de taxas de verdadeiro positivo (sensibilidade) e taxas de falso positivo (100% de especificidade) que correspondem a cada valor controle possível para o resultado de teste de diagnóstico. O valor controle no gráfico que inclui a área maior é o valor de corte mais preciso, e uma amostra gerando um sinal que é maior do que o valor de corte determinado através deste método é considerado positivo. Alternativamente, o valor de corte pode ser mudado para minimizar a taxa de falso positivo, ou para minimizar a taxa de falso negativo. Em geral, uma amostra gerando um sinal que é maior do que o valor de corte determinado através deste método é considerada positiva para tuberculose.

Em uma modalidade relacionada, o ensaio é realizado em um rápido escoamento ou em formato de teste de tiras ("*strip test*"), onde o antígeno é imobilizado em uma membrana, tal como, mas não limitado a, nitrocelulose. Em um teste rápido por imunoconcentração, anticorpos dentro da amostra se ligam ao polipeptídeo imobilizado conforme a amostra passa pela membrana. Um reagente de detecção (por exemplo, proteína A-ouro coloidal) se liga ao complexo anticorpo-peptídeo conforme a solução contendo o reagente de detecção flui através da membrana. A detecção de reagente de detecção ligado pode ser realizada conforme acima descrito.

Em um exemplo do formato de teste de tira, uma extremidade da

membrana à qual o polipeptídeo é ligado é imersa em uma solução contendo a amostra. A amostra migra ao longo da membrana através de uma região contendo o reagente de detecção e para a área de polipeptídeo imobilizado. A concentração do reagente de detecção no polipeptídeo indica a presença de anticorpos anti-*Mycobacterium* na amostra. Tipicamente, a concentração de reagente de detecção neste estágio gera um padrão, tal como uma linha, que pode ser visualmente lido. A ausência de tal padrão indica um resultado negativo. Em geral, a quantidade de polipeptídeo imobilizado na membrana é selecionada para gerar um padrão visualmente discernível quando a amostra biológica contém um nível de anticorpos que seria suficiente para gerar um sinal positivo em um ensaio imunoabsorvente ligado à enzima (E-LISA). Em várias modalidades, a quantidade de polipeptídeo imobilizado na membrana varia de a partir de cerca de 25 ng a cerca de 1 µg, tal como de a partir de cerca de 50 ng a cerca de 500 ng. Tais testes podem tipicamente ser realizados com um volume muito pequeno de soro ou sangue do paciente.

Método para Detecção de uma Infecção com Mtb: Detecção de Polinucleotídeos

Reagentes de diagnóstico incluem o uso de seqüências de polinucleotídeo codificando um ou mais dos polipeptídeos de Mtb acima descritos. Infecção com *Mycobacterium* pode ser detectada através da detecção da presença, ausência ou nível de mRNA codificando um polipeptídeo de *Mycobacterium* em uma amostra biológica. Em vários exemplos, ensaios de hibridização são utilizados, tal como ensaios *Northern blot* ou *dot blot*. Em exemplos adicionais, ensaios baseados em PCR são utilizados.

Métodos gerais para extração de mRNA são bem-conhecidos na técnica e são descritos em livros padrão de biologia molecular, incluindo Ausubel e outros, *Current Protocols of Molecular Biology*, John Wiley and Sons (1997). Métodos para extração de RNA de tecidos embebidos em parafina são descritos, por exemplo, em Rupp e Locker, *Lab Invest.* 56:A67 (1987) e De Andres e outros, *BioTechniques* 18:42044 (1995). Em particular, isolamento de RNA pode ser realizado usando estojo de purificação, conjunto de

tampão e protease de fabricantes comerciais, tal como QIAGEN®, de acordo com as instruções do fabricante. Por exemplo, RNA total de células em cultura (tal como aquelas obtidas de um indivíduo) pode ser isolado usando minicolunas QIAGEN® RNeasy. Outros estojos de isolamento de RNA comercialmente disponíveis incluem MASTERPURE®. Complete DNA and RNA Purification Kit (EPICENTRE® Madison, Wis.) e Paraffin Block RNA Isolation Kit (Ambion, Inc.). RNA total de amostras de tecido pode ser isolado usando RNA Stat-60 (Tel-Test). RNA preparado uma amostra biológica pode ser isolado, por exemplo, através de centrifugação de gradiente de densidade de cloreto de cério.

Métodos para quantificação de mRNA são bem-conhecidos na técnica. Em um exemplo, o método utiliza reação em cadeia de polimerase de transcriptase reversa (RT-PCR). Geralmente, a primeira etapa em traçado de perfil de expressão de gene através de RT-PCR é a transcrição reversa do molde de RNA em cDNA, seguido por sua amplificação exponencial em uma reação PCR. As duas transcriptases reversas mais comumente usadas são transcriptase reversa do vírus de mieloblastose de ave (AMV-RT) e transcriptase reversa do vírus da leucemia de murino Moloney (MMLV-RT). A etapa de transcrição reversa é tipicamente iniciada usando *iniciadores* específicos, hexâmeros aleatórios ou *iniciadores* oligo-dT, dependendo das circunstâncias e do objetivo de traçado de perfil. Por exemplo, RNA extraído pode ser transcrito reverso usando um GeneAmp RNA PCR Kit (Perkin Elmer, Calif., USA), seguindo as instruções do fabricante. O cDNA derivado pode ser então usado como um molde na reação PCR subsequente.

Embora a etapa de PCR possa usar uma variedade de polimerases de DNA dependentes de DNA termoestável, ela tipicamente emprega a Taq DNA polimerase, que tem uma atividade de 5'-3' nuclease mas não tem uma atividade de 3'-5' endonuclease revisora. Então, TaqMan® PCR tipicamente utiliza a atividade de 5'-nuclease de Taq ou Tth polimerase para hidrolisar uma sonda de hibridização ligada a seu amplicon alvo, mas qualquer enzima com atividade de 5' nuclease equivalente pode ser usada. Dois *iniciadores* de oligonucleotídeo são usados para gerar um amplicon típico de

uma reação PCR. Um terceiro oligonucleotídeo, ou sonda, é projetado para detectar sequência de nucleotídeo localizada entre os dois iniciadores de PCR. A sonda é não-extensível através da enzima Taq DNA polimerase, e é marcada com um corante fluorescente repórter e um corante fluorescente de extinção. Qualquer emissão induzida por laser do corante repórter é extinta pelo corante de extinção quando os dois corantes estão localizados próximos como eles estão na sonda. Durante a reação de amplificação, a enzima Taq DNA polimerase cliva a sonda de uma maneira dependente do molde. Os fragmentos de sonda resultantes dissociam em solução, e sinal do corante repórter liberado é livre do efeito de extinção do segundo fluoróforo. Uma molécula de corante repórter é liberada para cada nova molécula sintetizada, e detecção do corante repórter não-extinto provê a base para interpretação quantitativa dos dados.

TAQMAN[®] RT-PCR pode ser realizada usando equipamento comercialmente disponível, tal como, por exemplo, ABI PRISM 7700[®] Sequence Detection System. TM. (Perkin-Elmer-Applied Biosystems, Foster City, Calif., USA), ou Lightcycler (Roche Molecular Biochemicals, Mannheim, Alemanha). Em uma modalidade, o procedimento de 5' nuclease é realizado em um dispositivo de PCR quantitativa de tempo real tal como o ABI PRISM 7700[®]. Sequence Detection System[®]. O sistema inclui termociclizador, laser, dispositivo acoplado à carga (CCD), câmera e computador. O sistema amplifica amostras em um formato de 96 cavidades em um termociclizador. Durante amplificação, sinal fluorescente induzido por laser é coletado em tempo real através de cabos de fibra óptica para todas as 96 cavidades, e detectado no CCD. O sistema inclui *software* para ativar o instrumento e para análise dos dados.

Em alguns exemplos, dados de ensaio de 5'-nuclease são inicialmente expressos como Ct, ou o ciclo limiar. Conforme acima discutido, valores de fluorescência são registrados durante cada ciclo e representam a quantidade de produto amplificado para aquele ponto na reação de amplificação. O ponto quando o sinal fluorescente é primeiro registrado como estatisticamente significativo é o ciclo limiar (Ct).

Para minimizar erros e o efeito de variação amostra-para-amostra, RT-PCR pode ser realizada usando um padrão interno. O padrão interno ideal é expresso em um nível constante dentre tecidos diferentes, e é não-afetado pelo tratamento experimental. RNAs mais freqüentemente usados para normalizar padrões de expressão de gene são mRNAs para os genes de manutenção gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase (GAPDH), beta-actina e RNA ribossomal 18S.

Uma variação mais recente da técnica de RT-PCR é a PCR quantitativa em tempo real, que mede o acúmulo de produto de PCR através de uma sonda fluorogênica duplamente marcada (isto é, sonda TAQMAN®). PCR em tempo real é compatível com ambas PCR competitiva quantitativa, onde competidor interno para cada seqüência alvo é usado para normalização, e com PCR comparativa quantitativa usando um gene de normalização contido dentro da amostra, ou um gene de manutenção para RT-PCR (vide Held e outros, *Genome Research* 6:986 994, 1996). PCR quantitativa é também descrita na Patente U.S. Nº 5.538.848, cuja descrição é aqui incorporada a título de referência. Sondas e procedimentos de amplificação quantitativos relacionados são descritos na Patente U.S. Nº 5.716.784 e Patente U.S. Nº 5.723.591, cujas descrições são aqui incorporadas a título de referência. Instrumentos para realização de PCR quantitativa em placas de microtitulação estão disponíveis da PE Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Calif. 94404 sob a marca registrada ABI PRISM® 7700.

As etapas de um protocolo representativo para quantificação de expressão de gene usando tecidos embebidos em parafina, fixados, como uma fonte de RNA, incluindo isolamento de mRNA, purificação, extensão e amplificação de *iniciador* são dadas em vários artigos de jornal publicados (vide Godfrey e outros, *J. Molec. Diagnostics* 2:84 91, 2000; K. Specht e outros, *Am. J. Pathol.* 158:419 29, 2001). Resumidamente, um processo representativo começa com corte de seções de cerca de 10 µm de espessura de amostra de tecido embebido em parafina. O RNA é então extraído, e proteína e DNA são removidos. Após análise da concentração de RNA, etapas de reparo e/ou amplificação de RNA podem ser incluídas, se necessário, e RNA

é transcrito reverso usando promotores específicos de gene seguido por RT-PCR.

Um procedimento de amplificação de ácido nucléico quantitativo alternativo é descrito na Patente U.S. Nº 5.219.727, que é aqui incorporada a título de referência. Neste procedimento, a quantidade de uma seqüência alvo em uma amostra é determinada através de amplificação simultânea da seqüência alvo e um segmento de ácido nucléico de padrão interno. A quantidade de DNA amplificado de cada segmento é determinada e comparada com uma curva padrão para determinar a quantidade de segmento de ácido nucléico alvo que estava presente na amostra antes da amplificação.

Em algumas modalidades deste método, a expressão de um gene "de manutenção" ou "controle interno" pode ser também avaliada. Esses termos pretendem incluir qualquer gene constitutivamente ou globalmente expresso cuja presença permite uma varredura de níveis de mRNA de citocina. Tal varredura compreende uma determinação do nível constitutivo geral de transcrição de gene e um controle para variações em recuperação de RNA.

Monitoramento da Progressão de uma Infecção e/ou Eficácia de Terapia

Em várias modalidades, os métodos de diagnóstico descritos aqui são usados para monitoramento da progressão de uma infecção com *Mycobacterium*. Nesta modalidade, ensaios conforme acima descrito para o diagnóstico de uma infecção com *Mycobacterium* podem ser realizados com o tempo, e a mudança no nível de polipeptídeo(s) reativo(s) avaliada. Por exemplo, os ensaios podem ser realizados mais ou menos a cada 12, 24, 36, 48, 60 ou 72 horas durante um período especificado, tal como durante meses ou semanas, e em seguida realizado conforme necessário.

Em alguns exemplos, a presença de um polipeptídeo de Mtb, ou um polinucleotídeo codificando o polipeptídeo, é ensaiada. Geralmente, a infecção com *Mycobacterium* está progredindo naqueles pacientes em que o nível de polipeptídeo (tal como detectado usando um agente de ligação), o nível de polinucleotídeo, o nível de anticorpos ou o nível de células T aumenta com o tempo. Em contraste, a infecção com *Mycobacterium* não está pro-

gredindo quando o nível de polipeptídeo reativo, o nível de polinucleotídeo, o nível de anticorpos ou o nível de células T ou permanece constante ou diminui com o tempo. Desta maneira, a eficácia de um regime terapêutico particular pode ser avaliada.

5 Em uma modalidade, a presença de um polipeptídeo de Mtb é avaliada em um indivíduo. O indivíduo é administrado com um protocolo terapêutico. A presença do polipeptídeo de Mtb é então avaliada. Um aumento ou nenhuma mudança na quantidade do polipeptídeo de Mtb (ou polinucleotídeo) conforme comparado com a quantidade do polipeptídeo de Mtb antes
10 da administração do protocolo terapêutico indica que o protocolo terapêutico não é eficaz, e a infecção com Mtb está progredindo. Uma diminuição na quantidade do polipeptídeo de Mtb (ou polinucleotídeo) conforme comparado com a quantidade de polipeptídeo de Mtb (ou polinucleotídeo) antes da administração do protocolo terapêutico indica que o protocolo terapêutico é
15 eficaz, e que a infecção com Mtb não está progredindo.

 Em outra modalidade, a presença de células T, tal como células T CD8⁺ e/ou células T CD4⁺, que especificamente reconhecem um polipeptídeo de Mtb é avaliada em um indivíduo. O indivíduo é administrado com um protocolo terapêutico. A presença das células T que especificamente reco-
20 nhecem o polipeptídeo de Mtb é então avaliada. Uma diminuição ou nenhuma mudança na quantidade de células T CD 8⁺ e/ou células T CD4⁺ que especificamente reconhecem o polipeptídeo de Mtb conforme comparado com a quantidade de células T CD8⁺ e/ou células T CD4⁺, respectivamente, que especificamente reconhecem o polipeptídeo de Mtb antes da administração
25 do protocolo terapêutico indica que o protocolo terapêutico não é eficaz. Um aumento na quantidade de células T CD8⁺ e/ou células T CD4⁺ que especificamente reconhecem o polipeptídeo de Mtb conforme comparado com a quantidade das células T CD8⁺ e/ou células T CD4⁺ que especificamente reconhecem o polipeptídeo de Mtb antes da administração do protocolo te-
30 rapêutico indica que o protocolo terapêutico é eficaz.

Deve ser notado que para qualquer um dos ensaios acima descritos, para melhorar sensibilidade, marcadores de *Mycobacterium* múltiplos

podem ser avaliados dentro de uma dada amostra. Ficará aparente que os ensaios descritos aqui podem ser usados em combinação. Então, conjuntos de polipeptídeos de *Mycobacterium* e combinações de ensaios podem ser para sensibilidade e especificidade ótimas.

5 Vários outros protocolos de ensaio existem que são adequados para uso com os polipeptídeos da presente invenção. As descrições acima pretendem ser exemplares apenas.

A descrição é ilustrada pelos Exemplos não-limitantes que se-
quem.

10 EXEMPLOS

Para muitas infecções, o repertório da resposta de CD8 é moldado pela entrada de antígeno no curso de processamento de MHC-I, ligação de antígenos de peptídeos e/ou não-peptídeo a moléculas do MHC-I, e reconhecimento dessas estruturas pelas células T. Por fim, um subconjunto relativamente limitado de células T específicas de patógeno emerge. Embora vários antígenos de Mtb de CD4 geralmente reconhecidos tenham sido descritos (Reed e outros, *Microbes Infect.* 7:922-931, 2005) (ESAT-6, CFP10, Ag85, etc), surpreendentemente pouco se sabe sobre antígenos de Mtb comuns reconhecidos por células T CD8⁺ humanas. A maioria dos epítomos de CD8 que foram identificados foi definida pelo teste de peptídeos de Mtb selecionado quanto à ligação de alta afinidade a moléculas do MHC Classe Ia (HLA-2 na maioria dos casos (vide, por exemplo, Lalvani, *Microbes Infect.* 7:922-931, 1998)). Em quase todos desses, no entanto, a frequência *ex vivo* dessas células T em indivíduos infectados com Mtb é baixa ou indetectável, sugerindo que essas especificidades podem não representar respostas imunodominantes. Em contraste, nos casos limitados onde células T foram usadas para definir epítomos contidos em antígenos de Mtb selecionados, frequências *ex vivo* altas foram demonstradas (vide Lewinsohn e outros. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.* 166:843-848, 2002), sugerindo que uma abordagem centrada em célula T pode identificar epítomos imunodominantes. Além disso, respostas de célula T CD8 a alguns antígenos de Mtb que representam bons antígenos de CD4 (CFP10, ESAT-6, Ag85 e Mtb39) foram detectadas

em alta frequência em pessoas infectadas com Mtb. Então, uma biblioteca limitada de peptídeos sintéticos de sobreposição representando vários antígenos de Mtb de CD4 foi usada para determinar a magnitude da resposta de CD8 a esses antígenos em pessoas com tuberculose (TB) ativa e infecção com tuberculose latente (LTBI) bem como indivíduo não-infectados. Ainda, um painel de clones de célula T CD8⁺ específica de Mtb foi utilizado para definir epítomos mínimos reconhecidos dentro desses antígenos e determinou a contribuição desses novos epítomos para a resposta de CD8 específica de Mtb.

10 Exemplo 1

Materiais e Métodos

Indivíduos humanos. Indivíduos não-infectados foram definidos como indivíduos saudáveis com um teste de pele de tuberculina negativo (TST) e quaisquer fatores de risco conhecidos para infecção com Mtb. Indivíduos com LTBI foram definidos como pessoas saudáveis com um TST positivo e quaisquer sintomas e sinais de TB ativa. Em todos os casos de TB ativa, TB pulmonar foi diagnosticada pelo *TB Controller* da região e confirmada por cultura de esputo positiva para *Mycobacterium tuberculosis*. Células mononucleares de sangue periférico (PBMC) foram isoladas de sangue integral obtido através de venipunção e aférese.

Meios e Reagentes. Meio de cultura consistia em RPMI 1640 suplementado com Soro bovino fetal a 10% (FBS; Bio Whittaker), 5×10^{-5} M2 ME (Sigma-Aldrich) e glutamina a 2 mM (GIBCO BRL). Para o cultivo e ensaio de clones de célula T reativa a Mtb, RPMI 1640 foi suplementado com soro humano a 10%. Cepa de Mtb H37Rv foi obtida da American Type Culture Collection (Rockville, MD) e preparada conforme previamente descrito (Lewinsohn e outros, *J. Immunol.*, 165:925-930, 2000). Peptídeos foram sintetizados através da Genemed Synthesis, Inc., (São Francisco, CA). Grupos de peptídeo sintético consistiam em 15 mers se sobrepondo em 11 aminoácidos (aa) representando proteínas de Mtb demonstradas ser antígenos de CD4 potentes. Grupos de peptídeo representando CDP-10 (Berthet e outros, *Microbiology* 144:3195-3203, 1998; Dillon e outros, *J. Clin. Microbiol.*

38:3285-3290, 2000), ESAT-6 (Sorenson e outros, *Infect. Immun.* 63:1710-1717, 1995), Mtb39a (dois grupos, A&B, referência) (Dillon e outros, *Infect. Immun.* 67:2941-2950, 1999), Mtb8.4 (Coler e outros, *J. Immunol.* 161:2356-2364, 1998), Mtb 9.9 (Alderson e outros, *J. Exp. Med.* 191:551-560, 2000),
 5 (Coler e outros, *J. Immunol.* 161:2356-2364, 1998), Mtb 9.9 (Alderons e outros, *J. Exp. Med.* 191:551-560, 2000), EsxG (Rosenkrands e outros, *Electrophoresis* 21:3740-3756, 2002), antígeno de 19 kDa (Collins e outros, *J. Gen. Microbiol.* 136:1429-1436, 1990), antígeno 85b (Borremans e outros, *Infect. Immun.* 57:3132-3130, 1989) (dois grupos, A & B, referência) foram
 10 sintetizados. Peptídeos foram ressuspensos em DMSO e até 50 peptídeos foram combinados em um grupo de modo que cada peptídeo no grupo estava em uma concentração de 1 mg/ml. Grupos de peptídeo foram armazenados a -80° C.

Cepas de Célula e Clones de Célula T. Cepas de célula B transformadas com EBV, LCL, ou foram geradas usando sobrenadantes da cepa de célula 9B5-8 (*American Type Cultura Collection*) ou obtidas do *National Marrow Donor Program* (NMDP; Mineápolis, MN). LCL foram mantidas através de passagem contínua conforme previamente descrito (Heinzel e outros, *J. Exp. Med.* 196:1437-1481, 2002). Clones de célula T específica de Mtb
 20 foram isolados de indivíduos com LTBI ou tuberculose ativa, usando DCs infectadas com Mtb e metodologia de clonagem de diluição limitante conforme previamente descrito (Lewinsohn e outros, *J. Immunol.* 165:925-930, 2000). Rapidamente, células T CD8⁺ foram isoladas de PBMC usando seleção negativa usando contas revestidas com anticorpo CD4 e então seleção
 25 positiva usando contas magnéticas revestidas com anticorpo CD8 pelas instruções do fabricante (Miltenyi Biotec, Auburn CA) ou através de citometria de fluxo. Neste caso, (BD Bioscience Nº Cat. 555347) células negativas CD4-PE, positivas CD8-APC (BD Bioscience, Nº Cat. 555369) (pureza >99%) foram selecionadas em um Becton Dickenson LSR II. Células T foram
 30 semeadas em várias concentrações na presença de uma CD infectada com Mtb autóloga irradiada 1×10^5 , gerada conforme descrito abaixo, e rIL-2 (5 ng/ml) em meio de cultura celular consistindo em 200 µl de RPMI 1640 su-

plementado com soro humano a 10%. Cavidades exibindo crescimento entre 10-14 dias foram avaliadas quanto à especificidade de Mtb usando ELISPOT e DC infectadas com Mtb como uma fonte de APCs. Células T retendo especificidade de Mtb foram fenotipadas adicionalmente quanto à expressão do receptor de célula T $\alpha\beta$ e expressão de CD8 através de FACS e expandidas conforme descrito abaixo. Uso de V β foi determinado usando o IOTest Beta Mark Kit da Beckman Coulter.

Expansão de clones de célula T. Para expandir os clones de células T CD8⁺, um protocolo de expansão rápida usando estimulação de mAB anti-CD3 foi usado conforme anteriormente descrito (Heinzel e outros, *J. Exp. Med.* 196:1473-1481, 2002).

Geração e Infecção de DC de Sangue Periférico. DCs derivadas de monócito foram preparadas (Heinzel e outros, *supra*; Romani e outros, *J. Exp. Med.* 180:83-93, 1994). Para gerar DC infectada com Mtb, células (1 x 10⁶) foram culturadas da noite para o dia na presença de Mtb (multiplicidade de infecção [MOI] = 50:1). Após 18 horas, as células foram colhidas e res-suspensas em RPMI/soro humano a 10%.

Ensaio de ligação de MHC. O ensaio de ligação de MHC-peptídeo utilizado mede a habilidade de ligantes de peptídeo em inibir a ligação de um peptídeo radiomarcado a moléculas de MHC purificadas, e foi descrito em detalhes em outro lugar (Sidney e outros, 1999. "UNIT 18.3 Measurement of MHC/peptide interactions by gel filtration". In *Current Protocols in Immunology*. Coligan e outros, eds., John Wiley & Sons, Inc., 1996). Rapidamente, moléculas de MHC purificadas, peptídeos de teste e um peptídeo de sonda radiomarcado foram incubados em temperatura ambiente na presença de microglobulina B2 humana e um coquetel de inibidores de protease. Após uma incubação de dois dias, ligação do peptídeo radiomarcado à molécula do MHC classe I correspondente foi determinada através da captura de complexos de MHC/peptídeo em placas revestidas com anticorpo W6/32 (anti-HLA A, B e C) ou B123.2 (anti-HLA B, C e um pouco de A), e contagens ligadas por minuto (cpm) foram medidas usando um contador de microcintilação. Para ensaios de competição, a concentração de peptídeo

dando 50% de inibição da ligação do peptídeo radiomarcado foi calculada. Peptídeos foram tipicamente testados em seis concentrações diferentes cobrindo uma faixa de dose de 100.000 vezes, e em três ou mais ensaios independentes. Sob as condições utilizadas, onde $[\text{marcador}] < [\text{MHC}]$ e $\text{IC}_{50} \geq [\text{MHC}]$, os valores de IC_{50} medidos são aproximações razoáveis dos valores K_d verdadeiros.

Ensaio ELISPOT IFN- γ . O ensaio ELISPOT IFN- γ foi realizado conforme previamente descrito (Beckman e outros, *J. Immunol.* 157:2795-2803, 1996). Para determinação de frequências *ex vivo* de células T CD4^+ ou CD8^+ respondendo à infecção com Mtb ou antígenos de Mtb, células T CD4^+ ou CD8^+ foram positivamente selecionadas de PBMC usando contas magnéticas (Miltenyi Biotec, Auburn CA) como uma fonte de células T respondedoras e testadas em duplicata em quatro concentrações diferentes. DC autólogas (20.000 células/cavidade) foram usadas como APC e DC foram ou infectadas com Mtb ou pulsadas com grupos de peptídeo (5 $\mu\text{g/ml}$, concentração final de cada peptídeo) e então adicionadas ao ensaio. Para ensaio usando clones de célula T, células T (1000 ou 5000 células/cavidade) foram incubadas com LCL autóloga (20.000 células/cavidade) na presença ou ausência de antígeno.

Análise de dados: Para determinar a frequência *ex vivo* de células T específicas de antígeno, o número médio de manchas por cavidade para cada duplicata foi posto em gráfico contra o número de células respondedoras por cavidade. Análise de regressão linear foi usada para determinar a inclinação da linha, que representa a frequência de células T específicas de antígeno. O ensaio é considerado positivo, isto é, refletindo a presença de uma resposta de célula T iniciada, se a probabilidade binominal (Lewinshon e outros, *Microbes Infect.* 8:2587-2598, 2006) para o número de manchas for significativamente diferente através de ensaios experimentais e de controle. Para determinar diferenças em frequências de célula T *ex vivo* entre grupos análise Wilcoxon/Kruskal foi usada.

Exemplo 2

Definição de Antígenos de CD8⁺ Específicos de Mtb Imunodominantes

Para definir antígenos de CD8⁺ específicos de Mtb imunodominantes, e para determinar se ou não essas respostas resultam da infecção com Mtb, células T CD8⁺ foram usadas de doadores não-infectados, com LTBI, ou ativamente infectados com Mtb. Respostas foram determinadas ou diretamente *ex vivo* ou usando clones de célula T CD8⁺ obtidos através de clonagem de diluição limitante em DC autóloga infectada com Mtb (Lewingsohn e outros, *J. Immunol.* 165:925-930, 2000). Como muito é conhecido sobre antígeno de Mtb de CD4⁺, um painel desses antígenos geralmente conhecidos foi selecionado para varredura adicional. Esses foram: Mtb39, CPF10 e Mtb8.4, Mtb9.9, ESAT-6, Ag85b, 19 KDa e EsxG. Para evitar influência introduzida usando peptídeos de especificidade de ligação de HLA prevista, foram sintetizados peptídeos de sobreposição (15 aa, sobreposição 11 aa) para representar as proteínas de interesse (Lewinshon e outros, *J. Immunol.* 166:439-446, 2001).

Para determinar precisamente as freqüências de célula efetora *ex vivo* de células T CD8⁺, análise de regressão linear foi usada. Conforme mostrado na Figura 1, células T CD8⁺ purificadas com conta magnética foram testadas contra DC pulsada com peptídeo em uma faixa de números de células T CD8⁺ em um ensaio ELISPOT IFN- γ . Um ensaio positivo foi determinado conforme descrito abaixo e, se positivo, a freqüência específica de antígeno seria determinada usando regressão linear.

Indivíduos não-infectados (n = 14), aqueles com LTBI (n = 20) e aqueles com TB ativa (n = 12) foram avaliados quanto a respostas de CD8⁺ para um painel de antígenos de célula T CD4⁺ Mtb, bem como DC infectada com Mtb. Todos os indivíduos testados tinham respostas de célula T CD8⁺ robustas para DC infectada com Mtb e eram de magnitude maior em indivíduos com TB ativa do que naqueles com TLBI (p = 0,01; Figura 2, Tabela I). No entanto, respostas de célula T CD8⁺ para o painel de antígenos de Mtb foram encontradas quase exclusivamente naqueles infectados com Mtb pelo que diferenças estatisticamente significantes entre indivíduos não-infectados

e infectados com Mtb foram notadas para sete de dez antígenos para ambas a magnitude da resposta (Figura 2) e a proporção de ensaios positivos (Tabela I).

Tabela I.

5 Respostas de célula T CD8⁺ a antígenos de TB conhecidos

Antígeno	Infectado com Mtb Nº de positivo ^a / Nº testado (%)	Não-infectado com Mtb Nº de positivo ^a / Nº testado (%)	Valor P (teste de fisher bilateral)
DC de Mtb	17/17 (100)	11/11 (100)	
Mtb39 Grupo A	13/30 (43)	0/14 (0)	0,003
Mtb39 Grupo B	10/30 (33)	0/14 (0)	0,01
CFP10	14/30 (47)	1/14 (7)	0,02
Mtb 8,4	13/30 (43)	0/14 (0)	0,003
Mtb 9,9	10/25 (40)	1/14 (7)	0,06
ESAT 6	12/25 (48)	0/14 (0)	0,003
Ag85b Grupo A	5/22 (23)	1/14 (7)	0,37
Ag85b Grupo G	4/22 (18)	0/14 (0)	0,14
19 kd	6/22 (27)	1/12 (8)	0,38
EsxG	9/22 (41)	0/14 (0)	0,006

^aEnsaio positivo definido no texto.

10 No entanto diferenças em respostas de célula T CD8⁺ entre indivíduos com TB ativa e LTBI não foram estatisticamente diferentes. Embora respostas de célula T CD8⁺ fortes fossem observadas contra muitos dos antígenos testados, é igualmente notado que vários indivíduos com respostas de célula T CD8⁺ direcionadas a Mtb fortes não tiveram respostas demonstráveis a muitos dos antígenos testados.

15 Esses dados de frequência *ex vivo* demonstram a presença de respostas de alta frequência a vários antígenos de Mtb conhecidos, mas não esclarece alelo de restrição, epítipo mínimo ou hierarquia de dominância dentro do gene de interesse. Para se direcionar a esta questão, clonagem de diluição limitante de células T CD8⁺ humanas usando DC infectada com Mtb foi realizada (vide Lewinsohn e outros, *J. Immunol.* 166:439-446, 2001) e painéis de ambos clones de célula T CD8⁺ classicamente e não-classica-

mente restritos a HLA foram gerados. Usando grupos de peptídeo representando antígenos de CD4⁺ conhecidos, a especificidade antigênica dos clones restritos a HLA-Ia pode ser definida em mais da metade dos clones (Tabela I).

5

Tabela II.

Muitos clones de célula T CD8+ reconhecem antígenos de
célula T CD4+ conhecidos

Doador	Estado da TB	Clones de HLA-Ia (Nº) ^a	Antígeno Identificado (Nº) ^b	Nº de Antígenos Distintos (Nº) ^c	Nº de Epítomos Distintos (Nº) ^d
D431	TB Ativa	1	0	0	0
D432	TB Ativa	14	4	2	2
D466	TB Ativa	11	10	1	2
D571	TB Ativa	7	7	1	1
D480	TB Ativa	6	6	1	1
D481	TB Ativa	11	11	1	1
D426	LTBI	1	0	0	0
D443	LTBI	1	1	1	1
D454	LTBI	2	2	2	2
D504	LTBI	7	2	1	1
Total		61	42	10	11

^aNúmero de clones derivados de doador.

^bNúmero de clones para os quais antígeno cognato foi identificado.

^cNúmero total de antígenos distintos identificados do conjunto de clone.

^dNúmero total de epítomos distintos identificados do conjunto de clone.

Esta abordagem é mostrada em detalhes para um clone representativo único, D466 D6, derivado de um indivíduo com TB ativa. Conforme mostrado na Figura 3A, teste do clone contra DC autóloga pulsada com um painel de grupos de peptídeo definiu sem ambiguidade a especificidade antigênica como CFP10. O clone foi então testado contra cada um dos peptídeos de 15 mer que compreende o grupo CFP10, revelando que o epítopo estava contido dentro de CFP101-15 (Figura 3B). Cada peptídeo 8 aa, 9 aa, 10 aa e 11 aa possível foi então sintetizado e testado quanto à reatividade,

15

revelando atividade antigênica entre aa 2-11 (Figura 3C). Similarmente, cada clone foi testado contra cepas de célula linfoblásticoide (LCL) compartilhando pelo menos um tipo de HLA com o doador (Figura 3D).

LCL autóloga e LCL IHW 9058, que compartilham B4501 e
5 C1601, apresentam o epítipo para o clone, identificando ambos B4501 e C1601 como possíveis alelos de restrição. No entanto, CLC C1601+ D433 não apresentam o epítipo, eliminando C1601 como um alelo de restrição candidato. Deste modo D466 D6 é restrito por HLA-B4501. Conforme demonstrado na Figura 4, através do teste de cada epítipo plausível em uma
10 ampla faixa de concentrações, o epítipo mínimo foi definido como CFP10-210 para D466 D6. Dados experimentais apoiando a designação do epítipo mínimo são providos para cada clone na Figura suplementar. Um sumário da especificidade antigênica, epítipo mínimo e alelo de restrição de HLA é apresentado na Tabela III. Inesperadamente, todos exceto um dos clones de
15 célula T foram restritos por alelos de HLA-B. Ainda, uma minoria daqueles observados eram 9 aa de comprimento.

Tabela III. Sumário de Epítopos Identificados

Clone ^a	Gene	Número de Acesso	HLA-Alelo Restrito	Localização do Epítopo	Sequência do Epítopo (SEQ ID NOS:26-38)	Nº SFU ^b	Afin. de Lig. MHC ^c	Região V beta
D160 1-B ^d (0)	CFP10	Rv3874	B44	2-11	AEMKTDAA TL	360	38	
D160 1-6F ^d (0)	CFP10	Rv3874	B14	85-94	RADEEQQAL	120	NA	5,3
D432 H12 (2)	CFP10	Rv3874	B3514	49-58	TAAQAAVVR F	258	2011 ^e	IND
D466 A10 (10)	CFP10	Rv3874	B4501	2-9	AEMKTDAA	2458	48	22
D466 D6 (1)	CFP10	Rv3874	B4501	2-12	AEMKTDAA TL	1993	6,2	9
D481 C10 (10)	CFP10	Rv3874	B1502	75-83	NIRQAGVQY	1715	14 ^f	13,6
D481 C11 (1)	CFP10	Rv3874	B1502	75-83	NIRQAGVQY	1715	14 ^f	13,1
D480 F6 (6)	CFP10	Rv3874	B0801	3-11	EMKTDAA TL	387	79	IND
D571 B12 (3)	CFP10	Rv3874	B4402	2-11	AEMKTDAA TL	31	38	14
D571 E9 (4)	CFP10	Rv3874	B4402	2-11	AEMKTDAA TL	31	38	8
D504 E4 (1)	Mtb9.8	Rv0287	A0201	3-11	LLDAHIPQL	<10	0,39	IND
D454 B10 (1)	Mtb9.8	Rv0287	B0801	53-61	AAHARFVAA	88	0,22	7,1
D454 H1-2 (1)	Mtb8.4	Rv1174c	B1501	5-15	AVINTTCNYGQ	24	10	14
D432 A3 (2)	Mtb8.4	Rv1174c	B3514	32-40	ASPVAQSYL	210	127 ^e	22
D443 H9 (1)	Ag85B	Rv1886c	TBD	144-153	ELPQWLSANR	<10	NA	

^aNúmero de clones irmãos em parênteses.
^bNº De SFU/250.000 células T CD8+ é mostrado.
^cIC50 em nm é mostrada.
^d*J. Immunol.* 2001 Jan 1 previamente publicado;166(1):439-46.
^eAfinidade de ligação medida para B3501 é mostrada.
^fAfinidade de ligação para B1501 é mostrada.
NA = Não-Disponível.
IND = Indeterminado.
TBD = A ser feito.

Devido ao fato de que cada um dos clones de célula T CD8⁺ individuais foi derivado com base em cultivo de DC infectada com Mtb, foi determinado se ou não o antígeno e epítomos identificados refletiam epítomos imunodominantes *ex vivo*. Duas abordagens independentes foram seguidas, a primeira para determinar se a resposta estava presente em alta frequência e a segunda para determinar qual proporção da resposta total ao antígeno é constituída pelo antígeno. Para determinar a frequência de célula efetora *ex vivo*, conforme descrito na Figura 1, cada epítomo foi testado usando DC autóloga e células T CD8⁺ purificadas com conta magnética do doador do qual os clones de célula T foram isolados. Um sumário das frequências de célula efetora é apresentado na Tabela III. Para a maioria, os epítomos refletem respostas de alta frequência, e então poderiam ser considerados uma resposta que foi iniciada pela exposição a Mtb. Notavelmente, clones de célula T isolados de quatro doadores reconhecidos CFP10. Para determinar se os epítomos definidos refletiam uma proporção substancial da resposta total ao antígeno de interesse, células T CD8⁺ purificadas com conta magnética de três doadores com células mononucleares de sangue periférico (PMBC) disponíveis suficientes foram testadas quanto à reatividade a cada peptídeo de 15-mer individual, o grupo de peptídeo e peptídeo representando o epítomo mínimo. Como é demonstrado na Figura 5, as frequências *ex vivo* para o epítomo mínimo, peptídeo(s) de 15-mer contendo o epítomo mínimo e grupo de peptídeo foram notavelmente concordantes. Esses dados sugerem que para cada doador a hierarquia de dominância foi claramente estabelecida, e é refletida nos clones originais. Finalmente, como é notado na Tabela III, clones filhas de especificidade idêntica foram frequentemente identificadas, um resultado que seria previsto com base em uma hierarquia de imunodominância. Tingimento com TCR V beta foi usado para confirmar a relação clonal entre clones filhas. Interessantemente, em dois casos, o epítomo mínimo idêntico e restrição por HLA foram representados por dois clones distintos (Tabela III).

Devido ao fato de que muito trabalho em respostas de célula T CD8⁺ humana para Mtb se apoiou no uso de algoritmos de previsão de HLA,

conforme cada epítipo era definido era perguntado se ou não os epítipos teriam sido previstos através dessas abordagens. Muitos desses epítipos não foram classificados fortemente. Isto poderia destacar as limitações desses algoritmos no momento em que eles foram usados. Para se endereçar a esta questão experimentalmente, a IC_{50} de cada peptídeo que tinha sido sintetizado no curso da definição do epítipo mínimo foi determinada contra um painel de moléculas de HLA humana. É mostrada na Tabela III a IC_{50} para o epítipo mínimo com o alelo de restrição cognato. Os dados demonstraram que os epítipos de célula T ligaram avidamente a HLA, e mostram um alto grau de concordância entre os dados de epítipo de célula T e dados de ligação de HLA.

Os dados demonstraram que respostas de célula T $CD8^+$ estão presentes em pessoas infectadas com Mtb em frequências que são comparáveis com aqueles vistas seguindo muitas infecções virais comuns tal como vaccínia, influenza e CMV. Todos exceto um dos epítipos que foram mapeados foram restritos por moléculas de HLA-B. Os dados sugerem que usando uma abordagem guiada por célula T para identificação de epítipo, epítipos dominantes podem ser definidos em humanos infectados com Mtb.

Exemplo 3

Varredura de clones de célula T contra uma biblioteca de peptídeo genômico

Os clones de célula T classicamente restritos e não-classicamente restritos (vide Tabela II acima) que não reconheceram um dos grupos de peptídeo de antígeno de Mtb conhecidos (Rv3875, Rv3874, Rv1886c, Rv0287, Rv3763, Rv1174, Rv1196, Rv1793, Rv2346c, Rv1037c, Rv3619c e Rv1198) foram avaliados contra uma biblioteca de peptídeo genômico. Esta biblioteca de peptídeo representa 389 genes, representando aproximadamente 10% do genoma de Mtb. Os peptídeos são de 15 mers se sobrepondo 11 para cada produto de gene. 50 nmols de cada peptídeo foram sintetizados individualmente e então agrupados em 777 grupos de 50 peptídeos em um formato de 96 cavidades (nove placas). Cinco cavidades vazias e uma cavidade de um grupo de peptídeo irrelevante, SIV gag, foram incluídas em cada uma das nove placas. Para avaliar os clones contra a biblioteca de peptídeo genômico, os clones são primeiro expandidos e testados contra

DCs infectadas com Mtb para assegurar que cada clone desta expansão particular dê um sinal específico de Mtb robusto no ensaio ELISPOT. Então até seis clones de célula T são agrupados. Para a varredura, clones de célula T (5.000 células/cavidade de cada clone), DCs autólogas (20.000 células/cavidade), IL-2 (0,5 ng/ml) e os grupos de peptídeo (5 ug/ml, peptídeos individuais) foram incubados da noite para o dia a 37° C no ensaio ELISPOT. Apenas uma réplica técnica é feita por grupo porque 5000 clones de célula T por cavidade com um antígeno de peptídeo produziram uma resposta positiva esmagadora, resultando em um resultado definitivo. Seis clones clássicos de D504 foram avaliados contra a biblioteca de peptídeo genômica, levando ao encontro de um novo epítipo. Este epítipo era da família de quatro proteínas que inclui EsxJ, EsxW, EsxK e EsxP. Essas proteínas compartilham 98% de homologia e diferem em apenas 3 aminoácidos. Há um quinto membro desta família, EsxM (Rv1792), que não estava incluído na biblioteca de peptídeo genômico.

Os clones foram avaliados contra os quinze mers individuais para esses grupos de peptídeo. Todos os seis clones clássicos reconheceram EsxJ 21-35. Esta é uma região de EsxJ que é idêntica as outros quatro membros desta família. Em seguida, peptídeos de 9, 10 e 11 mers foram feitos destes 15 mers e avaliados contra cada clone. O epítipo mínimo foi determinado ser EsxJ 24-34. Em adição, a restrição por HLA foi verificada ser B5701.

Exemplo 4

Varredura adicional de clones de célula T contra uma biblioteca de peptídeo genômico

Onze clones clássicos de D432B foram avaliados contra a biblioteca de peptídeo genômico descrita acima. O antígeno foi determinado para dois clones, que levaram à identificação de dois novos epítipos, PE_PGRS42₄₇₋₅₅ e PE9₅₃₋₆₇. O epítipo mínimo para um clone foi determinado ser PE_PGRS42₄₇₋₅₅ e a restrição por HLA foi verificada ser B3514. O epítipo mínimo para o outro clone não é ainda determinado, mas está contido no PE9₅₃₋₆₇ de 15 mer. A restrição por HLA para este clone foi verificada ser B3905.

Tabela IV.
Detalhes de Novos Epítomos de Varreduras de Biblioteca de
Peptídeo Genômico

Clone	Gene	Número de Acesso	Localização do Epítipo	Epítipo	No.SFU/250.000 CélulasT CD8+	MHC- Restrição	Afinidade de Ligação a MHC (IC ₅₀ nm)	Região beta TCR V
D504 F9 (6)	EsxJ*	Rv1038c	24-34 SEQ ID NO:2	QTVEDE- ARRMW	84	B5701	TBD	Indeterminado
D432 D8 (1)	PE9	Rv1088	53-67 SEQ ID NO:7	RLFNAN- AEEYHA- LSA	TBD	B3905	TBD	8
D432 H8 (1)	PE_PGR S42	Rv2487c	47-55 SEQ ID NO:8	VSAAIAG- LF	TBD	B3514	TBD	7,1

Número de clones reconhecendo epítipo de cada doador em parênteses. *Esta é uma família de proteínas que tem seqüências quase idênticas. A família consiste em Rv1038c, Rv1197, Rv2347, Rv3620c.

Tabela V. Sumário de Varreduras de Clone Completados

Doador	Estado da TB	Nº Clássico Disponível (avaliado)	Nº Não-clássico disponível (avaliado)	Nº de cavidades positivas em varredura	Nº de hits confirmados	Nº de epítomos novos	Nº de epítomo identificado em clones clássicos	Nº de epítomo NÃO-identificado em clones clássicos
426	PPD+	1 (1)	4 (4)	1	0	0	0	1
431	Ativa	1 (1)	1 (1)	1**	0	0	0	1
432	Ativa	11 (11)	14 (7)	11	3	2	3	8
454	PPD+	1* (0)	6 (4)	0	0	0	0	0
466	Ativa	1 (1)	4 (4)	1	0	0	0	1
504	PPD+	6 (6)	9 (9)	5	4	1	6	0

21 (20) 38 (29) 18 7 3 9 11

*O clone clássico de D454 não reconheceu Mtb quando da reexpansão e não foi avaliado contra a biblioteca.

** Os clones clássicos de 426 e 431 foram avaliados juntos, então havia uma cavidade positiva entre ambos clones.

Exemplo 5

Varredura de células T CD8⁺ ex vivo contra uma biblioteca de peptídeo genômica

Células T CD8⁺ de doador LTBI, D610 (SE Asian), foram avaliadas contra a biblioteca de peptídeo genômica descrita acima. Cada placa da biblioteca de peptídeo genômica foi avaliada em duplicata, para um total de 18 placas ELISPOT por varredura. Células T CD8⁺ foram preparadas de PBMC criopreservadas por seleção de CD8⁺ usando separação de conta magnética. Populações de célula resultantes continham □ 96% de células T CD8⁺. Células T CD8⁺ (250.000 células/cavidade), DC autólogas (20.000 células/cavidade) e IL-2 (0,5 ng/ml) foram adicionadas a peptídeo (final 5 ug/ml, peptídeos individuais) em placas ELISPOT. Cinco cavidades de controle médias são incluídas em cada placa. Para cada placa, a média dessas cinco cavidades foi subtraída de cada cavidade daquela placa para normalizar entre as placas. Cada replicação técnica em cada placa foi então *scored*. Uma cavidade foi marcada positiva se as unidades de formação de mancha (SFU), menos a média das cavidades médias, fosse maior do que ou igual a dez e a SFU fosse maior do que ou igual a duas vezes a média da média (Hudgens e outros, *J. Immunol. Methods*. 288:19-34, 2004). Este doador respondeu às quatro cavidades de peptídeo contendo EsxJ, EsxW, EsxK e EsxP. Células T CD8⁺ foram então avaliadas contra cada 15 mer desses grupos de peptídeo e verificadas responder a apenas EsxJ 21-35, a mesma região de EsxJ, EsxW, EsxK e EsXP que é descrita no exemplo 3 acima.

Sete doadores adicionais foram avaliados contra a biblioteca de peptídeo genômico. As 10 primeiras respostas são detalhadas na Tabela 7. Os quatro grupos de peptídeo destacados em amarelo contêm peptídeos de apenas um gene. Esses quatro genes contêm quatro nove epítomos.

Tabela 7.

10 Principais Respostas de Varreduras de Grupo de Peptídeo de Sete Doadores. Unidades de Formação de Mancha são para 250.000 Células T CD8⁺

"Pool" de Peptídeo	Doador	SFU Média	Números de Rv Representados em Cavidades	Categoria Funcional
C09_1	D560	208,2	Rv1860(50):	parede celular e processos celulares
C12_4	D545	156,4	Rv0468(27): Rv0456c(23):	metabolismo de lipídeo
A04_3	D454	136	Rv0284(17): Rv0288(11): Rv0287(22)	parede celular e processos celulares
B10_3	D560	112,3	Rv1273c(50):	parede celular e processos celulares
E04_4	D560	78,2	Rv0152c(40): Rv0151c(10):	PE/PPE
G12_8	D560	77,4	Rv3478(18): Rv3507(32):	PE/PPE
E07_4	D525	76,8	Rv0159c(50):	PE/PPE
A10_8	D560	70,4	Rv3136(47): Rv3144c(3):	PE/PPE
E11_8	D560	66,4	Rv3350c(50):	PE/PPE
E08_9	D545	60,2	Rv1404(13): Rv2711(37):	proteínas reguladoras

Exemplo 65 Modelos animais

Em pesquisa de tuberculose, o modelo de camundongo foi usado extensivamente para modelo de vários aspectos da doença. Camundongos podem ser infectados por uma variedade de vias incluindo intravenosa, intraperitoneal e traqueal. Uma via é aerossolização do organismo para infecção respiratória. Os camundongos são expostos ao aerossol em uma câmara (corpo inteiro enfraquecido ou infecção apenas no nariz). A dose da invenção pode ser variada manipulando a concentração de Mtb no nebulizador ou tempo de exposição. Uma infecção de dose baixa, tal como cerca de

50 unidades de formação de colônia (UFC) através de aerossol resulta em um aumento lento e uniforme em números bacterianos nos pulmões, geralmente atingido um pico em quatro semanas, que coincide com o número de pico de células T nos pulmões. O período inicial é considerado o estágio agudo de infecção. Seguindo infecção, há uma disseminação de bactérias para os nós linfáticos mediastinais. Inicialização de célula T é geralmente detectável entre duas e três semanas. Após cerca de quatro semanas os números bacterianos estabilizam, e há uma resposta patológica progressiva lenta. Este sistema é de uso para modelagem da infecção ativa.

- 10 A habilidade de uma composição de interesse em prevenir infecção em um modelo animal pode ser avaliada usando o método descrito aqui. A eficácia da composição de interesse pode ser monitorada através da medição da resposta de célula T, tal como o número de células T CD8⁺ ou CD4⁺ respondendo a um polipeptídeo de Mtb em uma amostra biológica.
- 15 Para esses ensaios células T *com um são contatadas* com pelo menos um polipeptídeo de *Mycobacterium*, e uma célula apresentando antígeno apresentando o um ou mais polipeptídeos de *Mycobacterium*. Os polipeptídeos de *Mycobacterium* incluem a seqüência de aminoácido mostrada como (a) uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO:1, SEQ ID
- 20 NO:2, SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:11 ou SEQ ID NO:12; ou (b) pelo menos nove a vinte aminoácidos consecutivos de pelo menos uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2, SEQ ID NO:3, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6,
- 25 SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:7, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:9, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:11 ou SEQ ID NO:12, onde os nove a vinte aminoácidos consecutivos especificamente se ligam a complexo de histocompatibilidade principal (MHC) classe I. É determinado se as células T reconhecem especificamente o polipeptídeo de *Mycobacterium*. Um aumento no número de células
- 30 T que especificamente reconhecem o polipeptídeo de Mtb indica que a composição é eficaz.

Modelos animais exemplares são descritos abaixo (vide também

Repique e outros, *Infec. Immunol.* 70:3318-3323, 2002, incorporado aqui a título de referência para um protocolo adicional).

A. Modelo de Camundongo de Curto Prazo:

5 Camundongos C57BL/6 são vacinados com uma composição de acordo com o protocolo apropriado e então descansados por 4 a 6 semanas. Camundongos imunizados são infectados com um aerossol de dose baixa (50-100 UFC) de *M. tuberculosis* virulento e proteção é avaliada estimando o número de bacilos viáveis 30 dias pós-provocação.

10 Contagens viáveis são realizadas no pulmão e baço de camundongos através de homogeneização dos órgãos e plaqueamento de diluições de 10 vezes seriais em placas de ágar 7H11. As placas são incubadas por até 21 dias e o número de unidades de formação de colônia por órgão determinado.

15 Camundongos vacinados com BCG têm aproximadamente proteção de 1Log10 em seus pulmões e baços quando comparado com camundongos tratados com PBS.

20 Uma amostra biológica é obtida antes da administração da composição de interesse e após administração da composição de interesse. Alternativamente, amostras biológicas são obtidas de animais tratados com veículo e de animais tratados com a composição de interesse. Um aumento no número de células T que ligam um polipeptídeo de Mtb conforme aqui descrito indica que a composição é eficaz.

B. Modelo de porquinho-da-índia de curto prazo

25 Porquinhos-da-índia Hartley exogâmicos são vacinados com uma composição incluindo um ou mais polipeptídeo de Mtb, ou um polinucleotídeo codificando esses um ou mais polipeptídeos e então descansados por 8 a 10 semanas. Porquinhos-da-índia imunizados são infectados com uma dose de aerossol baixa (10-30 UFC) de *M. tuberculosis* virulento e proteção é avaliada estimando o número de bacilos viáveis 30 dias pós-provocação.

30 Contagens viáveis são realizadas no pulmão e baço de porquinhos-da-índia através de homogeneização dos órgãos e plaqueamento de diluições 10 vezes seriais em placas de ágar 7H11. Placas são incubadas

por até 21 dias é o número de unidades de formação de colônia por órgão determinado. Segmentos do pulmão e baço são também tomados para análises histológicas.

5 Porquinhos-da-índia vacinados com BCG têm proteção de aproximadamente 2-3Log10 em seus pulmões e baço quando comparado com porquinhos-da-índia tratados com PBS. Ainda, porquinhos-da-índia vacinados com BCG têm granulomas bem definidos quando comparado com animais não-vacinados.

10 Uma amostra biológica é obtida antes da administração da composição de interesse e após administração da composição de interesse. Alternativamente, amostras biológicas são obtidas de animais tratados com veículo e de animais tratados com a composição de interesse. Um aumento no número de células T que ligam um polipeptídeo de Mtb conforme aqui descrito indica que a composição é eficaz.

15 C. Modelo de porquinho-da-índia de longo prazo

O modelo de porquinho-da-índia é similar ao modelo de camundongo, mas os experimentos são do tipo sobrevivência abertos e podem durar até 2 anos. Porquinhos-da-índia desenvolvem granulomas 'clássicos' similares a humanos com tuberculose ativa (TB), e conforme necrose do tecido pulmonar progride, eles começam a perder peso e morrem de TB similar a humanos. O número de unidades de formação de colônia nos pulmões e baço pode ser avaliado. Exame histológico pode ser também realizado para determinar o grau de envolvimento do pulmão e destruição de tecido. Após exposição a aerossol de baixa dose no porquinho-da-índia o número de organismos aumenta progressivamente durante as três primeiras semanas e então atinge um platô em um estado crônico. Durante os últimos estágios de infecção há carga bacteriana aumentada no pulmão e isto está associado com uma piora da condição patológica. Sem tratamento, há um aumento concomitante em ambas células CD4 e CD8 nos pulmões de porquinhos-da-índia infectados.

30 Porquinhos-da-índia Hartley exogâmicos são vacinados com a vacina do experimento de acordo com o protocolo apropriado e então des-

cansados por 8 a 10 semanas. Porquinhos-da-índia imunizados são então infectados com um aerossol de dose baixa (10-30 UFC) de *M. tuberculosis* virulento. Os porquinhos-da-índia são pesados semanalmente e monitorados diariamente quanto a sinais de doença (tal como respiração aumentada e
5 falha em se desenvolver). Porquinhos-da-índia não-vacinados sucumbem à infecção de 20 a 25 semanas pós-provocação, enquanto porquinhos-da-índia vacinados com BCG sobrevivem por 50 a 55 semanas pós-provocação.

Na necropsia, o pulmão e baço são avaliados quanto ao número
10 de UFC e a extensão de patologia. A proteção relativa da composição experimental é comparada com animais vacinados com BCG.

Uma amostra biológica é obtida antes da administração da composição de interesse e após administração da composição de interesse. Alternativamente, amostras biológicas são obtidas de animais tratados com
15 veículo e de animais tratados com a composição de interesse. Um aumento no número de células T que ligam um polipeptídeo de Mtb conforme aqui descrito indica que a composição é eficaz.

Será aparente que os detalhes precisos dos métodos ou composições descritos podem ser variados ou modificados sem se afastar do espírito da invenção descrita. Todas tais modificações e variações que se encaixarem no escopo e espírito das reivindicações abaixo são reivindicadas.
20

LISTAGEM DE SEQUÊNCIA

<110> Oregon Health and Science University
 David, Lewinsohn M.
 Deborah, Lewinsohn A.

5 <120> MÉTODOS PARA DETECÇÃO DE UMA INFECÇÃO POR *MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS*
 <130> 899-77364-03
 <150> US 60/782,364
 <151> 2006-03-14

10 <160> 38
 <170> PatentIn version 3.3
 <210> 1
 <211> 97
 <212> PRT

15 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <220>
 <221> MISC_FEATURE
 <222> (2)..(2)
 <223> Xaa can be A ou T

20 <220>
 <221> MISC_FEATURE
 <222> (58)..(58)
 <223> Xaa can be T ou A
 <220>

25 <221> MISC_FEATURE
 <222> (59)..(59)
 <223> Xaa qualquer aminoácido ou não aminoácido
 <400> 1

Met Xaa Ser Arg Phe Met Thr Asp Pro His Ala Met Arg Asp Met Ala
 30 1 5 10 15
 Gly Arg Phe Glu Val His Ala Gln Thr Val Glu Asp Glu Ala Arg Arg
 20 25 30

Met Trp Ala Ser Ala Gln Asn Ile Ser Gly Ala Gly Trp Ser Gly Met
 35 40 45
 Ala Glu Ala Thr Ser Leu Asp Thr Met Xaa Xaa Met Asn Gln Ala Phe
 50 55 60
 5 Arg Asn Ile Val Asn Met Leu His Gly Val Arg Asp Gly Leu Val Arg
 65 70 75 80
 Asp Ala Asn Asn Tyr Glu Gln Gln Glu Gln Ala Ser Gln Gln Ile Leu
 85 90 95
 Ser
 10 <210> 2
 <211> 97
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 2
 15 Met Ala Ser Arg Phe Met Thr Asp Pro His Ala Met Arg Asp Met Ala
 1 5 10 15
 Gly Arg Phe Glu Val His Ala Gln Thr Val Glu Asp Glu Ala Arg Arg
 20 25 30
 Met Trp Ala Ser Ala Gln Asn Ile Ser Gly Ala Gly Trp Ser Gly Met
 20 35 40 45
 Ala Glu Ala Thr Ser Leu Asp Thr Met Thr Gln Met Asn Gln Ala Phe
 50 55 60
 Arg Asn Ile Val Asn Met Leu His Gly Val Arg Asp Gly Leu Val Arg
 65 70 75 80
 25 Asp Ala Asn Asn Tyr Glu Gln Gln Glu Gln Ala Ser Gln Gln Ile Leu
 85 90 95
 Ser
 <210> 3
 <211> 98
 30 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 3

Met Ala Ser Arg Phe Met Thr Asp Pro His Ala Met Arg Asp Met Ala
 1 5 10 15
 Gly Arg Phe Glu Val His Ala Gln Thr Val Glu Asp Glu Ala Arg Arg
 20 25 30
 5 Met Trp Ala Ser Ala Gln Asn Ile Ser Gly Ala Gly Trp Ser Gly Met
 35 40 45
 Ala Glu Ala Thr Ser Leu Asp Thr Met Ala Gln Met Asn Gln Ala Phe
 50 55 60
 Arg Asn Ile Val Asn Met Leu His Gly Val Arg Asp Gly Leu Val Arg
 10 65 70 75 80
 Asp Ala Asn Asn Tyr Glu Gln Gln Glu Gln Ala Ser Gln Gln Ile Leu
 85 90 95
 Ser Ser
 <210> 4
 15 <211> 97
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 4
 Met Ala Ser Arg Phe Met Thr Asp Pro His Ala Met Arg Asp Met Ala
 20 1 5 10 15
 Gly Arg Phe Glu Val His Ala Gln Thr Val Glu Asp Glu Ala Arg Arg
 20 25 30
 Met Trp Ala Ser Ala Gln Asn Ile Ser Gly Ala Gly Trp Ser Gly Met
 35 40 45
 25 Ala Glu Ala Thr Ser Leu Asp Thr Met Thr Met Asn Gln Ala Phe Arg
 50 55 60
 Asn Ile Val Asn Met Leu His Gly Val Arg Asp Gly Leu Val Arg Asp
 65 70 75 80
 Ala Asn Asn Tyr Glu Gln Gln Glu Gln Ala Ser Gln Gln Ile Leu Ser
 30 85 90 95
 Ser
 <210> 5

<211> 98
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 5

5 Met Ala Thr Arg Phe Met Thr Asp Pro His Ala Met Arg Asp Met Ala
 1 5 10 15
 Gly Arg Phe Glu Val His Ala Gln Thr Val Glu Asp Glu Ala Arg Arg
 20 25 30
 Met Trp Ala Ser Ala Gln Asn Ile Ser Gly Ala Gly Trp Ser Gly Met
 10 35 40 45
 Ala Glu Ala Thr Ser Leu Asp Thr Met Ala Gln Met Asn Gln Ala Phe
 50 55 60
 Arg Asn Ile Val Asn Met Leu His Gly Val Arg Asp Gly Leu Val Arg
 65 70 75 80
 15 Asp Ala Asn Asn Tyr Glu Gln Gln Glu Gln Ala Ser Gln Gln Ile Leu
 85 90 95
 Ser Ser

<210> 6
 <211> 98
 20 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 6

Met Thr Ser Arg Phe Met Thr Asp Pro His Ala Met Arg Asp Met Ala
 1 5 10 15
 25 Gly Arg Phe Glu Val His Ala Gln Thr Val Glu Asp Glu Ala Arg Arg
 20 25 30
 Met Trp Ala Ser Ala Gln Asn Ile Ser Gly Ala Gly Trp Ser Gly Met
 35 40 45
 Ala Glu Ala Thr Ser Leu Asp Thr Met Thr Gln Met Asn Gln Ala Phe
 30 50 55 60
 Arg Asn Ile Val Asn Met Leu His Gly Val Arg Asp Gly Leu Val Arg
 65 70 75 80

Asp Ala Asn Asn Tyr Glu Gln Gln Glu Gln Ala Ser Gln Gln Ile Leu

85

90

95

Ser Ser

<210> 7

5 $\langle 211 \rangle$ 144

<212> PRT

<213> Mycobacterium tuberculosis

<400> 7

Met Ser Tyr Met Ile Ala Thr Pro Ala Ala Leu Thr Ala Ala Ala Thr

10 1 5 10 15

Asp Ile Asp Gly Ile Gly Ser Ala Val Ser Val Ala Asn Ala Ala Ala

20

25

30

Val Ala Ala Thr Thr Gly Val Leu Ala Ala Gly Gly Asp Glu Val Leu

35

40

45

15 Ala Ala Ile Ala Arg Leu Phe Asn Ala Asn Ala Glu Glu Tyr His Ala

50

55

60

Leu Ser Ala Gln Val Ala Ala Phe Gln Thr Leu Phe Val Arg Thr Leu

65 70 75 80

Thr Gly Gly Cys Gly Val Phe Arg Arg Arg Arg Gly Arg Gln Cys Val

20 85 90 95

Thr Ala Ala Glu His Arg Ala Ala Gly Ala Gly Arg Arg Gln Arg Arg

100

105

110

Arg Arg Ser Gly Asp Gly Gln Trp Arg Leu Arg Gln Gln Arg His Phe

115

120

125

25 Gly Cys Gly Gly Gln Pro Glu Phe Arg Gln His Ser Glu His Arg Arg

130

135

140

<210> 8

<211> 694

<212> PRT

30 <213> Mycobacterium tuberculosis

<400> 8

Val Ser Leu Val Ile Ala Thr Pro Gln Leu Leu Ala Thr Ala Ala Leu

1	5	10	15													
Asp	Leu	Ala	Ser	Ile	Gly	Ser	Gln	Val	Ser	Ala	Ala	Asn	Ala	Ala	Ala	
	20	25	30													
	Ala	Met	Pro	Thr	Thr	Glu	Val	Val	Ala	Ala	Ala	Ala	Asp	Glu	Val	Ser
5	35	40	45													
	Ala	Ala	Ile	Ala	Gly	Leu	Phe	Gly	Ala	His	Ala	Arg	Gln	Tyr	Gln	Ala
	50	55	60													
	Leu	Ser	Val	Gln	Val	Ala	Ala	Phe	His	Glu	Gln	Phe	Val	Gln	Ala	Leu
	65	70	75	80												
10	Thr	Ala	Ala	Ala	Gly	Arg	Tyr	Ala	Ser	Thr	Glu	Ala	Ala	Val	Glu	Arg
	85	90	95													
	Ser	Leu	Leu	Gly	Ala	Val	Asn	Ala	Pro	Thr	Glu	Ala	Leu	Leu	Gly	Arg
	100	105	110													
	Pro	Leu	Ile	Gly	Asn	Gly	Ala	Asp	Gly	Thr	Ala	Pro	Gly	Gln	Pro	Gly
15	115	120	125													
	Ala	Ala	Gly	Gly	Leu	Leu	Phe	Gly	Asn	Gly	Gly	Asn	Gly	Ala	Ala	Gly
	130	135	140													
	Gly	Phe	Gly	Gln	Thr	Gly	Gly	Ser	Gly	Gly	Ala	Ala	Gly	Leu	Ile	Gly
	145	150	155	160												
20	Asn	Gly	Gly	Asn	Gly	Gly	Ala	Gly	Gly	Thr	Gly	Ala	Ala	Gly	Gly	Ala
	165	170	175													
	Gly	Gly	Asn	Gly	Gly	Trp	Leu	Trp	Gly	Asn	Gly	Gly	Asn	Gly	Gly	Val
	180	185	190													
	Gly	Gly	Thr	Ser	Val	Ala	Ala	Gly	Ile	Gly	Gly	Ala	Gly	Gly	Asn	Gly
25	195	200	205													
	Gly	Asn	Ala	Gly	Leu	Phe	Gly	His	Gly	Gly	Ala	Gly	Gly	Thr	Gly	Gly
	210	215	220													
	Ala	Gly	Leu	Ala	Gly	Ala	Asn	Gly	Val	Asn	Pro	Thr	Pro	Gly	Pro	Ala
	225	230	235	240												
30	Ala	Ser	Thr	Gly	Asp	Ser	Pro	Ala	Asp	Val	Ser	Gly	Ile	Gly	Asp	Gln
	245	250	255													
	Thr	Gly	Gly	Asp	Gly	Gly	Thr	Gly	Gly	His	Gly	Thr	Ala	Gly	Thr	Pro

	260	265	270
	Thr Gly Gly Thr Gly Gly Asp Gly Ala Thr Ala Thr Ala Gly Ser Gly		
	275	280	285
	Lys Ala Thr Gly Gly Ala Gly Gly Asp Gly Gly Thr Ala Ala Ala Gly		
5	290	295	300
	Gly Gly Gly Gly Asn Gly Gly Asp Gly Gly Val Ala Gln Gly Asp Ile		
	305	310	315
	Ala Ser Ala Phe Gly Gly Asp Gly Gly Asn Gly Ser Asp Gly Val Ala		
	325	330	335
10	Ala Gly Ser Gly Gly Gly Ser Gly Gly Ala Gly Gly Gly Ala Phe Val		
	340	345	350
	His Ile Ala Thr Ala Thr Ser Thr Gly Gly Ser Gly Gly Phe Gly Gly		
	355	360	365
	Asn Gly Ala Ala Ser Ala Ala Ser Gly Ala Asp Gly Gly Ala Gly Gly		
15	370	375	380
	Ala Gly Gly Asn Gly Gly Ala Gly Gly Leu Leu Phe Gly Asp Gly Gly		
	385	390	395
	Asn Gly Gly Ala Gly Gly Ala Gly Gly Ile Gly Gly Asp Gly Ala Thr		
	405	410	415
20	Gly Gly Pro Gly Gly Ser Gly Gly Asn Ala Gly Ile Ala Arg Phe Asp		
	420	425	430
	Ser Pro Asp Pro Glu Ala Glu Pro Asp Val Val Gly Gly Lys Gly Gly		
	435	440	445
	Asp Gly Gly Lys Gly Gly Ser Gly Leu Gly Val Gly Gly Ala Gly Gly		
25	450	455	460
	Thr Gly Gly Ala Gly Gly Asn Gly Gly Ala Gly Gly Leu Leu Phe Gly		
	465	470	475
	Asn Gly Gly Asn Gly Gly Asn Ala Gly Ala Gly Gly Asp Gly Gly Ala		
	485	490	495
30	Gly Val Ala Gly Gly Val Gly Gly Asn Gly Gly Gly Gly Gly Thr Ala		
	500	505	510
	Thr Phe His Glu Asp Pro Val Ala Gly Val Trp Ala Val Gly Gly Val		

	515	520	525
	Gly Gly Asp Gly Gly Ser Gly Gly Ser Ser Leu Gly Val Gly Gly Val		
	530	535	540
	Gly Gly Ala Gly Gly Val Gly Gly Lys Gly Gly Ala Ser Gly Met Leu		
5	545	550	555
	Ile Gly Asn Gly Gly Asn Gly Gly Ser Gly Gly Val Gly Gly Ala Gly		
	565	570	575
	Gly Val Gly Gly Ala Gly Gly Asp Gly Gly Asn Gly Gly Ser Gly Gly		
	580	585	590
10	Asn Ala Ser Thr Phe Gly Asp Glu Asn Ser Ile Gly Gly Ala Gly Gly		
	595	600	605
	Thr Gly Gly Asn Gly Gly Asn Gly Ala Asn Gly Gly Asn Gly Gly Ala		
	610	615	620
	Gly Gly Ile Ala Gly Gly Ala Gly Gly Ser Gly Gly Phe Leu Ser Gly		
15	625	630	635
	Ala Ala Gly Val Ser Gly Ala Asp Gly Ile Gly Gly Ala Gly Gly Ala		
	645	650	655
	Gly Gly Ala Gly Gly Ala Gly Gly Ser Gly Gly Glu Ala Gly Ala Gly		
	660	665	670
20	Gly Leu Thr Asn Gly Pro Gly Ser Pro Gly Val Ser Gly Thr Glu Gly		
	675	680	685
	Met Ala Gly Ala Pro Gly		
	690		
	<210>	9	
25	<211>	325	
	<212>	PRT	
	<213>	Mycobacterium tuberculosis	
	<400>	9	
	Met His Gln Val Asp Pro Asn Leu Thr Arg Arg Lys Gly Arg Leu Ala		
30	1	5	10
	Ala Leu Ala Ile Ala Ala Met Ala Ser Ala Ser Leu Val Thr Val Ala		
	20	25	30

Val Pro Ala Thr Ala Asn Ala Asp Pro Glu Pro Ala Pro Pro Val Pro
 35 40 45
 Thr Thr Ala Ala Ser Pro Pro Ser Thr Ala Ala Ala Pro Pro Ala Pro
 50 55 60
 5 Ala Thr Pro Val Ala Pro Pro Pro Pro Ala Ala Ala Asn Thr Pro Asn
 65 70 75 80
 Ala Gln Pro Gly Asp Pro Asn Ala Ala Pro Pro Pro Ala Asp Pro Asn
 85 90 95
 Ala Pro Pro Pro Pro Val Ile Ala Pro Asn Ala Pro Gln Pro Val Arg
 10 100 105 110
 Ile Asp Asn Pro Val Gly Gly Phe Ser Phe Ala Leu Pro Ala Gly Trp
 115 120 125
 Val Glu Ser Asp Ala Ala His Phe Asp Tyr Gly Ser Ala Leu Leu Ser
 130 135 140
 15 Lys Thr Thr Gly Asp Pro Pro Phe Pro Gly Gln Pro Pro Pro Val Ala
 145 150 155 160
 Asn Asp Thr Arg Ile Val Leu Gly Arg Leu Asp Gln Lys Leu Tyr Ala
 165 170 175
 Ser Ala Glu Ala Thr Asp Ser Lys Ala Ala Ala Arg Leu Gly Ser Asp
 20 180 185 190
 Met Gly Glu Phe Tyr Met Pro Tyr Pro Gly Thr Arg Ile Asn Gln Glu
 195 200 205
 Thr Val Ser Leu Asp Ala Asn Gly Val Ser Gly Ser Ala Ser Tyr Tyr
 210 215 220
 25 Glu Val Lys Phe Ser Asp Pro Ser Lys Pro Asn Gly Gln Ile Trp Thr
 225 230 235 240
 Gly Val Ile Gly Ser Pro Ala Ala Asn Ala Pro Asp Ala Gly Pro Pro
 245 250 255
 Gln Arg Trp Phe Val Val Trp Leu Gly Thr Ala Asn Asn Pro Val Asp
 30 260 265 270
 Lys Gly Ala Ala Lys Ala Leu Ala Glu Ser Ile Arg Pro Leu Val Ala
 275 280 285

Pro Pro Pro Ala Pro Ala Pro Ala Pro Ala Glu Pro Ala Pro Ala Pro
 290 295 300
 Ala Pro Ala Gly Glu Val Ala Pro Thr Pro Thr Thr Pro Thr Pro Gln
 305 310 315 320
 5 Arg Thr Leu Pro Ala
 325
 <210> 10
 <211> 582
 <212> PRT
 10 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 10
 Met Leu Leu Ala Leu Leu Arg Gln His Ile Arg Pro Tyr Arg Arg Leu
 1 5 10 15
 Val Ala Met Leu Met Met Leu Gln Leu Val Ser Thr Leu Ala Ser Leu
 15 20 25 30
 Tyr Leu Pro Thr Val Asn Ala Ala Ile Val Asp Asp Gly Val Ala Lys
 35 40 45
 Gly Asp Thr Ala Thr Ile Val Arg Leu Gly Ala Val Met Leu Gly Val
 50 55 60
 20 Thr Gly Leu Gln Val Leu Cys Ala Ile Gly Ala Val Tyr Leu Gly Ser
 65 70 75 80
 Arg Thr Gly Ala Gly Phe Gly Arg Asp Leu Arg Ser Ala Met Phe Glu
 85 90 95
 His Ile Ile Thr Phe Ser Glu Arg Glu Thr Ala Arg Phe Gly Ala Pro
 25 100 105 110
 Thr Leu Leu Thr Arg Ser Thr Asn Asp Val Arg Gln Ile Leu Phe Leu
 115 120 125
 Val Gln Met Thr Ala Thr Val Leu Val Thr Ala Pro Ile Met Cys Val
 130 135 140
 30 Gly Gly Ile Ile Met Ala Ile His Gln Glu Ala Ala Leu Thr Trp Leu
 145 150 155 160
 Leu Leu Val Ser Val Pro Ile Leu Ala Val Ala Asn Tyr Trp Ile Ile

		165		170		175	
	Ser	His	Met	Leu	Pro	Leu	Phe
					Arg	Arg	Met
					Gln	Ser	Leu
					Ile	Asp	Gly
		180		185		190	
	Ile	Asn	Arg	Val	Met	Arg	Asp
					Gln	Leu	Ser
					Gly	Val	Arg
					Val	Val	Arg
5		195		200		205	
	Ala	Phe	Thr	Arg	Glu	Gly	Tyr
					Glu	Arg	Asp
					Lys	Phe	Ala
					Gln	Ala	Asn
		210		215		220	
	Thr	Ala	Leu	Ser	Asn	Ala	Ala
					Leu	Ser	Ala
					Gly	Asn	Trp
					Gln	Ala	Leu
		225		230		235	
10	Met	Leu	Pro	Val	Thr	Thr	Leu
					Thr	Ile	Asn
					Ala	Ser	Ser
					Val	Ala	Leu
		245		250		255	
	Ile	Trp	Phe	Gly	Gly	Leu	Arg
					Ile	Asp	Ser
					Gly	Gln	Met
					Gln	Val	Gly
		260		265		270	
	Ser	Leu	Ile	Ala	Phe	Leu	Ser
					Tyr	Phe	Ala
					Gln	Ile	Leu
					Met	Ala	Val
15		275		280		285	
	Leu	Met	Ala	Thr	Met	Thr	Leu
					Ala	Val	Leu
					Pro	Arg	Ala
					Ser	Val	Cys
		290		295		300	
	Ala	Glu	Arg	Ile	Thr	Glu	Val
					Leu	Ser	Thr
					Pro	Ala	Ala
					Leu	Gly	Asn
		305		310		315	
20	Pro	Asp	Asn	Pro	Lys	Phe	Pro
					Thr	Asp	Gly
					Val	Thr	Gly
					Val	Val	Arg
		325		330		335	
	Leu	Ala	Gly	Ala	Thr	Phe	Thr
					Tyr	Pro	Gly
					Ala	Asp	Cys
					Pro	Val	Leu
		340		345		350	
	Gln	Asp	Ile	Ser	Leu	Thr	Ala
					Arg	Pro	Gly
					Thr	Thr	Thr
					Ala	Ile	Val
25		355		360		365	
	Gly	Ser	Thr	Gly	Ser	Gly	Lys
					Ser	Thr	Leu
					Val	Ser	Leu
					Ile	Cys	Arg
		370		375		380	
	Leu	Tyr	Asp	Val	Thr	Ala	Gly
					Ala	Val	Leu
					Val	Asp	Gly
					Ile	Asp	Val
		385		390		395	
30	Arg	Glu	Tyr	His	Thr	Glu	Arg
					Leu	Trp	Ser
					Ala	Ile	Gly
					Leu	Val	Pro
		405		410		415	
	Gln	Arg	Ser	Tyr	Leu	Phe	Ser
					Gly	Thr	Val
					Ala	Asp	Asn
					Leu	Arg	Tyr

420 425 430
 Gly Gly Gly Pro Asp Gln Val Val Thr Glu Gln Glu Met Trp Glu Ala
 435 440 445
 Leu Arg Val Ala Ala Ala Asp Gly Phe Val Gln Thr Asp Gly Leu Gln
 5 450 455 460
 Thr Arg Val Ala Gln Gly Gly Val Asn Phe Ser Gly Gly Gln Arg Gln
 465 470 475 480
 Arg Leu Ala Ile Ala Arg Ala Val Ile Arg Arg Pro Ala Ile Tyr Val
 485 490 495
 10 Phe Asp Asp Ala Phe Ser Ala Leu Asp Val His Thr Asp Ala Lys Val
 500 505 510
 His Ala Ser Leu Arg Gln Val Ser Gly Asp Ala Thr Ile Ile Val Val
 515 520 525
 Thr Gln Arg Ile Ser Asn Ala Ala Gln Ala Asp Gln Val Ile Val Val
 15 530 535 540
 Asp Asn Gly Lys Ile Val Gly Thr Gly Thr His Glu Thr Leu Leu Ala
 545 550 555 560
 Asp Cys Pro Thr Tyr Ala Glu Phe Ala Ala Ser Gln Ser Leu Ser Ala
 565 570 575
 20 Thr Val Gly Gly Val Gly
 580
 <210> 11
 <211> 468
 <212> PRT
 25 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 11
 Met Ser Tyr Val Ile Ala Ala Pro Glu Met Leu Ala Thr Thr Ala Ala
 1 5 10 15
 Asp Val Asp Gly Ile Gly Ser Ala Ile Arg Ala Ala Ser Ala Ser Ala
 30 20 25 30
 Ala Gly Pro Thr Thr Gly Leu Leu Ala Ala Ala Ala Asp Glu Val Ser
 35 40 45

Ser Ala Ala Ala Ala Leu Phe Ser Glu Tyr Ala Arg Glu Cys Gln Glu
 50 55 60
 Val Leu Lys Gln Ala Ala Ala Phe His Gly Glu Phe Thr Arg Ala Leu
 65 70 75 80
 5 Ala Ala Ala Gly Ala Ala Tyr Ala Gln Ala Glu Ala Ser Asn Thr Ala
 85 90 95
 Ala Met Ser Gly Thr Ala Gly Ser Ser Gly Ala Leu Gly Ser Val Gly
 100 105 110
 Met Leu Ser Gly Asn Pro Leu Thr Ala Leu Met Met Gly Gly Thr Gly
 10 115 120 125
 Glu Pro Ile Leu Ser Asp Arg Val Leu Ala Ile Ile Asp Ser Ala Tyr
 130 135 140
 Ile Arg Pro Ile Phe Gly Pro Asn Asn Pro Val Ala Gln Tyr Thr Pro
 145 150 155 160
 15 Glu Gln Trp Trp Pro Phe Ile Gly Asn Leu Ser Leu Asp Gln Ser Ile
 165 170 175
 Ala Gln Gly Val Thr Leu Leu Asn Asn Gly Ile Asn Ala Glu Leu Gln
 180 185 190
 Asn Gly His Asp Val Val Val Phe Gly Tyr Ser Gln Ser Ala Ala Val
 20 195 200 205
 Ala Thr Asn Glu Ile Arg Ala Leu Met Ala Leu Pro Pro Gly Gln Ala
 210 215 220
 Pro Asp Pro Ser Arg Leu Ala Phe Thr Leu Ile Gly Asn Ile Asn Asn
 225 230 235 240
 25 Pro Asn Gly Gly Val Leu Glu Arg Tyr Val Gly Leu Tyr Leu Pro Phe
 245 250 255
 Leu Asp Met Ser Phe Asn Gly Ala Thr Pro Pro Asp Ser Pro Tyr Gln
 260 265 270
 Thr Tyr Met Tyr Thr Gly Gln Tyr Asp Gly Tyr Ala His Asn Pro Gln
 30 275 280 285
 Tyr Pro Leu Asn Ile Leu Ser Asp Leu Asn Ala Phe Met Gly Ile Arg
 290 295 300

Trp Val His Asn Ala Tyr Pro Phe Thr Ala Ala Glu Val Ala Asn Ala
 305 310 315 320
 Val Pro Leu Pro Thr Ser Pro Gly Tyr Thr Gly Asn Thr His Tyr Tyr
 325 330 335
 5 Met Phe Leu Thr Gln Asp Leu Pro Leu Leu Gln Pro Ile Arg Ala Ile
 340 345 350
 Pro Phe Val Gly Thr Pro Ile Ala Glu Leu Ile Gln Pro Asp Leu Arg
 355 360 365
 Val Leu Val Asp Leu Gly Tyr Gly Tyr Gly Tyr Ala Asp Val Pro Thr
 10 370 375 380
 Pro Ala Ser Leu Phe Ala Pro Ile Asn Pro Ile Ala Val Ala Ser Ala
 385 390 395 400
 Leu Ala Thr Gly Thr Val Gln Gly Pro Gln Ala Ala Leu Val Ser Ile
 405 410 415
 15 Gly Leu Leu Pro Gln Ser Ala Leu Pro Asn Thr Tyr Pro Tyr Leu Pro
 420 425 430
 Ser Ala Asn Pro Gly Leu Met Phe Asn Phe Gly Gln Ser Ser Val Thr
 435 440 445
 Glu Leu Ser Val Leu Ser Gly Ala Leu Gly Ser Val Ala Arg Leu Ile
 20 450 455 460
 Pro Pro Ile Ala
 465
 <210> 12
 <211> 3716
 25 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 12
 Met Glu Phe Pro Val Leu Pro Pro Glu Ile Asn Ser Val Leu Met Tyr
 1 5 10 15
 30 Ser Gly Ala Gly Ser Ser Pro Leu Leu Ala Ala Ala Ala Ala Trp Asp
 20 25 30
 Gly Leu Ala Glu Glu Leu Gly Ser Ala Ala Val Ser Phe Gly Gln Val

	35		40		45										
	Thr	Ser	Gly	Leu	Thr	Ala	Gly	Val	Trp	Gln	Gly	Ala	Ala	Ala	Ala
	50					55					60				
	Met	Ala	Ala	Ala	Ala	Ala	Pro	Tyr	Ala	Gly	Trp	Leu	Gly	Ser	Val
5	65				70				75				80		
	Ala	Ala	Ala	Glu	Ala	Val	Ala	Gly	Gln	Ala	Arg	Val	Val	Val	Gly
				85					90				95		
	Phe	Glu	Ala	Ala	Leu	Ala	Ala	Thr	Val	Asp	Pro	Ala	Leu	Val	Ala
				100					105				110		
10	Asn	Arg	Ala	Arg	Leu	Val	Ala	Leu	Ala	Val	Ser	Asn	Leu	Leu	Gly
				115					120				125		
	Asn	Thr	Pro	Ala	Ile	Ala	Ala	Ala	Glu	Ala	Glu	Tyr	Glu	Leu	Met
				130				135				140			
	Ala	Ala	Asp	Val	Ala	Ala	Met	Ala	Gly	Tyr	His	Ser	Gly	Ala	Ser
15	145				150				155				160		
	Ala	Ala	Ala	Ala	Leu	Pro	Ala	Phe	Ser	Pro	Pro	Ala	Gln	Ala	Leu
				165					170				175		
	Gly	Gly	Val	Gly	Ala	Phe	Leu	Thr	Ala	Leu	Phe	Ala	Ser	Pro	Ala
				180					185				190		
20	Ala	Leu	Ser	Leu	Asn	Ala	Gly	Leu	Gly	Asn	Val	Gly	Asn	Tyr	Asn
				195					200				205		
	Gly	Leu	Gly	Asn	Val	Gly	Val	Phe	Asn	Leu	Gly	Ala	Gly	Asn	Val
				210				215				220			
	Gly	Gln	Asn	Leu	Gly	Phe	Gly	Asn	Ala	Gly	Gly	Thr	Asn	Val	Gly
25	225				230				235				240		
	Gly	Asn	Leu	Gly	Asn	Gly	Asn	Val	Gly	Phe	Gly	Asn	Ser	Gly	Leu
				245					250				255		
	Ala	Gly	Leu	Ala	Gly	Leu	Gly	Asn	Ile	Gly	Leu	Gly	Asn	Ala	Gly
				260					265				270		
30	Ser	Asn	Tyr	Gly	Phe	Ala	Asn	Leu	Gly	Val	Gly	Asn	Ile	Gly	Phe
				275					280				285		
	Asn	Thr	Gly	Thr	Asn	Asn	Val	Gly	Val	Gly	Leu	Thr	Gly	Asn	His

	290		295		300	
	Thr Gly Ile Gly Gly Leu Asn Ser Gly Thr Gly Asn Ile Gly Leu Phe					
	305		310		315	320
	Asn Ser Gly Thr Gly Asn Val Gly Phe Phe Asn Ser Gly Thr Gly Asn					
5		325		330		335
	Phe Gly Val Phe Asn Ser Gly Asn Tyr Asn Thr Gly Val Gly Asn Ala					
		340		345		350
	Gly Thr Ala Ser Thr Gly Leu Phe Asn Ala Gly Asn Phe Asn Thr Gly					
		355		360		365
10	Val Val Asn Val Gly Ser Tyr Asn Thr Gly Ser Phe Asn Ala Gly Asp					
		370		375		380
	Thr Asn Thr Gly Gly Phe Asn Pro Gly Gly Val Asn Thr Gly Trp Leu					
	385		390		395	400
	Asn Thr Gly Asn Thr Asn Thr Gly Ile Ala Asn Ser Gly Asn Val Asn					
15		405		410		415
	Thr Gly Ala Phe Ile Ser Gly Asn Phe Asn Asn Gly Val Leu Trp Val					
		420		425		430
	Gly Asp Tyr Gln Gly Leu Phe Gly Val Ser Ala Gly Ser Ser Ile Pro					
		435		440		445
20	Ala Ile Pro Ile Gly Leu Val Leu Asn Gly Asp Ile Gly Pro Ile Thr					
		450		455		460
	Ile Gln Pro Ile Pro Ile Leu Pro Thr Ile Pro Leu Ser Ile His Gln					
	465		470		475	480
	Thr Val Asn Leu Gly Pro Leu Val Val Pro Asp Ile Val Ile Pro Ala					
25		485		490		495
	Phe Gly Gly Gly Ile Gly Ile Pro Ile Asn Ile Gly Pro Leu Thr Ile					
		500		505		510
	Thr Pro Ile Thr Leu Phe Ala Gln Gln Thr Phe Val Asn Gln Leu Pro					
		515		520		525
30	Phe Pro Thr Phe Ser Leu Gly Lys Ile Thr Ile Pro Gln Ile Gln Thr					
		530		535		540
	Phe Asp Ser Asn Gly Gln Leu Val Ser Phe Ile Gly Pro Ile Val Ile					

545 550 555 560
 Asp Thr Thr Ile Pro Gly Pro Thr Asn Pro Gln Ile Asp Leu Thr Ile
 565 570 575
 Arg Trp Asp Thr Pro Pro Ile Thr Leu Phe Pro Asn Gly Ile Ser Ala
 5 580 585 590
 Pro Asp Asn Pro Leu Gly Leu Leu Val Ser Val Ser Ile Ser Asn Pro
 595 600 605
 Gly Phe Thr Ile Pro Gly Phe Ser Val Pro Ala Gln Pro Leu Pro Leu
 610 615 620
 10 Ser Ile Asp Ile Glu Gly Gln Ile Asp Gly Phe Ser Thr Pro Pro Ile
 625 630 635 640
 Thr Ile Asp Arg Ile Pro Leu Thr Val Gly Gly Gly Val Thr Ile Gly
 645 650 655
 Pro Ile Thr Ile Gln Gly Leu His Ile Pro Ala Ala Pro Gly Val Gly
 15 660 665 670
 Asn Thr Thr Thr Ala Pro Ser Ser Gly Phe Phe Asn Ser Gly Ala Gly
 675 680 685
 Gly Val Ser Gly Phe Gly Asn Val Gly Ala Gly Ser Ser Gly Trp Trp
 690 695 700
 20 Asn Gln Ala Pro Ser Ala Leu Leu Gly Ala Gly Ser Gly Val Gly Asn
 705 710 715 720
 Val Gly Thr Leu Gly Ser Gly Val Leu Asn Leu Gly Ser Gly Ile Ser
 725 730 735
 Gly Phe Tyr Asn Thr Ser Val Leu Pro Phe Gly Thr Pro Ala Ala Val
 25 740 745 750
 Ser Gly Ile Gly Asn Leu Gly Gln Gln Leu Ser Gly Val Ser Ala Ala
 755 760 765
 Gly Thr Thr Leu Arg Ser Met Leu Ala Gly Asn Leu Gly Leu Ala Asn
 770 775 780
 30 Val Gly Asn Phe Asn Thr Gly Phe Gly Asn Val Gly Asp Val Asn Leu
 785 790 795 800
 Gly Ala Ala Asn Ile Gly Gly His Asn Leu Gly Leu Gly Asn Val Gly

		805		810		815
	Asp	Gly	Asn	Leu	Gly	Leu
				Gly	Asn	Ile
				Gly	His	Gly
				Asn	Leu	Gly
				Phe		
		820		825		830
	Ala	Asn	Leu	Gly	Leu	Thr
				Ala	Gly	Ala
				Ala	Gly	Val
				Gly	Val	Gly
				Asn	Val	Gly
5		835		840		845
	Phe	Gly	Asn	Ala	Gly	Ile
				Asn	Asn	Tyr
				Gly	Leu	Ala
				Asn	Met	Gly
				Val		
		850		855		860
	Gly	Asn	Ile	Gly	Phe	Ala
				Asn	Thr	Gly
				Thr	Gly	Asn
				Ile	Gly	Ile
				Gly	Ile	Gly
		865		870		875
10	Leu	Val	Gly	Asp	His	Arg
				Thr	Gly	Ile
				Gly	Ile	Gly
				Gly	Gly	Leu
				Asn	Ser	Gly
				Ile		
		885		890		895
	Gly	Asn	Ile	Gly	Leu	Phe
				Asn	Ser	Gly
				Thr	Gly	Asn
				Val	Gly	Phe
				Phe		
		900		905		910
	Asn	Ser	Gly	Thr	Gly	Asn
				Phe	Gly	Ile
				Gly	Ile	Gly
				Asn	Ser	Gly
				Arg	Phe	Asn
15		915		920		925
	Thr	Gly	Ile	Gly	Asn	Ser
				Gly	Thr	Ala
				Ser	Thr	Gly
				Leu	Phe	Asn
				Ala		
		930		935		940
	Gly	Ser	Phe	Ser	Thr	Gly
				Ile	Ala	Asn
				Thr	Gly	Asp
				Tyr	Asn	Thr
				Gly		
		945		950		955
20	Ser	Phe	Asn	Ala	Gly	Asp
				Thr	Asn	Thr
				Gly	Gly	Phe
				Asn	Pro	Gly
				Gly		
		965		970		975
	Ile	Asn	Thr	Gly	Trp	Phe
				Asn	Thr	Gly
				His	Ala	Asn
				Thr	Gly	Leu
				Ala		
		980		985		990
	Asn	Ala	Gly	Thr	Phe	Gly
				Thr	Gly	Ala
				Phe	Met	Thr
				Gly	Asp	Tyr
				Ser		
25		995		1000		1005
	Asn	Gly	Leu	Leu	Trp	Arg
				Gly	Gly	Tyr
				Glu	Gly	Leu
				Val	Gly	Val
		1010		1015		1020
	Arg	Val	Gly	Pro	Thr	Ile
				Ser	Gln	Phe
				Pro	Val	Thr
				Val	His	Ala
		1025		1030		1035
	Ile	Gly	Gly	Val	Gly	Pro
				Leu	His	Val
				Ala	Pro	Val
				Pro	Val	Pro
30		1040		1045		1050
	Ala	Val	His	Val	Glu	Ile
				Thr	Asp	Ala
				Thr	Val	Gly
				Leu	Gly	Pro

	1055		1060		1065
	Phe Thr Val Pro Pro Ile Ser	Ile Pro Ser Leu Pro	Ile Ala Ser		
	1070	1075	1080		
	Ile Thr Gly Ser Val Asp Leu	Ala Ala Asn Thr Ile	Ser Pro Ile		
5	1085	1090	1095		
	Arg Ala Leu Asp Pro Leu Ala	Gly Ser Ile Gly Leu	Phe Leu Glu		
	1100	1105	1110		
	Pro Phe Arg Leu Ser Asp Pro	Phe Ile Thr Ile Asp	Ala Phe Gln		
	1115	1120	1125		
10	Val Val Ala Gly Val Leu Phe	Leu Glu Asn Ile Ile	Val Pro Gly		
	1130	1135	1140		
	Leu Thr Val Ser Gly Gln Ile	Leu Val Thr Pro Thr	Pro Ile Pro		
	1145	1150	1155		
	Leu Thr Leu Asn Leu Asp Thr	Thr Pro Trp Thr Leu	Phe Pro Asn		
15	1160	1165	1170		
	Gly Phe Thr Ile Pro Ala Gln	Thr Pro Val Thr Val	Gly Met Glu		
	1175	1180	1185		
	Val Ala Asn Asp Gly Phe Thr	Phe Phe Pro Gly Gly	Leu Thr Phe		
	1190	1195	1200		
20	Pro Arg Ala Ser Ala Gly Val	Thr Gly Leu Ser Val	Gly Leu Asp		
	1205	1210	1215		
	Ala Phe Thr Leu Leu Pro Asp	Gly Phe Thr Leu Asp	Thr Val Pro		
	1220	1225	1230		
	Ala Thr Phe Asp Gly Thr Ile	Leu Ile Gly Asp Ile	Pro Ile Pro		
25	1235	1240	1245		
	Ile Ile Asp Val Pro Ala Val	Pro Gly Phe Gly Asn	Thr Thr Thr		
	1250	1255	1260		
	Ala Pro Ser Ser Gly Phe Phe	Asn Thr Gly Gly Gly	Gly Gly Ser		
	1265	1270	1275		
30	Gly Phe Ala Asn Val Gly Ala	Gly Thr Ser Gly Trp	Trp Asn Gln		
	1280	1285	1290		
	Gly His Asp Val Leu Ala Gly	Ala Gly Ser Gly Val	Ala Asn Ala		

	1295		1300		1305
	Gly Thr	Leu Ser Ser Gly Val	Leu Asn Val Gly Ser	Gly Ile Ser	
	1310		1315		1320
	Gly Trp	Tyr Asn Thr Ser Thr	Leu Gly Ala Gly Thr	Pro Ala Val	
5	1325		1330		1335
	Val Ser	Gly Ile Gly Asn Leu	Gly Gln Gln Leu Ser	Gly Phe Leu	
	1340		1345		1350
	Ala Asn	Gly Thr Val Leu Asn	Arg Ser Pro Ile Val	Asn Ile Gly	
	1355		1360		1365
10	Trp Ala	Asp Val Gly Ala Phe	Asn Thr Gly Leu Gly	Asn Val Gly	
	1370		1375		1380
	Asp Leu	Asn Trp Gly Ala Ala	Asn Ile Gly Ala Gln	Asn Leu Gly	
	1385		1390		1395
	Leu Gly	Asn Leu Gly Ser Gly	Asn Val Gly Phe Gly	Asn Ile Gly	
15	1400		1405		1410
	Ala Gly	Asn Val Gly Phe Ala	Asn Ser Gly Pro Ala	Val Gly Leu	
	1415		1420		1425
	Ala Gly	Leu Gly Asn Val Gly	Leu Ser Asn Ala Gly	Ser Asn Asn	
	1430		1435		1440
20	Trp Gly	Leu Ala Asn Leu Gly	Val Gly Asn Ile Gly	Leu Ala Asn	
	1445		1450		1455
	Thr Gly	Thr Gly Asn Ile Gly	Ile Gly Leu Val Gly	Asp Tyr Gln	
	1460		1465		1470
	Thr Gly	Ile Gly Gly Leu Asn	Ser Gly Ser Gly Asn	Ile Gly Leu	
25	1475		1480		1485
	Phe Asn	Ser Gly Thr Gly Asn	Val Gly Phe Phe Asn	Thr Gly Thr	
	1490		1495		1500
	Gly Asn	Phe Gly Leu Phe Asn	Ser Gly Ser Phe Asn	Thr Gly Ile	
	1505		1510		1515
30	Gly Asn	Ser Gly Thr Gly Ser	Thr Gly Leu Phe Asn	Ala Gly Asn	
	1520		1525		1530
	Phe Asn	Thr Gly Ile Ala Asn	Pro Gly Ser Tyr Asn	Thr Gly Ser	

	1535		1540		1545
	Phe Asn Val Gly Asp Thr Asn Thr Gly Gly Phe Asn Pro Gly Asp				
	1550		1555		1560
	Ile Asn Thr Gly Trp Phe Asn Thr Gly Ile Met Asn Thr Gly Thr				
5	1565		1570		1575
	Arg Asn Thr Gly Ala Leu Met Ser Gly Thr Asp Ser Asn Gly Met				
	1580		1585		1590
	Leu Trp Arg Gly Asp His Glu Gly Leu Phe Gly Leu Ser Tyr Gly				
	1595		1600		1605
10	Ile Thr Ile Pro Gln Phe Pro Ile Arg Ile Thr Thr Thr Gly Gly				
	1610		1615		1620
	Ile Gly Pro Ile Val Ile Pro Asp Thr Thr Ile Leu Pro Pro Leu				
	1625		1630		1635
	His Leu Gln Ile Thr Gly Asp Ala Asp Tyr Ser Phe Thr Val Pro				
15	1640		1645		1650
	Asp Ile Pro Ile Pro Ala Ile His Ile Gly Ile Asn Gly Val Val				
	1655		1660		1665
	Thr Val Gly Phe Thr Ala Pro Glu Ala Thr Leu Leu Ser Ala Leu				
	1670		1675		1680
20	Lys Asn Asn Gly Ser Phe Ile Ser Phe Gly Pro Ile Thr Leu Ser				
	1685		1690		1695
	Asn Ile Asp Ile Pro Pro Met Asp Phe Thr Leu Gly Leu Pro Val				
	1700		1705		1710
	Leu Gly Pro Ile Thr Gly Gln Leu Gly Pro Ile His Leu Glu Pro				
25	1715		1720		1725
	Ile Val Val Ala Gly Ile Gly Val Pro Leu Glu Ile Glu Pro Ile				
	1730		1735		1740
	Pro Leu Asp Ala Ile Ser Leu Ser Glu Ser Ile Pro Ile Arg Ile				
	1745		1750		1755
30	Pro Val Asp Ile Pro Ala Ser Val Ile Asp Gly Ile Ser Met Ser				
	1760		1765		1770
	Glu Val Val Pro Ile Asp Ala Ser Val Asp Ile Pro Ala Val Thr				

	1775		1780		1785
	Ile Thr Gly Thr Thr Ile Ser	Ala Ile Pro Leu Gly Phe Asp Ile			
	1790		1795		1800
	Arg Thr Ser Ala Gly Pro Leu	Asn Ile Pro Ile Ile Asp Ile Pro			
5	1805		1810		1815
	Ala Ala Pro Gly Phe Gly Asn	Ser Thr Gln Met Pro Ser Ser Gly			
	1820		1825		1830
	Phe Phe Asn Thr Gly Ala Gly	Gly Gly Ser Gly Ile Gly Asn Leu			
	1835		1840		1845
10	Gly Ala Gly Val Ser Gly Leu	Leu Asn Gln Ala Gly Ala Gly Ser			
	1850		1855		1860
	Leu Val Gly Thr Leu Ser Gly	Leu Gly Asn Ala Gly Thr Leu Ala			
	1865		1870		1875
	Ser Gly Val Leu Asn Ser Gly	Thr Ala Ile Ser Gly Leu Phe Asn			
15	1880		1885		1890
	Val Ser Thr Leu Asp Ala Thr	Thr Pro Ala Val Ile Ser Gly Phe			
	1895		1900		1905
	Ser Asn Leu Gly Asp His Met	Ser Gly Val Ser Ile Asp Gly Leu			
	1910		1915		1920
20	Ile Ala Ile Leu Thr Phe Pro	Pro Ala Glu Ser Val Phe Asp Gln			
	1925		1930		1935
	Ile Ile Asp Ala Ala Ile Ala	Glu Leu Gln His Leu Asp Ile Gly			
	1940		1945		1950
	Asn Ala Leu Ala Leu Gly Asn	Val Gly Gly Val Asn Leu Gly Leu			
25	1955		1960		1965
	Ala Asn Val Gly Glu Phe Asn	Leu Gly Ala Gly Asn Val Gly Asn			
	1970		1975		1980
	Ile Asn Val Gly Ala Gly Asn	Leu Gly Gly Ser Asn Leu Gly Leu			
	1985		1990		1995
30	Gly Asn Val Gly Thr Gly Asn	Leu Gly Phe Gly Asn Ile Gly Ala			
	2000		2005		2010
	Gly Asn Phe Gly Phe Gly Asn	Ala Gly Leu Thr Ala Gly Ala Gly			

	2015		2020		2025
	Gly Leu	Gly Asn Val	Gly Leu	Gly Asn Ala	Gly Ser Gly Ser Trp
	2030		2035		2040
	Gly Leu	Ala Asn Val	Gly Val	Gly Asn Ile	Gly Leu Ala Asn Thr
5	2045		2050		2055
	Gly Thr	Gly Asn Ile	Gly Ile	Gly Leu Thr	Gly Asp Tyr Arg Thr
	2060		2065		2070
	Gly Ile	Gly Gly Leu Asn Ser	Gly Thr	Gly Asn Leu	Gly Leu Phe
	2075		2080		2085
10	Asn Ser	Gly Thr Gly Asn Ile	Gly Phe Phe Asn Thr	Gly Thr Gly	
	2090		2095		2100
	Asn Phe	Gly Leu Phe Asn Ser	Gly Ser Tyr Ser Thr	Gly Val Gly	
	2105		2110		2115
	Asn Ala	Gly Thr Ala Ser Thr	Gly Leu Phe Asn Ala	Gly Asn Phe	
15	2120		2125		2130
	Asn Thr	Gly Leu Ala Asn Ala	Gly Ser Tyr Asn Thr	Gly Ser Leu	
	2135		2140		2145
	Asn Val	Gly Ser Phe Asn Thr	Gly Gly Val Asn Pro	Gly Thr Val	
	2150		2155		2160
20	Asn Thr	Gly Trp Phe Asn Thr	Gly His Thr Asn Thr	Gly Leu Phe	
	2165		2170		2175
	Asn Thr	Gly Asn Val Asn Thr	Gly Ala Phe Asn Ser	Gly Ser Phe	
	2180		2185		2190
	Asn Asn	Gly Ala Leu Trp Thr	Gly Asp Tyr His Gly	Leu Val Gly	
25	2195		2200		2205
	Phe Ser	Phe Ser Ile Asp Ile	Ala Gly Ser Thr Leu	Leu Asp Leu	
	2210		2215		2220
	Asn Glu	Thr Leu Asn Leu Gly	Pro Ile His Ile Glu	Gln Ile Asp	
	2225		2230		2235
30	Ile Pro	Gly Met Ser Leu Phe	Asp Val His Glu Ile	Val Glu Ile	
	2240		2245		2250
	Gly Pro	Phe Thr Ile Pro Gln	Val Asp Val Pro Ala	Ile Pro Leu	

	2255		2260		2265
	Glu Ile	His Glu Ser Ile	His Met Asp Pro Ile	Val Leu Val	Pro
	2270		2275		2280
	Ala Thr	Thr Ile Pro Ala Gln	Thr Arg Thr Ile	Pro Leu Asp	Ile
5	2285		2290		2295
	Pro Ala	Ser Pro Gly Ser Thr	Met Thr Leu Pro	Leu Ile Ser	Met
	2300		2305		2310
	Arg Phe	Glu Gly Glu Asp Trp	Ile Leu Gly Ser Thr	Ala Ala	Ile
	2315		2320		2325
10	Pro Asn	Phe Gly Asp Pro Phe	Pro Ala Pro Thr Gln	Gly Ile	Thr
	2330		2335		2340
	Ile His	Thr Gly Pro Gly Pro	Gly Thr Thr Gly Glu	Leu Lys	Ile
	2345		2350		2355
	Ser Ile	Pro Gly Phe Glu Ile	Pro Gln Ile Ala Thr	Thr Arg	Phe
15	2360		2365		2370
	Leu Leu	Asp Val Asn Ile Ser	Gly Gly Leu Pro Ala	Phe Thr	Leu
	2375		2380		2385
	Phe Ala	Gly Gly Leu Thr Ile	Pro Thr Asn Ala Ile	Pro Leu	Thr
	2390		2395		2400
20	Ile Asp	Ala Ser Gly Ala Leu	Asp Pro Ile Thr Ile	Phe Pro	Gly
	2405		2410		2415
	Gly Tyr	Thr Ile Asp Pro Leu	Pro Leu His Leu Ala	Leu Asn	Leu
	2420		2425		2430
	Thr Val	Pro Asp Ser Ser Ile	Pro Ile Ile Asp Val	Pro Pro	Thr
25	2435		2440		2445
	Pro Gly	Phe Gly Asn Thr Thr	Ala Thr Pro Ser Ser	Gly Phe	Phe
	2450		2455		2460
	Asn Ser	Gly Ala Gly Gly Val	Ser Gly Phe Gly Asn	Val Gly	Ser
	2465		2470		2475
30	Asn Leu	Ser Gly Trp Trp Asn	Gln Ala Ala Ser Ala	Leu Ala	Gly
	2480		2485		2490
	Ser Gly	Ser Gly Val Leu Asn	Val Gly Thr Leu Gly	Ser Gly	Val

	2495		2500		2505
	Leu Asn Val Gly Ser Gly Val	Ser Gly Ile Tyr Asn	Thr Ser Val		
	2510		2515		2520
	Leu Pro Leu Gly Thr Pro Ala	Val Leu Ser Gly Leu	Gly Asn Val		
5	2525		2530		2535
	Gly His Gln Leu Ser Gly Val	Ser Ala Ala Gly Thr	Ala Leu Asn		
	2540		2545		2550
	Gln Ile Pro Ile Leu Asn Ile	Gly Leu Ala Asp Val	Gly Asn Phe		
	2555		2560		2565
10	Asn Val Gly Phe Gly Asn Val	Gly Asp Val Asn Leu	Gly Ala Ala		
	2570		2575		2580
	Asn Leu Gly Ala Gln Asn Leu	Gly Leu Gly Asn Val	Gly Thr Gly		
	2585		2590		2595
	Asn Leu Gly Phe Ala Asn Val	Gly His Gly Asn Ile	Gly Phe Gly		
15	2600		2605		2610
	Asn Ser Gly Leu Thr Ala Gly	Ala Ala Gly Leu Gly	Asn Thr Gly		
	2615		2620		2625
	Phe Gly Asn Ala Gly Ser Ala	Asn Tyr Gly Phe Ala	Asn Gln Gly		
	2630		2635		2640
20	Val Arg Asn Ile Gly Leu Ala	Asn Thr Gly Thr Gly	Asn Ile Gly		
	2645		2650		2655
	Ile Gly Leu Val Gly Asp Asn	Leu Thr Gly Ile Gly	Gly Leu Asn		
	2660		2665		2670
	Ser Gly Ala Gly Asn Ile Gly	Leu Phe Asn Ser Gly	Thr Gly Asn		
25	2675		2680		2685
	Ile Gly Phe Phe Asn Ser Gly	Thr Gly Asn Phe Gly	Ile Gly Asn		
	2690		2695		2700
	Ser Gly Ser Phe Asn Thr Gly	Ile Gly Asn Ser Gly	Thr Gly Ser		
	2705		2710		2715
30	Thr Gly Leu Phe Asn Ala Gly	Ser Phe Asn Thr Gly	Val Ala Asn		
	2720		2725		2730
	Ala Gly Ser Tyr Asn Thr Gly	Ser Phe Asn Ala Gly	Asp Thr Asn		

	2735		2740		2745
	Thr Gly Gly Phe Asn Pro Gly	Thr Ile Asn Thr Gly	Trp Phe Asn		
	2750	2755	2760		
	Thr Gly His Thr Asn Thr Gly	Ile Ala Asn Ser Gly	Asn Val Gly		
5	2765	2770	2775		
	Thr Gly Ala Phe Met Ser Gly	Asn Phe Ser Asn Gly	Leu Leu Trp		
	2780	2785	2790		
	Arg Gly Asp His Glu Gly Leu	Phe Ser Leu Phe Tyr	Ser Leu Asp		
	2795	2800	2805		
10	Val Pro Arg Ile Thr Ile Val	Asp Ala His Leu Asp	Gly Gly Phe		
	2810	2815	2820		
	Gly Pro Val Val Leu Pro Pro	Ile Pro Val Pro Ala	Val Asn Ala		
	2825	2830	2835		
	His Leu Thr Gly Asn Val Ala	Met Gly Ala Phe Thr	Ile Pro Gln		
15	2840	2845	2850		
	Ile Asp Ile Pro Ala Leu Thr	Pro Asn Ile Thr Gly	Ser Ala Ala		
	2855	2860	2865		
	Phe Arg Ile Val Val Gly Ser	Val Arg Ile Pro Pro	Val Ser Val		
	2870	2875	2880		
20	Ile Val Glu Gln Ile Ile Asn	Ala Ser Val Gly Ala	Glu Met Arg		
	2885	2890	2895		
	Ile Asp Pro Phe Glu Met Trp	Thr Gln Gly Thr Asn	Gly Leu Gly		
	2900	2905	2910		
	Ile Thr Phe Tyr Ser Phe Gly	Ser Ala Asp Gly Ser	Pro Tyr Ala		
25	2915	2920	2925		
	Thr Gly Pro Leu Val Phe Gly	Ala Gly Thr Ser Asp	Gly Ser His		
	2930	2935	2940		
	Leu Thr Ile Ser Ala Ser Ser	Gly Ala Phe Thr Thr	Pro Gln Leu		
	2945	2950	2955		
30	Glu Thr Gly Pro Ile Thr Leu	Gly Phe Gln Val Pro	Gly Ser Val		
	2960	2965	2970		
	Asn Ala Ile Thr Leu Phe Pro	Gly Gly Leu Thr Phe	Pro Ala Thr		

	2975		2980		2985
	Ser Leu	Leu Asn Leu Asp Val	Thr Ala Gly Ala	Gly Gly Val Asp	
	2990		2995	3000	
	Ile Pro	Ala Ile Thr Trp Pro	Glu Ile Ala Ala	Ser Ala Asp Gly	
5	3005		3010	3015	
	Ser Val	Tyr Val Leu Ala Ser	Ser Ile Pro Leu Ile	Asn Ile Pro	
	3020		3025	3030	
	Pro Thr	Pro Gly Ile Gly Asn	Ser Thr Ile Thr Pro	Ser Ser Gly	
	3035		3040	3045	
10	Phe Phe	Asn Ala Gly Ala Gly	Gly Gly Ser Gly Phe	Gly Asn Phe	
	3050		3055	3060	
	Gly Ala	Gly Thr Ser Gly Trp	Trp Asn Gln Ala His	Thr Ala Leu	
	3065		3070	3075	
	Ala Gly	Ala Gly Ser Gly Phe	Ala Asn Val Gly Thr	Leu His Ser	
15	3080		3085	3090	
	Gly Val	Leu Asn Leu Gly Ser	Gly Val Ser Gly Ile	Tyr Asn Thr	
	3095		3100	3105	
	Ser Thr	Leu Gly Val Gly Thr	Pro Ala Leu Val Ser	Gly Leu Gly	
	3110		3115	3120	
20	Asn Val	Gly His Gln Leu Ser	Gly Leu Leu Ser Gly	Gly Ser Ala	
	3125		3130	3135	
	Val Asn	Pro Val Thr Val Leu	Asn Ile Gly Leu Ala	Asn Val Gly	
	3140		3145	3150	
	Ser His	Asn Ala Gly Phe Gly	Asn Val Gly Glu Val	Asn Leu Gly	
25	3155		3160	3165	
	Ala Ala	Asn Leu Gly Ala His	Asn Leu Gly Phe Gly	Asn Ile Gly	
	3170		3175	3180	
	Ala Gly	Asn Leu Gly Phe Gly	Asn Ile Gly His Gly	Asn Val Gly	
	3185		3190	3195	
30	Val Gly	Asn Ser Gly Leu Thr	Ala Gly Val Pro Gly	Leu Gly Asn	
	3200		3205	3210	
	Val Gly	Leu Gly Asn Ala Gly	Gly Asn Asn Trp Gly	Leu Ala Asn	

	3215		3220		3225
	Val Gly	Val Gly Asn Ile Gly	Leu Ala Asn Thr Gly	Thr Gly Asn	
	3230		3235		3240
	Ile Gly	Ile Gly Leu Thr Gly	Asp Tyr Gln Thr Gly	Ile Gly Gly	
5	3245		3250		3255
	Leu Asn	Ser Gly Ala Gly Asn	Leu Gly Leu Phe Asn	Ser Gly Ala	
	3260		3265		3270
	Gly Asn	Val Gly Phe Phe Asn	Thr Gly Thr Gly Asn	Phe Gly Leu	
	3275		3280		3285
10	Phe Asn	Ser Gly Ser Phe Asn	Thr Gly Val Gly Asn	Ser Gly Thr	
	3290		3295		3300
	Gly Ser	Thr Gly Leu Phe Asn	Ala Gly Ser Phe Asn	Thr Gly Val	
	3305		3310		3315
	Ala Asn	Ala Gly Ser Tyr Asn	Thr Gly Ser Phe Asn	Val Gly Asp	
15	3320		3325		3330
	Thr Asn	Thr Gly Gly Phe Asn	Pro Gly Ser Ile Asn	Thr Gly Trp	
	3335		3340		3345
	Leu Asn	Ala Gly Asn Ala Asn	Thr Gly Val Ala Asn	Ala Gly Asn	
	3350		3355		3360
20	Val Asn	Thr Gly Ala Phe Val	Thr Gly Asn Phe Ser	Asn Gly Ile	
	3365		3370		3375
	Leu Trp	Arg Gly Asp Tyr Gln	Gly Leu Ala Gly Phe	Ala Val Gly	
	3380		3385		3390
	Tyr Thr	Leu Pro Leu Phe Pro	Ala Val Gly Ala Asp	Val Ser Gly	
25	3395		3400		3405
	Gly Ile	Gly Pro Ile Thr Val	Leu Pro Pro Ile His	Ile Pro Pro	
	3410		3415		3420
	Ile Pro	Val Gly Phe Ala Ala	Val Gly Gly Ile Gly	Pro Ile Ala	
	3425		3430		3435
30	Ile Pro	Asp Ile Ser Val Pro	Ser Ile His Leu Gly	Leu Asp Pro	
	3440		3445		3450
	Ala Val	His Val Gly Ser Ile	Thr Val Asn Pro Ile	Thr Val Arg	

	3455		3460		3465		
	Thr Pro	Pro Val	Leu Val	Ser Tyr	Ser Gln Gly Ala	Val Thr	Ser
	3470		3475		3480		
	Thr Ser	Gly Pro	Thr Ser	Glu Ile	Trp Val	Lys Pro	Ser Phe Phe
5	3485		3490		3495		
	Pro Gly	Ile Arg	Ile Ala	Pro Ser	Ser Gly	Gly Gly	Ala Thr Ser
	3500		3505		3510		
	Thr Gln	Gly Ala	Tyr Phe	Val Gly	Pro Ile	Ser Ile	Pro Ser Gly
	3515		3520		3525		
10	Thr Val	Thr Phe	Pro Gly	Phe Thr	Ile Pro	Leu Asp	Pro Ile Asp
	3530		3535		3540		
	Ile Gly	Leu Pro	Val Ser	Leu Thr	Ile Pro	Gly Phe	Thr Ile Pro
	3545		3550		3555		
	Gly Gly	Thr Leu	Ile Pro	Thr Leu	Pro Leu	Gly Leu	Ala Leu Ser
15	3560		3565		3570		
	Asn Gly	Ile Pro	Pro Val	Asp Ile	Pro Ala	Ile Val	Leu Asp Arg
	3575		3580		3585		
	Ile Leu	Leu Asp	Leu His	Ala Asp	Thr Thr	Ile Gly	Pro Ile Asn
	3590		3595		3600		
20	Val Pro	Ile Ala	Gly Phe	Gly Gly	Ala Pro	Gly Phe	Gly Asn Ser
	3605		3610		3615		
	Thr Thr	Leu Pro	Ser Ser	Gly Phe	Phe Asn	Thr Gly	Ala Gly Gly
	3620		3625		3630		
	Gly Ser	Gly Phe	Ser Asn	Thr Gly	Ala Gly	Met Ser	Gly Leu Leu
25	3635		3640		3645		
	Asn Ala	Met Ser	Asp Pro	Leu Leu	Gly Ser	Ala Ser	Gly Phe Ala
	3650		3655		3660		
	Asn Phe	Gly Thr	Gln Leu	Ser Gly	Ile Leu	Asn Arg	Gly Ala Gly
	3665		3670		3675		
30	Ile Ser	Gly Val	Tyr Asn	Thr Gly	Ala Leu	Gly Val	Val Thr Ala
	3680		3685		3690		
	Ala Val	Val Ser	Gly Phe	Gly Asn	Val Gly	Gln Gln	Leu Ser Gly

	3695		3700		3705
	Leu Leu	Phe Thr Gly Val	Gly Pro		
	3710		3715		
	<210>	13			
5	<211>	11			
	<212>	PRT			
	<213>	Mycobacterium tuberculosis			
	<400>	13			
	Gln Thr Val	Glu Asp Glu Ala Arg Arg Met Trp			
10	1	5	10		
-	<210>	14			
	<211>	9			
-	<212>	PRT			
	<213>	Mycobacterium tuberculosis			
15	<400>	14			
	Val Ser Ala Ala Ile Ala Gly Leu Phe				
	1	5			
	<210>	15			
	<211>	297			
20	<212>	DNA			
	<213>	Mycobacterium tuberculosis			
	<400>	15			
	atggcctcgc gttttatgac ggatccgcac gcgatgcggg acatggcggg ccgttttgag	60			
	gtgcacgccc agacggtgga ggacgaggct cgccggatgt gggcgtccgc gcaaaacatc	120			
25	tcgggcgcgg gctggagtgg catggccgag gcgacctcgc tagacaccat gacccagatg	180			
	aatcaggcgt ttcgcaacat cgtgaacatg ctgcacgggg tgcgtgacgg gctggttcgc	240			
	gacgccaaca actacgaaca gcaagagcag gcctcccagc agatcctcag cagctga	297			
	<210>	16			
	<211>	297			
30	<212>	DNA			
	<213>	Mycobacterium tuberculosis			
	<400>	16			

atggcctcac gttttatgac ggatccgcac gcgatgcggg acatggcggg ccgttttgag 60
 gtgcacgccc agacggtgga ggacgaggct cgccggatgt gggcgtccgc gcaaaacatt 120
 tccggtgcgg gctggagtgg catggccgag gcgacctcgc tagacaccat ggcccagatg 180
 aatcaggcgt ttcgcaacat cgtgaacatg ctgcacgggg tgcgtgacgg gctggttcgc 240
 5 gacgccaaca actacgagca gcaagagcag gcctcccagc agatcctcag cagctaa 297
 <210> 17
 <211> 297
 <212> DNA
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 10 <400> 17
 atggcctcac gttttatgac ggatccgcat gcgatgcggg acatggcggg ccgttttgag 60
 gtgcacgccc agacggtgga ggacgaggct cgccggatgt gggcgtccgc gcaaaacatt 120
 tccggtgcgg gctggagtgg catggccgag gcgacctcgc tagacaccat gacctagatg 180
 aatcaggcgt ttcgcaacat cgtgaacatg ctgcacgggg tgcgtgacgg gctggttcgc 240
 15 gacgccaaca actacgaaca gcaagagcag gcctcccagc agatcctgag cagctag 297
 <210> 18
 <211> 297
 <212> DNA
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 20 <400> 18
 atggcaacac gttttatgac ggatccgcac gcgatgcggg acatggcggg ccgttttgag 60
 gtgcacgccc agacggtgga ggacgaggct cgccggatgt gggcgtccgc gcaaaacatc 120
 tcgggcgcgg gctggagtgg catggccgag gcgacctcgc tagacaccat ggcccagatg 180
 aatcaggcgt ttcgcaacat cgtgaacatg ctgcacgggg tgcgtgacgg gctggttcgc 240
 25 gacgccaaca actacgagca gcaagagcag gcctcccagc agatcctcag cagctaa 297
 <210> 19
 <211> 297
 <212> DNA
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 30 <400> 19
 atgacctcgc gttttatgac ggatccgcac gcgatgcggg acatggcggg ccgttttgag 60

	gtgcacgccc agacggtgga ggacgaggct cgccggatgt gggcgtccgc gcaaaacatt	120
	tccggcgcg gctggagtgg catggccgag gcgacctcgc tagacaccat gacccagatg	180
	aatcaggcgt ttcgcaacat cgtgaacatg ctgcacgggg tgcgtgacgg gctggttcgc	240
	gacgccaaca actacgaaca gcaagagcag gcctcccagc agatcctcag cagctga	297
5	<210> 20	
	<211> 435	
	<212> DNA	
	<213> Mycobacterium tuberculosis	
	<400> 20	
10	atgtcataca tgattgccac accagcggcg ttgacggcgg cggcaacgga tatcgacggg	60
	attggctcgg cggttagcgt tgcgaacgcc gcggcggtcg ccgcgacaac cggagtgctg	120
	gccgccggtg gcgatgaagt gttggcggcc atcgctaggc tgttcaacgc aaacgccgag	180
	gaatatcacg ccctcagcgc gcagggtggcg gcgtttcaaa ccctgtttgt gcgcaccttg	240
	actgggggggt gcggagtctt tcgccggcgc cgaggccgcc aatgcgtcac agctgcagag	300
15	catcgcgcg caggtgcggg gcgccgtcaa cgccgtcgcc ggtcagggtga cgggcaatgg	360
	cggctccggc aacagcggca cttcggctgc ggcgccaac ccgaattccg acaacacagc	420
	gagcatcgcc gatag	435
	<210> 21	
	<211> 2085	
20	<212> DNA	
	<213> Mycobacterium tuberculosis	
	<400> 21	
	gtgtcgttgg tgatcgcgac gccgcagctg ctggcaactg cggctttgga tttagcgagt	60
	attggttcgc aggtgagcgc ggctaattgc gccgcggcga tgccgacgac ggaagtgggtg	120
25	gctgcggctg ccgatgaagt gtcggcggcg attgcgggggt tgttcggggc ccatgctcgg	180
	cagtatcagg cgctcagcgt acagggtggca gcgtttcacg agcagtttgt gcaggcgttg	240
	actgcggccg cgggtcggtg tgccagcact gaggccgctg ttgagcggag tctgctgggt	300
	gcggtgaatg cgcccaccga ggcgcttttg gggcgcccgt tgatcggaaa cggcgccgac	360
	gggacggcac ccgggcagcc tggcgcggcc ggcgggttgc tgtttgcaa cgggtggcaac	420
30	ggcgcggtg gcgggttcgg tcaaaccggc ggcagcggag gcgcggccgg gttgatcggc	480
	aacggcgga acggcggggc cgggtgtacc ggcgcggccg gcggtgccgg tgggaacggg	540
	gggtggttgt ggggcaacgg cggcaacggc ggtgtcggcg gcaccagcgt ggccgcaggc	600

atcgggggtg cgggcggtaa cggcggcaac gccgggctgt tcggccatgg cggcgccggt 660
 ggtaccggcg gcgccggcct cgccggggca aacgggggtca atccacgcc cggcccccg 720
 gccagcaccg gggacagccc ggcagatgtg tccggcatcg gtgatcaaac cggcggcgac 780
 ggcggcacgg gcggccatgg cactgccggc acgccgaccg gtggcaccgg cggcgacggt 840
 5 gccaccgcga cggcaggctc gggcaaggcc accggcggtg ccggtggtga cggcggtacc 900
 gccgctgccg gtggcgggcg cggcaacggc ggcgacggcg gagtcgcgca gggcgacatt 960
 gcgagcgctt ttggcggtga tggtaggaac ggggtccgac gtgtagccgc cggcagtggg 1020
 ggtggtagcg gcggcgcccg aggcggcgct ttcgtacaca tcgccactgc cacctctacc 1080
 ggtggtagcg gcggttttcg tggtaacggg gctgccagtg ccgcctccgg cgccgacggt 1140
 10 ggcgcagggg gagctggcg caatggtggc gccggcggtg tgctattcgg tgatggcggc 1200
 aacggtggcg ccggtggcg ggggtggtatc ggtggtgacg gcgccacggg ggggccccgg 1260
 ggaagcgggc gcaacgctgg catcgcgagg ttgacagcc cagaccccga ggcagaaccc 1320
 gatgtggtcg gcggcaaggg tggtagtgcc ggcaagggcg gcagcggcct tggcgtcggc 1380
 ggcgccccgg ggaccggcg cgcgggcgcc aacggcgggc ccggcggggt gttgttcggc 1440
 15 aacggcgga acggcgga cgcggggg gccgggggat gcggcgccgg cgttgccggt 1500
 ggggttgggc gtaacggcg cggtggtggc accgcgacgt ttcacgaaga cccggtcgct 1560
 ggtgtctggg cggtcggtgg cgtaggtggt gatggtggct ccggcggcag ctgcttggt 1620
 gtcggcgggg tggcgggagc cggtggcggt ggtggcaagg gtggcgccag cggcatgttg 1680
 atcggcaacg gcggcaacgg tggcagcggc ggagtcggtg gggccggtg agtcggcggg 1740
 20 gctggcggtg acggcgga cggcggtcc ggtggcaacg ccagtacttt tggcgatgag 1800
 aactccatcg gcggggccgg cgggacgggc ggcaacgggg gcaacggcg aaacggcggt 1860
 aacggtggcg ctggcggtat tgccggcggt gcgggtgggt ccggaggggt cctcagcggt 1920
 gccgcaggag tcagcggcgc tgacggtatc ggtggcgcg gcggcgagg cggtgccggt 1980
 ggcgcggggc gtagcggcgg tgaggcaggc gcggggggcc tcaccaacgg ccccggtcc 2040
 25 cctggcggtt ccggcaccga aggcattggc ggcgcgccc gctag 2085
 <210> 22
 <211> 978
 <212> DNA
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 30 <400> 22
 atgcatcagg tggaccccaa cttgacacgt cgcaagggac gattggcggc actggctatc 60
 gcggcgatgg ccagcgccag cctggtgacc gttgcggtgc ccgcgaccgc caacgccgat 120

	ccggagccag	cgcccccggt	accacaacg	gccgcctcgc	cgccgtcgac	cgctgcagcg	180
	ccacccgcac	cggcgacacc	tgttgcccc	ccaccaccgg	ccgccgcaa	cacgccgaat	240
	gcccagccgg	gcgatcccaa	cgagcacct	ccgccggccg	accgaacgc	accgccgcca	300
	cctgtcattg	cccaaacgc	acccaacct	gtccggatcg	acaaccgggt	tggaggattc	360
5	agcttcgcgc	tgcttgctgg	ctgggtggag	tctgacgccg	cccacttcga	ctacggttca	420
	gcactcctca	gcaaaaccac	cggggacccg	ccatttcccg	gacagccgcc	gccggtggcc	480
	aatgacaccc	gtatcgtgct	cggccggcta	gacaaaagc	tttacgccag	cgccgaagcc	540
	accgactcca	agggcgccgc	ccggttgggc	tcggacatgg	gtgagttcta	tatgccctac	600
	ccgggcaccc	ggatcaacca	ggaaaccgtc	tcgctcgacg	ccaacgggggt	gtctggaagc	660
10	gcgtcgtatt	acgaagtcaa	gttcagcgat	ccgagtaagc	cgaacggcca	gatctggacg	720
	ggcgtaatcg	gctcgcccgc	ggcgaacgca	ccggacgccg	ggccccctca	gcgctggttt	780
	gtggtatggc	tcgggaccgc	caacaacccg	gtggacaagg	gcgcggccaa	ggcgctggcc	840
	gaatcgatcc	ggcctttggt	cgccccgccg	ccggcgccgg	caccggctcc	tgacagagccc	900
	gctccggcgc	cggcgccggc	cggggaagtc	gctcctaccc	cgacgacacc	gacaccgcag	960
15	cggaaccttac	cggcctga					978
	<210>	23					
	<211>	1749					
	<212>	DNA					
	<213>	Mycobacterium tuberculosis					
20	<400>	23					
	atgctcctgg	ccctgctgcg	ccagcacatc	cgaccgtacc	gccggctggt	cgcgatgctg	60
	atgatgctgc	agctggtcag	caccctggct	tcgctatacc	tcccgacggg	caacgccgca	120
	atcgctcgacg	acggcgctgc	caagggcgac	accgccacca	tcgtacggct	gggtgcgggtg	180
	atgcttgggg	tgaccggatt	gcaggtgctg	tgcgcgatcg	gggcgggtcta	tctgggctcc	240
25	cggaccgggg	cgggtttcgg	ccgtgacctg	cgctcgga	tggtcgaaca	catcatcacc	300
	ttctcggaac	gcgagaccgc	ccgattcggc	gctccgacgt	tggtgacccg	cagcaccaac	360
	gacgtccggc	agatcctggt	cctgggtccag	atgaccgcca	ccgtgctggt	caccgcaccg	420
	atcatgtgcg	tcggcggaat	catcatggcc	atccaccagg	aggccgcgct	gacatggctg	480
	ctgctgggtca	gcgttccgat	tctggccgta	gcaaactact	ggatcatctc	ccacatgctg	540
30	ccgctcttcc	gccgcatgca	gagcctgatc	gacggcatca	accgggtgat	gcgcgatcag	600
	ctgtccgggg	tgcgagtggg	ccgcgccttc	acccgcgaag	gctatgaacg	cgacaagttc	660
	gcgcaggcca	atacggcgct	gtcgaatgcc	gactgagcg	ccggcaactg	gcaagcactg	720

atgctgccgg tgaccacgct gaccatcaac gcatccagcg tcgcactgat ctggttcgg 780
 gggctacgca tcgacagcgg ccagatgcag gtcggctccc tgatgcctt cctgtcctac 840
 ttcgcccaga tcctgatggc ggtgttgatg gcgacatga cgctggccgt gctgccacga 900
 gcgtcgggtct gcgccgaacg catcaccgag gtgctttcca cgcccggcg actcggtaac 960
 5 cccgacaatc ccaagtcccc gacggacggg gtcacgggcg tagtgcgctt ggctggcgca 1020
 acctttacct atcctggcgc cgactggcg gtgctgcagg acatttcgtt gactgcgcgg 1080
 cccggtacca ccaccgcgat cgctggcagt accggttcgg gcaagtcgac actggtgtcg 1140
 ttgatctgcc ggctctacga cgtcaccgct ggcgcgggtct tggttgacgg tatcgacgtc 1200
 cgcgagtacc acaccgagcg gctctgggtca gcgatcgggc tggtgcccca gcgcagctac 1260
 10 ctcttctccg gaaccgtcgc ggacaacctg cgctacggcg ggggcccaga ccaggtagtc 1320
 accgagcagg agatgtggga ggcgctgcgg gtcgccgcgg ccgacggctt tgtacaaaca 1380
 gacgggctgc agacgcgtgt cgcccaagggt ggtgtcaact tctccggcg gcagcgccaa 1440
 cggctggcga tagcccagc ggtcatccga cgtccggcca tctatgtgtt cgacgacgcg 1500
 ttctccgcac ttgacgtgca caccgacgcc aaagtccacg catcgctgcg acaggtatct 1560
 15 ggtgatgcaa ccatcattgt tgttacacaa cggatttcga atgccgtca ggccgaccag 1620
 gtcacgttg tcgataacgg taagatcgtc ggcacgggca cccacgaaac gctgctggcc 1680
 gattgcccc cctatgccga attcgccgcc tcacaatcgc tgagcgccac ggtcgggggt 1740
 gtaggggtga 1749
 <210> 24
 20 <211> 1407
 <212> DNA
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 24
 atgtcctacg tcatcgcgcc cccggagatg ttggcaacga cggccgcgga cgtggacggg 60
 25 atcggttcgg cgatacgagc ggccagcgcg tccgctgcgg gtccaacgac cggactgctg 120
 gccgcggccg ccgatgaggt gtcgtcggcc gctgcagcgc tgttcagcga atacgcgcgc 180
 gaatgtcaag aggtcctaaa gcaggctgcg gcgttccatg gcgagttcac ccgggcgctg 240
 gctgcccggc gggccgccta tgcccaggct gaagccagca acaccgctgc tatgtcgggc 300
 accgcccgggt ccagcggcgc cctcggttct gtcgggatgc tgtcaggcaa cccgctaacc 360
 30 gcgttgatga tgggcggcac cggggaaccg atccttagtg accgcgtctt ggcgatcatt 420
 gacagcgcac acattcggcc cattttcggg cccaacaacc cggtcgcccc gtacacgccc 480
 gagcagtggg ggccgtttat cgggaacctg tactggacc aatccatcgc ccagggtgtc 540

acgctgctga acaacggcat caacgcggaa ctacaaaatg ggcattgacgt cgtcgttttc 600
 ggctactcgc aaagcgccgc ggtagcgacc aatgaaatac gcgctcttat ggcgttacca 660
 ccgggccaag ccccgatcc aagccggctg gctttcacgt tgatcggtaa tatcaataac 720
 cccaacggcg gcgtcctcga gcgttacgtg ggcctttacc tcccgttctt ggatatgtcg 780
 5 ttcaacgggtg cgactccacc ggattcccc taccagacct acatgtacac cggccaatac 840
 gacggctacg cccacaaccc gcagtaccgc ctcaatatct tgcggacct caacgccttc 900
 atgggcatca gatgggtgca caacgcgtac cccttcaccg cggccgaggt tgccaatgcc 960
 gtgccgttgc ccacgtctcc gggctacacc ggcaacaccc attactacat gtttctgacc 1020
 caggacctgc cgctgttgca gccgattcgc gccatcccct tcgtagggac cccaatagcc 1080
 10 gagctgattc agcccgacct acgggtgcta gtcgacttgg gctatggcta cggctacgcc 1140
 gacgtaccca ccccgccag cctgttcgcg ccaatcaacc cgatcgccgt ggcctcggcc 1200
 ctggcgaccg ggaccgtgca agggcccaaa gccgcctag taagcatcgg attgttaccg 1260
 cagtccgcgc taccgaatac gtatccgtat cttccgtcgg cgaatccggg cctgatgttc 1320
 aacttcggtc aatccagtgt gacggagttg tcggtgctca gtggcgccct cgggtccgta 1380
 15 gcgagattga ttccaccgat cgcgtga 1407
 <210> 25
 <211> 11151
 <212> DNA
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 20 <400> 25
 atggagtttc cgggtgttgcc accggaaatc aactccgtgc tgatgtattc ggggtgcgggg 60
 tcgagcccgt tgctggcggc ggccgcggcg tgggatgggc tggctgagga gttggggtcg 120
 gcggcggtgt cgtttgggca ggtgacgtcg ggcctgacgg cgggggtgtg gcagggtgcg 180
 gcggcgggcg cgatggcggc gcggcgggcg ccgtatgcgg ggtggttggg ttcggtggcg 240
 25 gccgcggccg aggcggtggc cgggcaggcg cgggtggtgg tgggggtctt tgaggcggcg 300
 ttggcgggca cgggtgatcc ggcgtggtg gcggccaacc gggcgcggt ggtggcggtg 360
 gcggtgtcga atctgttggg gcagaacacg ccggcgatcg cggccgccga ggccgagtac 420
 gagctgatgt gggccgccga tgtggcggcg atggccggct accattccgg cgcgtcggct 480
 gctgccgcgg cgttgccggc gttcagccca ccggcgagg cgctgggggg aggtgtcggc 540
 30 gcgttcctta ccgccctgtt cgccagccct gcgaaggcgc tgagcctgaa tgcgggtttg 600
 ggcaatgtcg gcaattacaa cgtcgggttg ggcaatgtcg ggggtgtcaa cctgggcgcg 660
 ggcaatgtgg gtgggcagaa tctgggtttc gggaatgccg gtggcaccaa tgcgggttc 720

ggcaacctcg gtaacgggaa tgctcgggttc ggcaactccg gtctgggggc gggcctggcc 780
 ggcttgggca atatcgggtt gggcaatgcg ggcagcagca actatggttt cgcaaacctg 840
 ggtgtgggca acatcgggtt cggcaacacc ggcaccaaca acgtcggcgt cgggctcacc 900
 ggcaaccacc tgacgggtat cgggggcctg aattcgggca ccgggaatat cgggttggtc 960
 5 aactccggca ccgggaatgt ggggttcttc aattcgggga ccgggaactt cggggtgttc 1020
 aactcgggta attacaacac cgggtgtcgt aatgcgggga cggccagcac ggggttggtc 1080
 aatgccggca atttcaacac cggcgtggtg aacgtgggca gttacaacac cggcagtttc 1140
 aacgccggcg acaccaacac cggtggttc aaccccgcg gtgtgaacac cggctggctg 1200
 aacaccggca acaccaacac cggcatcgcc aactcgggca acgtcaacac cggcgcgttc 1260
 10 atctcgggca acttcaacaa cggcgtgctg tgggtgggtg actaccaggg cctgttcggc 1320
 gtctccgccc gctcgtcgat ccccgcaatt cccatcggcc tgggtgctca cggcgacatc 1380
 ggcccgatca ccatccagcc catcccgatc ctgcccacca tcccgtcag cattcaccaa 1440
 accgtcaact tgggcccgtt ggtggttccc gacatcgtga tccccgcctt cggcggcggg 1500
 atcggcatac ccatcaacat cggcccgtg accatcacac ccatcaccct gtttgcccaa 1560
 15 cagacatttg tcaaccaatt gccctttccc accttcagtt tagggaaaat cacaattcca 1620
 caaatccaaa ctttgattc taacggtcag cttgtcagct ttatcggccc tatcgttata 1680
 gacaccacca ttcccggacc caccaatcca cagattgatt taacgatcag atgggatacc 1740
 cctccgatca cgctgttccc gaatggcatc agtgctcccg ataatccttt ggggttgctg 1800
 gtgagtgtgt cgatcagtaa cccgggcttt accatcccgg gatttagtgt tccgcgcag 1860
 20 ccgttgccgt tgctgatcga tatcaggggc cagatcgacg gggtcagcac cccgccgatc 1920
 acgatcgatc gcatccccct gaccgtgggg ggcgggggtca cgatcggccc catcacgatc 1980
 cagggccttc atatcccggc ggcgccggga gtggggaaca ccaccacggc cccgtcgtcg 2040
 ggattcttca actccggtgc ggggtggggtg tcgggtttcg gcaacgtcgg cgcgggcagc 2100
 tcgggctggt ggaaccaggc gccgagcgcg ctgttggggg ccggttcggg tggttggaac 2160
 25 gtgggcaccc tgggctcggg tgtgctcaac ctgggctcag ggatctcggg gttctacaac 2220
 accagcgtgt tgcctttcgg gacaccggcg gcggtgtcgg gcatcggcaa cctgggccag 2280
 cagctgtcgg ggggtgtcgg ggcgggaacc acgtgcgct cgatgctcgc cggcaacctc 2340
 ggggttgcca atgtgggcaa cttcaacacc ggggttcgaa atgtcgggga cgtcaacctg 2400
 ggtgcggcca acatcgggtg gcacaacctg ggcctgggca atgtcgggga cggcaacctg 2460
 30 ggggttgggca acatcggcca tggcaacctg ggggttgcca acttgggcct gaccgccggc 2520
 gcggcggggg tgggcaatgt tggttttggc aatgccggca tcaacaacta tggcttggcg 2580
 aacatgggtg tgggcaatat tgggtttgcc aacaccggca cgggcaacat cgggatcggg 2640

ctggtcgggg accatcggac cgggatcggg ggcttgaact ccggcatcgg caatatcggg 2700
 ttgttcaact ccggcaccgg caacgtcggg ttcttcaatt ccgggaccgg caacttcggc 2760
 atcgggaact ccggccgctt caacaccggg atcggtaata gcggaacggc cagcaccggg 2820
 ctcttcaatg ccggcagctt cagcaccggc atcgccaaca ctggtgacta caacacgggc 2880
 5 agcttcaacg ccggcgacac caacaccggt ggcttcaacc cgggcggcat caacaccggc 2940
 tggttcaaca ccgggcatgc caacaccggg ttggccaacg cgggcacett cggcaccggc 3000
 gccttcatga cgggcgacta cagcaacggc ctgttgtggc ggggcggcta cgaggcctg 3060
 gtcggcgctc gcgtcgggcc cacgatctcc caattcccgg tcaccgtgca cgcgatcggc 3120
 ggggtgggcc cgctgcatgt ggcgcccgtc ccggtaccgg ccgtgcacgt cgagatcacc 3180
 10 gacgccaccg tcggcctggg tccgttcacc gtcccaccga tcagcattcc ctacttccc 3240
 atcgccagca tcaccggaag cgtggacctg gccgcaaaca ccatctcgcc gattcgcgct 3300
 cttagcccg ctcgccggtt gatagggctt tttctcgagc cgttccgctt cagtgacca 3360
 tttatcacca ttgatgcgtt ccaagtgtgt gccggtgtct tgttcctaga gaacatcatt 3420
 gtgcccggcc tcacggttag cgtcagata ttggtcacc cgacaccaat tcccctaacc 3480
 15 ctcaacttgg acaccacccc gtggacgctt ttcccgaatg gtttcacat tcccgcgcaa 3540
 acccccgtga cgggtgggtat ggaggtcgcc aacgacgggt tcaccttctt cccgggtggg 3600
 ctgacctttc cgcgggcctc cgccgggggtc accggactgt ccgtgggggt ggacgcgttc 3660
 acgctgttgc ccgacgggtt caccctcgac accgtgccgg cgaccttga cggcaccatc 3720
 ctcatcggcg atatcccgat cccgatcatc gatgtgccgg cggtgccggg gttcggcaac 3780
 20 accaccacgg ccccatcgtc ggggttcttc aacaccggcg gcggcgggtg atcggggttc 3840
 gccaacgtcg gcgcgggcac gtcgggctgg tggaaccagg ggcacgacgt gttagcaggg 3900
 gcgggctcgg gagttgccaa tgccggcacg ctgagctcgg gcgtgctgaa cgtcggctcg 3960
 gggatctccg ggtggtacaa caccagcacc ctgggagcgg gcacccggc ggtggtctcg 4020
 ggcacgcgca acctcggcca gcagctgtcg gggttcttgg caaatgggac cgtgctcaac 4080
 25 cggagcccca ttgtcaatat cgggtgggcc gatgtgggcg cgttcaacac cgggttgggc 4140
 aatgtggggg acctcaactg ggggtcggcc aacatcggcg cgcagaacct gggcctgggc 4200
 aatctcggca gcgggaacgt cgggttcggc aacatcgggt ccggcaacgt cgggttcgcc 4260
 aactcgggtc cggcgggtgg cctggccggc ctgggcaacg tggggttgag caatgccggc 4320
 agcaacaact gggggctggc caacctgggt gtgggcaaca tcgggttggc caacaccggc 4380
 30 acgggcaaca tcgggatcgg gctggtcggc gactaccaga ccggcatcgg cggcctcaac 4440
 tcgggtagt gcaatatcgg attgttcaat tccggcaccg gcaatgtcgg gttcttcaac 4500
 accggcaccg gcaacttcgg actgttcaac tccggtagtt tcaacaccgg catcggtaat 4560

agcgggaaccg gcagtactgg gctcttcaat gccgggaatt tcaacaccgg catcgccaac 4620
 cccggggtcgt acaacacggg cagcttcaat gtcggtgata ccaacaccgg tggtttcaac 4680
 ccgggcgaca tcaacaccgg ctggttcaac accggcatta tgaatacggg caccgcgaac 4740
 accggcgccc tcatgtcggg gaccgacagc aacggcatgc tgtggcgcg cgaccacgag 4800
 5 ggcctgttcg gcctgtccta tggcatcacg atcccgcaat tccgatccg catcaccacg 4860
 actggcggtg tcggcccat cgtcatccc gacaccacga tccttcggc gctgcacctg 4920
 cagatcacgg gcgacgcgga ctacagcttc accgtgccc acatcccat ccccgccatc 4980
 cacatcgga tcaatggcgt cgtcacggtc ggcttcaccg ccccggaagc caccctgctg 5040
 tccgccctga agaataacgg tagcttcatc agcttcggc ccatcacgct ctggaatatc 5100
 10 gatattccgc ccatggattt caggttaggc ctgcccgttc ttggtcctat caggggccaa 5160
 ctgaggacaa ttcatttga gccaatcgtg gtggccggga tcggtgtgcc cctggagatc 5220
 gagcccatcc ccttgatgc gatttcgtt agtgagtcga ttcctatccg catacctgtt 5280
 gatattccgg cctcggatc cgatgggatt tcaatgtcgg aagtgggtgcc gatcgatgcg 5340
 tccgtggaca tcccgcggt cagcatcaca ggcaccacca tttccgcat cccgtgggc 5400
 15 ttcgacattc gcaccagtgc cggaccctc aacatcccga tcatcgacat cccggcgcg 5460
 ccgggcttcg ggaactcgac ccagatgccg tcgtcgggt tcttcaacac cggtgccggc 5520
 ggcggatcgg gcatcgcaa cttgggtgcg ggcgtgtcgg gcctgtcaa ccaggccggc 5580
 gcggggtcac tgggtgggac actctcgggg ctgggcaatg ccggcaccct ggcctcgggt 5640
 gtgctgaact ccggcaccgc catctcgggg ctgttcaacg tgagcacgct ggacgccacc 5700
 20 acccggcg tgatctcggg gttcagcaac ctgcccagc atatgtcggg ggtgtccatc 5760
 gatggcctga tcgcatcct caccttcca cctgccagt ccgtgttga tcagatcatc 5820
 gacgcggcca tcgccgagct gcagcacctc gacatcgga acgctttggc cttgggcaat 5880
 gtcggcgggg tgaacctcg tttggctaac gtcggtgagt tcaacctggg tgcgggcaac 5940
 gtcggcaaca tcaacgtcgg cgccggcaac ctgcccggca gcaacttggg gttgggcaac 6000
 25 gtcgggaccg gcaacctcg gttcggcaac atcgggtgcc gcaatttcgg attcggcaac 6060
 gcgggcctga ccgcgggcgc ggggggcctg ggcaatgtgg ggttgggtaa cgccggcagc 6120
 ggcagctggg ggttggccaa cgtgggtgtg ggcaatatc ggttggccaa caccggcacc 6180
 ggcaacatcg ggatcgggct gaccggggac tatcggaccg ggatcggcg cctgaactcg 6240
 ggcaccggga acctcgggtt gttcaactcg ggcaccggca acatcgggtt cttcaacacc 6300
 30 gggaccggga acttcgggct gttcaactcg ggcagttaca gcaccggtgt ggggaatgcg 6360
 ggcacggcca gcaccgggtt gttcaacgcg ggggaacttca acaccggtct ggccaatgcc 6420
 ggctcctaca acaccggcag cctcaacgtg ggcagcttca acaccggcg cgtcaacccg 6480

ggcaaccgtca acaccggctg gttcaacacc ggccacacca acaccggcct gttcaacacc 6540
 ggcaacgtca acaccggcgc gttcaactcc ggcagcttca acaacggggc gctgtggacc 6600
 ggtgactacc acgggctggt cggcttctcc ttcagcatcg acatcgccgg cagcaccctg 6660
 ctggacctca acgaaaccct caacctgggc cccatccaca tcgagcagat cgacatcccc 6720
 5 ggcattgtcgc tggtcgacgt ccacgaaatc gtcgagatcg gacccttcac catcccgcag 6780
 gtcgatgttc ccgcgatacc gctagagatc cacgaatcga tccacatgga tcccatcgtc 6840
 ctggtgcccc ccaccacaat tcccgcacag acgagaacca ttccgctgga catccccgcc 6900
 tcaccgggt caaccatgac gcttccgctc atcagcatgc gcttcgaagg cgaggactgg 6960
 atcctcgggt cgaccgcggc gattcccaat ttcggagacc ccttcccggc gccacccag 7020
 10 ggcattacca ttcacaccgg ccctggcccc ggaacgaccg gcgagctcaa gatatttatt 7080
 ccgggtttcg agattccgca aatcgctacc acgagattcc tggtggacgt gaacatcagc 7140
 ggtggtctgc cggccttcac cttgttcgcg ggtggcctga cgatccccac gaacgccatc 7200
 ccgttaacga tcgatgcgtc cggcgcgctg gatccgatca cgattttccc ggggtgggtac 7260
 acgatcgacc cgctgccgct gcacctggcg ctgaattctc ccgtgcccga cagcagcatc 7320
 15 ccgatcatcg atgtcccgcc gacgccaggg ttcggcaaca ccacggcgac ccgctcgtcg 7380
 gggttcttca actccggcgc cgggtggggtg tcggggttcg gaaacgctcg gtcgaacctg 7440
 tcgggctggt ggaaccaggc ggcgagcgcg ctggcggggt cgggatcggg ggtgttgaat 7500
 gtcggcacgc tgggctcggg tgtgtctaac gtcggctcgg gtgtctcggg gatctacaac 7560
 accagcgtgt tgccgctcgg gacgccggcg gtgtgtcgg gcctcggcaa cgtcggccat 7620
 20 cagctgtcgg gcgtgtctgc ggccgggacc gcgttgaacc agatccccat cctcaacatc 7680
 gggttggcgg atgtgggcaa cttcaacgtc gggttcggca acgtcgggga cgtaacctg 7740
 ggcgcggcca acctcgggtg gcaaaacctg gggctgggca acgtcggcac cggcaacctc 7800
 ggcttcgcca acgtcggcca cggcaatatc ggtttcggca attcgggtct gaccgccggc 7860
 gcggccggcc tgggcaacac ggggttcggc aatgccggca gcgccaacta tggtttcgcc 7920
 25 aaccagggcg tgcgcaacat cgggttggcc aacaccggca ccggcaacat cgggatcggg 7980
 ctggtggggg acaacctcac cggcatcggg ggcctgaact ccggtgccgg caatatcggc 8040
 ttgttcaact ccggcaccgg caacatcggg ttcttcaact ccgggaccgg caacttcggc 8100
 atcggtaact cgggcagctt caacaccggc atcggaata gcggaacggg cagcactggg 8160
 ctcttcaatg ccggcagctt caacaccggc gtggccaacg ccggcagcta caacaccggc 8220
 30 agcttcaatg ccggcgacac caacaccggg gggttcaacc cgggcacat caacaccggc 8280
 tggttcaaca ccggccacac caataccggc atcgccaact cgggcaacgt cggcaccggc 8340
 gcgttcatgt cgggcaactt cagcaacggc ctgttggtgg ggggtgatca cgagggcctg 8400

ttcagcctgt tctacagcct cgacgtgccc cggatcacca tcgtggacgc ccacctcgac 8460
 ggcggttcg gaccggtgt cctcccgccc atcccggtgc cggccgtaa tgcgacactg 8520
 accggaaacg tcgcatggg cgcatcacc attccgcaga tcgacatccc cgactcacc 8580
 ccaaactca ccggaagcgc cgccttccgc atcgttgtgg ggtccgtgcg cattccgccg 8640
 5 gtgagtgtca ttgtggagca aataatcaac gcctcggttg gggcgagat gaggatagat 8700
 cccttcgaaa tgtggactca aggcactaat ggccttggtg taaccttcta ttcattcgga 8760
 tcggccgacg gttcgcccta cgccaccggc cactcgttt tcggcgccgg cagcagcgac 8820
 ggaagccatc tcaccatttc cgcgtccagc gggcggttta cactccgca gtcgaaact 8880
 gggccgatca cgttgggctt ccagggtgccc ggcagcgtca acgcgatcac cctcttcccc 8940
 10 ggtggtttga cgttcccggc gacctcgctg ctgaacctgg acgtgaccgc cggcgccggc 9000
 ggcgtggaca tcccggccat cactggccc gagatcgcg cgagcgcca cggctcggtg 9060
 tatgtcctcg ccagcagcat cccgtgatc aacatccgc ccacccggg cattgggaac 9120
 agcaccatca cccgctcgtc gggcttcttc aacgccggcg cggcggggg atcgggcttc 9180
 ggcaacttcg gcgcgggcac ctcgggctgg tggaaaccagg cgacaccgc gctggcgggg 9240
 15 gcgggctcgg gttttgcaa cgttggcacg ctgcattccg gtgtgtcaa cctgggctcg 9300
 ggtgtctcgg ggatctaaa caccagcacg ctgggggtgg ggacccggc gctggtctca 9360
 ggcctgggca acgtcgcca ccaactgtcg gggctgctt ccggcggtc cgcggtgaac 9420
 ccggtgaccg ttctgaatat cgggttggcc aacgtcgga gccacaacgc cggtttcggc 9480
 aatgtcgggg aggtcaacct gggcgcgcc aacctcgcg cgacaacct gggcttcgga 9540
 20 aatatcgcg ccggcaacct ggggttcggc aatattggc acggcaatgt cggagtcggc 9600
 aactcgggtc tgaccgcggg cgtgccgggc ctgggcaatg tggggttggg caatgccggc 9660
 ggcaacaact gggggttggc caacgtgggc gtgggcaata tcgggttggc caacaccggc 9720
 accggcaaca ttgggatcgg gctgaccggc gactaccaga ccggcatcgg cggcctaaat 9780
 tccggtgccg gcaacctggg gttgttcaac tccggcgccg gcaacgtcgg gttcttcaac 9840
 25 accgggaccg gcaacttcgg gttgttcaac tccggcagct tcaacaccgg cgtcggcaat 9900
 agcggaaacg gcagcactgg gctcttcaat gccggcagtt tcaacaccgg tgtggccaac 9960
 gccggcagct acaacacggg cagcttcaat gtcggtgaca ccaacaccgg gggcttcaac 10020
 ccgggcagca tcaacaccgg ctggctcaac gccggcaacg ccaacaccgg ggtggccaac 10080
 gcgggcaatg tcaacaccgg cgccttcgtc accggcaact tcagcaacgg catcctgtgg 10140
 30 cgcggcgact accagggcct ggccggcttc gccgtgggt acaccctcc gctgttcccc 10200
 gcggtggggc ccgacgtcag cggcgggatc gggcgatta ccgtgctgcc gccatccac 10260
 atcccgcca ttccggtcgg ctcgcccg gtcggtggca tcggccgat cgccatccc 10320

gacatctctg ttccatccat tcacttgggc ctcgaccccg ccgtccatgt cggctccatc 10380
 accgtcaacc ccattaccgt caggaccccg cccgtgctcg tcagttactc ccaaggagcc 10440
 gtcaccagca cgtccggacc aacctcagag atttgggtca agcccagctt cttccccgga 10500
 atccggatcg cgccctctag cggcgggggt gcaacgtcca cgcaaggggc atactttgtg 10560
 5 gggcccatct ccatcccctc cggcacggtg accttcccgg gattcaccat ccccctcgac 10620
 ccgatcgaca tcggcctgcc ggtgtcgtcg accatcccgg ggttcaccat cccgggcggc 10680
 accctgatcc ccaccctccc gctgggcctc gcgttgtcca atggcatccc gcccgctcgac 10740
 atcccggcca tcgttctcga ccggatcttg ctggacctgc acgccgacac cactatcggc 10800
 ccgatcaacg tcccgatcgc cgggttcggc ggggcgcggg gtttcgggaa ctcgaccacg 10860
 10 ctgccgtcgt cgggcttctt caacaccgga gctggcggcg gttcgggctt tagcaacacc 10920
 ggcgcgggca tgtcgggatt gctcaacgcg atgtcggatc cgctgctcgg gtcggcgtcg 10980
 ggcttcgcca acttcggcac ccagctctcc ggcacctca accgcggcgc cggcatctcg 11040
 ggcgtgtaca acaccggcgc gctgggtgtt gtcaccgcgg ccgtcgtctc gggtttcggc 11100
 aacgtcggcc agcaactgtc gggcttgctc ttcaccggcg tcgggcccta a 11151
 15 <210> 26
 <211> 10
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 26
 20 Ala Glu Met Lys Thr Asp Ala Ala Thr Leu
 1 5 10
 <210> 27
 <211> 10
 <212> PRT
 25 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 27
 Arg Ala Asp Glu Glu Gln Gln Gln Ala Leu
 1 5 10
 <210> 28
 30 <211> 10
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis

<400> 28
 Thr Ala Ala Gln Ala Ala Val Val Arg Phe
 1 5 10
 <210> 29
 5 <211> 8
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 29
 Ala Glu Met Lys Thr Asp Ala Ala
 10 1 5
 <210> 30
 <211> 11
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 15 <400> 30
 Ala Glu Met Lys Thr Asp Ala Ala Thr Leu Ala
 1 5 10
 <210> 31
 <211> 9
 20 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 31
 Asn Ile Arg Gln Ala Gly Val Gln Tyr
 1 5
 25 <210> 32
 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 32
 30 Glu Met Lys Thr Asp Ala Ala Thr Leu
 1 5
 <210> 33

<211> 10
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 33
 5 Ala Glu Met Lys Thr Asp Ala Ala Thr Leu
 1 5 10
 <210> 34
 <211> 9
 <212> PRT
 10 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 34
 Leu Leu Asp Ala His Ile Pro Gln Leu
 1 5
 <210> 35
 15 <211> 9
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 35
 Ala Ala His Ala Arg Phe Val Ala Ala
 20 1 5
 <210> 36
 <211> 11
 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 25 <400> 36
 Ala Val Ile Asn Thr Thr Cys Asn Tyr Gly Gln
 1 5 10
 <210> 37
 <211> 9
 30 <212> PRT
 <213> Mycobacterium tuberculosis
 <400> 37

Ala Ser Pro Val Ala Gln Ser Tyr Leu

1 5

<210> 38

<211> 10

5 <212> PRT

<213> Mycobacterium tuberculosis

<400> 38

Glu Leu Pro Gln Trp Leu Ser Ala Asn Arg

1 5 10

REIVINDICAÇÕES

1. Método para detecção de *Mycobacterium tuberculosis* em um indivíduo compreendendo:

contato de uma amostra biológica do indivíduo compreendendo
5 células T com um ou mais polipeptídeos de *Mycobacterium*, e uma célula
apresentando antígeno apresentando o um ou mais polipeptídeos de *Myco-*
bacterium em que o um ou mais polipeptídeos de *Mycobacterium* compreen-
dem uma seqüência de aminoácido mostrada como

(a) uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 ou SEQ ID NO: 12;

(b) pelo menos nove a vinte aminoácidos consecutivos de pelo menos uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 OU SEQ ID NO: 12; em que os nove a vinte aminoácidos consecutivos especificamente se ligam a complexo de histôcompatibilidade principal (MHC) classe I; e

20 determinação de se as células T especificamente reconhecem o polipeptídeo de *Mycobacterium*, em que a presença de células T que especificamente reconhecem o polipeptídeo de *Mycobacterium* detecta *Mycobacterium tuberculosis* no indivíduo.

25 2. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a seqüência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 1.

30 3. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 1 que especificamente se ligam a MHC classe I ou um polinucleotídeo codificando o polipeptídeo.

4. Método de acordo com a reivindicação 3, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a seqüência de aminoácido QTVEDE

ARRMW (aminoácidos 24 a 34 de SEQ ID NO: 1).

5. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 2.

5 6. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 2 que especificamente se ligam a HMC classe I.

7. Método de acordo com a reivindicação 6, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido VSAAIAGLF
10 (aminoácidos 47 a 55 de SEQ ID NO: 2).

8. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 3.

9. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 3 que especificamente se ligam a MHC classe I.
15

10. Método de acordo com a reivindicação 9, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende aminoácidos 53 a 67 de SEQ ID NO: 3.

11. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 4.
20

12. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 4 que especificamente se ligam a MHC classe I.

13. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 5.
25

14. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 5 que especificamente se ligam a MHC classe I.
30

15. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada

como SEQ ID NO: 6.

16. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 6 que especificamente se ligam a MHC classe I.

5 17. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 7.

18. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 7 que especificamente se ligam a MHC classe I.

19. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 8.

20. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 8 que especificamente se ligam a MHC classe I.

21. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 9.

22. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 9 que especificamente se ligam a MHC classe I.

23. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 10.

24. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 10 que especificamente se ligam a MHC classe I.

25. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a sequência de aminoácido mostrada como SEQ ID NO: 11.

26. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipep-

tídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 11 que especificamente se ligam a MHC classe I.

27. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende a seqüência de aminoácido mostrada
5 como SEQ ID NO: 12.

28. Método de acordo com a reivindicação 1, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende pelo menos nove aminoácidos consecutivos de SEQ ID NO: 12 que especificamente se ligam a MHC classe I.

29. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1-
10 28, em que as células T são células T CD8+.

30. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1-29, em que a determinação de se as células T CD8⁺ especificamente reconhecem o polipeptídeo de *Mycobacterium* é determinada medindo a secreção de uma citocina a partir das células T CD8⁺.

31. Método de acordo com a reivindicação 30, em que a citocina
15 é interferon (IFN)- γ .

32. Método de acordo com a reivindicação 31, em que a medição da secreção de IFN- γ é determinada usando um anticorpo que especificamente se liga a IFN- γ .

33. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1-
20 32, em que a amostra biológica é sangue, células mononucleares de sangue periférico isoladas, células mononucleares isoladas

34. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1-32, em que as células T são cultivadas *in vitro* com o polipeptídeo de *Myco-
25 bacterium*.

35. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 1-33, em que o polipeptídeo é administrado ao indivíduo.

36. Método de detecção de *Mycobacterium tuberculosis* em um indivíduo compreendendo:

30 administrar ao indivíduo uma quantidade eficaz de um polipeptídeo de *Mycobacterium* à pele do indivíduo, em que o polipeptídeo de *Myco-
bacterium* compreende uma seqüência de aminoácido mostrada como (a)

uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 ou SEQ ID NO: 12; ou

- 5 (b) pelo menos nove a vinte aminoácidos consecutivos de pelo menos uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 OU SEQ ID NO: 12; em que os nove a vinte aminoácidos
- 10 consecutivos especificamente se ligam a complexo de histocompatibilidade principal (MHC) classe I; e

detecção da presença de células T CD8+ que especificamente reconhecem o polipeptídeo de *Mycobacterium* no indivíduo.

37. Método de acordo com a reivindicação 36, em que a detecção da presença de células T CD8+ compreende detecção da presença de células T CD8+ *in vivo*.
- 15

38. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 35-37, em que a detecção da presença de células T CD8+ compreende detecção de uma reação de hipersensibilidade do tipo retardada.

- 20 39. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações 35-38, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* é administrado intradermalmente ao indivíduo, e em que a reação de hipersensibilidade do tipo retardada é medida através da medição de vermelhidão, inchaço ou endurecimento da pele.

- 25 40. Método de detecção de uma infecção por *Mycobacterium tuberculosis* em um indivíduo compreendendo

- detecção da presença de um polipeptídeo de *Mycobacterium* ou um polinucleotídeo codificando o polipeptídeo em uma amostra do indivíduo, em que o polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende uma seqüência de aminoácido mostrada como uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID
- 30

NO: 10, SEQ ID NO: 11 ou SEQ ID NO: 12.

41. Método de acordo com a reivindicação 40 compreendendo determinar a presença do polipeptídeo de *Mycobacterium*.

42. Método de acordo com a reivindicação 41, em que a detecção da presença do polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende o uso de um anticorpo que especificamente se liga a polipeptídeo de *Mycobacterium*.

43. Método de acordo com a reivindicação 40 compreendendo determinar a presença do polinucleotídeo de *Mycobacterium*.

44. Método de acordo com a reivindicação 43, em que a determinação da presença do polipeptídeo de *Mycobacterium* compreende o uso de reação de cadeia de polimerase.

45. Método de acordo com a reivindicação 40, em que a amostra biológica é sangue, células mononucleares de sangue periférico, esputo, uma biópsia de pulmão, uma biópsia de nó linfático, saliva, fluido espinhal cerebral ou células T isoladas.

46. Método de detecção de células T expressando CD8 que especificamente reconhecem SEQ ID NO: 1 em um indivíduo compreendendo

(A) contato de células mononucleares de sangue periférico isoladas do indivíduo com um reagente compreendendo

(1) um polipeptídeo de *Mycobacterium* compreendendo pelo menos nove a vinte aminoácidos consecutivos de pelo menos uma das seqüências de aminoácido mostradas como SEQ ID NO: 1, SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 3, SEQ ID NO: 4, SEQ ID NO: 5, SEQ ID NO: 6, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 7, SEQ ID NO: 8, SEQ ID NO: 9, SEQ ID NO: 10, SEQ ID NO: 11 ou SEQ ID NO: 12, em que os nove a vinte aminoácidos consecutivos especificamente se ligam a complexo de histocompatibilidade principal (MHC) classe I;

(2) polipeptídeo de cadeia pesada HLA e β 2-microglobulina; e

(3) estreptavidina, em que o reagente é marcado ou não-marcado; e

(B) detecção da presença do reagente ligado às células mononucleares de sangue periférico, deste modo detectando células T expres-


sando CD8 que especificamente se ligam ao polipeptídeo de *Mycobacterium*.

47. Método de acordo com a reivindicação 46 compreendendo ainda quantificação do número de células T CD8+ que se ligam ao reagente.

5 48. Método de acordo com a reivindicação 46, em que o reagente é marcado.

49. Método de acordo com a reivindicação 48, em que o marcador é fluorcromo.

FIG. 1








FIG. 2


a) Identificação de antígeno



b) Identificação de Peptídeo de 15 mer



c) Identificação de Epítomos Mínimos



d) Identificação de Alelo de restrição




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

RESUMO

Patente de Invenção: "MÉTODOS PARA DETECÇÃO DE UMA INFECÇÃO POR *MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS*".

5 A presente invenção refere-se a métodos para detecção de uma infecção com *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) em um indivíduo que são descritos. Os métodos incluem detecção da presença de células T CD8+ que especificamente reconhecem polipeptídeo de Mtb. Os métodos incluem ensaios *in vitro* para detecção da presença de células T CD8+ em uma amostra biológica, e ensaios *in vivo* que detectam uma reação de hipersensibilidade do tipo retardado. Os métodos podem também incluir detecção de polipeptídeos e polinucleotídeos de Mtb. Reagentes para detecção de uma
10 infecção por Mtb são também descritos.