



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101095762 B

(45) 授权公告日 2012.06.20

(21) 申请号 200710138948.3

(22) 申请日 2007.07.16

(73) 专利权人 陆宏成

地址 311400 浙江省富阳市富春街道杨梅山
村 1 号信箱 (便民诊所)

(72) 发明人 陆宏成

(51) Int. Cl.

A61K 36/86 (2006.01)

A61P 11/04 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 1965960 A, 2007.05.23, 说明书第 1 页倒数第 1-8 行.

戴美友. 急性扁桃体炎的中医治疗概况.《中
医药学报》. 1997, (第 4 期), 第 54-56 页.

审查员 吴立坤

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物及
制备方法

(57) 摘要

一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物及
制备方法, 涉及治疗急性卡他性扁桃体炎的中草
药配方, 其药物是由下述重量的原料制成的: 金
银花 18-20 克, 连翘、紫花地丁、赤茯苓、夏枯草各
13-15 克, 黄芩、马勃、牡丹皮、桔梗、薄荷各 8-10
克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低
廉、见效快。

1. 一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物,其特征在于该药物是由下述重量的原料药制成的:金银花 18-20 克,连翘、紫花地丁、赤茯苓、夏枯草各 13-15 克,黄芩、马勃、牡丹皮、桔梗、薄荷各 8-10 克。

一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物及制备方法

技术领域：

[0001] 本发明涉及中草药领域，尤其是涉及防治急性卡他性扁桃体炎效果十分理想的一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物及制备方法。

背景技术：

[0002] 急性卡他性扁桃体炎是由于病毒感染引起的急性扁桃体炎症。该炎症的症状表现为：咽痛，低热和全身轻度不适感等。目前，国内外治疗急性卡他性扁桃体炎的方法较多，如西医治疗法，常用药有螺旋霉素、冰硼散、碘喉片等；如中医治疗法，常用药有西瓜霜、牛黄解毒片等。但是，在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

[0003] 经检索未发现有与本发明相同的配方。

发明内容：

[0004] 本发明采用的治疗方法为中草药汤剂治疗法。

[0005] 本发明的目的在于克服目前在治疗急性卡他性扁桃体炎上的不足之处，并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗急性卡他性扁桃体炎的中草药汤剂药物及制备方法。

[0006] 本发明的技术方案是这样实现的：

[0007] 一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物，其药物是由下述重量的原料制成的：金银花 18-20 克，连翘、紫花地丁、赤茯苓、夏枯草各 13-15 克，黄芩、马勃、牡丹皮、桔梗、薄荷各 8-10 克。

[0008] 一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物，其药物的制备方法为：先将配比量金银花、连翘、紫花地丁、赤茯苓、夏枯草、黄芩、马勃、牡丹皮、桔梗、薄荷等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0009] 本发明汤剂药物里：金银花具有清热解毒作用；连翘具有清热解毒、消肿排脓作用；紫花地丁具有清热解毒、消痈肿作用；赤茯苓具有行水、利湿热作用；夏枯草具有清肝热、散郁结作用；黄芩具有清热泻火、除湿解毒作用；马勃具有清热、利咽、解毒作用；牡丹皮具有清热凉血、活血行瘀作用；桔梗具有清肺、祛痰利咽作用；薄荷具有疏散风热、清利头目作用。上述中草药经有机组合、辨证配伍和相互辅佐，增强了该药物清热解毒、利咽止痛的功效，从而达到治愈急性卡他性扁桃体炎的目的。

[0010] 使用本发明的治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物治疗急性卡他性扁桃体炎有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

[0011] 服用方法：

[0012] 1、药量：每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后，分两次服用。

[0013] 2、服药时间：上、下午各一次，在饭后两小时服药。

[0014] 3、药温控制：温服。

[0015] 禁忌事项：

[0016] 治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

[0017] 实施例1：一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物的原料配方：金银花18克，连翘、紫花地丁、赤茯苓、夏枯草各13克，黄芩、马勃、牡丹皮、桔梗、薄荷各8克。药物的制备方法为：先将配比量金银花、连翘、紫花地丁、赤茯苓、夏枯草、黄芩、马勃、牡丹皮、桔梗、薄荷等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面2-3cm为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬15分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0018] 实施例2：一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物的原料配方：金银花20克，连翘、紫花地丁、赤茯苓、夏枯草各15克，黄芩、马勃、牡丹皮、桔梗、薄荷各10克。药物的制备方法为：先将配比量金银花、连翘、紫花地丁、赤茯苓、夏枯草、黄芩、马勃、牡丹皮、桔梗、薄荷等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面2-3cm为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬15分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

[0019] 治疗效果：

[0020] 疗效标准：一种治疗急性卡他性扁桃体炎的汤剂药物治疗急性卡他性扁桃体炎之疗效判断主要依据于急性卡他性扁桃体炎症状是否消失。服药7天为1个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——急性卡他性扁桃体炎症状全部消失；好转——急性卡他性扁桃体炎症状明显减少；无效——服药1个疗程后，急性卡他性扁桃体炎症状毫无消失。

[0021] 效果：用该药物治疗急性卡他性扁桃体炎患者30例，治疗1个疗程，其中治愈26例，好转4例，治愈率为87%，有效率为100%。

[0022] 典型病例：

[0023] 徐某某，女，46岁，农民。2003年5月就诊。患者自述，近两天感觉咽喉疼痛，吞咽困难。诊查，患者咽喉部肿大，有低热。诊断为急性卡他性扁桃体炎。采用本发明汤剂药物，连服7天，症状全消。3个月后追访，未见复发。