(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2015-512436

(P2015-512436A)

(43) 公表日 平成27年4月27日(2015.4.27)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C07D 241/18 (2006.01)	C07D 241/18 CSP	4C076
A61P 7/06 (2006.01)	A61P 7/06	4C086
A61K 31/4965 (2006.01)	A61K 31/4965	
A61P 3/02 (2006.01)	A61P 3/02	
A61P 25/28 (2006.01)	A61P 25/28	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 56 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2015-503874 (P2015-503874)	(71) 出願人	509203050 ヴィフォール (インターナショナル) アクチェンゲゼルシャフト Vifor (International) AG スイス連邦, CH-9001 ザンクト・ガレン, レッヒェンシュトラッセ 37
(86) (22) 出願日	平成25年4月4日 (2013.4.4)	(74) 代理人	100090251 弁理士 森田 憲一
(85) 翻訳文提出日	平成26年12月3日 (2014.12.3)	(74) 代理人	100139594 弁理士 山口 健次郎
(86) 国際出願番号	PCT/EP2013/057071	(74) 代理人	100185915 弁理士 長山 弘典
(87) 国際公開番号	W02013/150087	(74) 代理人	100194973 弁理士 尾崎 祐朗
(87) 国際公開日	平成25年10月10日 (2013.10.10)		
(31) 優先権主張番号	12163308.5		
(32) 優先日	平成24年4月5日 (2012.4.5)		
(33) 優先権主張国	欧州特許庁 (EP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血の治療及び予防のための Fe (III) 錯体化合物

(57) 【要約】

本発明は、薬剤として使用するための、とりわけ鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血の治療及び/又は予防のための、鉄 (III) 錯体化合物及びそれらを含む医薬組成物に関する。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血並びにそれらに付随する症状の治療及び予防に使用するための鉄(III) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩。

【請求項 2】

下記式 (I) :

【化 1】

10

[上記式中、

矢印はそれぞれ 1 つ又は複数の鉄原子への配位結合を表し、そして

R_1 、 R_2 、 R_3 は同じであるか又は異なっていることができ、そして以下 :

- 水素原子、
- ハロゲン原子、
- 場合により置換されていることがあるアルキル基、
- 場合により置換されていることがあるアルコキシ基、
- 場合により置換されていることがあるアリール基、
- 場合により置換されていることがあるアルコキシカルボニル基、及び
- 場合により置換されていることがあるアミノカルボニル基、

からなる群から選択されるか、又は

R_2 及び R_3 はそれらが結合している炭素原子と一緒に、場合によりヘテロ原子 1 個又は 2 個以上を含んでいることができる、場合により置換されていることがある飽和又は不飽和の 5 員環又は 6 員環を形成する]

で表される配位子少なくとも 1 個を含有する、請求項 1 に記載の使用のための鉄(III) - 錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩。

30

【請求項 3】

下記式 (I) :

【化 2】

40

[上記式中、

矢印はそれぞれ 1 つ又は複数の鉄原子への配位結合を表し、そして

R_1 、 R_2 、 R_3 は同じであるか又は異なっていることができ、そして以下 :

- 水素原子、
- 場合により置換されていることがあるアルキル基、及び
- ハロゲン原子

からなる群から選択されるか、又は

R_2 及び R_3 はそれらが結合している炭素原子と一緒に、5 員又は 6 員の炭素環式環を形成する]

で表される配位子少なくとも 1 個を含有する、請求項 1 又は 2 に記載の使用のための鉄(III) - 錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩。

50

【請求項 4】

下記式 (I) :

【化 3】

10

[上記式中、

矢印はそれぞれ 1 つ又は複数の鉄原子への配位結合を表し、そして

R_1 、 R_2 、 R_3 は同じであるか又は異なっていることができ、そして水素原子及びアルキル基からなる群から選択され、場合によりアルコキシ基によって置換されていることができ、又は

R_2 及び R_3 は一緒になってプロピレン基 (- $CH_2 - CH_2 - CH_2 -$)、ブチレン基 (- $CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 -$)、アザブチレン基若しくはオキサブチレン基を形成する]

で表される配位子少なくとも 1 個を含有する、請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の使用のための鉄 (I I I) - 錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩。

【請求項 5】

20

下記式 :

【化 4】

30

[上記式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 は同じであるか又は異なっていることができ、そして上記の通りに定義される]

で表される、請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の使用のための鉄 (I I I) - 錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩。

【請求項 6】

固体形態である、請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載の使用のための鉄 (I I I) - 錯体化合物。

40

【請求項 7】

薬剤として使用するための固体形態である、請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載の使用のための鉄 (I I I) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物。

【請求項 8】

前記症状が：疲労、だるさ、集中力の欠如、認知能力の低下、正しい言葉を見出すことの困難性、健忘、不自然な蒼白、怒りっぽさ、心拍数の加速 (頻脈)、舌のただれ又は腫れ、脾臓肥大、変わった食べ物への欲求 (異食)、頭痛、食欲不振、易感染性の増大、抑うつ気分を含む、請求項 1 ~ 6 のいずれか一項に記載の使用のための鉄 (I I I) 錯体化合物。

50

【請求項 9】

妊婦における鉄欠乏性貧血、子供及び青年における潜在的な鉄欠乏性貧血、胃腸異常によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、血液損失、例えば、（例えば、潰瘍、癌腫、痔、炎症性疾患、アセチルサリチル酸の摂取による）胃腸出血などによる鉄欠乏性貧血、月経によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、損傷によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、脱毛（スプルー）による鉄欠乏性貧血、とりわけ選択的に食事をする子供及び青年における、食事の鉄摂取減少による鉄欠乏性貧血、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる免疫不全、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる脳機能障害、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる下肢静止不能症候群、癌の場合の鉄欠乏性貧血、化学療法によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、炎症（A I）によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、うっ血性心不全（C H F；うっ血性心不全）の場合の鉄欠乏性貧血、慢性腎不全ステージ3～5（C K D 3～5；慢性腎臓病ステージ3～5）の場合の鉄欠乏性貧血、慢性炎症（A C D）によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、関節リウマチ（R A；関節リウマチ）の場合の鉄欠乏性貧血、全身性エリテマトーデス（S L E；全身性エリテマトーデス）の場合の鉄欠乏性貧血及び炎症性腸疾患（I B D；炎症性腸疾患）の場合の鉄欠乏性貧血の治療のための請求項1～6のいずれか一項に記載の使用のための鉄（I I I）錯体化合物。

10

【請求項 10】

前記鉄（I I I）錯体化合物が経口投与される、請求項1～9のいずれか一項に記載の使用のための鉄（I I I）錯体化合物。

20

【請求項 11】

腸溶コーティング形態又はpH依存性コーティングを有する形態を含む、錠剤又はカプセル剤の形態で投与される、請求項10に記載の使用のための鉄（I I I）錯体化合物。

【請求項 12】

生理学的に適合性の担体又は賦形剤少なくとも1種を含有する医薬製剤の形態での投与のための請求項10又は11に記載の使用のための鉄（I I I）錯体化合物。

【請求項 13】

請求項1～6又は12のいずれか一項に定義された通りの鉄（I I I）錯体化合物を、鉄代謝に作用するさらなる薬剤少なくとも1種と組み合わせて含有する組成物。

【発明の詳細な説明】

30

【発明の詳細な説明】

【0001】

序論：

本発明は、薬剤として使用するための、とりわけ鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血の治療及び/又は予防のための、鉄（I I I）-ピラジン-2-オール-1-オキシド錯体化合物及びそれらを含有する医薬組成物に関する。

【0002】

背景：

鉄はほとんどすべての生物にとって必須の微量元素であり、とりわけ成長及び血液の形成に関連している。鉄代謝のバランスは、この場合に、主として老化した赤血球のヘモグロビンからの鉄回収及び食事性鉄の十二指腸吸収のレベルで調節される。放出された鉄は腸を介して、とりわけ特定の輸送系（D M T - 1、フェロポルチン、トランスフェリン、トランスフェリン受容体）を介して取り込まれ、血液循環内に移行され、そしてそれによって適切な組織及び器官に運ばれる。

40

【0003】

人体において、元素鉄は酸素輸送、酸素取り込み、ミトコンドリア電子伝達などの細胞機能にとって、及び最終的にはエネルギー代謝全体にとって大変に重要である。

【0004】

平均すると、人体は鉄4～5gを含んでおり、それは酵素中に、ヘモグロビン及びミオグロビン中に存在し、並びにフェリチン及びヘモシデリンの形態で貯蔵鉄又は蓄積鉄とし

50

て存在する。

【0005】

この鉄の略半分である約2gは、赤血球のヘモグロビン中に結合したヘモ鉄として存在する。これらの赤血球は限られた寿命(75~150日間)しか持たないので、新たな赤血球が絶えず形成されなければならない、また古い赤血球は除去されなければならない(毎秒200万個を超える赤血球が形成されている)。この高い再生能力は老化した赤血球を貪食し、それらを溶解し、そしてこのようにして得られた鉄を鉄代謝に再利用するマクロファージによって達成される。赤血球生成に対して一日当たり必要とされる鉄の量約25mgはこのようにしてその主要部分が供給される。

【0006】

成人の毎日の鉄必要量は0.5~1.5mg/日であり、幼児及び妊娠中の女性は2~5mg/日の鉄を必要とする。例えば、皮膚及び上皮細胞の剥離による、毎日の鉄損失は低い;鉄損失の増加は、例えば、女性の月経時の出血の間に生じる。一般に、血液損失は鉄レベルを有意に低下させることがあるが、それは血液2mL当たり鉄約1mgが失われるからである。健康な成人では、正常な毎日約1mgの鉄の損失は、通常、毎日の食物摂取によって置き換えられる。鉄レベルは吸収によって調節されるが、食物中に存在する鉄の吸収率は6~12%である;鉄欠乏の場合、吸収率は25%までとなる。吸収率は鉄の必要量及び鉄貯蔵の大きさに依存して生物によって調節される。その過程で、ヒト生物は二価及び三価鉄イオンの両方を利用する。通常、鉄(III)化合物は十分に酸性のpH値で胃において溶解され、このようにして吸収に利用可能となる。鉄の吸収は、上部小腸で粘膜細胞によって行われる。この過程で、最初に三価の非ヘム鉄が吸収のために腸細胞膜において、例えば、第二鉄還元酵素(膜結合十二指腸シトクロムb)によって、Fe(II)に還元されるので、次いでそれは輸送タンパク質DMT1(二価金属輸送体1)によって腸細胞中に輸送されることが出来る。対照的に、ヘム鉄は何らの変化もなしに細胞膜を通して腸細胞中に入る。腸細胞において、鉄は貯蔵鉄としてフェリチン中に貯蔵されるか、又は輸送タンパク質フェロポルチンによって血液中に排出される。ヘプシジンはこの過程で中心的な役割を果たすが、それはヘプシジンが鉄取り込みの最も重要な調節因子だからである。フェロポルチンによって血液中に輸送された二価鉄は、オキシダーゼ(セルロプラスミン、ヘファエスチン)によって三価鉄に変換され、次いでこの三価鉄はトランスフェリンによって生物中の関連する場所に輸送される(例えば、「Balancing acts: molecular control of mammalian iron metabolism」. M.W. Hentze, Cell 117, 2004, 285-297参照)。

【0007】

哺乳類生物は能動的に鉄を排出することができない。鉄代謝は、マクロファージ、肝細胞及び腸細胞からの鉄の細胞放出を介してヘプシジンによって実質的に制御される。

【0008】

病的な場合、血清の鉄レベルの低下はヘモグロビンレベルの低下、赤血球産生の低下をもたらす、そしてこのようにして貧血をもたらす。

【0009】

貧血の外部病徴として、疲労、蒼白並びに集中力の低下を挙げることができる。貧血の臨床症状として、低い血清鉄レベル(低鉄血症)、低いヘモグロビンレベル、低いヘマトクリットレベル並びに赤血球数の減少、網状赤血球の減少及び可溶性トランスフェリン受容体レベルの上昇を挙げることができる。

【0010】

鉄欠乏症状又は鉄貧血は鉄を供給することによって治療される。この場合に、鉄置換は経口的に又は鉄の静脈内投与によって行われる。さらに、赤血球形成を促進するために、エリスロポエチン及び他の赤血球生成刺激物質も貧血の治療に用いられることができる。

【0011】

貧血は、しばしば、栄養不良又は低鉄食又は鉄分の少ないアンバランスな栄養習慣まで

10

20

30

40

50

遜ることができる。さらに、貧血は、例えば、胃切除術又はクローン病などの疾患による、鉄吸収の低下又は不足が原因で起こる。さらに、鉄欠乏は、例えば、外傷、重度の月経出血又は献血などによる、血液損失の増大の結果として起こることができる。さらに、青年及び子供の成長期並びに妊婦において鉄の必要量が増加することが知られている。鉄欠乏は赤血球形成の低下をもたらすだけでなく、それによって生物の酸素供給不足にも至り、このことは、例えば、疲労、蒼白、集中力の低下などの上記した症状、及びとりわけ青年期に、認知発達への長期的な悪影響をもたらすことがあるので、非常に有効で良好な耐容性の治療がとりわけ注目される。

【0012】

本発明に係る $Fe(III)$ 錯体化合物を用いることによって、古典的な製剤である $FeSO_4$ などの $Fe(II)$ 鉄塩の酸化ストレスによって引き起こされる副作用についての大きな潜在性を受容する必要なしに、経口適用によって鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血を有効に治療する可能性が存在する。従って、鉄欠乏状態の不十分な除去の理由となることが多い低コンプライアンスが回避される。

10

【0013】

従来技術：

鉄欠乏状態の治療のための多数の鉄錯体が先行技術から公知である。

【0014】

これらの錯体化合物の大部分は鉄 - 多糖類錯体化合物である（国際公開第 20081455586 号、国際公開第 2007062546 号、国際公開第 20040437865 号、米国特許出願公開第 2003236224 号、ヨーロッパ特許第 150085 号）。正確には、この範囲から市場で入手可能な薬剤がある（例えば、マルトファー (Maltofer)、ベノファー (Venofer)、フェリンジェクト (Ferinject)、デックスフェラム (Dexferrum)、フェルモキシトール (Ferumoxitol)）。

20

【0015】

高分子錯体化合物の群の別の大きな部分は、鉄 - ペプチド錯体化合物からなる（中国特許第 101481404 号、ヨーロッパ特許第 939083 号、特開平 02 - 083400）。

【0016】

構造的にヘモグロビン、クロロフィル、クルクミン及びヘパリンなどの巨大分子に由来する、文献に記載された Fe 錯体化合物も存在する（米国特許第 474670 号、中国特許第 1687089 号、Biometals, 2009, 22, 701 - 710）。

30

【0017】

さらに、低分子 Fe 錯体化合物も文献に記載されている。多数のこれらの Fe 錯体化合物は配位子としてカルボン酸及びアミノ酸を含む。この場合に、配位子としてアスパラギン酸塩（米国特許出願公開第 2009035385 号）及びクエン酸塩（ヨーロッパ特許第 308362 号）に焦点が当てられている。配位子として誘導体化フェニルアラニン基を含む Fe 錯体化合物もこれに関連して記載されている（スペイン国特許第 2044777 号）。

40

【0018】

ヒドロキシピロン及びヒドロキシピリドン Fe 錯体化合物も文献に記載されている（ヨーロッパ特許第 159194 号、ヨーロッパ特許第 138420 号、ヨーロッパ特許第 107458 号、ヨーロッパ特許第 120670 号）。相応する 5 環系のヒドロキシフラノン Fe 錯体化合物もこれに関連して記載されている（国際公開第 2006037449 号）。しかしながら、とりわけ、ヒドロキシピリドン Fe 錯体化合物は比較的低い水溶性を有しており、このことはそれらをとるわけ経口投与に不向きにしている。さらに、ヒドロキシピリドン Fe 錯体化合物は鉄利用が比較的低い。

【0019】

INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUT

50

RIT I O N R E S E A R C H , 7 7 (1) , 1 3 - 2 1 C O D E N : I J V N A P ; I S S N : 0 3 0 0 - 9 8 3 1 , 2 0 0 7 は、鉄欠乏疾患の治療での使用にフェリクリシン (Ferrichry sine) を記載している。

【 0 0 2 0 】

さらに、鉄 - シクロペンタジエニル錯体化合物も文献に記載されている (英国特許第 8 4 2 6 3 7 号) 。

【 0 0 2 1 】

さらに、1 - ヒドロキシ - 2 (1 H) - ピラジノン (H O P R - H) 及び 1 - ヒドロキシ - 5 , 6 - ジメチル - 2 (1 H) - ピラジノン (H O P R - M e) が記載されている (Bull . Chem . Soc . Jpn . , 6 6 , 8 4 1 - 8 4 1 (1 9 9 3) ; 「 R e v i e w s O n H e t e r o a t o m C h e m i s t r y 」 , V o l . 1 8 , 1 9 9 8 , 8 7 - 1 1 8 頁及び T E T R A H E D R O N , E L S E V I E R S C I E N C E P U B L I S H E R S , A M S T E R D A M , N L , V o l . 5 1 , N o . 4 7 , N o v e m b e r 2 0 , 1 9 9 5 (1 9 9 5 - 1 1 - 2 0) , 1 2 9 9 5 - 1 3 0 0 2 頁、同じ著者ら、も参照されたい) 。 後者の化合物に対し、水溶液中で種々の pH 条件において鉄 (I I I) との 3 : 1 モル混合物の UV - 可視スペクトルが示される。実験から、鉄 (I I I) との 3 : 1 - 錯体の形成が結論される。ピリミジノンとは対照的に、ピラジノン - 錯体化合物の可能な構造は何ら示されない。水溶液中 3 : 1 混合物からの鉄錯体化合物の単離は行われなかった。従って、固体の鉄錯体化合物は何ら単離されず又は開示されなかった。さらに、鉄錯体化合物は、とりわけ鉄欠乏症状の治療などのための、薬剤として提案されていない。同じ著者らは、サラセミアなどの鉄過剰状態の治療のための鉄イオン封鎖剤として六座 1 - ヒドロキシ - 1 H - ピラジン - 2 - オン化合物の使用だけを示唆している (J . O r g . C h e m . 1 9 9 7 , 6 2 , 3 6 1 8 - 3 6 2 4) 。 本発明に係る鉄錯体化合物の投与による鉄欠乏性貧血の治療のように、サラセミアの治療のために身体にヒドロキシ - ピリミジノン化合物又はヒドロキシ - ピラジン化合物を投与することによって、鉄を除去することができる (すなわち、鉄は供給されることはない) 。

【 0 0 2 2 】

J . A m . C h e m . S o c . 1 9 8 5 , 1 0 7 , 6 5 4 0 - 6 5 4 6 は、配位子としての四座 1 - ヒドロキシ - 1 H - ピリジン - 2 - オン化合物及びそれを用いた二核性鉄錯体化合物を記載している。鉄イオン封鎖のために配位子を用いる可能性も言及されている。同様に、Inorganica Chimica Acta, 135 (1987) 145 - 150 は、鉄をマスクする剤としての 1 - ヒドロキシ - 1 H - ピリジン - 2 - オンの使用を開示している。

【 0 0 2 3 】

N A T U R A L P R O D U C T C O M M U N I C A T I O N S ; 2 0 1 1 , 6 (8) , 1 1 3 7 - 1 1 4 0 及び Journal of Agricultural and Food Chemistry , J a n u a r y 1 , 1 9 8 1 (1 9 8 1 - 0 1 - 0 1) , 7 8 5 - 7 8 7 頁は、ネオアスペルギリン酸 (Neoaspergillinsaeure) の鉄 (I I I) - 錯体を記載しており、最初に挙げた出版物は概してその抗菌活性にも言及している。Chemical & Pharmaceutical Bulletin, J a n u a r y 1 , 1 9 7 8 (1 9 7 8 - 0 1 - 0 1) , 1 3 2 0 - 1 3 2 2 頁は、構造的に同様な鉄錯体化合物を記載している。かかる鉄錯体の、とりわけ鉄欠乏性貧血の治療などにおける、薬剤としての使用は言及されていない。

【 0 0 2 4 】

C h e m i c a l & P h a r m a c e u t i c a l B u l l e t i n , J a n u a r y 1 , 1 9 9 4 (1 9 9 4 - 0 1 - 0 1) , 2 7 7 - 2 7 9 頁、Chemical & Pharmaceutical Bulletin, J a n u a r y 1 , 1 9 8 1 (1 9 8 1 - 0 1 - 0 1) , 1 5 1 0 - 1 5 1 7 頁及び H E T E R O C Y C L E S , E L S E V I E R S C I E N C E P U B L I S H E R S B . V . A M S T E R D A M , N L , V o l . 3 5 , N o . 2 , J a n u a r y 1 , 1 9 9 3 (1 9 9 3 - 0 1 - 0 1) , 1

10

20

30

40

50

279 - 1287頁は、アスペルギルス株の代謝産物としてアステクロム (Astechrome) 及びその単離を記載している。かかる鉄錯体の、とりわけ鉄欠乏性貧血の治療などにおける、薬剤としての使用は言及されていない。

【0025】

鉄塩 (例えば、硫酸鉄 (II)、フマル酸鉄 (II)、塩化鉄 (III)、アスパラギン酸鉄 (II)、コハク酸鉄 (II)) は、鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血の治療のための別の重要な成分である。

【0026】

これらの鉄塩は、一つには、悪心、嘔吐、下痢及びまた便秘及び痙攣の形態において非常に不適合 (50%まで) であるということ、大変に問題がある。さらに、反応性酸素種 (ROS) の形成 (とりわけ、フェントン反応) を触媒する遊離の鉄 (II) イオンがこれらの鉄 (II) 塩の使用の間に生じる。これらの ROS は、細胞、組織及び器官における広範囲な影響を及ぼす、DNA、脂質、タンパク質及び炭水化物への損傷を引き起こす。この問題の錯体は公知であり、文献において、高い不適合性の原因と広くみなされ、酸化性ストレスと称されている。

10

【0027】

従って、鉄 (III) - 1 - ヒドロキシ - 1H - ピラジン - 2 - オン又はピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物はそれぞれ、従来技術において今まで、薬剤としても、とりわけ鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血の治療及び/又は予防における使用に対しても記載されてこなかった。

20

【0028】

目的：

本発明の目的は、鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血の好ましくは経口的処理としての有効な治療に使用されることができると認められた。さらに、これらの鉄錯体は、古典的に使用される鉄 (II) 塩よりも有意に少ない副作用を示すことが必要であると認められた。さらに、これらの鉄錯体は、公知の高分子鉄錯体化合物と対照的に、可能な場合、規定の構造 (化学量論) を有しかつ単純な合成方法によって調製できることが必要であると認められた。さらに、これらの化合物は、経口投与において高い鉄利用率をもたらすべきであるが、これは良好な水溶性によって支えられる。最後に、鉄錯体化合物は極めて低い毒性を有していなければならないが、それゆえに非常に高い用量で投与されることができると認められた。この目標は、新規な鉄 (III) 錯体化合物の開発によって達成された。

30

【0029】

さらに、この新規な鉄錯体は、それらが膜を介して腸細胞中に直接に取り込まれこのようにしてフェリチン又はトランスフェリンに直接それらの錯体結合鉄を放出し又は無傷の錯体として直接に血流に達するように設計されることが必要であると認められた。これらの新規な錯体は、その特性のゆえに、高濃度の遊離の鉄イオンを実質的に発生させないことが必要であると認められた。最終的に副作用が生じる原因となる ROS の発生をもたらすのは正確には遊離の鉄イオンである。

【0030】

これらの要件を満たすことができるように、本発明者らは、大きすぎない分子量、中程度の親油性 (Lipophilie) 及び最適の錯体安定性を有する新規の Fe (III) 錯体化合物を開発した。

40

【0031】

発明の説明：

本発明者らは、意外にも、ピラジン - 2 - オール 1 - オキシド配位子を有する Fe (III) 錯体化合物が上記要件にとりわけ適していることを見出した。これらの Fe 錯体化合物が高い鉄取り込みを示し、それによって鉄欠乏性貧血の治療に速やかな治療的成功が達成され得ることを示すことができた。とりわけ、鉄塩と比較すると、本発明に係る錯体化合物はより迅速でより高い利用状態を示した。さらに、これらの新規な系は、古典的に

50

用いられる鉄塩より副作用を有意に低下させたが、それはこの場合に遊離の鉄イオンの顕著な発生がないからである。本発明に係る錯体化合物はほとんど何らの酸化的ストレスも示さないが、それはフリーラジカルの形成がないからである。このように、これらの錯体化合物の場合には、従来技術から公知である Fe 塩の場合よりも生じる副作用が有意に少ない。錯体化合物は種々の pH 値範囲で良好な安定性及び同等に良好な可溶性を示す。さらに、鉄錯体化合物は非常に低い毒性を有しているので副作用なしに高用量で投与されることができる。最後に、錯体化合物は適切に調製されることができ、とりわけ経口投与のための、薬剤の形成に最適に適している。

【 0 0 3 2 】

従って、本発明の主題は、薬剤として使用するための鉄 (I I I) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩、又は人体の治療的処理方法に使用するための等価物 (gleichbedeutend) の、それぞれである。

10

【 0 0 3 3 】

本発明に従って用いられる鉄 (I I I) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物は、とりわけ、以下の構造要素：

【 化 1 】

20

[上記式中、

~~~~

はそれぞれ自由原子価を飽和する配位子の置換基であり、そして矢印はそれぞれ鉄原子への配位結合を表す]

を含む、かかる化合物を包含する。

【 0 0 3 4 】

本発明に係る以下の用語：

- 「ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド」
- 「ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド化合物」又は
- 「ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド - 」配位子

30

は、対応する鉄 (I I I) 錯体化合物中に存在する、対応するヒドロキシ出発化合物：

【 化 2 】

並びに対応する脱プロトン化配位子：

【 化 3 】

40

をそれぞれ包含する。

【 0 0 3 5 】

さらに、本発明によれば、上記用語は、それぞれの基本的骨格：

【 化 4 】

又は基礎となるヒドロキシ化合物を脱プロトン化することによって生じる配位子化合物：

【化 5】

をそれぞれ含むだけでなく、ピラジン環上の 1 個又は 2 個以上の水素原子の他の置換基による置換から生じる、ピラジン環上で置換されたそれらの代理物 (Vertreter) も同様に含む。従って、本発明に関連して、上記用語は「ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド」化合物及びピラジン環上で置換されたそれらの代理物を含む脱プロトン化配位子を指す。

【0036】

形式的には、本発明に係る (脱プロトン化) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド配位子は負電荷を担持する。このことは、鉄原子 1 個当たり配位子 3 個の場合に、鉄原子が形式上酸化状態 + 3 を有することを意味する。示された式は 1 つの可能なメソメリー式だけを表していること及び幾つかのメソメリー式が存在すること、及び以下で模式的に示されるように、配位子中又は鉄錯体化合物中の電子の非局在化がそれぞれ存在することができることは当業者に明白である。

【0037】

本発明に係る鉄 (III) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物において、鉄原子の配位数は一般に 6 であるが、配位する原子は一般に 8 面体状に配置される。

【0038】

さらに、1 個又は 2 個以上 (例えば、2 個、3 個又は 4 個) の鉄原子が存在する単核又は多核の鉄 (III) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物も本発明に従って包含される。

【0039】

一般に、鉄 (III) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物中に、鉄原子 1 ~ 4 個及び配位子 2 ~ 10 個が存在することができる。少なくとも 1 個の好ましくは三座の、好ましくは二座のピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド配位子を有する単核の鉄 (III) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物が好ましい。1 個の中心鉄原子及び 3 個のピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド配位子を有する単核の鉄 (III) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物がとりわけ好ましい。

【0040】

本発明の鉄 (III) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物は一般に中性形態で存在する。しかしながら、錯体が、とりわけ、薬理的に適合性で実質的に非配位性のアニオン (例えば、とりわけ、ハロゲン化物、例えば、塩化物等) 又はカチオン (例えば、とりわけ、アルカリ金属イオン又はアルカリ土類金属イオン) によって相殺される正電荷又は負電荷を有する、鉄 (III) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物の塩類も含まれる。

【0041】

本発明に係る鉄 (III) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物は、とりわけ、下記式：

【化 6】

[上記式中、

はそれぞれ配位子の自由原子価を飽和する置換基であり、配位子は上記に示されるように、1 個の鉄原子に又は架橋の意味で 2 個の異なる鉄原子にさえ結合することができる] で表される二座ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド配位子少なくとも 1 個を含む錯体化

10

20

30

40

50

合物を包含する。

【0042】

同じであるか又は異なっていることができる、好ましくは二座ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド配位子だけを含む鉄 (I I I) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物が好ましい。さらに、同じピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド配位子だけを含む鉄 (I I I) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物がとりわけ好ましく、トリス (ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド) 鉄 (I I I) 化合物がとりわけ大変に好ましい。

【0043】

好ましくは、本発明の鉄 (I I I) ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物の分子量は 1 0 0 0 g / モル未満であり、より好ましくは 8 0 0 g / モル未満である (それぞれ構造式から決定) 。

【0044】

とりわけ好ましい実施形態において、本発明に係る鉄 (I I I) 錯体化合物は、下記式 (I) :

【化 7】

(I)

[上記式中、

矢印はそれぞれ 1 つ又は複数の鉄原子への配位結合を表し、そして

R₁、R₂、R₃ は同じであるか又は異なっていることができ、そして以下 :

- 水素原子、
- 場合により置換されていることがあるアルキル基、
- ハロゲン原子、
- 場合により置換されていることがあるアルコキシ基、
- 場合により置換されていることがあるアリール基、
- 場合により置換されていることがあるアルコキシカルボニル基、及び
- 場合により置換されていることがあるアミノカルボニル基、

からなる群から選択され、又は

R₂ 及び R₃ はそれらが結合している炭素原子と一緒に、場合によりヘテロ原子 1 個又は 2 個以上を含んでいることができる、場合により置換されていることがある飽和又は不飽和の 5 員環又は 6 員環を形成する]

で表される、同じ又は異なった、好ましくは同じ配位子又はその薬剤学的に許容することのできる塩少なくとも 1 個、好ましくは 3 個を含有する。

【0045】

置換基 R₂ 及び R₃ の上記の環形成は模式的に下記式 :

【化 8】

で示される。

【0046】

上記式中、R₁ は前記意味の一つを有していることができる。

【 0 0 4 7 】

本発明の好ましい実施形態は、下記式 (I) :

【 化 9 】

(I)

10

[上記式中、

矢印はそれぞれ 1 つ又は複数の鉄原子への配位結合を表し、そして

R_1 、 R_2 、 R_3 は同じであるか又は異なっていることができ、そして以下 :

- 水素原子、及び
  - 場合により置換されていることがあるアルキル基
- からなる群から選択される]

で表される配位子少なくとも 1 個を含有するこれらの鉄 (I I I) 錯体化合物に関する。

【 0 0 4 8 】

本発明の全体的関係の中で、とりわけ置換基 $R_1 \sim R_3$ の、場合により置換されていることがあるアルキル基として、好ましくは、以下 :

炭素原子 1 ~ 8 個、好ましくは 1 ~ 6 個を有する直鎖又は分枝鎖のアルキル基、炭素原子 3 ~ 8 個、好ましくは 5 又は 6 個を有するシクロアルキル基、又はシクロアルキル基で置換されている、炭素原子 1 ~ 4 個を有するアルキル基、ここでこれらのアルキル基は場合により置換されていることができる、

を挙げるることができる。

20

【 0 0 4 9 】

上記アルキル基は、非置換であるか又は、好ましくは置換基 1 ~ 3 個で、置換されていることができる。アルキル基のこれらの置換基は、好ましくは、以下 : ヒドロキシ基、とりわけ下記に定義される通りの、場合により置換されていることがあるアリアル基、とりわけ下記に定義される通りの、場合により置換されていることがあるヘテロアリアル基、とりわけ下記に定義される通りの、場合により置換されていることがあるアルコキシ基、とりわけ下記に定義される通りの、場合により置換されていることがあるアルコキシカルボニル基、とりわけ下記に定義される通りの、場合により置換されていることがあるアシル基、とりわけ下記に定義される通りの、ハロゲン原子、とりわけ下記に定義される通りの、場合により置換されていることがあるアミノ基、とりわけ下記に定義される通りの、場合により置換されていることがあるアミノカルボニル基、及びシアノ基、からなる群から選択される。

30

【 0 0 5 0 】

ハロゲン原子は本明細書中でかつ本発明の関係の中で、フッ素原子、塩素原子、臭素原子及びヨウ素原子を含み、好ましくはフッ素原子又は塩素原子を含む。

【 0 0 5 1 】

上記に定義されたアルキル基において、場合により、炭素原子 1 個又は 2 個以上、より好ましくは 1 ~ 3 個は、窒素原子、酸素原子又は硫黄原子を含むヘテロ類縁基 (heteroanaloge Gruppen) でさらに置換されていることができる。このことは、とりわけ、アルキル基中の、例えば、メチレン基 (- CH_2 -) 1 個又は 2 個以上、好ましくは 1 ~ 3 個、さらにより好ましくは 1 個が - NH - 基、 - NR_4 - 基、 - O - 基、 - S - 基 [式中、 R_4 は上記定義した通りの場合により置換されていることがあるアルキル基、好ましくは、1 ~ 3 個の置換基、例えば、フッ素原子、塩素原子、ヒドロキシ基又はアルコキシ基等で置換されていることがあるアルキル基、置換された $C_1 \sim C_6$ アルキル基、例えば、メチル基又はエチル基等である] によって置換されていることができることを意味する。

40

【 0 0 5 2 】

50

炭素原子 1 ~ 8 個を有するアルキル残基の例として以下を挙げることができる：メチル基、エチル基、n - プロピル基、i - プロピル基、n - ブチル基、i - ブチル基、sec - ブチル基、t - ブチル基、n - ペンチル基、i - ペンチル基、sec - ペンチル基、t - ペンチル基、2 - メチルブチル基、n - ヘキシル基、1 - メチルペンチル基、2 - メチルペンチル基、3 - メチルペンチル基、4 - メチルペンチル基、1 - エチルブチル基、2 - エチルブチル基、3 - エチルブチル基、1, 1 - ジメチルブチル基、2, 2 - ジメチルブチル基、3, 3 - ジメチルブチル基、1 - エチル - 1 - メチルプロピル基、n - ヘブチル基、1 - メチルヘキシル基、2 - メチルヘキシル基、3 - メチルヘキシル基、4 - メチルヘキシル基、5 - メチルヘキシル基、1 - エチルペンチル基、2 - エチルペンチル基、3 - エチルペンチル基、4 - エチルペンチル基、1, 1 - ジメチルペンチル基、2, 2 - ジメチルペンチル基、3, 3 - ジメチルペンチル基、4, 4 - ジメチルペンチル基、1 - プロピルブチル基、n - オクチル基、1 - メチルヘブチル基、2 - メチルヘブチル基、3 - メチルヘブチル基、4 - メチルヘブチル基、5 - メチルヘブチル基、6 - メチルヘブチル基、1 - エチルヘキシル基、2 - エチルヘキシル基、3 - エチルヘキシル基、4 - エチルヘキシル基、5 - エチルヘキシル基、1, 1 - ジメチルヘキシル基、2, 2 - ジメチルヘキシル基、3, 3 - ジメチルヘキシル基、4, 4 - ジメチルヘキシル基、5, 5 - ジメチルヘキシル基、1 - プロピルペンチル基、2 - プロピルペンチル基等。炭素原子 1 ~ 6 個を有するものが好ましい。メチル基、エチル基、n - プロピル基、イソプロピル基、sec - ブチル基及び n - ブチル基が最も好ましい。

10

20

30

40

50

【0053】

1 個又は 2 個以上のヘテロ類縁基、例えば、- O - 基、- S - 基、- NH - 基又は - N (R₄) - 基等による置換によって生成されるアルキル基の例は、好ましくは、メチレン基 (- CH₂ -) 1 個又は 2 個以上が - O - 基により置換されてエーテル基を形成するかかる基、例えば、メトキシメチル基、エトキシメチル基、2 - メトキシエチル基等である。従って、アルキル基の定義には、例えば、メチレン基を - O - 基で置換することによって上記アルキル基から生成される、以下で定義される通りのアルコキシアルキル基も含まれる。本発明によれば、アルコキシ基がアルキル基の置換基としてさらに許容される場合、幾つかのエーテル基もこのようにして形成されることができる (例えば、- CH₂ - O - CH₂ - OCH₃ - 基)。このように、本発明によれば、アルキル基の定義によってポリエーテル基も包含される。

【0054】

炭素原子 3 ~ 8 個を有するシクロアルキル基として、好ましくは、以下を挙げることができる：シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘブチル基、シクロオクチル基等。シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基及びシクロヘキシル基が好ましい。シクロアルキル基は好ましくは、1 個又は 2 個の置換基、例えば、ヒドロキシル基又は C₁ - C₆ アルコキシカルボニル基等で場合により置換されていることができる。

【0055】

場合により置換されていることがあるアルキル基の定義は、上記シクロアルキル基、例えば、シクロプロピルメチル基、シクロブチルメチル基、シクロペンチルメチル基又はシクロヘキシルメチル基等によって置換されたアルキル基も包含する。

【0056】

本発明に係る複素環式アルキル基は、好ましくは、シクロアルキル基からヘテロ類縁基によってメチレンを置換することによって形成されたものであり、その例として、例えば、炭素原子又は窒素原子を介して結合されていることができ、及び好ましくは、1 ~ 3 個、好ましくは 2 個のヘテロ原子、とりわけ O 原子、N 原子を有していることができる、飽和の 5 員又は 6 員複素環式残基、例えば、テトラヒドロフリル基、アゼチジン - 1 - イル基、置換されたアゼチジニル基、例えば、3 - ヒドロキシアゼチジン - 1 - イル基、ピロリジニル基、例えば、ピロリジン - 1 - イル基、置換されたピロリジニル基、例えば、3 - ヒドロキシピロリジン - 1 - イル基、2 - ヒドロキシピロリジン - 1 - イル基、2 - メ

トキシカルボニルピロリジン - 1 - イル基、2 - エトキシカルボニルピロリジン - 1 - イル基、2 - メトキシピロリジン - 1 - イル基、2 - エトキシピロリジン - 1 - イル基、3 - メトキシカルボニルピロリジン - 1 - イル基、3 - エトキシカルボニルピロリジン - 1 - イル基、3 - メトキシピロリジン - 1 - イル基、3 - エトキシピロリジン - 1 - イル基、ピペリジニル基、例えば、ピペリジン - 1 - イル基、ピペリジン - 4 - イル基、置換されたピペリジニル基、例えば、4 - メチル - 1 - ピペリジル基、4 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジル基、4 - メトキシ - 1 - ピペリジル基、4 - エトキシ - 1 - ピペリジル基、4 - メトキシカルボニル - 1 - ピペリジル基、4 - エトキシカルボニル - 1 - ピペリジル基、4 - カルボキシ - 1 - ピペリジル基、4 - アセチル - 1 - ピペリジル基、4 - ホルミル - 1 - ピペリジル基、1 - メチル - 4 - ピペリジル基、4 - ヒドロキシ - 2, 2, 6, 6 - テトラメチル - 1 - ピペリジル基、4 - (ジメチルアミノ) - 1 - ピペリジル基、4 - (ジエチルアミノ) - 1 - ピペリジル基、4 - アミノ - 1 - ピペリジル基、2 - (ヒドロキシメチル) - 1 - ピペリジル基、3 - (ヒドロキシメチル) - 1 - ピペリジル基、4 - (ヒドロキシメチル) - 1 - ピペリジル基、2 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジル基、3 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジル基、4 - ヒドロキシ - 1 - ピペリジル基、モルホリン - 4 - イル基、置換されたモルホリニル基、例えば、2, 6 - ジメチルモルホリン - 4 - イル基、ピペラジニル基、例えば、ピペラジン - 1 - イル基、置換されたピペラジニル基、例えば、4 - メチルピペラジン - 1 - イル基、4 - エチルピペラジン - 1 - イル基、4 - エトキシカルボニルピペラジン - 1 - イル基、4 - メトキシカルボニルピペラジン - 1 - イル基、又はテトラヒドロピラニル基、例えば、テトラヒドロピラン - 4 - イル基、及び場合により芳香環と縮合されていることができ、及び、場合により、例えば、1 ~ 2 個の置換基、例えば、ヒドロキシ基、ハロゲン原子、C₁ - C₆ アルキル基等で置換されていることができる、飽和の 5 員又は 6 員複素環式残基を挙げることができる。従って、場合により置換されていることがあるアルキル基の定義には、上記定義された複素環によって置換されたアルキル基、例えば、3 - (1 - ピペリジル)プロピル基、3 - ピロリジン - 1 - イルプロピル基、3 - モルホリノプロピル基、2 - モルホリノエチル基、2 - テトラヒドロピラン - 4 - イルエチル基、3 - テトラヒドロピラン - 4 - イルプロピル基、3 - (アゼチジン - 1 - イル)プロピル基等も含まれる。

10

20

30

40

50

【0057】

炭素原子 1 ~ 8 個、好ましくは 1 ~ 6 個を有し及びハロゲン原子で置換された直鎖又は分枝鎖のアルキル基の例として、とりわけ、以下を挙げることができる：
フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、クロロメチル基、ジクロロメチル基、トリクロロメチル基、プロモメチル基、ジプロモメチル基、トリプロモメチル基、1 - フルオロエチル基、1 - クロロエチル基、1 - プロモエチル基、2 - フルオロエチル基、2 - クロロエチル基、2 - プロモエチル基、1, 2 - ジフルオロエチル基、1, 2 - ジクロロエチル基、1, 2 - ジプロモエチル基、2, 2, 2 - トリフルオロエチル基、ヘプタフルオロエチル基、1 - フルオロプロピル基、1 - クロロプロピル基、1 - プロモプロピル基、2 - フルオロプロピル基、2 - クロロプロピル基、2 - プロモプロピル基、3 - フルオロプロピル基、3 - クロロプロピル基、3 - プロモプロピル基、1, 2 - ジフルオロプロピル基、1, 2 - ジクロロプロピル基、1, 2 - ジプロモプロピル基、2, 3 - ジフルオロプロピル基、2, 3 - ジクロロプロピル基、2, 3 - ジプロモプロピル基、3, 3, 3 - トリフルオロプロピル基、2, 2, 3, 3, 3 - ペンタフルオロプロピル基、2 - フルオロブチル基、2 - クロロブチル基、2 - プロモブチル基、4 - フルオロブチル基、4 - クロロブチル基、4 - プロモブチル基、4, 4, 4 - トリフルオロブチル基、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 - ヘプタフルオロブチル基、ペルフルオロブチル基、2 - フルオロペンチル基、2 - クロロペンチル基、2 - プロモペンチル基、5 - フルオロペンチル基、5 - クロロペンチル基、5 - プロモペンチル基、ペルフルオロペンチル基、2 - フルオロヘキシル基、2 - クロロヘキシル基、2 - プロモヘキシル基、6 - フルオロヘキシル基、6 - クロロヘキシル基、6 - プロモヘキシル基、ペルフルオロヘキシル基、2 - フルオロヘプチル基、2 - クロロヘプチル基、2 - プロモヘプチル基、7 - フルオ

ロヘブチル基、7-クロロヘブチル基、7-プロモヘブチル基、ペルフルオロヘブチル基等。

【0058】

ヒドロキシ基で置換されたアルキル基の例として、ヒドロキシ残基1~3個を有する上記アルキル残基、例えば、ヒドロキシメチル基、2-ヒドロキシエチル基、3-ヒドロキシプロピル基、4-ヒドロキシブチル基、5-ヒドロキシペンチル基、6-ヒドロキシヘキシル基等を挙げることができる。

【0059】

場合により置換されていることがあるアリール基は、好ましくは、本発明によれば、炭素原子6~14個を有する芳香族炭化水素残基（芳香族環系中にヘテロ原子を有しない）、例えば：フェニル基、ナフチル基、フェナントレニル基及びアントラセニル基を含む。前記芳香族基は非置換であるか又は置換されていることができる。置換の場合、それらは、上記又は下記で説明されるようにそれぞれの場合において、好ましくは、1個又は2個以上の、好ましくは、1個又は2個の置換基、とりわけ、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アルキル基、アルコキシ基を有する。好ましい芳香族基はフェニル基である。芳香族基で置換された好ましいアルキル基（アリールアルキル基）はベンジル基である。

10

【0060】

本発明に係る、場合により置換されていることがあるアリール基として、さらに、場合により置換されていることがあるヘテロアリール基、すなわち、複素芳香族基、例えば：ピリジル基、ピリジル-N-オキシド基、ピリミジル基、ピリダジニル基、ピラジニル基、チエニル基、フリル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、チアゾリル基、オキサゾリル基又はイソオキサゾリル基、インドリジニル基、インドリル基、ベンゾ[b]チエニル基、ベンゾ[b]フリル基、インダゾリル基、キノリル基、イソキノリル基、ナルチリジニル基、キナゾリニル基等を挙げることができる。5員又は6員の芳香族複素環式基、例えば、ピリジル基、ピリジル-N-オキシド基、ピリミジル基、ピリダジニル基、フリル基及びチエニル基が好ましい。前記複素芳香族基は非置換であるか又は置換されていることができる。置換の場合、それらは、上記又は下記で説明されるようにそれぞれの場合において、好ましくは、1個又は2個以上の、好ましくは、1個又は2個の置換基、とりわけ、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アルキル基、アルコキシ基を有する。複素芳香族基で置換されたアルキル基（ヘタリールアルキル基）の好ましい例は、それぞれの場合に複素芳香族基で置換された、メチル基、エチル基、又はプロピル基、例えば、チエニルメチル基、ピリジルメチル基等である。

20

30

【0061】

場合により置換されていることがあるアルコキシ(RO-)基は、形式的には、上記した場合により置換されていることがあるアルキル残基から酸素原子を付加することによって誘導されるが、本発明に関連して、例えば、炭素原子6個までを有する直鎖又は分枝鎖のアルコキシ基、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロピルオキシ基、i-プロピルオキシ基、n-ブチルオキシ基、i-ブチルオキシ基、sec-ブチルオキシ基、t-ブチルオキシ基、n-ペンチルオキシ基、i-ペンチルオキシ基、sec-ペンチルオキシ基、t-ペンチルオキシ基、2-メチルブトキシ基、n-ヘキシルオキシ基、i-ヘキシルオキシ基、t-ヘキシルオキシ基、sec-ヘキシルオキシ基、2-メチルペンチルオキシ基、3-メチルペンチルオキシ基、1-エチルブチルオキシ基、2-エチルブチルオキシ基、1,1-ジメチルブチルオキシ基、2,2-ジメチルブチルオキシ基、3,3-ジメチルブチルオキシ基、1-エチル-1-メチルプロピルオキシ基等を包含する。メトキシ基、エトキシ基、n-プロピルオキシ基、i-プロピルオキシ基、n-ブチルオキシ基、i-ブチルオキシ基、sec-ブチルオキシ基、t-ブチルオキシ基等が好ましい。アルコキシ基は、場合により、例えば、アルキル基に対する上記の可能な置換基等で、置換されていることができる。

40

【0062】

メトキシ基、エトキシ基、n-プロボキシ基、n-ブトキシ基等が好ましいアルコキシ

50

基である。

【0063】

場合により置換されていることがあるアルコキシカルボニル ($\text{RO}-\text{CO}-$) 基は、形式的には、上記アルキル基から、場合により置換されていることがあるアルキルオキシカルボニル残基の形成下に $-\text{O}-\text{C}(\text{O})-$ 残基を付加することによって誘導される。それに関して、上記したアルキル基の定義が参照されることができる。代わりに、場合により置換されていることがあるアルコキシカルボニル ($\text{RO}-\text{CO}-$) 基は、前記したアルコキシ基からカルボニル基の付加によって誘導される。好ましいアルコキシカルボニル基は炭素原子6個までを含んでおり、そして例えば：メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、 n -プロポキシカルボニル基、 n -ブトキシカルボニル基、*tert*-ブトキシカルボニル基等（これらはすべて上記に定義したアルキル基のように置換されていることができる）を包含する。

10

【0064】

本発明に係る、場合により置換されていることがあるアミノカルボニル基は、形式的には、場合により置換されていることがあるアミノ基からカルボニル残基 ($(\text{R})_2\text{N}-\text{C}(=\text{O})-$) を付加することによって誘導されることができる。その際に、場合により置換されていることがあるアミノ基は、好ましくは、本発明に従って：アミノ ($-\text{NH}_2$) 基、場合により置換されていることがあるモノアルキルアミノ基又はジアルキルアミノ基 ($\text{RHN}-$ 、 $(\text{R})_2\text{N}-$) を含み、ここで、場合により置換されていることがあるアルキル基の定義に関して上記定義が参照されることができる。さらに、場合により置換されていることがあるモノアリアルアミノ基若しくはジアリアルアミノ基又は混合された、場合により置換されていることがあるアルキルアリアルアミノ基が含まれ、ここで場合により置換されていることがあるアルキル基又はアリアル基の定義に関して上記の定義が参照されることができる。かかる基として、例えば、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ヒドロキシエチルアミノ基、例えば、2-ヒドロキシエチルアミノ基、ジエチルアミノ基、フェニルアミノ基、メチルフェニルアミノ基等を挙げるることができる。

20

【0065】

場合により置換されていることがあるアミノ基は、さらに、場合により置換されていることがある環状アミノ基、例えば、N原子、O原子、S原子などのヘテロ原子、好ましくは、O原子をさらに含んでいることができる場合により置換されていることがある5員又は6員環状アミノ基等を含む。かかる環状アミノ基の例として、窒素原子を介して結合された上記の窒素原子含有複素環式基、例えば、ピペリジン-1-イル基、4-ヒドロキシ-ピペリジン-1-イル基、2-(メトキシカルボニル)ピロリジン-1-イル基、ピロリジン-1-イル基、モルホリン-4-イル基等を挙げるることができる。

30

【0066】

従って、場合により置換されていることがあるアミノカルボニル基の例として：カルバモイル ($\text{H}_2\text{NC}(=\text{O})-$) 基、場合により置換されていることがあるモノアルキルアミノカルボニル又はジアルキルアミノカルボニル ($\text{RHN}-\text{C}(=\text{O})-$ 、 $(\text{R})_2\text{N}-\text{C}(=\text{O})-$) 基を挙げることができ、ここで、場合により置換されていることがあるアルキル基の上記定義が参照されることができる。さらに、場合により置換されていることがあるモノアリアルアミノカルボニル残基若しくはジアリアルアミノカルボニル残基又は混合された、場合により置換されていることがあるアルキルアリアルアミノカルボニル残基を挙げることができ、ここで、場合により置換されていることがあるアルキル基又はアリアル基の上記定義が参照されることができる。好ましい置換されたアミノカルボニル基は炭素原子14個までを含有する。かかる基として、例えば、メチルアミノカルボニル基、ジメチルアミノカルボニル基、エチルアミノカルボニル基、ジエチルアミノカルボニル基、フェニルアミノカルボニル基、ジフェニルアミノカルボニル基、メチルフェニルアミノカルボニル基等を挙げるることができる。

40

【0067】

下記式：

50

【化10】

[上記式中、 R_1 は前記意味を有していることができる]

によって模式的に表される置換基 R_2 及び R_3 の前記環形成の例として、とりわけ：

式中の R_2 及び R_3 が一緒になって、好ましくは、場合により1個のメチレン基 ($-CH_2-$) がそれぞれ $-O-$ 基、 $-NH-$ 基又は $-NR_4-$ 基 (式中の R_4 は前記の通りに定義される) で置換されていることができる、プロピレン基 ($-CH_2-CH_2-CH_2-$) 又はブチレン基 ($-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-$) を表し、及び R_2 及び R_3 によって形成される基が場合によりそれぞれ、ヒドロキシ基、オキシ基、 C_1-C_4 アルコシキ基、アミノ基及びモノ-又はジ- (C_1-C_4 -アルキル) アミノ基からなる群より選択される置換基1~3個によってさらに置換されていることができる、化合物を挙げることができる。

10

【0068】

例示的な配位子は、以下である：

【化11】

20

[上記式中、 R_1 はそれぞれ上記の通りである]。

【0069】

下記式 (II)：

【化12】

30

(II)

40

[上記式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 はそれぞれ上記の通り定義され又は好ましくは以下の定義の通りである]

で表される鉄 (III) 錯体化合物がとりわけ好ましい。

【0070】

さらに、好ましくは、 R_1 、 R_2 及び R_3 は同じであるか又は異なりおして以下

:

- 水素原子、
- C_1-6 -アルキル基、好ましくは、上記に示された通り、
- ハロゲン原子、好ましくは、上記に示された通り、

50

- C₃ - 6 - シクロアルキル基、好ましくは、上記に示された通り、
- C₃ - 6 - シクロアルキル - C₁ - 4 - アルキル基、好ましくは、上記に示された通り、
- C₁ - 4 - アルコキシ - C₁ - 4 - アルキル基、好ましくは、上記に示された通り、
- C₁ - 4 - アルコキシ - カルボニル基、好ましくは、上記に示された通り、
- C₁ - 4 - モノ - 若しくはジ - アルキルアミノカルボニル基、好ましくは、上記に示された通り、
- アミノカルボニル基又はカルバモイル基 (H₂NCO -)、
- ヒドロキシ - C₁ - 4 - アルキル基、好ましくは、上記に示された通り、及び
- ハロゲン - C₁ - 4 - アルキル基、好ましくは、上記に示された通り；

10

から選択されるか、又は

上記に説明された通りに、R₂ 及び R₃ はそれらが結合している炭素原子と一緒にあって、場合により置換されていることがある飽和若しくは不飽和の 5 員環若しくは 6 員環を形成する。

【0071】

とりわけ好ましくは、R₁、R₂ 及び R₃ は同じであるか又は異なりおいて以下：水素原子及び C₁ - 6 - アルキル基（好ましくは、上記に示された通り）、とりわけ、水素原子、メチル基、エチル基及びプロピル基、とりわけ、i - プロピル基、ブチル基、とりわけ、sec - ブチル基、から選択される。最も好ましくは、R₁、R₂ 及び R₃ は以下：水素原子、メチル基及びエチル基から選択される。

20

【0072】

R₂ 及び R₃ がそれらが結合している炭素原子と一緒にあって、場合により置換されていることがある飽和又は不飽和の 5 員環若しくは 6 員環、とりわけ、場合により置換されていることがある飽和の 5 員環若しくは 6 員環、とりわけ好ましくは、飽和 6 員環を形成することもとりわけ好ましい。

【0073】

本発明のさらなる実施形態において、固体形態の鉄 (III) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物が提供される。「固体形態」なる用語は、本明細書中でとりわけ、鉄 (III) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物が水などの溶媒中で溶解して存在する、溶解された形態とは対照的であることを意味する。「固体形態」なる用語は、鉄 (III) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物が室温 (23) において固体形態で存在することも意味する。鉄 (III) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物は、非晶形、結晶形又は部分結晶形で存在することができる。同様に、本発明の鉄 (III) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物は水和物として存在することもできる。

30

【0074】

本発明に係る配位子：

【化13】

40

が、対応するピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド化合物：

【化 1 4】

(III)

から生じることは当業者に明らかである。

【0075】

ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド化合物において、1 - ヒドロキシピラジン - 2 (1 H) (式 (III a)) とピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド (式 (III)) との間にケト - エノール - 互変異性があり、その平衡状態は種々の因子によって決定される。

10

【化 1 5】

(IIIa)

(III)

20

【0076】

配位子は、形式的には、対応するピラジン - 1 - オキシド化合物 (式 (III)) からプロトンの開裂によって得られるので：

【化 1 6】

(III)

30

形式的には 1 個の負電荷を担持する。

【0077】

さらに、本発明に従って用いられるピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド化合物は異なった表記 (a 及び b) によって描かれることができるが、いずれも N - オキシドの同じ状態を含むことは当業者に明らかである。

【化 1 7】

(a)

(b)

40

【0078】

同じことが、対応する脱プロトン化型のピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド配位子化合物に当てはまる。本発明の範囲内で、メソメリー式の 1 つだけが描かれている場合でもすべての互変異性体の形態が含まれる。

【0079】

置換基 R_1 、 R_2 及び R_3 に依存して、それらはピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド

50

配位子における互変異性体の共鳴構造にも関与し、そして本発明の範囲内にかかる互変異性体すべてが包含される。

【0080】

本発明の鉄(III)ピラジン-2-オール-1-オキシド錯体化合物、とりわけ、一般式(II)で表されるものなど又は対応するピラジン-2-オール-1-オキシド錯体は、それぞれ、種々の異性体又は互変異性体の形態で存在することができる。異性体の形態として、例えば、互いに配位子の位置が異なる位置異性体を挙げることができ、互いに像/鏡像の関係を有するいわゆる光学異性体が含まれる。不斉炭素原子が存在する場合、配位子は、互いに像/鏡像の関係を有する光学異性体の形態で存在することができる、そして、純粋なエナンチオマー、エナンチオマーの混合物、とりわけ、ラセミ体を包含する。エナンチオマー的に純粋な配位子は、当業者に知られているように、光学的分割法によって、例えば、キラル試薬との反応によるジアステレオマーの形成、ジアステレオマーの分離及びエナンチオマーの放出によって、得ることができる。

10

【0081】

本発明のさらに好ましい実施形態として以下を挙げるができる：
(本発明において、「1-6C」若しくは「C1-6」中の数字1-6又は「1-4C」若しくは「C1-4」中の数字「1-4」等は各場合に、それに続く炭化水素基名の炭素原子の数を表す)

R₁、R₂及びR₃が以下：

- 水素原子
- 1-6C-アルキル基、(これは炭素原子1~6個を有するアルキル基を意味する)、
- 3-6C-シクロアルキル基、
- 3-6C-シクロアルキル-1-4C-アルキル基、
- 1-4C-アルコキシ-1-4C-アルキル基、
- ヒドロキシ-1-4C-アルキル基、

20

からなる群から選択されるか、

又は、R₂及びR₃が一緒になってプロピレン基(-CH₂-CH₂-CH₂-)、ブチレン基(-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-)、アザブチレン基若しくはオキサブチレン基を形成するか；

又は、R₂及びR₃は、それらが結合している炭素原子と一緒に、場合によりヘテロ原子1個又は2個以上を含むことがある不飽和環を形成するか、

30

又は、その薬剤学的に許容することのできる塩。

【0082】

好ましくは、前記置換基は以下のように定義される：

1-6C-アルキルは、好ましくは、炭素原子1~6個を有する直鎖又は分枝鎖のアルキル基を含む。従って、例は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、n-ヘキシル基、イソヘキシル基及びネオヘキシル基であることができる。

40

【0083】

3-6C-シクロアルキルは、好ましくは、炭素原子1~6個のシクロアルキル基、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基を含む。

【0084】

3-6C-シクロアルキル-1-4C-アルキルは、好ましくは、上記3-6C-シクロアルキル基で置換された上記1-6Cアルキル基を含む。従って、例は、シクロプロピルメチル基、シクロペンチルメチル基及びシクロヘキシルメチル基であることができる。

【0085】

1-3C-アルコキシ-カルボニル-1-6C-アルキルは、好ましくは、カルボン酸エステルとして1-3Cアルコキシ基と共に存在するカルボニル基に結合された上記1-

50

6 C - アルキル基を含む。従って、例は、メトキシカルボニルメチル基、エトキシカルボニルメチル基、メトキシカルボニルエチル基、エトキシカルボニルエチル基及びイソプロポキシカルボニルメチル基であることができる。

【0086】

1 - 4 C - アルコキシは、好ましくは、酸素原子が、炭素原子 1 ~ 4 個を有する直鎖又は分枝アルキル鎖に結合された、1 - 4 C - アルコキシ基を含む。この基の例は、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基及びイソブトキシ基であることができる。

【0087】

1 - 4 C - アルコキシ - 1 - 4 C - アルキルは、好ましくは、上記 1 - 4 C - アルキル基で置換された上記 1 - 4 C - アルコキシ基を含む。この基の例は、メトキシエチル基、エトキシプロピル基、メトキシプロピル基、イソブトキシメチル基であることができる。

10

【0088】

ヒドロキシ - 1 - 4 C - アルキルは、ヒドロキシ基で置換された上記 1 - 4 C - アルキル基を含む。従って、例は、ヒドロキシエチル基、ヒドロキシブチル基及びヒドロキシイソプロピル基であることができる。

【0089】

とりわけ好ましいのは、 R_1 、 R_2 及び R_3 が、以下：

- 水素原子、
- 1 - 6 C - アルキル基、
- 1 - 4 C - アルコキシ - 1 - 4 C - アルキル基、
- ヒドロキシ - 1 - 4 C - アルキル基；

20

からなる群から選択されるか、

又は、 R_2 及び R_3 が一緒になってプロピレン基 ($-CH_2-CH_2-CH_2-$)、ブチレン基 ($-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-$)、アザブチレン基若しくはオキサブチレン基を形成するか；

又は、 R_2 及び R_3 が、それらが結合している炭素原子と一緒に、ヘテロ原子をさらに含んでいることができる、不飽和環を形成する。

【0090】

とりわけ好ましくは：

R_1 、 R_2 及び R_3 が、以下：

30

- 水素原子
- 1 - 6 C - アルキル基；
- 1 - 4 C - アルコキシ - 1 - 4 C - アルキル基

からなる群より選択されるか、

又は、 R_2 及び R_3 が一緒になってプロピレン基 ($-CH_2-CH_2-CH_2-$) 若しくはブチレン基 ($-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-$) を形成するか；

又は、 R_2 及び R_3 が、それらが結合している炭素原子と一緒に、窒素原子 1 個をさらに含んでいることができる、不飽和環を形成する。

【0091】

一般式 (I I) で表されるとりわけ好ましい錯体化合物は実施例に記載される。

40

【0092】

本発明は、さらに、式 (I I I) で表されるピラジン - 2 - オール - 1 - オキシドと鉄 (I I I) 塩との反応を含む、本発明に係る鉄 (I I I) 錯体化合物の製造方法に関する。

【0093】

出発物質としてのピラジン - 2 - オール - 1 - オキシドは、とりわけ、下記式 (I I I) :

【化 1 8】

(III)

[上記式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は上記の通りに定義され、その互変異性共鳴構造については言及されている]

で表されるものを含む。

10

【0094】

適当な鉄 (I I I) 塩の例として：塩化鉄 (I I I)、酢酸鉄 (I I I)、硫酸鉄 (I I I)、硝酸鉄 (I I I) 及びアセチルアセトン酸鉄 (I I I) を挙げることができ、その中で塩化鉄 (I I I) が好ましい。

【0095】

好ましい方法が以下のスキームに示される：

【化 1 9】

(II)

20

[上記式中、 R_1 、 R_2 及び R_3 は上記定義の通りであり、 X はアニオン、例えば、ハロゲン化物、例えば、塩化物など、カルボン酸塩、例えば、酢酸塩、硫酸塩、硝酸塩及びアセチルアセトン酸塩などであり、そして塩基は一般的な有機塩基又は無機塩基である]。

30

【0096】

本発明に係る方法において、好ましくは、ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド (式 (I I I)) 3 等量が、適当な鉄 (I I I) 塩 (式 (I V)) (この場合には、塩化鉄 (I I I)、酢酸鉄 (I I I)、硫酸鉄 (I I I) 及びアセチルアセトン酸鉄 (I I I) がとりわけ適当である) を用いて、標準的な条件下に反応されて、一般式 (I I) で表される対応する錯体を形成する。この場合に、合成は錯体形成に最適な pH 条件下で行われる。最適 pH 値は塩基 (V) を添加することによって設定され；この場合に、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、ナトリウムメタノレート、水酸化カリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム又はカリウムメタノレートの使用がとりわけ適当である。

40

【0097】

錯体の製造に必要な配位子 (I I I) は下記合成方法 (J . Chem Soc . 1949 , 2707 - 2712) に従って調製された。この目的のために、市販され入手可能な又は合成された 2 - アミノヒドロキサム酸 (式 (I V)) が市販され入手可能な又は合成された一般式 (V) で表される 1 - 2 - ジカルボニル化合物と標準的な条件下に反応されて一般式 (I I I) で表される配位子を形成した。この合成において非対称 1 - 2 - ジカルボニル化合物を用いる場合、これは対応する位置異性体 (式 (I I I a)) を生じさせることがあり、この位置異性体は当業者に周知である標準的方法によって分離されること

50

ができる。ジケトン(式(V))の他の置換パターンに対して、反応は、例えば、 $R_2 =$ メチル基、 $R_3 =$ 水素原子の場合などに、大部分が位置選択的に進行することもできる。

【化20】

【0098】

同様に、一般式(III)で表される各配位子の製造には、当業者に周知である反応条件下にわずかに変更された合成経路を用いることもできる。すなわち、Ohkandaらの合成(Bull. Chem. Soc. Jpn. 1993, 66, 841-847)において、一般式(VI)で表されるN末端保護アミノ酸から出発して、対応するO-ベンジル保護アミノヒドロキサム酸(式(VII))が調製されることができ、これは一般式(IV)で表される1-2-ジカルボニル化合物との反応及びO-ベンジル基の開裂後に一般式(III)で表される配位子を形成することができる。この代替りの合成経路においても、式(IIIa)が生じることがある。

【化21】

Boc = t-ブチルオキシカルボニル; Bn = ベンジル

【0099】

一般に、ピラジン-2-オール-1-オキシド(式(III))の調製は当業者によく知られている他の合成経路によっても実施されることができ、従って、例えば、対応する置換ピラジン(式(VIII))を適当な酸化剤、例えば、過酸化水素又はペルオキシカルボン酸など、と反応させて一般式(III)で表される所望の生成物を形成することが可能であり(例えば、J. Org. Chem. 1958, 23, 1603-1606)、ここで酸化の位置化学並びに酸化度(一重又は二重)は反応条件、とりわけ、酸化剤及び対応するピラジンの置換パターンによって決定される(例えば、J. Heterocycl. Chem. 1983, 19, 1061, J. Heterocycl. Chem. 1989, 26, 812)。

【化22】

【0100】

ピラジン-2-オール-1-オキシド出発化合物(式(III))の例として、とりわけ、以下を挙げることができる:

10

20

30

40

【化 2 3】

10

【0101】

これらの化合物から本発明に係る鉄錯体化合物の配位子はヒドロキシ基における単純な脱プロトン化によって誘導される。

【0102】

鉄(III)錯体が形式的に正電荷を担持する本発明に係る化合物の薬学的に許容することのできる塩として、例えば、適当なアニオンとの塩、例えば、カルボン酸塩、スルホン酸塩、硫酸塩、塩化物、臭化物、ヨウ化物、リン酸塩、酒石酸塩、メタンスルホン酸塩、ヒドロキシエタンスルホン酸塩、グリシン酸塩、マレイン酸塩、プロピオン酸塩、フマル酸塩、トルエンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トリフルオロ酢酸塩、1,5-ナフタレンジスルホン酸塩(Naphthalindisulfonate-1,5)、サリチル酸塩、安息香酸塩、乳酸塩、リンゴ酸の塩、3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸-2の塩、クエン酸塩及び酢酸塩を挙げることができる。

20

【0103】

鉄(III)錯体が形式的に負電荷を担持する本発明に係る化合物の薬学的に許容することのできる塩として、例えば、適当な薬学的に許容することのできる塩基との塩、例えば、アルカリ又はアルカリ土類水酸化物、例えば、NaOH、KOH、Ca(OH)₂、Mg(OH)₂等との塩、アミン化合物、例えば、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、エチルジイソプロピルアミン、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、メチルグルカミン、ジシクロヘキシルアミン、ジメチルアミノエタノール、プロカイン、ジベンジルアミン、N-メチルモルホリン、アルギニン、リシン、エチレンジアミン、N-メチルピペリジン、2-アミノ-2-メチル-プロパノール-(1)、2-アミノ-2-メチル-プロパンジオール-(1,3)、2-アミノ-2-ヒドロキシル-メチル-プロパンジオール-(1,3)(TRIS)等を挙げることができる。

30

【0104】

本発明に係る化合物の水溶性又は生理的食塩水中での溶解性、及び従って場合により本発明に係る化合物の効果も、一般には塩形成によって、具体的には対イオンの選択によって有意に影響を受けることがある。

【0105】

好ましくは、本発明に係る化合物は中性の錯体化合物を構成する。

40

【0106】

有利な薬理学的効果：

意外にも、本発明者らは、本発明の主題であって、とりわけ一般構造式(II)によって表される、鉄(III)ピラジン-2-オール-1-オキシド錯体化合物が安定で生物利用可能な鉄錯体でありそして鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血並びにそれらに付随する症状の治療及び予防の薬剤として用いるのに適していることを見出した。

【0107】

本発明に係る化合物を含有する薬剤はヒト及び獣医用の医薬における使用に適する。

【0108】

50

従って、本発明に係る化合物は、鉄欠乏性貧血の症状、例えば：疲労、だるさ、集中力の欠如、認知能力の低下、正しい言葉を見出すことの困難性、健忘、不自然な蒼白、怒りっぽさ、心拍数の加速（頻脈）、舌のただれ若しくは腫れ、脾臓肥大、変わった食べ物への欲求（異食）、頭痛、食欲不振、易感染性の増大又は抑うつ気分などに罹患している患者の治療のための薬剤を製造するのにも適する。

【0109】

本発明に係る鉄（III）錯体化合物はさらに、妊婦における鉄欠乏性貧血、子供及び青年における潜在的な鉄欠乏性貧血、胃腸異常によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、血液損失、例えば、（例えば、潰瘍、癌腫、痔、炎症性疾患、アセチルサリチル酸の摂取による）胃腸出血などによる鉄欠乏性貧血、月経によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、損傷によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、スプルーによる鉄欠乏性貧血、とりわけ、選択的に食事をする子供及び青年における、食事の鉄摂取減少による鉄欠乏性貧血、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる免疫不全、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる脳機能障害、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる下肢静止不能症候群、癌の場合の鉄欠乏性貧血、化学療法によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、炎症（AI）によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、うっ血性心不全（CHF；うっ血性心不全）の場合の鉄欠乏性貧血、慢性腎不全ステージ3～5（CKD3～5；慢性腎臓病ステージ3～5）の場合の鉄欠乏性貧血、慢性炎症（ACD）によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、関節リウマチ（RA）の場合の鉄欠乏性貧血、全身性エリテマトーデス（SLE）の場合の鉄欠乏性貧血及び炎症性腸疾患（IBD）の場合の鉄欠乏性貧血の治療に適する。

10

20

【0110】

投与は、例えば、患者のヘモグロビンレベル、トランスフェリン飽和及び血清フェチリンレベルに反映される、鉄状態が改善されるまで、又は鉄欠乏性貧血によって影響を受けた健康状態の所望の改善があるまで、数か月の期間にわたり行うことができる。

【0111】

本発明に係る製剤は子供、青年及び成人によって摂取されることができる。

【0112】

本発明に従って適用される化合物は、この場合に、経口的並びに非経口的のいずれによっても投与されることができる。経口投与が好ましい。

【0113】

このように、本発明に係る化合物及び本発明に係る化合物と他の活性物質又は薬剤との前記組み合わせは、とりわけ、鉄欠乏性貧血、例えば、妊婦における鉄欠乏性貧血、子供及び青年における潜在的な鉄欠乏性貧血、胃腸異常によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、血液損失、例えば、（例えば、潰瘍、癌腫、痔、炎症性疾患、アセチルサリチル酸の摂取による）胃腸出血などによる鉄欠乏性貧血、月経、損傷、スプルーによる鉄欠乏性貧血、とりわけ、選択的に食事をする子供及び青年における、食事の鉄摂取減少による鉄欠乏性貧血、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる免疫不全、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる脳機能障害、下肢静止不能症候群など、の治療のための薬剤の製造に使用されることができる。

30

【0114】

本発明に係る適用は、短期記憶試験（STM）、長期記憶試験（LTM）、レーヴン漸進的マトリックス試験、ウェクスラー成人知能検査スケール（WAIS）及び/又は感情係数（Baron EQ-i、YV試験、青年版）における改善を伴う、とりわけ子供及び青年の、また成人の、鉄、ヘモグロビン、フェリチン及びトランスフェリンのレベルの改善に、又は好中球レベル、抗体レベル及び/又はリンパ球機能の改善につながる。

40

【0115】

さらに、本発明は、本発明に係る化合物、とりわけ、式（II）に係る化合物、1種又は2種以上、並びに場合によりさらに薬学的に有効な化合物1種又は2種以上、並びに場合により薬理的に許容することのできる担体及び/又は助剤物質及び/又は溶媒を含む医薬組成物に関する。前記医薬組成物は、例えば、本発明の化合物99重量%まで又は

50

90重量%まで又は80重量%まで又は70重量%までを含み、残りはそれぞれ薬理的に許容することのできる担体及び/又は助剤及び/又は溶媒によって形成される。

【0116】

これらは一般的な薬剤学的担体、助剤物質又は溶媒である。上記医薬組成物は、例えば、静脈内、腹腔内、筋肉内、腔内、頬内、経皮的、皮下的、皮膚粘膜的、経口的、直腸内、経皮、局所的、皮内、胃内又は皮内の適用に適しており、そして、例えば、丸剤、錠剤、腸溶コーティング錠剤、フィルム錠剤、層錠剤、経口用徐放製剤、皮下的又は皮膚的投与(とりわけ、プラスターとして)、デポー製剤、糖衣錠、坐薬、ゲル剤、軟膏、シロップ剤、顆粒剤、坐薬、乳濁剤、分散剤、マイクロカプセル剤、マイクロ製剤、ナノ製剤、リポソーム製剤、カプセル剤、腸溶コーティングカプセル剤、粉末剤、吸入粉末剤、微結晶製剤、吸入スプレー、散布剤、ドロップ、点鼻剤、鼻スプレー、エアロゾル、アンプル剤、液剤、ジュース剤、懸濁剤、輸液剤又は注射液剤等の形態で提供される。

10

【0117】

好ましくは、本発明に係る化合物並びにかかる化合物を含有する医薬組成物は経口的に適用されるが、例えば、非経口的、とりわけ、静脈内などの他の形態も可能である。

【0118】

この目的に対し、本発明に係る化合物は、好ましくは、丸剤、錠剤、腸溶コーティング錠剤、フィルム錠剤、層錠剤、経口投与用徐放製剤、デポー製剤、糖衣錠、顆粒剤、乳濁剤、分散剤、マイクロカプセル剤、マイクロ製剤、ナノ製剤、リポソーム製剤、カプセル剤、腸溶コーティングカプセル剤、粉末剤、微結晶製剤、散布剤、ドロップ、アンプル剤、液剤、懸濁剤、輸液剤又は注射液の形態の医薬組成物で提供される。

20

【0119】

本発明の好ましい実施形態において、鉄錯体化合物は錠剤又はカプセル剤の形態で投与される。これらは、例えば、耐酸性形態として又はpH依存性コーティングを有して存在することができる。

【0120】

本発明に係る化合物は、製薬的目的で、とりわけ、固体薬剤製剤に対して通常用いられるような種々の有機又は無機の担体及び/又は助剤物質、例えば、賦形剤(例えば、ショ糖、デンプン、マンニトール、ソルビトール、ラクトース、グルコース、セルロース、タルク、リン酸カルシウム、炭酸カルシウムなど)、結合剤(例えば、セルロース、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリプロピルピロリドン、ゼラチン、アラビアガム、ポリエチレングリコール、ショ糖、デンプンなど)、崩壊剤(例えば、デンプン、加水分解デンプン、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースのカルシウム塩、ヒドロキシプロピルデンプン、ナトリウムグリコールデンプン、炭酸水素ナトリウム、リン酸カルシウム、クエン酸カルシウムなど)、滑剤(例えば、ステアリン酸マグネシウム、タルク、ラウリル硫酸ナトリウムなど)、香味剤(例えば、クエン酸、メントール、グリシン、オレンジ粉末など)、保存剤(例えば、安息香酸ナトリウム、重亜硫酸ナトリウム、メチルパラベン、プロピルパラベンなど)、安定剤(例えば、クエン酸、クエン酸ナトリウム、酢酸及びチトリプレックス(titriplex)シリーズ由来のマルチカルボン酸、例えば、ジエチレントリアミンペンタ酢酸(DTPA)など)、懸濁剤(例えば、メチルセルロース、ポリビニルピロリドン、ステアリン酸アルミニウムなど)、分散剤、希釈剤(例えば、水、有機溶媒など)、蜜ロウ、ココアバター、ポリエチレングリコール、白色ワセリン等、を含んでいることができる医薬組成物により投与されることができる。

30

40

【0121】

液体薬剤製剤、例えば、溶剤、懸濁剤及びゲル剤などは、通常、液体担体、例えば、水及び/又は薬剤学的に許容することのできる有機溶媒などを含有する。さらに、かかる液体製剤はpH調整剤、乳化剤又は分散剤、緩衝剤、保存剤、湿潤剤、ゲル化剤(例えば、メチルセルロース)、色素及び/又は香味剤も含有することができる。組成物は等張であることができ、すなわち、組成物は血液と同じ浸透圧を有していることができる。組成物

50

の等張性は、塩化ナトリウム及び他の薬剤学的に許容することのできる剤、例えば、デキストロース、マルトース、ホウ酸、酒石酸ナトリウム、プロピレングリコール及び他の無機又は有機の可溶性物質などを用いることによって調整されることができる。液体組成物の粘度は、薬剤学的に許容することのできる増粘剤、例えば、メチルセルロースなどによって調整されることができる。他の適当な増粘剤として、例えば、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボマー等を挙げるることができる。増粘剤の好ましい濃度は選択される剤に依存する。薬剤学的に許容することのできる保存剤は液体組成物の保存寿命を増加させるのに使用されることができる。ベンジルアルコールが適当であることができるが、例えば、パラベン、チメロサル、クロロブタノール及び塩化ベンザルコニウムを含む多数の保存剤が同様に用いられることができる。

10

【0122】

活性物質は、例えば、体重1kg当たり0.001mg~500mgの単位用量で、例えば、一日1~4回投与されることができる。しかしながら、用量は、患者の年齢、体重、状態、疾病の重症度又は投与型に応じて増減されることができる。

【0123】

実施例

配位子の名称表示は、Advanced Chemistry Development社によるプログラムACD/name、バージョン12.01を用いてIUPAC命名法に従って実施された。

略語

20

s 一重項   t 三重項
d 二重項   q 四重項
dd 二重二重項   m 多重項 (ブロード / 重畳 (ueberlagert))

L 配位子

【0124】

出発化合物:

A. ピラジン - 2 - オール 1 - オキシド

【化24】

30

次の文献: G. Dunn et al., J. Chem. Soc., 1949, 2707-2712と同様にして合成を実施した。

【0125】

B. 5,6-ジメチル-ピラジン-2-オール1-オキシド

【化25】

40

次の文献: G. Dunn et al., J. Chem. Soc., 1949, 2707-2712と同様にして合成を実施した。

【0126】

C. 3-メチルピラジン-2-オール-1-オキシド

【化 2 6】

次の文献：G. Dunn et al., J. Chem. Soc. 1949, 2707 - 2712と同様にして合成を実施した。

【0127】

D. 3, 5, 6 - トリメチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド

10

【化 2 7】

次の文献：G. Dunn et al., J. Chem. Soc. 1949, 2707 - 2712と同様にして合成を実施した。

【0128】

E. 5 - メチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド

20

【化 2 8】

水及びメタノール各 200 mL 中のグリシンヒドロキサム酸 100 ミリモル (9 g) を -25 に冷却して、メチルグリオキサール 100 ミリモル (40% 溶液 15.4 mL) を滴下して加えた後、30% NaOH 10 mL で pH を約 11 に調整した。2 時間以内に 5 まで加熱し、そして真空下に溶媒容量の半分まで濃縮した。20% HCl で pH 3 に調整し、沈殿した固体を濾別して乾燥させた。表題化合物 7.28 g (収率 52%) を得た。

30

IR (物質中, cm^{-1}): 1644、1577、1527、1454、1425、1381、1333、1229、1141、1062、1028、949、896、835、806、732。

CHN 元素分析: C、42.91; H、4.49; N、19.54。

$^1\text{H-NMR}$ (DMSO- d_6 , 400 MHz): [ppm] = 8.04 (s, 1H)、7.83 (s, 1H)、2.21 (s, 3H)。

【0129】

F. 3, 5 - ジメチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド

40

【化 2 9】

水及びメタノール各 200 mL 中のアラニンヒドロキサム酸 407 ミリモル (42.4 g) を -10 に冷却し、メチルグリオキサール 400 ミリモル (40% 溶液 57 mL) を滴下して加えた後、30% NaOH 19 mL で pH を約 11 に調整した。2 時間以内に 0 まで加熱し、次いで 20% HCl で pH 3 に調整した。この溶液を真空蒸留下に濃縮

50

乾固し、この残渣をエタノール 50 mL で加熱還流し、冷却後に濾過を行い、この濾液を再度濃縮乾固した。この固体残渣 4.4 g を水 50 mL 中に溶解し、 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 15 ミリモル (4.06 g) を添加し、50 に 30 分間加熱し、濃縮して 5 に 4 時間保存した。沈殿した固体を濾別して乾燥させた。水 50 mL 及びエタノール 10 mL 中の固体 3.7 g を 1 M NaOH 6 mL で pH 11 に調整し、一晚攪拌して遠心分離した。この上澄をデカンタし、1 M HCl 3 mL で pH 3 に調整して濃縮乾固した。固体 4.2 g をエタノール 20 mL 中で還流し、冷却して濾別した。この濾液を再度濃縮乾固し、そして得られた固体 2.8 g を水 10 mL で懸濁し、50 に加熱しそして一晚放置して冷却した。この懸濁液を遠心分離し、上澄をデカンタして濃縮乾固した。表題化合物 2.0 g (収率 3.5%) を得た。

10

IR (物質中, cm^{-1}): 1633、1579、1526、1423、1372、1318、1274、1212、1148、1030、987、934、829、751、681、613。

LC-MS (m/z): 141.6 (M+H)。

CHN 元素分析: C、50.15; H、5.75; N、18.83。

$^1\text{H-NMR}$ ($\text{DMSO}-d_6$, 400 MHz): [ppm] = 7.64 (s, 1H)、2.31 (s, 3H)、2.15 (s, 3H)。

【0130】

G. 5, 6 - ジエチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド

【化30】

20

次の文献: G. Dunn et al., J. Chem. Soc. 1949, 2707 - 2712 と同様にして合成を実施した。

【0131】

H. 5, 6, 7, 8 - テトラヒドロキノキサリン - 2 - オール - 1 - オキシド

【化31】

30

次の文献: G. Dunn et al., J. Chem. Soc. 1949, 2707 - 2712 と同様にして合成を実施した。

【0132】

I. 6 - メチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド

【化32】

40

2 - クロロ - 6 - メチルピラジン 156 ミリモル (20 g) を 96% 硫酸 80 mL 中に溶解し、ペルオキシ二硫酸カリウム 222 ミリモル (63 g) を 10 で少量ずつ添加し、そして 10 で 2 日間かつ室温で 1 日間攪拌した (C. E. Mixan, R. Garth, J. Org. Chem. 1977, 42, 1869 - 1871 も参照されたい)。この反応混合物を、エタノールの添加下に、氷 200 g 上に注ぎ、水酸化カルシウムで中和

50

を行った後、濾別してエタノールで洗浄した。この濾液を蒸発乾固し、得られた固体(20g)を20% KOH 溶液300 mL 中で3時間還流し、そして冷却後に20% HCl で pH 3 に調整した。この溶液を蒸発乾固し、この残渣を還流下に2時間エタノール0.2 L で煮沸し、冷却後に濾過して濾液を蒸発乾固した。エタノール/テトラヒドロフランからの再結晶後、粗生成物7.4 g から表題化合物2.17 g (収率10%、純度93%)を得た。

IR (物質中, cm^{-1}): 1649、1573、1541、1454、1413、1389、1374、1297、1247、1208、1171、1126、1055、1037、981、896、848、816、718。

LC-MS (m/z): 127.4 (M+H)。

CHN 元素分析: C、44.77; H、4.56; N、20.72。

$^1\text{H-NMR}$ (DMSO- d_6 , 400 MHz): [ppm] = 7.95 (s, 1H)、7.30 (s, 1H)、2.31 (s, 3H)。

【0133】

J. 3, 6-ジメチルピラジン-2-オール-1-オキシド

【化33】

次の文献: A. Ohta et al., J. Heterocyclic Chem. 1981, 18, 555-558 と同様にして合成を実施した。

【0134】

鉄錯体化合物 (実施例)

実施例 1

トリス-(ピラジン-2-オール1-オキシド)-鉄(III)-錯体

【化34】

ピラジン-2-オール-1-オキシド (G. Dunn et al., J. Chem. Soc. 1949, 2707-2712 に同様) 15ミリモル (1.77g) をエタノール50 mL 中に溶解し、還流まで加熱しそしてエタノール20 mL 中に溶解した $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 5ミリモル (1.352g) を添加した。還流下に、水50 mL を滴下して加え、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続いて、1M NaOH 15 mL で pH を 4.5 に調整し、50 で2時間攪拌し、そして冷却後に生成物を濾別して50の真空乾燥オープンで乾燥させた。表題化合物1.89g (Fe 収率95%) を得た。

IR (物質中, cm^{-1}): 3096、3060、1595、1517、1476、1440、1340、1289、1188、1157、1048、921、890、830、801。

Fe 含有量: 13.8% [m/m]

塩化物含有量: 3.0% [m/m]

【0135】

実施例 2

トリス - (5 , 6 - ジメチルピラジン - 2 - オール 1 - オキシド) - 鉄 (I I I) - 錯体
【化 3 5】

10

5 , 6 - ジメチルピラジン - 2 - オール 1 - オキシド (G . Dunn et al . , J . Chem . Soc . 1949 , 2707 - 2712 に同様) 15 ミリモル (2 . 213 g) をエタノール 50 mL 中に溶解し、還流まで加熱しそしてエタノール 25 mL 中に溶解した $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 5 ミリモル (1 . 352 g) を添加した。還流下に、水 75 mL を滴下して加え、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続いて、1 M $NaOH$ 10 mL で pH を 4 . 5 に調整し、50 で 2 時間攪拌し、そして冷却後に生成物を濾別して 50 の真空乾燥オープンで乾燥させた。表題化合物 2 . 07 g (Fe 収率 86 %) を得た。

20

IR (物質中 , cm^{-1}) : 3037、1594、1477、1361、1276、1217、1161、1093、1065、1018、968、878、771、692。

Fe 含有量 : 11 . 63 % [m / m]

塩化物含有量 : 0 . 0 % [m / m] (検出できず)

【 0 1 3 6 】

実施例 3

トリス - (3 - メチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド) - 鉄 (I I I) - 錯体
【化 3 6】

30

40

3 - メチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド (G . Dunn et al . , J . Chem . Soc . 1949 , 2707 - 2712 に同様) 12 ミリモル (1 . 51 g) をエタノール 100 mL 中で還流まで加熱しそしてエタノール 20 mL 中に溶解した $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 4 ミリモル (1 . 08 g) を添加した。還流下に、水 120 mL を滴下して加え、溶媒の半分を蒸留して除き、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続いて、1 M $NaOH$ 9 mL で pH を 4 . 4 に調整し、そして 50 で 15 分間攪拌した。冷却後に生成物を濾別して乾燥させた。表題化合物 1 . 57 g (Fe 収率 89 %) を得た。

50

IR (物質中, cm^{-1}): 1588、1523、1487、1373、1333、1314、1257、1185、1099、1032、946、881、809、793、752、729。

CHN元素分析: C、41.92; H、3.58; N、19.33。

Fe含有量: 12.7% [m/m]

塩化物含有量: 0.0% [m/m] (検出できず)

【0137】

実施例4

トリス-(3,5,6-トリメチルピラジン-2-オール-1-オキシド)-鉄(III)-錯体

10

【化37】

20

3,5,6-トリメチルピラジン-2-オール-1-オキシド (G. Dunn et al., J. Chem. Soc. 1949, 2707-2712に同様) 39ミリモル (6.0g) をエタノール80mL中で還流まで加熱しそしてエタノール10mL中に溶解した $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 13ミリモル (3.5g) を添加した。還流下に、水80mLを滴下して加え、溶媒の半分を蒸留して除き、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続き、1M NaOH 48mLでpHを4.4に調整し、そして50℃で15分間

30

攪拌した。冷却後に生成物を濾別して乾燥させた。表題化合物 6.48g (Fe収率90%) を得た。

IR (物質中, cm^{-1}): 1587、1486、1413、1363、1332、1182、1129、1082、1005、940、873、749、721

CHN元素分析: C、47.67; H、5.26; N、15.82

Fe含有量: 10.07% [m/m]

塩化物含有量: 0.0% [m/m] (検出できず)

【0138】

実施例5

トリス-(5-メチルピラジン-2-オール-1-オキシド)-鉄(III)-錯体

40

【化38】

10

5 - メチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド 42.8 ミリモル (6.0 g、純度 90%) をエタノール 360 mL 中で還流まで加熱しそしてエタノール 20 mL 中に溶解した $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 14.3 ミリモル (3.86 g) を添加した。還流下に、水 380 mL を滴下して加え、溶媒の半分を蒸留して除き、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続き、1 M NaOH 45 mL で pH を 4.4 に調整し、そして 50 で 30 分間攪拌した。冷却後に生成物を濾別して乾燥させた。表題化合物 5.31 g (Fe 収率 80%) を得た。

20

IR (物質中, cm^{-1}): 1611、1514、1486、1450、1398、1380、1340、1256、1205、1184、1122、1039、1007、939、918、873、840、757、742。

CHN 元素分析: C、40.88; H、3.55; N、18.86。

Fe 含有量: 11.96% [m/m]

塩化物含有量: 0.0% [m/m] (検出できず)

【0139】

実施例 6

トリス - (3, 5 - ジメチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド) - 鉄 (III) - 錯体

30

【化39】

40

3, 5 - ジメチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド 11.4 ミリモル (1.68 g) をエタノール 50 mL 中で還流まで加熱しそしてエタノール 10 mL 中に溶解した $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 3.8 ミリモル (1.03 g) を添加し、還流下に、水 50 mL を滴下して加え、溶媒の半分を蒸留して除き、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続き、1 M NaOH 7 mL で pH を 4.4 に調整し、そしてさらに溶媒 30 mL を留去した後に一晩攪拌した。生成物を濾別して乾燥させ、表題化合物 1.11 g (Fe 収率

50

47%)を得た。

IR (物質中, cm^{-1}): 1526、1489、1373、1332、1306、1226、1141、1055、940、834、748、643、605。

Fe含有量: 9.07% [m/m]

塩化物含有量: 0.79% [m/m]

【0140】

実施例7

トリス-(5,6-ジエチルピラジン-2-オール-1-オキシド)-鉄(III)-錯体

【化40】

5,6-ジエチルピラジン-2-オール-1-オキシド6.6ミリモル(1.1g)をエタノール30mL中で還流まで加熱しそしてエタノール10mL中に溶解した $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 2.2ミリモル(0.6g)を添加した。還流下に、水35mLを滴下して加え、溶媒の半分を蒸留して除き、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続いて、1M NaOH3.8mLでpHを4.2に調整し、生成物を濾別して乾燥させた。

表題化合物1.15g(Fe収率99%)を得た。

IR (物質中, cm^{-1}): 2974、2937、2876、1706、1588、1509、1479、1457、1353、1260、1214、1158、1105、1048、981、950、895、782、754、687、667、608。

CHN元素分析: C、51.5; H、6.27; N、14.31

Fe含有量: 10.6% [m/m]

塩化物含有量: 3.4% [m/m]

【0141】

実施例8

トリス-(5,6,7,8-テトラヒドロキノキサリン-2-オール-1-オキシド)-鉄(III)-錯体

10

20

30

40

【化 4 1】

10

5, 6, 7, 8 - テトラヒドロキノキサリン - 2 - オール - 1 - オキシド 15 ミリモル (2.62 g) をエタノール 100 mL 中で還流まで加熱しそしてエタノール 30 mL 中に溶解した $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 5 ミリモル (1.35 g) を添加した。還流下に、水 100 mL を滴下して加え、溶媒の半分を蒸留して除き、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続き、1 M NaOH 15 mL で pH を 4.5 に調整し、この生成物を濾別して乾燥させた。表題化合物 2.52 g (Fe 収率 91%) を得た。

20

IR (物質中, cm^{-1}): 2933, 1592, 1519, 1486, 1433, 1366, 1325, 1266, 1245, 1217, 1184, 1134, 1102, 1067, 987, 966, 887, 856, 821, 762, 690, 633, 611。

CHN 元素分析: C, 52.44; H, 5.03; N, 15.21。

Fe 含有量: 10.12% [m/m]

塩化物含有量: 0.0% [m/m] (検出できず)

【0142】

実施例 9

トリス - (6 - メチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド) - 鉄 (III) - 錯体

【化 4 2】

30

40

6 - メチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド 15.4 ミリモル (1.94 g) をエタノール 30 mL 中で還流まで加熱しそしてエタノール 5 mL 中に溶解した $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 5.1 ミリモル (1.39 g) を添加した。還流下に、さらにエタノール 45 mL 及び水 75 mL を滴下して加え、溶媒 120 mL を蒸留して除き、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続き、1 M NaOH 15 mL で pH を 4.4 に調整し、50 で 30 分間攪拌した後、生成物を濾別して乾燥させた。表題化合物 2.1 g (Fe 収率 92%) を得た。

IR (物質中, cm^{-1}): 1597, 1528, 1478, 1409, 1379, 1357, 1218, 1189, 1170, 1134, 1080, 1035, 989, 924

50

、 8 6 1、 8 2 8、 7 1 2。

CHN元素分析：C、 4 0 . 6 8 ; H、 3 . 4 8 ; N、 1 8 . 7 7。

Fe含有量： 1 2 . 6 2 % [m / m]

塩化物含有量： 0 . 0 % [m / m] (検出できず)

【 0 1 4 3 】

実施例 1 0

トリス - (3 , 6 - ジメチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド) - 鉄 (I I I) - 錯体

【 化 4 3 】

10

20

3 , 6 - ジメチルピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド 1 5 ミリモル (2 . 1 g) をエタノール 5 0 m L 中で還流まで加熱しそしてエタノール 1 0 m L 中に溶解した $FeCl_3 \cdot 6H_2O$ 5 ミリモル (1 . 3 5 g) を添加した。還流下に、水 5 0 m L を滴下して加え、溶媒 9 0 m L を蒸留して除き、そしてこの反応混合物を放置して冷却した。引き続いて、 1 M $NaOH$ 1 2 m L で pH を 4 . 4 に調整し、生成物を濾別して乾燥させた。表題化合物 2 . 2 g (Fe 収率 8 7 %) を得た。

IR (物質中 , cm^{-1}) : 1 5 9 9、 1 5 2 9、 1 4 8 6、 1 4 5 5、 1 4 1 3、 1 3 7 0、 1 3 1 6、 1 2 5 2、 1 1 7 1、 1 1 2 3、 1 0 2 8、 9 7 8、 9 4 0、 8 5 9、 7 5 2、 7 0 7。

CHN元素分析：C、 4 5 . 2 8 ; H、 4 . 3 1 ; N、 1 7 . 3 3。

30

Fe含有量： 1 1 . 0 4 % [m / m]

塩化物含有量： 0 . 0 % [m / m] (検出できず)

【 0 1 4 4 】

薬理学的試験方法：

本発明に係る Fe 錯体によって達成されることが出来る優れた Fe 利用を以下のマウスモデルによって測定した。

【 0 1 4 5 】

雄性 N M R I (S P F) マウス (約 3 週齢) に低鉄食 (鉄約 5 p p m) を約 3 週間にわたり与えた。次いで、 2 日間の中断期間を設けて 5 日間を 2 回 (1 ~ 5 日目及び 8 ~ 1 2 日目) で、これらのマウスに胃管によって鉄錯体を投与した (2 m g 鉄 / k g 体重 / 日) 。 6 匹のマウスは対照群 (ネガティブコントロール) とし、代わりに水を投与した。下記式に従ってヘモグロビン増加及び体重増加から 1 5 日目の利用を計算した。

40

【 数 1 】

$$\text{利用 (\%)} = \frac{\Delta \text{鉄利用} * 100}{FeDos.} = \frac{(Fe ut. - Fe ut. \text{対照}) * 100}{FeDos.}$$

$$= [(H b_{2(3)} * B W_{9(14)} - H b_1 * B W_4) * 0 . 0 7 * 0 . 0 0 3 4 - (H b_{2(3)} \text{対照} * B W_{9(14)} \text{対照} - H b_1 \text{対照} * B W_4 \text{対照}) * 0 . 0 7 * 0 . 0 0 3 4] * 1 0 0 / F e D o s .$$

$$= [(H b_{2(3)} * B W_{9(14)} - H b_1 * B W_4) * 0 . 0 0 0 2 3 8 - (H b$$

50

$$2(3) \text{ 対 照 } * B W_{9(14)} \text{ 対 照 } - H b_{1 \text{ 対 照 }} * B W_{4 \text{ 対 照 }} * 0.000238] * 100 / F e D o s .$$

$$= (H b_{2(3)} * B W_{9(14)} - H b_{1} * B W_{4} - H b_{2(3) \text{ 対 照 }} * B W_{9(14)} \text{ 対 照 } + H b_{1 \text{ 対 照 }} * B W_{4 \text{ 対 照 }}) * 0.0238 / F e D o s .$$

【0146】

0.07 = 体重 (BW) 1 kg 当たり血液 70 mL に対する係数

0.0034 = 0.0034 g Fe / g Hb に対する係数

Hb₁ = 1日目のヘモグロビンレベル (g / L)

Hb₂₍₃₎ = 8日目 (又は15日目) のヘモグロビンレベル (g / L)

BW₄ = 1日目の体重 (g)

BW₉₍₁₄₎ = 8日目 (又は15日目) の体重 (g)

Hb_{1 対 照} = 対照群における1日目の平均ヘモグロビンレベル (g / L)

Hb_{2(3) 対 照} = 対照群における8日目 (又は15日目) の平均ヘモグロビンレベル (g / L)

BW_{4 対 照} = 対照群における1日目の平均体重 (g)

BW_{9(14) 対 照} = 対照群における8日目 (又は15日目) の平均体重 (g)

Fe Dos . = 5日間又は10日間にわたる投与鉄全量 (mg Fe)

$$F e u t . = (H b_{2(3)} * B W_{9(14)} - H b_{1} * B W_{4}) * 0.07 * 0.0034 \text{ (mg Fe)}$$

利用 = 食餌から利用された、Fe 利用総量 (実験群) - Fe ut . 対照群、(mg Fe)

【0147】

下記表は結果を示す：

表：

実施例番号	利用 n 15 d (abs. %)	標準偏差 (+/- 0.5)
1	56	13
2	61	11
3	77	15
4	32	15
5	37	7
10	58	16
比較例*	25	13

【0148】

比較例*：

比較例として、下記式：

【化44】

で表されるトリス (ピリジノン - 2 - オール - 1 - オキシド) - 鉄 (III) - 錯体化合

物を、ヨーロッパ特許公報第 0 1 3 8 4 2 0 号と同様に調製して試験し、複素環基本構造の影響を示した。ヨーロッパ特許公報第 0 1 3 8 4 2 0 号は実施例 7 において、ピリジン環にさらなる置換基を有するトリス(ピリジノン-2-オール-1-オキシド)-鉄(III)-錯体化合物だけを開示している。本明細書中の比較例である非置換トリス(ピリジノン-2-オール-1-オキシド)-鉄(III)-錯体化合物は、そこには開示されていない。

【0149】

上記表中に結果に示されるように、本発明の実施例 1 の対応するピリミジン化合物は、ヨーロッパ特許公報第 0 1 3 8 4 2 0 号と同様のピリジン比較化合物と比較して優位に改善された鉄利用を示す。本発明の実施例化合物 2、3、4、5 及び 10 も、該比較化合物と比較して改善された鉄利用を示す。

10

【0150】

測定された鉄利用値は鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血の治療の指標に関して重要なパラメータであり、それはこのパラメータが鉄吸収(Eisenaufnahme)だけでなく、動物モデルにおいて若い動物を用いた場合にとりわけ重要となる体重と鉄吸収との間の関係も反映しているからである。実際に吸収された鉄の評価基準であるヘモグロビンレベルだけが考慮された場合、動物の成長に基づく量は考慮されないままとなるであろう。従って、鉄利用とヘモグロビンレベルとは大抵は相互に関連しているが、鉄利用がよりの確な評価基準である。測定可能である鉄血清レベルだけを考慮するのも考慮不足となるが、その理由は、それをもって体内に達する鉄量についての予測は与えられることができるが、体によって利用されることができ鉄量についての予測は与えられることができないからである。

20

【0151】

本発明は以下の実施形態によってさらに説明される：

1. 薬剤として使用するための鉄(III)-ピラジン-2-オール-1-オキシド錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩。

【0152】

2. 下記式(I)：

【化 4 5】

30

[上記式中、

矢印はそれぞれ 1 つ又は複数の鉄原子への配位結合を表し、そして

R₁、R₂、R₃ は同じであるか又は異なっていることができそして以下：

- 水素原子、
- ハロゲン原子、
- 場合により置換されていることがあるアルキル基、
- 場合により置換されていることがあるアルコキシ基、
- 場合により置換されていることがあるアリール基、
- 場合により置換されていることがあるアルコシカルボニル基、及び
- 場合により置換されていることがあるアミノカルボニル基、

40

からなる群から選択され、又は

R₂ 及び R₃ はそれらが結合している炭素原子と一緒に、場合によりヘテロ原子 1 個又は 2 個以上を含んでいることができる、場合により置換されていることがある飽和又は不飽和の 5 員環又は 6 員環を形成する]

で表される配位子少なくとも 1 個を含有する、実施形態 1 に記載の鉄(III)錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩。

50

【 0 1 5 3 】

3 . 下記式 (I)

【 化 4 6 】

(I)

10

[上記式中、

矢印はそれぞれ 1 つ又は複数の鉄原子への配位結合を表し、そして

R₁、R₂、R₃ は同じであるか又は異なっていることができそして以下：

- 水素原子、
- 場合により置換されていることがあるアルキル基、及び
- ハロゲン原子

からなる群から選択されるか、又は

R₂ 及び R₃ はそれらが結合している炭素原子と一緒に、5 員又は 6 員の炭素環式環を形成する]

で表される配位子少なくとも 1 個を含有する、実施形態 1 ~ 2 のいずれか一つに記載の使用のための鉄 (I I I) 錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩。

20

【 0 1 5 4 】

4 . 下記式 (I) :

【 化 4 7 】

(I)

30

[上記式中、

矢印はそれぞれ 1 つ又は複数の鉄原子への配位結合を表し、そして

R₁、R₂、R₃ は同じであるか又は異なっていることができ、そして水素原子及びアルキル基からなる群から選択され、場合によりアルコキシ基によって置換されていることができ、又はR₂ 及び R₃ は一緒になってプロピレン基 (- C H₂ - C H₂ - C H₂ -)、ブチレン基 (- C H₂ - C H₂ - C H₂ - C H₂ -)、アザブチレン基若しくはオキサブチレン基を形成する]

で表される配位子少なくとも 1 個を含有する、実施形態 1 ~ 3 のいずれか一つに記載の使用のための鉄 (I I I) 錯体化合物又はその薬剤学的に許容することのできる塩。

40

【 0 1 5 5 】

5 . 下記式 :

【化 4 8】

(II)

[上記式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 は同じであるか又は異なっていることができ、そして上記の通りに定義される]

で表される、実施形態 1 ~ 4 のいずれか一つに記載の使用のための鉄 (I I I) 錯体化合物及びその薬剤学的に許容することのできる塩。

【 0 1 5 6 】

6 . 固体形態の実施形態 1 ~ 5 のいずれか一つで定義された通りの、鉄 (I I I) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物。

【 0 1 5 7 】

7 . 薬剤として使用するための実施形態 6 に記載の鉄 (I I I) - ピラジン - 2 - オール - 1 - オキシド錯体化合物。

【 0 1 5 8 】

8 . 鉄欠乏症状及び鉄欠乏性貧血並びにそれらに付随する症状の治療及び予防に使用するための実施形態 1 ~ 5 及び 7 のいずれか一つに記載の使用のための鉄 (I I I) - 錯体化合物。

【 0 1 5 9 】

9 . 前記症状が以下：疲労、だるさ、集中力の欠如、認知能力の低下、正しい言葉を見出すことの困難性、健忘、不自然な蒼白、怒りっぽさ、心拍数の加速 (頻脈)、舌のただれ又は腫れ、脾臓肥大、変わった食べ物への欲求 (異食)、頭痛、食欲不振、易感染性の増大、抑うつ気分を含む、実施形態 8 に記載の使用のための鉄 (I I I) - 錯体化合物。

【 0 1 6 0 】

10 . 妊婦における鉄欠乏性貧血、子供及び青年における潜在的な鉄欠乏性貧血、胃腸異常によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、血液損失、例えば、(例えば、潰瘍、癌腫、痔、炎症性疾患、アセチルサリチル酸の摂取による) 胃腸出血などによる鉄欠乏性貧血、月経によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、損傷によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、脱毛 (Psilosis) (スプルー) による鉄欠乏性貧血、とりわけ選択的に食事をする子供及び青年における、食事の鉄摂取減少による鉄欠乏性貧血、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる免疫不全、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる脳機能障害、鉄欠乏性貧血によって引き起こされる下肢静止不能症候群、癌の場合の鉄欠乏性貧血、化学療法によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、炎症 (A I) によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、うっ血性心不全 (C H F ; うっ血性心不全) の場合の鉄欠乏性貧血、慢性腎不全ステージ 3 ~ 5 (C K D 3 ~ 5 ; 慢性腎臓病ステージ 3 ~ 5) の場合の鉄欠乏性貧血、慢性炎症 (A C D) によって引き起こされる鉄欠乏性貧血、関節リウマチ (R A ; 関節リウマチ) の場合の鉄欠乏性貧血、全身性エリテマトーデス (S L E ; 全身性エリテマトーデス) の場合の鉄欠乏性貧血及び炎症性腸疾患 (I B D ; 炎症性腸疾患) の場合の鉄欠乏性貧血の治療のための実施形態 8 に記載の使用のための鉄 (I I I) - 錯体化合物。

【 0 1 6 1 】

11 . 前記鉄 (I I I) 錯体化合物が経口投与される、実施形態 1 ~ 5 及び 7 ~ 10 のい

10

20

30

40

50

ずれか一つに記載の使用のための鉄(III) - 錯体化合物。

【0162】

12. 腸溶コーティング形態又はpH依存性コーティングを有する形態を含む、錠剤又はカプセル剤の形態で投与される、実施形態11に記載の使用のための鉄(III) - 錯体化合物。

【0163】

13. 実施形態1~6のいずれか一つに定義された鉄(III)錯体化合物を含有する、薬剤。

【0164】

14. 実施形態1~6のいずれか一つに定義された鉄(III)錯体化合物及び生理学的に適合性の担体又は賦形剤少なくとも1種を含有する、薬剤。

10

【0165】

15. 実施形態1~6のいずれか一つに定義された鉄(III)錯体化合物を、鉄代謝に作用するさらなる薬剤少なくとも1種と組み合わせて含有する組成物。

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2013/057071

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. A61K31/555 C07F15/02 A61P7/06 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61K C07F		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	ZHU, FENG ET AL: "Biosynthesis, characterization and biological evaluation of Fe(III) and Cu(II) complexes of neoaspergillitic acid, a hydroxamate siderophore produced by co-cultures of two marine-derived mangrove epiphytic fungi", NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 6(8), 1137-1140 CODEN: NPCACO; ISSN: 1934-578X, 2011, XP009160418,	7,10-12
Y	page 1139, column 1, paragraph 4; compound 2 tables 1-2 ----- -/--	1-6,8,9, 13
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents :		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 7 May 2013		Date of mailing of the international search report 23/05/2013
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 6818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Renard, Delphine

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2013/057071

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	OHKANDA ET AL: "N-Hydroxyamide-Containing Heterocycles. Part 5.1 Synthesis of Novel Hexadentate Ligands Composed of N-Hydroxy-2(1H)-pyrazinone, Aliphatic Diamine, and 1,1,1-Tris(carboxyethoxymethyl)ethane, and Properties of Their Ferric Complexes", TETRAHEDRON, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, vol. 51, no. 47, 20 November 1995 (1995-11-20), pages 12995-13002, XP005254741, ISSN: 0040-4020, DOI: 10.1016/0040-4020(95)00839-Z	7,10-12
Y	3HOPRnCMe-ferric complex; compound 6 tables 1-2	1-6,8,9, 13
X	Junko Ohkanda ET AL: "Novel Iron Sequestering Agents: Synthesis and Iron-Chelating Properties of Hexadentate Ligands Composed of 1-Hydroxy-2(1H)-pyrimidinone, δ -Amino Carboxylic Acid, and Tris(2-aminoethyl)amine", J. Org. Chem, 30 May 1997 (1997-05-30), pages 3618-3624, XP055030457, DOI: 10.1021/jo961901m Retrieved from the Internet: URL: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo961901m [retrieved on 2012-06-20]	7,10-12
Y	page 3618; compound HOPR figure 2 stability of iron complex; pages 3619-362	1-6,8,9, 13
X	J OHKANDA ET AL: "N-Hydroxyamide-Containing Heterocycles. Part 2. Synthesis and Iron(III) Complex-Forming Tendency of 1-Hydroxy-2(1H)-pyrimidinone and -pyrazinone", BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, vol. 66, 1 January 1993 (1993-01-01), pages 841-847, XP055000884,	7,10-12
Y	page 842; compounds HOPR-H, HOPR-Me Iron(III) complex formation; stability constants of the iron(III) Complexes; pages 843-844 Measurement of the UV-Vis spectra; page 846	1-6,8,9, 13
	----- -/--	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/EP2013/057071

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	Yukio Maebayashi ET AL: "Isolation and structure of red pigment from <i>Aspergillus ochraceus</i> Wilh", Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1 January 1978 (1978-01-01), pages 1320-1322, XP055030367, Retrieved from the Internet: URL:http://ci.nii.ac.jp/els/110003623132.pdf?id=ART0004128721&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1342516782&cp= [retrieved on 2012-06-19] figure Scheme I	1-13
Y	Jing Hao ET AL: "First total synthesis of astechrome: novel hydroxamic acid with an indole-pyrazine skeleton", Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1 January 1994 (1994-01-01), pages 277-279, XP055030353, Retrieved from the Internet: URL:http://ci.nii.ac.jp/els/110003630922.pdf?id=ART0004138024&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1342516855&cp= [retrieved on 2012-06-19] compounds 1-2, 9 Synthese von Verbindungen 1 and 9; page 279 Referenzen 2-3 für die Synthese von Verbindung 2; page 277	1-13
Y	Arai Kunizo ET AL: "Metabolic products of <i>Aspergillus terreus</i>. VII. Astechrome: an iron-containing metabolite of the strain IFO 6123", Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1 January 1981 (1981-01-01), pages 1510-1517, XP055030361, Retrieved from the Internet: URL:http://ci.nii.ac.jp/els/110003633857.pdf?id=ART0004141421&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1342516922&cp= [retrieved on 2012-06-19] Experimental - Catalytic Hydrogenation of Astechrome (I) with Pd/C; page 1514 compound Astechrome	1-13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/EP2013/057071

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	Gemma Assante ET AL: "Isolation and structure of red pigments from <i>Aspergillus flavus</i> and related species, grown on a differential medium", <i>Journal of Agricultural and Food Chemistry</i>, 1 January 1981 (1981-01-01), pages 785-787, XP055030365, Retrieved from the Internet: URL:http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jf00106a023 [retrieved on 2012-06-19] compound VI Experimental - Red Pigment VI; page 1321 -----	1-13
Y	JING HAO ET AL: "Approach to the synthesis of astechrome", <i>HETEROCYCLES</i>, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, vol. 35, no. 2, 1 January 1993 (1993-01-01), pages 1279-1287, XP009160458, ISSN: 0385-5414 figure scheme 3; compounds 1, 13Fe, 2-Fe -----	1-13
Y	EP 0 120 670 A1 (NAT RES DEV [GB]) 3 October 1984 (1984-10-03) tables 2-3 -----	1-13
Y	SUZUKI, SACHIKO ET AL: "Iron chelated cyclic peptide, ferrichrysin, for oral treatment of iron deficiency: solution properties and efficacy in anemic rats", <i>INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH</i>, 77(1), 13-21 CODEN: IJVNAP; ISSN: 0300-9831, 2007, XP009160393, figure 1 the whole document -----	1-13

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2013/057071

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0120670	A1	03-10-1984	
		CY 1504 A	03-08-1990
		DE 3475706 D1	26-01-1989
		DK 165984 A	25-09-1984
		EP 0120670 A1	03-10-1984
		GB 2136806 A	26-09-1984
		HK 5190 A	02-02-1990
		JP H0625120 B2	06-04-1994
		JP S59181258 A	15-10-1984
		SG 54389 G	08-12-1989
		US RE36831 E	22-08-2000
		US 4650793 A	17-03-1987

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2013/057071

Cover page, point 4: FE (III) -PYRAZINE COMPLEX COMPOUNDS FOR THE TREATMENT AND PREVENTION OF IRON DEFICIENCY SYMPTOMS AND HYPOFERRIC ANAEMIAS**[Supplemental sheet]**

The International Searching Authority has determined that this international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims: 1-6, 8, 9, 13 (in full); 10-12 (in part)

Iron (III)-pyrazin-2-ol 1-oxide complex compounds or their pharmaceutically acceptable salts for use in the treatment and prevention of iron deficiency symptoms and hypoferric anaemias and the symptoms associated therewith.

2. Claims: 7 (in full); 10-12 (in part)

Iron (III) -pyrazin-2-ol 1-oxide complex compounds in solid form for use as medicaments.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2013/057071

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr. _____ weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich _____
2. Ansprüche Nr. _____ weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich _____
3. Ansprüche Nr. _____ weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr. _____
4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfasst: _____

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch entrichtet und die gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.
- Die zusätzlichen Recherchegebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt, jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.
- Die Zahlung der zusätzlichen Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/057071

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
INV. A61K31/555 C07F15/02 A61P7/06 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchiertes Mindestprüfstoß (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A61K C07F		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoß gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	ZHU, FENG ET AL: "Biosynthesis, characterization and biological evaluation of Fe(III) and Cu(II) complexes of neoaspergillitic acid, a hydroxamate siderophore produced by co-cultures of two marine-derived mangrove epiphytic fungi", NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, 6(8), 1137-1140 CODEN: NPCACO; ISSN: 1934-578X, 2011, XP009160418, Seite 1139, Spalte 1, Absatz 4; Verbindung 2 Tabellen 1-2 ----- -/--	7,10-12 1-6,8,9, 13
Y		
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :		
A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist		*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
E frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist		*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)		*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht		*Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts
7. Mai 2013		23/05/2013
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäische Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Renard, Delphine

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/057071

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	OHKANDA ET AL: "N-Hydroxyamide-Containing Heterocycles. Part 5.1 Synthesis of Novel Hexadentate Ligands Composed of N-Hydroxy-2(1H)-pyrazinone, Aliphatic Diamine, and 1,1,1-Tris(carboxyethoxymethyl)ethane, and Properties of Their Ferric Complexes", TETRAHEDRON, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, Bd. 51, Nr. 47, 20. November 1995 (1995-11-20), Seiten 12995-13002, XP005254741, ISSN: 0040-4020, DOI: 10.1016/0040-4020(95)00839-Z	7,10-12
Y	3HOPRnCMe-ferric complex; Verbindung 6 Tabellen 1-2	1-6,8,9, 13
X	Junko Ohkanda ET AL: "Novel Iron Sequestering Agents: Synthesis and Iron-Chelating Properties of Hexadentate Ligands Composed of 1-Hydroxy-2(1H)-pyrimidinone, δ -Amino Carboxylic Acid, and Tris(2-aminoethyl)amine", J. Org. Chem, 30. Mai 1997 (1997-05-30), Seiten 3618-3624, XP055030457, DOI: 10.1021/jo961901m Gefunden im Internet: URL: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jo961901m [gefunden am 2012-06-20]	7,10-12
Y	Seite 3618; Verbindung HOPR Abbildung 2 stability of iron complex; Seiten 3619-362	1-6,8,9, 13
X	J OHKANDA ET AL: "N-Hydroxyamide-Containing Heterocycles. Part 2. Synthesis and Iron(III) Complex-Forming Tendency of 1-Hydroxy-2(1H)-pyrimidinone and -pyrazinone", BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, Bd. 66, 1. Januar 1993 (1993-01-01), Seiten 841-847, XP055000884,	7,10-12
Y	Seite 842; Verbindungen HOPR-H, HOPR-Me Iron(III) complex formation; stability constants of the iron(III) Complexes; Seiten 843-844 Measurement of the UV-Vis spectra; Seite 846	1-6,8,9, 13
	----- -/--	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/057071

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	Yukio Maebayashi ET AL: "Isolation and structure of red pigment from <i>Aspergillus ochraceus</i> Wilh", Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1. Januar 1978 (1978-01-01), Seiten 1320-1322, XP055030367, Gefunden im Internet: URL:http://ci.nii.ac.jp/els/110003623132.pdf?id=ART0004128721&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1342516782&cp= [gefunden am 2012-06-19] Abbildung Scheme I	1-13
Y	Jing Hao ET AL: "First total synthesis of astechrome: novel hydroxamic acid with an indole-pyrazine skeleton", Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1. Januar 1994 (1994-01-01), Seiten 277-279, XP055030353, Gefunden im Internet: URL:http://ci.nii.ac.jp/els/110003630922.pdf?id=ART0004138024&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1342516855&cp= [gefunden am 2012-06-19] Verbindungen 1-2, 9 Synthese von Verbindungen 1 and 9; Seite 279 Referenzen 2-3 für die Synthese von Verbindung 2; Seite 277	1-13
Y	Arai Kunizo ET AL: "Metabolic products of <i>Aspergillus terreus</i>. VII. Astechrome: an iron-containing metabolite of the strain IFO 6123", Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1. Januar 1981 (1981-01-01), Seiten 1510-1517, XP055030361, Gefunden im Internet: URL:http://ci.nii.ac.jp/els/110003633857.pdf?id=ART0004141421&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1342516922&cp= [gefunden am 2012-06-19] Experimental - Catalytic Hydrogenation of Astechrome (I) with Pd/C; Seite 1514 Verbindung Astechrome	1-13
	----- -/--	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/057071

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	Gemma Assante ET AL: "Isolation and structure of red pigments from <i>Aspergillus flavus</i> and related species, grown on a differential medium", <i>Journal of Agricultural and Food Chemistry</i>, 1. Januar 1981 (1981-01-01), Seiten 785-787, XP055030365, Gefunden im Internet: URL:http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jf00106a023 [gefunden am 2012-06-19] Verbindung VI Experimental - Red Pigment VI; Seite 1321 -----	1-13
Y	JING HAO ET AL: "Approach to the synthesis of astechrome", <i>HETEROCYCLES</i>, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, Bd. 35, Nr. 2, 1. Januar 1993 (1993-01-01), Seiten 1279-1287, XP009160458, ISSN: 0385-5414 Abbildung scheme 3; Verbindungen 1, 13Fe, 2-Fe -----	1-13
Y	EP 0 120 670 A1 (NAT RES DEV [GB]) 3. Oktober 1984 (1984-10-03) Tabellen 2-3 -----	1-13
Y	SUZUKI, SACHIKO ET AL: "Iron chelated cyclic peptide, ferrichrysin, for oral treatment of iron deficiency: solution properties and efficacy in anemic rats", <i>INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH</i>, 77(1), 13-21 CODEN: IJVNAP; ISSN: 0300-9831, 2007, XP009160393, Abbildung 1 das ganze Dokument -----	1-13

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/057071

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0120670	A1	03-10-1984	CY 1504 A 03-08-1990
			DE 3475706 D1 26-01-1989
			DK 165984 A 25-09-1984
			EP 0120670 A1 03-10-1984
			GB 2136806 A 26-09-1984
			HK 5190 A 02-02-1990
			JP H0625120 B2 06-04-1994
			JP S59181258 A 15-10-1984
			SG 54389 G 08-12-1989
			US RE36831 E 22-08-2000
			US 4650793 A 17-03-1987

Internationales Aktenzeichen PCT/ EP2013/ 057071

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-6, 8, 9, 13(vollständig); 10-12(teilweise)

Eisen(III)-pyrazin-2-ol 1-oxid-Komplexverbindungen oder deren pharmazeutisch verträgliche Salze zur Verwendung in der Behandlung und Prophylaxe von Eisenmangelerscheinungen und Eisenmangelanämien sowie der damit einhergehenden Symptome

---

2. Ansprüche: 7(vollständig); 10-12(teilweise)

Eisen(III)-pyrazin-2-ol 1-oxid-Komplexverbindungen in fester Form zur Verwendung als Arzneimittel.

フロントページの続き

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 P 9/00 (2006.01)	A 6 1 P 9/00	
A 6 1 P 1/02 (2006.01)	A 6 1 P 1/02	
A 6 1 P 1/00 (2006.01)	A 6 1 P 1/00	
A 6 1 P 25/24 (2006.01)	A 6 1 P 25/24	
A 6 1 P 25/06 (2006.01)	A 6 1 P 25/06	
A 6 1 K 9/28 (2006.01)	A 6 1 K 9/28	
A 6 1 K 9/48 (2006.01)	A 6 1 K 9/48	
A 6 1 K 9/20 (2006.01)	A 6 1 K 9/20	

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, T M), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, R S, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, H U, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI , NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC

- (72) 発明者 バルク トーマス
スイス連邦, CH - 8 0 5 0 チューリッヒ, ヴィクトリアシュトラッセ 5 5
- (72) 発明者 ブーア ヴィルム
ドイツ連邦共和国, 7 8 4 6 5 コンスタンツ, ツム キルヒヴァルト 2 0
- (72) 発明者 ブルクハルト ズザンナ
スイス連邦, CH - 8 0 4 9 チューリッヒ, アッカーシュタインシュトラッセ 2 0 7
- (72) 発明者 ブルゲルト ミヒヤエル
ドイツ連邦共和国, 8 8 0 4 5 フリードリヒスハーフェン, アッペンツェラーシュトラッセ 2 5
- (72) 発明者 カンクリーニ カミッコ
スイス連邦, CH - 9 0 0 0 ザンクト・ガレン, フィヒテシュトラッセ 1 5
- (72) 発明者 デュレンベルガー フランツ
スイス連邦, CH - 4 1 4 3 ドルナハ, ドルネックシュトラッセ 1 2 7
- (72) 発明者 フンク フェリクス
スイス連邦, CH - 8 4 0 4 ヴィンタートゥール, ドルフシュトラッセ 1 0
- (72) 発明者 ガイサー ペーター オットー
スイス連邦, CH - 9 0 1 4 ザンクト・ガレン, マルヴェエスシュトラッセ 8
- (72) 発明者 カロゲラキス アリス
スイス連邦, CH - 8 4 0 0 ヴィンタートゥール, クルツシュトラッセ 1
- (72) 発明者 マイヤー シモナ
スイス連邦, CH - 9 0 5 5 ビューラー, エック 6 4 3
- (72) 発明者 フィリップ エリク
スイス連邦, CH - 9 3 2 0 アルボン, シュヴァルベンシュトラッセ 1
- (72) 発明者 ライム シュテファン
スイス連邦, CH - 8 4 0 4 シュターデル ヴィンタートゥール, グルントホーフシュトラッセ 6 8
- (72) 発明者 ジーベル ディアナ
スイス連邦, CH - 9 0 3 0 アプトヴィル, ロスヴァイトシュトラッセ 3 a
- (72) 発明者 シュミット イェルク
スイス連邦, CH - 9 4 2 5 タール, ハイdraーシュトラッセ 7

(72)発明者 シュヴァルツ カトリン

スイス連邦, CH - 9000 ザンクト・ガレン, リンゲルベルクシュトラッセ 4

Fターム(参考) 4C076 AA36 AA44 AA45 AA60 BB01 CC14 FF67

4C086 AA01 AA02 AA03 BC48 HA28 MA01 MA04 MA52 NA06 ZA08

ZA12 ZA16 ZA36 ZA55 ZA66 ZA67 ZC21