

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012140874/14, 24.09.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 24.09.2012

(43) Дата публикации заявки: 27.03.2014 Бюл. № 9

Адрес для переписки:

664013, г.Иркутск, а/я 81, С.В. Шалашову

(71) Заявитель(и):

Шалашов Сергей Владимирович (RU)

(72) Автор(ы):

Шалашов Сергей Владимирович (RU),
Шалашова Татьяна Николаевна (RU),
Федотова Ирина Васильевна (RU),
Юрченко Елена Николаевна (RU),
Федотова Татьяна Васильевна (RU),
Негожева Нина Константиновна (RU),
Баштовая Елена Григорьевна (RU),
Негожева Наталья Игоревна (RU)

(54) СПОСОБ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ

(57) Формула изобретения

1. Способ эндоскопической пластики при паховых грыжах, включающий установку трех троакаров необходимого диаметра в брюшную полость, проведение через них требуемых инструментов, дугообразное рассечение брюшины над латеральной и медиальной паховыми ямками, отделение ее от подлежащих тканей вниз с обработкой грыжевого мешка, оставлением участка брюшины над подвздошными сосудами, семявыносящим протоком, яичковыми артерией и веней, не отделенным от подлежащих тканей, расположение в сформированном ложе и фиксацию к подлежащим тканям нераскроенного сетчатого протеза с противоспаечным слоем, который ориентируют по направлению к брюшной полости, отличающийся тем, что восстановления брюшины над сетчатым протезом с противоспаечным слоем не выполняют вообще, а при косых паховых грыжах обработка грыжевого мешка заключается в его рассечении и отделении от подлежащих тканей продольно от «шейки» на всем протяжении вне зоны расположения семявыносящего протока.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сетчатый протез с противоспаечным слоем дополнительно фиксируют 2-3 клипсами при помощи клипатора к брюшине, подтягивая ее, в зоне расположения подвздошных сосудов, семявыносящего протока, яичковых артерии и вены.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что сетчатый протез с противоспаечным слоем дополнительно фиксируют при помощи фибринового клея к брюшине в зоне расположения подвздошных сосудов, семявыносящего протока, яичковых артерии и вены.