

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成18年9月14日(2006.9.14)

【公開番号】特開2004-143151(P2004-143151A)

【公開日】平成16年5月20日(2004.5.20)

【年通号数】公開・登録公報2004-019

【出願番号】特願2003-315524(P2003-315524)

【国際特許分類】

A 01N 25/34 (2006.01)

A 01N 25/22 (2006.01)

A 01N 53/04 (2006.01)

A 01N 53/06 (2006.01)

【F I】

A 01N 25/34 B

A 01N 25/22

A 01N 53/00 504 A

A 01N 53/00 506 Z

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月20日(2006.6.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

有効成分として5-プロパルギル-2-フリルメチル(+)-シス、トランス-クリサンテマートを、0.1~1.0重量%含有することを特徴とするハ工取り線香。

【請求項2】

有効成分とともに、沸点が250℃以上のジーターシャリーブチルフェノール系安定剤の1種又は2種以上を、前記有効成分に対して0.1~2.0倍量配合したことを特徴とする請求項1に記載のハ工取り線香。

【請求項3】

共力剤として、MGK-5026を含有することを特徴とする請求項1又は2に記載のハ工取り線香。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の詳細な説明】

【発明の名称】ハ工取り線香

【技術分野】

【0001】

本発明は、ハ工取り線香の改良に関するものである。

【背景技術】

【0002】

蚊取線香は、蚊の成虫駆除用殺虫剤として100年以上も前から親しまれているもので、

その有効成分としては、その加熱蒸散性と熱安定性ゆえに、(±)-2-アリル-3-メチル-シクロペント-2-エン-1-オン-4-イル(+) -シス、トランス-クリサンテマート(以降、ピナミンフォルテと称す)や、その立体異性体、例えばエスバイオスリンやエスピオールなどの菊酸エステル化合物が広く使用されている。一方、ハエについては、都市部では発生が減っているが、漁村、魚介類加工場、ゴミ処理場や畜舎、鶏舎などの周辺では従来以上に悩まされる機会が多くなっている。ハエの発生源対策用として乳剤、油剤、粉剤などの殺虫剤が使用されるほか、一般家庭で成虫駆除用に空間エアゾールが汎用されているが一過性で効果の持続性に乏しいという欠点がある。そこで、ハエ取り線香、すなわち空間処理剤であって、かつ効果が数時間持続し、更に拡散性がよく開放的な場面でも有効な線香タイプの開発が望まれている。

蚊取線香は、マッチ一本で空間処理を時間的にも保持し、燃え尽きるまで効力は一定なので非常に合理的な殺虫形態である。蚊取線香の有効成分は燃焼部から数mm離れた200~250付近の部位から揮散し、この温度は電気蚊取の発熱体温度(120~170)と比べると幾分高い。従来のピナミンフォルテ含有線香では安定剤を添加しなくても、有効成分の揮散率が60~80%に達することが知られているが、ハエに対する効力は弱く、線香中の有効成分濃度をアップしてもハエ取り線香への適用は困難であった。

【0003】

本発明者らは、有効成分として市販ピレスロイドのなかで最も蒸気圧の高いエムペントリンを選択し、これを含有するハエ取り線香(特許第3001169号公報)を既に開発したが、コスト的に不利なうえ、揮散性が高すぎて製造時乾燥工程でのロスが免れなかつた。従って、ハエ取り線香に最適な有効成分の選定は重要な課題であり、例えば、特開平10-203905号公報には、2-アリル-3-メチル-シクロペント-2-エン-1-オン-4-イル2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシレートを有効成分とするハエ取り線香が開示されているが、必ずしも満足のいくものではなかつた。

【特許文献1】特許第3001169号公報

【特許文献2】特開平10-203905号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

本発明は、線香形態で、ハエはもちろん蚊に対しても従来のピナミンフォルテ線香より高い殺虫効果を奏する有効成分を選択し、これを含有する有用なハエ取り線香を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0005】

上記課題を解決するため、本発明者らは、5-プロパルギル-2-フリルメチル(+) -シス、トランス-クリサンテマート[以降、d-フラメトリンと称す]のハエに対する殺虫効力と、その蒸気圧が前記エムペントリンとピナミンフォルテの間に位置することに着目し、ハエ取り線香への適用を試みた。而して、d-フラメトリンを含有するハエ取り線香は、高い殺蠅効力を示し、コスト的に有利になるだけでなく、化合物の有する適度な揮散性が製造時のロスを生ぜず、しかも線香使用時において高い拡散性を奏することを発見した。

更に、本発明者らは、d-フラメトリンの揮散性能の向上を目的として種々の安定剤を検討したところ、沸点が250以上の中-ターシャリーブチル-フェノール系安定剤の1種又は2種以上を、前記有効成分に対して0.1~2.0倍量配合することによって、経時的安定性のみならず、燻煙時の安定性も著しく増強させ、揮散性能の向上に寄与しえることを見出し本発明を完成した。

【0006】

すなわち、本発明は次のような構成を採用する。

(1) 有効成分として、d-フラメトリンを、0.1~1.0重量%含有するハエ取り線香。

(2) 有効成分とともに、沸点が250以上の中・ターシャリーブチル・フェノール系安定剤の1種又は2種以上を、前記有効成分に対して0.1~2.0倍量配合したことを特徴とする(1)に記載のハ工取り線香。

(3) 共力剤として、MGK-5026を含有することを特徴とする(1)又は(2)に記載のハ工取り線香。

【発明の効果】

【0007】

本発明は、有効成分として、d-フラメトリンを選択し、好ましくは特定の安定剤を配合することにより、燻煙時の揮散率、ならびに殺虫効力にすぐれた極めて実用的なハ工取り線香を提供する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0008】

d-フラメトリンは、ピナミンフォルテに比べハ工に対して高い殺虫効力を有し、ハ工取り線香中に0.1~1.0重量%、好ましくは0.2~0.9重量%配合される。0.1重量%未満であると所望の殺虫効果が得られないし、一方1.0重量%を越えて配合しても格段の効力増強は認められない。

また、d-フラメトリンに、従来のピレスロイド、例えば、ピナミン、ピナミンフォルテ、バイオアレスリン、エスバイオスリン、エスピオール、プラレトリン、エムペントリン、あるいはトランスフルトリンなどを適宜混合してもよいことはもちろんである。

【0009】

本発明のハ工取り線香は、d-フラメトリンの選定に特徴を有するが、安定剤として沸点が250以上のジ・ターシャリーブチル・フェノール系安定剤を配合するのが好ましい。例えば、3-ターシャリーブチル-4-ヒドロキシアニソールや2-ターシャリーブチル-4-ヒドロキシアニソールのようなモノ-ターシャリーブチル・フェノール系安定剤は効果がなく、また、N,N'-ジフェニル-P-フェニレンジアミンやフェニル-α-ナフチルアミンのようなアミン系安定剤についても効果は低かった。また、沸点が250以上のものが有効な理由は、有効成分のピレスロイドが200~250付近から揮散するので、安定剤自身、この温度で揮散しないことが必要なためと考えられる。

【0010】

本発明で用いられる安定剤としては、次のようなものがあげられるがもちろんこれらのみに限定されない。

安定剤A：2,6-ジ・ターシャリーブチル-4-メチルフェノール(BHT)、

安定剤B：2,2'-メチレンビス(4-メチル-6-ターシャリーブチルフェノール)、

、
安定剤C：2,2'-メチレンビス(4-エチル-6-ターシャリーブチルフェノール)、

、
安定剤D：4,4'-ブチリデンビス(3-メチル-6-ターシャリーブチルフェノール)、

安定剤E：4,4'-チオビス(3-メチル-6-ターシャリーブチルフェノール)、

安定剤F：2-ターシャリーブチル-6-(3-ターシャリーブチル-2-ヒドロキシ-5-メチルベンジル)-4-メチルフェニルアクリレート、

安定剤G：2,4-ジ・ターシャリーブチルフェニル-3,5-ジ・ターシャリーブチル-4-ヒドロキシベンゾエート。

【0011】

なお、本発明では上記安定剤の1種又は2種以上が、d-フラメトリンに対して0.1~2.0倍量配合されるが、もちろんこれに、ホスファイト系、アミン系、有機イオウ系などの従来の種々の安定剤を混合しても構わない。

【0012】

本発明のハ工取り線香は、上記有効成分組成物に、必要ならば、ピペロニルブトキサイド、MGK-264、MGK-5026、S-421、リーセン384などの共力剤を加え

てもよい。更に、除虫菊抽出粕粉、木粉などの支燃剤、タブ粉、澱粉、デキストリン、アラビアゴム、CMCなどの糊剤、着色剤としてのマラカイトグリーンや防黴剤としてのデヒドロ酢酸や2,4-ジニトロフェノール、その他、鉱物性微粉末、ポリエチレングリコールなどを適宜加えて、常法に従い、ハ工取り線香を調製することができる。

【0013】

本発明によれば、有効成分としてd-フラメトリンを選択し、好ましくは特定の安定剤の配合効果で、ハ工はもちろん、蚊に対しても従来のピナミンフォルテ線香より高い殺虫効果を奏し、極めて有用なハ工取り線香を提供するものである。

【0014】

次に、試験例及び実施例をあげて本発明をより詳細に説明するが、本発明は、その要旨を越えない限りこれらのみに限定されるものではない。

【実施例1】

【0015】

次表に示す処方にてハ工取り線香を調製し、燻煙時の有効成分の揮散率、ハ工成虫に対する殺虫効力を調べた。なお、その他の成分については、記載成分以外に、澱粉20重量%、デヒドロ酢酸ナトリウム0.2重量%、除虫菊抽出粕粉15重量%、ならびに木粉を加えて全量を100重量%とした。なお、殺虫効力はピナミンフォルテ1.2重量%の線香を1.0としてノックダウン効果の相対効力で示した。

【0016】

【表1】

		処 方 (重量%)		有効成分 揮散率(%)	殺虫効力
		有効成分	安定剤		
本 発 明	1	d-フラメトリン 0.8	A 0.6	79	3.4
比 較 例	1	化合物(A) エムペントリン 1.2	— A 0.4	67 74	0.7 2.2
	2	対照化合物P*	A 0.5	75	2.3
	3	ピナミンフォルテ 1.2	—	67	1.0
	4	〃 1.2	A 0.4	69	1.0
	5	〃 2.4	A 0.4	68	1.1
	6				

* 特開平10-203905号公報開示の2-アリル-3-メチル-シクロペント-2-エン-1-オン-4-イル 2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシレート

【0017】

試験の結果、d-フラメトリンを含有するハ工取り線香、好ましくはこれにジ-ターシャリーブチル-フェノール系安定剤を前記化合物に対して0.1倍量以上配合することによって、燻煙時の有効成分の揮散率が向上し、ピナミンフォルテ線香(対照線香)に比べて高い殺虫効力を示すことが認められた。

これに対し、一般にハ工駆除用の殺虫剤は、蚊駆除用の殺虫剤に比べて高濃度の薬量を要する。例えば、比較例2や比較例3のように、エムペントリンや対照化合物Pは、ハ工取り線香の有効成分として有用ではあるが、高濃度が必要で必ずしも満足のいくものではない。また、ピナミンフォルテ含有ハ工取り線香については、比較例4~6で示すように、薬量を更にアップしてもハ工に対する殺虫効力はほとんど増強せず、しかも安定剤配合の効果がほとんどないのに対し、本発明のハ工取り線香は、特定の安定剤を配合することに

よって一層殺虫活性の優れた線香を提供し、その実用性は極めて高い。

【実施例 2】

【0018】

d - フラメトリン 0 . 8 部、安定剤 A (2 , 6 - ジ - ターシャリーブチル - 4 - メチルフェノール) 0 . 6 部を用い、ハエ取り線香を得た。近くに養豚場がありハエの侵入の多い家屋で使用したところ、ハエの侵入が見られなくなった。

【産業上の利用可能性】

【0019】

本発明のハエ取り線香は、燻煙時の揮散率、ならびに殺虫効力にすぐれ、蚊取り線香としても使用でき極めて実用的なので、殺虫剤製造産業の発展に寄与するものである。