

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges

Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum

19. Oktober 2017 (19.10.2017)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2017/178544 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

A61K 9/00 (2006.01) *A61K 31/728* (2006.01)

A61K 47/36 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2017/058825

(22) Internationales Anmeldedatum:

12. April 2017 (12.04.2017)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

16165546.9 15. April 2016 (15.04.2016) EP

(71) Anmelder: **DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH** [DE/DE]; Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin (DE).

(72) Erfinder: **BELLMANN, Günther**; Semmelländerweg 31B, 13593 Berlin (DE). **KRÖHNE, Lutz**; Buchholzer Str. 11, 13156 Berlin (DE).

(74) Anwalt: **MÜLLER-DYCK, Martina**; Maiwald Patentanwalts GmbH, Elisenhof, Elisenstraße 3, 80335 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)

(54) Title: STORAGE-STABLE OPHTHALMIC COMPOSITION

(54) Bezeichnung : LAGERUNGSSTABILE, OPHTHALMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

(57) Abstract: The invention relates to a storage-stable multiphase ophthalmic composition that can be dispensed in drops, containing at least one liquid aqueous phase and at least one liquid hydrophobic phase, characterised in that this is both emulsifier free and buffer free, and contains hyaluronic acid and/or hyaluronate.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung, enthaltend mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase, dadurch gekennzeichnet, dass diese sowohl emulgatorfrei als auch pufferfrei ist und Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat enthält.



WO 2017/178544 A1

Lagerungsstabile, ophthalmische Zusammensetzung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine tropfbare, lagerungsstabile, ophthalmische
5 Zusammensetzung sowie deren Herstellung und Verwendung.

Es ist allgemein bekannt, dass die Augen beispielsweise durch intensive
Bildschirmarbeit, das Tragen von Kontaktlinsen oder durch trockene Raumluft
beispielsweise durch Klimaanlage häufig brennen, jucken oder tränen. Hierfür ist
10 oft eine Funktionsstörung des Tränenfilms die Ursache, ausgelöst durch zu hohe
Verdunstung oder zu geringe Tränenproduktion. Aber auch durch hormonelle
Umstellungen im Alter, durch Einnahme von Medikamenten oder durch innere
Erkrankungen wie dem Sjögren-Syndrom, Rheuma oder Diabetes können
Benetzungsstörungen des Auges begünstigt werden.

15 Es ist im Stand der Technik bekannt, bei gereizten oder entzündeten Augen,
insbesondere bei „trockenem Auge“, *Keratokonjunktivitis sicca*, wässrige Präparate
zur Behandlung der Beschwerden einzusetzen. Diese Präparate liegen üblicherweise
in Form von Flüssigkeiten, Gelen, oder Cremes vor.

20 Nachteilig ist, dass Lösungen vielfach Inhaltsstoffe zugesetzt sind, die Allergien
auslösen, zu Irritation führen oder Unverträglichkeiten gegenüber den Inhaltsstoffen
erzeugen können. Auch ist von wässrigen Lösungen bekannt, dass diese häufig
Jucken, Brennen oder andere unangenehme Nebenwirkungen beim Kontakt mit dem
25 Auge erzeugen können. Weiterhin haben insbesondere Präparate in Form von Gelen,
Cremes oder Salben den Nachteil, dass das Auftragen von den Patienten, die bereits
an einer schmerzhaften Reizung des Auges leiden, als zusätzlich unangenehm
empfundene wird. Hinzu kommt, dass die Verteilung des Präparates im oder am Auge
häufig durch Reiben unterstützt werden muss, ein Vorgang, der ebenfalls zu einem
30 zusätzlichen Schmerzempfinden bei dem Patienten führt.

Es sind auch zweiphasige Emulsionen im Stand der Technik bekannt. Deren
Stabilität ist unter anderem jedoch von ihrer Viskosität abhängig. So werden

- 2 -

Emulsionen beispielweise instabil, wenn eine in einer hydrophilen Phase feindispersierte hydrophobe Phase aggregiert. Dieser Vorgang schränkt die Stabilität bei einer Lagerung der Emulsion ein und läuft umso langsamer ab, je viskoser die kontinuierliche Phase der Emulsion ist. Um eine ausreichende Stabilität von

- 5 Emulsionen erreichen zu können, werden üblicherweise Emulgatoren eingesetzt. Emulgatoren können jedoch ebenfalls allergische oder auf Überempfindlichkeit beruhende Reaktionen hervorrufen.

- Ein emulgatorfreies Präparat ist beispielsweise in EP 1913934 A1 offenbart. Dieses
10 Präparat hat jedoch den Nachteil, dass das Präparat eine hohe Viskosität aufweist, so dass die Applikation des Präparates für den Patienten unangenehm sein kann und eine Unterstützung der Verteilung des Präparates beispielsweise durch Reiben im Auge zusätzliche Schmerzen auslösen kann. Weiterhin ist die Entnahme von höherviskosen Präparaten aus Ophtiolen oder Ein-Dosis-Ophtiolen schwierig,
15 insbesondere für ältere Patienten oder Patienten mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten.

- WO 2007/012625 A1 beschreibt ein steriles, tropfbares, mehrphasiges, emulgatorfreies, ophthalmisches Präparat mit einer Viskosität im Bereich von größer
20 oder gleich 200 mPa·s und weniger als 2000 mPa·s. Allerdings werden bei dieser Formulierung Phosphatsalze eingesetzt, die in seltenen Fällen bei Patienten mit signifikanter Schädigung der Hornhautoberfläche mit dem im Hornhautstroma vorhandenen Kalzium reagieren und zur Ausfällung von Kalziumphosphat auf der Hornhaut führen können (siehe BfArM & PEI Bulletin zur Arzneimittelsicherheit
25 2013, 1, 7-12).

Lagerungsstabile, mehrphasige ophthalmische Zusammensetzungen werden auch in WO 2013/122801 A1 beschrieben. Allerdings können diese Zusammensetzungen Emulgatoren, Puffer oder auch Phosphatsalze enthalten.

- 3 -

Es besteht somit weiterhin ein Bedarf im Stand der Technik an lagerungsstabilen ophthalmischen Zusammensetzungen, die sehr gut verträglich sind und die bekannten Nachteile vermeiden.

- 5 Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine ophthalmische Zusammensetzung bereitzustellen, die lagerungsstabil und sehr gut verträglich ist. Es ist wünschenswert, dass die Zusammensetzung tropfbar ist und eine lipophile Komponente enthält. Des Weiteren ist es wünschenswert, dass die Zusammensetzung auch bei einer geringen Viskosität ohne Zusatz von Emulgatoren oder
- 10 Puffersubstanzen lagerungsstabil ist.

- Es ist weiterhin eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine ophthalmische Zusammensetzung zur Verwendung als Arzneimittel bereitzustellen. Es ist wünschenswert, dass sich diese Zusammensetzung zur Behandlung von Krankheiten
- 15 und Fehlfunktionen des Auges oder der das Auge umgebenden oder damit zusammenhängenden Organe und Gewebe eignet, insbesondere zur Behandlung des trockenen Auges.

- Die zuvor genannten und weitere Aufgaben werden gemäß den in den unabhängigen
- 20 Ansprüchen definierten Gegenständen gelöst.

- Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung bereitgestellt, enthaltend mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase,
- 25 dadurch gekennzeichnet, dass
- die Zusammensetzung emulgatorfrei ist,
 - die Zusammensetzung pufferfrei ist, und
 - die Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat enthält.

- 4 -

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung einer tropfbaren, lagerungsstabilen, mehrphasigen, ophthalmischen Zusammensetzung gemäß der vorliegenden Erfindung bereitgestellt, dadurch gekennzeichnet, dass eine flüssige hydrophobe Phase homogen in einer

5 kontinuierlichen flüssigen wässrigen Phase dispergiert wird, wobei die flüssige wässrige Phase Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat umfasst.

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung gemäß der

10 vorliegenden Erfindung, zur Verwendung als Arzneimittel bereitgestellt.

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung gemäß der vorliegenden Erfindung, zur Verwendung bei der Behandlung von Krankheiten und

15 Fehlfunktionen des Auges oder der das Auge umgebenden oder damit zusammenhängenden Organe und Gewebe bereitgestellt, bevorzugt zur Verwendung bei der Behandlung des trockenen Auges.

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Behältnis

20 enthaltend eine Zusammensetzung gemäß der vorliegenden Erfindung bereitgestellt, wobei das Behältnis ein Einmaldosen-Behältnis oder ein Mehrdosen-Behältnis ist, bevorzugt eine Ophtiole, eine Ein-Dosis-Ophtiole, oder ein Applikationssystem, bevorzugter ein pumpenbasiertes Applikationssystem oder ein Tip-Seal-

Applikationssystem.

25

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die Verwendung von Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat zur Stabilisierung einer mehrphasigen, emulgatorfreien Zusammensetzung bereitgestellt, umfassend mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase.

Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind in den entsprechenden Unteransprüchen beschrieben.

- 5 Gemäß einer Ausführungsform weist die Zusammensetzung eine Viskosität von weniger als 350 mPa·s bei 20°C auf, bevorzugt weniger als 250 mPa·s bei 20°C, bevorzugter weniger als 200 mPa·s bei 20°C, noch bevorzugter weniger als 150 mPa·s bei 20°C, und am meisten bevorzugt weniger als 100 mPa·s bei 20°C. Gemäß einer weiteren Ausführungsform enthält die Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat in einer Menge von mindestens 0,001 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt in einer Menge von mindestens 0,01 Gew.-%, bevorzugter in einer Menge von mindestens 0,1 Gew.-%, noch bevorzugter in einer Menge von mindestens 0,15 Gew.-%, und am meisten bevorzugt in einer Menge von mindestens 0,2 Gew.-%.
- 10 Gemäß einer Ausführungsform weist die Hyaluronsäure und/oder das Hyaluronat ein Molekulargewicht M_w von 50 000 bis 10 000 000 g/mol auf, bevorzugt von 100 000 bis 5 000 000 g/mol, und am meisten bevorzugt von 250 000 bis 1 000 000 g/mol. Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist das Hyaluronat ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Natrium-Hyaluronat, Kalium-Hyaluronat, Zink-Hyaluronat und Mischungen davon, bevorzugt ist das Hyaluronat Natrium-Hyaluronat. Gemäß einer weiteren Ausführungsform enthält die Zusammensetzung die flüssige wässrige Phase als kontinuierliche Phase und die flüssige hydrophobe Phase als darin dispergierte Tröpfchen.
- 15 Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung mindestens eine polymere, gelbildende Komponente, bevorzugt mindestens eine Polyacrylsäure und/oder mindestens ein polymeres Acrylsäurederivat, und am meisten bevorzugt mindestens ein Carbomer. Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst die flüssige hydrophobe Phase ein ophthalmisch verträgliches Öl, bevorzugt ein
- 20 Triglycerid, und am meisten bevorzugt ein mittelkettiges Triglycerid. Gemäß einer
- 25
- 30

- 6 -

- weiteren Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung ein Mittel zur Einstellung der Isotonizität, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Dextrose, Glycerin, Propylenglycol, Sorbitol, Mannitol, Harnstoff, Polyethylenglycol, Borsäure, Magnesiumsulfat, Zinksulfat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid,
- 5 Calciumchlorid, Natriumsulfat, Natriumhydrogenphosphat, Trinatriumcitrat, Trinatriumphosphat, und Mischungen davon, bevorzugter ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Dextrose, Glycerin, Propylenglycol, Sorbitol, Mannitol, Harnstoff, Polyethylenglycol, und am meisten bevorzugt Glycerin.
- 10 Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, die folgenden Stoffe:
- 0,15 bis 0,3 Gew.-% Natrium-Hyaluronat,
0,15 bis 0,25 Gew.-% mittelkettige Triglyceride,
15 0,05 bis 0,1 Gew.-% Carbomer,
1,5 bis 7 Gew.-% Mittel zur Einstellung der Isotonizität, bevorzugt Glycerin, Natriumhydroxid zur pH Einstellung, und
q.s. ad 100 Gew.-% Wasser.
- 20 Gemäß einer Ausführungsform liegt die Zusammensetzung als Augenspray, Augenbad, Augenspüllösung oder Augentropfen vor, bevorzugt als Augenspray oder Augentropfen.
- Nachfolgend werden in der vorliegenden Anmeldung verwendete Begriffe näher
25 erläutert:

Im Sinne der vorliegenden Erfindung bedeutet der Begriff „tropfbar“, dass die ophthalmische Zusammensetzung fähig ist Tropfen zu bilden, und sich daher in Form von Tropfen applizieren lässt. Die Tropfengröße ist abhängig von dem

Behältnis und insbesondere dem Tropfer, aus dem die Zusammensetzung appliziert wird. Zum Beispiel kann die Tropfengröße in einem Bereich von 5 bis 70 µl liegen.

Der Begriff „lagerungsstabil“ bedeutet im Rahmen der vorliegenden Erfindung, dass
5 keine sichtbare Phasenseparation auftritt und die Zusammensetzung kaum oder nur geringfügige Veränderungen im Hinblick auf pH-Wert, Osmolalität, Viskosität und Aussehen zeigt, wenn sie über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten bei einer Temperatur von 2 bis 8°C gelagert wird. Gemäß einer Ausführungsform ist eine Zusammensetzung lagerungsstabil, wenn ein Tropfen, bevorzugt 50 µl, der
10 Zusammensetzung, nachdem sie über einen Zeitraum von 12 Monaten bei einer Temperatur von 2 bis 8°C gelagert wurde, maximal 10 Öltropfen (lipophile Phase) mit einem Tropfendurchmesser von mehr als 150 µm und maximal 15 Öltropfen (lipophile Phase) mit einem Durchmesser von mehr als 100 µm aufweisen. Der Tropfendurchmesser der lipophilen Phase kann mikroskopisch ermittelt werden.

15 „Emulgatorfrei“ bedeutet im Sinne dieser Erfindung, dass die Zusammensetzung ausschließlich Inhaltsstoffe aufweist, die keine Emulgatoren im Sinne der vorliegenden Erfindung sind. „Emulgatoren“ im Sinne der vorliegenden Erfindung sind grenzflächenaktive Substanzen, die in der Lage sind, die Grenzflächenspannung
20 zwischen Öl und Wasserphase zu vermindern, indem sie sich bevorzugt an der Grenzfläche zwischen diesen beiden anlagern. Dies wird durch den amphiphilen Molekülaufbau der Emulgatoren ermöglicht, die wenigstens eine polare (hydrophile) Gruppe und wenigstens eine unpolare (lipophile) Gruppe besitzen. Damit sind sie sowohl in der hydrophilen als auch in der lipophilen Phase löslich. Der in der
25 entsprechenden Phase besser lösliche Teil ragt in diese hinein und senkt dadurch die Grenzflächenspannung zwischen beiden Phasen.

Insbesondere kann die Zusammensetzung gemäß der vorliegenden Erfindung Stoffe ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus einem ophthalmisch verträglichem Öl, eine
30 polymere, gelbildende Komponente, ein Mittel zur Einstellung der Isotonizität, einen

ophthalmischen Wirkstoff, Säuren oder Basen zur Einstellung des pH-Wertes, Wasser und Mischungen davon aufweisen, wobei es sich bei diesen Stoffen im Sinne der vorliegenden Erfindung nicht um Emulgatoren handelt.

- 5 „Pufferfrei“ bedeutet im Sinne dieser Erfindung, dass die Zusammensetzung ausschließlich Inhaltsstoffe aufweist, die keine Puffer im Sinne der vorliegenden Erfindung sind. Ein „Puffer“ im Sinne der vorliegenden Erfindung kann ein Puffersystem sein, z.B. eine Mischung aus einer Säure und ihrer konjugierten Base, oder eine Puffersubstanz. Beispiele für Puffer im Sinne der vorliegenden Erfindung
 10 sind Phosphat-Puffer, Phosphat-Citrat-Puffer, Citrat-Puffer, Tartrat-Puffer, Borat-Puffer, Malat-Puffer, Succinat-Puffer, Acetat-Puffer, Acetat-Borat-Puffer, MES (2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure), HEPES (2-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl)-ethansulfonsäure), BES (N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure), MOPS (3-(N-Morpholino)-propansulfonsäure), TRIS (Tris(hydroxymethyl)-aminomethan), oder BIS-TRIS (Bis(2-hydroxyethyl)amino-
 15 tris(hydroxymethyl)methan).

Gemäß einer Ausführungsform ist die Zusammensetzung pufferfrei, wenn die Pufferkapazität P_i der Zusammensetzung weniger als 0,005 beträgt, und bevorzugt
 20 weniger als 0,0005 beträgt. Zur Bestimmung der Pufferkapazität P_i wird zu 10 ml der zu prüfenden Zusammensetzung so viel 0,1 N Natronlauge gegeben, bis eine pH-Verschiebung von 0,3 Einheiten eintritt. Die Pufferkapazität P_i lässt sich dann wie folgt bestimmen:

$$25 \quad P_i = \frac{\text{ml Lauge} \cdot 0,1}{\text{pH-Verschiebung} \cdot 10}$$

(Vgl. Dolder, Skinner, Ophthalmika, 4. Auflage, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Seite 606, Kapitel 4.1.2.4).

Unter dem Begriff „Viskosität“ wird vorliegend, sofern nicht anders angegeben, die dynamische Viskosität verstanden, die auch als absolute Viskosität bezeichnet wird. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die Viskosität nach dem Kegel-Platte-

5 Typs DV-III+ (Brookfield Engineering Laboratories Vertriebs GmbH, Deutschland) mit einer CP51 Spindel bei 5 U/min und 20°C bestimmt. Die Viskosität bezieht sich, sofern nicht anders angegeben, auf die Viskosität der Zusammensetzung vor der Applikation im Auge.

10 Sofern ein unbestimmter oder bestimmter Artikel im Zusammenhange mit einem Substantiv im Singular verwendet wird, wie z.B. „ein/eine/einer“ oder „die/der/das“, schließt dies auch immer den Plural dieses Substantivs mit ein, es sei denn es ist etwas anderes angegeben.

15 Wenn der Begriff „umfassend“ in der vorliegenden Beschreibung oder Ansprüchen, verwendet wird, schließt dies nicht andere Elemente aus. Im Sinne der vorliegenden Erfindung, wird der Begriff „bestehend aus“ als eine bevorzugte Ausführungsform des Begriffs „umfassend“ verstanden. Wird nachstehend eine Gruppe von Elementen definiert, die mindestens eine bestimmte Zahl von Ausführungsformen umfasst, ist
20 dies so zu verstehen, dass die Gruppe vorzugsweise nur aus diesen Elementen besteht.

Begriffe wie „erhältlich“ oder „definierbar“ und „erhalten“ oder „definiert“ werden synonym verwendet. Dies bedeutet zum Beispiel, sofern sich aus dem

25 Zusammenhang nichts anderes ergibt, dass der Begriff „erhalten“ nicht so zu verstehen ist, dass beispielsweise eine Ausführungsform z.B. durch eine bestimmte Schrittreihenfolge erhalten werden muss, die dem Begriff „erhalten“ folgt. Nichtsdestotrotz beinhalten die Begriffe „erhalten“ oder „definiert“ diese eingeschränkte Betrachtung als bevorzugte Ausführungsform.

Wann auch immer die Begriffe „einschließend“ oder „aufweisend“ verwendet werden, sind diese als äquivalent zu dem Begriff „umfassend“ anzusehen.

5 Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung bereitgestellt, die mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase beinhaltet. Die Zusammensetzung ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie sowohl emulgatorfrei als auch pufferfrei ist und Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat enthält.

10 Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung ausführlich beschrieben. Diese Ausführungsformen und Angaben gelten entsprechend für das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäßen Verwendungen.

15

Die flüssige wässrige und die flüssige hydrophobe Phase

Die ophthalmische Zusammensetzung der vorliegenden Erfindung ist mehrphasig und enthält mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige
20 hydrophobe Phase. Die hydrophobe Phase kann auch als lipophile Phase bezeichnet werden.

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die flüssige wässrige Phase Wasser, und bevorzugt Wasser für Injektionszwecke. Gemäß einer anderen Ausführungsform
25 bildet die flüssige wässrige Phase den natürlichen Tränenfilm nach. Hierdurch kann die flüssige wässrige Phase die Hornhaut befeuchten und eine reinigende und schützende Funktion ausüben. Gemäß einer Ausführungsform weist die flüssige wässrige Phase einen pH-Wert von 7,1 bis 7,8 auf und/oder eine Osmolalität von 260 bis 320 mosmol/kg.

30

Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst die flüssige hydrophobe Phase ein ophthalmisch verträgliches Öl. Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das ophthalmisch verträgliche Öl ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fettsäureestern, Phthalsäureestern, mittelkettigen

- 5 Triglyceriden, langkettigen Triglyceriden, Erdnussöl, Olivenöl, Kokosnussöl, Sesamöl, Baumwollsaamenöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Kiwisamenöl, Leinöl, Walnussöl, Rapsöl, Chiaöl, Perillaöl, Hanföl, Palmöl, Mandelöl, Fischöl, Algenöl und Mischungen davon.
- 10 Vorzugsweise ist das Öl ein biologisches Öl, d.h. ein Öl pflanzlichen oder tierischen Ursprungs. Gemäß einer Ausführungsform umfasst die hydrophobe Phase ein ophthalmisch verträgliches Pflanzenöl, vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Erdnussöl, Olivenöl, Kokosnussöl, Sesamöl, Baumwollsaamenöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Kiwisamenöl, Leinöl, Walnussöl, Rapsöl, Chiaöl,
- 15 Perillaöl, Hanföl, Palmöl, Mandelöl, und Mischungen davon.

“Mittelkettige Triglyceride” im Sinne der vorliegenden Erfindung weisen Fettsäuren mit einer Kettenlänge von 6 bis 12 C-Atomen auf. “Langkettige Triglyceride” im Sinne der vorliegenden Erfindung weisen Fettsäuren mit einer Kettenlänge von 14

20 bis 18 C-Atomen auf.

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die flüssige hydrophobe Phase ein Triglycerid. Verwendbare Triglyceride sind erhältlich in Form von synthetischen, halbsynthetischen oder natürlichen Ölen, wie Olivenöl, Palmöl, Mandelöl,

- 25 Kokosnussöl oder deren Mischungen. Bevorzugt verwendbare Triglyceride sind erhältlich aus Kokosnussöl. Solche mittelkettigen Triglyceride werden beispielsweise aus dem Öl des Endosperms von *Cocos nucifera* L., vorzugsweise des festen getrockneten Teils, oder *Elasis guineensis* Jacq. hergestellt. Weiterhin bevorzugt verwendbare Triglyceride, vorzugsweise mittelkettige Triglyceride, sind Neutralöle,
- 30 beispielsweise erhältlich unter den Handelsnamen Myritol[®] 312, Myritol[®] 318, oder

Myritol[®] 331, kommerziell erhältlich von der Firma Cognis Ltd., Japan.

Insbesondere sind auch mittelkettige Triglyceride der Art bevorzugt, wie sie im Europäischen Arzneibuch, European Pharmacopoeia 5.0, 01/2010:0868, S. 3471, *Triglycerida saturata media*, beschrieben werden. Bevorzugt enthält der

- 5 Säurebestandteil ein Gemisch mit einem Anteil von wenigstens 90 Gew.-%, bevorzugt wenigstens 94 Gew.-%, am meisten bevorzugt wenigstens 95 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Fettsäuren n-Octansäure und n-Decansäure. Andere geeignete, mittelkettige Triglyceride sind unter den Handelsnamen Acomed[®], Captex[®], Neobee[®]M5F, Miglyol[®]810, Miglyol[®]812, Mazol[®], oder
- 10 Sefsol[®]860 kommerziell erhältlich. Die mittelkettigen Triglyceride können vorteilhafter Weise die Verdunstung der wässrigen Komponente verhindern und einem zu raschen Trocknen des Tränenfilms oder der ophthalmischen Zusammensetzung vorbeugen.
- 15 Gemäß einer Ausführungsform ist das Triglycerid ein mittelkettiges Triglycerid. Das mittelkettige Triglycerid kann beispielsweise aus, bezogen auf das Gesamtgewicht der Fettsäuren, wenigstens 80 Gew.-%, bevorzugt wenigstens 90 Gew.-%, und bevorzugt wenigstens 95 Gew.-%, C₈-C₁₂-Fettsäuren ausgebildet sein, bevorzugt C₈-C₁₀-Fettsäuren. Vorzugsweise kann das mittelkettige Triglyceride ein gesättigtes
- 20 mittelkettiges Triglycerids sein. Gemäß einer Ausführungsform ist das gesättigte mittelkettige Triglycerid ausgebildet aus wenigstens 80 Gew.-%, bevorzugt wenigstens 90 Gew.-%, und bevorzugt wenigstens 95 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Fettsäuren, gesättigten C₈- und C₁₀-Fettsäuren.
- 25 Besonders bevorzugt sind Capryl-Caprinsäure-Triglyceride, d.h. eine Mischung ausgebildet aus veresterten gesättigten C₈- und C₁₀-Fettsäuren. Diese Mischung hat den Vorteil, dass die gesättigten Fettsäuren eine verbesserte Stabilität des Lipidfilms und damit eine überraschend verbesserte längere Verweildauer der Zusammensetzung im Auge zur Verfügung stellen können.

Gemäß einer Ausführungsform besteht die flüssige hydrophobe Phase aus einem ophthalmisch verträglichen Öl, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fettsäureestern, Phthalsäureestern, mittelkettigen Triglyceriden, langkettigen Triglyceriden, Erdnussöl, Olivenöl, Kokosnussöl, Sesamöl, Baumwollsaamenöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Kiwisamenöl, Leinöl, Walnussöl, Rapsöl, Chaiöl, Perillaöl, Hanföl, Palmöl, Mandelöl, Fischöl, Algenöl und Mischungen davon, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Fettsäureestern, Phthalsäureestern, mittelkettigen Triglyceriden, langkettigen Triglyceriden, Erdnussöl, Olivenöl, Kokosnussöl, Sesamöl, Baumwollsaamenöl, Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Kiwisamenöl, Leinöl, Walnussöl, Rapsöl, Chaiöl, Perillaöl, Hanföl, Palmöl, Mandelöl, und Mischungen davon, und am meisten bevorzugt ist das ophthalmisch verträgliche Öl ein mittelkettiges Triglycerid. Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst die flüssige hydrophobe Phase ein ophthalmisch verträgliches Öl, bevorzugt ein Triglycerid, und am meisten bevorzugt ein mittelkettiges Triglycerid.

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung das ophthalmisch verträgliche Öl in einer Menge von 0,05 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,1 bis 5 Gew.-%, bevorzugt von 0,15 bis 2 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 0,2 bis 1,5 Gew.-%. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung das ophthalmisch verträgliche Öl in einer Menge von weniger als 0,5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung.

Ohne an eine bestimmte Theorie gebunden zu sein, vermuten die Erfinder, dass durch Zugabe eines ophthalmisch verträglichen Öls, die Integrität der Lipidschicht des Tränenfilms verbessert bzw. wiederhergestellt werden kann. Durch diese Stabilisierung des Tränenfilms kann die Verdunstung der Tränenflüssigkeit des Auges auf ein Minimum reduziert werden. Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben herausgefunden, dass in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung bereits

eine geringe Menge an ophthalmisch verträglichem Öl nach dem Einbringen in das Auge eine ausreichende Verdunstungsbarriere bereitstellen kann. Hierdurch kann eine Sehbeeinträchtigung nach der Applikation der Zusammensetzung vermieden oder reduziert werden.

5

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung das ophthalmisch verträgliche Öl in einer Menge von 0,05 bis 0,45 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,1 bis 0,4 Gew.-%, bevorzugter von 0,15 bis 0,35 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 0,2 bis

10 0,3 Gew.-%. Beispielsweise kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung das ophthalmisch verträgliche Öl in einer Menge von 0,15 bis 0,25 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, umfassen.

Gemäß einer Ausführungsform enthält die mehrphasige, ophthalmische

15 Zusammensetzung die flüssige wässrige Phase als kontinuierliche Phase, und die flüssige hydrophobe Phase als darin dispergierte Tröpfchen. Die Tröpfchen können einen Durchmesser von 1 bis 30 µm aufweisen, vorzugsweise von 5 bis 15 µm.

Das Präparat ist vorzugsweise wenigstens zweiphasig ausgebildet, und kann in

20 bevorzugten Ausführungsformen auch dreiphasig ausgebildet sein. Die Zusammensetzung kann zum Beispiel eine zusätzliche wässrige Phase mit einer polymeren, gelbildenden Komponente enthalten, wie sie weiter unten beschrieben ist.

25 Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann einen hohen Anteil an flüssiger wässriger Phase aufweisen. Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung die flüssige wässrige Phase in einer Menge von 60 bis 99,95 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt 80 bis 99,9 Gew.-%, bevorzugter von 90 bis 99,85 Gew.-%, und am meisten bevorzugt 30 von 92 bis 99,8 Gew.-%. Gemäß einer anderen Ausführungsform umfasst

Zusammensetzung die flüssige hydrophobe Phase in einer Menge von 0,05 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,1 bis 5 Gew.-%, bevorzugter von 0,15 bis 2 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 0,2 bis 1,5 Gew.-%. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform besteht die
5 flüssige hydrophobe Phase vollständig aus dem ophthalmisch verträglichen Öl.

Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat

Die ophthalmische Zusammensetzung der vorliegenden Erfindung ist dadurch
10 gekennzeichnete, dass sie Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat enthält.

Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommendes hochviskoses Glycosaminoglykan bestehend aus den Glucosederivaten D-Glucuronsäure und *N*-Acetyl-D-glucosamin. Je nach Extraktionsverfahren kann das Molekulargewicht M_w der Hyaluronsäure in
15 dem Bereich von 50 000 bis 10 000 000 g/mol liegen. Die Hyaluronsäure ist ein Bestandteil der extrazellulären Matrix von Wirbeltieren und insbesondere ein natürlicher Bestandteil der menschlichen Augenflüssigkeiten. Die Hyaluronsäure kann aus tierischen oder pflanzlichen Quellen gewonnen oder synthetisch oder halbsynthetisch hergestellt werden.

20

Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, enthält die Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat in einer Menge von mindestens 0,001 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt in einer Menge von mindestens 0,01 Gew.-%, bevorzugter in einer Menge
25 von mindestens 0,1 Gew.-%, noch bevorzugter in einer Menge von mindestens 0,15 Gew.-%, und am meisten bevorzugt in einer Menge von mindestens 0,2 Gew.-%. Gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, enthält die Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat in einer Menge von 0,001 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt in
30 einer Menge von 0,01 bis 2 Gew.-%, bevorzugter in einer Menge von 0,1 bis

- 1,5 Gew.-%, noch bevorzugter in einer Menge von 0,15 bis 1 Gew.-%, und am meisten bevorzugt in einer Menge von 0,2 bis 0,8 Gew.-%. Beispielsweise kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat in einer Menge von 0,15 bis 0,3 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der
- 5 Zusammensetzung, umfassen.

Gemäß einer Ausführungsform weist die Hyaluronsäure und/oder das Hyaluronat ein Molekulargewicht M_w von 50 000 bis 10 000 000 g/mol auf, bevorzugt von 100 000 bis 5 000 000 g/mol, und am meisten bevorzugt von 250 000 bis 1 000 000 g/mol.

10

- Statt der freien Hyaluronsäure oder zusätzlich zu der freien Hyaluronsäure kann in der ophthalmischen Zusammensetzung der vorliegenden Erfindung auch ein Salz der Hyaluronsäure, d.h. ein Hyaluronat, eingesetzt werden. Gemäß einer Ausführungsform ist das Hyaluronat ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus
- 15 Natrium-Hyaluronat, Kalium-Hyaluronat, Zink-Hyaluronat und Mischungen davon. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist das Hyaluronat Natrium-Hyaluronat.

- Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben überraschenderweise herausgefunden, dass der Zusatz von Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat die
- 20 Stabilität und insbesondere die Lagerungsstabilität von mehrphasigen ophthalmischen Zusammensetzungen verbessert. Ohne an eine bestimmte Theorie gebunden zu sein, vermuten die Erfinder, dass die Hyaluronsäure und/oder das Hyaluronat die in der flüssigen wässrigen Phase dispergierten Tröpfchen der flüssigen hydrophoben Phase über einen sterischen Effekt stabilisieren kann.

- 25 Des Weiteren hat sich überraschend gezeigt, dass die erfindungsgemäße Zusammensetzung auch in niedrigen Viskositätsbereichen, insbesondere bei einer Viskosität von weniger als 350 mPa·s, z.B. bei weniger als 250 mPa·s oder weniger als 200 mPa·s, über einen längeren Zeitraum stabil bleibt. Dies kann insbesondere für
- 30 die Formulierung von niedrigviskosen Emulsionen vorteilhaft sein, da diese

üblicherweise bei Lagerung rasch instabil werden und sich entmischen. Insbesondere ist von Vorteil, dass eine Zusammensetzung mit geringer Viskosität die Applizierbarkeit für den Patienten deutlich verbessert. Somit kann in vorteilhafter Weise eine tropfbare Zusammensetzung zur Verfügung gestellt werden, die sich
5 aufgrund der geringen Viskosität auf der Cornea des Auges besser verteilen kann, und das Auge weniger durch eine zusätzliche mechanische Unterstützung der Verteilung gereizt werden muss. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass eine Zusammensetzung mit geringer Viskosität bei der Applikation ein nur geringes Fremdkörpergefühl im Auge erzeugt und für den Patienten eine angenehmere
10 Verträglichkeit bereitstellt. Zudem lassen sich Zusammensetzungen mit geringerer Viskosität leichter aus Dosier-Behältnissen entnehmen und einfacher applizieren. Es besteht auch die Möglichkeit, Zusammensetzungen mit geringer Viskosität in Form von Augensprays bereitzustellen, welche für den Patienten ebenfalls leichter zu applizieren sind.

15 Ein besonderer Vorteil der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist, dass die Stabilität der ophthalmischen Zusammensetzung ohne Zusatz von Emulgatoren erzielt werden kann. Zudem kann auf die Zugabe eines Puffers verzichtet werden. Somit kann erfindungsgemäß eine emulgatorfreie und pufferfreie Zusammensetzung
20 bereitgestellt werden. Dies ermöglicht eine Verbesserung der Verträglichkeit der erfindungsgemäßen Zusammensetzung und vermeidet Reizungen oder das „Brennen“ am Auge.

Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Verwendung von
25 Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat zur Stabilisierung einer mehrphasigen, emulgatorfreien Zusammensetzung, umfassend mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase, bereitgestellt. Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird eine Verwendung von Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat zur Stabilisierung einer tropfbaren,
30 mehrphasigen, emulgatorfreien, pufferfreien Zusammensetzung, umfassend

mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase, bereitgestellt.

5 Weitere Bestandteile

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Komponenten, kann die ophthalmische Zusammensetzung der vorliegenden Erfindung weitere Bestandteile enthalten.

- 10 Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzlich mindestens eine polymere, gelbildende Komponente. Hierdurch kann beispielsweise die Viskosität der Zusammensetzung gezielt gesteuert werden. Zudem kann durch eine polymere, gelbildende Komponente die Adsorbierbarkeit der Zusammensetzung an die Muzinschicht des Tränenfilms verbessert und so die Verweildauer der
- 15 Zusammensetzung im Auge verlängert werden. Die Schmiereigenschaften und/oder das Wasserbindevermögen der Zusammensetzung können durch Anwesenheit einer polymeren, gelbildenden Komponente ebenfalls verbessert werden.

- Vorzugsweise kann die polymere, gelbildende Komponente mindestens eine
- 20 Polyacrylsäure und/oder mindestens ein polymeres Acrylsäurederivat umfassen.

- Bevorzugte Polyacrylsäuren oder polymere Acrylsäurederivate weisen beispielsweise ein Molekulargewicht M_w im Bereich von etwa 3 bis 5 Millionen g/mol auf. Besonders bevorzugt verwendbare Polyacrylsäuren oder polymere
- 25 Acrylsäurederivate sind die unter der INCI-Bezeichnung Carbomer bezeichneten quervernetzten Acrylsäurepolymere, vorzugsweise hydrophobisch modifizierten quervernetzten Acrylsäurepolymere. Bevorzugte Carbomere sind unter dem Handelsnamen Carbopol® beispielsweise bei der Firma The Lubrizol Corporation, U.S.A., erhältlich. Besonders bevorzugte Carbomere sind Acrylsäure-
- 30 Homopolymere, beispielsweise Carbopol®-Homopolymere, besonders bevorzugt

verwendbar ist Carbopol® 980 NF, weiterhin bevorzugt verwendbar ist Carbopol® 940 NF. Die Begriffe Polyacrylsäure und polymere Acrylsäure werden im Sinne dieser Anmeldung synonym verwendet. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße Zusammensetzung mindestens ein Carbomer.

5

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung die polymere, gelbildende Komponente in einer Menge von 0,01 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,02 bis 3 Gew.-%, bevorzugter von 0,04 bis 1 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 0,05 bis

10 0,08 Gew.-%. Gemäß einer anderen Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung mindestens eine Polyacrylsäure und/oder mindestens ein polymeres Acrylsäurederivat, bevorzugt mindestens ein Carbomer, in einer Menge von 0,01 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,02 bis 3 Gew.-%, bevorzugter von 0,04 bis 1 Gew.-%, und am
15 meisten bevorzugt von 0,05 bis 0,1 Gew.-%.

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung die polymere gelbildende Komponente in einer Menge, so dass die Zusammensetzung eine Viskosität von weniger als 350 mPa·s bei 20°C aufweist, bevorzugt weniger als
20 250 mPa·s bei 20°C, bevorzugter weniger als 200 mPa·s bei 20°C, noch bevorzugter weniger als 150 mPa·s bei 20°C, und am meisten bevorzugt weniger als 100 mPa·s bei 20°C.

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße Zusammensetzung
25 zusätzlich ein Mittel zur Einstellung der Isotonizität, d.h. ein Isotonisierungsmittel. Als Isotonisierungsmittel können Nichtelektrolyte und/oder Elektrolyte eingesetzt werden. Beispiele für zur Einstellung der Isotonizität geeignete Nichtelektrolyte sind Dextrose, Glycerin, Propylenglycol, Sorbitol, Mannitol, Harnstoff, Polyethylenglycol, oder Mischungen davon. Beispiele für zur Einstellung der
30 Isotonizität geeignete Elektrolyte sind Borsäure, Magnesiumsulfat, Zinksulfat,

- 20 -

Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumsulfat, Natriumhydrogenphosphat, Trinatriumcitrat, Trinatriumphosphat, oder Mischungen davon.

- 5 Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung ein Mittel zur Einstellung der Isotonizität ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Dextrose, Glycerin, Propylenglycol, Sorbitol, Mannitol, Harnstoff, Polyethylenglycol, Borsäure, Magnesiumsulfat, Zinksulfat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumsulfat, Natriumhydrogenphosphat, Trinatriumcitrat,
- 10 Trinatriumphosphat, und Mischungen davon, und bevorzugter ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Dextrose, Glycerin, Propylenglycol, Sorbitol, Mannitol, Harnstoff, Polyethylenglycol, und Mischungen davon. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist das Mittel zur Einstellung der Isotonizität Glycerin.
- 15 Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung das Mittel zur Einstellung der Isotonizität in einer Menge, die ausreicht, um die Zusammensetzung isotonisch mit natürlicher Tränenflüssigkeit bereit zu stellen. In bevorzugten Ausführungsformen umfasst die Zusammensetzung das Mittel zur Einstellung der Isotonizität in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht
- 20 der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,5 bis 9 Gew.-%, bevorzugter von 1 bis 8 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 1,5 bis 7 Gew.-%. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsformen umfasst die Zusammensetzung Glycerin als Isotonisierungsmittel in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,5 bis 9 Gew.-%, bevorzugter
- 25 von 1 bis 5 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 2 bis 3 Gew.-%. Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung das Mittel zur Einstellung der Isotonizität in einer Menge so dass die Zusammensetzung eine Osmolalität von 100 bis 500 mosmol/kg aufweist, bevorzugt von 200 bis 400 mosmol/kg, und am meisten bevorzugt von 260 bis 320 mosmol/kg.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann vorzugsweise keine Arzneistoffe oder pharmazeutisch aktiven Substanzen wie antivirale Mittel, steroidale und nicht-steroidale entzündungshemmende Verbindungen oder Corticosteroide, Antibiotika, Antimykotika, Narkotika, entzündungshemmender Agenzien oder antiallergische
5 Agenzien enthalten. „Pharmazeutisch aktive Substanzen“ im Sinne der Erfindung sind insbesondere nicht Vitamin A und Vitamin E.

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße Zusammensetzung mindestens einen ophthalmischen Wirkstoff. Beispielsweise kann die
10 erfindungsgemäße Zusammensetzung Arzneistoffe oder pharmazeutisch aktiven Substanzen wie antivirale Mittel, steroidale und nicht-steroidale entzündungshemmende Verbindungen oder Corticosteroide, Antibiotika, Antimykotika, Narkotika, entzündungshemmende Wirkstoffe, immunsuppressive Wirkstoffe und/oder antiallergische Wirkstoffe enthalten.

15
Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzlich einen immunsuppressiven Wirkstoff, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Cyclosporin A, Azathioprin, Cyclophosphamid, Tacrolimus Hydrat, Mycophenolat-Mofetil, Mycophenolsäure, Pimecrolimus, Pimecrolimus Hydrat, Sirolimus,
20 Sirolimus Hydrat und Mischungen davon. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzlich Cyclosporin A.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung zusätzlich eine Vitamin A-Komponente, bevorzugt Vitamin A-palmitat.

25
Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung mindestens einen ophthalmischen Wirkstoff, bevorzugt eine Vitamin A-Komponente, am meisten bevorzugt Vitamin A-palmitat, und/oder ein Antioxidans, am meisten bevorzugt Vitamin E. Vorzugsweise kann der Gehalt an Vitamin A-palmitat bei 1000 I.E.
30 Vitamin A-palmitat pro Gramm Zusammensetzung liegen, wobei vorteilhafter Weise

zusätzlich 20 % Stabilitätszuschlag verwendet werden. Bevorzugt verwendbares Vitamin A-palmitat weist 1 Mio. I. E. pro Gramm Vitamin A-palmitat auf und enthält vorzugsweise als Stabilisatoren butyliertes Hydroxyanisol und/oder butyliertes Hydroxytoluol. Gemäß einer Ausführungsform umfasst die

- 5 Zusammensetzung eine Vitamin A-Komponente, insbesondere Vitamin A-palmitat, in einer Menge von 0,05 bis 0,5 Gew.-%, bevorzugt von 0,08 bis 0,2 Gew.-%, und am meisten bevorzugt in einer Menge von etwa 0,1 Gew.-%, unter Berücksichtigung des Stabilitätszuschlags bei etwa 0,12 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung.

10

Besonders bevorzugt ist die Vitamin A-Komponente in Kombination mit einem Antioxidans wie Vitamin E verwendbar. Die Vitamin A-Komponente kann mit wenigstens einem Antioxidans, bevorzugt Vitamin E, besonders bevorzugt D,L- α -Tocopherol, stabilisiert werden. Zur Stabilisierung ist besonders bevorzugt ein

15 geringer Gehalt Antioxidans, bevorzugt Vitamin E, besonders bevorzugt D,L- α -Tocopherol, verwendbar, beispielsweise in einer Menge von 0,002 bis 0,01 Gew.-%, bevorzugt von 0,006 bis 0,008 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung.

- 20 Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Zusammensetzung ist, dass ein suspendierter bzw. in der flüssigen hydrophoben Phase gelöster Wirkstoff gleichmäßiger verteilt werden kann. Die Benetzbarkeit von Objekten, die auf die Cornea aufgelegt werden, wie Kontaktschalen oder Frontlinsen ophthalmischer Geräte, kann dadurch verbessert werden.

25

Der pH-Wert der erfindungsgemäßen Zusammensetzung kann mit Säuren und/oder Basen eingestellt werden. Beispielsweise kann der pH-Wert mit Borsäure und/oder Natronlauge eingestellt werden. Gemäß einer Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße Zusammensetzung eine Säure und/oder Base in einer Menge von

- 30 0,01 bis 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung,

bevorzugt von 0,02 bis 0,5 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 0,02 bis 0,05 Gew.-%.

- Gemäß einer Ausführungsform umfasst die Zusammensetzung Natronlauge zur
- 5 Einstellung des pH-Wertes. Zur Einstellung des pH-Wertes ist eine 2 %ige bis 3%ige Lösung von Natriumhydroxid in Wasser besonders geeignet. Gemäß einer Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße Zusammensetzung Natriumhydroxid in einer Menge von 0,01 bis 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,02 bis 0,5 Gew.-%, und am
- 10 meisten bevorzugt von 0,02 bis 0,05 Gew.-%.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann weiterhin ein wasserlösliches Phosphatsalz umfassen.

- 15 Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Zusammensetzung frei von Phosphatsalzen.

- Gemäß einer Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Zusammensetzung einen pH-Wert im Bereich von 6 bis 8 auf, bevorzugt im Bereich von 6,5 bis 7,5, und am
- 20 meisten bevorzugt im Bereich von 6,8 bis 7,2. Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Zusammensetzung einen pH-Wert im Bereich von 6 bis 7 auf.

- Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann weitere Komponenten enthalten,
- 25 beispielsweise Konservierungsmittel, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe enthaltend Cetrimid, Benzododeciniumchlorid, Benzalkoniumchlorid, Thiomersal, Alexidin, und Mischungen davon, und am meisten bevorzugt Cetrimid und/oder Alexidin. „Cetrimid“ ist die übliche Bezeichnung für N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid, „Benzododeciniumchlorid“ für N-Benzyl-N-dodecyl-N,N-
- 30 dimethyl-ammoniumchlorid, „Benzalkoniumchlorid“ für

Benzyl-lauryldimethylammoniumchlorid, und „Thiomersal“ für das Natriumsalz von 2-(Ethylmercurithio)-benzoesäure. Bei Alexidin handelt es sich im Sinne der vorliegenden Erfindung nicht um einen Emulgator, oder Alexidin ist in Mengen enthalten, dass der Stoff keine emulgierende Wirkung aufweist.

5

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die erfindungsgemäße Zusammensetzung ein Konservierungsmittel in einer Menge von 0,001 bis 0,05 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,005 bis 0,01 Gew.-%.

- 10 In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die erfindungsgemäße Zusammensetzung frei von Konservierungsmitteln.

Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst die tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung Hyaluronsäure

- 15 und/oder ein Hyaluronat, ein ophthalmisch verträgliches Öl, mindestens eine polymere, gelbildende Komponente, ein Mittel zur Einstellung der Isotonizität, eine Base und Wasser. Gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst die tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder ein Hyaluronat, ein mittelkettiges
- 20 Triglycerid, mindestens eine Polyacrylsäure und/oder mindestens ein polymeres Polyacrylsäurederivat, ein Mittel zur Einstellung der Isotonizität, eine Base und Wasser. Gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst die tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder ein Hyaluronat, bevorzugt ein
- 25 Hyaluronat, ein mittelkettiges Triglycerid, ein Carbomer, ein Mittel zur Einstellung der Isotonizität ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Dextrose, Glycerin, Propylenglycol, Sorbitol, Mannitol, Harnstoff, Polyethylenglycol, und Mischungen davon, eine Base, bevorzugt Natriumhydroxid, und Wasser. Gemäß einer Ausführungsform ist die erfindungsgemäße Zusammensetzung frei von
- 30 Phosphatsalzen und Konservierungsmitteln.

Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung umfasst die tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, die folgenden Stoffe:

5

Hyaluronsäure und/oder ein Hyaluronat, bevorzugt ein Hyaluronat, in einer Menge von 0,001 bis 5 Gew.-%, bevorzugt von 0,01 bis 2 Gew.-%, bevorzugter von 0,1 bis 1,5 Gew.-%, noch bevorzugter von 0,15 bis 1 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 0,2 bis 0,8 Gew.-%, ein ophthalmisch verträgliches Öl, bevorzugt ein
10 mittelkettiges Triglycerid, in einer Menge von 0,05 bis 10 Gew.-%, bevorzugt von 0,1 bis 5 Gew.-%, bevorzugter von 0,15 bis 2 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 0,2 bis 1,5 Gew.-%, mindestens eine polymere, gelbildende Komponente, bevorzugt eine Polyacrylsäure und/oder ein polymeres Polyacrylsäurederivat, bevorzugt ein Carbomer, in einer Menge von 0,01 bis 5 Gew.-%, bevorzugt von
15 0,02 bis 3 Gew.-%, bevorzugter von 0,04 bis 1 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 0,05 bis 0,1 Gew.-%, ein Mittel zur Einstellung der Isotonizität, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Dextrose, Glycerin, Propylenglycol, Sorbitol, Mannitol, Harnstoff, Polyethylenglycol, und Mischungen davon, bevorzugter Glycerin, in einer Menge von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt von 0,5 bis
20 9 Gew.-%, bevorzugter von 1 bis 8 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 1,5 bis 7 Gew.-%, eine Base, bevorzugt Natriumhydroxid, in einer Menge von 0,01 bis 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, bevorzugt von 0,02 bis 0,5 Gew.-%, und am meisten bevorzugt von 0,02 bis 0,05 Gew.-%, und Wasser.

25

Gemäß einer Ausführungsform umfasst die tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, die folgenden Stoffe:

30

0,15 bis 0,3 Gew.-% Natrium-Hyaluronat,

- 26 -

- 0,15 bis 0,25 Gew.-% mittelkettige Triglyceride,
0,05 bis 0,1 Gew.-% Carbomer,
1,5 bis 7 Gew.-% Mittel zur Einstellung der Isotonizität, bevorzugt Glycerin,
Natriumhydroxid zur pH Einstellung, bevorzugt in einer Menge von 0,02 bis
5 0,05 Gew.-%, und
q.s. ad 100 Gew.-% Wasser.

- Der Ausdruck „q.s. ad 100 Gew.-% Wasser“ bedeutet im Sinne der vorliegenden
Erfindung, dass so viel Wasser zugegeben wird, wie benötigt wird, um eine
10 Gesamtmenge von 100 Gew.-% zu erreichen.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform enthält die erfindungsgemäße
Zusammensetzung neben den oben genannten Stoffen keine weiteren Bestandteile.

15

Eigenschaften, Herstellung und Verwendung

- Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine tropfbare, lagerungsstabile,
mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung bereitgestellt, enthaltend mindestens
20 eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung emulgatorfrei ist, die
Zusammensetzung pufferfrei ist, und die Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder
Hyaluronat enthält.

- 25 Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann in jeder dem Fachmann bekannten,
geeigneten, flüssigen Zubereitung bereitgestellt werden. Gemäß einer
Ausführungsform liegt die Zusammensetzung als Augenspray, Augenbad,
Augenspüllösung, oder Augentropfen vor. Gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform liegt die Zusammensetzung als Augenspray oder Augentropfen
30 vor.

Gemäß einer Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Zusammensetzung eine Viskosität von weniger als 350 mPa·s bei 20°C auf, bevorzugt weniger als 250 mPa·s bei 20°C, bevorzugter weniger als 200 mPa·s bei 20°C, noch bevorzugter weniger als 150 mPa·s bei 20°C, und am meisten bevorzugt weniger als 100 mPa·s bei 20°C. Gemäß der vorliegenden Erfindung wird die Viskosität nach dem Kegel-Platte-Verfahren unter Verwendung eines Wells-Brookfield Kegel-Platte-Viskosimeters des Typs DV-III+ (Brookfield Engineering Laboratories Vertriebs GmbH, Deutschland) unter Verwendung einer CP51 Spindel bei 5 U/min und 20°C bestimmt.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung lässt sich unproblematisch aseptisch herstellen und ist hervorragend verträglich. Geeignete Verfahren zur Herstellung von mehrphasigen Zusammensetzungen sind dem Fachmann bekannt. Die Herstellung der erfindungsgemäßen Zusammensetzung erfolgt vorzugsweise in einem mehrstufigen Verfahren. Insbesondere wird der flüssigen wässrigen Phase der erfindungsgemäßen Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat zugesetzt. Es versteht sich von selbst, dass die ophthalmische Zusammensetzung zur Verwendung vorzugsweise steril vorliegt, so dass sterile Stoffe unter sterilen Bedingungen verwendet werden, oder die Zusammensetzung nach der Einarbeitung der Stoffe sterilisiert wird.

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung einer tropfbaren, lagerungsstabilen, mehrphasigen, ophthalmischen Zusammensetzung bereitgestellt, dadurch gekennzeichnet, dass eine flüssige hydrophobe Phase homogen in einer kontinuierlichen flüssigen wässrigen Phase dispergiert wird, wobei die flüssige wässrige Phase Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat umfasst.

Bei einem bevorzugten Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Zusammensetzung wird zunächst Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat in der flüssigen wässrigen Phase gelöst, bevorzugt unter aseptischen Bedingungen. In dieser wässrigen flüssigen Phase wird dann die hydrophobe flüssige Phase, 5 vorzugsweise unter aseptischen Bedingungen, dispergiert. Bevorzugt wird bis zur vollständigen Homogenisierung gerührt. Der Durchmesser der so erzeugten Tröpfchen der hydrophoben flüssigen Phase in der Dispersion liegt vorzugsweise bei weniger 100 µm. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform wird so lange homogenisiert bis Tröpfchen mit einem Durchmesser von 1 bis 30 µm erhalten 10 werden, vorzugsweise von 5 bis 15 µm. Die erhaltene, bevorzugt sterile, Zusammensetzung kann anschließend in üblicher Weise konfektioniert werden.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann der flüssigen wässrigen Phase mindestens eine polymere, gelbildende Komponente zugesetzt werden. Hierdurch 15 kann eine dreiphasige Zusammensetzung bereitgestellt werden, die zusätzlich zu der flüssigen wässrigen und der flüssigen hydrophoben Phase noch eine Gel-Phase bzw. Muzin-Phase enthält. Des Weiteren können der flüssigen wässrigen Phase ein Mittel zur Isotonisierung und/oder andere der oben beschriebenen, weiteren Bestandteile zugesetzt werden.

20 Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform wird zunächst eine Suspension aus mindestens einer Polyacrylsäure und/oder mindestens einem Acrylsäurederivat hergestellt, bevorzugt unter aseptischen Bedingungen. Zu dieser Suspension wird anschließend eine wässrige sterilfiltrierte Lösung gegeben, die Hyaluronsäure 25 und/oder Hyaluronat sowie gegebenenfalls ein Mittel zur Isotonisierung enthält, wobei unter Verwendung von bevorzugt sterilfiltriertem Stickstoff oder Druckluft als Druckgas gearbeitet werden kann. Nach sorgfältigem Durchmischen werden dann durch Zugabe einer geeigneten Base, vorzugsweise einer sterilen 2 %igen bis 30 3 %igen Natriumhydroxidlösung, die Carboxylgruppen der mindestens einer Polyacrylsäure und/oder mindestens einem Acrylsäurederivat neutralisiert, die

Gelbildung der mindestens einer Polyacrylsäure und/oder mindestens einem Acrylsäurederivat eingeleitet, und es wird vorzugsweise bis zur Homogenität des Gels weitergerührt. In das hergestellte sterile Hydrogel wird dann die flüssige hydrophobe Phase unter aseptischen Bedingungen eingearbeitet.

5

Des Weiteren kann dem so hergestellten sterilen Gel ein ophthalmischer Wirkstoff, z.B. Vitamin A-palmitat, zugesetzt werden. Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform wird der Wirkstoff unter aseptischen Bedingungen zugesetzt und homogen eingemischt. Zum Beispiel kann eine Vitamin A-Komponente und die vorzugsweise vorhandene sehr viel geringere Menge eines Antioxidans in der hydrophoben Phase gelöst und dann steril filtriert werden. Die sterile hydrophobe wirkstoffhaltige Phase kann dann unter Rühren in das Gel eingearbeitet werden.

10

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung eignet sich besonders zur Behandlung von Krankheiten oder Zuständen des Auges oder der das Auge umgebenden oder damit zusammenhängenden Organe oder Gewebe. Insbesondere ist die ophthalmische Zusammensetzung zur Linderung der Beschwerden bei trockenem Auge und/oder für die symptomatische Behandlung des trockenen Auges geeignet.

15

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird daher eine tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung zur Verwendung als Arzneimittel bereitgestellt, wobei die Zusammensetzung mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase enthält, und dadurch gekennzeichnet ist, dass sie emulgatorfrei und pufferfrei ist und

20

Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat enthält. Gemäß einer Ausführungsform wird eine tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung gemäß der vorliegenden Erfindung, zur Verwendung bei der Behandlung von Krankheiten und Fehlfunktionen des Auges oder der das Auge umgebenden oder damit zusammenhängenden Organe und Gewebe, bevorzugt zur Verwendung bei der Behandlung des trockenen Auges, wobei die Zusammensetzung mindestens eine

25

30

flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase enthält, und dadurch gekennzeichnet ist, dass sie emulgatorfrei und pufferfrei ist und Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat enthält.

- 5 Auf Grund der Abwesenheit von augenreizenden Stoffen wie z.B. Emulgatoren oder Puffersubstanzen, eignet sich die erfindungsgemäße ophthalmische Zusammensetzung zur Langzeitanwendung bei trockenem Auge, beispielsweise als Tränenersatzmittel. Es wurde überraschend gefunden, dass schon innerhalb weniger Minuten nach der Applikation der erfindungsgemäßen Zusammensetzung eine
10 deutliche Besserung der Beschwerden wie Trockenheitsgefühl am Auge, aber auch Brennen, Jucken, Rötungen oder Schwellungen, bewirkt werden kann. Von besonderem Vorteil ist, dass diese Beschwerden nachhaltig durch die erfindungsgemäße Zusammensetzung gelindert werden können. Die konservierungsmittelfreie und/oder phosphatsalzfreie erfindungsgemäße
15 Zusammensetzung ist für eine Langzeitanwendung besonders gut geeignet.

Für die Applikation kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung in geeignete Behältnisse abgefüllt werden, die vorzugsweise so gestaltet sind, dass der Inhalt auf das Auge aufgebracht werden kann.

- 20 Gemäß einem weiteren Aspekt wird ein Behältnis enthaltend eine Zusammensetzung gemäß der vorliegenden Erfindung bereitgestellt, wobei das Behältnis ein Einmaldosen-Behältnis oder ein Mehrdosen-Behältnis ist, bevorzugt eine Ophtiole, eine Ein-Dosis-Ophtiole, oder ein Applikationssystem, bevorzugter ein
25 pumpenbasiertes Applikationssystem oder ein Tip-Seal-Applikationssystem.

- Gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird die erfindungsgemäße Zusammensetzung in Form eines Einmaldosen-Behältnisses bereitgestellt. Einmaldosis-Behältnisse sind im Stand der Technik beispielsweise
30 bekannt unter der Bezeichnung Eindosis-Ophtiole[®], und können bevorzugt aus einem

Polyethylen wie z.B. LDPE (low density polyethylene, Polyethylen niedriger Dichte) bestehen. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird die erfindungsgemäßen Zusammensetzung in einem Einmaldosis-Behältnis frei von Konservierungsmitteln bereitgestellt.

5

Alternativ kann das Behältnis, welches die erfindungsgemäße Zusammensetzung umfasst, auch ein Mehrdosen-Behältnis sein. Beispielsweise kann das Behältnis eine Tropflasche sein. Geeignete Tropfflaschen sind im Stand der Technik bekannt, z.B. unter der Bezeichnung Ophthiole[®], und können aus Polyethylen bestehen, bevorzugt aus HDPE (high density polyethylene, Polyethylen hoher Dichte) oder LDPE (low density polyethylene, Polyethylen niedriger Dichte).

10

Der Mehrdosen-Behältnis kann auch ein Applikationssystem sein, wie z.B. ein pumpenbasiertes Applikationssystem oder ein Tip-Seal-System. Beispiele für pumpenbasierte Applikationssysteme sind Augensprays, Dosiersprühflaschen, sowie Augentropfenpumpen, wie z.B. das COMOD[®]-System oder das 3K[®]-System, beides hergestellt von der Firma Ursatec Verpackung GmbH. Beispiele für Tip-Seal-Systeme sind das Ophthalmic Squeeze Dispenser (OSD[®])-System der Firma Aptargroup, Inc., oder das Novelia[®]-System der Firma Nemera.

20

Gemäß einer Ausführungsform wird eine Dosiersprühflasche umfassend eine Zusammensetzung gemäß der vorliegenden Erfindung bereitgestellt, wobei die Zusammensetzung vorzugsweise als Augenspray vorliegt. Das Augenspray kann hierbei in Form eines Sprühnebels am Auge angewandt werden. Typischerweise werden Augensprays mehrmals täglich auf das geschlossene Augenlid gesprüht. Es ist jedoch auch möglich, das erfindungsgemäße Augenspray von vorne oder von der Seite auf das geöffnete Auge sprühen. Sobald die erfindungsgemäße Zusammensetzung mit der Tränenflüssigkeit des Auges in Kontakt kommt, kann durch den Salzgehalt der Tränenflüssigkeit die Viskosität der Zusammensetzung herabgesetzt und damit die Zusammensetzung destabilisiert werden. Als Folge kann

25

30

eine Entmischung der flüssigen wässrigen und flüssigen hydrophoben Phase stattfinden und sich ein homogener hydrophober Film, z.B. ein Ölfilm, auf dem Tränenfilm des Auges ausbilden, um so eine Verdunstungsbarriere bereitzustellen und/oder die Integrität der Lipidschicht des Tränenfilms zu verbessern bzw.

- 5 wiederherzustellen. Somit kann eine schnelle, direkte, und effektive Wirkung bereitgestellt werden.

Dies ist ein Vorteil gegenüber den im Stand der Technik bekannten liposomalen Augensprays, die typischerweise Phospholipid-haltige Liposomen enthalten. Die in
10 den Liposomen enthaltenen Lipide sollen in die Lipidschicht des Tränenfilms integriert werden und diese so stabilisieren, was zunächst ein Aufbrechen der Liposomen notwendig zu machen scheint. Zudem weisen liposomale Augensprays oft einen Eigengeruch auf, der von den Patienten als unangenehm empfunden wird.

15

Umfang und Gegenstand der vorliegenden Erfindung werden durch die nachfolgenden Beispiele anhand von ausgewählten Ausführungsformen veranschaulicht, die jedoch nicht als einschränkend zu verstehen sind.

20

Beispiele

1. Messmethoden

5

pH-Wert

Der pH-Wert der hergestellten, ophthalmischen Zusammensetzungen wurde bei einer Temperatur von 20°C mit einem Knick pH-Meter 765 oder Knick pH-Meter 766
10 (Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG, Deutschland) gemessen.

Osmolarität

Die Osmolarität der hergestellten, ophthalmischen Zusammensetzungen wurde bei
15 einer Temperatur von 20°C mit einem Mikro-Osmometer gemessen (Hermann Rößling Messtechnik, Deutschland).

Viskosität

20 Die Viskosität der hergestellten, ophthalmischen Zusammensetzungen wurde nach dem Kegel-Platte-Verfahren unter Verwendung eines Wells-Brookfield Kegel-Platte-Viskosimeters des Typs DV-III+ (Brookfield Engineering Laboratories Vertriebs GmbH, Deutschland) mit einer CP51 Spindel bei 5 U/min und 20°C bestimmt.

25 Messung der Tröpfchengröße

Der Durchmesser der Tröpfchen der flüssigen hydrophoben Phase wurde mikroskopisch mit dem Mikroskop Axio Imager M1 (Carl Zeiss AG, Deutschland) bestimmt.

30

Tropfversuch (Priming)

Die Tropfversuche wurden manuell durch senkrechte Betätigung eines
pumpenbasierten Applikationssystems (3K[®]-System, Ursatec Verpackung GmbH,
5 Deutschland), durchgeführt. Dabei wurde die erforderliche Anzahl an Betätigungen
bestimmt, bis ein Tropfen mittlerer Tropfengröße vom Applikationssystem
abgegeben wurde.

Stabilitätstest

10

Die Lagerungsstabilität der hergestellten, ophthalmischen Zusammensetzungen
wurde durch Zentrifugieren der Zusammensetzung bei einer Geschwindigkeit von
5700 Umdrehungen pro Minute bei 20°C über einen Zeitraum von 60 Minuten
bestimmt. Für diese Untersuchungen wurde eine Laborzentrifuge Multifuge 1 S
15 (Kendro Laboratory Products GmbH, Deutschland) verwendet.

Nach Beendigung des Zentrifugierens wurde die Zusammensetzung visuell
begutachtet und wie folgt bewertet:

- 20 OK: Optisch keine Trennung oder Trübungsunterschiede erkennbar.
ET: Eintrübung von unten erkennbar.

2. Stoffe

25

- HA: Natrium-Hyaluronat (Bloomage Freda Biopharm Co., Ltd., China).
MCT: Capryl-Caprinsäure-Triglycerid (Myritol 318, BASF AG,
Deutschland).
Carbomer: Carbopol 980 NF (Lubrizol Advanced Materials Europe BVBA,
30 Belgium).

- 35 -

IM: Isotonisierungsmittel; folgende Stoffe wurden eingesetzt: Glycerin, Sorbitol, Mannitol, Glucose, Propylenglycol, Harnstoff, PEG 300.

5 3. Beispiel

Es wurden ophthalmische Zusammensetzungen, bezeichnet mit Probe 1 bis 9 nach dem folgenden Verfahren unter Verwendung der in Tabelle 1 genannten Stoffe und Mengen hergestellt.

10

Im ersten Schritt der Herstellung wurde Carbomer in Wasser suspendiert und anschließend autoklaviert. Im zweiten Schritt wurde eine sterile wässrige Lösung, bestehend aus Wasser, Natrium-Hyaluronat und einem Isotonisierungsmittel hergestellt und der sterilen Carbomersuspension aseptisch zugegeben. Nachfolgend wurde ein pH-Wert von 6 bis 7, sofern notwendig durch Zugabe steriler NaOH-Lösung eingestellt, und die flüssige hydrophobe Phase unter Homogenisierung zugegeben. Die fertiggestellte Zusammensetzung wurde aseptisch in ein Primärpackmittel abgefüllt.

15

20 Die in Tabelle 2 zusammengefassten Ergebnisse zeigen, dass alle erfindungsgemäßen Proben 2 bis 9 den Stabilitätstest bestehen und daher lagerungsstabil sind. Dagegen zeigt die Vergleichsprobe 1 ohne Hyaluronat nach der Durchführung des Stabilitätstests eine Eintrübung von unten, was auf eine Entmischung der Phasen hinweist.

25

Stoff	Probe 1 (Vgl.)	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Probe 6	Probe 7	Probe 8	Probe 9
HA [mg/g]	--	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,7
MCT [mg/g]	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Carbomer [mg/g]	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625
NaOH	q.s. pH 6-7	q.s. pH 6-7	q.s. pH 6-7	q.s. pH 6-7	q.s. pH 6-7	q.s. pH 6-7	q.s. pH 6-7	q.s. pH 6-7	q.s. pH 6-7
IM [mg/g]	Glycerin 29,0	Glycerin 29,0	Sorbitol 50,0	Mannitol 49,0	Glucose 52,8	Propylenglycol 20,0	Harnstoff 16,3	PEG 300 65,0	Glycerin 29,0
Wasser	ad 1 g	ad 1 g	ad 1 g	ad 1 g	ad 1 g	ad 1 g	ad 1 g	ad 1 g	ad 1 g

Tabelle 1: Stoffe und Mengen der hergestellten Proben 1 bis 9 (Vgl.: Vergleichsprobe).

	Probe 1 (Vgl.)	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Probe 6	Probe 7	Probe 8	Probe 9
pH-Wert	7,3	7,1	7,1	7,1	7,2	7,3	7,1	7,7	7,0
Osmolarität [mosmol/kg]	287	269	294	283	286	270	271	274	287
Viskosität [mPa·s]	123	202	209	194	183	184	174	199	166
Tröpfchengröße [µm]	9-12	9-11	11-12	7-10	8-11	9-10	8-10	9-11	5-10
Tropfversuch (Priming)	8	10	10	18	18	10	15	10	10
Stabilitätstest	ET	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Tabelle 2: Eigenschaften der hergestellten Proben 1 bis 9 (Vgl.: Vergleichsprobe).

Ansprüche

1. Tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung, enthaltend mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase, dadurch gekennzeichnet, dass
5 die Zusammensetzung emulgatorfrei ist,
die Zusammensetzung pufferfrei ist, und
die Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat enthält.
- 10 2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung eine Viskosität von weniger als 350 mPa·s bei 20°C aufweist, bevorzugt weniger als 250 mPa·s bei 20°C, bevorzugter weniger als 200 mPa·s bei 20°C, noch bevorzugter weniger als 150 mPa·s bei 20°C, und am meisten bevorzugt weniger als 100 mPa·s bei 20°C.
- 15 3. Zusammensetzung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat in einer Menge von mindestens 0,001 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, enthält, bevorzugt in einer Menge von mindestens 0,01 Gew.-%, bevorzugter in einer Menge von mindestens 0,1 Gew.-%, noch bevorzugter in einer Menge von mindestens 0,15 Gew.-%, und am meisten bevorzugt in einer Menge von mindestens 0,2 Gew.-%.
- 20 4. Zusammensetzung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hyaluronsäure und/oder das Hyaluronat ein Molekulargewicht M_w von 50 000 bis 10 000 000 g/mol aufweist, bevorzugt von 100 000 bis 5 000 000 g/mol, und am meisten bevorzugt von 250 000 bis 1 000 000 g/mol.

5. Zusammensetzung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Hyaluronat ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Natrium-Hyaluronat, Kalium-Hyaluronat, Zink-Hyaluronat und Mischungen davon, bevorzugt ist das Hyaluronat Natrium-Hyaluronat.

5

6. Zusammensetzung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung die flüssige wässrige Phase als kontinuierliche Phase und die flüssige hydrophobe Phase als darin dispergierte Tröpfchen enthält.

10

7. Zusammensetzung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung mindestens eine polymere, gelbildende Komponente umfasst, bevorzugt mindestens eine Polyacrylsäure und/oder mindestens ein polymeres Acrylsäurederivat, und am meisten bevorzugt mindestens ein Carbomer.

15

8. Zusammensetzung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die flüssige hydrophobe Phase ein ophthalmisch verträgliches Öl umfasst, bevorzugt ein Triglycerid, und am meisten bevorzugt ein mittelkettiges Triglycerid.

20

9. Zusammensetzung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung ein Mittel zur Einstellung der Isotonizität umfasst, bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Dextrose, Glycerin, Propylenglycol, Sorbitol, Mannitol, Harnstoff, Polyethylenglycol, Borsäure, Magnesiumsulfat, Zinksulfat, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Calciumchlorid, Natriumsulfat, Natriumhydrogenphosphat, Trinatriumcitrat, Trinatriumphosphat, und Mischungen davon, bevorzugter ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Dextrose, Glycerin, Propylenglycol, Sorbitol, Mannitol, Harnstoff, Polyethylenglycol, und am meisten bevorzugt Glycerin.

30

10. Zusammensetzung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zusammensetzung, die folgenden Stoffe umfasst:

5

0,15 bis 0,3 Gew.-% Natrium-Hyaluronat,
0,15 bis 0,25 Gew.-% mittelkettige Triglyceride,
0,05 bis 0,1 Gew.-% Carbomer,
1,5 bis 7 Gew.-% Mittel zur Einstellung der Isotonizität, bevorzugt Glycerin,
10 Natriumhydroxid zur pH Einstellung, und
q.s. ad 100 Gew.-% Wasser.

11. Zusammensetzung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung als Augenspray, Augenbad,
15 Augenspüllösung oder Augentropfen vorliegt, bevorzugt als Augenspray oder Augentropfen.

12. Verfahren zur Herstellung einer tropfbaren, lagerungsstabilen, mehrphasigen, ophthalmischen Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch
20 gekennzeichnet, dass eine flüssige hydrophobe Phase homogen in einer kontinuierlichen flüssigen wässrigen Phase dispergiert wird, wobei die flüssige wässrige Phase Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat umfasst.

13. Tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung
25 nach einem der Ansprüche 1 bis 11, zur Verwendung als Arzneimittel.

14. Tropfbare, lagerungsstabile, mehrphasige, ophthalmische Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, zur Verwendung bei der Behandlung von Krankheiten und Fehlfunktionen des Auges oder der das Auge umgebenden oder

- 41 -

damit zusammenhängenden Organe und Gewebe, bevorzugt zur Verwendung bei der Behandlung des trockenen Auges.

15. Behältnis enthaltend eine Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1
5 bis 11, wobei das Behältnis ein Einmaldosen-Behältnis oder ein Mehrdosen-Behältnis ist, bevorzugt eine Ophtiole, eine Ein-Dosis-Ophtiole, oder ein Applikationssystem, bevorzugter ein pumpenbasiertes Applikationssystem oder ein Tip-Seal-Applikationssystem.
- 10 16. Verwendung von Hyaluronsäure und/oder Hyaluronat zur Stabilisierung einer mehrphasigen, emulgatorfreien Zusammensetzung, umfassend mindestens eine flüssige wässrige Phase und mindestens eine flüssige hydrophobe Phase.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2017/058825

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. A61K9/00 A61K47/36 A61K31/728 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61K		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS, EMBASE		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1 913 934 A1 (MANN GERHARD CHEM PHARM FAB [DE]) 23 April 2008 (2008-04-23) paragraphs [0001] - [0081]; claims 1-16; examples 1-3 -----	1-16
A	WO 2007/012625 A1 (MANN GERHARD CHEM PHARM FAB [DE]; CLAUS-HERZ GUDRUN [DE]; KESSLER CHRI) 1 February 2007 (2007-02-01) the whole document -----	1-16
A	US 2013/210912 A1 (DAVIO STEPHEN R [US] ET AL) 15 August 2013 (2013-08-15) tables 1-7 -----	1-16
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 2 June 2017		Date of mailing of the international search report 03/07/2017
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Toulacis, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2017/058825

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1913934	A1	23-04-2008	DE 102006049091 A1 EP 1913934 A1	24-04-2008 23-04-2008

WO 2007012625	A1	01-02-2007	AT 423545 T BR PI0616013 A2 CA 2616531 A1 CN 101227891 A DE 102005035986 A1 EP 1915128 A1 ES 2321875 T3 JP 5349963 B2 JP 2009502866 A WO 2007012625 A1	15-03-2009 31-05-2011 01-02-2007 23-07-2008 08-02-2007 30-04-2008 12-06-2009 20-11-2013 29-01-2009 01-02-2007

US 2013210912	A1	15-08-2013	AR 089962 A1 AU 2013219822 A1 CA 2864417 A1 CN 104203215 A EP 2814463 A1 ES 2576113 T3 HU E029276 T2 JP 5898789 B2 JP 2015507010 A KR 20140121479 A PL 2814463 T3 TW 201345564 A US 2013210912 A1 WO 2013122801 A1	01-10-2014 28-08-2014 22-08-2013 10-12-2014 24-12-2014 05-07-2016 28-02-2017 06-04-2016 05-03-2015 15-10-2014 30-11-2016 16-11-2013 15-08-2013 22-08-2013

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. A61K9/00 A61K47/36 A61K31/728 ADD.														
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC														
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A61K														
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen														
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS, EMBASE														
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorie*</th> <th>Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile</th> <th>Betr. Anspruch Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>EP 1 913 934 A1 (MANN GERHARD CHEM PHARM FAB [DE]) 23. April 2008 (2008-04-23) Absätze [0001] - [0081]; Ansprüche 1-16; Beispiele 1-3</td> <td>1-16</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>WO 2007/012625 A1 (MANN GERHARD CHEM PHARM FAB [DE]; CLAUS-HERZ GUDRUN [DE]; KESSLER CHRI) 1. Februar 2007 (2007-02-01) das ganze Dokument</td> <td>1-16</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>US 2013/210912 A1 (DAVIO STEPHEN R [US] ET AL) 15. August 2013 (2013-08-15) Tabellen 1-7</td> <td>1-16</td> </tr> </tbody> </table>			Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	A	EP 1 913 934 A1 (MANN GERHARD CHEM PHARM FAB [DE]) 23. April 2008 (2008-04-23) Absätze [0001] - [0081]; Ansprüche 1-16; Beispiele 1-3	1-16	A	WO 2007/012625 A1 (MANN GERHARD CHEM PHARM FAB [DE]; CLAUS-HERZ GUDRUN [DE]; KESSLER CHRI) 1. Februar 2007 (2007-02-01) das ganze Dokument	1-16	A	US 2013/210912 A1 (DAVIO STEPHEN R [US] ET AL) 15. August 2013 (2013-08-15) Tabellen 1-7	1-16
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.												
A	EP 1 913 934 A1 (MANN GERHARD CHEM PHARM FAB [DE]) 23. April 2008 (2008-04-23) Absätze [0001] - [0081]; Ansprüche 1-16; Beispiele 1-3	1-16												
A	WO 2007/012625 A1 (MANN GERHARD CHEM PHARM FAB [DE]; CLAUS-HERZ GUDRUN [DE]; KESSLER CHRI) 1. Februar 2007 (2007-02-01) das ganze Dokument	1-16												
A	US 2013/210912 A1 (DAVIO STEPHEN R [US] ET AL) 15. August 2013 (2013-08-15) Tabellen 1-7	1-16												
☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie														
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist														
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts												
2. Juni 2017		03/07/2017												
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Toulacis, C												

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2017/058825

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1913934	A1	23-04-2008	DE 102006049091 A1 EP 1913934 A1	24-04-2008 23-04-2008

WO 2007012625	A1	01-02-2007	AT 423545 T BR PI0616013 A2 CA 2616531 A1 CN 101227891 A DE 102005035986 A1 EP 1915128 A1 ES 2321875 T3 JP 5349963 B2 JP 2009502866 A WO 2007012625 A1	15-03-2009 31-05-2011 01-02-2007 23-07-2008 08-02-2007 30-04-2008 12-06-2009 20-11-2013 29-01-2009 01-02-2007

US 2013210912	A1	15-08-2013	AR 089962 A1 AU 2013219822 A1 CA 2864417 A1 CN 104203215 A EP 2814463 A1 ES 2576113 T3 HU E029276 T2 JP 5898789 B2 JP 2015507010 A KR 20140121479 A PL 2814463 T3 TW 201345564 A US 2013210912 A1 WO 2013122801 A1	01-10-2014 28-08-2014 22-08-2013 10-12-2014 24-12-2014 05-07-2016 28-02-2017 06-04-2016 05-03-2015 15-10-2014 30-11-2016 16-11-2013 15-08-2013 22-08-2013
