



MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

NUMERO DE PUBLICATION : 1005220A3

NUMERO DE DEPOT : 09100026

Classif. Internat. : C12Q G01N B01D

Date de délivrance le : 01 Juin 1993

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 2 Décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, notamment l'article 28;

Vu le procès verbal dressé le 15 Janvier 1991 à 14H20 à l'Office de la Propriété Industrielle

ARRETE:

ARTICLE 1.- Il est délivré à : ANALIS S.A.
rue Dewez 14, B-5000 NAMUR(BELGIQUE)

représenté(e)(s) par : VAN MALDEREN MICHEL, OFFICE VAN MALDEREN, BD. DE LA
SAUVENIERE 85/042 - B 4000 LIEGE.

un brevet d'invention d'une durée de 20 ans, sous réserve du paiement des taxes annuelles, pour : PROCEDE DE SEPARATION, D'IDENTIFICATION ET DE QUANTIFICATION D'ISOENZYMES ET D'ISOFORMES DE LA PHOSPHATASE ALCALINE.

INVENTEUR(S) : Chevigne Roland, rue des Forts 9, B-5100 WEPION (BE)

ARTICLE 2.- Ce brevet est délivré sans examen préalable de la brevetabilité de l'invention, sans garantie du mérite de l'invention ou de l'exactitude de la description de celle-ci et aux risques et périls du(des) demandeurs(s).

Bruxelles, le 01 Juin 1993
PAR DELEGATION SPECIALE :

G. DE CUYPERE
Secrétaire d'administration

5

10 PROCÉDÉ DE SÉPARATION, D'IDENTIFICATION ET DE
 QUANTIFICATION D'ISOENZYMES ET D'ISOFORMES DE LA
 PHOSPHATASE ALCALINE

Objet de l'invention

 La présente invention concerne essentiellement un
15 procédé électrophorétique permettant de séparer et d'identi-
 fier les isoenzymes et les isoformes de la phosphatase alca-
 line présentes dans un liquide physiologique ou un extrait
 de tissu.

 Elle concerne également un procédé densitométrique
20 permettant de quantifier les isoenzymes et les isoformes
 mises en évidence par le procédé électrophorétique de l'in-
 vention.

 L'invention s'étend également aux préparations
 utilisées pour la mise en oeuvre du procédé et aux produits
25 de celui-ci.

Arrière-plan technologique

 Le terme de phosphatase alcaline (EC3.1.3.1), en
 abrégé PAL, regroupe un ensemble d'enzymes catalysant, à pH
 basique, l'hydrolyse d'esters phosphoriques.

30 La PAL est présente au niveau des membranes cellu-
 laires et se trouve dans la plupart des tissus de l'organis-
 me. En fonction de leur localisation, on parlera des iso-
 enzymes intestinale, rénale, osseuse, hépatique, placentaire
 et intestin foetal. Les PAL circulent également dans le sérum
35 sanguin.

 Dans l'organisme humain, quatre gènes différents
 contrôlent l'expression de la PAL: un gène tissulaire non
 spécifique (codant pour les isoenzymes osseuse, hépatique et

rénale, notamment), un gène intestinal, un gène placentaire et un gène intestin foetal, chacun de ces gènes codant pour une isoenzyme correspondante.

Chacune de ces isoenzymes peut subir une ou plusieurs modifications post-translationnelles altérant ses propriétés physico-chimiques mais conservant ses propriétés biologiques et devenir une isoforme.

On connaît actuellement les isoformes suivantes: isoenzyme liée à une immunoglobuline, isoenzyme tétramère, isoenzyme ayant une teneur anormale en acide sialique, isoenzyme liée à un débris de membrane cellulaire (appelé macromoléculaire), isoenzyme liée à une lipoprotéine, par exemple à la LpX.

Le nombre et la quantité des différentes isoenzymes et isoformes de la phosphatase alcaline varient très fortement en fonction d'une part de l'âge et d'autre part de l'état de santé des individus.

Les isoenzymes osseuses et hépatiques ont été particulièrement étudiées, car toute pathologie primaire ou secondaire affectant les systèmes osseux et/ou hépato-biliaire est susceptible d'occasionner une augmentation ou une diminution selon le cas des isoenzymes osseuses et/ou hépatiques dans le sérum sanguin et de s'accompagner de l'apparition d'une autre isoenzyme ou d'une ou plusieurs isoformes.

On sait que le taux d'isoenzymes osseuses sériques décroît de l'enfance vers l'âge adulte et présente des pointes au moment des poussées de croissance. Un arrêt de croissance chez l'enfant se marque par une diminution anormale du taux d'isoenzymes osseuses. Les poussées de croissance s'accompagnent de la présence, dans le sérum sanguin, d'une seconde fraction osseuse qui apparaît sous forme de tétramères.

Cette fraction est absente du sérum de l'adulte normal, mais on l'y découvre lorsqu'un processus multiplicatif pathologique est présent au niveau des os (maladie de Paget, métastases osseuses...).

Une activité ostéoclastique sera caractérisée par la présence d'isoenzyme osseuse à teneur moindre en acide

sialique.

L'isoenzyme hépatique reste normalement à un taux constant tout au long de la vie d'un individu en bonne santé.

Les maladies dégénératives du foie comme la fibrose, les maladies occasionnant une infiltration hépatique et résultant en une destruction progressive des hépatocytes, résultent en une diminution, puis en une disparition de l'isoenzyme hépatique.

Une cholostase intra ou extrahépatique (hépatite, cirrhose, métastases hépatiques, compression hépatique occasionnée par une tumeur de voisinage par exemple) peut occasionner par contre une augmentation de l'isoenzyme hépatique accompagnée de l'apparition de l'isoforme dénommée fraction macromoléculaire, hépato-biliaire ou alpha 1, (liée à un débris de membrane) ainsi que d'autres isoformes, telles que des fractions hépatiques liées à différentes lipoprotéines.

En l'absence d'une inflammation aiguë, la présence d'une isoenzyme hépatique ayant une teneur en acide sialique diminuée est un signe de présence tumorale.

Une isoenzyme hépatique ayant une teneur anormale en acide sialique se rencontre dans l'hyperphosphatasémie transitoire infantile (infection virale des voies respiratoires ou digestives chez l'enfant).

L'identification d'autres types d'isoenzymes de la phosphatase alcaline permet également de déceler des troubles pathologiques.

On sait ainsi que la présence d'isoenzymes placentaires en dehors de la grossesse est le signe d'une pathologie tumorale à évolution rapide, que des isoenzymes et isoformes intestinales en quantités élevées peuvent être la marque d'une maladie systémique et que l'isoenzyme intestin foetal se rencontre en cas de tumeur primitive du foie (hépatome).

L'étude des phosphatases alcalines peut donc apporter une aide substantielle au diagnostic mais aussi à la surveillance des patients pour suivre l'évolution d'une maladie ou objectiver l'effet d'un traitement.

Résumé de l'état de la technique

Les différentes isoenzymes sont habituellement séparées par électrophorèse sur gel d'agarose ou de polyacrylamide ou sur membranes d'acétate de cellulose.

5 Selon les techniques utilisées, certaines isoenzymes ou isoformes ne sont pas révélées ou ne peuvent être identifiées sans ambiguïté. La sensibilité n'est pas toujours suffisante non plus, ce qui empêche une détection précoce des pathologies.

10 On a proposé dans le brevet US-A-4 030 995 un procédé électrophorétique dans lequel on utilise un détergent non-ionique qui permet aux isoenzymes de pénétrer dans un gel d'agarose et donc de présenter une bonne révélation. La migration des isoformes dans le gel lors de l'électrophorèse
15 est cependant insuffisante et ne permet pas une identification parfaitement fiable.

L'utilisation d'un détergent non-ionique permet notamment à l'isoforme macromoléculaire de pénétrer dans le gel; celle-ci n'acquérant pas de charge, reste localisée au
20 point d'application, où elle est difficilement identifiable, étant donné qu'on trouve à ce même endroit les fractions suivantes: intestinale, variant intestinal, placentaire, diverses fractions tétramérisées, et des fractions liées à des immunoglobulines.

25 Les détergents anioniques, quant à eux, apportent une charge négative aux différentes isoformes, permettant de les étaler sur toute la longueur de la migration. Leur utilisation présente cependant des inconvénients: ils augmentent le courant (avec le risque de rupture des gels) et par conséquent l'effet Joule (dénaturation possible des enzymes); ces
30 détergents sont en outre souvent dénaturants au niveau des protéines (donc des enzymes), ils peuvent même être des "anti-enzymes", c'est-à-dire causer une inhibition de l'activité phosphatase. Enfin, ils peuvent conférer une charge
35 trop grande pour une isoforme donnée, la faire migrer trop fortement lors de l'électrophorèse et même la faire sortir du gel.

Lorsqu'on utilise un détergent cationique seul, la

fraction macromoléculaire dont la charge est modifiée migre dans la direction opposée à celle qu'elle adopte en électrophorèse de protéines sériques, ce qui rend difficile l'interprétation.

5 Pour toutes ces raisons, les détergents anioniques ou cationiques ne sont habituellement guère utilisés dans les techniques électrophorétiques pour l'identification des phosphatases alcalines.

10 Jusqu'à présent, une séparation correcte et une identification sûre des isoenzymes osseuse et hépatique notamment n'ont pu être obtenues qu'en recourant à des techniques complémentaires impliquant une double analyse.

15 Ainsi, il est connu de pratiquer des électrophorèses sur membranes d'acétate de cellulose en faisant migrer sur le même support non seulement l'échantillon à analyser mais encore un échantillon thermodénaturé 10 minutes à 56°C.

Il est encore connu de traiter des échantillons à la neuraminidase, qui ôte les résidus d'acide sialique de phosphatases alcalines à des vitesses différentes selon l'origine (hépatique ou osseuse) de l'isoenzyme, ce qui assure une meilleure séparation des bandes électrophorétiques correspondant aux isoenzymes hépatique ou osseuse. D'après les techniques connues, même l'analyse densitométrique ne permet pas d'observer d'une manière nette deux fractions
20 séparées sans recourir à un test complémentaire. Il est à noter que la neuraminidase n'agit pas sur la fraction intestinale, constituée d'asialoglycoprotéines.

Les techniques à double analyse sont malheureusement lentes et coûteuses.

30 La durée des analyses selon les procédés connus incluant l'utilisation d'un détergent est encore augmentée par le fait que le détergent est généralement ajouté au gel après le coulage et le refroidissement de celui-ci: avant l'électrophorèse proprement dite, il est nécessaire de placer
35 le gel dans un tampon dit d'équilibration pendant 30 minutes. De tels tampons n'ont qu'une durée de conservation limitée (60 jours) et doivent donc être renouvelés lorsqu'on pratique des analyses à longueur d'année.

Buts visés par l'invention

L'invention a pour but de mettre au point une technique électrophorétique qui permette une séparation correcte des isoenzymes osseuse et hépatique de la phosphatase alcaline ainsi qu'une identification sans ambiguïté de
5 toute autre isoenzyme ou isoforme, tout en ayant une très grande sensibilité.

Elle a également pour but de permettre une telle séparation qui puisse être réalisée sans recourir à une
10 double analyse d'échantillons.

Elle a encore pour but de fournir un procédé électrophorétique permettant de quantifier directement les isoenzymes osseuse et hépatique de la phosphatase alcaline dans du liquide physiologique ou des extraits de tissus.

Un but particulièrement intéressant est de fournir des troussees d'électrophorèse prêtes à l'emploi, de longue conservation et qui permettent d'obtenir une bonne coloration des échantillons tout en pouvant être utilisées au cours d'une procédure plus simple et dont la durée est considéra-
15 blement diminuée par rapport aux procédures à appliquer dans les techniques connues.

La Demanderesse a constaté avec surprise que l'utilisation conjointe de détergent non-ionique et de détergent anionique dans un gel d'agarose utilisé en électrophorèse
25 permettait d'atteindre les buts ci-dessus.

Éléments caractéristiques de l'invention

Selon l'invention, on fournit un procédé électrophorétique pour séparer et identifier les isoenzymes et les isoformes de la phosphatase alcaline dans un échantillon de
30 liquide physiologique ou d'extrait de tissu dans lequel on applique sur le milieu de support un tampon, au moins un détergent non-ionique et au moins un détergent anionique, en solution dans ce tampon.

De préférence, chaque détergent est présent dans
35 le tampon en une quantité de 0,1 à 10 g/l.

Avantageusement, la proportion entre le détergent non-ionique et le détergent anionique est comprise entre 1:0,5 et 2:1.

De préférence, le pH du tampon est compris entre 8 et 11. Dans une forme d'exécution préférée, le pH est de 9,45.

Le tampon utilisé est de préférence du
5 Tris(hydroxyméthyl) aminométhane contenant de l'acide borique.

Le détergent anionique peut être choisi parmi les acides biliaires et les sels biliaires et consister dans ce cas de préférence en désoxycholate de sodium ou en taurocho-
10 late de sodium.

Alternativement, le détergent anionique peut consister en un composé de formule



où R_1 représente une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée
15 de 6 à 12 atomes de carbone et

X représente un groupe choisi parmi les groupes sulfate, sulfonate et carboxylate.

On peut également utiliser comme détergent anionique dans le procédé de l'invention un dérivé d'acide aminé
20 dont la fonction amine porte un substituant N-alkyle ou N-alkyle de 6 à 12 atomes de carbone.

Le milieu de support pour l'électrophorèse peut être une membrane d'acétate de cellulose, un gel de polyacrylamide ou un gel d'agarose.

25 Dans ce dernier cas, les détergents peuvent être ajoutés soit à la solution tamponnée d'agarose avant le coulage des gels, soit, en mélange dans un tampon d'équilibration, au gel déjà coulé.

Le détergent non-ionique est choisi dans le groupe
30 comprenant les dérivés de type Triton, Brij et Tween, le lubrol, l'éthylphénylpolyoxyéthylène glycol et le N-oxyde de diméthyl N-N dodécylamine.

Le procédé de l'invention peut comprendre en outre une étape de quantification des isoenzymes et des isoformes
35 de la phosphatase alcaline séparées et identifiées par ce procédé. Cette quantification peut être réalisée par analyse densitométrique aux environs de 600 nm après incubation du gel pendant 15 minutes dans une solution contenant du

5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate et du bleu de tétrazolum nitré.

L'invention a également pour objet des troussees pour l'électrophorèse des isoenzymes de la phosphatase alcaline comprenant un gel d'agarose et un agent détergent consistant en au moins un détergent non-ionique et au moins un détergent anionique. De préférence, le gel d'agarose de ces troussees est fabriqué en y introduisant les détergents en solution dans un tampon, avant la solidification du gel contenant de l'agarose.

Les détergents sont choisis parmi ceux mentionnés ci-dessus.

Un autre objet de l'invention est un gel d'agarose contenant ces détergents.

Avantageusement, on fabrique les troussees de l'invention en introduisant, avant solidification de l'agarose, outre les détergents, de la chlorhexidine. Cette substance est un bon agent conservateur; un objet de l'invention est son utilisation à cette fin dans des réactifs de laboratoire.

Un autre objet de l'invention est l'utilisation des troussees de l'invention pour l'identification et la quantification des isoenzymes et des isoformes dans des échantillons de liquide physiologique et des extraits de tissus.

Exemples d'exécution de l'invention

L'invention est illustrée par les exemples de préparation de gels électrophorétiques repris ci-dessous (exemples 1 à 4) et par un exemple de mise en oeuvre (exemple 5).

Exemples 1 à 4 (préparation)

Une solution standard d'agarose est préparée de la manière suivante: à 1 l d'eau distillée sont ajoutés successivement: 0,38 mole de Tris(hydroxyméthyl) aminométhane, 0,062 mole d'acide borique, environ 0,02 mole d'hydroxyde de sodium pour obtenir un pH de 9,45. Après dissolution complète, 10 g d'agarose ainsi que des adjuvants connus permettant d'obtenir les caractéristiques de gel souhaitées (texture, rétention d'eau,...), sont ajoutés sous forte agitation. Le mélange est porté à 95°C. Après dissolution complète, il

est refroidi à 55°C.

Exemple 1

1 g d'éthylphénylpolyoxyéthylène glycol renfermant 10 résidus éthylène et 0,75 g de N-lauroylsarcosinate de sodium ainsi que 200 mg de chlorhexidine sont ajoutés à la solution standard. Après dissolution complète, l'agitation est arrêtée et on procède au coulage des gels d'agarose (200 à 250 gels de 10 x 7,5 cm) sur un support adéquat.

Exemple 2

10 1 g d'éthylphénylpolyoxyéthylène glycol renfermant 10 résidus éthylène et 0,9 g de N-lauroyl-N-méthyltaurinate de sodium ainsi que 200 mg de chlorhexidine sont ajoutés à la solution standard. Après dissolution complète, l'agitation est arrêtée et on procède au coulage des gels d'agarose (200 à 250 gels de 10 x 7,5 cm) sur un support adéquat.

Exemple 3

1 g de polyoxyéthylène lauryl éther, PEG 9-10, (PM moyen 582) renfermant 10 résidus éthylène et 0,75 g de N-lauroylsarcosinate de sodium ainsi que 200 mg de chlorhexidine sont ajoutés à la solution standard. Après dissolution complète, l'agitation est arrêtée et on procède au coulage des gels d'agarose (200 à 250 gels de 10 x 7,5 cm) sur un support adéquat.

Exemple 4

25 1 g de N-oxyde de diméthyl N-N dodécylamine renfermant 10 résidus éthylène et 0,75 g de N-lauroylsarcosinate de sodium ainsi que 200 mg de chlorhexidine sont ajoutés à la solution standard. Après dissolution complète, l'agitation est arrêtée et on procède au coulage des gels d'agarose (200 à 250 gels de 10 x 7,5 cm) sur un support adéquat.

Il est à noter que l'utilisation de la chlorhexidine, (que l'on utilise habituellement de manière courante pour la désinfection des mains pendant des opérations chirurgicales, ou en tant que désinfectant actif dans des affections buccales, par exemple) en tant qu'agent conservateur dans un gel d'agarose est particulièrement avantageuse: les résultats obtenus sont tout aussi bons qu'en utilisant classiquement l'azide de sodium, lequel risque de former des composés

explosifs au contact d'objets métalliques, par exemple dans les canalisations d'eau.

La Demanderesse a d'ailleurs utilisé la chlorhexidine avec succès à cette fin pour des gels d'agarose ou d'agar destinés à d'autres types d'analyses électrophorétiques que celles des isoenzymes de la phosphatase alcaline. L'utilisation de chlorhexidine comme agent préservatif empêchant le développement de bactéries, de moisissures, levures et algues dans des réactifs de laboratoire les plus divers s'est, à maintes reprises, révélée efficace.

Exemple 5 (mise en oeuvre)

Un gel obtenu selon une des préparations décrites en exemples 1, 2, 3, 4 est déposé sur la table, buvardé pour enlever l'excès de tampon et des échantillons sont appliqués selon un procédé courant en électrophorèse. Le gel est alors soumis à une électrophorèse de 150 V pendant 25 minutes (valeurs pour un gel de 10 x 7,5 cm) en utilisant de préférence comme tampon d'électrophorèse un tampon identique à celui utilisé pour la préparation de la solution standard d'agarose. Après l'électrophorèse, le gel est incubé à 45°C pendant 15 minutes avec une solution de 10 ml d'un tampon 2-amino-2-méthylpropanol à pH 10,6 contenant du substrat 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate et du bleu de tétrazolium nitré. Le gel est alors rincé avec de l'eau distillée et/ou une solution d'acide acétique à 5%, puis séché. Après rinçage, le gel peut également être buvardé, compressé une ou plusieurs fois, puis séché.

Il est à noter par ailleurs que le bleu de tétrazolium nitré amplifie la coloration obtenue grâce à la transformation du substrat en un composé violet. Un quart d'heure d'incubation dans le tampon est tout à fait suffisant pour obtenir un excellent résultat.

Les gels présentent, après électrophorèse, une série de bandes de coloration violette correspondant aux différentes isoformes ou isoenzymes contenues dans les échantillons et peuvent dans la plupart des cas être identifiées à l'oeil nu.

Des résultats expérimentaux obtenus avec un grand

nombre d'échantillons de différentes origines ont permis d'identifier d'une manière fiable et sans recourir à une analyse complémentaire, les isoenzymes et isoformes suivantes: isoenzymes liées à des lipoprotéines, isoenzyme liée à la LpX, fraction X présente dans l'hyperphosphatasémie transitoire infantile, la fraction macromoléculaire, la fraction intestin foetal, des fractions tétramérisées (telles que la seconde fraction osseuse, la deuxième et la troisième fractions placentaires, la fraction variant intestinal), la fraction hépatique, la fraction osseuse, la fraction intestinale adulte, et les fractions hépatique, osseuse, intestinale placentaire, chacune de ces fractions se présentant sous une forme liée à une immunoglobuline.

L'analyse densitométrique aux environs de 600 nm permet de déterminer avec précision les quantités des différentes fractions présentes dans un échantillon donné. Si de telles analyses sont effectuées sur un même patient au cours du temps, elles permettent un suivi de l'évolution d'une maladie, ou un diagnostic précis.

Bien que les exemples ci-dessus illustrent des formes d'exécution particulièrement avantageuses de l'invention, ils n'en limitent nullement la portée.

Un mélange de détergent non-ionique et de détergent anionique dans un tampon peut également être utilisé dans des techniques d'électrophorèse dans lesquelles le support est constitué par de l'acétate de cellulose par exemple

Au cas où on dispose par exemple d'un gel Beckman Paragon® SPE ne contenant pas un tel tampon à deux détergents tel que décrit plus haut, on ne sortira pas du cadre de l'invention en laissant incuber un tel gel classique dans un tel tampon: les résultats obtenus bien que la procédure soit plus longue, sont tout à fait similaires; une telle manière de procéder constitue une alternative qui ne sort pas du cadre de l'invention.

REVENDEICATIONS

1. Procédé électrophorétique pour séparer et identifier les isoenzymes et les isoformes de la phosphatase alcaline dans un échantillon de liquide physiologique ou d'extrait de tissu dans lequel on applique sur un milieu de support un tampon et du détergent caractérisé en ce qu'on utilise au moins un détergent non-ionique et au moins un détergent anionique en solution dans ce tampon.

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que chaque détergent est présent dans le tampon en une quantité de 0,1 à 10 g/l de tampon.

3. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la proportion entre le détergent non-ionique et le détergent anionique est comprise entre 1:0,5 et 2:1.


4. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que le pH du tampon est compris entre 8 et 11.

5. Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le tampon utilisé est du Tris(hydroxyméthyl) aminométhane contenant de l'acide borique.

6. Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le détergent anionique est choisi parmi les acides biliaires et les sels biliaires.

7. Procédé suivant la revendication 6, caractérisé en ce que le détergent est un sel biliaire, de préférence le désoxycholate de sodium ou le taurocholate de sodium.

8. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le détergent anionique consiste en un composé de formule



où R_1 représente une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée de 6 à 12 atomes de carbone et

X représente un groupe choisi parmi les groupes sulfate, sulfonate et carboxylate.

9. Procédé suivant l'une quelconque des revendica-

tions 1 à 5 caractérisé en ce que le détergent anionique est un dérivé d'acide aminé dont la fonction amine porte un substituant N-alkyle ou N-alkoyle de 6 à 12 atomes de carbone.

10 Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le milieu de support est une membrane d'acétate de cellulose.

11. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le milieu de support est un gel de polyacrylamide.

10 12. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le milieu de support est un gel d'agarose.

15 13. Procédé suivant la revendication 12, caractérisé en ce que les détergents sont ajoutés à une solution tamponnée d'agarose avant le coulage des gels.

14. Procédé suivant la revendication 12, caractérisé en ce que les détergents sont ajoutés en mélange dans un tampon d'équilibration au gel d'agarose déjà coulé.

20 15. Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le détergent non-ionique est choisi dans le groupe comprenant les dérivés de type Triton, Brij et Tween, le lubrol, l'éthylphénylpolyoxyéthylène glycol et le N-oxyde de diméthyl-N-N-dodécylamine.

25 16. Procédé suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape de quantification des isoenzymes et des isoformes de la phosphatase alcaline séparés et identifiés.

30 17. Procédé suivant la revendication 16, caractérisé en ce qu'on incube le gel après électrophorèse pendant 15 minutes avec un substrat contenant du 5-bromo-4-chloro-indolyl phosphate et du bleu de tétrazolium nitré et en ce qu'on procède à une analyse densitométrique aux environs de 600 nm des bandes colorées obtenues, ce qui permet une quantification.

35 18. Trousse pour l'électrophorèse des isoenzymes de la phosphatase alcaline comprenant un gel d'agarose et un agent détergent, caractérisé en ce que le gel d'agarose contient en tant qu'agent détergent au moins un détergent

non-ionique et au moins un détergent anionique.

19. Trousse suivant la revendication 18, caractérisée en ce que le gel d'agarose est fabriqué en y introduisant les détergents, en solution dans un tampon, avant la solidification de l'agarose.

20. Trousse suivant l'une quelconque des revendications 18 et 19, caractérisée en ce que le ou les détergents anioniques sont choisis parmi les détergents d'une quelconque des revendications 6 à 9 et en ce que le ou les détergents non-ioniques sont choisis parmi les détergents de la revendication 15.

21. Gel d'agarose compris dans une trousse suivant l'une quelconque des revendications 18 à 20.

22. Procédé de fabrication de trousse pour l'électrophorèse des isoenzymes de la phosphatase alcaline, caractérisé en ce qu'on prépare une solution standard d'agarose dans un tampon, qu'on la chauffe, qu'on la laisse refroidir, et qu'on y ajoute au moins un détergent non ionique et au moins un détergent anionique avant solidification.

23. Procédé suivant la revendication 22, caractérisé en ce qu'on ajoute également, avant solidification, de la chlorhexidine.

24. Utilisation d'une trousse suivant l'une quelconque des revendications 18 à 20 pour l'identification et la quantification des isoenzymes et isoformes de la phosphatase alcaline dans des échantillons de liquide physiologique et des extraits de tissu.

25. Utilisation de la chlorhexidine en tant qu'agent conservateur dans des réactifs de laboratoire, notamment dans des gels d'agar ou d'agarose.



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE

établi en vertu de l'article 21 § 1 et 2
de la loi belge sur les brevets d'invention
du 28 mars 1984

Numero de la demande
nationale

BE 9100026
BO 2712

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
D,A	US-A-4 030 995 (W.H. STARKWEATHER) * En entier * ---	1-25	C 12 Q 1/42 G 01 N 27/26 B 01 D 57/02 // C 12 Q 1/00
A	BIOCHEMICAL MEDICINE, vol. 9, no. 3, mars 1974, pages 309-315, New York, US; L. FISHMAN: "Acrylamide disc gel electrophoresis of alkaline phosphatase of human tissues, serum and ascites fluid using triton X-100 in the sample and the gel matrix" * En entier * ---	1-25	
A	CLINICAL CHEMISTRY, vol. 28, no. 10, octobre 1982, pages 2007-2016, Winston-Salem, Washington, US; D.W. MOSS et al.: "Alkaline phosphatase isoenzymes" * Page 2010, colonne de droite, ligne 46 - page 2011, colonne de gauche, ligne 51 * -----	1-20	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			C 12 Q G 01 N B 01 D
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
06-09-1991		DOEPFER K-P.	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET BELGE NO.**

BE 9100026
BO 2712

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 18/09/91
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US-A- 4030995	21-06-77	Aucun	