

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200810187820.0

[51] Int. Cl.

A61K 36/815 (2006.01)

A61K 9/00 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

A61P 11/00 (2006.01)

[43] 公开日 2009年12月16日

[11] 公开号 CN 101601775A

[51] Int. Cl. (续)

A61K 31/045 (2006.01)

A61K 31/125 (2006.01)

[22] 申请日 2008.12.23

[21] 申请号 200810187820.0

[71] 申请人 张庆忠

地址 067000 河北省承德市西大街工商银行
后粮食小区5号楼4单元302室

[72] 发明人 张庆忠

[74] 专利代理机构 北京品源专利代理有限公司
代理人 陈慧珍

权利要求书2页 说明书21页

[54] 发明名称

一种治疗心脑血管呼吸循环系统疾病的外用中药
制剂及其制备方法

[57] 摘要

本发明公开一种治疗心脑血管呼吸循环系统疾病的外用中药制剂及其制备方法，它主要选用活血行气、舒经活络的皂刺，木别，红花等34味中药配制而成，可制成膏剂、药袋和片剂三种剂型。本发明配方独特，配合中医穴位理论采用外用方法治疗心脑血管呼吸循环系统疾病，对于冠心病心绞痛、精神病、帕金森氏病、癫痫病、发作性睡病、脑萎缩、鼻炎、慢性咽炎、喉炎、哮喘、妇科疾病、儿童多动症、儿童尿床症等多种疾病均有显著疗效，同时具有益智醒脑、强身健体的功效，无副作用。

1. 一种治疗心脑血管呼吸循环系统疾病的外用中药制剂，其特征在于它由下述重量配比的原料制成：皂刺 10、木别（去皮）10-20、防风 10、荆芥 10、苏木 10、红花 5-10、肉桂 10-15、桃仁 10-15、川芎 10、当归 10、黄柏 5-10、透骨草 5-10、生地 10-15、白芷 5-10、玄参 10、乳香 5-10、没药 5-10、羌活 10、独活 10、生马钱 10-1000，蜀椒 10-100、大风子 10-100、苏子 10、胡麻仁 10、枸杞子 10、决明子 10、檀香 10、补骨脂（生）10、毕拔 10、丁香 10、小茴香 10、杜仲 10-15、冰片 5-10、樟脑 5-10。

2. 根据权利要求 1 所述的外用中药制剂，其特征在于添加了香油和章丹，剂型为膏剂，其中各原料的重量配比是：皂刺 10、木别（去皮）10、防风 10、荆芥 10、苏木 10、红花 10、肉桂 15、桃仁 15、川芎 10、当归 10、黄柏 10、透骨草 10、生地 10、白芷 10、玄参 10、乳香 10、没药 10、羌活 10、独活 10、生马钱 30，蜀椒 100、大风子 100、苏子 10、胡麻仁 10、枸杞子 10、决明子 10、檀香 10、补骨脂（生）10、毕拔 10、丁香 10、小茴香 10、杜仲 10、冰片 6、樟脑 6、香油 1500、章丹 460。

3. 根据权利要求 1 所述的外用中药制剂，其特征在于制成药袋来使用，其中各原料的重量配比是：皂刺 10、木别（去皮）20、防风 10、荆芥 10、苏木 10、红花 6、肉桂 10、桃仁 10、川芎 10、当归 10、黄柏 6、透骨草 6、生地 12、白芷 10、玄参 10、乳香 10、没药 10、羌活 10、独活 10、生马钱 12，蜀椒 30、大风子 40、苏子 10、胡麻仁 10、枸杞子 10、决明子 10、檀香 10、补骨脂（生）10、毕拔 10、丁香 10、小茴香 10、杜仲 12、冰片 10、樟脑 10。

4. 根据权利要求 1 所述的外用中药制剂，其特征在于添加了适量蜂蜜，剂型为片剂，其中各原料的重量配比是：皂刺 10、木别（去皮）10、防风 10、荆芥 10、苏木 10、红花 10、肉桂 10、桃仁 10、川芎 10、当归 10、黄柏 10、透骨草 5、生地 10、白芷 5、玄参 10、乳香 5、没药 5、羌活 10、独活 10、生马钱 1000，蜀椒 10、大风子 10、苏子 10、胡麻仁 10、枸杞子 10、决明子 10、檀香 10、补骨脂（生）10、毕拔 10、丁香 10、小茴香 10、杜仲 10、冰片 10、樟脑 10。

5. 权利要求 2 所述膏剂的制备方法，其特征在于采用了如下步骤：①取香油、章丹备用；②将其余诸药（乳香、冰片、没药除外）同时倒入容器内用香

油浸泡，浸泡时间为春季3天、夏季4天、秋季5天、冬季6天；③浸泡好的药材混合物倒入锅内用武火煮，边煮边用柳枝不断搅拌，直至香油沸腾；④再用文火熬至药枯（最低不得少于60分钟），捞出药渣，留下药液；⑤当药液滴入白水中黑珠不散时，顺序将乳香、没药、冰片下锅；⑥下一匙章丹，用钢匙和筷子将之拨散，并用柳枝不断搅拌；⑦至药锅内浮面红色一点不见，再下一匙章丹，如此反复直至剩余章丹20（重量份）（约25分钟）；⑧用所剩章丹调整药液软硬度，当试捏药液不沾手时，膏剂即制成。

6. 权利要求3所述药袋的制备方法，其特征在于采用了如下步骤：①用细砂将生马钱炒至微酥（不要过火，防药味走失）后与其余诸药按组方配伍成药材混合物；②粉碎药材混合物；③在饲料加工机上过80目筛；④根据用药的部位或穴位，将适量过筛后的药末装入不同规格且与皮肤接触面具有良好通透性的药袋；⑤药袋封口；⑥穿透药袋缝制若干条线以相对固定其中药末。

7. 权利要求4所述片剂的制备方法，其特征在于采用了如下步骤：①用细砂将生马钱炒至微酥（不要过火，防药味走失）后与其余诸药按组方配伍成药材混合物；②粉碎药材混合物；③在饲料加工机上过60目筛；④过筛后的药末中加入适量蜂蜜并充分搅拌调匀，所加蜂蜜的量以药末不散聚成一体为度；⑤晾干至剩余水分10%；⑥按常规方法将之切割成一定规格的片，分装，密封保存。

一种治疗心脑血管呼吸循环系统疾病的外用中药制剂及其制备方法

技术领域

本发明涉及一种外用中药制剂，特别是一种能够治疗心脑血管呼吸循环系统疾病的外用中药制剂。

背景技术

临床上应用中药治疗心脑血管呼吸循环系统疾病已经积累了很多经验，但多为口服制剂，药物因受到胃肠道生理因素及肝脏代谢的影响，吸收利用率低、起效慢、疗效有限，并且长期应用副作用大；也有少数几种外用中药制剂用来治疗上述疾病，例如佩戴于胸口的“保心包”等，但亦存在疗效有限、副作用大等问题。

发明内容

本发明目的在于针对临床需要，通过挖掘祖国传统医学宝库，提供一种疗效好、见效快、副作用少的用于治疗心脑血管呼吸循环系统疾病的外用中药制剂。

本发明的另一目的是提供该外用中药制剂的制备方法。

本发明的解决方案是基于祖国传统医学对人体发病机理的认识及中医“辨证施治”的原则，参考现代药理学研究成果，从祖国医药宝库中筛选出活血化瘀、行气止痛的天然食用植物药，按中医理论组方，提取精华，同时配合中医穴位理论，循经取穴外用，以此来通调全身任督二脉，行气血通经络，扶正固本、平衡阴阳，既针对病变部位特定修复，又综合提高机体免疫力，从而改善循环障碍，恢复人体机能。

本发明所述外用制剂是由下列组分制成的：（用量为重量份）

皂刺 10、木别（去皮）10-20、防风 10、荆芥 10、苏木 10、红花 5-10、肉桂 10-15、桃仁 10-15、川芎 10、当归 10、黄柏 5-10、透骨草 5-10、生地 10-15、白芷 5-10、玄参 10、乳香 5-10、没药 5-10、羌活 10、独活 10、生马钱 10-1000，蜀椒 10-100、大风子 10-100、苏子 10、胡麻仁 10、枸杞子 10、决明子 10、檀香 10、补骨脂（生）10、毕拔 10、丁香 10、小茴香 10、杜仲 10-15、冰片 5-10、樟脑 5-10。

所述的外用中药制剂，可以添加香油和章丹制成膏剂，其组分配比为：（用量为重量份）

皂刺 10、木别（去皮）10、防风 10、荆芥 10、苏木 10、红花 10、肉桂 15、桃仁 15、川芎 10、当归 10、黄柏 10、透骨草 10、生地 10、白芷 10、玄参 10、乳香 10、没药 10、羌活 10、独活 10、生马钱 30，蜀椒 100、大风子 100、苏子 10、胡麻仁 10、枸杞子 10、决明子 10、檀香 10、补骨脂（生）10、毕拔 10、丁香 10、小茴香 10、杜仲 10、冰片 6、樟脑 6、香油 1500、章丹 460。

将上述组分制成本发明膏剂的方法是：

- ① 取香油、章丹备用；
- ② 将其余诸药（乳香、冰片、没药除外）同时倒入容器内用香油浸泡，浸泡时间为春季 3 天、夏季 4 天、秋季 5 天、冬季 6 天；
- ③ 浸泡好的药材混合物倒入锅内用武火煮，边煮边用柳枝不断搅拌，直至香油沸腾；
- ④ 再用文火熬至药枯（最低不得少于 60 分钟），捞出药渣，留下药液；
- ⑤ 当上述药液滴入白水中黑珠不散时，顺序将乳香、没药、冰片下锅；
- ⑥ 下一匙章丹，用钢匙和筷子将之拨散，并用柳枝不断搅拌；
- ⑦ 至药锅内浮面红色一点不见，再下一匙章丹，如此反复直至剩余章丹 20（重量份）（约 25 分钟）；
- ⑧ 用所剩章丹调整药液软硬度，当试捏药液不沾手时，膏剂即制成。

使用方法：根据病情寻经取穴贴敷。

所述的外用中药制剂，也可以制成药袋，其组分配比为：（用量为重量份）

皂刺 10、木别（去皮）20、防风 10、荆芥 10、苏木 10、红花 6、肉桂 10、桃仁 10、川芎 10、当归 10、黄柏 6、透骨草 6、生地 12、白芷 10、玄参 10、乳香 10、没药 10、羌活 10、独活 10、生马钱 12，蜀椒 30、大风子 40、苏子 10、胡麻仁 10、枸杞子 10、决明子 10、檀香 10、补骨脂（生）10、毕拔 10、丁香 10、小茴香 10、杜仲 12、冰片 10、樟脑 10。

将上述组分制成本发明药袋的方法是：

- ① 用细砂将生马钱炒至微酥（不要过火，防药味走失）后与其余诸药按组方配伍成药材混合物；

②粉碎药材混合物;

③在饲料加工机上过 80 目筛;

④根据用药的部位或穴位,将适量过筛后的药末装入不同规格且与皮肤接触面具有良好通透性的药袋;

⑤药袋封口;

⑥穿透药袋缝制若干条线以相对固定其中药末。

使用方法:根据病情寻经取穴佩戴。

所述的外用中药制剂,还可以添加适量蜂蜜制成片剂,其组分配比为:(用量为重份量)

皂刺 10、木别(去皮) 10、防风 10、荆芥 10、苏木 10、红花 10、肉桂 10、桃仁 10、川芎 10、当归 10、黄柏 10、透骨草 5、生地 10、白芷 5、玄参 10、乳香 5、没药 5、羌活 10、独活 10、生马钱 1000,蜀椒 10、大风子 10、苏子 10、胡麻仁 10、枸杞子 10、决明子 10、檀香 10、补骨脂(生) 10、毕拔 10、丁香 10、小茴香 10、杜仲 10、冰片 10、樟脑 10。

将上述组分制成本发明片剂的方法是:

①用细砂将生马钱炒至微酥(不要过火,防药味走失)后与其余诸药按组方配伍成药材混合物;

②粉碎药材混合物;

③在饲料加工机上过 60 目筛;

④过筛后的药末中加入适量蜂蜜并充分搅拌调匀,所加蜂蜜的量以药末不散聚成一体为度;

⑤晾干至剩余水分 10%;

⑥按常规方法将之切割成一定规格的片,分装,密封保存。

使用方法:根据病情寻经取穴贴敷。

上述组分方解:

皂刺:消肿,治风杀虫;

木别:消结肿,去恶疮;

防风:祛风胜湿,发表止痛;

荆芥:祛风解表,清头目,消疮肿;

苏木：行血止瘀，止痛散肿；
红花：活血通经，祛瘀止痛；
肉桂：温中补阳，散寒止痛；
桃仁：破血祛瘀；
川芎：活血行气，祛风止痛；
当归：补血和血，调经止痛；
黄柏：清热燥湿，泻火解毒；
透骨草：追风透骨，疏通经络；
生地：补血，滋阴祛瘀；
白芷：发表祛风，消肿止痛；
玄参：养阴生津，泻火解毒；
乳香、没药：消肿止痛，生肌；
羌活、独活：表散风寒，通痹止痛；
生马前：消结肿，止疼痛；
蜀椒：温中止痛，杀虫；
大风子：祛风燥湿，攻毒杀虫；
苏子：止咳平喘，下气消痰，利膈宽胸；
胡麻仁：滋养肝肾，润燥滑肠；
枸杞子：滋补肝肾，益精明目；
决明子：清肝明目；
檀香：理气散寒，止痛开胃；
补骨脂（生）：补骨壮阳；
毕拔：温中散寒；
丁香：温中降逆，温肾协阳；
小茴香：理气止痛，调中和胃；
杜仲：补肝肾，壮筋骨；
冰片、樟脑：芳香开窍，散热止痛。

本发明的外用中药制剂是发明人根据祖传秘方整理而得，使用时结合中医穴位理论，循经取穴外用。其有益效果是：①配方独特，具有很好的活血行气、

舒经活络功效；②药物外用于穴位可迅速渗透皮肤并被充分吸收，避免了胃肠道生理因素及肝脏“首过效应”的影响，生物利用度高；③经经脉输送直达病灶，药力集中，可以定向修复病变部位；④综合调和气血，疏通经络，调整脏腑功能，调节阴阳平衡，全面增强人体机能。实践证明，该制剂使用方便、疗效确切、无副作用，对于多种心脑血管呼吸循环系统疾病均有显著疗效。

具体实施方式

实施例 1:

按下述配比称取原料：皂刺 10 克、木别（去皮）10 克、防风 10 克、荆芥 10 克、苏木 10 克、红花 10 克、肉桂 15 克、桃仁 15 克、川芎 10 克、当归 10 克、黄柏 10 克、透骨草 10 克、生地 10 克、白芷 10 克、玄参 10 克、乳香 10 克、没药 10 克、羌活 10 克、独活 10 克、生马钱 30 克，蜀椒 100 克、大风子 100 克、苏子 10 克、胡麻仁 10 克、枸杞子 10 克、决明子 10 克、檀香 10 克、补骨脂（生）10 克、毕拔 10 克、丁香 10 克、小茴香 10 克、杜仲 10 克、冰片 6 克、樟脑 6 克、香油 1500 克、章丹 460 克。

取香油、章丹备用；将其余诸药（乳香、冰片、没药除外）同时倒入容器内用香油浸泡，浸泡时间为春季 3 天、夏季 4 天、秋季 5 天、冬季 6 天；浸泡好的药材混合物倒入锅内用武火煮，边煮边用柳枝不断搅拌，直至香油沸腾；用文火熬至药枯（最低不得少于 60 分钟），捞出药渣，留下药液；当药液滴入白水中黑珠不散时，顺序将乳香、没药、冰片下锅；下一匙章丹，用钢匙和筷子将之拨散，并用柳枝不断搅拌；至药锅内浮面红色一点不见，再下一匙章丹，如此反复直至剩余章丹 20 克（约 25 分钟）；用所剩的 20 克章丹调整药液软硬度，当试捏药液不沾手时，膏剂即制成。

使用方法:

贴敷于膻中穴（位于胸部两乳之间正中），于塑料薄膜上将膏药摊成直径 12cm 的圆形，膏药重约 15 克，再用塑料薄膜覆盖封实，固定。

主治:

胸痹心痛、咯唾脓血、心悸、心烦、咳嗽、气喘、呃逆、产妇少乳、乳腺炎等。

实施例 2:

原料配比及制作方法同实施例 1。

使用方法:

贴敷于前胸,覆盖胸乡穴(胸外侧部第 3 肋间隙,距前正中线 6 寸)、天溪穴(胸外侧部第 4 肋间隙,距前正中线 6 寸)、虚里穴(位于左乳下,心搏动处)、华盖穴(胸部前正中线上,平第 1 肋间)、灵虚穴(位于第 3 肋间隙,前正中线旁开 2 寸处)等胸部重要穴位,于塑料薄膜上将膏药摊成 10cm×12cm 的矩形,膏药重约 8 克,再用塑料薄膜覆盖封实,固定。

主治:

胸痛、肋肋痛、乳痛、喉痹、咽肿、咳嗽、气喘、呕吐、不嗜食等。

实施例 3:

原料配比及制作方法同实施例 1。

使用方法:

贴敷于命门穴(位于腰部,第二、三腰椎棘突之间),于塑料薄膜上将膏药摊成 8cm×10cm 的矩形,膏药重约 12 克,再用塑料薄膜覆盖封实,固定。

主治:

阳痿、遗精、月经不调、痛经、带下、久泻痔血、脱肛、急慢性肾炎、支气管炎、腰背痛、肺气肿、肺心病、慢性结肠炎等。

实施例 4:

原料配比及制作方法同实施例 1。

使用方法:

贴敷于委中穴(位于膝关节后面,窝横纹中央处),于塑料薄膜上将膏药摊成 5cm×6cm 的矩形,膏药重约 4 克,再用塑料薄膜覆盖封实,固定。

主治:

腰背痛、坐骨神经痛、腓肠肌痉挛、下肢瘫痪、中暑、消化不良、急慢性胃肠炎、痢疾、丹毒、膝关节炎、疖痈初期等症。

实施例 5:

原料配比及制作方法同实施例 1。

使用方法:

对贴敷于环跳穴(位于臀部股骨大转子的后上方,即站位时臀部最凹处,

两臀各一个), 内侧于塑料薄膜上将膏药摊成 3cm × 13cm 的矩形, 膏药重约 4.5 克, 外侧于塑料薄膜上将膏药摊成直径 8cm 的圆形, 膏药重约 2.5 克, 均用塑料薄膜覆盖封实, 固定。

主治:

腰胯疼痛、下肢痿痹等腰腿病证。

实施例 6:

原料配比及制作方法同实施例 1。

使用方法:

贴敷于膝关节, 于塑料薄膜上将膏药摊成外圆直径 15cm、内圆直径 5cm 的环形, 膏药重约 16 克, 再用塑料薄膜覆盖封实, 固定。对于体型肥胖者, 可于塑料薄膜上将膏药摊成外圆直径 17cm、内圆直径 6cm 的环形, 膏药重约 20 克, 再用塑料薄膜覆盖封实, 固定。

主治:

各种膝关节疾病。

实施例 7:

按下述配比称取原料: 皂刺 50 克、木别(去皮) 100 克、防风 50 克、荆芥 50 克、苏木 50 克、红花 30 克、肉桂 50 克、桃仁 50 克、川芎 50 克、当归 50 克、黄柏 30 克、透骨草 30 克、生地 60 克、白芷 50 克、玄参 50 克、乳香 50 克、没药 50 克、羌活 50 克、独活 50 克、生马钱 60 克、蜀椒 150 克、大风子 200 克、苏子 50 克、胡麻仁 50 克、枸杞子 50 克、决明子 50 克、檀香 50 克、补骨脂(生) 50 克、毕拔 50 克、丁香 50 克、小茴香 50 克、杜仲(生) 60 克、冰片 50 克、樟脑 50 克。

用细砂将生马钱炒至微酥(不要过火, 防药味走失)后与其余诸药按组方配伍成药材混合物; 粉碎药材混合物; 在饲料加工机上过 80 目筛, 得药末。

药袋制作方法:

取 50 克药末装入 15cm × 12cm 的药袋中(药袋与皮肤接触面具有良好通透性); 穿透药袋纵向缝制 8 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布, 留活口, 从活口处塞进一块 15cm × 12cm 的海绵, 封口。

使用方法:

佩戴于膻中穴（位于胸部两乳之间正中），具体做法如下：先做一个一端开口的 16.5cm×13.5cm 布袋，将上述药袋装入其中（布袋一端开口可以便于使用者取出药袋后清洗）。取寸带一条，一头固定于布袋开口端的一角，另一头使用者根据自己的脖颈粗细确定长短后固定于布袋开口端的另一角，使用时从脖子套入，使药袋紧贴于膻中穴。布袋封口端两角各缝制一个半活扣的活结，从两端的活结处穿入 100 厘米寸带一条，系结固定以使药袋贴实皮肤。

主治：

胸痹心痛、咯唾脓血、心悸、心烦、咳嗽、气喘、呃逆、产妇少乳、乳腺炎等。

实施例 8：

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法：

取 30 克药末装入 11cm×30cm 的药袋中（药袋与皮肤接触面具有良好通透性）；穿透药袋纵向缝制 8 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布。

使用方法：

佩戴于前胸，覆盖胸乡穴（胸外侧部第 3 肋间隙，距前正中线 6 寸）、天溪穴（胸外侧部第 4 肋间隙，距前正中线 6 寸）、虚里穴（位于左乳下，心搏动处）、华盖穴（胸部前正中线上，平第 1 肋间）、灵虚穴（位于第 3 肋间隙，前正中线旁开 2 寸处）等胸部重要穴位，具体做法如下：先做一个一端开口的 12.5cm×31.5cm 布袋，将上述药袋装入其中（布袋一端开口可以便于使用者取出药袋后清洗）。取寸带一条，一头固定于布袋开口端的一角，另一头使用者根据自己的脖颈粗细确定长短后固定于布袋开口端的另一角，使用时从脖子套入，使药袋紧贴于膻中穴。布袋封口端两角各缝制一个半活扣的活结，从两端的活结处穿入 100 厘米寸带一条，系结固定以使药袋贴实皮肤。

主治：

胸痹心痛、惊悸、咳嗽、气喘、吐血、失眠、健忘、盗汗、梦遗、癫痫、产妇少乳、噎膈、膨胀等。

实施例 9：

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法:

取 17 克药末装入 9cm×10cm 的药袋中(药袋与皮肤接触面具有良好通透性);穿透药袋纵向缝制 5 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布。

使用方法:

佩戴于大椎穴(位于第七颈椎棘突与第一胸椎棘突之间,约与肩平高),具体做法如下:先做一个一端开口的 10.5cm×11.5cm 布袋,将上述药袋装入其中。取 0.8cm×70cm 松紧带两条,沿对角线方向缝扎在布袋的四角上(要有适当的收缩度),松紧带从两肩挎入佩戴。在腰间配 1.5cm 宽的双层布带一条,于腰围系结固定。取粗绳两条,上端分别系紧于腋窝处的松紧带,垂直下拉两条粗绳使两侧松紧带分别至距离腋窝 20cm 处的肋间,两条粗绳下端均系结固定于腰间布带上。可按需要调整药袋的严实度。

主治:

发热、疟疾、中暑、感冒、癫狂、癫痫、骨蒸、盗汗、咳喘、项强、肺结核、支气管炎等。

实施例 10:

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法:

取 6 克药末装入 5cm×6cm 的药袋中(药袋与皮肤接触面具有良好通透性);穿透药袋纵向缝制 4 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布。

使用方法:

佩戴于儿童的大椎穴(位于第七颈椎棘突与第一胸椎棘突之间,约与肩平高),具体做法如下:先做一个一端开口的 6.5cm×7.5cm 布袋,将上述药袋装入其中。取 0.8cm×40cm 松紧带两条,呈十字缝扎在布袋的四角上(要有适当的收缩度),松紧带从两肩挎入,将腋窝下的松紧带沿肋间下拉直至腰际,系结固定,使药袋覆盖大椎穴。每个月更换一次药袋。

主治:

儿童的发热、疟疾、中暑、感冒、癫狂、癫痫、骨蒸、盗汗、咳喘、项强、肺结核、支气管炎等症状。

实施例 11:

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法：

取 18 克药末装入 10cm×17cm 的药袋中（药袋与皮肤接触面具有良好通透性）；穿透药袋横向缝制 14 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布。

使用方法：

佩戴于后背，特别应覆盖肺俞穴（位于人体背部、第三胸椎棘突下、左右旁开二指宽处，有左右两穴）、厥阴俞（位于人体背部、第五胸椎棘突上、左右二指宽处，有左右两穴）、心俞穴（位于人体背部、第五胸椎棘突下、左右旁开二指宽处，有左右两穴）、膈俞（背部第七胸椎棘突下（至阳）旁开 1.5 寸处，约与肩胛骨下角相平），具体做法如下：先做一个一端开口的 11.5cm×18.5cm 布袋，将上述药袋装入其中。

取松紧带一条，一头固定于布袋开口端的一角，另一头使用者根据自己的身高体型确定长短后固定于布袋同侧封口端的一角，对侧同法。使用时双臂分别挎入药袋两侧的松紧带（药袋开口端朝上），调整药袋位置使之覆盖背部相应穴位。布袋封口端两角各缝制一个半活扣的活结，从两端的活结处穿入 100 厘米寸带一条，系结固定以使药袋贴实皮肤。

主治：

心痛、心悸、胸闷、咳嗽、呕吐、呃逆、噎膈、胸满、胁痛、胃痛、咳血、吐血、贫血、脊背痛、癫狂、肺炎、支气管炎、肺结核等。

实施例 12：

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法：

取 30 克药末装入 10cm×11cm 的药袋中（药袋与皮肤接触面具有良好通透性）；穿透药袋纵向缝制 6 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布。

使用方法：

佩戴于命门穴（位于腰部第二腰椎棘突下），具体做法如下：先做一个一端开口的 11.5cm×12.5cm 布袋，将上述药袋装入其中。在布袋开口端的两角各缝 50cm 长寸带一条，将两条寸带系于腰际，固定药袋覆盖于命门穴。

主治:

阳痿、遗精、月经不调、痛经、带下、久泻痔血、脱肛、急慢性肾炎、支气管炎、腰背痛、肺气肿、肺心病、慢性结肠炎等。

实施例 13:

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法:

取 15 克药末装入 7cm × 9cm 的药袋中(药袋与皮肤接触面具有良好通透性); 穿透药袋纵向缝制 6 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布。

使用方法:

佩戴于儿童命门穴(位于腰部第二腰椎棘突下), 具体做法如下: 先做一个一端开口的 8.5cm × 10.5cm 布袋, 将上述药袋装入其中。在布袋开口端的两角各缝 30cm 长寸带一条, 将两条寸带系于腰际, 固定药袋覆盖于命门穴。

主治:

儿童急慢性肾炎、支气管炎、肺气肿、肺心病、慢性结肠炎、下肢萎痹、发育迟缓等。

实施例 14:

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法:

取 55 克药末装入 11cm × 27cm 的药袋中(药袋与皮肤接触面具有良好通透性); 穿透药袋纵向缝制 5 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布, 留活口, 从活口处塞进一块 10cm × 25cm 的纸板一块以防药袋收缩, 封口。

使用方法:

佩戴于两肾(位于腹后壁腰椎两侧), 特别应覆盖肾俞穴(位于第二腰椎棘突旁开 1.5 寸处, 左右两穴)。具体做法如下: 先做一个 12cm × 50cm 的空布袋, 取 2 个上述药袋装入其中, 布袋封口。成品系于腰际, 使其中两个药袋分别覆盖两肾, 固定。治疗期每三个月更换一次, 维护期每六个月至一年更换一次, 其间如出现硬块, 用手捏碎、晾晒几十分钟即可佩戴。

主治:

遗精, 阳萎, 遗尿, 溺血, 泄泻, 头昏, 目眩, 耳鸣, 耳聋, 虚喘, 月经

不调，赤白带下，痛经，水肿，腰痛，以及肾炎，肾盂肾炎，支气管哮喘，坐骨神经痛，神经衰弱等。

实施例 15:

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法:

取 70 克药末装入 15cm×12cm 的药袋中(药袋与皮肤接触面具有良好通透性); 穿透药袋纵向缝制 15 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布。

使用方法:

佩戴于腹部，特别应覆盖神阙穴(位于脐窝正中)、气海穴(位于前正中线上，脐下 1.5 寸)、关元穴(即丹田，位于前正中线上，脐下 3 寸)和中极穴(位于前正中线上，脐下 4 寸)。具体做法如下:先做一个一端开口的 16.5cm×13.5cm 布袋，将上述药袋装入其中。在布袋开口端的两角各缝 50cm 长寸带一条，将两条寸带系于腰际，固定药袋覆盖腹部。

主治:

阳萎、遗精、遗尿、痛经、月经不调、男性不育、腹胀、腹泻、腹中寒、尿路感染、尿潴留、盆腔炎、虚喘、休克等。

亦有防病保健、强身健体的功效。

实施例 16:

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法:

取 15 克药末装入 7cm×9cm 的药袋中(药袋与皮肤接触面具有良好通透性); 穿透药袋纵向缝制 6 条线以相对固定其中药末。药袋一面扎上一层塑料布。

使用方法:

佩戴于儿童腹部，具体做法如下:先做一个一端开口的 8.5cm×10.5cm 布袋，将上述药袋装入其中。在布袋开口端的两角各缝 30cm 长寸带一条，将两条寸带系于腰际，固定药袋覆盖腹部。

主治:

儿童腹胀、腹泻、腹中寒、体虚、休克等。

实施例 17:

药末原料配比及制作方法同实施例 7。

药袋制作方法:

取约 50 克药末装入鞋垫形状的药袋中(药袋与皮肤接触面具有良好通透性)制成药袋鞋垫,鞋垫大小根据使用者调整;穿透药袋纵向缝制 5 条线、横向缝制 10 条线以相对固定其中药末。

使用方法:

作为鞋垫垫于足下。

主治:

眩晕、昏迷、头痛、高血压、小儿惊风等。

实施例 18:

按下述配比称取原料:皂刺 10 克、木别(去皮) 10 克、防风 10 克、荆芥 10 克、苏木 10 克、红花 10 克、肉桂 10 克、桃仁 10 克、川芎 10 克、当归 10 克、黄柏 10 克、透骨草 5 克、生地 10 克、白芷 5 克、玄参 10 克、乳香 5 克、没药 5 克、羌活 10 克、独活 10 克、生马钱 1000 克,蜀椒 10 克、大风子 10 克、苏子 10 克、胡麻仁 10 克、枸杞子 10 克、决明子 10 克、檀香 10 克、补骨脂(生) 10 克、毕拔 10 克、丁香 10 克、小茴香 10 克、杜仲 10 克、冰片 10 克、樟脑 10 克、蜂蜜适量。

先用细砂将生马钱炒至微酥(不要过火,防药味走失)后与其余诸药按组方配伍成药材混合物;粉碎药材混合物;在饲料加工机上过 60 目筛;过筛后的药末中加入适量蜂蜜并充分搅拌调匀,所加蜂蜜的量以药末不散聚成一体为度;晾干至剩余水分 10%;⑥按常规方法将之切割成每个 0.2 克重和每个 1.0 克重两种规格的药片,分装,密封保存。

使用方法:

①贴敷于玄关穴(即印堂,位于两眉连线正中点),具体做法如下:取 0.2 克重的药片置于直径 2.3cm 的圆形橡皮胶布中心,贴敷。

②贴敷于玄关穴,具体做法如下:将 0.18 克重的药片与 0.02 克重的按实施例 1 所述方法得到的药膏合成(可防汗、防水),成品置于直径 2.3cm 的圆形橡皮胶布中心,贴敷。

主治:

高血压、头痛，眩晕、失眠、目痛、鼻衄、鼻炎、感冒、咳喘、哮喘、小儿急慢惊风、产后晕等，特别是对于高血压和失眠有特效。

实施例 19:

原料配比及制作方法同实施例 16。

使用方法:

贴敷太阳穴（位于眉稍和眼角之间，向后一寸的陷窝处，左右两穴），具体做法如下：取 0.2 克重的药片 1 片，置于直径 2.3cm 的圆形橡皮胶布中心，贴敷。

主治:

头晕、目眩、偏头痛、急性结膜炎、中风血栓等。

亦具有止痛明目、醒脑益智、促进血液循环、消除疲劳的功效。

实施例 20:

原料配比及制作方法同实施例 16。

使用方法:

①贴敷于颈椎（位于颈部后正中发际下），具体做法如下：取 0.2 克重的药片 10 片，分 2 行、每行 5 片顺序置于 5cm×6cm 的橡皮胶布中心，药片之间间距 1.2cm，贴敷。

②贴敷于颈椎，具体做法如下：将 0.18 克重的药片与 0.02 克重的按实施例 1 所述方法得到的药膏合成（可防汗、防水），取上述成品 10 片，分 2 行、每行 5 片顺序置于 5cm×6cm 的橡皮胶布中心，药片之间间距 1.2cm，贴敷。

主治:

水肿、哮喘、怔忡及多种颈椎疾病，对发作性睡病有特效。

实施例 21:

原料配比及制作方法同实施例 16。

使用方法:

贴敷神阙穴（位于脐窝正中，布有第十肋间神经前皮支和腹臂下动、静脉），具体做法如下：取 1.0 克重的药片 1 片，置于直径 7cm 的圆形橡皮胶布中心，贴敷。

主治:

阳萎、痛经、腹胀、腹泻、痢疾、水肿等。

实施例 22:

原料配比及制作方法同实施例 16。

使用方法:

贴敷中极穴(位于前正中线上,脐下4寸),具体做法如下:取1.0克重的药片1片,置于直径7cm的圆形橡皮胶布中心,贴敷。

主治:

尿潴留,遗尿,尿路感染,月经不调,痛经,盆腔炎。对小儿遗尿有特效。

实施例 23:

原料配比及制作方法同实施例 16。

使用方法:

贴敷涌泉穴(位于足底中线的前1/3与中1/3交际处),具体做法如下:制作外圆直径2.2cm、内圆直径1.5cm的环形海绵一块,外面缝一层黑色防雨绸(可防滑),环形内外均用双股线缝制固定。取1.0克重的药片1片置于环形中心,用2.3cm长橡皮胶布两条成十字将成品贴敷于涌泉穴。每隔3至4天可在原药片基础上加贴0.2克重的药片1片,并使新药片贴于皮肤,直至病愈停药。

主治:

心脑血管病、神经衰弱、高血压、精神分裂症、头痛、中暑、失眠、昏厥、休克、小儿惊风、癫痫、衄血、舌干、喉痹、失音、足心热、足底痛、感冒、便秘、肾病等。

实施例 24:

原料配比及制作方法同实施例 16。

使用方法:

①贴敷肩髃穴(位于上臂外展90度时肩峰前缘的凹陷处),具体做法如下:取0.2克重的药片5片,按星形置于直径5cm的圆形橡皮胶布中心,贴敷。

②贴敷肩髃穴,具体做法如下:将0.18克重的药片与0.02克重的按实施例1所述方法得到的药膏合成(可防汗、防水),取上述成品5片,按星形置于直径5cm的圆形橡皮胶布中心,贴敷。

主治：肩关节疼痛、上肢不能抬举、肩周炎等肩部和上臂的病症。并具有防止失眠，改善头部供血、预防脑中风的功效。

实施例 25:

原料配比及制作方法同实施例 16。

使用方法:

①贴敷曲池穴（位于屈肘成直角时肘横纹外侧端与肱骨外上髁连线的中点处）具体做法如下：取 0.2 克重的药片 5 片，按星形置于直径 5cm 的圆形橡皮胶布中心，贴敷。

②贴敷曲池穴，具体做法如下：将 0.18 克重的药片与 0.02 克重的按实施例 1 所述方法得到的药膏合成（可防汗、防水），取上述成品 5 片，按星形置于直径 5cm 的圆形橡皮胶布中心，贴敷。

主治:

热病上肢不遂、手臂肿痛、咽喉肿痛、牙痛、目赤痛、瘰疬、瘾疹、腹痛吐泻、高血压、癫狂等。

实施例 26:

原料配比及制作方法同实施例 16。

使用方法:

①贴敷内关穴（位于前臂正中、腕横纹上 2 寸，挠侧屈腕肌腱同掌长肌腱之间），具体做法如下：取 1.0 克重的药片 1 片，置于直径 2.3cm 的圆形橡皮胶布中心，贴敷。

②贴敷内关穴，具体做法如下：将 0.9 克重的药片与 0.1 克重的按实施例 1 所述方法得到的药膏合成（可防汗、防水），取上述成品置于直径 2.3cm 的圆形橡皮胶布中心，贴敷。

主治:

胸痛、胸闷、心悸、失眠、胃痛、呕吐、呃逆、运动性休克、酒精中毒、晕车等急症。

亦有稳定血压的功效。

实施例 27:

原料配比及制作方法同实施例 16。

使用方法:

①贴敷外关穴（位于前臂背侧阳池与肘尖的连线上、腕背横纹上 2 寸，尺骨与桡骨之间，与内关相对），具体做法如下：取 1.0 克重的药片 1 片，置于直径 2.3cm 的圆形橡皮胶布中心，贴敷。

②贴敷外关穴，具体做法如下：将 0.9 克重的药片与 0.1 克重的按实施例 1 所述方法得到的药膏合成（可防汗、防水），取上述成品置于直径 2.3cm 的圆形橡皮胶布中心，贴敷。

主治:

头痛、颊痛、耳聋、耳鸣、热病、目赤肿痛、胁痛、肩背痛、肘臂屈伸不利、手指疼痛、手颤等。

典型病例:

临床病例一:

张志中，男，76 岁，河北省承德市粮市北山人，商人。冠心病心绞痛，39 岁时曾突然晕倒在厕所，手脸青紫，之后连续二年早搏，右手掌下连续出现四个岛纹，经常胸闷气短，倦怠乏力。70 岁时一日清晨出现左上胸刺痛。治疗：实施例 1 和实施例 2，2 个月后单独用实施例 1 巩固治疗。疗效：用药次日刺痛症状消失；2 个月后胸闷气短症状明显缓解；5 个月后右手掌下岛纹逐渐退化、消失，手掌由原来的紫红变为淡红；至今未复发心绞痛。

临床病例二:

王文惠，男，65 岁，河北省承德市西大街小区人，工人。冠心病心绞痛，上楼喘，高血压，血稠，咳喘，两手掌布满大大小小的岛纹，体重超标。治疗：实施例 9、实施例 12、实施例 24，3 个月后改为实施例 1、实施例 23。疗效：1 个月，浑身无力有所缓解；3 个月，血压正常；5 个月，两手掌的岛纹消失；8 个月，疼痛彻底消失，查血脂正常。

临床病例三:

赵玉梅，女，48 岁，河北省承德市南兴隆小区人，下岗职工。心律不齐，体倦乏力。治疗：实施例 9。疗效：2 个月后痊愈。

临床病例三:

王文俊，男，55 岁，河北省承德市隆化县金沟屯人，农民。医院诊断精神

分裂症、抑郁症，幻得幻失，不出屋，病程3年。治疗：实施例1、实施例9、实施例12、实施例23；3个月后改为实施例9、实施例12。疗效：3个月后逐渐开朗，能外出；2年后痊愈。

临床病例四：

刘玉芝，女，45岁，河北省承德市双峰寺村人，农民。精神病，不能自理，狂跑，病程8年。治疗：实施例7、实施例8、实施例9、实施例17、实施例21、实施例23。疗效：6个月后病情基本得到控制，能自理，能做家务。3年后痊愈。

临床病例五：

张映，男，64岁，河北省承德市人，政协委员。帕金森病，病程5年，逐年加重，手抖腿颤，怕冷，站立时须用人拉双手站起。治疗：实施例7、实施例9、实施例14、实施例17、实施例22、实施例23、实施例8、实施例9、实施例12、实施例21、实施例23、实施例24、实施例25、实施例26、实施例27。疗效：3个月，各种症状减轻；9个月，手抖腿颤基本能控制，能自行站立；3年后痊愈。

临床病例六：

刘瑞，男，66岁，河北省承德市人，市工会干部。帕金森综合病，病程10年多，两腿无力、颤，弓腰，脸色灰暗，白眼球青黄。治疗：实施例6、实施例7、实施例9、实施例14、实施例17、实施例21、实施例23。疗效：3个月，各种症状减轻；9个月，手脚基本不抖；3年后完全治愈。

临床病例七：

王志惠，男，65岁，河北省承德市北山人，商人。癫痫病，不定期发作突然晕倒、四肢抽搐、眼神呆滞、斜视、腹痛。治疗：实施例1、实施例9、实施例12、实施例15、实施例19、实施例21、实施例23。疗效：4个月，各种症状减轻；3年后痊愈。

临床病例八：

胡辉，女，28岁，河北省承德市石洞子沟村人，农民。癫痫病，多于秋冬季节发病，犯病时四肢抽搐，手脚冰凉，病程11年。治疗：实施例7、实施例9、实施例12、实施例17、实施例21、实施例23。疗效：2个月，手脚不凉，

抽搐减轻；3年后痊愈。

临床病例九：

杨慧兰，女，65岁，河北省承德市峡西营小区人，会计。昼夜昏睡，强行支撑才能走路，无精打采，脸色灰暗。治疗：实施例7、实施例12、实施例23。疗效：2个月后痊愈，精神爽朗，面色红润有光泽。

临床病例十：

杨淑兰，女，40岁，河北省承德市铁路小区人，营业员。常在情绪激动、狂笑、焦虑、恐惧时发作猝然倒地。治疗：实施例7、实施例12、实施例17、实施例20。疗效：2个月后痊愈。

临床病例十一：

赵万魁，男，71岁，河北省承德市竹林寺人，小业主。注意力难以集中，易遗忘，出门无目的、忘记回家，腰脚无力，面色暗淡。治疗：实施例7、实施例9、实施例14、实施例23。疗效：3个月后，面色红润有光泽，体力充沛，记忆力增强，能够自己回家。继续用药巩固治疗。

临床病例十二：

王志伟，男，65岁，河北省承德市人南园小区人，工程师。脑萎缩，看报1个小时，眼即干涩，眼花，头晕，四肢无力。治疗：实施例7、实施例9、实施例12、实施例23。疗效：3个月，各种症状明显减轻；9个月，眼干，眼花，头晕，无力完全消失。继续用药巩固治疗。

临床病例十三：

向人楷，男，72岁，河北省承德市南园小区人，高级工程师。读报1小时即感到头晕，眼涩，身无力。治疗：实施例9、实施例12、实施例23。疗效：1个月，上述症状完全消失，面色红润有光泽，精力充沛。

临床病例十四：

王智辉，男，65岁，河北省承德市石油工厂高级工程师。记忆力减退，思维迟钝，几年前的事回想不起来，对新鲜事物不感兴趣，常感冒。治疗：实施例9、实施例12、实施例23。疗效：3个月，上述症状完全消失，体质增强。

临床病例十五：

计淑珍，女，40岁，承德南营小学教师。头晕、痛经、周身无力、面色灰

暗，经常发作精神恍惚，不能备课、讲课。治疗：实施例 9、实施例 14。疗效：2 个月，头晕、痛经症状消失，面色红润有光泽，备课、讲课运用自如。

临床病例十六：

张芝花，女，40 岁，河北省承德市中医院护士。月经不调，赤白带下，痛经，面色灰暗。治疗：实施例 3、实施例 9。疗效：1 个月，上述症状完全消失，面色红润有光泽。

临床病例十七：

张欣，男，10 岁。河北省承德市粮市小区人，学生。面色灰暗，体质差，常感冒，学习成绩差。治疗：实施例 10、实施例 13。疗效：1 个月，面色红润有光泽，精力充沛。至今未患感冒，学习成绩由全班 30 名提升至前 10 名，

临床病例十八：

任玉敏，女，34 岁，河北省邯郸市丛台区人，个体商户。突发嗅觉失灵，病因不明，久治不愈。治疗：实施例 9、实施例 12、实施例 18、实施例 23。疗效：2 个月后嗅觉完全恢复。

临床病例十九：

范玉芝，女，62 岁，河北省承德市北山小区人，教师。堵塞性鼻炎，影响睡眠。治疗：实施例 18、实施例 23。疗效：24 小时，鼻腔通畅，安然入睡。继续用药巩固治疗。

临床病例二十：

赵文芹，女，60 岁，河北省承德市粮市小区人，退休工人。慢性咽炎，咳嗽不出。治疗：实施例 23。疗效：用药次日咽部不适感即减轻，咳痰立出。继续用药巩固治疗。

临床病例二十一：

杨兰英，女，40 岁，河北省承德市承德电视台主持人。感冒后喉腔失音。治疗：实施例 23。疗效：1 个月，喉音恢复，比之前更洪亮有力。继续用药巩固治疗。

临床病例二十二：

冷凤岐，男，65 岁，河北省承德市北山小区人，退休工人。咳喘、哮喘 12 年。活疗：实施例 9、实施例 23。疗效：1 个月，咳、喘症状明显见轻；2 个月，

咳痰立出，上楼不喘。继续用药巩固治疗。

临床病例二十三：

刘淑英，女，10岁，河北省承德市小佟沟人，学生。不怕生人，蹦跳、欢喜动作多，注意力涣散，学习成绩差。治疗：实施例9、实施例23。疗效：2个月，蹦跳、欢喜动作相对减少；6个月，注意力集中，学习认真，成绩提高。继续用药巩固治疗。

临床病例二十四：

柳迎龄，男，12岁，河北省承德市牛圈子村人，学生。任性，易冲动，学习不认真，经常逃学。治疗：实施例7、实施例9、实施例12。疗效：3个月，冲动、任性症状减轻；6个月，学习认真，成绩提高。继续用药巩固治疗。

临床病例二十五：

毕伟，男，3岁，河北省承德市露苑花园。经常尿床，憋不住尿。治疗：实施例7、实施例9、实施例12、实施例16、实施例21。疗效：3个月，憋尿时间逐渐延长；6个月，憋尿正常，不再尿床。