



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107929670 A

(43)申请公布日 2018.04.20

(21)申请号 201711336698.4

(22)申请日 2017.12.14

(71)申请人 吴晓旭

地址 456150 河南省安阳市汤阴县政通东
路208号

(72)发明人 吴晓旭 吴哲 吴春生

(74)专利代理机构 郑州华智星知识产权代理事
务所(普通合伙) 41145

代理人 刘迪

(51)Int.Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61F 9/04(2006.01)

A61P 27/10(2006.01)

A61K 35/618(2015.01)

权利要求书1页 说明书7页

(54)发明名称

一种治疗视力模糊的药物眼罩及其制备方法

(57)摘要

本发明属于中药技术领域,具体涉及一种治疗视力模糊的药物眼罩及其制备方法,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下重量份的原料组成:栀子30~50份、大黄16~30份、郁金16~30份、黄连30~50份、黄芩16~30份、黄药子18~35份、白药子18~35份、没药15~30份、石决明25~40份、草决明25~40份、桑葚叶30~50份;该药物眼罩,配方合理,制药工艺简单,成本低,渗透力强,吸收迅速,抗菌消炎,活血化瘀效果显著,能够促进晶体内血管再生,使视力模糊患者得到治愈,而且,本品是外用型纯中药制品,使用方便,无污染,携带方便,而且药物不直接经过人体脾脏、肝脏的代谢,可直接作用于眼睛部位,起效快,无副作用。

1. 一种治疗视力模糊的药物眼罩,其特征在于,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成: 梔子30~50份、大黄16~30份、郁金16~30份、黄连30~50份、黄芩16~30份、黄药子18~35份、白药子18~35份、没药15~30份、石决明25~40份、草决明25~40份、桑葚叶30~50份。

2. 根据权利要求1所述的治疗视力模糊的药物眼罩,其特征在于,所述的中药组分由以下原料组成: 梔子35~45份、大黄20~25份、郁金20~28份、黄连35~45份、黄芩20~28份、黄药子20~30份、白药子20~30份、没药18~28份、石决明30~35份、草决明30~35份、桑葚叶35~45份。

3. 根据权利要求2所述的治疗视力模糊的药物眼罩,其特征在于,所述的中药组分由以下原料组成: 梔子38份、大黄24份、郁金24份、黄连41份、黄芩23份、黄药子24份、白药子28份、没药22份、石决明32份、草决明31份、桑葚叶38份。

4. 根据权利要求2所述的治疗视力模糊的药物眼罩,其特征在于,所述的中药组分由以下原料组成: 梔子42份、大黄22份、郁金26份、黄连37份、黄芩25份、黄药子28份、白药子25份、没药26份、石决明33份、草决明34份、桑葚叶42份。

5. 根据权利要求1~4任意一项所述的治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤(1):按照所述治疗视力模糊的中药组分的重量配比称取梔子、大黄、郁金、黄连、黄芩、黄药子、白药子、没药、石决明、草决明和桑葚叶,分别清洗干净后,置于烘箱红烘干,烘干温度控制在50℃,烘干后药物的含水率控制在5~9%;

步骤(2):将步骤(1)烘干后的药物分别置于粉碎机中粉碎,然后过200目筛;

步骤(3):将步骤(2)粉碎后的诸药混合均匀,装入网袋中,将盛装有药粉的网袋置于眼罩空腔内,即制成治疗视力模糊的药物眼罩。

6. 根据权利要求5所述的治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,其特征在于,一副眼罩内填充的药物的重量为12~15g。

7. 根据权利要求5所述的治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述的网袋为透气性网袋,药粉盛装于网袋内不漏出。

一种治疗视力模糊的药物眼罩及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域,具体涉及一种治疗视力模糊的药物眼罩及其制备方法。

背景技术

[0002] 视力模糊睛疾病的发病原因主要是脏腑经络生理病变不能协调,致使五脏六腑精气不能上输于目,从而导致眼睛发生病变,患者经常感觉,眼前有东西挡着,看不清楚东西,病因很难确定,常规的治疗眼睛炎症的药物也很难起到作用。

[0003] 有些人采用内服中药的方式来调节体内营养平衡,但是内脏的调节需要一个长期的过程,而且在服药过程中也会损伤肝、肾,近些年来,随着眼罩的结构越来越复杂,在眼罩中设计夹层,在夹层中填充有益成分的设计越来越多,基于此,本发明的发明人设计了一种治疗视力模糊的药物眼罩。

发明内容

[0004] 也为了克服中药损伤肝肾的缺陷,本发明的发明人提供一种治疗视力模糊的药物眼罩及其制备方法,该药物眼罩,配方合理,制药工艺简单,成本低,渗透力强,吸收迅速,抗菌消炎,活血化瘀效果显著,能够促进晶体内血管再生,使视力模糊患者得到治愈,而且,本品是外用型纯中药制品,使用方便,无污染,携带方便,而且药物不直接经过人体脾脏、肝脏的代谢,可直接作用于眼睛部位,起效快,无副作用。

[0005] 本发明采用的技术方案是:

[0006] 一种治疗视力模糊的药物眼罩,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成:栀子30~50份、大黄16~30份、郁金16~30份、黄连30~50份、黄芩16~30份、黄药子18~35份、白药子18~35份、没药15~30份、石决明25~40份、草决明25~40份、桑葚叶30~50份。

[0007] 优选地,上述治疗视力模糊的药物眼罩,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成:栀子35~45份、大黄20~25份、郁金20~28份、黄连35~45份、黄芩20~28份、黄药子20~30份、白药子20~30份、没药18~28份、石决明30~35份、草决明30~35份、桑葚叶35~45份。

[0008] 最优地,上述治疗视力模糊的药物眼罩,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成:栀子38份、大黄24份、郁金24份、黄连41份、黄芩23份、黄药子24份、白药子28份、没药22份、石决明32份、草决明31份、桑葚叶38份;或,栀子42份、大黄22份、郁金26份、黄连37份、黄芩25份、黄药子28份、白药子25份、没药26份、石决明33份、草决明34份、桑葚叶42份。

[0009] 本发明还公开了一种治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,包括如下步骤:

[0010] 步骤(1):按照所述治疗视力模糊的中药组分的重量配比称取栀子、大黄、郁金、黄连、黄芩、黄药子、白药子、没药、石决明、草决明和桑葚叶,分别清洗干净后,置于烘箱红烘

干,烘干温度控制在50℃,烘干后药物的含水率控制在5~9%;

[0011] 步骤(2):将步骤(1)烘干后的药物分别置于粉碎机中粉碎,然后过200目筛;

[0012] 步骤(3):将步骤(2)粉碎后的诸药混合均匀,装入网袋中,将盛装有药粉的网袋置于眼罩空腔内,即制成治疗视力模糊的药物眼罩。

[0013] 进一步,一副眼罩内填充的药物的重量为12~15g。

[0014] 进一步,步骤(3)中,所述的网袋为透气性网袋,药粉盛装于网袋内不漏出。

[0015] 本发明中各味中药的药性如下:

[0016] 栀子:苦,寒,无毒。《别录》曰:大寒。元素曰:气薄味浓,轻清上行,气浮而味降,阳中阴也。主治:五内邪气,胃中热气,面赤酒鼻,白癩、赤癩、疮疡。疗目赤热痛,胸、心、大小肠大热,心中烦闷。去热毒风,除时疾热,解五种黄病,利五淋,通小便,解消渴,明目,主中恶,杀虫毒。解玉支主喑哑,紫癜风。治心烦懊不得眠,脐下血滞而小便不利。泻三焦火,清胃膀胱血,治热厥心痛,解热郁,行结气。治吐血衄血,血痢下血血淋,损伤瘀血,及伤寒劳复,热厥头痛,疝气,烫火伤。

[0017] 大黄:性味:苦,寒。归经:胃经;大肠经;肝经;脾经;功效:1.泻下攻积:用于胃肠实热积滞,大便秘结,腹胀腹痛等。4.清泄湿热:能导湿热从大便而出。主要用于黄疸、淋证等,如<茵陈蒿汤>、<八正散>。主治:实热便秘;热结胸痞;湿热泻痢;黄疸;淋病;水肿腹满;小便不利;目赤;咽喉肿痛;口舌生疮;胃热呕吐;吐血;咯血;衄血;便血;尿血;蓄血;经闭;产后瘀滞腹痛;症瘕积聚;跌打损伤;热毒痈疮;丹毒;烫伤。本药方中采用的大黄是生大黄,以攻积导滞,泻火解毒效好,临床多用于毒热便秘、火毒伤络(吐血、衄血)、眼目赤肿、口舌生疮及热毒痈疽等,也可外用(磨汁研粉)调敷疮疡肿毒;熟大黄泻下力逊,清热化湿力强,多用于湿热内阻之黄疸、淋证及湿热引起的痞满之证。

[0018] 郁金:辛苦,凉。入心、肺、肝经。功用主治:行气解郁,凉血破瘀。治胸腹肋肋诸痛,失心癫狂,热病神昏,吐血,衄血,尿血,血淋,妇女倒经,黄疸。《唐本草》记载:主血积,下气,生肌,止血,破恶血,血淋,尿血,金疮。《本草述》记载:治发热,郁,咳嗽,齿衄,咳嗽血,溲血,头痛眩晕,狂病,滞下,淋,并眼目鼻舌咽喉等证。

[0019] 黄连:苦,寒,无毒。主治:热气,目痛伤泣出,明目,肠腹痛下痢,妇人阴中肿痛。久服令人不忘。主五脏冷热,久下泄脓血,止消渴大惊,除水利骨,调胃浓肠益胆,疗口疮。治五劳七伤,益气,止心腹痛,惊悸烦躁,润心肺,长肉止血,天行热疾,止盗汗并疮疥。猪肚蒸为丸,治小儿疳气,杀虫。羸瘦气急。治郁热在中,烦躁恶心,兀兀欲吐,心下痞满。主心病逆而盛,心积伏梁。《本草经疏》:黄连禀天地清寒之气以生,故气味苦寒而无毒。味厚于气,味苦而厚,阴也。宜其下泄,欲使上行须加引导。入手少阴、阳明,足少阳、厥阴,足阳明、太阴。为病酒之仙药,滞下之神草。六经所至,各有殊功。其主热气,目痛眦伤泪出,明目,大惊益胆者,凉心清肝胆也。肠澼腹痛下痢,《别录》兼主泄瀉。泄者,泻利也;澼者,大肠下血也,俗名为脏毒。除水利骨,厚肠胃,疗口疮者,涤除肠、胃、脾三家之湿热也。久服令人不忘者,心家无火则清,清则明,故不忘。

[0020] 黄芩:苦,平,无毒。《别录》曰:大寒。普曰:神农、桐君、雷公:苦,无毒;李当之:小温。杲曰:可升可降,阴也。好古曰:气寒,味微苦而甘,阴中微阳,入手太阴血分。元素曰:气凉,味苦、甘,气浓味薄,浮而升,阳中阴也,入手少阳、阳明经。酒炒则上行。之才曰:山茱萸、龙骨为之使,恶葱实,畏丹砂、牡丹、藜芦。得浓朴、黄连,止腹痛;得五味子、牡蒙、牡蛎,令人

有子；得黄、白薇、赤小豆，疗鼠。时珍曰：得酒，上行；得猪胆汁，除肝胆火；得柴胡，退寒热；得芍药，治下痢；得桑白皮，泻肺火；得白术，安胎。主治：诸热黄胆，肠泄痢，逐水，下血闭，恶疮疽蚀火疡（《本经》）。疗痰热胃中热，小腹绞痛，消谷，利小肠，女子血闭，淋露下血，小儿腹痛（《别录》）。治热毒骨蒸，寒热往来，肠胃不利，破拥气，治五淋，令人宣畅，去关节烦闷，解热渴。下气，主天行热疾，疗疮排脓，治乳痈发背。凉心，治肺中湿热，泻肺火上逆，疗上热，目中肿赤，瘀血壅盛，上部积血，补膀胱寒水，安胎，养阴退阳。治风热湿热头疼，奔豚热痛，火咳肺痿喉腥，诸失血。

[0021] 黄药子：性平，味苦。功能主治：解毒消肿，化痰散结，凉血止血。用于甲状腺肿大，淋巴结结核，咽喉肿痛，吐血，咯血，百日咳，癌肿；外用治疮疖。《本草经疏》记载：黄药根，解少阴之热，相火自不妄动而喉痹瘳矣。蛇犬咬毒，亦血分受热所伤故也。苦寒能凉血，得土气之厚者，又能解百毒也。《本草汇言》记载：黄药子，解毒凉血最验，古人于外科、血证两方尝用。今入不复用者，因久服有脱发之虞，知其为凉血、散血阴矣。《开宝本草》记载：黄药子，主诸恶肿疮痿，喉痹，蛇犬咬毒，取根研服之，亦含亦涂。《纲目》记载：凉血，降火，消瘿，解毒。

[0022] 白药子：苦辛，凉。功能主治：清热解毒；祛风止痛；凉血止血。主咽喉肿痛；热毒痈肿；风湿痹痛；腹痛；泻痢；吐血；衄血；外伤出血。《本草经疏》记载：白药，味辛，《经》云气温，〈日华子〉云冷，当是辛寒之药无疑，故无毒而能解毒。金疮出血过多必发热，热则作痛，不得生肌矣，凉血清热，则其痛自止，肌自生也。又〈药性论〉、《日华子》二条所主，皆解热散结之功，则其为寒明矣。《药性论》：白药子，治喉中塞热，噎痹不通，胸中隘塞，咽中常痛，肿胀。

[0023] 没药：苦，平，无毒。主治：破血止痛，疗金疮杖疮，诸恶疮痔漏，猝下血，目中翳晕痛肤赤，开破症瘕宿血，损伤瘀血，消肿痛。

[0024] 石决明：1) 有清热、镇静、降血压、拟交感神经的作用。2) 抗感染作用：石决明的提取液对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌的抑菌效力最强。临床应用1) 平肝潜阳上亢，头晕目眩；石决明咸寒清热，质重潜阳，专入肝经，而有平肝阳、清肝热之功，为凉肝、镇肝之要药。用治肝肾阴虚、肝阳眩晕症，常与生地黄、白芍药、牡蛎等养阴、平肝药物配伍；肝阳上亢、肝火亢盛、头晕头痛、烦躁易怒者，可与夏枯草、钩藤、菊花等清热、平肝药物同用。2) 用于目赤、翳障，视物昏花；肝开窍于目，石决明清肝火而明目退翳，为治目疾之常用药。治疗肝火上炎、目赤肿痛，可与夏枯草、决明子、菊花等配伍；治疗风热目赤、翳膜遮睛，可与蝉蜕、菊花、木贼等配伍；阴虚血少之目暗不瞻、雀盲眼花者，每与熟地黄、枸杞子、菟丝子等配伍。

[0025] 草决明：即决明子，味苦、甘、咸，性微寒，入肝、肾、大肠经；润肠通便，降脂明目，治疗便秘及高血脂，高血压。清肝明目，利水通便，有缓泻作用，降血压降血脂。医术对决明子的记载如下：1) 《本草纲目》：“除肝胆风热，淫肤白膜，青盲。”2) 《中华本草》述其应用较为广泛，载曰：“清肝益肾，明目，利水通便。主治目赤肿痛，羞明泪多、青盲、雀目、头痛头晕、视物昏暗、肝硬化腹水、小便不利，习惯性便秘。外治肿毒、癣疾。”3) 《本经》：“治青盲，目淫肤赤白膜，眼赤痛，泪出，久服益精光。”4) 《本草经疏》：“决明子，其味咸平，《别录》益以苦甘微寒而无毒。咸得水气，甘得土气，苦可泄热，平合胃气，寒能益阴泄热，足厥阴肝家正药也。亦入胆肾。肝开窍于目，瞳子神光属肾，故主青盲目淫，肤赤白膜，眼赤痛泪出。《别录》兼疗唇口青。《本经》久服益精光者，益阴泄热、大补肝肾之气所致也。”5) 《本草求真》：“决明子，除风散热。凡人目泪不收，眼痛不止，多属风热内淫，以致血不上行，治当即为驱逐；按此苦能泄

热,咸能软坚,甘能补血,力薄气浮,又能升散风邪,故为治目收泪止痛要药。并可作枕以治头风,但此服之太过,搜风至甚,反招风害,故必合以蒺藜、甘菊、枸杞、生地、女贞实、槐实、谷精草相为补助,则功更胜。谓之决明,即是此意。”6)《本草正义》:“决明子明目,乃滋益肝肾,以镇潜补阴为义,是培本之正治,非如温辛散风,寒凉降热之止为标病立法者可比,最为有利无弊。”

[0026] 桑葚叶:桑葚叶的保健作用:一用于肺热燥咳:本品苦寒清泄肺热,甘寒益阴,凉润肺燥,故可用于燥热伤肺、干咳少痰;二疏散风热:用于风热感冒及目赤肿痛,常配菊花。三清肝明目:用于风火目疾(如急性结膜炎)。配黑芝麻名桑麻丸,用于肝阴不足,肝阳上亢引起的头晕、视物昏花。

[0027] 目前已公认“整体观念”、“辨证施治”、“复方使用”、“复方配伍用药如用兵”是中医最科学最有效的几大优势,其中“复方配伍用药如用兵”是非常科学的中医药原创理论。中医组方中各药如行兵布阵那样环环相扣的严密配伍,是其优于西药配方的有效手段。中医方剂理论认为,每一方剂,不仅需要根据病因病机选择合适的药物妥善配伍,同时也应该符合方剂的基本结构,即“君、臣、佐、使”的组方配伍理论,所谓“君、臣、佐、使”的组方配伍,就是其建立在对疾病病机的全方位判断基础上的科学配比。中医用方通过多环节、多靶点整合调节的生物学机制,可以取得比西药更持久、更绿色天然无毒副作用的治疗效果,而这种疗效是建立在上述中医传统原创理论的正确指导之上的,本发明正遵循了这一原则。

[0028] 君药是指方中治疗主症,起主要治疗作用的药物,按照需要可用一味或几味药。臣药是协助主药或加强主药功效的药物。佐药是协助主药治疗兼症或抑制主药的毒性的药物。使药是引导各药直达病变部位或调和各药的作用。

[0029] 本发明君药:栀子、桑葚叶,泻火除烦、清热利湿、凉血解毒、疏散风热、清肺润燥、平抑肝阳、清肝明目;臣药:黄药子、白药子、黄连,消瘿解毒、喉痹瘕气、疮痈瘰疬泻火;佐药:黄芩、郁金、没药,泻实火除湿热、除气滞淤郁、化郁瘕、走七窍;使药:大黄、石决明、草决明,除湿热壅滞、辅助清火明目。本配方君臣佐使配方合理,相辅相成,能够疏肝解郁、活血通络、疏风清热、清肝明目、缓解疲劳,此外本药物眼罩,直接作用于眼睛部位,患者使用本产品,疗效好,治愈率高。

具体实施方式

[0030] 下面结合实施例对本发明进行进一步说明。

[0031] 实施例1

[0032] 一种治疗视力模糊的药物眼罩,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成:栀子30份、大黄30份、郁金16份、黄连50份、黄芩16份、黄药子35份、白药子18份、没药30份、石决明25份、草决明40份、桑葚叶30份。

[0033] 上述治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,包括如下步骤:

[0034] 步骤(1):按照所述治疗视力模糊的中药组分的重量配比称取栀子、大黄、郁金、黄连、黄芩、黄药子、白药子、没药、石决明、草决明和桑葚叶,分别清洗干净后,置于烘箱红烘干,烘干温度控制在50℃,烘干后药物的含水率控制在5~9%;

[0035] 步骤(2):将步骤(1)烘干后的药物分别置于粉碎机中粉碎,然后过200目筛;

[0036] 步骤(3):将步骤(2)粉碎后的诸药混合均匀,装入网袋中,将盛装有药粉的网袋置于眼罩空腔内,即制成治疗视力模糊的药物眼罩。

[0037] 具体地,一副眼罩内填充的药物的重量为12g。

[0038] 具体地,步骤(3)中,所述的网袋为透气性网袋,药粉盛装于网袋内不漏出。

[0039] 实施例2

[0040] 一种治疗视力模糊的药物眼罩,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成:栀子50份、大黄16份、郁金30份、黄连30份、黄芩30份、黄药子18份、白药子35份、没药15份、石决明40份、草决明25份、桑葚叶50份。

[0041] 上述治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,包括如下步骤:

[0042] 步骤(1):按照所述治疗视力模糊的中药组分的重量配比称取栀子、大黄、郁金、黄连、黄芩、黄药子、白药子、没药、石决明、草决明和桑葚叶,分别清洗干净后,置于烘箱红烘干,烘干温度控制在50℃,烘干后药物的含水率控制在5~9%;

[0043] 步骤(2):将步骤(1)烘干后的药物分别置于粉碎机中粉碎,然后过200目筛;

[0044] 步骤(3):将步骤(2)粉碎后的诸药混合均匀,装入网袋中,将盛装有药粉的网袋置于眼罩空腔内,即制成治疗视力模糊的药物眼罩。

[0045] 具体地,一副眼罩内填充的药物的重量为13g。

[0046] 具体地,步骤(3)中,所述的网袋为透气性网袋,药粉盛装于网袋内不漏出。

[0047] 实施例3

[0048] 一种治疗视力模糊的药物眼罩,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成:栀子35份、大黄25份、郁金20份、黄连45份、黄芩20份、黄药子30份、白药子20份、没药28份、石决明30份、草决明35份、桑葚叶35份。

[0049] 上述治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,包括如下步骤:

[0050] 步骤(1):按照所述治疗视力模糊的中药组分的重量配比称取栀子、大黄、郁金、黄连、黄芩、黄药子、白药子、没药、石决明、草决明和桑葚叶,分别清洗干净后,置于烘箱红烘干,烘干温度控制在50℃,烘干后药物的含水率控制在5~9%;

[0051] 步骤(2):将步骤(1)烘干后的药物分别置于粉碎机中粉碎,然后过200目筛;

[0052] 步骤(3):将步骤(2)粉碎后的诸药混合均匀,装入网袋中,将盛装有药粉的网袋置于眼罩空腔内,即制成治疗视力模糊的药物眼罩。

[0053] 具体地,一副眼罩内填充的药物的重量为14g。

[0054] 具体地,步骤(3)中,所述的网袋为透气性网袋,药粉盛装于网袋内不漏出。

[0055] 实施例4

[0056] 一种治疗视力模糊的药物眼罩,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成:栀子45份、大黄20份、郁金28份、黄连35份、黄芩28份、黄药子20份、白药子30份、没药18份、石决明35份、草决明30份、桑葚叶45份。

[0057] 上述治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,包括如下步骤:

[0058] 步骤(1):按照所述治疗视力模糊的中药组分的重量配比称取栀子、大黄、郁金、黄

连、黄芩、黄药子、白药子、没药、石决明、草决明和桑葚叶,分别清洗干净后,置于烘箱红烘干,烘干温度控制在50℃,烘干后药物的含水率控制在5~9%;

[0059] 步骤(2):将步骤(1)烘干后的药物分别置于粉碎机中粉碎,然后过200目筛;

[0060] 步骤(3):将步骤(2)粉碎后的诸药混合均匀,装入网袋中,将盛装有药粉的网袋置于眼罩空腔内,即制成治疗视力模糊的药物眼罩。

[0061] 具体地,一副眼罩内填充的药物的重量为15g。

[0062] 具体地,步骤(3)中,所述的网袋为透气性网袋,药粉盛装于网袋内不漏出。

[0063] 实施例5

[0064] 一种治疗视力模糊的药物眼罩,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成:栀子38份、大黄24份、郁金24份、黄连41份、黄芩23份、黄药子24份、白药子28份、没药22份、石决明32份、草决明31份、桑葚叶38份。

[0065] 上述治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,包括如下步骤:

[0066] 步骤(1):按照所述治疗视力模糊的中药组分的重量配比称取栀子、大黄、郁金、黄连、黄芩、黄药子、白药子、没药、石决明、草决明和桑葚叶,分别清洗干净后,置于烘箱红烘干,烘干温度控制在50℃,烘干后药物的含水率控制在5~9%;

[0067] 步骤(2):将步骤(1)烘干后的药物分别置于粉碎机中粉碎,然后过200目筛;

[0068] 步骤(3):将步骤(2)粉碎后的诸药混合均匀,装入网袋中,将盛装有药粉的网袋置于眼罩空腔内,即制成治疗视力模糊的药物眼罩。

[0069] 具体地,一副眼罩内填充的药物的重量为15g。

[0070] 具体地,步骤(3)中,所述的网袋为透气性网袋,药粉盛装于网袋内不漏出。

[0071] 实施例6

[0072] 一种治疗视力模糊的药物眼罩,所述的药物眼罩由带空腔的眼罩和置于眼罩空腔内中药组分组成,以重量份计,该中药组分由以下原料组成:栀子42份、大黄22份、郁金26份、黄连37份、黄芩25份、黄药子28份、白药子25份、没药26份、石决明33份、草决明34份、桑葚叶42份。

[0073] 上述治疗视力模糊的药物眼罩的制备方法,包括如下步骤:

[0074] 步骤(1):按照所述治疗视力模糊的中药组分的重量配比称取栀子、大黄、郁金、黄连、黄芩、黄药子、白药子、没药、石决明、草决明和桑葚叶,分别清洗干净后,置于烘箱红烘干,烘干温度控制在50℃,烘干后药物的含水率控制在5~9%;

[0075] 步骤(2):将步骤(1)烘干后的药物分别置于粉碎机中粉碎,然后过200目筛;

[0076] 步骤(3):将步骤(2)粉碎后的诸药混合均匀,装入网袋中,将盛装有药粉的网袋置于眼罩空腔内,即制成治疗视力模糊的药物眼罩。

[0077] 具体地,一副眼罩内填充的药物的重量为15g。

[0078] 具体地,步骤(3)中,所述的网袋为透气性网袋,药粉盛装于网袋内不漏出。

[0079] 病例试验:

[0080] 选取90例视力模糊患者,发病原因为:晶状体退行性改变所致;年龄在50岁以上。

[0081] 90例患者设为对照组1、对照组2和试验组,对照组1、对照组2和实验组各30人,三组临床资料经统计学处理,差异无显著性意义($p>0.05$),具有可比性。

[0082] 典型病例

[0083] 病例1:王某某,由于经常使用电脑,造成视力模糊,患者自述,配带眼睛后,仍然感觉眼前有东西遮挡,看不清楚东西,现在不敢开车,不敢快速走路,不敢去人多的地方,做起事情来非常慢,去医院检查眼睛,也没有发现眼睛有病症出现,采用多种眼药水,都未得到有效治疗,经人介绍,来到我处,给予本发明所述的治疗视力模糊的药物眼罩,于睡前带上,早上取下,三天后患者自述,眼睛舒服多了,眼前的遮挡物感觉消失了大半,又坚持使用一周后,视力模糊症状基本消失,后又坚持使用该眼罩2周,眼睛不干、不涩,可以开车上路了。

[0084] 病例2:位某某,38岁,由于工作中用眼较多,造成视力模糊,眼前经常出现黑影,间歇性出现,去医院检查,医生认为他是气血不足以供养眼周,造成的视力模糊,建议其停止工作一段时间,看是否会得到改善,但是位某休息三周后,眼睛前的黑影出现的概率越来越低,回到工作岗位以后,视力模糊又继续出现,但是位某自述,自己人到中年,上有老,下有小,不能不工作呀,如果他不工作,他的家就断了生活来源了,给予本发明所述的治疗视力模糊的药物眼罩,于睡前带上,早上取下,两周后患者自述,眼睛舒服多了,眼前的黑影感觉消失了大半,又坚持使用一周后,视力模糊症状基本消失,眼前的黑影已基本不出现,在其用药期间,并未停止工作,现在他每周佩戴两次本发明所述的药物眼罩睡觉,坚持了半年,现在停药了,眼前的黑影也未再出现。

[0085] 病例3:王某某,15岁,爱好打游戏,造成视力模糊和高度近视,现在佩戴眼镜,还经常看不清楚东西,不想动手术来调整近视,但是他妈妈讲,如果现在不给他治疗,以后,眼镜度数会越来越多,给予本发明所述的治疗视力模糊的药物眼罩,于睡前带上,早上取下,两周后,视力模糊消失,又继续佩戴两周,去医院检查,眼镜度数有所降低,现在还是使用本发明所述的治疗视力模糊的药物眼罩,他妈妈讲,现在基本已经不需要再使用眼镜了,管着他不要让他打游戏,每天注意眼镜休息,估计能够治疗他的近视呢。

[0086] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要更符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。