



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103463571 A

(43) 申请公布日 2013. 12. 25

(21) 申请号 201310422292. 3

(22) 申请日 2013. 09. 07

(71) 申请人 张玉华

地址 262600 山东省潍坊市临朐县山旺路
21 号临朐县人民医院

(72) 发明人 张玉华 张美芬 马玉玲

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

A61P 1/16(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗妊娠期肝内胆汁淤积症的中药制剂

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗妊娠期肝内胆汁淤积症的中药制剂。中医认为妊娠期肝内胆汁淤积症属“胎毒”范畴,患者胆汁淤积、胆汁酸升高,导致肝功能受损。为此,本发明选择具有清胆利湿,疏肝解郁,健脾利尿,化湿止痒的中药郁金、三白草、川楝子、滇獐牙菜、窄叶飘带草、犁头草、木槿皮、排钱草、山乌柏根、木通、薤白、苎麻根,由我院制剂室制成汤剂,经临床试验,总有效率达到 98.1%,明显优于对照组。

1. 一种治疗妊娠期肝内胆汁淤积症的中药制剂,其特征在于该中药制剂由以下重量份的中药制成:郁金 5-10 份、三白草 15-30 份、川楝子 5-10 份、滇獐牙菜 15-20 份、窄叶飘带草 15-25 份、犁头草 15-25 份、木槿皮 5-15 份、排钱草 10-25 份、山乌柏根 5-10 份、木通 5-10 份、薤白 5-10 份、苎麻根 10-30 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗妊娠期肝内胆汁淤积症的中药制剂,其特征在于该中药制剂由以下重量份的中药制成:郁金 8 份、三白草 20 份、川楝子 8 份、滇獐牙菜 18 份、窄叶飘带草 20 份、犁头草 18 份、木槿皮 10 份、排钱草 20 份、山乌柏根 8 份、木通 8 份、薤白 8 份、苎麻根 20 份。

一种治疗妊娠期肝内胆汁淤积症的中药制剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药组合物,尤其涉及一种治疗妊娠期肝内胆汁淤积症的中药制剂。

背景技术

[0002] 妊娠期肝内胆汁淤积症(ICP)是妊娠中晚期特有的并发症,以皮肤瘙痒、肝内胆汁淤积、黄疸为主要表现,因其围产儿病死率、产后出血率、早产率、胎儿宫内发育受限率高而被列为高危妊娠。病因尚不明确,临床也无一致公认的特效药物。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗妊娠期肝内胆汁淤积症的中药制剂。中医认为妊娠期肝内胆汁淤积症属“胎毒”范畴,患者胆汁淤积、胆汁酸升高,导致肝功能受损。治疗该病以清胆利湿,疏肝解郁,健脾利尿,化湿止痒为主要原则。

[0004] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的,该治疗妊娠期肝内胆汁淤积症的中药制剂由以下重量份的中药制成:郁金 5-10 份、三白草 15-30 份、川楝子 5-10 份、滇獐牙菜 15-20 份、窄叶飘带草 15-25 份、犁头草 15-25 份、木槿皮 5-15 份、排钱草 10-25 份、山乌柏根 5-10 份、木通 5-10 份、薤白 5-10 份、苈麻根 10-30 份。

[0005] 优选的,郁金 8 份、三白草 20 份、川楝子 8 份、滇獐牙菜 18 份、窄叶飘带草 20 份、犁头草 18 份、木槿皮 10 份、排钱草 20 份、山乌柏根 8 份、木通 8 份、薤白 8 份、苈麻根 20 份。

[0006] 制备方法将上述中药水煎制成汤剂。

[0007] 方中:郁金行气化瘀,清心解郁,利胆退黄;三白草清利湿热,退黄疸;川楝子舒肝行气止痛;滇獐牙菜清肝利胆,清热祛湿;窄叶飘带草、犁头草、木槿皮清热利湿,解毒止痒;排钱草、山乌柏根利水通便,去瘀止痒;木通清热利尿,活血通脉;薤白通阳散结,行气导滞;苈麻根清热凉血、解毒安胎。

[0008] 临床资料

[0009] 1. 一般资料 2009 年 1 月-2012 年 1 月我院收治妊娠期肝内胆汁淤积症患者 105 例,随机分成两组,治疗组 52 例,年龄 22~37 岁,平均 26.5 岁,发病孕周 25~37 周,平均 35 周;对照组 53 例,年龄 21~36 岁,平均 26.1 岁,发病孕周 26~39 周,平均 35.5 周。两组患者均有皮肤瘙痒和黄疸症状。两组患者在年龄、病程方面比较差异无显著性意义($P>0.05$),具有可比性。

[0010] 2. 诊断标准采用 1999 年《中华妇产科学》妊娠期肝内胆汁淤积症的诊断标准:(1) 妊娠期出现皮肤瘙痒症状。(2) 总胆汁酸(TBA)水平、甘胆酸水平显著增高最高达正常的 100 倍。(3) 肝功能异常,谷丙转氨酶、谷草转氨酶轻度升高。(4) 可伴有轻度黄疸,血清胆红素约为 $2.0 \sim 19 \mu\text{mol} / \text{L}$ 。(5) 一般情况良好,无明显呕吐、食欲不振等。(6) 分娩后瘙痒、黄疸消退,肝功能迅速恢复正常。

[0011] 3. 治疗方法治疗组患者服用本发明所述的中药制剂,称取郁金 8g、三白草 20g、川

楝子 8g、滇獐牙菜 18g、窄叶飘带草 20g、犁头草 18g、木槿皮 10g、排钱草 20g、山乌柏根 8g、木通 8g、薤白 8g、苈麻根 20g, 将上述中药水煎成汤剂, 每日一剂, 分早晚 2 次服用; 对照组采用口服熊去氧胆酸 200mg, 每日 2 次, 鲁米那 0.03mg, 每日 3 次。两组均 7 日为一个疗程, 连续治疗两个疗程统计疗效。

[0012] 4. 疗效标准痊愈: 瘙痒消失, 血清 TBA $<10\mu\text{mol} / \text{L}$; 显效: 瘙痒消失, TBA 比原值降低 2 / 3 以上, 但未恢复正常; 有效: 瘙痒消失或明显减轻, TBA 比原值降低 1 / 2 以上, 不及 2 / 3; 无效: 瘙痒无改善, TBA 降低不明显。

[0013] 5. 治疗效果两组治疗两个疗程后疗效比较, 治疗组 52 例, 其中治愈 35 例 (67.3%); 显效 13 例 (25%), 有效 3 例 (5.8%), 无效 1 例 (1.9%), 总有效率 98.1%; 对照组 53 例, 其中治愈 24 例 (45.3%); 显效 11 例 (20.7%), 有效 9 例 (17%), 无效 9 例 (17%), 总有效率 83%。两组比较, 治疗组治愈率、总有效率明显优于对照组, 具有可比性。 $P<0.05$ 。

具体实施方式

[0014] 实施例一: 称取郁金 8g、三白草 20g、川楝子 8g、滇獐牙菜 18g、窄叶飘带草 20g、犁头草 18g、木槿皮 10g、排钱草 20g、山乌柏根 8g、木通 8g、薤白 8g、苈麻根 20g, 将上述中药水煎成汤剂。

[0015] 实施例二: 称取郁金 5g、三白草 15g、川楝子 10g、滇獐牙菜 15g、窄叶飘带草 25g、犁头草 15g、木槿皮 5g、排钱草 25g、山乌柏根 5g、木通 10g、薤白 10g、苈麻根 10g, 将上述中药水煎成汤剂。

[0016] 实施例三: 称取郁金 10g、三白草 30g、川楝子 5g、滇獐牙菜 20g、窄叶飘带草 15g、犁头草 25g、木槿皮 15g、排钱草 10g、山乌柏根 10g、木通 5g、薤白 5g、苈麻根 30g, 将上述中药水煎成汤剂。