



(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公告本

(11)證書號數：TW I877262 B

(45)公告日：中華民國 114 (2025) 年 03 月 21 日

(21)申請案號：109142852

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 12 月 04 日

(51)Int. Cl.：

C07D281/10 (2006.01)**A61K31/554 (2006.01)****A61P3/00 (2006.01)****A61P9/00 (2006.01)****A61P1/00 (2006.01)**

(30)優先權：2019/12/04 印度

201911049985

(71)申請人：瑞典商艾爾比瑞歐公司(瑞典) ALBIREO AB (SE)

瑞典

(72)發明人：吉博格 玻 高瑞 GILLBERG, PER-GORAN (SE)；史塔克 英吉馬 STARKE, INGEMAR (SE)；可卡尼 聖托斯 S KULKARNI, SANTOSH S. (IN)

(74)代理人：陳長文

(56)參考文獻：

WO 02/50051A1

WO 99/35135

審查人員：徐永任

申請專利範圍項數：23 項 圖式數：0 共 209 頁

(54)名稱


苯并噻氮呋化合物及其作為膽酸調節劑之用途

(57)摘要

本發明係關於式(I)之 1,5-苯并噻氮呋衍生物。此等化合物為具有小腸頂區鈉依賴性膽酸轉運蛋白(ASBT)及/或肝臟膽酸轉運(LBAT)抑制活性之膽酸調節劑。本發明亦關於包含此等化合物之醫藥組合物，以及此等化合物在治療心血管疾病、脂肪酸代謝及葡萄糖利用病症、胃腸道疾病及肝病中之用途。

The invention relates to 1,5-benzothiazepine derivatives of formula (I). These compounds are bile acid modulators having apical sodium-dependent bile acid transporter (ASBT) and/or liver bile acid transport (LBAT) inhibitory activity. The invention also relates to pharmaceutical compositions comprising these compounds and to the use of these compounds in the treatment of cardiovascular diseases, fatty acid metabolism and glucose utilization disorders, gastrointestinal diseases and liver diseases.

特徵化學式：





I877262

【發明摘要】

【中文發明名稱】

苯并噻氮呋化合物及其作為膽酸調節劑之用途

【英文發明名稱】

BENZOTHIAZEPINE COMPOUNDS AND THEIR USE AS BILE ACID MODULATORS

【中文】

本發明係關於式(I)之1,5-苯并噻氮呋衍生物。此等化合物為具有小腸頂區鈉依賴性膽酸轉運蛋白(ASBT)及/或肝臟膽酸轉運(LBAT)抑制活性之膽酸調節劑。本發明亦關於包含此等化合物之醫藥組合物，以及此等化合物在治療心血管疾病、脂肪酸代謝及葡萄糖利用病症、胃腸道疾病及肝病中之用途。

【英文】

The invention relates to 1,5-benzothiazepine derivatives of formula (I). These compounds are bile acid modulators having apical sodium-dependent bile acid transporter (ASBT) and/or liver bile acid transport (LBAT) inhibitory activity. The invention also relates to pharmaceutical compositions comprising these compounds and to the use of these compounds in the treatment of cardiovascular diseases, fatty acid metabolism and glucose utilization disorders, gastrointestinal diseases and liver diseases.


【指定代表圖】

無

【代表圖之符號簡單說明】

無

【特徵化學式】



(I)

【發明說明書】

【中文發明名稱】

苯并噻氮呋化合物及其作為膽酸調節劑之用途

【英文發明名稱】

BENZOTHIAZEPINE COMPOUNDS AND THEIR USE AS BILE ACID MODULATORS

【技術領域】

【0001】 本發明係關於式(I)之1,5-苯并噻氮呋衍生物。此等化合物為具有小腸頂區鈉依賴性膽酸轉運蛋白(ASBT)及/或肝臟膽酸轉運(LBAT)抑制活性之膽酸調節劑。本發明亦關於包含此等化合物之醫藥組合物，以及此等化合物在治療心血管疾病、脂肪酸代謝及葡萄糖利用病症、胃腸道疾病及肝病中之用途。

【先前技術】

【0002】 膽酸為生理清潔劑，其在腸道吸收及脂質、營養物及維生素之運輸中起重要作用。其亦為信號傳導分子，活化核受體及調節脂質、葡萄糖及能量代謝之細胞信號傳導路徑。膽酸為類固醇酸，其由肝臟中之膽固醇合成且以混合微胞形式儲存於膽囊中。在消化期間，十二指腸觸發引起膽囊收縮之激素的釋放，從而在小腸中釋放膽酸，其使得能夠在小腸中吸收脂溶性維生素及膽固醇。當其到達迴腸時，膽酸自腸道再吸收且分泌至門靜脈血液中，經由門靜脈循環返回肝臟。因此，超過90%之膽酸再循環且返回肝臟。此等膽酸隨後轉運穿過肝細胞之竇狀隙膜且穿過小管膜再分泌至膽汁中。在此第一遍中，75-90%之膽酸由肝細胞吸收，完成一輪腸肝循環。逃脫肝臟清除之膽酸部分進入全身循環，其中游離膽酸由腎

小球過濾，在近端小管中有效回收且輸出回全身循環。有趣的是，大多數穿過小管膜分泌至膽汁中之膽酸來源於再循環池，而少於10%來自新的重新肝臟合成。在迴腸中未被再吸收之小部分膽酸到達結腸。在腸腔內，初級膽酸在腸道細菌之作用下轉化成次級膽酸，主要藉由類固醇核之單或雙脫氫基反應。逃脫腸道吸收之膽酸此後排泄至糞便中。

【0003】 總體而言，有效的轉運系統有助於維持恆定的膽酸池，確保腸道中足夠高水準之結合膽酸，以促進脂質吸收以及減少小腸細菌負荷。該系統亦藉由消除潛在的細胞毒性清潔劑而使糞便及尿膽酸損失降至最低且保護腸道及肝膽區室(如由Kosters及Karpen (Xenobiotica 2008, 第38卷, 第1043-1071頁)；Chiang (J. Lipid Res. 2009, 第50卷, 第1955-1966頁)；及Dawson (Handb. Exp. Pharmacol. 2011, 第201卷, 第169-203頁)所綜述)。

【0004】 已發現膽酸池大小之調節藉由肝臟將膽固醇轉化為膽酸而在膽固醇恆定中起關鍵作用，其代表自身體消除膽固醇之主要途徑。肝臟在自身體移除內源性及外來生物化合物中起至關重要的作用。正常的肝膽分泌及腸肝循環為自身體消除內源性化合物諸如膽固醇及膽紅素及其代謝物所必需的，從而維持脂質及膽酸恆定。(Kosters及Karpen, Xenobiotica 2008, 第38卷, 第1043-1071頁)。

【0005】 迴腸中膽酸之再吸收可藉由小腸頂區鈉依賴性膽酸轉運蛋白(ASBT)抑制劑化合物來抑制。已報導抑制膽酸再吸收適用於治療數種疾病，包括血脂異常、糖尿病、肥胖症、便秘、膽汁鬱積性肝病、非酒精性脂肪變性肝炎及其他肝病。在過去數十年中已揭示多種ASBT抑制劑化合物，參見例如WO 93/16055、WO 94/18183、WO 94/18184、WO

96/05188、WO 96/08484、WO 96/16051、WO 97/33882、WO
 98/03818、WO 98/07449、WO 98/40375、WO 99/35135、WO
 99/64409、WO 99/64410、WO 00/47568、WO 00/61568、WO
 00/38725、WO 00/38726、WO 00/38727、WO 00/38728、WO
 00/38729、WO 01/66533、WO 01/68096、WO 02/32428、WO
 02/50051、WO 03/020710、WO 03/022286、WO 03/022825、WO
 03/022830、WO 03/061663、WO 03/091232、WO 03/106482、WO
 2004/006899、WO 2004/076430、WO 2007/009655、WO
 2007/009656、WO 2011/137135、WO 2019/234077、WO
 2020/161216、WO 2020/161217、DE 19825804、EP 864582、EP
 489423、EP 549967、EP 573848、EP 624593、EP 624594、EP
 624595、EP 624596、EP 0864582、EP 1173205、EP 1535913及EP
 3210977。

【0006】 儘管先前已報導許多ASBT抑制劑化合物，但仍需要額外的膽酸調節化合物，其在效力、選擇性及生物可用性方面具有最佳化特徵。

【發明內容】

【實施方式】

【0007】


相關申請案之交叉引用

本申請案主張2019年12月4日申請之印度申請案第201911049985號之優先權，其揭示內容以全文引用之方式併入本文中。

【0008】 已發現某些1,5-苯并噻氮呋衍生物為小腸頂區鈉依賴性膽

酸轉運蛋白(ASBT)及/或肝臟膽酸轉運蛋白(LBAT)之有效抑制劑，且可適用於治療需要抑制膽酸循環之疾病。

【0009】 在第一態樣中，本發明係關於一種式(I)化合物



其中

R^1 及 R^2 各自獨立地為 C_{1-4} 烷基；

R^3 獨立地選自由以下組成之群：氫、鹵素、羥基、 C_{1-4} 烷基、 C_{1-4} 鹵烷基、 C_{1-4} 烷氧基、 C_{1-4} 鹵烷氧基、氰基、硝基、胺基、 N -(C_{1-4} 烷基)胺基、 N,N -二(C_{1-4} 烷基)胺基及 N -(芳基- C_{1-4} 烷基)胺基；

n 為整數1、2或3；

R^4 係選自由以下組成之群：氫、鹵素、羥基、氰基、 C_{1-4} 烷基、 C_{3-6} 環烷基、 C_{1-4} 烷氧基、 C_{3-6} 環烷氧基、 C_{1-4} 烷硫基、 C_{3-6} 環烷硫基、胺基、 N -(C_{1-4} 烷基)胺基及 N,N -二(C_{1-4} 烷基)胺基；

或其醫藥學上可接受之鹽，

其限制條件為該化合物並非來自由以下組成之群的化合物：

2-((3,3-二丙基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-5-(4-氯苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四

氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-甲氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-異丙氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-甲氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((7-溴-3,3-二丁基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；及

2-((7-溴-3-丁基-3-乙基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸。

【0010】 在一些實施例中， R^1 為正丁基。


【0011】 在一些實施例中， R^2 為 C_{2-4} 烷基。在一較佳實施例中， R^2 為乙基。在另一較佳實施例中， R^2 為正丙基。在另一較佳實施例中， R^2 為正丁基。

【0012】 在一些實施例中， R^3 獨立地選自由以下組成之群：氫、鹵素、羥基、氰基、 C_{1-4} 鹵烷基、 C_{1-4} 烷氧基及 C_{1-4} 鹵烷氧基。在一較佳實施例中， R^3 獨立地選自由以下組成之群：氫、氟、氯、溴、羥基、氰基、三氟甲基、甲氧基及三氟甲氧基。

【0013】 在一較佳實施例中， n 為1，亦即苯基環僅經一個取代基 R^3 取代。在另一較佳實施例中， R^3 在對位。

【0014】 在一些實施例中， R^4 係選自由以下組成之群：鹵素、羥基、氰基、 C_{1-4} 烷基、 C_{1-4} 烷氧基、 C_{1-4} 烷硫基、胺基、 N -(C_{1-4} 烷基)胺基及 N,N -二(C_{1-4} 烷基)胺基。在一較佳實施例中， R^4 係選自由以下組成之群：氟、氯、溴、羥基、氰基、甲基、甲氧基、乙氧基、甲硫基、乙硫基、胺基、甲胺基及二甲胺基。在另一較佳實施例中， R^4 係選自由以下組成之群：氟、氯、溴、羥基、氰基、甲氧基、乙氧基、甲硫基、乙硫基及二甲胺基。

【0015】 在一較佳實施例中，式(I)化合物為式(I-a)化合物



其中

R^2 為 C_{2-4} 烷基；

R^3 獨立地選自由以下組成之群：氫、鹵素、羥基、氰基、 C_{1-4} 鹵烷基、 C_{1-4} 烷氧基及 C_{1-4} 鹵烷氧基；

n 為整數1或2；

R^4 係選自由以下組成之群：鹵素、羥基、氰基、 C_{1-4} 烷基、 C_{1-4} 烷氧基、 C_{1-4} 烷硫基、胺基、 N -(C_{1-4} 烷基)胺基及 N,N -二(C_{1-4} 烷基)胺基；

或其醫藥學上可接受之鹽，

其限制條件為該化合物並非來自由以下組成之群的化合物：

2-((3,3-二丁基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-5-(4-氯苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-甲氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；


2-((3-丁基-3-乙基-7-異丙氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-甲氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((7-溴-3,3-二丁基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；及

2-((7-溴-3-丁基-3-乙基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸。

【0016】 在另一較佳實施例中，式(I)化合物為式(I-b)化合物



其中

R²為乙基、正丙基或正丁基；

R^3 係選自由以下組成之群：氫、氟、氯、溴、羥基、氰基、三氟甲基、甲氧基及三氟甲氧基；

R^4 係選自由以下組成之群：氟、氯、溴、羥基、氰基、甲氧基、乙氧基、甲硫基、乙硫基及二甲胺基；

或其醫藥學上可接受之鹽，

其限制條件為該化合物並非來自由以下組成之群的化合物：

2-((3,3-二丁基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-5-(4-氯苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-甲氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-甲氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((7-溴-3,3-二丁基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；及

2-((7-溴-3-丁基-3-乙基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸。

【0017】 本發明之較佳化合物為如上文所定義之式(I-b)化合物，其中M及 R^1 至 R^4 係如下表1中所指示，或其醫藥學上可接受之鹽：

表1

R ²	R ³	R ⁴
CH ₂ CH ₃	H	SCH ₃
CH ₂ CH ₃	F	SCH ₃
CH ₂ CH ₃	OCH ₃	SCH ₃
CH ₂ CH ₃	OH	SCH ₃
CH ₂ CH ₃	Cl	SCH ₃
CH ₂ CH ₃	CN	SCH ₃
CH ₂ CH ₃	CF ₃	SCH ₃
CH ₂ CH ₃	H	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₃	F	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₃	OCH ₃	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₃	OH	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₃	Cl	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₃	CN	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₃	CF ₃	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₃	H	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₃	F	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₃	OCH ₃	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₃	OH	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₃	Cl	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₃	CN	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₃	CF ₃	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	H	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	F	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	OH	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	Cl	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	CN	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	CF ₃	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	H	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₃	F	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₃	OH	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₃	Cl	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₃	CN	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₃	CF ₃	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₃	H	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	F	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	OH	SCH ₂ CH ₃

R ²	R ³	R ⁴
CH ₂ CH ₂ CH ₃	Cl	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	CN	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₃	CF ₃	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	H	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	F	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	OH	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Cl	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	CN	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	CF ₃	SCH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	H	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	F	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	OH	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Cl	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	CN	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	CF ₃	N(CH ₃) ₂
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	H	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	F	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	OCH ₃	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	OH	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	Cl	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	CN	SCH ₂ CH ₃
CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃	CF ₃	SCH ₂ CH ₃

【0018】 在一具體實施例中，式(I)化合物係選自由以下組成之群：

2-((3,3-二丁基-7-(二甲胺基)-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((5-(4-溴苯基)-3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

(S)-2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

(R)-2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-氟基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-氯-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

(S)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

(R)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-

2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

(S)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；及

(R)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸；

或其醫藥學上可接受之鹽。

【0019】 如本文所用，術語「鹵基」係指氟基、氯基、溴基及碘基。

【0020】 如本文所用，術語「C₁₋₆烷基」係指具有1至6個碳原子之直鏈或分支鏈烷基，且術語「C₁₋₄烷基」係指具有1至4個碳原子之直鏈或分支鏈烷基。C₁₋₄烷基之實例包括甲基、乙基、正丙基、異丙基、正丁基、異丁基、第二丁基及第三丁基。

【0021】 如本文所用，術語「C₁₋₄鹵烷基」係指如本文所定義之直鏈或分支鏈C₁₋₄烷基，其中一或多個氫原子已經鹵素置換。C₁₋₄鹵烷基之實例包括氯甲基、氟乙基及三氟甲基。

【0022】 如本文所用，術語「C₁₋₄烷氧基」及「C₁₋₄烷硫基」係指分別經由氧或硫原子與分子之其餘部分連接的直鏈或分支鏈C₁₋₄烷基。

【0023】 如本文所用，術語「C₃₋₆環烷基」係指具有3至6個碳原子之單環飽和烴環。C₃₋₆環烷基之實例包括環丙基、環丁基、環戊基及環己

基。

【0024】術語「芳基」表示由6個碳原子構成之芳族單環或由10個碳原子構成之芳族雙環系統。芳基之實例包括苯基、萘基及蒽基。

【0025】術語「胺基」係指-NH₂基團。如本文所用，術語「*N*-(C₁₋₄烷基)胺基」及「*N,N*-二(C₁₋₄烷基)胺基」係指一個或兩個氫原子分別經直鏈或分支鏈C₁₋₄烷基置換之胺基。*N*-(C₁₋₄烷基)胺基之實例包括甲胺基、乙胺基及第三丁胺基，且*N,N*-二(C₁₋₄烷基)胺基之實例包括二甲胺基及二乙胺基。

【0026】如本文所用，術語「*N*-(芳基-C₁₋₄烷基)胺基」係指氫原子經芳基-C₁₋₄烷基置換之胺基。*N*-(芳基-C₁₋₄烷基)胺基之實例包括苯甲基胺基及苯乙基胺基。

【0027】如本文所用，術語「醫藥學上可接受」係指適用於人類醫藥用途且一般為安全、無毒、既非生物學上亦非其他方面不合需要的彼等化合物、物質、組合物及/或劑型。

【0028】如本文所用，術語「約」係指本文中之值或參數，包括(及描述)針對該值或參數本身之實施例。舉例而言，提及「約20」之描述包括「20」之描述。數值範圍包括界定該範圍之數值。一般而言，術語「約」係指變數之指定值及變數在指定值之實驗誤差內(例如，在平均值之95%信賴區間內)或在指定值之10%內的所有值，以較大者為準。

【0029】式(I)之1,5-苯并噻氮吡化合物或其醫藥學上可接受之鹽為小腸頂區鈉依賴性膽酸轉運蛋白之抑制劑(ASBT抑制劑)、肝臟膽酸轉運蛋白之抑制劑(LBAT抑制劑)或小腸頂區鈉依賴性膽酸及肝臟膽酸轉運體兩者之抑制劑(雙重ASBT/LBAT抑制劑)。因此，其適用於治療或預防需

要抑制膽酸循環之病況、病症及疾病，諸如心血管疾病、脂肪酸代謝及葡萄糖利用病症、胃腸道疾病及肝病。

【0030】 心血管疾病以及脂肪酸代謝及葡萄糖利用病症包括但不限于於高膽固醇血症；脂肪酸代謝病症；1型及2型糖尿病；糖尿病之併發症，包括白內障、微血管疾病及大血管疾病、視網膜病變、神經病變、腎病變及傷口癒合延遲、組織缺血、糖尿病足、動脈硬化、心肌梗塞、急性冠狀動脈症候群、不穩定型心絞痛、穩定型心絞痛、中風、周邊動脈阻塞疾病、心肌病、心臟衰竭、心律不整及血管再狹窄；糖尿病相關疾病，諸如胰島素抗性(葡萄糖恆定受損)、高血糖症、高胰島素血症、脂肪酸或甘油之血液含量升高、肥胖症、血脂異常、包括高三酸甘油酯血症之高脂質血症、代謝症候群(症候群X)、動脈粥樣硬化及高血壓；及用於增加高密度脂蛋白含量。

【0031】 胃腸道疾病及病症包括便秘(包括慢性便秘、功能性便秘、慢性特發性便秘(CIC)、間歇性/偶發性便秘、因糖尿病繼發之便秘、因中風繼發之便秘、因慢性腎病繼發之便秘、因多發性硬化症繼發之便秘、因帕金森氏病(Parkinson's disease)繼發之便秘、因全身性硬化症繼發之便秘、藥物誘發之便秘、伴有便秘之大腸急躁症(IBS-C)、混合型大腸急躁症(IBS-M)、小兒功能性便秘及類鴉片誘發之便秘)；克羅恩氏病(Crohn's disease)；原發性膽酸吸收障礙；大腸急躁症(IBS)；發炎性腸病(IBD)；迴腸發炎；及逆流性疾病及其併發症，諸如巴雷特氏食道(Barrett's esophagus)、膽汁逆流性食道炎及膽汁逆流性胃炎。

【0032】 如本文所定義之肝病為肝臟及與其連接之器官(諸如胰臟、門靜脈、肝實質、肝內膽道、肝外膽道及膽囊)中之任何疾病。在一些情

況下，肝病為膽酸依賴性肝病。肝臟疾病及病症包括但不限於遺傳性肝臟代謝病症；膽酸合成之先天性錯誤；先天性膽管異常；膽道閉鎖；葛西術後膽道閉鎖(post-Kasai biliary atresia)；肝移植術後膽道閉鎖；新生兒肝炎；新生兒膽汁鬱積；遺傳性膽汁鬱積；腦腱性黃瘤病；次級BA合成缺陷；齊薇格氏症候群(Zellweger's syndrome)；囊腫性纖維化相關肝病； α 1-抗胰蛋白酶缺乏症；阿拉傑里症候群(Alagilles syndrome, ALGS)；拜勒症候群(Byler syndrome)；初級膽酸(BA)合成缺陷；進行性家族性肝內膽汁鬱積(PFIC)，包括PFIC-1、PFIC-2、PFIC-3及非特異性PFIC、膽汁分流術後PFIC及肝移植術後PFIC；良性復發性肝內膽汁鬱積(BRIC)，包括BRIC1、BRIC2及非特異性BRIC、膽汁分流術後BRIC及肝移植術後BRIC；自體免疫肝炎；原發性膽汁性肝硬化(PBC)；肝纖維化；非酒精性脂肪肝病(NAFLD)；非酒精性脂肪變性肝炎(NASH)；門靜脈高血壓；膽汁鬱積；唐氏症候群膽汁鬱積(Down syndrome cholestasis)；藥物誘發性膽汁鬱積；妊娠肝內膽汁鬱積(妊娠期黃疸)；肝內膽汁鬱積；肝外膽汁鬱積；非經腸式營養相關膽汁鬱積(PNAC)；低磷脂相關膽汁鬱積；淋巴水腫膽汁鬱積症候群1 (LSC1)；原發性硬化性膽管炎(PSC)；免疫球蛋白G4相關膽管炎；原發性膽汁性膽管炎；膽石症(膽結石)；膽道結石；輸膽管結石；膽石性胰臟炎；卡羅利病(Caroli disease)；膽管惡性腫瘤；惡性腫瘤導致膽道梗阻；膽道狹窄；AIDS膽管病；缺血性膽管病；膽汁鬱積或黃疸引起之搔癢病；胰臟炎；慢性自體免疫肝病導致進行性膽汁鬱積；肝臟脂肪變性；酒精性肝炎；急性脂肪肝；妊娠脂肪肝；藥物誘發性肝炎；鐵過載症；先天性膽酸合成缺陷1型(BAS 1型)；藥物誘發性肝損傷(DILI)；肝纖維化；先天性肝纖維化；肝硬化；蘭格漢氏細胞組織細胞增

生症(Langerhans cell histiocytosis, LCH)；新生兒魚鱗癬硬化性膽管炎(NISCH)；紅血球生成性原卟啉症(EPP)；特發性成人期膽管缺失症(IAD)；特發性新生兒肝炎(INH)；非症候型小葉間膽管缺乏(NSPILBD)；北美印第安兒童期肝硬化(NAIC)；肝結節病；澱粉樣變性；壞死性小腸結腸炎；血清膽酸引起之毒性，包括血清膽酸分佈型態異常之心律不整(例如心房微顫)、與肝硬化相關之心肌病(「膽心病」)及與膽汁鬱積性肝病相關之骨骼肌萎縮；多囊性肝病；病毒性肝炎(包括A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎及E型肝炎)；肝細胞癌(肝癌)；膽管癌；膽酸相關之胃腸道癌症；及由肝臟、膽道及胰臟腫瘤及贅瘤引起之膽汁鬱積。式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽亦適用於增強肝臟疾病之皮質類固醇療法。

【0033】可藉由式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽治療或預防之其他疾病包括超吸收症候群(包括無 β 脂蛋白血症、家族性低 β 脂蛋白血症(FHBL)、乳糜微粒滯留病(CRD)及植固醇血症)；維生素過多症及骨質石化病；高血壓；腎小球高濾過；多囊性腎病(PKD) (包括體染色體顯性多囊性腎病(ADPKD)及體染色體隱性多囊性腎病(ARPKD))；及腎衰竭之搔癢病。化合物亦適用於對肝臟疾病或代謝疾病相關腎損傷的保護措施中。

【0034】人體內膽酸之轉運受SLC10溶質載體蛋白家族成員之作用控制，尤其 Na^+ -牛膽酸鹽協同轉運多肽(NTCP，亦稱為肝臟膽酸轉運蛋白(LBAT)；基因符號*SLC10A1*)，其在肝細胞之竇狀隙膜中表現；及小腸頂區鈉依賴性膽酸轉運蛋白(ASBT，亦稱為迴腸膽酸轉運蛋白(IBAT)、ISBT、ABAT或NTCP2；基因符號*SLC10A2*)，其在迴腸上皮細胞、近端腎小管細胞、膽道上皮細胞、大膽管細胞及膽囊上皮細胞之小腸頂區膜中

表現。在肝臟中，膽酸藉由肝臟膽酸轉運蛋白(LBAT)自門靜脈血中有效提取，且藉由膽鹽輸出泵(BSEP；基因符號*ABCB11*)再分泌穿過小管膜。迴腸中膽酸之再吸收係由小腸頂區鈉依賴性膽酸轉運蛋白(ASBT)處理，其通常稱為迴腸膽酸轉運蛋白(IBAT)。LBAT及ASBT均充當起電鈉-溶質協同轉運蛋白，每分子溶質移動兩個或更多個 Na^+ 離子。

【0035】 外生物及內生物，包括膽酸，係由肝臟自門靜脈血吸收且藉由具有個別化受質特異性之不同轉運蛋白分泌於膽汁中。甘胺酸結合之膽酸及牛磺酸結合之膽酸以陰離子形式存在且不能藉由擴散穿過膜，因此完全依賴於膜轉運蛋白進入或離開肝細胞(Kosters及Karpen, *Xenobiotica* 2008, 第38卷, 第1043-1071頁)。ASBT及LBAT偏好甘胺酸結合之膽鹽及牛磺酸結合之膽鹽超過其未結合之對應物，且表現出對二羥基膽鹽之親和力高於對三羥基膽鹽之親和力。尚未鑑別出ASBT之非膽酸受質，然而，亦發現LBAT轉運多種類固醇硫酸鹽、激素及外生物。

【0036】 就藥物抑制要求而言，LBAT未如ASBT一般徹底表徵。Dong等人已鑑別出FDA核准之抑制人類LBAT之藥物，且比較LBAT及ASBT抑制要求。使用FDA核准之藥物，配合迭代計算模型開發進行一系列LBAT抑制研究。篩選研究鑑別出27種藥物作為新穎的LBAT抑制劑，包括依貝沙坦(irbesartan, $K_i = 11.9 \mu\text{M}$)及依澤替米貝(ezetimibe, $K_i = 25.0 \mu\text{M}$)。共同特徵藥效團表明兩個疏水物及一個氫鍵受體對於抑制LBAT為重要的。自活體外篩選之72種藥物中，共有31種藥物抑制LBAT，而51種藥物(亦即超過一半)抑制ASBT。因此，雖然存在抑制劑重疊，但ASBT出乎意料地比LBAT更容許藥物抑制，且此可能與LBAT具有較少的藥效團特徵相關(Dong等人, *Mol. Pharm.* 2013, 第10卷, 第1008-

1019頁)。

【0037】 Vaz等人將LBAT缺乏症之鑑別描述為具有相對輕微臨床表型之新的先天性代謝錯誤。LBAT缺乏症之鑑別證實，此轉運蛋白為結合膽鹽進入肝臟之主要輸入系統，且亦表明輔助轉運蛋白能夠在其不存在時維持腸肝循環(Vaz等人, *Hepatology* 2015, 第61卷, 第260-267頁)。此等發現支持LBAT抑制為安全作用機制的假設，因為肝細胞仍有可能吸收必需量之膽酸。

【0038】 Liu等人描述與*SLC10A1* (LBAT)中p.Ser267Phe突變之純合性相關之新型高膽烷血症的鑑別。基因*SLC10A1*中此突變之對偶基因頻率在不同群體中有所不同，其中最高的發病率出現在中國南方(中國漢族及傣族分別為8%及12%)及越南(11%)。咸信此「隱藏的」高膽烷血症影響南方漢族之0.64%、中國傣族人口之1.44%及越南人口之1.21%。亦觀測到純合個體中結合及未結合之血清BA含量的增加。Liu等人提出，此發現最可能歸因於自門靜脈循環至肝細胞中之BA轉運減少。此支持以下假設：腸肝循環之生理功能不僅使膽酸再循環，且亦自循環清除膽酸以達成恆定(Karpen及Dawson, *Hepatology* 2015, 第61卷, 第24-27頁)。或者，肝臟可合成增加含量之膽酸以補償純合載體中減少的腸肝再循環。由於LBAT亦轉運未結合之膽酸，故在此研究中未結合之膽酸增加並不出人意料(Liu等人, *Scientific Reports* 2017, 7: 9214, 第1-7頁)。

【0039】 已發現LBAT在數種形式之膽汁鬱積性肝損傷及膽汁鬱積中被下調，而發現ASBT在多種胃腸道病症中被下調，諸如克羅恩氏病、原發性膽酸吸收障礙、發炎性腸病及迴腸發炎，但在膽汁鬱積中被上調。LBAT亦充當B型肝炎病毒(HBV)及D型肝炎病毒(HDV)之病毒進入的細胞

受體，B型肝炎病毒及D型肝炎病毒又為肝病及肝細胞癌之主要原因。

【0040】 已研究ASBT抑制用於降低血漿膽固醇含量及改良胰島素抗性，以及減輕膽汁鬱積性肝病中之肝膽酸負荷。另外，已發現ASBT抑制恢復胰島素含量及血糖濃度正常，從而確立ASBT抑制為2型糖尿病之有前景的治療。ASBT抑制劑亦用於治療功能性便秘。

【0041】 由於ASBT主要在迴腸中表現(在此其通常稱為IBAT)，因此ASBT抑制劑不必全身可用。另一方面，ASBT亦在腎臟之近端小管細胞中表現。因此，全身可用之ASBT抑制劑亦可抑制腎臟中膽酸之再吸收。咸信，此將導致尿液中膽酸含量增加，及經由尿液增加自身體移除膽酸。因此，預期不僅在迴腸中且亦在腎臟中發揮作用之全身可用的ASBT抑制劑比僅在迴腸中發揮作用之非全身可用的ASBT抑制劑導致膽酸含量之更大降低。

【0042】 具有高ASBT抑制效力之化合物特別適用於治療引起膽汁鬱積之肝病，諸如進行性家族性肝內膽汁鬱積(PFIC)、阿拉傑里症候群、膽道閉鎖及非酒精性脂肪變性肝炎(NASH)。

【0043】 膽道閉鎖為一種罕見的小兒肝病，其涉及大膽管之部分或完全阻塞(或甚至缺失)。此阻塞或缺失造成膽汁鬱積，導致膽酸積聚，從而損害肝臟。在一些實施例中，膽酸之積聚發生在肝外膽道中。在一些實施例中，膽酸之積聚發生在肝內膽道中。目前的護理標準為葛西手術，其為移除阻塞的膽管且將一部分小腸直接連接至肝臟的手術。目前沒有針對此病症之核准藥物療法。

【0044】 本文提供用於治療有需要之個體之膽道閉鎖的方法，該等方法包含投與治療有效量之式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽。在一

些實施例中，個體在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前已進行葛西手術。在一些實施例中，在進行葛西手術之前，向個體投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽。在一些實施例中，膽道閉鎖之治療降低個體之血清膽酸含量。在一些實施例中，血清膽酸含量係藉由例如ELISA酶分析或量測總膽酸之分析來測定，如Danese等人, PLoS One. 2017, 第12(6)卷: e0179200中所述，其以全文引用之方式併入本文中。在一些實施例中，血清膽酸含量可降低例如在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前的血清膽酸含量的10%至40%、20%至50%、30%至60%、40%至70%、50%至80%或大於90%。在一些實施例中，膽道閉鎖之治療包括搔癢病之治療。

【0045】 PFIC為一種罕見的遺傳病症，據估計影響全球出生的每50,000至100,000名兒童中之一名且造成進行性、危及生命的肝病。

【0046】 PFIC之一種表現形式為搔癢病，其通常導致生活品質嚴重下降。在一些情況下，PFIC導致肝硬化及肝衰竭。目前的療法包括部分膽汁外分流術(PEBD)及肝移植，然而，此等選項可能帶來相當大的手術後併發症風險，以及心理及社會問題。

【0047】 已鑑別三種可選基因缺陷，其與稱為1型、2型及3型之三種單獨的PFIC亞型相關：

- PFIC 1型，其有時稱為「拜勒病」，係由因ATP8B1基因突變所致的膽汁分泌受損引起，該基因編碼之蛋白質有助於維持稱為磷脂之脂肪在膽管細胞膜中之適當平衡。此等磷脂之不平衡與膽汁鬱積及肝臟中之膽酸升高相關聯。受PFIC 1型影響之個體通常在出生後的前幾個月發生膽汁鬱積，且在沒有手術治療之情況下，在生命的第一個十年結束之前進展為肝

硬化及末期肝病。

- PFIC 2型，其有時稱為「拜勒症候群」，係由因ABCB11基因突變所致的膽鹽分泌受損引起，該基因編碼一種稱為膽鹽輸出泵之蛋白質，其將膽酸自肝臟移出。患有PFIC 2型之個體通常在出生後的前幾年內罹患肝衰竭，且罹患一類稱為肝細胞癌之肝癌的風險增加。

- PFIC 3型，其通常在兒童期之最初幾年伴隨進行性膽汁鬱積出現，係由ABCB4基因突變引起，該基因編碼將磷脂移動穿過細胞膜之轉運蛋白。

【0048】 另外，已提出TJP2基因、NR1H4基因或Myo5b基因突變為PFIC之原因。另外，一些患有PFIC之個體在ATP8B1、ABCB11、ABCB4、TJP2、NR1H4或Myo5b基因中之任一者中均沒有突變。在此等情況下，病況之原因為未知的。

【0049】 ATP8B1基因或所得蛋白質的例示性突變列於表2及表3中，其中編號基於人類野生型ATP8B1蛋白(例如SEQ ID NO: 1)或基因(例如SEQ ID NO: 2)。ABCB11基因或所得蛋白質的例示性突變列於表4及表5中，其中編號基於人類野生型ABCB11蛋白(例如SEQ ID NO: 3)或基因(例如SEQ ID NO: 4)。

【0050】 如熟習此項技術者可瞭解，參考蛋白質序列中對應於SEQ ID NO: 1或3之特定胺基酸位置的胺基酸位置可藉由將參考蛋白質序列與SEQ ID NO: 1或3比對來確定(例如，使用軟體程式，諸如ClustalW2)。此等殘基之變化(在本文中稱為「突變」)可包括單個或多個胺基酸取代、序列內或側翼之插入以及序列內或側翼之缺失。如熟習此項技術者可瞭解，參考基因序列中對應於SEQ ID NO: 2或4之特定核苷酸位置的核苷酸位置

可藉由將參考基因序列與SEQ ID NO: 2或4比對來確定(例如，使用軟體程式，諸如ClustalW2)。此等殘基之變化(在本文中稱為「突變」)可包括單個或多個核苷酸取代、序列內或側翼之插入以及序列內或側翼之缺失。亦參見Kooistra等人，「KLIFS: A structural kinase-ligand interaction database」, Nucleic Acids Res. 2016, 第44卷, 第D1期, 第D365-D371頁，其以全文引用的方式併入本文中。

ATP8B1之典型蛋白質序列(SEQ ID NO: 1) - Uniprot ID O43520

MSTERDSETT FDSDSQPNDE VVPYSDDETE DELDDQGS AV EPEQNRVNRE AEENREPFRK
ECTWQVKAND RKYHEQPHFM NTKFLCIKES KYANNAIKTY KYNAFTFIPM NLFEQFKRAA
NLYFLALLIL QAVPQISTLA WYTTLVPLLV VLGVTAIKDL VDDVARHKMD KEINNRTCEV
IKDGRFKVAK WKEIQVGDVI RLKKNDFVPA DILLSSSEP NSLCYVETAE LDGETNLKFK
MSLEITDQYL QREDTLATFD GFIECEEPNN RLDKFTGTLF WRNTSFPLDA DKILLRGCVI
RNTDFCHGLV IFAGADTKIM KNSGKTRFKR TKIDYLMNYM VYTIFVVLIL LSAGLAIGHA
YWEAQVGNSS WYLYDGEDDT PSYRGFLIFW GYIIVLNTMV PISLYVSVEV IRLGQSHFIN
WDLQMYAEK DTPAKARTTT LNEQLGQIHY IFSDKTGTLT QNIMTFKKCC INGQIYGDHR
DASQHNHNKI EQVDFSWNTY ADGKLAFYDH YLIEQIQSGK EPEVRQFFFL LAVCHTVMVD
RTDGQLNYQA ASPDEGALVN AARNEGFAFL ARTQNTITIS ELGTERTYNV LAILDENSDR
KRMSIIVRTP EGNIKLYCKG ADTVIYERLH RMNPTKQETQ DALDIFANET LRTLCLCYKE
IEEKEFTAWN KKFMAASVAS TNRDEALDKV YEEIEKDLIL LGATAIEDKL QDGVPEITISK
LAKADIKI WV LTGDKKETAE NIGFACELLT EDTTICYGED INSLHARME NQRNRGGVYA
KFAPPVQESF FPPGGNRALI ITGSWLNEIL LEKKTKRNKI LKLKFPRTTE ERRMRTQSKR
RLEAKKEQRQ KNFVDLACEC SAVICCRVTP KQKAMVVDLV KRYKKAITLA IGDGANDVNM
IKTAHIGVGI SGQEGMQAVM SSDYSFAQFR YLQRLLLVHG RWSYIRMCKF LRYFFYKNFA
FTLVHFWYSE FNGYSAQTAY EDWFITLYNV LYTSLPVLLM GLLDQDVSDK LSLRFPGLYI
VGQRDLLFNY KRFFVSLLHG VLTSMILFFI PLGAYLQTVG QDGEAPSDYQ SFAVTIASAL
VITVNFQIGL DTSYWTFVNA FSIFGSIALY FGIMFDFHSA GIHVLFP SAF QFTGTASNAL
RQPYIWLTII LAVAVCLLPV VAIRFLSMTI WPSESDKI QK HRKRLKAE EQ WQRRQQVFRR
GVSTRRSAYA FSHQRGYADL ISSGRSIRKK RSPLDAIVAD GTAEYRRTGD S

ATP8B1之典型DNA序列(SEQ ID NO: 2)

ATG AGT ACA GAA AGA GAC TCA GAA ACG ACA TTT GAC GAG GAT TCT CAG CCT
AAT GAC GAA GTG GTT CCC TAC AGT GAT GAT GAA ACA GAA GAT GAA CTT GAT
GAC CAG GGG TCT GCT GTT GAA CCA GAA CAA AAC CGA GTC AAC AGG GAA GCA
GAG GAG AAC CGG GAG CCA TTC AGA AAA GAA TGT ACA TGG CAA GTC AAA GCA
AAC GAT CGC AAG TAC CAC GAA CAA CCT CAC TTT ATG AAC ACA AAA TTC TTG
TGT ATT AAG GAG AGT AAA TAT GCG AAT AAT GCA ATT AAA ACA TAC AAG TAC
AAC GCA TTT ACC TTT ATA CCA ATG AAT CTG TTT GAG CAG TTT AAG AGA GCA
GCC AAT TTA TAT TTC CTG GCT CTT CTT ATC TTA CAG GCA GTT CCT CAA ATC
TCT ACC CTG GCT TGG TAC ACC ACA CTA GTG CCC CTG CTT GTG GTG CTG GGC
GTC ACT GCA ATC AAA GAC CTG GTG GAC GAT GTG GCT CGC CAT AAA ATG GAT
AAG GAA ATC AAC AAT AGG ACG TGT GAA GTC ATT AAG GAT GGC AGG TTC AAA
GTT GCT AAG TGG AAA GAA ATT CAA GTT GGA GAC GTC ATT CGT CTG AAA AAA
AAT GAT TTT GTT CCA GCT GAC ATT CTC CTG CTG TCT AGC TCT GAG CCT AAC
AGC CTC TGC TAT GTG GAA ACA GCA GAA CTG GAT GGA GAA ACC AAT TTA AAA
TTT AAG ATG TCA CTT GAA ATC ACA GAC CAG TAC CTC CAA AGA GAA GAT ACA
TTG GCT ACA TTT GAT GGT TTT ATT GAA TGT GAA GAA CCC AAT AAC AGA CTA
GAT AAG TTT ACA GGA ACA CTA TTT TGG AGA AAC ACA AGT TTT CCT TTG GAT
GCT GAT AAA ATT TTG TTA CGT GGC TGT GTA ATT AGG AAC ACC GAT TTC TGC
CAC GGC TTA GTC ATT TTT GCA GGT GCT GAC ACT AAA ATA ATG AAG AAT AGT
GGG AAA ACC AGA TTT AAA AGA ACT AAA ATT GAT TAC TTG ATG AAC TAC ATG
GTT TAC ACG ATC TTT GTT GTT CTT ATT CTG CTT TCT GCT GGT CTT GCC ATC
GGC CAT GCT TAT TGG GAA GCA CAG GTG GGC AAT TCC TCT TGG TAC CTC TAT
GAT GGA GAA GAC GAT ACA CCC TCC TAC CGT GGA TTC CTC ATT TTC TGG GGC
TAT ATC ATT GTT CTC AAC ACC ATG GTA CCC ATC TCT CTC TAT GTC AGC GTG
GAA GTG ATT CGT CTT GGA CAG AGT CAC TTC ATC AAC TGG GAC CTG CAA ATG
TAC TAT GCT GAG AAG GAC ACA CCC GCA AAA GCT AGA ACC ACC ACA CTC AAT
GAA CAG CTC GGG CAG ATC CAT TAT ATC TTC TCT GAT AAG ACG GGG ACA CTC
ACA CAA AAT ATC ATG ACC TTT AAA AAG TGC TGT ATC AAC GGG CAG ATA TAT
GGG GAC CAT CGG GAT GCC TCT CAA CAC AAC CAC AAC AAA ATA GAG CAA GTT
GAT TTT AGC TGG AAT ACA TAT GCT GAT GGG AAG CTT GCA TTT TAT GAC CAC
TAT CTT ATT GAG CAA ATC CAG TCA GGG AAA GAG CCA GAA GTA CGA CAG TTC
TTC TTC TTG CTC GCA GTT TGC CAC ACA GTC ATG GTG GAT AGG ACT GAT GGT
CAG CTC AAC TAC CAG GCA GCC TCT CCC GAT GAA GGT GCC CTG GTA AAC GCT
GCC AGG AAC TTT GGC TTT GCC TTC CTC GCC AGG ACC CAG AAC ACC ATC ACC
ATC AGT GAA CTG GGC ACT GAA AGG ACT TAC AAT GTT CTT GCC ATT TTG GAC
TTC AAC AGT GAC CGG AAG CGA ATG TCT ATC ATT GTA AGA ACC CCA GAA GGC
AAT ATC AAG CTT TAC TGT AAA GGT GCT GAC ACT GTT ATT TAT GAA CGG TTA
CAT CGA ATG AAT CCT ACT AAG CAA GAA ACA CAG GAT GCC CTG GAT ATC TTT
GCA AAT GAA ACT CTT AGA ACC CTA TGC CTT TGC TAC AAG GAA ATT GAA GAA
AAA GAA TTT ACA GAA TGG AAT AAA AAG TTT ATG GCT GCC AGT GTG GCC TCC
ACC AAC CGG GAC GAA GCT CTG GAT AAA GTA TAT GAG GAG ATT GAA AAA GAC

TTA ATT CTC CTG GGA GCT ACA GCT ATT GAA GAC AAG CTA CAG GAT GGA GTT
CCA GAA ACC ATT TCA AAA CTT GCA AAA GCT GAC ATT AAG ATC TGG GTG CTT
ACT GGA GAC AAA AAG GAA ACT GCT GAA AAT ATA GGA TTT GCT TGT GAA CTT
CTG ACT GAA GAC ACC ACC ATC TGC TAT GGG GAG GAT ATT AAT TCT CTT CTT
CAT GCA AGG ATG GAA AAC CAG AGG AAT AGA GGT GGC GTC TAC GCA AAG TTT
GCA CCT CCT GTG CAG GAA TCT TTT TTT CCA CCC GGT GGA AAC CGT GCC TTA
ATC ATC ACT GGT TCT TGG TTG AAT GAA ATT CTT CTC GAG AAA AAG ACC AAG
AGA AAT AAG ATT CTG AAG CTG AAG TTC CCA AGA ACA GAA GAA GAA AGA CGG
ATG CGG ACC CAA AGT AAA AGG AGG CTA GAA GCT AAG AAA GAG CAG CGG CAG
AAA AAC TTT GTG GAC CTG GCC TGC GAG TGC AGC GCA GTC ATC TGC TGC CGC
GTC ACC CCC AAG CAG AAG GCC ATG GTG GTG GAC CTG GTG AAG AGG TAC AAG
AAA GCC ATC ACG CTG GCC ATC GGA GAT GGG GCC AAT GAC GTG AAC ATG ATC
AAA ACT GCC CAC ATT GGC GTT GGA ATA AGT GGA CAA GAA GGA ATG CAA GCT
GTC ATG TCG AGT GAC TAT TCC TTT GCT CAG TTC CGA TAT CTG CAG AGG CTA
CTG CTG GTG CAT GGC CGA TGG TCT TAC ATA AGG ATG TGC AAG TTC CTA CGA
TAC TTC TTT TAC AAA AAC TTT GCC TTT ACT TTG GTT CAT TTC TGG TAC TCC
TTC TTC AAT GGC TAC TCT GCG CAG ACT GCA TAC GAG GAT TGG TTC ATC ACC
CTC TAC AAC GTG CTG TAC ACC AGC CTG CCC GTG CTC CTC ATG GGG CTG CTC
GAC CAG GAT GTG AGT GAC AAA CTG AGC CTC CGA TTC CCT GGG TTA TAC ATA
GTG GGA CAA AGA GAC TTA CTA TTC AAC TAT AAG AGA TTC TTT GTA AGC TTG
TTG CAT GGG GTC CTA ACA TCG ATG ATC CTC TTC TTC ATA CCT CTT GGA GCT
TAT CTG CAA ACC GTA GGG CAG GAT GGA GAG GCA CCT TCC GAC TAC CAG TCT
TTT GCC GTC ACC ATT GCC TCT GCT CTT GTA ATA ACA GTC AAT TTC CAG ATT
GGC TTG GAT ACT TCT TAT TGG ACT TTT GTG AAT GCT TTT TCA ATT TTT GGA
AGC ATT GCA CTT TAT TTT GGC ATC ATG TTT GAC TTT CAT AGT GCT GGA ATA
CAT GTT CTC TTT CCA TCT GCA TTT CAA TTT ACA GGC ACA GCT TCA AAC GCT
CTG AGA CAG CCA TAC ATT TGG TTA ACT ATC ATC CTG GCT GTT GCT GTG TGC
TTA CTA CCC GTC GTT GCC ATT CGA TTC CTG TCA ATG ACC ATC TGG CCA TCA
GAA AGT GAT AAG ATC CAG AAG CAT CGC AAG CGG TTG AAG GCG GAG GAG CAG
TGG CAG CGA CGG CAG CAG GTG TTC CGC CGG GGC GTG TCA ACG CGG CGC TCG
GCC TAC GCC TTC TCG CAC CAG CGG GGC TAC GCG GAC CTC ATC TCC TCC GGG
CGC AGC ATC CGC AAG AAG CGC TCG CCG CTT GAT GCC ATC GTG GCG GAT GGC
ACC GCG GAG TAC AGG CGC ACC GGG GAC AGC TGA

表2. 例示性ATP8B1突變

胺基酸位置3 (例如T3K) ²⁷
胺基酸位置23 (例如P23L) ⁵
胺基酸位置45 (例如N45T) ^{5,8,9}
胺基酸位置46 (例如R46X) ^{A,25}
胺基酸位置62 (例如C62R) ²⁸
胺基酸位置63 (例如T63T) ⁴¹
胺基酸位置70 (例如D70N) ^{1,6}
胺基酸位置71 (例如R71H) ⁴³
胺基酸位置78 (例如H78Q) ¹⁹
胺基酸位置82 (例如T82T) ⁴¹
胺基酸位置92 (例如Y92Y) ⁴¹
胺基酸位置93 (例如A93A) ⁶

胺基酸位置96 (例如A96G) ²⁷
胺基酸位置114 (例如E114Q) ⁸
胺基酸位置127 (例如L127P ⁶ 、L127V ³⁶)
胺基酸位置177 (例如T177T) ⁶
胺基酸位置179 (例如E179X) ²⁹
Δ胺基酸位置185-282 ⁴⁴
胺基酸位置197 (例如G197Lfs*10) ²²
胺基酸位置201 (例如R201S ²⁷ 、R201H ³⁵)
胺基酸位置203 (例如K203E ^{5,8} 、K203R ⁹ 、K203fs ²⁵)
胺基酸位置205 (例如N205fs ⁶ 、N205Kfs*2 ³⁵)
胺基酸位置209 (例如P209T) ⁴
胺基酸位置217 (例如S217N) ⁴³
胺基酸位置232 (例如D232D) ³⁰
胺基酸位置233 (例如G233R) ³⁸
胺基酸位置243 (例如L243fs*28) ³³
胺基酸位置265 (例如C265R) ²⁵
胺基酸位置271 (例如R271X ¹³ 、R271R ³⁰)
胺基酸位置288 (例如L288S) ⁶
胺基酸位置294 (例如L294S) ⁴³
胺基酸位置296 (例如R296C) ¹¹
胺基酸位置305 (例如F305I) ²⁸
胺基酸位置306 (例如C306R) ²³
胺基酸位置307 (例如H307L) ³⁵
胺基酸位置308 (例如G308V ¹ 、G308D ⁶ 、G308S ³⁵)
胺基酸位置314 (例如G314S) ¹³
胺基酸位置320 (例如M320Vfs*13) ¹¹
胺基酸位置337 (例如M337R) ¹⁸
胺基酸位置338 (例如N338K) ¹⁸
胺基酸位置340 (例如M340V) ¹⁸
胺基酸位置344 (例如I344F) ^{6,20}
胺基酸位置349 (例如I349T) ⁴¹
胺基酸位置358 (例如G358R) ²⁸
胺基酸位置367 (例如G367G) ⁴¹
胺基酸位置368 (例如N368D) ⁴¹
胺基酸位置393 (例如I393V) ²⁷

胺基酸位置403 (例如S403Y) ⁶
胺基酸位置407 (例如S407N) ⁴⁰
胺基酸位置412 (例如R412P) ⁶
胺基酸位置415 (例如Q415R) ²⁷
胺基酸位置422 (例如D422H) ³⁵
胺基酸位置429 (例如E429A) ⁶
胺基酸位置446 (例如G446R) ^{4,11}
胺基酸位置453 (例如S453Y) ⁶
胺基酸位置454 (例如D454G) ⁶
胺基酸位置455 (例如K455N) ⁴³
胺基酸位置456 (例如T456M ^{3,6} 、T456K ³⁵)
胺基酸位置457 (例如G457G ⁶ 、G457fs*6 ³³)
胺基酸位置469 (例如C469G) ⁴¹
胺基酸位置478 (例如H478H) ⁴¹
胺基酸位置500 (例如Y500H) ⁶
胺基酸位置525 (例如R525X) ⁴
Δ胺基酸位置529 ⁶
胺基酸位置535 (例如H535L ⁶ 、H535N ⁴¹)
胺基酸位置553 (例如P553P) ⁴³
胺基酸位置554 (例如D554N ^{1,6} 、D554A ³⁵)
Δ胺基酸位置556-628 ⁴⁴
Δ胺基酸位置559-563 ³⁵
胺基酸位置570 (例如L570L) ⁴¹
胺基酸位置577 (例如I577V) ¹⁹
胺基酸位置581 (例如E581K) ³⁵
胺基酸位置554及581 (例如D554A+E581K) ³⁵
胺基酸位置585 (例如E585X) ²¹
胺基酸位置600 (例如R600W ^{2,4} 、R600Q ⁶)
胺基酸位置602 (例如R602X) ^{3,6}
胺基酸位置628 (例如R628W) ⁶
胺基酸位置631 (例如R631Q) ²⁸
Δ胺基酸位置645-699 ⁴
胺基酸位置661 (例如I661T) ^{1,4,6}
胺基酸位置665 (例如E665X) ^{4,6}
胺基酸位置672 (例如K672fs ⁶ 、K672Vfs*1 ³⁵)

胺基酸位置674 (例如M674T) ¹⁹
胺基酸位置78及674 (例如H78Q/M674T) ¹⁹
胺基酸位置684 (例如D684D) ⁴¹
胺基酸位置688 (例如D688G) ⁶
胺基酸位置694 (例如I694T ⁶ 、I694N ¹⁷)
胺基酸位置695 (例如E695K) ²⁷
胺基酸位置709 (例如K709fs ⁶ 、K709Qfs*41 ¹³)
胺基酸位置717 (例如T717N) ⁴
胺基酸位置733 (例如G733R) ⁶
胺基酸位置757 (例如Y757X) ⁴
胺基酸位置749 (例如L749P) ²¹
胺基酸位置792 (例如P792fs) ⁶
Δ胺基酸位置795-797 ⁶
胺基酸位置809 (例如I809L) ²⁷
胺基酸位置814 (例如K814N) ²⁸
胺基酸位置833 (例如R833Q ²⁷ 、R833W ⁴¹)
胺基酸位置835 (例如K835Rfs*36) ³⁵
胺基酸位置845 (例如K845fs) ²⁵
胺基酸位置849 (例如R849Q) ²⁴
胺基酸位置853 (例如F853S、F853fs) ⁶
胺基酸位置867 (例如R867C ¹ 、R867fs ⁶ 、R867H ²³)
胺基酸位置885 (例如K885T) ⁴¹
胺基酸位置888 (例如T888T) ⁴¹
胺基酸位置892 (例如G892R) ⁶
胺基酸位置912 (例如G912R) ³⁵
胺基酸位置921 (例如S921S) ⁴¹
胺基酸位置924 (例如Y924C) ²⁸
胺基酸位置930 (例如R930X ⁶ 、R930Q ²⁸)
胺基酸位置941 (例如R941X) ³⁵
胺基酸位置946 (例如R946T) ⁴¹
胺基酸位置952 (例如R952Q ^{5,9,15} 、R952X ⁶)
胺基酸位置958 (例如N958fs) ⁶
胺基酸位置960 (例如A960A) ⁴¹
Δ胺基酸位置971 ⁴³
胺基酸位置976 (例如A976E ⁴¹ 、A976A ⁴³)

胺基酸位置981 (例如E981K) ²⁰
胺基酸位置994 (例如S994R) ⁴
胺基酸位置1011 (例如L1011fs*18) ³³
胺基酸位置1012 (例如S1012I) ¹⁰
胺基酸位置1014 (例如R1014X) ^{6,11}
胺基酸位置1015 (例如F1015L) ²⁷
胺基酸位置1023 (例如Q1023fs) ⁶
胺基酸位置1040 (例如G1040R) ^{1,6}
胺基酸位置1044 (例如S0144L) ³⁴
胺基酸位置1047 (例如L1047fs) ⁶
胺基酸位置1050 (例如I1050K) ³¹
胺基酸位置1052 (例如L1052R) ²⁸
胺基酸位置1095 (例如W1095X) ¹¹
胺基酸位置1098 (例如V1098X) ³⁵
胺基酸位置1131 (例如Q1131X) ⁴⁴
胺基酸位置1142 (例如A1142Tfs*35) ⁴³
胺基酸位置1144 (例如Y1144Y) ⁴³
胺基酸位置1150 (例如I1150T) ⁴¹
胺基酸位置1152 (例如A1152T) ³⁰
胺基酸位置1159 (例如P1159P) ^{25,43}
胺基酸位置1164 (例如R1164X) ⁶
胺基酸位置1193 (例如R1193fs*39) ³³
胺基酸位置1197 (例如V1197L) ⁴¹
胺基酸位置1208 (例如A1208fs) ⁶
胺基酸位置1209 (例如Y1209Lfs*28) ⁴
胺基酸位置1211 (例如F1211L) ²⁷
胺基酸位置1219 (例如D1219H ⁵ 、D1219G ²⁷)
胺基酸位置1223 (例如S1223S) ⁴¹
胺基酸位置1233 (例如P1233P) ⁴¹
胺基酸位置1241 (例如G1241fs) ⁶
胺基酸位置1248 (例如T1248T) ⁴³
剪接位點突變IVS3+1_+3delGTG ⁶
剪接位點突變IVS3-2A>G ⁶
IVS6+5T>G ^{17,25}
剪接位點突變IVS8+1G>T ⁶

IVS9-G>A ²⁶
IVS12+1G>A ²⁵
剪接位點突變IVS17-1G>A ⁶
剪接位點突變IVS18+2T>C ⁶
剪接位點突變IVS20-4CT>AA
剪接位點突變IVS21+5G>A ⁶
剪接位點突變IVS23-3C>A ⁶
剪接位點突變IVS26+2T>A ⁶
g.24774-42062del ⁴
c.-4C>G ⁴¹
c.145C>T ¹²
c.181-72G>A ⁹
c.182-5T>A ⁴¹
c.182-72G>A ⁴¹
c.246A>G ⁹
c.239G>A ³⁹
c.279+1_279+3delGTG ⁴⁶
c.280-2A>G ⁴⁶
c.625_62715delinsACAGTAAT ⁴⁶
c.554+122C>T ⁹
c.555-3T>C ²⁷
c.625+5 G>T ⁴
胺基酸位置209 (例如P209T)及c.625+5 G>T ⁴
c.628-30G>A ⁴¹
c.628-31C>T ⁴¹
c.698+1G>T ⁴⁶
c.698+20C>T ⁴¹
c.782-1G>A ⁴⁶
c.782-34G>A ⁴¹
Δ795-797 ¹⁴
c.782 -1G>A ⁴
c.852A>C ²⁷
c.941-1G>A ⁴⁶
c.1014C>T ⁹
c.1029+35G>A ⁹

c.1221-8C.G ⁴¹
1226delA ¹⁶
c.1429+1G>A ⁴⁶
c.1429+2T>G ¹³
c.1429+49G>A ⁴¹
c.1430-42A>G ⁴¹
c.1493T>C ¹²
c.1587_1589delCTT ⁴⁶
c.1630+2T>G ²⁷
c.1631-10T>A ⁴¹
c.1637-37T>C ⁴¹
1660 G>A ¹⁴
1798 C>T ¹⁴
1799 G>A ¹⁴
c.1819-39_41delAA ⁹
c.1819+1G>A ³¹
c.1820-27G>A ⁴¹
c.1918+8C>T ²⁷
c.1933-1G>AK46
c.2097+2T>C ³²
c.2097+60T>G ⁴¹
c.2097+89T>C ⁴¹
c.2097+97T>G ⁴¹
c.2210-114T>C ⁹
2210delA ¹⁶
c.2210-45_50dupATAAAA ⁹
c.2285+29C.T ⁴¹
c.2285+32A>G ⁴¹
c.2286-4_2286-3delinsAA ⁴⁶
c.2418+5G>A ⁴⁶
c.2707+3G>C ²⁷
c.2707+9T>G ⁴¹
c.2707+43A>G ⁴¹
c.2709-59T>C ⁴¹
c.2931+9A>G ⁴¹

c.2931+59T>A ⁴¹
c.2932-3C>A ⁴⁶
c.2932+59T>A ⁹
c.2937A>C ²⁷
c.3016-9C>A ³¹
c.3033-3034del ¹⁹
3122delTCCTA/ insACATCGATGTTGATGTTAGG ⁴⁵
3318 G>A ¹⁴
c.3400+2T>A ⁴⁶
c.3401-175C>T ⁹
c.3401-167C>T ⁹
c.3401-108C>T ⁹
c.3531+8G>T ^{9,15}
c.3532-15C>T ⁹
Δ Phe ex 15 ⁴
Ex1_Ex13del ⁶
Ex2_Ex6del ³³
Ex12_Ex14del ²⁷
跳過外顯子24 ⁴⁵
del5'UTR-ex18 ¹¹
c.*11C>T ⁴¹
c.*1101 + 366G > A ⁷
g.92918del565 ³¹
GC在外顯子16之前(例如導致4 bp缺失) ⁴²
自外顯子16之5'端讀框轉移 ⁴²
5' 1.4 kb缺失 ⁴⁶

表3.與PFIC-1相關之所選ATP8B1突變

胺基酸位置23 (例如P23L) ⁵
胺基酸位置78 (例如H78Q) ¹⁹
胺基酸位置93 (例如A93A) ⁶
胺基酸位置96 (例如A96G) ²⁷
胺基酸位置127 (例如L127P) ⁶
胺基酸位置197 (例如G197Lfs*10) ²²
胺基酸位置205 (例如N205fs) ⁶

胺基酸位置209 (例如P209T) ⁴
胺基酸位置233 (例如G233R) ³⁸
胺基酸位置243 (例如L243fs*28) ³³
胺基酸位置288 (例如L288S) ⁶
胺基酸位置296 (例如R296C) ¹¹
胺基酸位置308 (例如G308V ^{1,6})
胺基酸位置320 (例如M320Vfs*13) ¹¹
胺基酸位置403 (例如S403Y) ⁶
胺基酸位置407 (例如S407N) ⁴⁰
胺基酸位置412 (例如R412P) ⁶
胺基酸位置415 (例如Q415R) ²⁷
胺基酸位置429 (例如E429A) ⁶
胺基酸位置446 (例如G446R) ⁴
胺基酸位置456 (例如T456M) ^{3,6}
胺基酸位置457 (例如G457G ⁶ 、G457fs*6 ³³)
胺基酸位置500 (例如Y500H) ⁶
胺基酸位置525 (例如R525X) ⁴
Δ胺基酸位置529 ⁶
胺基酸位置535 (例如H535L) ⁶
胺基酸位置554 (例如D554N) ^{1,6}
胺基酸位置577 (例如I577V) ¹⁹
胺基酸位置585 (例如E585X) ²¹
胺基酸位置600 (例如R600W) ⁴
胺基酸位置602 (例如R602X) ^{3,6}
胺基酸位置661 (例如I661T) ^{4,6}
胺基酸位置665 (例如E665X) ^{4,6}
Δ胺基酸位置645-699 ⁴
胺基酸位置672 (例如K672fs) ⁶
胺基酸位置674 (例如M674T) ¹⁹
胺基酸位置78及674 (例如H78Q/M674T) ¹⁹
胺基酸位置688 (例如D688G) ⁶
胺基酸位置694 (例如I694N) ¹⁷
胺基酸位置695 (例如E695K) ²⁷
胺基酸位置709 (例如K709fs) ⁶
胺基酸位置717 (例如T717N) ⁴
胺基酸位置733 (例如G733R) ⁶
胺基酸位置749 (例如L749P) ²¹
胺基酸位置757 (例如Y757X) ⁴
胺基酸位置792 (例如P792fs) ⁶
胺基酸位置809 (例如I809L) ²⁷

胺基酸位置853 (例如F853S、F853fs) ⁶
胺基酸位置867 (例如R867fs) ⁶
胺基酸位置892 (例如G892R) ⁶
胺基酸位置930 (例如R930X ⁶ 、R952Q ¹⁵)
胺基酸位置952 (例如R952X) ⁶
胺基酸位置958 (例如N958fs) ⁶
胺基酸位置981 (例如E981K) ²⁰
胺基酸位置994 (例如S994R) ⁴
胺基酸位置1014 (例如R1014X) ^{6,11}
胺基酸位置1015 (例如F1015L) ²⁷
胺基酸位置1023 (例如Q1023fs) ⁶
胺基酸位置1040 (例如G1040R) ^{1,6}
胺基酸位置1047 (例如L1047fs) ⁶
胺基酸位置1095 (例如W1095X) ¹¹
胺基酸位置1208 (例如A1208fs) ⁶
胺基酸位置1209 (例如Y1209Lfs*28) ⁴
胺基酸位置1211 (例如F1211L) ²⁷
胺基酸位置1219 (例如D1219H ⁵ 、D1219G ²⁷)
剪接位點突變IVS3+1_+3delGTG ⁶
剪接位點突變IVS3-2A>G ⁶
IVS6+5T>G ¹⁷
剪接位點突變IVS8+1G>T ⁶
IVS9-G>A ²⁶
剪接位點突變IVS17-1G>A ⁶
剪接位點突變IVS18+2T>C ⁶
剪接位點突變IVS21+5G>A ⁶
g.24774-42062del ⁴
c.145C>T ¹²
c.239G>A ³⁹
c.625+5 G>T ⁴
胺基酸位置209 (例如P209T)及c.625+5 G>T ⁴
c.782 -1G>A ⁴
c.1493T>C ¹²
c.1630+2T>G ²⁷
1660 G>A ¹⁴
c.2707+3G>C ²⁷
c.2097+2T>C ³²
c.3033-3034del ¹⁹
3318 G>A ¹⁴
c.3158+8G>T ¹⁵

Δ Phe ex 15 ⁴
Ex1_Ex13del ⁶
Ex2_Ex6del ³³
Ex12_Ex14del ²⁷
del5'UTR-ex18 ¹¹
c.*1101 + 366G > A ⁷
GC在外顯子16之前(例如導致4 bp缺失) ⁴²
自外顯子16之5'端讀框轉移 ⁴²

^A 突變為「X」表示早期終止密碼子

表2及表3之參考文獻

¹ Folmer et al., Hepatology. 2009, vol. 50(5), p. 1597-1605.

² Hsu et al., Hepatol Res. 2009, vol. 39(6), p. 625-631.

³ Alvarez et al., Hum Mol Genet. 2004, vol. 13(20), p. 2451-2460.

⁴ Davit-Spraul et al., Hepatology 2010, vol. 51(5), p. 1645-1655.

⁵ Vitale et al., J Gastroenterol. 2018, vol. 53(8), p. 945-958.

⁶ Klomp et al., Hepatology 2004, vol. 40(1), p. 27-38.

⁷ Zarenezhad et al., Hepatitis Monthly: 2017, vol. 17(2); e43500.

⁸ Dixon et al., Scientific Reports 2017, vol. 7, 11823.

⁹ Painter et al., Eur J Hum Genet. 2005, vol. 13(4), p. 435-439.

¹⁰ Deng et al., World J Gastroenterol. 2012, vol. 18(44), p. 6504-6509.

¹¹ Giovannoni et al., PLoS One. 2015, vol. 10(12): e0145021.

¹² Li et al., Hepatology International 2017, vol. 11, No. 1, Supp. Supplement 1, pp. S180. Abstract Number: OP284.

¹³ Togawa et al., Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2018, vol. 67, Supp. Supplement 1, pp. S363. Abstract Number: 615.

¹⁴ Miloh et al., Gastroenterology 2006, vol. 130, No. 4, Suppl. 2, pp.

A759-A760. Meeting Info.: Digestive Disease Week Meeting/107th Annual Meeting of the American-Gastroenterological-Association. Los Angeles, CA, USA. May 19.

¹⁵ Dröge et al., Zeitschrift fur Gastroenterologie 2015, vol. 53, No. 12. Abstract Number: A3-27. Meeting Info: 32. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber. Dusseldorf, Germany. 22 Jan 2016-23 Jan 2016

¹⁶ Mizuochi et al., Clin Chim Acta. 2012, vol. 413(15-16), p. 1301-1304.

¹⁷ Liu et al., Hepatology International 2009, vol. 3, No. 1, p. 184-185. Abstract Number: PE405. Meeting Info: 19th Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver. Hong Kong, China. 13 Feb 2009-16 Feb 2009

¹⁸ McKay et al., Version 2. F1000Res. 2013; 2: 32. DOI: 10.12688/f1000research.2-32.v2

¹⁹ Hasegawa et al., Orphanet J Rare Dis. 2014, vol. 9:89.

²⁰ Stone et al., J Biol Chem. 2012, vol. 287(49), p. 41139-51.

²¹ Kang et al., J Pathol Transl Med. 2019 May 16. doi: 10.4132/jptm.2019.05.03. [Epub ahead of print]

²² Sharma et al., BMC Gastroenterol. 2018, vol. 18(1), p. 107.

²³ Uegaki et al., Intern Med. 2008, vol. 47(7), p. 599-602.

²⁴ Goldschmidt et al., Hepatol Res. 2016, vol. 46(4), p. 306-311.

²⁵ Liu et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010, vol. 50(2), p. 179-

183.

²⁶ Jung et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007, vol. 44(4), p. 453-458.

²⁷ Bounford. University of Birmingham. Dissertation Abstracts International, (2016) Vol. 75, No. 1C. Order No.: AAI10588329. ProQuest Dissertations & Theses.

²⁸ Stolz et al., Aliment Pharmacol Ther. 2019, vol. 49(9), p. 1195-1204.

²⁹ Ivashkin et al., Hepatology International 2016, vol. 10, No. 1, Suppl. SUPPL. 1, pp. S461. Abstract Number: LBO-38. Meeting Info: 25th Annual Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, APASL 2016. Tokyo, Japan. 20 Feb 2016-24 Feb 2016

³⁰ Blackmore et al., J Clin Exp Hepatol. 2013, vol. 3(2), p. 159-161.

³¹ Matte et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010, vol. 51(4), p. 488-493.

³² Squires et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017, vol. 64(3), p. 425-430.

³³ Hayshi et al., EBioMedicine. 2018, vol. 27, p. 187-199.

³⁴ Nagasaka et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007, vol. 45(1), p. 96-105.

³⁵ Wang et al., PLoS One. 2016; vol. 11(4): e0153114.

³⁶ Narchi et al., Saudi J Gastroenterol. 2017, vol. 23(5), p. 303-305.

³⁷ Alashkar et al., Blood 2015, vol. 126, No. 23. Meeting Info.: 57th

Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology. Orlando, FL, USA. December 05 -08, 2015. Amer Soc Hematol.

³⁸ Ferreira et al., Pediatric Transplantation 2013, vol. 17, Supp. SUPPL. 1, pp. 99. Abstract Number: 239. Meeting Info: IPTA 7th Congress on Pediatric Transplantation. Warsaw, Poland. 13 Jul 2013-16 Jul 2013.

³⁹ Pauli-Magnus et al., J Hepatol. 2005, vol. 43(2), p. 342-357.

⁴⁰ Jericho et al., Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2015, vol. 60(3), p. 368-374.

⁴¹ van der Woerd et al., PLoS One. 2013, vol. 8(11): e80553.

⁴² Copeland et al., J Gastroenterol Hepatol. 2013, vol. 28(3), p. 560-564.

⁴³ Dröge et al., J Hepatol. 2017, vol. 67(6), p. 1253-1264.

⁴⁴ Chen et al., Journal of Pediatrics 2002, vol. 140(1), p. 119-124.

⁴⁵ Jirsa et al., Hepatol Res. 2004, vol. 30(1), p. 1-3.

⁴⁶ van der Woerd et al., Hepatology 2015, vol. 61(4), p. 1382-1391.

【0051】 在一些實施例中，ATP8B1中之突變係選自L127P、G308V、T456M、D554N、F529del、I661T、E665X、R930X、R952X、R1014X及G1040R。

ABCB11之典型蛋白質序列(SEQ ID NO: 3) - Uniprot ID O95342

MSDSVILRSI KKFGEENDGF ESDKSYNNNDK KSRLQDEKKG DGVRVGGFFQL FRFSSSTDIW
LMFVGSLCAF LHGIAQPGVL LIFGTMTDVF IDYDVELQEL QIPGKACVNN TIVWTNSSLN
QNMTNGTRCG LLNIESEMIK FASYIYAGIAV AVLITGYIQI CFWVIAAARQ IQKMRKFYFR
RIMRMEIGWF DCNSVGELNT RFSDDINKIN DAIADQMALF IQRMTSTICG FLLGFFRGWK
LTLVIISVSP LIGIGAATIG LSVSKFTDYE LKAYAKAGVV ADEVISSMRT VAAFGGEKRE
VERYEKNLVF AQRWGIRKGI VMGFFTGFVW CLIFLCYALA FWYGSTLVLD EGEYTPGTLV
QIFLSVIVGA LNLGNASPCL EAFATGRAAA TSIFETIDRK PIIDCMSEDG YKLDRIKGEI
EFHNVTFHYP SRPEVKILND LNMVIKPGEM TALVGPSGAG KSTALQLIQR FYDPCEGMVT
VDGHDIRSLN IQWLRLDQIGI VEQEPVLEST TIAENIRYGR EDATMEDIVQ AAKEANAYNF
IMDLPQQFDT LVGEGGGQMS GGQKQORVAIA RALIRNPKIL LLDMATSALD NESEAMVQEV
LSKIQHGHTI ISVAHRLSTV RAADTIIGFE HGTAVERGTH EELLERKGVY FTLVTLQSQG
NQALNEEDIK DATEDDMLAR TFSRGSYQDS LRASIRQRSK SQLSYLVHEP PLAVVDHKST
YEEDRKDKDI PVQEEVEPAP VRRILKFSAP EWPYMLVGSV GAAVNGTVTP LYAFLFSQIL
GTFESIPDKEE QRSQINGVCL LFMVAMGCVSL FTQFLQGYAF AKSGELLTKR LRKFGFRAML
GQDIAWFDDL RNSPGALTTR LATDASQVQG AAGSQIGMIV NSFTNVTVM IIAFSFSWKL
SLVILCFFPF LALSGATQTR MLTGFASTRDK QALEMVGQIT NEALSNIRTV AGIGKERRFI
EALETELEKP FKTAIQKANI YGFCFAFAQC IMFANSASY RYGGYLISNE GLHFSYVFRV
ISAVVLSATA LGRAFSYTPS YAKAKISAAR FFQLLLDRQPP ISVYNTAGEK WDNFQGGKIDF
VDCKFTYPSR PDSQVLNGLS VSISPGQTLA FVGSSGCGKS TSIQLLERFY DPDQGGKVMID
GHDSKKVNVQ FLRSNIGIVS QEPVLFACSI MDNIKYGDNT KEIPMERVIA AAKQAQLHDF
VMSLPEKYET NVGSQGSQLS RGEKQRIATA RAIVRDPKIL LLDEATSALD TESEKTVQVA
LDKAREGRTC IVIAHRLSTI QNADIIAVMA QGVVIEKGTH EELMAQKGAY YKLVTTGSPI S

ABCB11之典型DNA序列(SEQ ID NO: 4)

ATG TCT GAC TCA GTA ATT CTT CGA AGT ATA AAG AAA TTT GGA GAG GAG AAT
GAT GGT TTT GAG TCA GAT AAA TCA TAT AAT AAT GAT AAG AAA TCA AGG TTA
CAA GAT GAG AAG AAA GGT GAT GGC GTT AGA GTT GGC TTC TTT CAA TTG TTT
CGG TTT TCT TCA TCA ACT GAC ATT TGG CTG ATG TTT GTG GGA AGT TTG TGT
GCA TTT CTC CAT GGA ATA GCC CAG CCA GGC GTG CTA CTC ATT TTT GGC ACA
ATG ACA GAT GTT TTT ATT GAC TAC GAC GTT GAG TTA CAA GAA CTC CAG ATT
CCA GGA AAA GCA TGT GTG AAT AAC ACC ATT GTA TGG ACT AAC AGT TCC CTC
AAC CAG AAC ATG ACA AAT GGA ACA CGT TGT GGG TTG CTG AAC ATC GAG AGC
GAA ATG ATC AAA TTT GCC AGT TAC TAT GCT GGA ATT GCT GTC GCA GTA CTT
ATC ACA GGA TAT ATT CAA ATA TGC TTT TGG GTC ATT GCC GCA GCT CGT CAG
ATA CAG AAA ATG AGA AAA TTT TAC TTT AGG AGA ATA ATG AGA ATG GAA ATA
GGG TGG TTT GAC TGC AAT TCA GTG GGG GAG CTG AAT ACA AGA TTC TCT GAT
GAT ATT AAT AAA ATC AAT GAT GCC ATA GCT GAC CAA ATG GCC CTT TTC ATT
CAG CGC ATG ACC TCG ACC ATC TGT GGT TTC CTG TTG GGA TTT TTC AGG GGT
TGG AAA CTG ACC TTG GTT ATT ATT TCT GTC AGC CCT CTC ATT GGG ATT GGA
GCA GCC ACC ATT GGT CTG AGT GTG TCC AAG TTT ACG GAC TAT GAG CTG AAG
GCC TAT GCC AAA GCA GGG GTG GTG GCT GAT GAA GTC ATT TCA TCA ATG AGA
ACA GTG GCT GCT TTT GGT GGT GAG AAA AGA GAG GTT GAA AGG TAT GAG AAA
AAT CTT GTG TTC GCC CAG CGT TGG GGA ATT AGA AAA GGA ATA GTG ATG GGA

TTC TTT ACT GGA TTC GTG TGG TGT CTC ATC TTT TTG TGT TAT GCA CTG GCC
TTC TGG TAC GGC TCC ACA CTT GTC CTG GAT GAA GGA GAA TAT ACA CCA GGA
ACC CTT GTC CAG ATT TTC CTC AGT GTC ATA GTA GGA GCT TTA AAT CTT GGC
AAT GCC TCT CCT TGT TTG GAA GCC TTT GCA ACT GGA CGT GCA GCA GCC ACC
AGC ATT TTT GAG ACA ATA GAC AGG AAA CCC ATC ATT GAC TGC ATG TCA GAA
GAT GGT TAC AAG TTG GAT CGA ATC AAG GGT GAA ATT GAA TTC CAT AAT GTG
ACC TTC CAT TAT CCT TCC AGA CCA GAG GTG AAG ATT CTA AAT GAC CTC AAC
ATG GTC ATT AAA CCA GGG GAA ATG ACA GCT CTG GTA GGA CCC AGT GGA GCT
GGA AAA AGT ACA GCA CTG CAA CTC ATT CAG CGA TTC TAT GAC CCC TGT GAA
GGA ATG GTG ACC GTG GAT GGC CAT GAC ATT CGC TCT CTT AAC ATT CAG TGG
CTT AGA GAT CAG ATT GGG ATA GTG GAG CAA GAG CCA GTT CTG TTC TCT ACC
ACC ATT GCA GAA AAT ATT CGC TAT GGC AGA GAA GAT GCA ACA ATG GAA GAC
ATA GTC CAA GCT GCC AAG GAG GCC AAT GCC TAC AAC TTC ATC ATG GAC CTG
CCA CAG CAA TTT GAC ACC CTT GTT GGA GAA GGA GGA GGC CAG ATG AGT GGT
GGC CAG AAA CAA AGG GTA GCT ATC GCC AGA GCC CTC ATC CGA AAT CCC AAG
ATT CTG CTT TTG GAC ATG GCC ACC TCA GCT CTG GAC AAT GAG AGT GAA GCC
ATG GTG CAA GAA GTG CTG AGT AAG ATT CAG CAT GGG CAC ACA ATC ATT TCA
GTT GCT CAT CGC TTG TCT ACG GTC AGA GCT GCA GAT ACC ATC ATT GGT TTT
GAA CAT GGC ACT GCA GTG GAA AGA GGG ACC CAT GAA GAA TTA CTG GAA AGG
AAA GGT GTT TAC TTC ACT CTA GTG ACT TTG CAA AGC CAG GGA AAT CAA GCT
CTT AAT GAA GAG GAC ATA AAG GAT GCA ACT GAA GAT GAC ATG CTT GCG AGG
ACC TTT AGC AGA GGG AGC TAC CAG GAT AGT TTA AGG GCT TCC ATC CGG CAA
CGC TCC AAG TCT CAG CTT TCT TAC CTG GTG CAC GAA CCT CCA TTA GCT GTT
GTA GAT CAT AAG TCT ACC TAT GAA GAA GAT AGA AAG GAC AAG GAC ATT CCT
GTG CAG GAA GAA GTT GAA CCT GCC CCA GTT AGG AGG ATT CTG AAA TTC AGT
GCT CCA GAA TGG CCC TAC ATG CTG GTA GGG TCT GTG GGT GCA GCT GTG AAC
GGG ACA GTC ACA CCC TTG TAT GCC TTT TTA TTC AGC CAG ATT CTT GGG ACT
TTT TCA ATT CCT GAT AAA GAG GAA CAA AGG TCA CAG ATC AAT GGT GTG TGC
CTA CTT TTT GTA GCA ATG GGC TGT GTA TCT CTT TTC ACC CAA TTT CTA CAG
GGA TAT GCC TTT GCT AAA TCT GGG GAG CTC CTA ACA AAA AGG CTA CGT AAA
TTT GGT TTC AGG GCA ATG CTG GGG CAA GAT ATT GCC TGG TTT GAT GAC CTC
AGA AAT AGC CCT GGA GCA TTG ACA ACA AGA CTT GCT ACA GAT GCT TCC CAA
GTT CAA GGG GCT GCC GGC TCT CAG ATC GGG ATG ATA GTC AAT TCC TTC ACT
AAC GTC ACT GTG GCC ATG ATC ATT GCC TTC TCC TTT AGC TGG AAG CTG AGC
CTG GTC ATC TTG TGC TTC TTC CCC TTC TTG GCT TTA TCA GGA GCC ACA CAG
ACC AGG ATG TTG ACA GGA TTT GCC TCT CGA GAT AAG CAG GCC CTG GAG ATG
GTG GGA CAG ATT ACA AAT GAA GCC CTC AGT AAC ATC CGC ACT GTT GCT GGA
ATT GGA AAG GAG AGG CGG TTC ATT GAA GCA CTT GAG ACT GAG CTG GAG AAG
CCC TTC AAG ACA GCC ATT CAG AAA GCC AAT ATT TAC GGA TTC TGC TTT GCC
TTT GCC CAG TGC ATC ATG TTT ATT GCG AAT TCT GCT TCC TAC AGA TAT GGA
GGT TAC TTA ATC TCC AAT GAG GGG CTC CAT TTC AGC TAT GTG TTC AGG GTG
ATC TCT GCA GTT GTA CTG AGT GCA ACA GCT CTT GGA AGA GCC TTC TCT TAC
ACC CCA AGT TAT GCA AAA GCT AAA ATA TCA GCT GCA CGC TTT TTT CAA CTG
CTG GAC CGA CAA CCC CCA ATC AGT GTA TAC AAT ACT GCA GGT GAA AAA TGG
GAC AAC TTC CAG GGG AAG ATT GAT TTT GTT GAT TGT AAA TTT ACA TAT CCT
TCT CGA CCT GAC TCG CAA GTT CTG AAT GGT CTC TCA GTG TCG ATT AGT CCA
GGG CAG ACA CTG GCG TTT GTT GGG AGC AGT GGA TGT GGC AAA AGC ACT AGC
ATT CAG CTG TTG GAA CGT TTC TAT GAT CCT GAT CAA GGG AAG GTG ATG ATA
GAT GGT CAT GAC AGC AAA AAA GTA AAT GTC CAG TTC CTC CGC TCA AAC ATT
GGA ATT GTT TCC CAG GAA CCA GTG TTG TTT GCC TGT AGC ATA ATG GAC AAT
ATC AAG TAT GGA GAC AAC ACC AAA GAA ATT CCC ATG GAA AGA GTC ATA GCA
GCT GCA AAA CAG GCT CAG CTG CAT GAT TTT GTC ATG TCA CTC CCA GAG AAA

TAT GAA ACT AAC GTT GGG TCC CAG GGG TCT CAA CTC TCT AGA GGG GAG AAA
CAA CGC ATT GCT ATT GCT CGG GCC ATT GTA CGA GAT CCT AAA ATC TTG CTA
CTA GAT GAA GCC ACT TCT GCC TTA GAC ACA GAA AGT GAA AAG ACG GTG CAG
GTT GCT CTA GAC AAA GCC AGA GAG GGT CGG ACC TGC ATT GTC ATT GCC CAT
CGC TTG TCC ACC ATC CAG AAC GCG GAT ATC ATT GCT GTC ATG GCA CAG GGG
GTG GTG ATT GAA AAG GGG ACC CAT GAA GAA CTG ATG GCC CAA AAA GGA GCC
TAC TAC AAA CTA GTC ACC ACT GGA TCC CCC ATC AGT TGA

表4. 例示性ABCB11突變

胺基酸位置1 (例如M1V) ⁹
胺基酸位置4 (例如S4X) ^{A,64}
胺基酸位置8 (例如R8X) ⁸⁸
胺基酸位置19 (例如G19R) ⁵⁶
胺基酸位置24 (例如K24X) ³⁵
胺基酸位置25 (例如S25X) ^{5,14}
胺基酸位置26 (例如Y26Ifs*7) ³⁸
胺基酸位置36 (例如D36D) ²⁷
胺基酸位置38 (例如K38Rfs*24) ⁷³
胺基酸位置43 (例如V43I) ⁵⁷
胺基酸位置49 (例如Q49X) ⁷³
胺基酸位置50 (例如L50S、L50W) ⁵⁷
胺基酸位置52 (例如R52W ²⁶ 、R52R ²⁸)
胺基酸位置56 (例如S56L) ⁵⁸
胺基酸位置58 (例如D58N) ⁶²
胺基酸位置62 (例如M62K) ⁹
胺基酸位置66 (例如S66N) ¹⁷
胺基酸位置68 (例如C68Y) ⁴¹
胺基酸位置50 (例如L50S) ^{5,7}
胺基酸位置71 (例如L71H) ⁷³
胺基酸位置74 (例如I74R) ⁷¹
胺基酸位置77 (例如P77A) ⁷³
胺基酸位置87 (例如T87R) ⁶⁷
胺基酸位置90 (例如F90F) ^{7,27}
胺基酸位置93 (例如Y93S ¹³ 、Y93X ⁸⁸)
胺基酸位置96 (例如E96X) ⁸⁸
胺基酸位置97 (例如L97X) ³⁹
胺基酸位置101 (例如Q101Dfs*8) ⁹
胺基酸位置107 (例如C107R) ³⁶
胺基酸位置112 (例如I112T) ⁹
胺基酸位置114 (例如W114R) ^{2,9}
胺基酸位置123 (例如M123T) ⁶⁷
胺基酸位置127 (例如T127Hfs*6) ⁵

胺基酸位置129 (例如C129Y) ²⁵
胺基酸位置130 (例如G130G) ⁷⁷
胺基酸位置134 (例如I134I) ²⁸
胺基酸位置135 (例如E135K ^{7,13} 、E135L ¹⁷)
胺基酸位置137 (例如E137K) ⁷
胺基酸位置157 (例如Y157C) ⁵
胺基酸位置161 (例如C161X) ³⁹
胺基酸位置164 (例如V164Gfs*7 ³⁰ 、V164I ⁸⁵)
胺基酸位置167 (例如A167S ⁴ 、A167V ⁷ 、A167T ^{9,17})
胺基酸位置181 (例如R181I) ³⁵
胺基酸位置182 (例如I182K) ⁹
胺基酸位置183 (例如M183V ⁸ 、M183T ⁹)
胺基酸位置185 (例如M185I) ⁷³
胺基酸位置186 (例如E186G) ^{2,7,22}
胺基酸位置188 (例如G188W) ⁷³
胺基酸位置194 (例如S194P) ⁷
胺基酸位置198 (例如L198P) ⁷
胺基酸位置199 (例如N199Ifs*15X) ⁸⁸
胺基酸位置206 (例如I206V) ²⁸
胺基酸位置212 (例如A212T) ⁷³
胺基酸位置217 (例如M217R) ⁸⁸
胺基酸位置225 (例如T225P) ⁵⁷
胺基酸位置226 (例如S226L) ⁹
胺基酸位置232 (例如L232Cfs*9) ⁹
胺基酸位置233 (例如L233S) ⁸⁶
胺基酸位置238 (例如G238V) ^{2,7}
胺基酸位置242 (例如T242I) ^{5,7}
胺基酸位置245 (例如I245Tfs*26) ⁵⁷
胺基酸位置256 (例如A256G) ⁹
胺基酸位置260 (例如G260D) ⁷
胺基酸位置269 (例如Y269Y) ²⁷
胺基酸位置277 (例如A277E) ⁷⁷
胺基酸位置283 (例如E283D) ⁷³
胺基酸位置212及283 (例如A212T+E283D) ⁷³
胺基酸位置284 (例如V284L ^{7,39} 、V284A ⁷ 、V284D ²³)
胺基酸位置297 (例如E297G ^{1,2,5,7} 、E297K ⁷)
胺基酸位置299 (例如R299K) ²⁸
胺基酸位置303 (例如R303K ⁸ 、R303M ⁶³ R303fsX321 ⁸³)
胺基酸位置304 (例如Y304X) ²⁶
胺基酸位置312 (例如Q312H) ⁷

胺基酸位置313 (例如R313S) ^{5,7}
胺基酸位置314 (例如W314X) ⁵⁷
胺基酸位置318 (例如K318Rfs*26) ²⁹
胺基酸位置319 (例如G319G) ⁷
胺基酸位置327 (例如G327E) ^{5,7}
胺基酸位置330 (例如W330X) ²⁴
胺基酸位置336 (例如C336S) ^{2,7}
胺基酸位置337 (例如Y337H) ^{21,27}
胺基酸位置342 (例如W342G) ⁵⁰
胺基酸位置354 (例如R354X) ⁹
胺基酸位置361 (例如Q361X ⁵⁷ 、Q361R ⁷⁴)
胺基酸位置366 (例如V366V ²⁸ 、V366D ⁵⁷)
胺基酸位置368 (例如V368Rfs*27) ⁵
胺基酸位置374 (例如G374S) ³
胺基酸位置380 (例如L380Wfs*18) ⁵
胺基酸位置382 (例如A382G) ⁸⁸
Δ胺基酸位置382-388 ⁵
Δ胺基酸位置383-389 ⁵⁷
胺基酸位置387 (例如R387H) ⁹
胺基酸位置390 (例如A390P) ^{5,7}
胺基酸位置395 (例如E395E) ²⁸
胺基酸位置404 (例如D404G) ⁹
胺基酸位置410 (例如G410D) ^{5,7}
胺基酸位置413 (例如L413W) ^{5,7}
胺基酸位置415 (例如R415X) ⁴²
胺基酸位置416 (例如I416I) ²⁷
胺基酸位置420 (例如I420T) ⁹
胺基酸位置423 (例如H423R) ¹³
胺基酸位置432 (例如R432T) ^{1,2,7}
胺基酸位置436 (例如K436N) ⁴⁰
胺基酸位置440 (例如D440E) ⁸⁸
胺基酸位置444 (例如V444A) ²
胺基酸位置454 (例如V454X) ⁴⁹
胺基酸位置455 (例如G455E) ⁹
胺基酸位置457 (例如S457Vfs*23) ⁸⁸
胺基酸位置461 (例如K461E) ^{2,7}
胺基酸位置462 (例如S462R) ⁸⁸
胺基酸位置463 (例如T463I) ^{5,7}
胺基酸位置466 (例如Q466K) ^{5,7}
胺基酸位置470 (例如R470Q ^{5,7} 、R470X ⁹)

胺基酸位置471 (例如Y472X) ⁵
胺基酸位置472 (例如Y472C ^{5,27} 、Y472X ¹⁴)
胺基酸位置473 (例如D473Q ³⁵ 、D473V ⁸⁸)
胺基酸位置475 (例如C475X) ²⁹
胺基酸位置481 (例如V481E) ^{5,7}
胺基酸位置482 (例如D482G) ^{2,5,7}
胺基酸位置484 (例如H484Rfs*5) ⁹
胺基酸位置487 (例如R487H ² 、R487P ⁵)
胺基酸位置490 (例如N490D) ^{5,7}
胺基酸位置493 (例如W493X) ⁸
胺基酸位置496 (例如D496V) ⁸⁸
胺基酸位置498 (例如I498T) ^{2,7}
胺基酸位置499 (例如G499E) ⁷³
胺基酸位置501 (例如V501G) ⁶⁸
胺基酸位置504 (例如E504K) ⁷⁹
胺基酸位置510 (例如T510T) ⁷
胺基酸位置512 (例如I512T) ^{5,7}
胺基酸位置515 (例如N515T ^{5,7} 、N515D ⁶⁴)
胺基酸位置516 (例如I516M) ¹⁷
胺基酸位置517 (例如R517H) ^{5,7}
胺基酸位置520 (例如R520X) ⁵
胺基酸位置523 (例如A523G) ¹³
胺基酸位置528 (例如I528Sfs*21 ⁵ 、I528X ⁹ 、I528T ⁷³)
胺基酸位置535 (例如A535A ⁷ 、A535X ⁸⁹)
胺基酸位置540 (例如F540L) ⁴⁶
胺基酸位置541 (例如I541L ^{5,7} 、I541T ^{5,17})
胺基酸位置546 (例如Q546K ³⁹ 、Q546H ⁷³)
胺基酸位置548 (例如F548Y) ^{5,7}
胺基酸位置549 (例如D549V) ⁹
胺基酸位置554 (例如E554K) ²¹
胺基酸位置556 (例如G556R) ⁶⁷
胺基酸位置558 (例如Q558H) ²³
胺基酸位置559 (例如M559T) ⁵⁷
胺基酸位置562 (例如G562D ^{5,7} 、G562S ⁷³)
胺基酸位置570 (例如A570T ^{2,5,7} 、A570V ²⁶)
胺基酸位置575 (例如R575X ^{2,5} 、R575Q ²¹)
胺基酸位置580 (例如L580P) ⁵⁷
胺基酸位置586 (例如T586I) ⁷
胺基酸位置587 (例如S587X) ⁷³
胺基酸位置588 (例如A588V ^{5,7} 、A588P ⁷³)

胺基酸位置591 (例如N591S) ^{2,7}
胺基酸位置593 (例如S593R) ^{2,7}
胺基酸位置597 (例如V597V ⁹ 、V597L ¹³)
胺基酸位置603 (例如K603K) ⁵⁵
胺基酸位置609 (例如H609Hfs*46) ²⁶
胺基酸位置610 (例如I610Gfs*45 ⁹ 、I610T ⁵⁷) ⁹
胺基酸位置615 (例如H615R) ²⁶
胺基酸位置616 (例如R616G ²⁸ 、R616H ⁷³)
胺基酸位置619 (例如T619A) ²⁸
胺基酸位置623 (例如A623A) ²⁸
胺基酸位置625 (例如T625Nfs*5) ²⁶
胺基酸位置627 (例如I627T) ⁷
胺基酸位置628 (例如G628Wfs*3) ⁷⁰
胺基酸位置636 (例如E636G) ²
胺基酸位置648 (例如G648Vfs*6 ⁵ 、G648V ⁵⁰)
胺基酸位置655 (例如T655I) ⁷
胺基酸位置669 (例如I669V) ²⁶
胺基酸位置676 (例如D676Y) ¹¹
胺基酸位置677 (例如M677V) ^{7,13}
胺基酸位置679 (例如A679V) ⁵⁸
胺基酸位置685 (例如G685W) ⁶⁰
胺基酸位置696 (例如R696W ²⁷ 、R696Q ⁵⁸)
胺基酸位置698 (例如R698H ^{7,9} 、R698K ⁶¹ 、R698C ⁸⁸)
胺基酸位置699 (例如S699P) ⁹
胺基酸位置701 (例如S701P) ⁵⁸
胺基酸位置702 (例如Q702X) ⁸⁹
胺基酸位置709 (例如E709K) ⁷
胺基酸位置710 (例如P710P) ⁷
胺基酸位置712 (例如L712L) ²⁸
胺基酸位置721 (例如Y721C) ⁸⁸
胺基酸位置729 (例如D724N) ³⁹
胺基酸位置731 (例如P731S) ²³
胺基酸位置740 (例如P740Qfs*6) ⁷³
胺基酸位置758 (例如G758R) ⁵
胺基酸位置766 (例如G766R) ^{5,24}
胺基酸位置772 (例如Y772X) ⁵
胺基酸位置804 (例如A804A) ⁷
胺基酸位置806 (例如G806D ⁴⁴ 、G806G ⁵⁵)
胺基酸位置809 (例如S809F) ⁸¹
胺基酸位置817 (例如G817G) ⁸⁸

胺基酸位置818 (例如Y818F) ⁷
胺基酸位置824 (例如G824E) ⁴²
胺基酸位置825 (例如G825G) ⁷³
胺基酸位置830 (例如R830Gfs*28) ⁷³
胺基酸位置832 (例如R832C ^{7,26} 、R832H ⁴¹)
胺基酸位置842 (例如D842G) ²
胺基酸位置848 (例如D848N) ⁷³
胺基酸位置855 (例如G855R) ¹¹
胺基酸位置859 (例如T859R) ^{5,7}
胺基酸位置865 (例如A865V) ²⁷
胺基酸位置866 (例如S866A) ⁵⁷
胺基酸位置868 (例如V868D) ⁷³
胺基酸位置869 (例如Q869P) ⁷³
胺基酸位置875 (例如Q875X) ⁷³
胺基酸位置877 (例如G877R) ⁵⁶
胺基酸位置879 (例如I879R) ⁸⁸
胺基酸位置893 (例如A893V) ⁵⁷
胺基酸位置901 (例如S901R ¹⁷ 、S901I ⁷³)
胺基酸位置903 (例如V903G) ⁵⁷
Δ胺基酸位置919 ¹²
胺基酸位置923 (例如T923P) ^{2,7}
胺基酸位置926 (例如A926P) ^{2,7}
胺基酸位置928 (例如R928X ¹⁵ 、R928Q ⁴⁰)
胺基酸位置930 (例如K930X ⁵ 、K930Efs*79 ^{5,10} 、K930Efs*49 ²⁶)
胺基酸位置931 (例如Q931P) ²⁷
胺基酸位置945 (例如S945N) ⁵⁷
胺基酸位置948 (例如R948C) ^{5,7,26}
胺基酸位置958 (例如R958Q) ²⁸
胺基酸位置969 (例如K969K) ⁸⁸
Δ胺基酸位置969-972 ⁵
胺基酸位置973 (例如T973I) ⁵⁷
胺基酸位置976 (例如Q976R ⁵⁸ 、Q976X ⁸⁸)
胺基酸位置979 (例如N979D) ^{5,7}
胺基酸位置981 (例如Y981Y) ²⁸
胺基酸位置982 (例如G982R) ^{2,5,7}
胺基酸位置444及982 (例如V444A+G982R) ³⁸
胺基酸位置995 (例如A995A) ²⁸
胺基酸位置1001 (例如R1001R) ⁹
胺基酸位置1003 (例如G1003R) ²⁴
胺基酸位置1004 (例如G1004D) ^{2,7}

胺基酸位置1027 (例如S1027R) ²⁶
胺基酸位置1028 (例如A1028A ^{7,10,88} 、A1028E ⁸⁸)
胺基酸位置1029 (例如T1029K) ⁵
胺基酸位置1032 (例如G1032R) ¹²
胺基酸位置1041 (例如Y1041X) ⁹
胺基酸位置1044 (例如A1044P) ⁸⁸
胺基酸位置1050 (例如R1050C) ^{2,7,57}
胺基酸位置1053 (例如Q1053X) ⁵⁷
胺基酸位置1055 (例如L1055P) ³⁶
胺基酸位置1057 (例如R1057X ² 、R1057Q ⁵⁸)
胺基酸位置1058 (例如Q1058Hfs*38 ⁹ 、Q1058fs*38 ¹⁷ 、Q1058X ⁷³)
胺基酸位置1061 (例如I1061Vfs*34) ⁹
胺基酸位置1083 (例如C1083Y) ⁴⁷
胺基酸位置1086 (例如T1086T) ²⁸
胺基酸位置1090 (例如R1090X) ^{2,5}
胺基酸位置1099 (例如L1099Lfs*38) ²⁶
胺基酸位置1100 (例如S1100Qfs*38) ¹³
胺基酸位置1110 (例如A1110E) ^{5,7}
胺基酸位置1112 (例如V1112F) ⁷⁰
胺基酸位置1116 (例如G1116R ⁷ 、G1116F ^{9,17} 、G1116E ³⁶)
胺基酸位置1120 (例如S1120N) ⁸⁸
胺基酸位置1128 (例如R1128H ^{2,7} 、R1128C ^{5,7,13})
胺基酸位置1131 (例如D1131V) ²⁷
胺基酸位置1144 (例如S1144R) ⁷
胺基酸位置1147 (例如V1147X) ⁵
胺基酸位置1153 (例如R1153C ^{2,5,7} 、R1153H ⁵)
胺基酸位置1154 (例如S1154P) ^{5,7}
胺基酸位置1162 (例如E1162X) ³⁹
Δ胺基酸位置1165 ⁸⁸
胺基酸位置1164 (例如V1164Gfs*7)
胺基酸位置1173 (例如N1173D) ⁵⁷
胺基酸位置1175 (例如K1175T) ⁵⁸
胺基酸位置1186 (例如E1186K) ⁷
胺基酸位置1192 (例如A1192Efs*50) ⁹
胺基酸位置1196 (例如Q1196X) ⁸⁸
胺基酸位置1197 (例如L1197G) ⁷
胺基酸位置1198 (例如H1198R) ²⁷
胺基酸位置1204 (例如L1204P) ⁸⁸
胺基酸位置1208 (例如Y1208C) ⁷³
胺基酸位置1210 (例如T1210P ^{5,7} 、T1210F ⁵⁷)

胺基酸位置1211 (例如N1211D) ⁷
胺基酸位置1212 (例如V1212F) ³⁶
胺基酸位置1215 (例如Q1215X) ⁵
胺基酸位置1221 (例如R1221K) ⁵³
胺基酸位置1223 (例如E1223D) ⁷
胺基酸位置1226 (例如R1226P) ⁷³
胺基酸位置1228 (例如A1228V) ⁷
胺基酸位置1231 (例如R1231W ^{5,7} 、R1231Q ^{5,7})
胺基酸位置1232 (例如A1232D) ¹⁷
胺基酸位置1235 (例如R1235X) ^{5,12}
胺基酸位置1242 (例如L1242I) ^{5,7}
胺基酸位置1243 (例如D1243G) ⁶⁷
胺基酸位置1249 (例如L1249X) ⁷³
胺基酸位置1256 (例如T1256fs*1296) ⁸³
胺基酸位置1268 (例如R1268Q) ^{2,7}
胺基酸位置1276 (例如R1276H) ³⁰
胺基酸位置1283 (例如A1283A ²⁸ 、A1283V ⁸⁸)
胺基酸位置1292 (例如G1292V) ⁷³
胺基酸位置1298 (例如G1298R) ⁵
胺基酸位置1302 (例如E1302X) ⁵
胺基酸位置1311 (例如Y1311X) ⁵⁷
胺基酸位置1316 (例如T1316Lfs*64) ¹⁵
胺基酸位置1321 (例如S1321N) ⁵⁷
內含子4 ((+3)A>C) ¹
IVS4-74A>T ⁸⁹
剪接位點突變3'內含子5 c.3901G>A ⁵
剪接位點突變5;內含子7 c.6111G>A ⁵
剪接位點突變IVS7+1G>A ¹⁴
IVS7+5G>A ⁴⁰
IVS8+1G>C ⁷⁶
剪接位點突變5'內含子9 c.9081delG ⁵
剪接位點突變5'內含子9 c.9081G>T ⁵
剪接位點突變5'內含子9 c.9081G>A ⁵
剪接位點突變IVS9+1G>T ¹⁴
剪接位點突變3'內含子13 c.143513_1435-8del ⁵
剪接位點突變IVS13del-13^-8 ¹⁴
剪接位點突變3'內含子16 c.20128T>G ⁵
剪接位點突變IVS16-8T>G ¹⁴
剪接位點突變5'內含子18 c.21781G>T ⁵
剪接位點突變5'內含子18 c.21781G>A ⁵

剪接位點突變5'內含子18 c.21781G>C ⁵
剪接位點突變3'內含子18 c.21792A>G ⁵
剪接位點突變IVS18+1G>A ¹⁴
剪接位點突變5'內含子19 c.2343+1G>T ⁵
剪接位點突變5'內含子19 c.2343+2T>C ⁵
剪接位點突變IVS19+2T>C ¹⁴
剪接位點突變IVS19+1G>A ²²
剪接位點突變3'內含子21 c.26112A>T ⁵
IVS22+3A>G ⁸⁹
IVS 23-8 G-A ³⁶
IVS24+5G>A ⁵¹
剪接位點突變5'內含子24 c.32131delG ⁵
IVS35-6C>G ⁸⁹
推定的剪接突變1198-1G>C ¹⁷
推定的剪接突變1810-3C>G ¹⁷
推定的剪接突變2178+1G>A ¹⁷
推定的剪接突變2344-1G>T ¹⁷
推定的剪接突變c.2611-2A>T ³⁹
推定的剪接突變3213+1_3213+2delinsA ¹⁷
c.-24C>A ^{44,78}
c.76 13 G>T ⁹
c.77-19T>A ⁵²
c.90_93delGAAA ¹⁸
c.124G>A ⁶⁹
c.150 +3 A>C ¹⁰
174C>T ⁵⁴
c.245T>C ⁸⁷
c.249_250insT ¹⁸
270T>C ⁵⁴
402C>T ⁵⁴
585G>C ⁵⁴
c.611+1G>A ⁷⁰
c.611+4A>G ³⁶
c.612-15_-6del10bp ⁵⁵
c.625A>C ³¹
c.627+5G>T ³¹
c.625A>C/ c.627+5G>T ³¹
696G>T ⁵⁴
c. 784+1G>C ⁴⁹
807T>C ⁵⁴

c.886C>T ³¹
c.890A>G ⁵⁹
c.908+1G>A ⁵⁷
c.908+5G>A ⁵⁵
c.908delG ⁵⁹
c.909-15A>G ⁶⁶
957A>G ⁵⁴
c.1084-2A>G ⁵⁷
1145 bp缺失 ⁹⁰
1281C>T ^{54,57}
c.1309-165C > T ¹⁹
c.1434 + 174G > A ¹⁹
c.1434 + 70C > T ¹⁹
c.1530C>A ⁵⁷
c.1587-1589delCTT ³¹
c.1621A>C ^{33,59}
c.1638+32T>C ⁶⁶
c.1638+80C>T ⁶⁶
1671C>T ⁵⁴
1791G>T ⁵⁴
1939delA ¹⁴
c.2075+3A>G ⁵³
c.2081T>A ³¹
c.2093G>A ⁶⁵
2098delA ¹⁶
c.2138-8T>G ⁶⁷
2142A>G ⁵⁴
c.2178+1G>T ^{36,39}
c.2179-17C>A ⁶⁶
c.2344-157T>G ⁶⁶
c.2344-17T>C ⁶⁶
c.2417G>A ⁷⁸
c.2541delG ⁸⁷
c.2620C>T ^{32,33}
c.2815-8A>G ⁵⁵
c.3003A>G ³⁷
c.3084A>G ^{48,54}
c.3213 +4 A>G ^{9,37}
c.3213 +5 G>A ⁹
c.3268C>T ⁷⁵

3285A>G ⁵⁴
c.3382C>T ⁷⁵
3435A>G ⁵⁴
c.3491delT ⁷²
c.3589C>T ⁵⁷
c.3765(+1 +5)del5 ⁴²
c.3766-34A>G ⁶⁶
c.3767-3768insC ⁶
c.3770delA ⁶⁷
c.3826C>T ⁷²
c.3846C>T ⁵⁷
c.3929delG ⁶⁷
c.*236A>G ⁶⁶
1145delC ⁸
Ex13_Ex17del ⁸²

表5. 與PFIC-2相關之所選ABCB11突變

胺基酸位置1 (例如M1V) ⁹
胺基酸位置4 (例如S4X) ⁶⁴
胺基酸位置19 (例如G19R) ⁵⁶
胺基酸位置25 (例如S25X) ¹⁴
胺基酸位置26 (例如Y26Ifs*7) ³⁸
胺基酸位置50 (例如L50S) ^{7,57}
胺基酸位置52 (例如R52W) ²⁶
胺基酸位置58 (例如D58N) ⁶²
胺基酸位置62 (例如M62K) ⁹
胺基酸位置66 (例如S66N) ¹⁷
胺基酸位置68 (例如C68Y) ⁴¹
胺基酸位置93 (例如Y93S) ¹³
胺基酸位置101 (例如Q101Dfs*8) ⁹
胺基酸位置107 (例如C107R) ³⁶
胺基酸位置112 (例如I112T) ⁹
胺基酸位置114 (例如W114R) ^{2,9}
胺基酸位置129 (例如C129Y) ²⁵
胺基酸位置135 (例如E135K ¹³ 、E135L ¹⁷)
胺基酸位置167 (例如A167V ⁷ 、A167T ^{9,17})
胺基酸位置182 (例如I182K) ⁹
胺基酸位置183 (例如M183V ⁸ 、M183T ⁹)
胺基酸位置225 (例如T225P) ⁵⁷
胺基酸位置226 (例如S226L) ⁹

胺基酸位置232 (例如L232Cfs*9) ⁹
胺基酸位置233 (例如L233S) ⁸⁶
胺基酸位置238 (例如G238V) ^{2,7}
胺基酸位置242 (例如T242I) ⁷
胺基酸位置245 (例如I245Tfs*26) ⁵⁷
胺基酸位置256 (例如A256G) ⁹
胺基酸位置260 (例如G260D) ⁵⁷
胺基酸位置284 (例如V284L) ⁷
胺基酸位置297 (例如E297G) ^{2,7}
胺基酸位置303 (例如R303K ⁸ 、R303M ⁶³ 、R303fsX321 ⁸³)
胺基酸位置304 (例如Y304X) ²⁶
胺基酸位置312 (例如Q312H) ⁷
胺基酸位置313 (例如R313S) ⁷
胺基酸位置314 (例如W314X) ⁵⁷
胺基酸位置318 (例如K318Rfs*26) ²⁹
胺基酸位置327 (例如G327E) ⁷
胺基酸位置330 (例如V330X) ²⁴
胺基酸位置336 (例如C336S) ^{2,7}
胺基酸位置337 (例如Y337H) ²¹
胺基酸位置342 (例如W342G) ⁵⁰
胺基酸位置354 (例如R354X) ⁹
胺基酸位置361 (例如Q361X) ⁵⁷
胺基酸位置366 (例如V366D) ⁵⁷
胺基酸位置386 (例如G386X) ³⁴
Δ胺基酸位置383-389 ⁵⁷
胺基酸位置387 (例如R387H) ⁹
胺基酸位置390 (例如A390P) ⁷
胺基酸位置410 (例如G410D) ⁷
胺基酸位置413 (例如L413W) ⁷
胺基酸位置415 (例如R415X) ⁴²
胺基酸位置420 (例如I420T) ⁹
胺基酸位置454 (例如V454X) ⁴⁹
胺基酸位置455 (例如G455E) ⁹
胺基酸位置461 (例如K461E) ^{2,7}
胺基酸位置463 (例如T463I) ⁷
胺基酸位置466 (例如Q466K) ⁷
胺基酸位置470 (例如R470Q ⁷ 、R470X ⁹)
胺基酸位置472 (例如Y472X ¹⁴ 、Y472C ²⁷)
胺基酸位置475 (例如C475X) ²⁹
胺基酸位置481 (例如V481E) ⁷

胺基酸位置482 (例如D482G) ^{2,7}
胺基酸位置484 (例如H484Rfs*5) ⁹
胺基酸位置487 (例如R487H ² 、R487P ⁸⁴)
胺基酸位置490 (例如N490D) ⁷
胺基酸位置493 (例如W493X) ⁸
胺基酸位置498 (例如I498T) ⁷
胺基酸位置501 (例如V501G) ⁶⁸
胺基酸位置512 (例如I512T) ⁷
胺基酸位置515 (例如N515T ⁷ 、N515D ⁶⁴)
胺基酸位置516 (例如I516M) ¹⁷
胺基酸位置517 (例如R517H) ⁷
胺基酸位置520 (例如R520X) ⁵⁷
胺基酸位置523 (例如A523G) ¹³
胺基酸位置528 (例如I528X) ⁹
胺基酸位置540 (例如F540L) ⁴⁶
胺基酸位置541 (例如I541L ⁷ 、I541T ¹⁷)
胺基酸位置548 (例如F548Y) ⁷
胺基酸位置549 (例如D549V) ⁹
胺基酸位置554 (例如E554K) ²¹
胺基酸位置559 (例如M559T) ⁵⁷
胺基酸位置562 (例如G562D) ⁷
胺基酸位置570 (例如A570T ⁷ 、A570V ²⁶)
胺基酸位置575 (例如R575X ² 、R575Q ²¹)
胺基酸位置588 (例如A588V) ⁷
胺基酸位置591 (例如N591S) ^{9,17}
胺基酸位置593 (例如S593R) ^{2,7}
胺基酸位置597 (例如V597V ⁹ 、V597L ¹³)
胺基酸位置591及597 (例如N591S+V597V) ⁹
胺基酸位置603 (例如K603K) ⁵⁵
胺基酸位置609 (例如H609Hfs*46) ²⁶
胺基酸位置610 (例如I610Gfs*45) ⁹
胺基酸位置615 (例如H615R) ²⁶
胺基酸位置625 (例如T625Nfs*5) ²⁶
胺基酸位置627 (例如I627T) ⁷
胺基酸位置636 (例如E636G) ²
胺基酸位置669 (例如I669V) ²⁶
胺基酸位置698 (例如R609H) ⁹
胺基酸位置112及698 (例如I112T+R698H) ⁹
胺基酸位置699 (例如S699P) ⁹
胺基酸位置766 (例如G766R) ²⁴

胺基酸位置806 (例如G806G) ⁵⁵
胺基酸位置824 (例如G824E) ⁴²
胺基酸位置832 (例如R832C ^{7,26} 、R832H ⁴¹)
胺基酸位置842 (例如D842G) ²
胺基酸位置859 (例如T859R) ⁷
胺基酸位置865 (例如A865V) ⁴⁵
胺基酸位置877 (例如G877R) ⁵⁶
胺基酸位置893 (例如A893V) ⁵⁷
胺基酸位置901 (例如S901R) ¹⁷
胺基酸位置903 (例如V903G) ⁵⁷
Δ胺基酸位置919 ¹²
胺基酸位置928 (例如R928X) ^{15,21}
胺基酸位置930 (例如K930Efs*79 ¹⁰ 、K930Efs*49 ²⁶)
胺基酸位置948 (例如R948C) ^{7,26}
胺基酸位置979 (例如N979D) ⁷
胺基酸位置982 (例如G982R) ^{2,7}
胺基酸位置444及982 (例如V444A+G982R) ³⁸
胺基酸位置1001 (例如R1001R) ⁹
胺基酸位置1003 (例如G1003R) ²⁴
胺基酸位置1004 (例如G1004D) ^{2,7}
胺基酸位置1027 (例如S1027R) ²⁶
胺基酸位置1028 (例如A1028A) ¹⁰
胺基酸位置1032 (例如G1032R) ¹²
胺基酸位置1041 (例如Y1041X) ⁹
胺基酸位置1050 (例如R1050C) ⁵⁷
胺基酸位置1053 (例如Q1053X) ⁵⁷
胺基酸位置1055 (例如L1055P) ³⁶
胺基酸位置1057 (例如R1057X) ²
胺基酸位置1058 (例如Q1058Hfs*38 ⁹ 、Q1058fs*38 ¹⁷)
胺基酸位置1061 (例如I1061Vfs*34) ⁹
胺基酸位置1083 (例如C1083Y) ⁴⁷
胺基酸位置1090 (例如R1090X) ²
胺基酸位置1099 (例如L1099Lfs*38) ²⁶
胺基酸位置1100 (例如S1100Qfs*38) ¹³
胺基酸位置1110 (例如A1110E) ⁷
胺基酸位置1116 (例如G1116R ⁷ 、G1116F ^{9,17} 、G1116E ³⁶)
胺基酸位置1128 (例如R1128C) ^{7,13}
胺基酸位置1131 (例如D1131V) ²⁷
胺基酸位置1144 (例如S1144R) ⁷
胺基酸位置1153 (例如R1153C ^{2,7} 、R1153H ^{7,26})

胺基酸位置1154 (例如S1154P) ⁷
胺基酸位置1173 (例如N1173D) ⁵⁷
胺基酸位置1192 (例如A1192Efs*50) ⁹
胺基酸位置1198 (例如H1198R) ²⁷
胺基酸位置1210 (例如T1210P ⁷ 、T1210F ⁵⁷)
胺基酸位置1211 (例如N1211D) ⁷
胺基酸位置1212 (例如V1212F) ³⁶
胺基酸位置1231 (例如R1231W ⁷ 、R1223Q ⁷)
胺基酸位置1232 (例如A1232D) ¹⁷
胺基酸位置1235 (例如R1235X) ¹²
胺基酸位置1242 (例如L1242I) ⁷
胺基酸位置1256 (例如T1256fs*1296) ⁸³
胺基酸位置1268 (例如R1268Q) ^{2,7}
胺基酸位置1302 (例如E1302X) ⁵⁷
胺基酸位置1311 (例如Y1311X) ⁵⁷
胺基酸位置1316 (例如T1316Lfs*64) ¹⁵
內含子4 ((+3)A>C) ¹
剪接位點突變IVS7+1G>A ¹⁴
IVS8+1G>C ⁷⁶
剪接位點突變IVS9+1G>T ¹⁴
剪接位點突變IVS13del-13 ⁻ 8 ¹⁴
剪接位點突變IVS16-8T>G ¹⁴
剪接位點突變IVS18+1G>A ¹⁴
剪接位點突變IVS19+2T>C ¹⁴
IVS 23-8 G-A ³⁶
IVS24+5G>A ⁵¹
推定的剪接突變1198-1G>C ¹⁷
推定的剪接突變1810-3C>G ¹⁷
推定的剪接突變2178+1G>A ¹⁷
推定的剪接突變2344-1G>T ¹⁷
推定的剪接突變3213+1_3213+2delinsA ¹⁷
c.-24C>A ⁷⁸
c.76 13 G>T ⁹
c.77-19T>A ⁵²
c.90_93delGAAA ¹⁸
c.124G>A ⁶⁹
c.150 +3 A>C ¹⁰
c.249_250insT ¹⁸
c.611+1G>A ⁸⁴
c.611+4A>G ³⁶

c.612-15_-6del10bp ⁵⁵
c.625A>C ³¹
c.627+5G>T ³¹
c.625A>C/ c.627+5G>T ³¹
c.886C>T ³¹
c.890A>G ⁵⁹
c.908+1G>A ⁵⁷
c.908+5G>A ⁵⁵
c.908delG ⁵⁹
1273 1bp缺失 ⁹¹
c.1084-2A>G ⁵⁷
c.1445A>G ⁵⁹
c.1587-1589delCTT ³¹
c.1621A>C ⁵⁹
1939delA ¹⁴
c.2081T>A ³¹
2098delA ¹⁶
c.2343+1 G>T ⁸⁰
c.2178+1G>T ³⁶
c.2417G>A ⁷⁸
c.2620C>T ³²
c.2815-8A>G ⁵⁵
c.3003A>G ³⁷
c.3213 +4 A>G ^{9,37}
c.3213 +5 G>A ⁹
c.3268C>T ⁷⁵
c.3382C>T ⁷⁵
c.3765(+1 +5)del5 ⁴²
c.3767-3768insC ⁶
1145delC ⁸
Ex13_Ex17del ⁸²

^A 突變為「X」表示早期終止密碼子

表4及表5之參考文獻

¹ Noe et al., J Hepatol. 2005, vol. 43(3), p. 536-543.

² Lam et al., Am J Physiol Cell Physiol. 2007, vol. 293(5), p. C1709-

- ³ Stindt et al., Liver Int. 2013, vol. 33(10), p. 1527-1735.
- ⁴ Gao et al., Shandong Yiyao 2012, vol. 52(10), p. 14-16.
- ⁵ Strautnieks et al., Gastroenterology. 2008, vol. 134(4), p. 1203-1214.
- ⁶ Kagawa et al., Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2008, vol. 294(1), p. G58-67.
- ⁷ Byrne et al., Hepatology. 2009, vol. 49(2), p. 553-567.
- ⁸ Chen et al., J Pediatr. 2008, vol. 153(6), p. 825-832.
- ⁹ Davit-Spraul et al., Hepatology 2010, vol. 51(5), p. 1645-1655.
- ¹⁰ Dröge et al., Sci Rep. 2016, vol. 6: 24827.
- ¹¹ Lang et al., Pharmacogenet Genomics. 2007, vol. 17(1), p. 47-60.
- ¹² Ellinger et al., World J Gastroenterol. 2017, vol. 23(29), p. :5295-5303.
- ¹³ Vitale et al., J Gastroenterol. 2018, vol. 53(8), p. 945-958.
- ¹⁴ Knisely et al., Hepatology. 2006, vol. 44(2), p. 478-86.
- ¹⁵ Ellis et al., Hepatology. 2018, vol. 67(4), p. 1531-1545.
- ¹⁶ Lam et al., J Hepatol. 2006, vol. 44(1), p. 240-242.
- ¹⁷ Varma et al., Hepatology 2015, vol. 62(1), p. 198-206.
- ¹⁸ Treepongkaruna et al., World J Gastroenterol. 2009, vol. 15(34), p. 4339-4342.
- ¹⁹ Zarenezhad et al., Hepatitis Monthly: 2017, vol. 17(2); e43500.
- ²⁰ Hayashi et al., Hepatol Res. 2016, vol. 46(2), p. 192-200.
- ²¹ Guorui et al., Linchuang Erke Zazhi 2013, vol. 31(10), 905-909.

- ²² van Mil et al., *Gastroenterology*. 2004, vol. 127(2), p. 379-384.
- ²³ Anzivino et al., *Dig Liver Dis*. 2013, vol. 45(3), p. 226-232.
- ²⁴ Park et al., *World J Gastroenterol*. 2016, vol. 22(20), p. 4901-4907.
- ²⁵ Imagawa et al., *J Hum Genet*. 2018, vol. 63(5), p. 569-577.
- ²⁶ Giovannoni et al., *PLoS One*. 2015, vol. 10(12): e0145021.
- ²⁷ Hu et al., *Mol Med Rep*. 2014, vol. 10(3), p. 1264-1274.
- ²⁸ Lang et al., *Drug Metab Dispos*. 2006, vol. 34(9), p. 1582-1599.
- ²⁹ Masahata et al., *Transplant Proc*. 2016, vol. 48(9), p. 3156-3162.
- ³⁰ Holz et al., *Hepatol Commun*. 2018, vol. 2(2), p. 152-154.
- ³¹ Li et al., *Hepatology International* 2017, vol. 11, No. 1, Supp. Supplement 1, pp. S180. Abstract Number: OP284.
- ³² Francalanci et al., *Laboratory Investigation* 2011, vol. 91, Supp. SUPPL. 1, pp. 360A. Abstract Number: 1526.
- ³³ Francalanci et al., *Digestive and Liver Disease* 2010, vol. 42, Supp. SUPPL. 1, pp. S16. Abstract Number: T.N.5.
- ³⁴ Shah et al., *J Pediatr Genet*. 2017, vol. 6(2), p. 126-127.
- ³⁵ Gao et al., *Hepatitis Monthly* 2017, vol. 17(10), e55087/1-e55087/6.
- ³⁶ Evason et al., *Am J Surg Pathol*. 2011, vol. 35(5), p. 687-696.
- ³⁷ Davit-Spraul et al., *Mol Genet Metab*. 2014, vol. 113(3), p. 225-229.
- ³⁸ Maggiore et al., *J Hepatol*. 2010, vol. 53(5), p. 981-6.
- ³⁹ McKay et al., *Version 2. F1000Res*. 2013; 2: 32. DOI:

10.12688/f1000research.2-32.v2

⁴⁰ Liu et al., *Pediatr Int.* 2013, vol. 55(2), p. 138-144.

⁴¹ Waisbourd-Zinman et al., *Ann Hepatol.* 2017, vol. 16(3), p. 465-468.

⁴² Griffin, et al., *Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology* 2016, vol. 2016. Abstract Number: A200. Meeting Info: 2016 Canadian Digestive Diseases Week, CDDW 2016. Montreal, QC, United States. 26 Feb 2016-29 Feb 2016

⁴³ Qiu et al., *Hepatology* 2017, vol. 65(5), p. 1655-1669.

⁴⁴ Imagawa et al., *Sci Rep.* 2017, 7:41806.

⁴⁵ Kang et al., *J Pathol Transl Med.* 2019 May 16. doi: 10.4132/jptm.2019.05.03. [Epub ahead of print]

⁴⁶ Takahashi et al., *Eur J Gastroenterol Hepatol.* 2007, vol. 19(11), p. 942-6.

⁴⁷ Shimizu et al., *Am J Transplant.* 2011, vol. 11(2), p. 394-398.

⁴⁸ Krawczyk et al., *Ann Hepatol.* 2012, vol. 11(5), p. 710-744.

⁴⁹ Sharma et al., *BMC Gastroenterol.* 2018, vol. 18(1), p. 107.

⁵⁰ Sattler et al., *Journal of Hepatology* 2017, vol. 66, No. 1, Suppl. S, pp. S177. Meeting Info.: International Liver Congress / 52nd Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver. Amsterdam, NETHERLANDS. April 19 -23, 2017. European Assoc Study Liver.

⁵¹ Jung et al., *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2007, vol. 44(4), p. 453-

458.

⁵² Sciveres. Digestive and Liver Disease 2010, vol. 42, Suppl. SUPPL. 5, pp. S329. Abstract Number: CO18. Meeting Info: 17th National Congress SIGENP. Pescara, Italy. 07 Oct 2010-09 Oct 2010

⁵³ Sohn et al., Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2019, vol. 22(2), p. 201-206.

⁵⁴ Ho et al., Pharmacogenet Genomics. 2010, vol. 20(1), p. 45-57.

⁵⁵ Wang et al., Hepatol Res. 2018, vol. 48(7), p. 574-584.

⁵⁶ Shaprio et al., J Hum Genet. 2010, vol. 55(5), p. 308-313.

⁵⁷ Bounford. University of Birmingham. Dissertation Abstracts International, (2016) Vol. 75, No. 1C. Order No.: AAI10588329. ProQuest Dissertations & Theses.

⁵⁸ Stolz et al., Aliment Pharmacol Ther. 2019, vol. 49(9), p. 1195-1204.

⁵⁹ Jankowska et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014, vol. 58(1), p. 92-95.

⁶⁰ Kim. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2016, vol. 62, Suppl. SUPPL. 1, pp. 620. Abstract Number: H-P-045. Meeting Info: 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN 2016. Athens, Greece. 25 May 2016-28 May 2016.

⁶¹ Pauli-Magnus et al., Hepatology 2003, vol. 38, No. 4 Suppl. 1, pp. 518A. print. Meeting Info.: 54th Annual Meeting of the American

Association for the Study of Liver Diseases. Boston, MA, USA. October 24-28, 2003. American Association for the Study of Liver Diseases.

⁶² Li et al., Hepatology International 2017, vol. 11, No. 1, Supp. Supplement 1, pp. S362. Abstract Number: PP0347. Meeting Info: 26th Annual Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, APASL 2017. Shanghai, China. 15 Feb 2017-19 Feb 2017.

⁶³ Rumbo et al., Transplantation 2018, vol. 102, No. 7, Supp. Supplement 1, pp. S848. Abstract Number: P.752. Meeting Info: 27th International Congress of The Transplantation Society, TTS 2018. Madrid, Spain. 30 Jun 2018-05 Jul 2018.

⁶⁴ Lee et al., Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2017, vol. 20(2), p. 114-123.

⁶⁵ Sherrif et al., Liver international: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2013, vol. 33, No. 8, pp. 1266-1270.

⁶⁶ Blackmore et al., J Clin Exp Hepatol. 2013, vol. 3(2), p. 159-161.

⁶⁷ Matte et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010, vol. 51(4), p. 488-493.

⁶⁸ Lin et al., Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2018, vol. 20(9), p. 758-764.

⁶⁹ Harmanci et al., Experimental and Clinical Transplantation 2015, vol. 13, Supp. SUPPL. 2, pp. 76. Abstract Number: P62. Meeting Info: 1st Congress of the Turkic World Transplantation Society. Astana,

Kazakhstan. 20 May 2015-22 May 2015.

⁷⁰ Herbst et al., Mol Cell Probes. 2015, vol. 29(5), p. 291-298.

⁷¹ Moghadamrad et al., Hepatology. 2013, vol. 57(6), p. 2539-2541.

⁷² Holz et al., Zeitschrift fur Gastroenterologie 2016, vol. 54, No. 8.

Abstract Number: KV275. Meeting Info: Viszeralmedizin 2016, 71. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten mit Sektion Endoskopie - 10. Herbsttagung der Deutschen Gesellschaft fur Allgemein- und Viszeralchirurgie. Hamburg, Germany. 21 Sep 2016-24 Sep 2016.

⁷³ Wang et al., PLoS One. 2016; vol. 11(4): e0153114.

⁷⁴ Hao et al., International Journal of Clinical and Experimental Pathology 2017, vol. 10(3), p. 3480-3487.

⁷⁵ Arnell et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010, vol. 51(4), p. 494-499.

⁷⁶ Sharma et al., Indian Journal of Gastroenterology 2017, vol. 36, No. 1, Supp. Supplement 1, pp. A99. Abstract Number: M-20. Meeting Info: 58th Annual Conference of the Indian Society of Gastroenterology, ISGCON 2017. Bhubaneswar, India. 14 Dec 2017-17 Dec 2017.

⁷⁷ Beauséjour et al., Can J Gastroenterol. 2011, vol. 25(6), p. 311-314.

⁷⁸ Imagawa et al., Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2016, vol. 63, Supp. Supplement 2, pp. S51. Abstract Number: 166. Meeting Info: World Congress of Pediatric Gastroenterology,

Hepatology and Nutrition 2016. Montreal, QC, Canada. 05 Oct 2016-08 Oct 2016.

⁷⁹ Peng et al., Zhonghua er ke za zhi (Chinese journal of pediatrics) 2018, vol. 56, No. 6, pp. 440-444.

⁸⁰ Tibesar et al., Case Rep Pediatr. 2014, vol. 2014: 185923.

⁸¹ Ng et al., Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2018, vol. 66, Suppl. Supplement 2, pp. 860. Abstract Number: H-P-127. Meeting Info: 51st Annual Meeting European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN 2018. Geneva, Switzerland. 09 May 2018-12 May 2018.

⁸² Wong et al., Clin Chem. 2008, vol. 54(7), p. 1141-1148.

⁸³ Pauli-Magnus et al., J Hepatol. 2005, vol. 43(2), p. 342-357.

⁸⁴ Jericho et al., Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 60, vol. 3, p. 368-374.

⁸⁵ Scheimann et al., Gastroenterology 2007, vol. 132, No. 4, Suppl. 2, pp. A452. Meeting Info.: Digestive Disease Week Meeting/108th Annual Meeting of the American-Gastroenterological-Association. Washington, DC, USA. May 19 -24, 2007. Amer Gastroenterol Assoc; Amer Assoc Study Liver Dis; Amer Soc Gastrointestinal Endoscopy; Soc Surg Alimentary Tract.

⁸⁶ Jaquotot-Haerranz et al., Rev Esp Enferm Dig. 2013, vol. 105(1), p. 52-54.

⁸⁷ Khosla et al., American Journal of Gastroenterology 2015, vol.

110, No. Suppl. 1, pp. S397. Meeting Info.: 80th Annual Scientific Meeting of the American-College-of-Gastroenterology. Honolulu, HI, USA. October 16 -21, 2015.

⁸⁸ Dröge et al., J Hepatol. 2017, vol. 67(6), p. 1253-1264.

⁸⁹ Liu et al., Liver International 2010, vol. 30(6), p. 809-815.

⁹⁰ Chen et al., Journal of Pediatrics 2002, vol. 140(1), p. 119-124.

⁹¹ U.S. Patent No. 9,295,677

【0052】 在一些實施例中，ABCB11中之突變係選自A167T、G238V、V284L、E297G、R470Q、R470X、D482G、R487H、A570T、N591S、A865V、G982R、R1153C及R1268Q。

【0053】 提供治療個體之PFIC(例如PFIC-1及PFIC-2)的方法，其包括對自個體獲得之樣品進行分析以確定個體是否具有與PFIC相關之突變(例如ATP8B1、ABCB11、ABCB4、TJP2、NR1H4或Myo5b突變)，及向確定具有與PFIC相關之突變的個體投與(例如特異性或選擇性投與)治療有效量之式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽。在一些實施例中，突變為ATP8B1或ABCB11突變。舉例而言，如表2至表5中之任一者所提供之突變。在一些實施例中，ATP8B1中之突變係選自L127P、G308V、T456M、D554N、F529del、I661T、E665X、R930X、R952X、R1014X及G1040R。在一些實施例中，ABCB11中之突變係選自A167T、G238V、V284L、E297G、R470Q、R470X、D482G、R487H、A570T、N591S、A865V、G982R、R1153C及R1268Q。

【0054】 亦提供治療有需要之個體之PFIC(例如PFIC-1及PFIC-2)的方法，該方法包含：(a)偵測個體之與PFIC相關之突變(例如ATP8B1、

ABCB11、ABCB4、TJP2、NR1H4或Myo5b突變)；及(b)向個體投與治療有效量之式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽。在一些實施例中，用於治療PFIC之方法可包括向具有與PFIC相關之突變(例如ATP8B1、ABCB11、ABCB4、TJP2、NR1H4或Myo5b突變)的個體投與治療有效量之式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽。在一些實施例中，突變為ATP8B1或ABCB11突變。舉例而言，如表2至表5中之任一者所提供之突變。在一些實施例中，ATP8B1中之突變係選自L127P、G308V、T456M、D554N、F529del、I661T、E665X、R930X、R952X、R1014X及G1040R。在一些實施例中，ABCB11中之突變係選自A167T、G238V、V284L、E297G、R470Q、R470X、D482G、R487H、A570T、N591S、A865V、G982R、R1153C及R1268Q。

【0055】 在一些實施例中，經由使用任何技術公認之測試，包括下一代定序(NGS)，在個體體內或來自個體之活組織檢查樣品中確定個體具有與PFIC相關之突變。在一些實施例中，使用管理機構核准(例如FDA核准)之用於鑑別個體或來自個體之活組織檢查樣品中與PFIC相關之突變的測試或分析，或藉由進行本文所述分析之非限制性實例中之任一者來確定個體具有與PFIC相關之突變。診斷PFIC之額外方法描述於Gunaydin, M. 等人, *Hepat Med.* 2018, 第10卷, 第95-104頁中，其以全文引用的方式併入本文中。

【0056】 在一些實施例中，PFIC (例如PFIC-1或PFIC-2)之治療降低個體之血清膽酸含量。在一些實施例中，血清膽酸含量係藉由例如ELISA酶分析或量測總膽酸之分析來測定，如Danese等人, *PLoS One.* 2017, 第12(6)卷: e0179200中所述，其以全文引用之方式併入本文中。在

一些實施例中，血清膽酸含量可降低例如在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前的血清膽酸含量的10%至40%、20%至50%、30%至60%、40%至70%、50%至80%或大於90%。在一些實施例中，PFIC之治療包括搔癢病之治療。

【0057】 由於LBAT在肝細胞上表現，故LBAT及雙重ASBT/LBAT抑制劑物質需要在血液中具有至少一定生物可用性及游離分率。因為LBAT抑制劑化合物僅需要自腸道存活至肝臟，所以預期此類化合物之相對低的全身暴露將為足夠的，從而使身體其餘部分中任何副作用之潛在風險降至最低。預期LBAT及ASBT之抑制將至少在降低肝內膽酸濃度方面具有累加效應。亦預期雙重ASBT/LBAT抑制劑可能夠降低膽酸含量而不誘發腹瀉，有時亦在ASBT抑制劑下觀測到。

【0058】 預期具有高LBAT抑制效力及足夠生物可用性之化合物特別適用於治療肝炎。預期具有雙重ASBT/LBAT抑制效力及足夠生物可用性之化合物特別適用於治療非酒精性脂肪變性肝炎(NASH)。

【0059】 NASH為一種常見且嚴重的慢性肝病，類似於酒精性肝病，但發生在少喝酒或不喝酒的人中。在NASH患者中，肝臟中之脂肪堆積，稱為非酒精性脂肪肝病(NAFLD)或脂肪變性，及諸如高LDL膽固醇及胰島素抗性之其他因素誘發肝臟中之慢性發炎，且可能導致組織進行性癍痕形成，稱為纖維化及肝硬化，最終導致肝衰竭及死亡。已發現NASH患者在空腹條件(NASH增加2.2至2.4倍)及所有餐後時間點(NASH增加1.7至2.2倍)下的總血清膽酸濃度顯著高於健康個體。此等為牛磺酸結合及甘胺酸結合之初級及次級膽酸增加所驅動的。NASH患者在其空腹及餐後膽酸概況中表現出較大的可變性。此等結果表明，NASH患者在空腹及餐後

更高地暴露於膽酸，包括更多疏水性及細胞毒性次級物種。增加的膽酸暴露可能涉及肝損傷以及NAFLD及NASH之發病機制(Ferslew等人, *Dig Dis Sci.* 2015, 第60卷, 第3318-3328頁)。因此，ASBT及/或LBAT抑制可能有益於NASH之治療。

【0060】 NAFLD之特徵在於肝臟脂肪變性而沒有肝臟脂肪變性之繼發性原因，包括過量飲酒、其他已知肝病或長期使用致脂藥物(Chalasani等人, *Hepatology* 2018, 第67(1)卷, 第328-357頁)。NAFLD可分類為非酒精性脂肪肝(NAFL)及非酒精性脂肪變性肝炎(NASH)。根據Chalasani等人，NAFL定義為存在 $\geq 5\%$ 肝臟脂肪變性而沒有呈肝細胞膨脹形式之肝細胞損傷的證據。NASH定義為存在 $\geq 5\%$ 肝臟脂肪變性及肝細胞損傷(例如膨脹)之發炎，伴有或不伴有任何肝纖維化。NASH亦通常與肝臟發炎及肝纖維化相關，其可進展為肝硬化、末期肝病及肝細胞癌。雖然肝纖維化並非總是存在於NASH中，但纖維化(當存在時)之嚴重程度可能與長期結果有關。

【0061】 存在許多方法用於評定及評估個體是否患有NAFLD，若如此，則評定及評估疾病之嚴重程度，包括區分NAFLD為NAFL或NASH。在一些實施例中，可使用NAS評定NAFLD之嚴重程度。在一些實施例中，可使用NAS評定NAFLD之治療。在一些實施例中，可如Kleiner等人, *Hepatology.* 2005, 41(6):1313-1321中所述確定NAS，其以全文引用之方式併入本文中。關於改編自Kleiner之簡化NAS方案，參見例如表6。

表6.具有纖維化分期之NAFLD活動評分(NAS)的實例

特徵	程度	評分
脂肪變性	<5%	0
	5-33%	1
	>33-66%	2
	>66%	3
小葉發炎	無病灶	0
	<2個病灶/200x	1
	2-4個病灶/200x	2
	>4個病灶/200x	3
膨脹變性	無	0
	很少	1
	許多細胞/顯著膨脹	2
纖維化	無	0
	竇周或門靜脈周	1
	竇周及門靜脈/門靜脈周	2
	橋接纖維化	3
	肝硬化	4

【0062】 在一些實施例中，NAS係非侵入性地確定的，例如，如美國申請案公開號2018/0140219中所述，其以全文引用之方式併入本文中。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前，確定來自個體之樣品的NAS。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之時間段期間或之後確定NAS。在一些實施例中，與投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前相比，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之時間段期間或之後的NAS評分較低指示NAFLD (例如NASH)之治療。舉例而言，NAS降低1、2、3、4、5、6或7指示NAFLD (例如NASH)之治療。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽後，NAS為7或更小。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間，NAS為5或更小、4或更小、3或更小或2或更小。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其

醫藥學上可接受之鹽的時間段期間，NAS為7或更小。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間，NAS為5或更小、4或更小、3或更小或2或更小。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段之後，NAS為7或更小。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段之後，NAS為5或更小、4或更小、3或更小或2或更小。

【0063】 評定及評估個體之NASH的其他方法包括確定肝臟脂肪變性(例如肝臟中之脂肪堆積)；肝臟發炎；指示肝損傷、肝臟發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的生物標誌物(例如血清標誌物及組)中之一或多者。NASH之生理指標的其他實例可包括肝臟形態、肝臟硬度及個體肝臟之大小或重量。

在一些實施例中，個體之NASH係藉由肝臟脂肪之堆積及指示肝損傷之生物標誌物的偵測來證明。舉例而言，升高之血清鐵蛋白及低效價之血清自體抗體可為NASH之常見特性。

【0064】 在一些實施例中，評定NASH之方法包括磁共振成像、藉由光譜分析或藉由質子密度脂肪分率(MRI-PDFF)來量化脂肪變性、瞬時彈性成像(FIBROSCAN®)、肝靜脈壓力梯度(HPVG)、使用MRE之肝臟硬度量測診斷顯著肝纖維化及/或肝硬化，以及評定肝臟活組織檢查之組織學特徵。在一些實施例中，磁共振成像用於偵測脂肪變性肝炎(NASH-MRI)、肝纖維化(Fibro-MRI)及脂肪變性中之一或多者。參見例如美國申請案公開號2016/146715及2005/0215882，其各自以全文引用的方式併入本文中。

【0065】 在一些實施例中，NASH之治療可包括在投與一或多次劑

量之式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽後，個體之與NASH相關之一或多個症狀減少；肝臟脂肪變性之量減少；NAS降低；肝臟發炎減少；指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的生物標誌物含量降低；及纖維化及/或肝硬化減少、纖維化及/或肝硬化沒有進一步進展或纖維化及/或肝硬化進展減緩。

【0066】 在一些實施例中，NASH之治療包含個體之與NASH相關之一或多個症狀減少。例示性症狀可包括肝臟擴大、疲勞、右上腹疼痛、腹部腫脹、皮膚表面正下方血管擴大、男性乳房增大、脾臟腫大、紅掌、黃疸及搔癢病中之一或多者。在一些實施例中，個體無症狀。在一些實施例中，個體之總體重不增加。在一些實施例中，個體之總體重降低。在一些實施例中，個體之身體質量指數(BMI)不增加。在一些實施例中，個體之身體質量指數(BMI)降低。在一些實施例中，個體之腰臀(WTH)比不增加。在一些實施例中，個體之腰臀(WTH)比降低。

【0067】 在一些實施例中，NASH之治療可藉由量測肝臟脂肪變性來評定。在一些實施例中，NASH之治療包含在投與如本文所述之式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽後肝臟脂肪變性減少。在一些實施例中，肝臟脂肪變性係藉由選自由以下組成之群的一或多種方法來確定：超音波檢查術、電腦斷層掃描(CT)、磁共振成像、磁共振光譜分析(MRS)、磁共振彈性成像(MRE)、瞬時彈性成像(TE) (例如FIBROSCAN®)、量測肝臟大小或重量或藉由肝臟活組織檢查(參見例如Di Lascio等人, *Ultrasound Med Biol.* 2018, 第44(8)卷, 第1585-1596頁；Lv等人, *J Clin Transl Hepatol.* 2018, 第6(2)卷, 第217-221頁；Reeder等人, *J Magn Reson Imaging.* 2011, 第34(4)卷, spcone；及de Lédinghen V等人, *J Gastroenterol Hepatol.*

2016, 第31(4)卷, 第848-855頁, 其各自以全文引用的方式併入本文中)。
經診斷患有NASH之個體可具有大於約5%肝臟脂肪變性, 例如大於約5%至約25%、約25%至約45%、約45%至約65%或大於約65%肝臟脂肪變性。在一些實施例中, 具有大於約5%至約33%肝臟脂肪變性之個體具有1期肝臟脂肪變性, 具有約33%至約66%肝臟脂肪變性之個體具有2期肝臟脂肪變性, 且具有大於約66%肝臟脂肪變性之個體具有3期肝臟脂肪變性。

【0068】 在一些實施例中, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前測定肝臟脂肪變性之量。在一些實施例中, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間或之後測定肝臟脂肪變性之量。在一些實施例中, 與在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前相比, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間或之後, 肝臟脂肪變性之量減少指示NASH之治療。舉例而言, 肝臟脂肪變性之量減少約1%至約50%、約25%至約75%或約50%至約100%指示NASH之治療。在一些實施例中, 肝臟脂肪變性之量減少約5%、約10%、約15%、約20%、約25%、約30%、約35%、約40%、約45%、約50%、約55%、約60%、約65%、約70%、約75%、約80%、約85%、約90%或約95%指示NASH之治療。

【0069】 在一些實施例中, 肝臟發炎之存在係藉由選自由以下組成之群之一或多種方法來確定: 指示肝臟發炎之生物標誌物及來自個體之肝臟活組織檢查樣品。在一些實施例中, 肝臟發炎之嚴重程度係由來自個體之肝臟活組織檢查樣品來確定。舉例而言, 肝臟活組織檢查樣品中之肝臟發炎可如Kleiner等人, Hepatology 2005, 第41(6)卷, 第1313-1321頁及

Brunt等人, Am J Gastroenterol 1999, 第94卷, 第2467-2474頁中所述來評定, 其各自特此以全文引用之方式併入。在一些實施例中, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前確定肝臟發炎之嚴重程度。在一些實施例中, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間或之後確定肝臟發炎之嚴重程度。在一些實施例中, 與在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前相比, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間或之後, 肝臟發炎之嚴重程度降低指示NASH之治療。舉例而言, 肝臟發炎之嚴重程度降低約1%至約50%、約25%至約75%或約50%至約100%指示NASH之治療。在一些實施例中, 肝臟發炎之嚴重程度降低約5%、約10%、約15%、約20%、約25%、約30%、約35%、約40%、約45%、約50%、約55%、約60%、約65%、約70%、約75%、約80%、約85%、約90%或約95%指示NASH之治療。

【0070】 在一些實施例中, NASH之治療包含纖維化及/或肝硬化之治療, 例如纖維化之嚴重程度降低、纖維化及/或肝硬化沒有進一步進展或纖維化及/或肝硬化之進展減緩。在一些實施例中, 纖維化及/或肝硬化之存在係藉由選自由以下組成之群的一或多種方法來確定: 瞬時彈性成像(例如FIBROSCAN®)、肝臟纖維化之非侵入性標誌物及肝臟活組織檢查之組織學特徵。在一些實施例中, 纖維化之嚴重程度(例如分期)係藉由選自由以下組成之群的一或多種方法來確定: 瞬時彈性成像(例如FIBROSCAN®)、纖維化評分系統、肝臟纖維化之生物標誌物(例如非侵入性生物標誌物)及肝靜脈壓力梯度(HVPG)。纖維化評分系統之非限制性實例包括NAFLD纖維化評分系統(參見例如Angulo等人, Hepatology 2007, 第45(4)卷, 第846-54頁)、Brunt等人, Am. J. Gastroenterol. 1999, 第

94卷, 第2467-2474頁中之纖維化評分系統、Kleiner等人, Hepatology 2005, 第41(6)卷, 第1313-1321頁中之纖維化評分系統及ISHAK纖維化評分系統(參見Ishak等人, J. Hepatol. 1995, 第22卷, 第696-699頁), 其各自之內容以全文引用之方式併入本文中。

【0071】 在一些實施例中, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前確定纖維化之嚴重程度。在一些實施例中, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間或之後確定纖維化之嚴重程度。在一些實施例中, 與在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前相比, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間或之後, 纖維化之嚴重程度降低指示NASH之治療。在一些實施例中, 纖維化之嚴重程度降低、纖維化及/或肝硬化沒有進一步進展或纖維化及/或肝硬化之進展減緩指示NASH之治療。在一些實施例中, 使用評分系統, 諸如本文所述之纖維化評分系統中之任一者來確定纖維化之嚴重程度, 例如, 評分可指示纖維化之分期, 例如0期(無纖維化)、1期、2期、3期及4期(肝硬化) (參見例如Kleiner等人)。在一些實施例中, 纖維化分期之降低為纖維化嚴重程度之降低。舉例而言, 1、2、3或4期之降低為纖維化嚴重程度之降低。在一些實施例中, 分期之降低, 例如自4期至3期、自4期至2期、自4期至1期、自4期至0期、自3期至2期、自3期至1期、自3期至0期、自2期至1期、自2期至0期或自1期至0期指示NASH之治療。在一些實施例中, 與在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前相比, 在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽後, 纖維化之分期自4期至3期、自4期至2期、自4期至1期、自4期至0期、自3期至2期、自3期至1期、自3期至0期、自2期至1期、自2期至0期或自1期至0期降低。在一些實施例

中，與在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前相比，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間，纖維化之分期自4期至3期、自4期至2期、自4期至1期、自4期至0期、自3期至2期、自3期至1期、自3期至0期、自2期至1期、自2期至0期或自1期至0期降低。在一些實施例中，與在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前相比，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段之後，纖維化之分期自4期至3期、自4期至2期、自4期至1期、自4期至0期、自3期至2期、自3期至1期、自3期至0期、自2期至1期、自2期至0期或自1期至0期降低。

【0072】 在一些實施例中，NASH之存在係藉由指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的一或多種生物標誌物或其評分系統來確定。在一些實施例中，NASH之嚴重程度係藉由指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的一或多種生物標誌物或其評分系統來確定。生物標誌物之含量可藉由例如量測、定量及監測編碼生物標誌物之基因或mRNA的表現量及/或生物標誌物之肽或蛋白質來測定。指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的生物標誌物及/或其評分系統的非限制性實例包括天冬胺酸轉胺酶(AST)與血小板比率指數(APRI)；天冬胺酸轉胺酶(AST)與丙胺酸轉胺酶(ALT)比率(AAR)；FIB-4評分，其係基於APRI、丙胺酸轉胺酶(ALT)含量及個體年齡(參見例如 McPherson等人, Gut 2010, 第59(9)卷, 第1265-9頁，其以全文引用之方式併入本文中)；玻尿酸；促炎性細胞介素；與個體之年齡及性別相結合的一組由 $\alpha 2$ -巨球蛋白、結合球蛋白、脂蛋白元A1、膽紅素、 γ 麩胺醯基轉胺酶(GGT)組成的生物標誌物，以產生肝臟中纖維化及壞死性發炎活動的量度(例如FIBROTEST®、FIBROSURE®)，與個體之年齡及性別相結合

的一組由膽紅素、 γ -麩胺醯基轉移酶、玻尿酸、 $\alpha 2$ -巨球蛋白組成之生物標誌物(例如HEPASCORE®；參見例如Adams等人, Clin. Chem. 2005, 第51(10)卷, 第1867-1873頁), 及一組由金屬蛋白酶-1之組織抑制劑、玻尿酸及 $\alpha 2$ -巨球蛋白組成的生物標誌物(例如FIBROSPECT®)；一組由金屬蛋白酶1之組織抑制劑(TIM P-1)、III型原膠原之胺基端前肽(PIIINP)及玻尿酸(HA)組成的生物標誌物(例如增強型肝纖維化(ELF)評分, 參見例如Lichtinghagen R等人, J Hepatol. 2013年8月;59(2):236-42, 其以全文引用之方式併入本文中)。在一些實施例中, 纖維化之存在係藉由FIB-4評分, 與個體之年齡及性別相結合的一組由 $\alpha 2$ -巨球蛋白、結合球蛋白、脂蛋白元A1、膽紅素、 γ -麩胺醯基轉肽酶(GGT)組成的生物標誌物, 以產生肝臟中纖維化及壞死性發炎活動的量度(例如FIBROTEST®、FIBROSURE®), 與個體之年齡及性別相結合的一組由膽紅素、 γ -麩胺醯基轉移酶、玻尿酸、 $\alpha 2$ -巨球蛋白組成之生物標誌物(例如HEPASCORE®；參見例如Adams等人, Clin. Chem. 2005, 第51(10)卷, 第1867-1873頁), 及一組由金屬蛋白酶-1之組織抑制劑、玻尿酸及 $\alpha 2$ -巨球蛋白組成的生物標誌物(例如FIBROSPECT®)；及一組由金屬蛋白酶1之組織抑制劑(TIM P-1)、III型原膠原之胺基端前肽(PIIINP)及玻尿酸(HA)組成的生物標誌物(例如增強型肝纖維化(ELF)評分)中之一或多者來確定。

【0073】 在一些實施例中, 天冬胺酸轉胺酶(AST)之含量不升高。在一些實施例中, 天冬胺酸轉胺酶(AST)之含量降低。在一些實施例中, 丙胺酸轉胺酶(ALT)之含量不升高。在一些實施例中, 丙胺酸轉胺酶(ALT)之含量降低。在一些實施例中, 酶之「含量」係指酶之濃度, 例如

在血液中。舉例而言，AST或ALT之含量可表示為U/L。

【0074】 在一些實施例中，纖維化之嚴重程度係藉由FIB-4評分，與個體之年齡及性別相結合的一組由 $\alpha 2$ -巨球蛋白、結合球蛋白、脂蛋白元A1、膽紅素、 γ -麩胺醯基轉胺酶(GGT)組成的生物標誌物，以產生肝臟中纖維化及壞死性發炎活動的量度(例如FIBROTEST®、FIBROSURE®)，與個體之年齡及性別相結合的一組由膽紅素、 γ -麩胺醯基轉移酶、玻尿酸、 $\alpha 2$ -巨球蛋白組成之生物標誌物(例如HEPASCORE®；參見例如Adams等人, Clin. Chem. 2005, 第51(10)卷, 第1867-1873頁，其以全文引用之方式併入本文中)，及一組由金屬蛋白酶-1之組織抑制劑、玻尿酸及 $\alpha 2$ -巨球蛋白組成的生物標誌物(例如FIBROSPECT®)；及一組由金屬蛋白酶1之組織抑制劑(TIMP-1)、III型原膠原之胺基端前肽(PIIINP)及玻尿酸(HA)組成的生物標誌物(例如增強型肝纖維化(ELF)評分)中之一或多者來確定。

【0075】 在一些實施例中，肝臟發炎係藉由肝臟發炎生物標誌物(例如促炎性細胞介素)之含量來確定。指示肝臟發炎之生物標誌物的非限制性實例包括介白素-(IL) 6、介白素-(IL) 1 β 、腫瘤壞死因子(TNF)- α 、轉化生長因子(TGF)- β 、單核球趨化蛋白(MCP)-1、C反應蛋白(CRP)、PAI-1及膠原蛋白同功異型物諸如Colla1、Colla2及Col4a1 (參見例如Neuman等人, Can. J. Gastroenterol. Hepatol. 2014, 第28(11)卷, 第607-618頁及美國專利第9,872,844號，其各自以全文引用之方式併入本文中)。肝臟發炎亦可藉由巨噬細胞浸潤之變化，例如量測CD68表現量之變化來評定。在一些實施例中，肝臟發炎可藉由量測或監測介白素-(IL) 6、介白素-(IL) 1 β 、腫瘤壞死因子(TNF)- α 、轉化生長因子(TGF)- β 、單核球趨化蛋白

(MCP)-1及C反應蛋白(CRP)中之一或多者的血清含量或循環含量來確定。

【0076】 在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前，測定來自個體之樣品的指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的一或多種生物標誌物的含量。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間或之後，測定指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的一或多種生物標誌物的含量。在一些實施例中，與在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前相比，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段期間或之後，指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的一或多種生物標誌物的含量降低指示NASH之治療。舉例而言，指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的一或多種生物標誌物的含量降低至少約5%、至少約10%、至少約15%、至少約20%、至少約25%、至少約30%、至少約35%、至少約40%、至少約45%、至少約50%、至少約55%、至少約60%、至少約65%、至少約70%、至少約75%、至少約80%、至少約85%、至少約90%、至少約95%或至少約99%指示NASH之治療。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽後，指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的一或多種生物標誌物的含量降低至少約5%、至少約10%、至少約15%、至少約20%、至少約25%、至少約30%、至少約35%、至少約40%、至少約45%、至少約50%、至少約55%、至少約60%、至少約65%、至少約70%、至少約75%、至少約80%、至少約85%、至少約90%、至少約95%或至少約99%。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受

之鹽的時間段期間，指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的一或多種生物標誌物的含量降低至少約5%、至少約10%、至少約15%、至少約20%、至少約25%、至少約30%、至少約35%、至少約40%、至少約45%、至少約50%、至少約55%、至少約60%、至少約65%、至少約70%、至少約75%、至少約80%、至少約85%、至少約90%、至少約95%或至少約99%。在一些實施例中，在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的時間段之後，指示肝損傷、發炎、肝纖維化及/或肝硬化中之一或多者的一或多種生物標誌物的含量降低至少約5%、至少約10%、至少約15%、至少約20%、至少約25%、至少約30%、至少約35%、至少約40%、至少約45%、至少約50%、至少約55%、至少約60%、至少約65%、至少約70%、至少約75%、至少約80%、至少約85%、至少約90%、至少約95%或至少約99%。

【0077】 在一些實施例中，NASH之治療降低個體之血清膽酸含量。在一些實施例中，血清膽酸含量係藉由例如ELISA酶分析或量測總膽酸之分析來測定，如Danese等人, PLoS One. 2017, 第12(6)卷: e0179200中所述，其以全文引用之方式併入本文中。在一些實施例中，血清膽酸含量可降低例如在投與式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽之前的血清膽酸含量的10%至40%、20%至50%、30%至60%、40%至70%、50%至80%或大於90%。在一些實施例中，NASH為伴隨膽汁鬱積之NASH。在膽汁鬱積中，膽汁(包括膽酸)自肝臟之釋放被阻塞。膽酸會導致肝細胞損傷(參見例如Perez MJ, Briz O. World J. Gastroenterol. 2009, 第15(14)卷, 第1677-1689頁)，從而可能導致或增加纖維化(例如肝硬化)之進展及增加肝細胞癌之風險(參見例如Sorrentino P等人, Dig. Dis. Sci. 2005, 第50(6)卷,

第1130-1135頁及Satapathy SK及Sanyal AJ. *Semin. Liver Dis.* 2015, 第35(3)卷, 第221-235頁, 其各自以全文引用之方式併入本文中)。在一些實施例中, NASH之治療包括搔癢病之治療。在一些實施例中, 伴隨膽汁鬱積之NASH之治療包括搔癢病之治療。在一些實施例中, 患有伴隨膽汁鬱積之NASH的個體患有搔癢病。

【0078】 NASH之例示性生物標誌物提供於表7中。

表7. 例示性NASH生物標誌物

肝纖維化生物標誌物

天冬胺酸轉胺酶(AST)與血小板比率指數(APRI)

天冬胺酸轉胺酶(AST)與丙胺酸轉胺酶(ALT)比率(AAR)

FIB-4評分¹

玻尿酸

促炎性細胞介素

與個體之年齡及性別相結合的一組包括 α 2-巨球蛋白、結合球蛋白、脂蛋白元A1、膽紅素、 γ -麩胺醯基轉胺酶(GGT), 以產生肝臟中纖維化及壞死性發炎活動的量度(例如FIBROTEST®、FIBROSURE®)

與個體之年齡及性別相結合的一組包括膽紅素、 γ -麩胺醯基轉移酶、玻尿酸、 α 2-巨球蛋白(例如HEPAScore®²)

一組包括金屬蛋白酶-1之組織抑制劑、玻尿酸及 α 2-巨球蛋白(例如FIBROSPECT®)

一組包括金屬蛋白酶1之組織抑制劑(TIMP-1)、III型原膠原之胺基端前肽(PIIINP)及玻尿酸(HA) (例如增強型肝纖維化(ELF)評分³)

肝臟發炎生物標誌物^{4,5}

介白素-(IL) 6

介白素-(IL) 1 β

腫瘤壞死因子(TNF)- α

轉化生長因子(TGF)- β

單核球趨化蛋白(MCP)-1

C反應蛋白(CRP)

PAI-1

膠原蛋白同功異型物(例如Colla1、Colla2及Col4a1)

巨噬細胞浸潤之變化(例如CD68表現量之變化)

表7之參考文獻

¹ McPherson et al., Gut. 2010, vol. 59(9), p. 1265-1269.

² Adams, et al. Clin Chem. 2005, vol. 51(10), p. 1867-1873.

³ Lichtinghagen, et al. J Hepatol. 2013, vol. 59(2), p. 236-242.

⁴ Neuman, et al. Can J Gastroenterol Hepatol. 2014, vol. 28(11), p. 607-618.

⁵ U.S. Patent No. 9,872,844

【0079】 一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可在血漿中顯示出較高游離分率。在一些實施例中，游離分率大於約0.2%，諸如大於約0.4%，諸如大於約0.6%，諸如大於約0.8%，諸如大於約1.0%，諸如大於約1.25%，諸如大於約1.5%，諸如大於約1.75%，諸如大於約2.0%，諸如大於約2.5%，諸如大於約3%，諸如大於約4%，諸如大於約5%，諸如大於約7.5%，諸如大於約10%或諸如大於約20%。

【0080】 一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可在尿液中被排

出。在一些實施例中，尿液中排出的化合物之分率大於約0.2%，諸如大於約0.4%，諸如大於約0.6%，諸如大於約0.8%，諸如大於約1.0%，諸如大於約2%，諸如大於約3%，諸如大於約5%，諸如大於約7.5%，諸如大於約10%，諸如大於約15%，諸如大於約20%，諸如大於約30%或諸如大於約50%。

【0081】 由腸道吸收之後，一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可經由腸肝循環進行循環。在一些實施例中，經由腸肝循環進行循環的化合物之分率大於約0.1%，諸如大於約0.2%，諸如大於約0.3%，諸如大於約0.5%，諸如大於約1.0%，諸如大於約1.5%，諸如大於約2%，諸如大於約3%，諸如大於約5%，諸如大於約7%，諸如大於約10%，諸如大於約15%，諸如大於約20%，諸如大於約30%或諸如大於約50%。

【0082】 一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可引起腎臟分泌膽鹽。在一些實施例中，腎臟途徑所分泌的循環膽酸之分率大於約1%，諸如大於約2%，諸如大於約5%，諸如大於約7%，諸如大於約10%，諸如大於約15%，諸如大於約20%或諸如大於約25%。

【0083】 一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可顯示出經改良或最佳滲透率。滲透率可在Caco2細胞中量測，且值係以表觀滲透率(Papp)值給出，單位為cm/秒。在一些實施例中，滲透率大於至少約 0.1×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 0.2×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 0.4×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 0.7×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 1.0×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 2×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 3×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 5×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 7×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 10×10^{-6} cm/秒，諸如大於約 15×10^{-6} cm/秒。

【0084】 一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可顯示出經改良或最佳生物可用性。在一些實施例中，口服生物可用性大於約5%，諸如大於約7%，諸如大於約10%，諸如大於約15%，諸如大於約20%，諸如大於約30%，諸如大於約40%，諸如大於約50%，諸如大於約60%，諸如大於約70%或諸如大於約80%。在其他實施例中，口服生物可用性在約10%與約90%之間，諸如在約20%與約80%之間，諸如在約30%與約70%之間或諸如在約40%與約60%之間。

【0085】 一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可為腎臟中相關轉運蛋白之受質。

【0086】 一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可在腸道、肝臟及血清中產生不會引起不利胃腸道作用之膽酸濃度。

【0087】 一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可降低肝臟中之膽酸濃度而不會引起諸如腹瀉之胃腸道疾病。

【0088】 如本文所用，術語「治療(treatment/treat/treating)」係指逆轉、緩解如本文所述之疾病或病症或其一或多種症狀，延遲其發作或抑制其進展。在一些實施例中，可在已出現一或多種症狀之後投與治療。在其他實施例中，可在不存在症狀之情況下投與治療。舉例而言，可在症狀發作之前向易感個體投與治療(例如，根據症狀病史及/或根據遺傳性或其他易感性因素)。亦可在症狀已消退之後繼續治療，例如以預防或延遲其復發。

【0089】 本發明化合物之適合之醫藥學上可接受之鹽為例如本發明化合物之鹼加成鹽，其具有足夠的酸性，諸如鹼金屬鹽(例如鈉或鉀鹽)、鹼土金屬鹽(例如鈣或鎂鹽)、銨鹽或與提供生理學上可接受之陽離子的有

機鹼之鹽，例如與甲胺、二甲胺、三甲胺、哌啶、嗎啉或參-(2-羥乙基)胺之鹽。

【0090】 一些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可具有對掌性中心及/或幾何異構中心(E-及Z-異構體)。應理解，本發明涵蓋具有ASBT及/或LBAT抑制活性之所有此類光學異構體、非對映異構體及幾何異構體。本發明亦涵蓋具有ASBT及/或LBAT抑制活性之式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的任何及所有互變異構形式。某些式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽可以非溶劑化以及溶劑化形式存在，諸如水合形式。應理解，本發明涵蓋具有ASBT及/或LBAT抑制活性之所有此類溶劑化形式。

【0091】 在另一態樣中，本發明係關於一種醫藥組合物，其包含治療有效量之式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽及一或多種醫藥學上可接受之賦形劑。賦形劑可例如包括填充劑、黏合劑、崩解劑、滑動劑及潤滑劑。一般而言，醫藥組合物可使用習知賦形劑以習知方式製備。

【0092】 適合之填充劑的實例包括但不限於二水合磷酸二鈣、硫酸鈣、乳糖(諸如單水合乳糖)、蔗糖、甘露糖醇、山梨糖醇、纖維素、微晶纖維素、乾澱粉、水解澱粉及預膠凝化澱粉。在某些實施例中，填充劑為甘露糖醇及/或微晶纖維素。

【0093】 適合之黏合劑的實例包括但不限於澱粉、預膠凝化澱粉、明膠、糖(諸如蔗糖、葡萄糖、右旋糖、乳糖及山梨糖醇)、聚乙二醇、蠟、天然及合成膠(諸如阿拉伯膠及黃蓍膠)、海藻酸鈉、纖維素衍生物(諸如羥丙基甲基纖維素(或羥丙甲纖維素)、羥丙基纖維素及乙基纖維素)及合成聚合物(諸如丙烯酸及甲基丙烯酸共聚物、甲基丙烯酸共聚物、甲基丙烯酸甲酯共聚物、甲基丙烯酸胺基烷基酯共聚物、聚丙烯酸/聚甲基

丙烯酸共聚物及聚乙烯吡咯啉酮(聚維酮))。在某些實施例中，黏合劑為羥丙基甲基纖維素(羥丙甲纖維素)。

【0094】 適合之崩解劑的實例包括但不限於乾澱粉、改質澱粉(諸如(部分)預膠凝化澱粉、羥基乙酸澱粉鈉及羧甲基澱粉鈉)、褐藻酸、纖維素衍生物(諸如羧甲基纖維素鈉、羥丙基纖維素及低取代之羥丙基纖維素(L-HPC))及交聯聚合物(諸如羧甲基纖維素、交聯羧甲基纖維素鈉、羧甲基纖維素鈣及交聯PVP (交聯聚維酮))。在某些實施例中，崩解劑為交聯羧甲基纖維素鈉。

【0095】 適合之滑動劑及潤滑劑的實例包括但不限於滑石、硬脂酸鎂、硬脂酸鈣、硬脂酸、山嶺酸甘油酯、膠態二氧化矽、水性二氧化矽、合成矽酸鎂、細粒氧化矽、澱粉、月桂基硫酸鈉、硼酸、氧化鎂、蠟(諸如巴西棕櫚蠟)、氫化油、聚乙二醇、苯甲酸鈉、聚乙二醇及礦物油。在某些實施例中，滑動劑或潤滑劑為硬脂酸鎂或膠態二氧化矽。

【0096】 醫藥組合物可習知地包覆有一或多個包衣層。亦涵蓋用於延遲或靶向釋放式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽的腸溶包衣層或包衣層。包衣層可包含一或多種包衣劑，且可視情況包含塑化劑及/或顏料(或著色劑)。

【0097】 適合之包衣劑的實例包括但不限於基於纖維素之聚合物(諸如乙基纖維素、羥丙基甲基纖維素(或羥丙甲纖維素)、羥丙基纖維素、鄰苯二甲酸乙酸纖維素、丁二酸乙酸纖維素、丁二酸乙酸羥丙基甲基纖維素及鄰苯二甲酸羥丙基甲基纖維素)、基於乙烯基之聚合物(諸如聚乙烯醇)及基於丙烯酸及其衍生物之聚合物(諸如丙烯酸及甲基丙烯酸共聚物、甲基丙烯酸共聚物、甲基丙烯酸甲酯共聚物、甲基丙烯酸胺基烷基酯共聚

物、聚丙烯酸/聚甲基丙烯酸共聚物)。在某些實施例中，包衣劑為羥丙基甲基纖維素。在其他實施例中，包衣劑為聚乙烯醇。

【0098】 適合之塑化劑的實例包括但不限於檸檬酸三乙酯、三乙酸甘油酯、檸檬酸三丁酯、鄰苯二甲酸二乙酯、檸檬酸乙醯基三丁酯、鄰苯二甲酸二丁酯、癸二酸二丁酯及聚乙二醇。在某些實施例中，塑化劑為聚乙二醇。


【0099】 適合之顏料的實例包括但不限於二氧化鈦、氧化鐵(諸如黃色、棕色、紅色或黑色氧化鐵)及硫酸鋇。

【0100】 醫藥組合物可呈適用於經口投與、非經腸注射(包括靜脈內、皮下、肌肉內及血管內注射)、局部投與或直腸投與之形式。在一較佳實施例中，醫藥組合物呈適用於經口投與之形式，諸如錠劑或膠囊。

【0101】 治療性或預防性治療所需之劑量將取決於投與途徑、疾病之嚴重程度、患者之年齡及體重以及當確定適於特定患者之方案及劑量水準時主治醫師通常考慮的其他因素。

【0102】 待投與之化合物之量對於所治療之患者為不同的，且可在每天每公斤體重約1 μg 至約50 mg之間變化。諸如錠劑或膠囊之單位劑型將通常含有約1至約250 mg活性成分，諸如約1至約100 mg，或諸如約1至約50 mg，或諸如約1至約20 mg，例如約2.5 mg，或約5 mg，或約10 mg，或約15 mg。日劑量可以單次劑量形式投與或分成一個、兩個、三個或更多個單位劑量。經口投與之膽酸調節劑的日劑量較佳在約0.1至約250 mg內，更佳在約1至約100 mg內，諸如在約1至約5 mg內，諸如在約1至約10 mg內，諸如在約1至約15 mg內，或諸如在約1至約20 mg內。

【0103】 在另一態樣中，本發明係關於一種式(I)化合物



其中

R^1 及 R^2 各自獨立地為 C_{1-4} 烷基；

R^3 獨立地選自由以下組成之群：氫、鹵素、羥基、 C_{1-4} 烷基、 C_{1-4} 鹵烷基、 C_{1-4} 烷氧基、 C_{1-4} 鹵烷氧基、氰基、硝基、胺基、 N -(C_{1-4} 烷基)胺基、 N,N -二(C_{1-4} 烷基)胺基及 N -(芳基- C_{1-4} 烷基)胺基；

n 為整數1、2或3；

R^4 係選自由以下組成之群：氫、鹵素、羥基、氰基、 C_{1-4} 烷基、 C_{3-6} 環烷基、 C_{1-4} 烷氧基、 C_{3-6} 環烷氧基、 C_{1-4} 烷硫基、 C_{3-6} 環烷硫基、胺基、 N -(C_{1-4} 烷基)胺基及 N,N -二(C_{1-4} 烷基)胺基；

或其醫藥學上可接受之鹽，

其供用作藥劑。

【0104】 在另一態樣中，本發明係關於式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽，其用於治療或預防本文中所列舉之任何疾病。本發明亦關於式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽在製造用於治療或預防本文中所列舉之任何疾病之藥劑中的用途。本發明亦關於治療或預防個體(諸如人類)之本文中所列舉之任何疾病的方法，其包含向需要此類治療或預防之個體投與治療有效量之式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽。

【0105】

組合療法

在本發明之一個態樣中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與至少一種其他治療活性劑，諸如與一種、兩種、三種或更多種其他治療活性劑組合投與。式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽及至少一種其他治療活性劑可同時、依次或分開投與。適合與式(I)化合物組合之治療活性劑包括但不限於適用於治療任何前述病況、病症及疾病的已知活性劑。

【0106】 在一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與另一種ASBT抑制劑組合投與。適合ASBT抑制劑揭示於WO 93/16055、WO 94/18183、WO 94/18184、WO 96/05188、WO 96/08484、WO 96/16051、WO 97/33882、WO 98/03818、WO 98/07449、WO 98/40375、WO 99/35135、WO 99/64409、WO 99/64410、WO 00/47568、WO 00/61568、WO 00/38725、WO 00/38726、WO 00/38727、WO 00/38728、WO 00/38729、WO 01/66533、WO 01/68096、WO 02/32428、WO 02/50051、WO 03/020710、WO 03/022286、WO 03/022825、WO 03/022830、WO 03/061663、WO 03/091232、WO 03/106482、WO 2004/006899、WO 2004/076430、WO 2007/009655、WO 2007/009656、WO 2011/137135、WO 2019/234077、WO 2020/161216、WO 2020/161217、DE 19825804、EP 864582、EP 489423、EP 549967、EP 573848、EP 624593、EP 624594、EP 624595、EP 624596、EP 0864582、EP 1173205、EP 1535913及EP 3210977中，其皆以全文引用之方式併入本文中。

【0107】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與膽酸結合劑(亦稱為膽酸螯合劑或樹脂)，諸如考來維侖(colesevelam)、消膽胺(cholestyramine)或降膽寧(cholestipol)組合投與。在此類組合之一

較佳實施例中，膽酸結合劑經調配用於結腸釋放。此類調配物之實例揭示於例如WO 2017/138877、WO 2017/138878、WO 2019/032026及WO 2019/032027中，其均以全文引用的方式併入本文中。

【0108】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與DPP-IV抑制劑，包括列汀類(gliptins)，諸如西他列汀(sitagliptin)、維格列汀(vildagliptin)、沙格列汀(saxagliptin)、利格列汀(linagliptin)、吉格列汀(gemigliptin)、阿拉格列汀(anagliptin)、替格列汀(teneligliptin)、阿格列汀(alogliptin)、曲格列汀(trelagliptin)、奧格列汀(omarigliptin)、依格列汀(evogliptin)、戈塞列汀(gosogliptin)及多格列汀(dutogliptin)或其醫藥學上可接受之鹽組合投與。

【0109】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與HMG CoA還原酶抑制劑，諸如氟伐他汀(fluvastatin)、洛伐他汀(lovastatin)、普伐他汀(pravastatin)、辛伐他汀(simvastatin)、阿托伐他汀(atorvastatin)、匹伐他汀(pitavastatin)、西立伐他汀(cerivastatin)、美伐他汀(mevastatin)、羅素他汀(rosuvastatin)、貝伐他汀(bervastatin)或達伐他汀(dalvastatin)或其醫藥學上可接受之鹽組合投與。

【0110】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與膽固醇吸收抑制劑，諸如依澤替米貝(ezetimibe)或其醫藥學上可接受之鹽組合投與。

【0111】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與PPAR α 促效劑，包括貝特類(fibrates)，諸如氯貝特(clofibrate)、苯紮貝特(bezafibrate)、環丙貝特(ciprofibrate)、可琳貝特(clinofibrate)、氯貝胺(clofibrade)、非諾貝特(fenofibrate)、吉非羅齊(gemfibrozil)、氯菸

貝特(ronifibrate)及雙貝特(simfibrate)或其醫藥學上可接受之鹽組合投與。

【0112】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與PPAR γ 促效劑，包括噻唑啉二酮類(thiazolidinediones)，諸如吡格列酮(pioglitazone)、羅格列酮(rosiglitazone)及洛貝格列酮(lobeglitazone)或其醫藥學上可接受之鹽組合投與。

【0113】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與雙重PPAR α/γ 促效劑，包括格列紫類(glitazars)，諸如沙格列紫(saroglitazar)、阿格列紫(aleglitazar)、莫格列紫(muraglitazar)或替格列紫(tesaglitazar)或其醫藥學上可接受之鹽組合投與。

【0114】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與雙重PPAR α/δ 促效劑諸如艾拉貝諾(elafibranor)組合投與。

【0115】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與泛PPAR促效劑(亦即對以下所有亞型具有活性之PPAR促效劑： α 、 γ 及 δ)，諸如IVA337組合投與。

【0116】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與法尼醇X受體(FXR)調節劑，包括FXR促效劑，諸如咖啡醇(cafestol)、鵝去氧膽酸、6 α -乙基-鵝去氧膽酸(奧貝膽酸(obeticholic acid；INT-747)、非沙拉明(fexaramine)、曲匹氟索(tropifexor)、希羅氟索(cilofexor)及MET409組合投與。

【0117】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與TGR5受體調節劑，包括TGR5促效劑，諸如6 α -乙基-23(S)-甲基膽酸(INT-777)組合投與。

【0118】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與雙重FXR/TGR5促效劑諸如INT-767組合投與。

【0119】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與熊去氧膽酸(UDCA)組合投與。在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與去甲熊去氧膽酸(nor-UDCA)組合投與。

【0120】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與FGF19調節劑，諸如NGM282組合投與。

【0121】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與FGF21促效劑，諸如BMS-986036組合投與。

【0122】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與整合素抑制劑，諸如PLN-74809及PLN-1474組合投與。

【0123】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與CCR2/CCR5抑制劑，諸如森尼韋若(cenicriviroc)組合投與。

【0124】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與凋亡蛋白酶抑制劑，諸如恩利卡生(emricasan)組合投與。

【0125】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與半乳糖凝集素-3抑制劑，諸如GR-MD-02組合投與。

【0126】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與硬脂醯基-CoA去飽和酶(SCD)抑制劑，諸如阿雷美羅(aramchol) (二十烷基醯胺基膽酸)組合投與。

【0127】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與細胞凋亡信號調節激酶1 (ASK1)抑制劑，諸如司隆色替(selonsertib)組合投與。

【0128】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與LOXL2抑制劑，諸如辛圖珠單抗(simtuzumab)組合投與。

【0129】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與ACC抑制劑，諸如GS-0976組合投與。

【0130】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與甲狀腺激素受體- β 促效劑，諸如MGL3196組合投與。

【0131】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與GLP-1促效劑諸如利拉魯肽(liraglutide)組合投與。

【0132】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與雙重類升糖素肽及升糖素受體促效劑，諸如SAR425899組合投與。

【0133】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與粒線體丙酮酸載體抑制劑，諸如MSDC-0602K組合投與。

【0134】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與抗氧化劑，諸如維生素E組合投與。

【0135】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與SGLT1抑制劑、SGLT2抑制劑或雙重SGLT1及SGLT2抑制劑組合投與。此類化合物之實例為達格列淨(dapagliflozin)、索格列淨(sotagliflozin)、卡格列淨(canagliflozin)、依帕列淨(empagliflozin)、LIK066及SGL5213。

【0136】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與二醯基甘油O-醯基轉移酶2 (DGAT2)抑制劑，諸如DGAT2RX及PF-06865571組合投與。

【0137】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽

與脂肪酸合成酶(FASN)抑制劑，諸如TVB-2640組合投與。

【0138】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與AMP活化蛋白激酶(AMPK)活化劑，諸如PXL-770組合投與。

【0139】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與糖皮質激素受體拮抗劑(GR)、鹽皮質激素受體拮抗劑(MR)或雙重GR/MR拮抗劑組合投與。此類化合物之實例為MT-3995及CORT-118335。

【0140】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與大麻素受體1 (CB1)拮抗劑，諸如IM102組合投與。

【0141】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與Klotho β (KLB)及纖維母細胞生長因子受體(FGFR)活化劑，諸如MK-3655 (先前稱為NGM-313)組合投與。

【0142】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與趨化因子(c-c模體)配體24 (CCL24)抑制劑，諸如CM101組合投與。

【0143】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與A3拮抗劑，諸如PBF-1650組合投與。

【0144】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與P2x7受體拮抗劑，諸如SGM 1019組合投與。

【0145】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與P2Y13受體促效劑，諸如CER-209組合投與。

【0146】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與硫酸化氧固醇，諸如Dur-928組合投與。

【0147】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽

與白三烯D4 (LTD4)受體拮抗劑，諸如MN-001組合投與。

【0148】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與1型自然殺手T細胞(NKT1)抑制劑，諸如GRI-0621組合投與。

【0149】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與抗脂多醣(LPS)化合物，諸如IMM-124E組合投與。

【0150】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與VAP1抑制劑，諸如BI1467335組合投與。

【0151】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與A3腺苷受體促效劑，諸如CF-102組合投與。

【0152】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與SIRT-1活化劑，諸如NS-20組合投與。

【0153】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與菸鹼酸受體1促效劑，諸如ARI-3037MO組合投與。

【0154】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與TLR4拮抗劑，諸如JKB-121組合投與。

【0155】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與己酮糖激酶抑制劑，諸如PF-06835919組合投與。

【0156】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與脂聯素受體促效劑，諸如ADP-335組合投與。

【0157】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與自分泌運動因子抑制劑，諸如PAT-505及PF8380組合投與。

【0158】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與趨化因子(c-c模體)受體3 (CCR3)拮抗劑，諸如柏替木單抗

(bertilimumab)組合投與。

【0159】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與氯通道刺激劑，諸如科普斯酮(cobiprostone)及魯比前列酮(lubiprostone)組合投與。

【0160】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與熱休克蛋白47 (HSP47)抑制劑，諸如ND-L02-s0201組合投與。

【0161】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與固醇調節元件結合蛋白(SREBP)轉錄因子抑制劑，諸如CAT-2003及MDV-4463組合投與。

【0162】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與雙胍，諸如二甲雙胍(metformin)組合投與。

【0163】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與胰島素組合投與。

【0164】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與糖原磷酸化酶抑制劑及/或葡萄糖-6-磷酸酶抑制劑組合投與。

【0165】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與磺醯脲，諸如格列吡嗪(glipizid)、格列本脲(glibenklamid)及格列美脲(glimepirid)組合投與。

【0166】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與美格替耐(meglitinide)，諸如瑞格列奈(repaglinide)、那格列奈(nateglinide)及奧格替耐(ormiglitinide)組合投與。

【0167】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與葡萄糖苷酶抑制劑，諸如阿卡波糖(acarbose)或米格列醇(miglitol)組合投

與。

【0168】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與角鯊烯合成酶抑制劑，諸如TAK-475組合投與。

【0169】 在另一個實施例中，式(I)化合物或其醫藥學上可接受之鹽與PTPB1抑制劑，諸如特羅杜明(trodesquamine)、埃替他非(ertiprotafib)、JTT-551及克拉若明(claramine)組合投與。

【0170】

化合物之製備

本發明之化合物可藉由下文所述之方法製備為游離酸或其醫藥學上可接受之鹽。在整個以下對此類方法之描述中，應理解，在適當的情況下，將以熟習有機合成技術者容易理解的方式將適合之保護基添加至各種反應物及中間物中，且隨後自各種反應物及中間物移除。使用此類保護基之習知程序以及適合之保護基的實例例如描述於P.G.M Wutz及T.W. Greene之*Greene's Protective Groups in Organic Synthesis*，第4版，John Wiley & Sons, Hoboken, 2006中。

【0171】

通用方法

所用的所有溶劑均為分析級。常規使用市售無水溶劑進行反應。起始物質可購自商業來源或根據文獻程序製備。7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物及3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物係如WO 02/50051 (方法26)中所述製備。7-溴-3-丁基-3-乙基-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物可如WO 96/16051 (實例21)中

所述製備。室溫係指20-25℃。溶劑混合物組成係以體積百分比或體積比給出。

【0172】

LCMS：

儀器名稱：Agilent 1290 infinity II。

【0173】 方法A：移動相：A：0.1% HCOOH/H₂O:ACN (95:5)，B：ACN；流動速率：1.5 mL/分鐘；管柱：ZORBAX XDB C-18 (50×4.6 mm) 3.5 μM。

【0174】 方法B：移動相：A：10 mM NH₄HCO₃水溶液，B：ACN；流動速率：1.2 mL/分鐘；管柱：XBridge C8 (50×4.6 mm)，3.5 μM。

【0175】 方法C：移動相：A：0.1% HCOOH水溶液:ACN (95:5)，B：ACN；流動速率：1.5 mL/分鐘；管柱：ATLANTIS dC18 (50×4.6 mm)，5 μM。

【0176】 方法D：移動相：A：10 mM NH₄OAc水溶液，B：ACN；流動速率：1.2 mL/分鐘；管柱：Zorbax Extend C18 (50×4.6mm) 5 μM。

【0177】 方法E：移動相：A：0.1% TFA水溶液:ACN (95:5)，B：0.1% TFA之ACN溶液；流動速率：1.5 mL/分鐘；管柱：XBridge C8 (50×4.6 mm)，3.5 μM。

【0178】 方法F：移動相：A：0.1% TFA水溶液，B：0.1% TFA之ACN溶液；流動速率：0.8 mL/分鐘；管柱：ZORBAX ECLIPSE PLUS C18 (50×2.1 mm)，1.8 μm。

【0179】 方法G：移動相：A：0.1% TFA水溶液，B：0.1% TFA之

ACN溶液；流動速率：0.8 mL/分鐘；管柱：Acquity UPLC BEH C18 (2.1×50 mm)，1.7 μm。

【0180】 方法H：移動相：A：10 mM NH₄OAc，B：100% ACN；流動速率：0.8 mL/分鐘；管柱：Acquity UPLC BEH C18 (2.1×50) mm；1.7 μm。

【0181】 方法I：移動相：A：0.1% HCOOH水溶液:ACN (95:5)，B：ACN；流動速率：0.8 mL/分鐘；管柱：ZORBAX ECLIPSE PLUS C18 (2.1×50) mm，1.8 μm。

【0182】

UPLC：

儀器名稱：waters Acquity I Class

【0183】 方法A：移動相：A：0.1% HCOOH水溶液，B：0.1% HCOOH之ACN溶液；流動速率：0.8 mL/分鐘；管柱：Acquity UPLC HSS T3 (2.1×50) mm；1.8 μm。

【0184】

HPLC：

儀器名稱：Agilent 1260 Infinity II系列儀器，如下使用%與UV偵測(maxplot)。

【0185】 方法A：移動相：A：10 mM NH₄HCO₃水溶液，B：ACN；流動速率：1.0 mL/分鐘；管柱：XBridge C8 (50×4.6 mm，3.5 μm)。

【0186】 方法B：移動相：A：0.1% TFA水溶液，B：0.1% TFA之ACN溶液；流動速率：2.0 mL/分鐘；管柱：XBridge C8 (50×4.6 mm，

3.5 μm)。

【0187】 方法C：移動相：A：10 mM NH_4OAc 之milli-q水溶液，
B：ACN；流動速率：1.0 ml/分鐘；管柱：Phenomenex Gemini C18
(150×4.6 mm，3.0 μm)。

【0188】 方法D：移動相：A：0.1% TFA水溶液，B：ACN；流動
速率：1.0 mL/分鐘；管柱：ATLANTIS dC18 (250×4.6 mm，5.0 μm)。

【0189】 方法E：移動相：A：0.1% TFA水溶液，B：CAN，流動
速率：2.0 mL/分鐘；管柱：X-Bridge C8 (50×4.6 mm，3.5 μm)。

【0190】

對掌性SFC：

儀器名稱：PIC SFC 10 (分析型)

【0191】 CO_2 與共溶劑之間的比率介於60:40與80:20之間

【0192】 方法A：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：3 mL/分
鐘；管柱：YMC Amylose-SA (250×4.6 mm，5 μm)。

【0193】 方法B：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：3 mL/分
鐘；管柱：Chiralpak AD-H (250×4.6 mm，5 μm)。

【0194】 方法C：移動相：20 mM氨/甲醇；流動速率：3 mL/分
鐘；管柱：YMC Cellulose-SC (250×4.6 mm，5 μm)。

【0195】 方法D：移動相：甲醇；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：
Lux A1 (250×4.6 mm，5 μm)。

【0196】 方法E：移動相：0.5%異丙胺/甲醇；流動速率：5 mL/分
鐘；管柱：Lux C4。

【0197】 方法F：移動相：0.5%異丙胺/甲醇；流動速率：3 mL/分

鐘；管柱：YMC Cellulose-SC。

【0198】 方法G：移動相：0.5%異丙胺/甲醇；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Lux A1。

【0199】 方法H：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Lux A1 (250×4.6 mm，5 μm)。

【0200】 方法I：移動相：0.5%異丙胺/甲醇；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：對掌性CCS (250×4.6 mm，5 μm)。

【0201】 方法J：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：5 mL/分鐘；管柱：YMC Cellulose-SC AD-H (250×4.6 mm，5 μm)。

【0202】 方法K：移動相：0.5%異丙胺/甲醇；流動速率：4 mL/分鐘；管柱：(R,R)-Whelk-01 (250×4.6 mm，5 μm)。

【0203】 方法L：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Chiralcel OX-H (250×4.6 mm，5 μm)。

【0204】 方法M：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：5 mL/分鐘；管柱：YMC Cellulose-SC (250×4.6 mm，5 μm)。

【0205】 方法N：移動相：甲醇，流動速率：5 mL/分鐘；管柱：Chiralcel OX-H (250×4.6 mm，5 μm)。

【0206】 方法O：移動相：0.1%異丙胺/IPA:甲醇(1:1)，流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Chiralpak AS-H (250×4.6 mm，5 μm)。

【0207】 方法P：移動相：0.5%異丙胺/甲醇，流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Chiralpak AS-H (250×4.6 mm，5 μm)。

【0208】 方法Q：移動相：IPA，流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Lux A1 (250×4.6 mm，5 μm)。

【0209】 方法R：移動相：0.1%異丙胺/IPA:甲醇(1:1)，流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Lux A1 (250×4.6 mm，5 μm)。

【0210】

製備型HPLC：

儀器名稱：Agilent 1290 Infinity II

【0211】 方法A：移動相：A：0.1% TFA水溶液；移動相；B：0.1% TFA之ACN溶液；流動速率：2.0 mL/分鐘；管柱：X-Bridge C8 (50×4.6 mm，3.5 μM)。

【0212】 方法B：移動相：A：10 mM NH₄OAc水溶液；B：ACN；流動速率：35 mL/分鐘；管柱：X select C18 (30×150 mm，5 μm)。

【0213】 方法C：移動相：A：10 mM NH₄HCO₃水溶液；B：ACN；流動速率：1.0 mL/分鐘；管柱：XBridge C8 (50×4.6 mm，3.5 μm)。

【0214】 方法D：移動相：A：0.1% HCOOH水溶液；B：ACN；流動速率：1.0 mL/分鐘；管柱：X-select C18 (30×150 mm，5 μm)。

【0215】

對掌性製備型SFC：

儀器名稱：PIC SFC 100及 PSC SFC 400

【0216】 CO₂與共溶劑之間的比率介於60:40與80:20之間

【0217】 方法A：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：YMC Amylose-SA (250×30 mm，5 μm)。

【0218】 方法B：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Chiralpak AD-H (250×30 mm，5 μm)。

【0219】 方法C：移動相：20 mM氨/甲醇；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：YMC Cellulose-SC (250×30 mm，5 μm)。

【0220】 方法D：移動相：甲醇；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：對掌性CCS (250×30 mm，5 μm)。

【0221】 方法E：移動相：甲醇；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Lux A1 (250×30 mm，5 μm)。

【0222】 方法F：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Lux A1 (250×30 mm，5 μm)。

【0223】 方法G：移動相：0.5%異丙胺/甲醇；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：對掌性CCS (250×30 mm，5 μm)。

【0224】 方法H：移動相：0.5%異丙胺/IPA，流動速率：5 mL/分鐘；管柱：YMC Amylose-SC (250×30 mm，5 μm)。

【0225】 方法J：移動相：0.5%異丙胺/IPA；流動速率：3 mL/分鐘；管柱：Chiralcel OX-H (250×30 mm，5 μm)。

【0226】 方法K：移動相：0.5%異丙胺/甲醇；流動速率：5 mL/分鐘；管柱：YMC Cellulose-SC (250×30 mm，5 μm)。

【0227】 方法L：移動相：甲醇；流動速率：5 mL/分鐘；管柱：Chiralcel OX-H (250×30 mm，5 μm)。

【0228】

縮寫

ACN	乙腈
DCM	二氯甲烷
DMF	二甲基甲醯胺

IPA	異丙醇
LCMS	液相層析-質譜分析
HPLC	高效液相層析
PE	石油醚
SFC	超臨界流體層析
TFA	三氟乙酸
THF	四氫呋喃
TLC	薄層層析
UPLC	超效能液相層析


【0229】 現將藉由以下實例描述本發明，該等實例不在任何方面限制本發明。全部列舉文獻及參考文獻均以引用之方式併入。

【0230】

實例

中間物1

3,3-二丁基-7-(二甲胺基)-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡
1,1-二氧化物



向7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡
1,1-二氧化物(0.8 g, 1.6 mmol)於甲苯(8 mL)中之攪拌溶液中添加二甲胺
(2 M於THF中; 2.4 mL, 4.8 mmol)、Cs₂CO₃ (1.31 g, 4.0 mmol)，且將
反應混合物用N₂脫氣10分鐘。隨後添加Pd(OAc)₂ (0.036 g, 0.16 mmol)及


XPhos (0.077 g, 0.16 mmol), 且將反應混合物在90°C下加熱隔夜。反應完成(藉由TLC監測)後, 將反應混合物經由矽藻土過濾且用EtOAc洗滌。真空濃縮合併之有機部分, 得到粗物質, 藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 13-15% EtOAc/PE, 矽膠: 230-400目)進行純化, 得到標題化合物。產率: 54% (0.4 g, 黃色膠)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.27 (s, 1H), 7.23-7.19 (m, 2H), 7.00-6.98 (m, 2H), 6.86-6.82 (m, 1H), 6.32 (s, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.65 (s, 2H), 3.20 (s, 2H), 2.66 (s, 6H), 1.40-1.32 (m, 4H), 1.20-1.12 (m, 8H), 0.79-0.72 (m, 6H)。LCMS: (方法A) 459.3 (M+H), Rt. 3.40 min, 92.77% (Max)。

【0231】

中間物2

3,3-二丁基-7-(二甲胺基)-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



在0°C下, 向3,3-二丁基-7-(二甲胺基)-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物1; 0.4 g, 0.87 mmol)於DCM (4 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加BBr₃ (0.42 mL, 4.3 mmol), 且將反應混合物在室溫下攪拌2小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 將反應物質冷卻至0°C。藉由逐滴添加甲醇(5 mL)淬滅反應物, 且隨後添加冰冷的水(10 mL)。將水層用DCM (2×15 mL)萃取, 用鹽水(10 mL)洗滌且經無水


Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分，得到粗物質，藉由Isolera管柱層析(溶離劑：15-18% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)進行純化，得到標題化合物。產率：66% (0.33 g，黃色膠)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 9.83 (s, 1H), 7.28 (s, 1H), 7.20-7.16 (m, 2H), 6.94-6.92 (m, 2H), 6.81-6.79 (m, 1H), 6.31 (s, 1H), 3.62 (s, 2H), 3.14 (s, 2H), 2.66 (s, 6H), 1.34-1.24 (m, 4H), 1.16-1.06 (m, 8H), 0.85-0.77 (m, 6H)。LCMS: (方法A) 445.2 (M+H), Rt. 3.10 min, 81.86% (Max)。

【0232】

中間物3

2-((3,3-二丁基-7-(二甲胺基)-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯



在0℃下，向3,3-二丁基-7-(二甲胺基)-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物2；0.15 g，0.34 mmol)於無水DMF (5 mL)中之攪拌溶液中添加60% NaH (0.03 g，0.67 mmol)及2-溴乙酸甲酯(0.15 g，1.0 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌4小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用冰冷的水淬滅且將水層用EtOAc (2×15 mL)萃取。將合併之有機層用鹽水(15 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：25% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。產率：82% (0.14 g，膠狀

固體)。


¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.24-7.20 (m, 2H), 7.19 (s, 1H), 7.02 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.87 (t, *J* = 7.2 Hz, 1H), 6.31 (s, 1H), 4.85 (s, 2H), 3.74 (s, 3H), 3.63 (s, 2H), 3.19 (s, 2H), 2.75 (s, 6H), 1.41-1.32 (m, 4H), 1.29-1.14 (m, 4H), 1.11-1.02 (m, 4H), 0.76 (t, *J* = 6.80 Hz, 6H)。

LCMS: (方法A) 517.0 (M⁺+H), Rt. 3.21 min, 88.31% (Max)。

【0233】

中間物4

5-(4-溴苯基)-3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



在-10℃下，向3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(4 g, 8.93 mmol)於DMF (20 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加溶解於DMF (20 mL)中之N-溴代丁二醯亞胺(1.75 g, 9.82 mmol)，且將反應混合物在-50℃下攪拌1小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物倒入碎冰中且劇烈攪拌5分鐘。將沈澱出之固體濾出，用冰冷的水洗滌且真空乾燥，得到標題化合物。**產率**：4.4 g (粗物質，淡粉色固體)。


¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.64 (s, 1H), 7.32-7.29 (m, 3H), 6.82 (d, *J* = 11.2 Hz, 2H), 6.75 (s, 1H), 3.62 (bs, 2H), 3.21 (s, 2H), 2.23

(s, 3H), 1.44-1.08 (m, 12H), 0.82-0.78 (m, 6H) 。 **UPLC:** (方法A) 526.7 (M⁺), Rt. 2.1 min, 96.80% (Max) 。

【0234】

中間物5

3,3-二丁基-8-羥基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼1,1-二氧化物




在室溫下，向5-(4-溴苯基)-3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼1,1-二氧化物(中間物4；1.5 g，2.84 mmol)於無水DMF (5 mL)中之攪拌溶液中添加甲醇鈉(5 mL，20%於甲醇中)及CuBr (0.06 g，0.284 mmol)，且將反應混合物在100℃下加熱24小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，將反應混合物經由矽藻土過濾且用EtOAc (15 mL)洗滌。真空濃縮有機部分，且將所得粗物質原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率：**44% (0.600 g，棕色膠狀固體)。

LCMS: (方法C) 477.68 (M+H), Rt. 3.51 min, 76.40% (Max) 。

【0235】

中間物6

2-((3,3-二丁基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸甲酯




在0℃下,向3,3-二丁基-8-羥基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物5; 0.19 g, 0.4 mmol)於無水DMF (5 mL)中之攪拌溶液中添加60% NaH (0.02 g, 0.48 mmol)及2-溴乙酸甲酯(0.086 g, 0.56 mmol), 且將反應混合物在室溫下攪拌4小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 將反應混合物用冰冷的水(5 mL)淬滅且將水層用EtOAc (2×15 mL)萃取。將合併之有機層用鹽水(15 mL)洗滌, 經無水Na₂SO₄乾燥且隨後真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 25% EtOAc/PE; 矽膠: 230-400目)純化所得粗物質, 得到標題化合物。產率: 86% (0.16 g, 無色膠)。

LCMS: (方法C) 550.1 (M⁺+H), Rt. 3.13 min, 92.03% (Max)

【0236】

中間物7

2-((5-(4-溴苯基)-3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯



向5-(4-溴苯基)-3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯


并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物4；500 mg，0.95 mmol)於DMF (5 mL)中之溶液中添加無水K₂CO₃ (394 mg，2.85 mmol)及溴乙酸第三丁酯(0.3 mL，1.90 mmol)，且將反應混合物在100℃下加熱2小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用EtOAc (15 mL)稀釋且將有機層用水(2×10 mL)洗滌。有機部分經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。將所得粗物質原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**：98% (600 mg，棕色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.34 (d, *J* = 11.6 Hz, 2H), 7.17 (s, 1H), 6.88 (d, *J* = 11.2 Hz, 2H), 6.80 (s, 1H), 4.82 (s, 2H), 3.65 (s, 2H), 3.23 (s, 2H), 2.24 (s, 3H), 1.45-1.35 (m, 13H), 1.30-1.09 (m, 8H), 0.81-0.70 (m, 6H)。**LCMS**: (方法A) 584.0 (M⁺-^tBu+H), Rt. 3.48 min, 96.44% (Max)。

【0237】

中間物8

2-((3,3-二丁基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯



向3,3-二丁基-8-羥基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物5；550 mg，1.15 mmol)於DMF (10 mL)中之溶液中添加無水K₂CO₃ (477 mg，3.45 mmol)及溴乙酸第三丁酯(673 mg，3.45 mmol)，且將反應混合物在100℃下加熱3小時。反應完成(藉由


TLC監測)後，將反應混合物用EtOAc (15 mL)稀釋。隨後將混合物用水(15 mL)、鹽水(15 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分且藉由Isolera管柱層析(溶離劑：15-18% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：51% (350 mg，淡黃色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): 7.13-7.11 (m, 3H), 6.89 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H), 6.47 (s, 1H), 4.74 (s, 2H), 3.73 (s, 3H), 3.68 (s, 2H), 3.29 (s, 2H), 2.35 (s, 3H), 1.45-1.39 (m, 12H), 1.21-0.92 (m, 9H), 0.75 (t, *J* = 6.8 Hz, 6H)。**UPLC**: (方法A) 592.6 (M⁺⁺H), Rt. 1.49 min, 90.52% (Max)。

【0238】

中間物9

2-((3,3-二丁基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯



在-40℃下，向2-((3,3-二丁基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯(中間物9；350 mg，0.59 mmol)於DCM (2.5 L)中之攪拌溶液中添加BBr₃(1 M於DCM中，0.9 mL，0.88 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成(藉由UPLC監測)後，將反應混合物冷卻至0℃，用甲醇(5 mL)淬滅且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：15% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：31% (100 mg，淡黃色固


體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 9.24 (s, 1H), 7.13 (s, 1H), 7.06 (d, *J* = 8.4 Hz, 2H), 6.72 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H), 6.38 (s, 1H), 4.87 (s, 2H), 3.71 (s, 3H), 3.63 (s, 2H), 3.29 (s, 2H), 2.07 (s, 3H), 1.39-1.35 (m, 4H), 1.11-0.99 (m, 8H), 0.77-0.74 (m, 6H)。**UPLC** (方法A) 536.9 (M⁺+H), Rt. 1.18 min, 99.63% (Max)。

【0239】

中間物10

4-(3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-3,4-二氫-1,5-苯并噻氮呋-5(2H)-基)苯甲腈



在室溫下，向5-(4-溴苯基)-3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物4；4.4 g，8.36 mmol)於DMF (40 mL)中之攪拌溶液中添加氰化鋅(4.9 g，41.01 mmol)，且將反應混合物用N₂脫氣30分鐘。添加肆(三苯基膦)鈰(0)(0.96 g，0.83 mmol)且將反應混合物在100℃下加熱24小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物倒入冰冷的水(25 mL)且將水層用EtOAc (2×50 mL)萃取。將合併之有機層用冰冷的水(30 mL)、鹽水(30 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分且藉由Isolera管柱層析(溶離劑：90-100% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：48% (1.9 g，灰白色固體)。


$^1\text{H NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.83 (s, 1H), 7.54 (d, $J = 11.6$ Hz, 2H), 7.34 (s, 1H), 6.92-6.71 (m, 3H), 3.62 (bs, 2H), 3.21 (s, 2H), 2.27 (s, 3H), 1.65-1.35 (m, 3H), 1.29-1.14 (m, 9H), 0.82 (t, $J = 8.8$ Hz, 6H)。

LCMS: (方法A) 473.2 ($\text{M}^+\text{+H}$), Rt.2.67 min, 87.18% (Max)。

【0240】

中間物11

2-((3,3-二丁基-5-(4-氰苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯




向4-(3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-3,4-二氫-1,5-苯并噻氮呋-5(2H)-基)苯甲腈(中間物10；100 mg，0.21mmol)於DMF (5 mL)中之溶液中添加無水 K_2CO_3 (58 mg，0.42 mmol)及溴乙酸第三丁酯 (82 mg，0.42 mmol)，且將反應混合物在 100°C 下加熱3小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用EtOAc稀釋且用水及鹽水洗滌。有機部分經無水 Na_2SO_4 乾燥且真空濃縮，得到粗物質，將其轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率：**110 mg (粗物質，淡棕色固體)。

UPLC: (方法A) 587.4 ($\text{M}^+\text{+H}$), Rt. 1.37 min, 91.13% (Max)。

【0241】

中間物12

7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮




向7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮吡-4(5H)-酮(2 g, 5.01 mmol)於4-溴三氟甲苯(6 mL)中之短暫脫氣溶液中添加參[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺(0.16 g, 0.5 mmol)、CuI (0.19 g, 1.0 mmol)及無水K₂CO₃ (1.38 g, 10.02 mmol)，且將反應混合物在130℃下加熱24小時。反應完成(藉由TLC監測)後，真空濃縮反應混合物且將所得殘餘物溶解於水(15 mL)中。將水層用EtOAc (2×25 mL)萃取，且將合併之有機層用鹽水(50 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：19% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：73% (2.2 g, 黃色膠)。

LCMS: (方法C) 544.1 (M+H), Rt. 3.54 min, 89.96% (Max)。

【0242】

中間物13

7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡



在0℃下，向7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮吡-4(5H)-酮(中間物12；2 g, 3.68 mmol)於無水THF (20 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加甲硼烷二甲基硫醚(1 M於THF中；7.5 mL，


7.37 mmol)，且將反應混合物在80℃下加熱16小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物在0℃下用甲醇(15 mL)淬滅且加熱1小時至80℃。隨後真空濃縮反應混合物。將所得殘餘物溶解於水(15 mL)中且用EtOAc (2×50 mL)萃取。將合併之有機層用鹽水(50 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：4% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：62% (1.21 g，灰白色固體)。

LCMS: (方法D) 532.1 (M+H), Rt. 3.26 min, 81.24% (Max)。

【0243】

中間物14

7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



向7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡(中間物13；1.21 g，2.26 mmol)於丙酮及水之混合物(12 mL，3:1)中之攪拌溶液中添加過硫酸氫鉀(7 g，2.27 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌48小時。藉由TLC及LCMS監測反應，表明形成亞磺及磺產物。隨後經由矽藻土過濾反應混合物以移除過量過硫酸氫鉀，且用水(30 mL)稀釋濾液。用EtOAc (2×40 mL)萃取水層且用鹽水(40 mL)洗滌合併之有機層。有機部分經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮，獲得粗物質，藉由Isolera管柱層析(溶離劑：3% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)進行純


化，得到標題化合物。**產率**：68% (0.87 g，淡黃色固體)。

LCMS: (方法D) 562.1 ($M^+ + H$), Rt. 4.39 min, 95.43% (Max)。

【0244】

中間物15

3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物




向7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物14；0.87 g，1.54 mmol)於DMF (5 mL)中之攪拌溶液中添加NaSMe (0.57 g，7.73 mmol)，且將溶液在60℃下加熱4小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物傾倒於冰冷的水(15 mL)上且攪拌5分鐘。用EtOAc (2×15 mL)萃取水層且用鹽水(15 mL)洗滌合併之有機層。有機部分經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮，得到粗標題化合物，將其原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**：71% (0.57 g，黃色膠)。

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.95 (s, 1H), 7.45 (d, *J* = 8.0 Hz, 2H), 7.32 (s, 1H), 6.92-6.85 (m, 2H), 6.84 (s, 1H), 3.85 (s, 2H), 3.21 (s, 2H), 2.25 (s, 3H), 1.52-1.39 (m, 2H), 1.26-1.13 (m, 10H), 0.82-0.79 (m, 6H)。**LCMS**: (方法C) 516.1 ($M^+ + H$), Rt. 3.09 min, 81.04% (Max)。

【0245】

中間物16

2-((3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸甲酯




在0℃下，向3,3-二丁基-8-羥基-7-(甲硫基)-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物15；150 g，0.29 mmol)於DMF (1.5 mL)中之攪拌溶液中分批添加60% NaH (16 mg，0.37 mmol)，且將反應混合物攪拌15分鐘。添加溴乙酸甲酯(66.7 mg，0.43 mmol)且將反應混合物在室溫下攪拌1小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應物質冷卻至0℃，用1.5 N HCl (pH~4)淬滅且用H₂O (5 mL)稀釋。用EtOAc (2×8 mL)萃取水層。將合併之有機層用鹽水(10 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。用冷甲醇濕磨所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：35% (60 mg，白色固體)。

LCMS: (方法C) 588.1 (M⁺+H), Rt. 3.17 min, 79.80% (Max)。

【0246】

中間物17

3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物




向7-溴-3-丁基-3-乙基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(3 g, 6.43 mmol)於甲苯(10 mL)中之攪拌溶液中添加Cs₂CO₃ (5.2 g, 16.1 mmol), 且將反應混合物用N₂脫氣10分鐘。隨後添加二甲胺(2 M於THF中; 6.4 mL, 12.8 mmol)、Pd(OAc)₂ (0.04 g, 0.16 mmol), 接著添加X-Phos (0.08 g, 0.16 mmol), 且將反應混合物在90°C下加熱16小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 經由矽藻土過濾反應混合物且用EtOAc (100 mL)洗滌矽藻土墊。真空濃縮合併之有機部分且藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 13-15% EtOAc/PE, 矽膠: 230-400目)純化所得粗物質, 得到標題化合物。**產率**: 26% (0.7 g, 黃色膠)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.28 (s, 1H), 7.22-7.18 (m, 2H), 6.97 (d, *J* = 8.0 Hz, 2H), 6.83 (t, *J* = 7.2 Hz, 1H), 6.34 (s, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.70 (bs, 2H), 3.29 (s, 2H), 2.66 (s, 6H), 1.54-1.41 (m, 2H), 1.35-1.24 (m, 2H), 1.20-1.12 (m, 4H), 0.85-0.75 (m, 6H)。**LCMS**: (方法A) 431.2 (M⁺+H), Rt. 3.19 min, 83.34% (Max)。

【0247】

中間物18

3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



在室溫下, 向3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物17; 1.9 g, 4.41 mmol)於DMF


(15 mL)中之攪拌溶液中添加硫代甲醇鈉(1.54 g, 22.06 mmol), 且將反應混合物在80℃下攪拌12小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 將反應物質冷卻至室溫且用水(15 mL)淬滅。用EtOAc (2×15 mL)萃取水層。將合併之有機層用水(20 mL)及鹽水(20 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分, 得到粗化合物, 將其原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**: 1.8 g (粗物質, 棕色膠)。

LCMS: (方法E) 417.2 (M⁺+H), Rt. 2.11 min, 55.04% (Max)。

【0248】

中間物19

2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸甲酯




向3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物18; 0.15 g, 0.36 mmol)於無水DMF(5 mL)中之攪拌溶液中添加K₂CO₃ (0.1 g, 0.72 mmol)及溴乙酸甲酯(0.066 mg, 0.43 mmol), 且將反應混合物在60℃下攪拌6小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 經由矽藻土墊過濾反應混合物且用EtOAc (15 mL)洗滌矽藻土墊。將濾液用水(15 mL)、鹽水(15 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分且藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 25% EtOAc/PE; 矽膠: 230-400目)純化所得粗物質, 得到標題化合物。**產率**: 72% (0.13 g, 白色固體)。

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.23 (d, *J* = 7.4 Hz, 1H), 7.20 (s, 2H), 6.99 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.86 (d, *J* = 7.3 Hz, 1H), 6.33 (s, 1H), 4.86 (s, 2H), 3.74 (s, 3H), 3.67 (bs, 2H), 3.19 (s, 2H), 2.74 (s, 6H), 1.52-1.30 (m, 4H), 1.24-1.02 (m, 4H), 0.74 (t, *J* = 7.68 Hz, 6H) 。 **LCMS:** (方法A) 489.3 (M⁺+H), Rt. 3.0 min, 94.14% (Max) 。

【0249】

中間物20

5-氟-6-甲氧基苯并[d]噻唑-2-胺




向3-氟-4-甲氧基苯胺(5 g, 0.04 mmol)於乙酸(50 mL)中之攪拌溶液中添加硫氰酸銨(2.96 g, 0.04 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌45分鐘。隨後在15℃下，將溶解於乙酸(10 mL)中之溴(5.7 g, 0.04 mmol)逐滴添加至反應混合物，且將所得反應混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成後，將所得固體濾出，用乙酸(10 mL)洗滌固體且隨後真空乾燥。將所得固體懸浮於水(20 mL)中，用10% NaOH溶液鹼化(pH~10)且濾出。用水(3×20 mL)洗滌所得固體且真空乾燥，得到標題化合物。**產率**：84% (5.9 g，灰白色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.52 (d, *J* = 8.6 Hz, 1H), 7.39 (s, 2H), 7.18 (d, *J* = 12.4 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H) 。 **LCMS:** (方法A) 199.04 (M⁺+H), Rt. 1.08 min, 98.24% (Max) 。

【0250】

中間物21

2-(((2-胺基-4-氟-5-甲氧苯基)硫基)甲基)-2-丁基己酸




向5-氟-6-甲氧基苯并[d]噻唑-2-胺(中間物20；5.9 g，0.03 mmol)於水(60 mL)中之攪拌溶液中添加KOH (27 g，0.47 mmol)，且將反應混合物在120℃下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，將反應混合物冷卻至室溫。隨後逐滴添加2-(溴甲基)-2-丁基己酸(4.5 g，0.04 mmol) (溶解於20 mL THF中)，且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。在起始物質消耗(藉由LCMS監測)後，將反應混合物冷卻至0℃且用濃HCl (pH~2)酸化。用EtOAc (2×20 mL)萃取水層。將合併之有機層用水(20 mL)及鹽水(20 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分，且將所得粗物質原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**：12.5 g (粗物質，棕色膠)。

LCMS: (方法A) 358.2 (M⁺+H), Rt. 2.67 min, 61.03% (Max)。

【0251】

中間物22

3,3-二丁基-7-氟-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮吡-4(5H)-酮



在0℃下，向2-(((2-胺基-4-氟-5-甲氧基苯基)硫基)甲基)-2-丁基己酸(中間物21；12.5 g，0.04 mmol)於EtOAc (80 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加三乙胺(9.04 g，0.07 mmol)及1-丙烷膦酸酐溶液(50%於EtOAc中；16.7 g，0.05 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由


UPLC監測)後，將反應混合物用水(100 mL)淬滅且將水層用EtOAc (2×50 mL)萃取。將合併之有機層用鹽水溶液(25 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：10-12% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：48% (5.7 g，灰白色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 9.60 (s, 1H), 7.18 (d, *J* = 9.2 Hz, 1H), 6.99 (d, *J* = 12.7 Hz, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.98 (s, 2H), 1.64-1.50 (m, 2H), 1.49-1.45 (m, 2H), 1.22-1.17 (m, 8H), 0.83 (t, *J* = 6.7 Hz, 6H)。
LCMS: (方法A) 340.2 (M⁺+H), Rt. 2.96 min, 99.47% (Max)。

【0252】

中間物23

3,3-二丁基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮



向3,3-二丁基-7-氟-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮(中間物22；5.7 g，0.02 mol)於碘苯(30 mL)中之攪拌溶液中添加碘化銅(I) (0.67 g，0.003 mol)及K₂CO₃ (4.84 g，0.035 mol)，且將溶液用氮氣吹掃20分鐘以脫氣。隨後在氮氣氛圍下添加參[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺 (0.56 mL，0.017 mol)，且將所得反應混合物加熱40小時至135℃。反應完成(藉由UPLC監測)後，經由矽藻土過濾反應混合物且用EtOAc (100 mL)洗滌矽藻土墊。將濾液用水(50 mL)及鹽水(50 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分，得到粗物質，藉由Isolera管柱層析(溶

離劑：3-5% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)進行純化，得到標題化合物。


產率：63% (4.6 g，淡棕色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.44-7.38 (m, 3H), 7.29-7.26 (t, *J* = 7.6 Hz, 1H), 7.07 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.79 (d, *J* = 11.96 Hz, 1H), 3.89 (s, 3H), 3.46 (s, 2H), 1.37-1.38 (m, 4H), 1.18-1.37 (m, 8H), 0.79-0.81 (m, 6H)。**LCMS:** (方法A) 416.3 (M⁺+H), Rt. 3.32 min, 99.63% (Max)。

【0253】

中間物24

3,3-二丁基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋



在0℃下，向3,3-二丁基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮(中間物23；4.6 g，11.07 mmol)於THF (45 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加甲硼烷二甲基硫醚(2 M於THF中；17.2 mL，33.2 mmol)，且將反應混合物在75℃下回流40小時。反應完成(藉由UPLC監測)後，將反應混合物冷卻至0℃，用甲醇(10 mL)淬滅且加熱2小時至65℃。隨後將所得反應混合物冷卻至室溫且真空濃縮，得到粗物質，將其原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率：**5 g (粗物質，無色液體)。


¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.20 (t, *J* = 7.5 Hz, 2H), 7.10 (d, *J* = 9.5 Hz, 1H), 6.93 (d, *J* = 6.0 Hz, 2H), 6.81 (t, *J* = 7.1 Hz, 1H), 6.62 (d, *J* = 12.6 Hz, 1H), 3.81 (s, 3H), 3.33 (s, 2H), 2.73 (s, 2H), 1.18-1.11 (m, 12H), 0.79-0.78 (m, 6H)。**LCMS:** (方法D) 402.4 (M⁺+H), Rt. 3.9 min,

99.4% (Max)。

【0254】

中間物25

3,3-二丁基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物




在室溫下，向3,3-二丁基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋(中間物24；5 g，0.01 mmol)於THF (75 mL)及水(7.5 mL)中之攪拌溶液中添加過硫酸氫鉀(38.3 g，0.13 mmol)，且將反應混合物在該溫度下攪拌24小時。反應完成(藉由TLC監測)後，經由布赫納漏斗(Büchner funnel)濾出反應混合物且用EtOAc (2×25 mL)萃取濾液。將合併之有機層用水(25 mL)及鹽水(25 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：10-12% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化粗物質，得到標題化合物。**產率**：59% (3.2 g，灰白色固體)。

LCMS: (方法D) 434.2 (M⁺+H), Rt. 3.21 min, 92.6% (Max)。

【0255】

中間物26

3,3-二丁基-7-氟-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物




在0℃下，向3,3-二丁基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物25；1.0 g，2.3 mmol)於DCM (10 mL)中之攪拌溶液中添加 BBr_3 (1 M於DCM中；7 mL，6.92 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌1小時。反應完成(藉由TLC監測)後，在0℃下逐滴添加甲醇(10 mL)直至停止發泡。隨後用DCM (20 mL)稀釋反應混合物。用水(2×20 mL)及鹽水(10 mL)洗滌DCM層。有機部分經無水 Na_2SO_4 乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：25-30% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：93% (0.9 g，灰白色固體)。

^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.45 (s, 1H), 7.48 (d, $J = 9.4$ Hz, 1H), 7.24 (t, $J = 8.3$ Hz, 2H), 7.02 (d, $J = 7.6$ Hz, 2H), 6.90 (t, $J = 7.3$ Hz, 1H), 6.74 (d, $J = 12.1$ Hz, 1H), 3.68 (s, 2H), 3.27 (s, 2H), 1.40-1.32 (m, 4H), 1.18-1.01 (m, 8H), 0.75 (t, $J = 6.80$ Hz, 6H)。**LCMS**: (方法A) 420.3 ($\text{M}^+ + \text{H}$), Rt. 2.99 min, 95.69% (Max)。

【0256】

中間物27

2-((3,3-二丁基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸甲酯



向3,3-二丁基-7-氟-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物26；0.15 g，0.36 mmol)於無水DMF(5 mL)中之攪拌溶


液中添加 K_2CO_3 (0.098 g, 0.71 mmol)及溴乙酸甲酯(0.066 mg, 0.43 mmol), 且將反應混合物在 60°C 下攪拌6小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 經由矽藻土墊過濾反應混合物且用EtOAc (15 mL)洗滌。用水(10 mL)及鹽水(10 mL)洗滌濾液, 經無水 Na_2SO_4 乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 25% EtOAc/PE; 矽膠: 230-400目)純化所得粗物質, 得到標題化合物。**產率**: 91% (0.16 g, 白色固體)。

$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 7.50 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H), 7.30 (t, $J = 8.4$ Hz, 2H), 7.13 (d, $J = 7.6$ Hz, 2H), 6.99 (t, $J = 7.2$ Hz, 1H), 6.75 (d, $J = 12.4$ Hz, 1H), 4.99 (s, 2H), 3.77 (s, 3H), 3.72 (bs, 2H), 3.18 (s, 2H), 1.40-1.29 (m, 4H), 1.20-1.04 (m, 8H), 0.78-0.75 (m, 6H)。**LCMS**: (方法A) 492.2 (M^++H), Rt. 3.15 min, 96.13% (Max)。

【0257】

中間物28

3,3-二丁基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-7-甲腈1,1-二氧化物



在室溫下, 向7-溴-3,3-二丁基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(2 g, 4.03 mmol)於DMA (10 mL)中之脫氣溶液中添加碳酸鈉(0.42 g, 4.03 mmol)及 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})]_6$ (1.7 g, 4.03 mmol), 且將反應混合物用 N_2 脫氣15分鐘。隨後添加 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ (90 mg, 0.4 mmol)且將反應混合物在 120°C 下加熱24小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 真空


濃縮反應混合物。將所得物質分配於水(10 mL)與EtOAc (10 mL)之間且用EtOAc (2×25 mL)萃取水層。將合併之有機層用冰冷的水(50 mL)及鹽水(50 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分且藉由Isolera管柱層析(溶離劑：90-100% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：44% (1.2 g，鮮黃色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.56 (s, 1H), 7.36 (s, 1H), 7.28 (t, *J* = 7.6 Hz, 2H), 7.09 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.96 (t, *J* = 7.0 Hz, 1H), 3.99 (s, 3H), 3.43 (s, 2H), 3.34 (s, 2H), 1.40-1.30 (m, 4H), 1.20-1.00 (m, 8H), 0.75 (t, *J* = 6.1 Hz, 6H)。**LCMS**: (方法A) 441.3 (M⁺+H), Rt. 3.15 min, 87.84% (Max)。

【0258】

中間物29

3,3-二丁基-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-7-甲腈1,1-二氧化物



在-10℃下，向3,3-二丁基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-7-甲腈1,1-二氧化物(中間物28；0.76 g，1.72 mmol)於DCM (10 mL)中之溶液中添加BBr₃ (1 M於DCM中，3.4 mL，3.45 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌12小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物冷卻至0℃且用冰冷的水(5 mL)淬滅。用DCM (2×10 mL)萃取水層。將合併之有機層用冰冷的水(10 mL)及鹽水(10 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。


真空濃縮有機部分且藉由Isolera管柱層析(溶離劑：30% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：28% (0.21 g，黃色固體)。

¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): δ 7.68 (s, 1H), 7.34 (t, J = 8.0 Hz, 2H), 7.11-7.05 (m, 4H), 3.75 (s, 2H), 3.26 (s, 2H), 1.42-1.27 (m, 4H), 1.18-1.04 (m, 8H), 0.80 (t, J = 6.8 Hz, 6H)。**LCMS**: (方法E) 427.2 (M⁺+H), Rt. 2.76 min, 68.44% (Max)。

【0259】

中間物30

2-((3,3-二丁基-7-氰基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯




向3,3-二丁基-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-7-甲腈1,1-二氧化物(中間物29；150 mg，0.35 mmol)於DMF (3mL)中之攪拌溶液中添加無水K₂CO₃(103 mg，0.05 mmol)及溴乙酸第三丁酯(72 mg，0.52 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌2小時。反應完成(藉由TLC監測)後，真空濃縮反應混合物且將所獲得之殘餘物分配於冰冷的水(10 mL)與EtOAc (10 mL)之間。用EtOAc (2×5 mL)萃取水層且用冰冷的水(5 mL)及鹽水(5 mL)洗滌合併之有機層。有機部分經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：18% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：44% (85 mg，黃色固體)。

$^1\text{H NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 7.43 (s, 1H), 7.32-7.28 (m, 3H), 7.13 (d, $J = 7.6$ Hz, 2H), 7.00 (t, $J = 7.6$ Hz, 1H), 4.98 (s, 2H), 3.71 (bs, 2H), 3.41 (s, 2H), 1.45 (s, 9H), 1.42-1.27 (m, 4H), 1.18-0.99 (m, 8H), 0.89-0.71 (m, 6H)。LCMS: (方法A) 485.2 ($\text{M}^+ - t\text{Bu} + \text{H}$), Rt. 3.31 min, 96.85% (Max)。

【0260】

中間物31

5-氟-6-甲氧基苯并[d]噻唑-2-胺




在室溫下，向3-氟-4-甲氧基苯胺(50 g，0.354 mol)於乙酸(300 mL)中之攪拌溶液中添加硫氰酸銨(29.69 g，0.39 mol)，且隨後將反應混合物在室溫下攪拌45分鐘。隨後在15°C下，將溶解於乙酸(100 mL)中之溴(57 g，0.354 mol)逐滴添加至反應混合物，且將所得反應混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成後，將所得固體濾出，用乙酸(50 mL)洗滌且隨後真空乾燥。將所得固體懸浮於水(200 mL)中且用10% NaOH溶液鹼化(pH~10)。將所得固體濾出，用水(3×200 mL)洗滌且真空乾燥，得到標題化合物。產率：86% (60 g，灰白色固體)。

LCMS: (方法A) 199.0 ($\text{M}^+ + \text{H}$), Rt. 1.12 min, 90.09% (Max)。

【0261】

中間物32

2-(((2-胺基-4-氟-5-甲氧基苯基)硫基)甲基)-2-乙基己酸




向5-氟-6-甲氧基苯并[d]噻唑-2-胺(中間物31；30 g，0.151 mol)於水(300 mL)中之攪拌溶液中添加KOH (135 g，2.42 mol)，且將反應混合物在120℃下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，將反應混合物冷卻至室溫。隨後逐滴添加2-(溴甲基)-2-乙基己酸(43.05 g，0.18 mol) (溶解於100 mL THF中)，且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，將反應混合物冷卻至0℃且用濃HCl (pH~2)酸化。用EtOAc (2×25 mL)萃取水性部分。用水(30 mL)及鹽水(30 mL)洗滌合併之有機層。有機部分經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮，得到粗物質，將其原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**：60 g (粗物質，棕色膠)。

【0262】

中間物33

3-丁基-3-乙基-7-氟-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮



在0℃下，向2-(((2-胺基-4-氟-5-甲氧基苯基)硫基)甲基)-2-乙基己酸(中間物32；60 g，0.18 mol)於EtOAc (600 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加三乙胺(36.7 g，0.3642 mol)及1-丙烷膦酸酐溶液(50%於EtOAc中；69.5 g，0.2185 mol)，且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由UPLC監測)後，添加水(500 mL)至反應混合物且用EtOAc (2×500 mL)萃


取水層。將合併之有機層用鹽水(250 mL)洗滌，經無水 Na_2SO_4 乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：10-12% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：30% (17 g，灰白色固體)。

LCMS: (方法A) 312.3 (M^+H), Rt. 2.64 min, 99.63% (Max)。

【0263】

中間物34

3-丁基-3-乙基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮



向3-丁基-3-乙基-7-氟-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮(中間物33；17 g，0.05 mol)於碘苯(170 mL)中之攪拌溶液中添加碘化銅(I) (1.03 g，0.01 mol)及 K_2CO_3 (15.08 g，0.11 mol)，且將反應混合物用氮氣吹掃20分鐘以脫氣。隨後在氮氣氛圍下添加參[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺(3.52 g，0.01 mol)，且將所得反應混合物加熱40小時至135°C。反應完成(藉由UPLC監測)後，經由矽藻土過濾反應混合物且用EtOAc (250 mL)洗滌。真空濃縮濾液，得到粗物質，藉由Isolera管柱層析(溶離劑：3-5% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)進行純化，得到標題化合物。**產率**：86% (16 g，淡棕色固體)。


^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 7.37-7.39 (m, 2H), 7.29 (d, J = 6.80 Hz, 1H), 7.08 (d, J = 6.80 Hz, 2H), 6.82 (d, J = 12.00 Hz, 2H), 3.89 (s, 3H), 3.46 (s, 2H), 1.37-1.38 (m, 4H), 1.18-1.37 (m, 4H), 0.79-0.81 (m,

6H)。LCMS: (方法A) 387.9 (M^+), Rt. 3.09 min, 99.25% (Max)。

【0264】

中間物35

3-丁基-3-乙基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡




在0℃下，向3-丁基-3-乙基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮吡-4(5H)-酮(中間物34；16 g，0.04 mol)於THF (160 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加甲硼烷二甲基硫醚(2 M於THF中，62 mL，0.12 mol)，且將反應混合物在75℃下回流40小時。反應完成(藉由UPLC監測)後，將反應混合物冷卻至0℃且用甲醇(100 mL)淬滅。將所得溶液在65℃下加熱2小時，且隨後冷卻至室溫且真空濃縮。將所得粗混合物原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**：100% (15 g，無色液體)。

LCMS: (方法A) 374.3 ($M^+ + H$), Rt. 2.72 min, 92.66% (Max)。

【0265】

中間物36

3-丁基-3-乙基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



在室溫下，向3-丁基-3-乙基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-


1,5-苯并噻氮呋(中間物35; 15 g, 0.04 mol)於THF (100 mL)中之攪拌溶液中添加水(45 mL)及過硫酸氫鉀(125 g, 0.40 mol), 且隨後將反應混合物在室溫下攪拌24小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 經由布赫納漏斗濾出反應混合物且用EtOAc (2×250 mL)萃取濾液。將合併之有機層用水(250 mL)及鹽水(250 mL)洗滌, 經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 10-12% EtOAc/PE; 矽膠: 230-400目)純化所得粗物質, 得到標題化合物。**產率**: 92% (15 g, 微黃色固體)。

¹H NMR (300 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.52 (d, *J* = 8.70 Hz, 1H), 7.23-7.25 (m, 2H), 7.04-7.07 (m, 2H), 6.93-6.95 (m, 1H), 6.80 (d, *J* = 12.60 Hz, 1H), 3.90 (s, 3H), 3.28 (s, 2H), 3.31 (m, 2H), 1.17-1.24 (m, 4H), 0.93-0.95 (m, 4H), 0.73-0.83 (m, 6H)。**LCMS**: (方法A) 406.2 (M⁺+H), Rt. 3.04 min, 95.49% (Max)。

【0266】

中間物37

3-丁基-3-乙基-7-氟-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物



在0℃下, 向3-丁基-3-乙基-7-氟-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物36; 15 g, 0.036 mol)於DCM (200 mL)中之攪拌溶液中添加BBR₃ (1 M於DCM中; 74 mL, 0.074 mmol), 且將反應混合物在室溫下攪拌1小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 在0℃下逐滴


添加甲醇(100 mL)直至停止發泡。用DCM (100 mL)稀釋反應混合物，且用水(2×200 mL)及鹽水(200 mL)洗滌DCM層。有機部分經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：30-32% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：94% (7 g，灰白色固體)。

¹H NMR (300 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.48 (d, *J* = 9.60 Hz, 2H), 7.22 (t, *J* = 7.50 Hz, 2H), 6.99 (d, *J* = 7.80 Hz, 2H), 6.74-6.79 (m, 2H), 3.66 (s, 2H), 3.18 (s, 2H), 1.36-1.47 (m, 4H), 1.01-1.10 (m, 4H), 0.73-0.75 (m, 6H)。 **LCMS**: (方法A) 392.2 (M⁺+H), Rt. 2.08 min, 96.59% (Max)。

【0267】

中間物38

2-((3-丁基-3-乙基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯



向3-丁基-3-乙基-7-氟-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物37；0.5 g，1.27 mmol)於無水DMF(5 mL)中之攪拌溶液中添加K₂CO₃ (0.35 g，2.55 mmol)及2-溴乙酸第三丁酯(0.37 g，1.91 mmol)，且將反應混合物在60℃下攪拌6小時。反應完成(藉由TLC監測)後，經由矽藻土過濾反應混合物且用EtOAc (25 mL)洗滌矽藻土墊。用水(15 mL)及鹽水(15 mL)洗滌濾液，經無水Na₂SO₄乾燥且隨後真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：25% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所

得粗物質，得到標題化合物。**產率**：87% (0.56 g，無色膠)。


¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.44 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H), 7.28 (t, *J* = 8.0 Hz, 2H), 7.10 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.97 (t, *J* = 7.6 Hz, 1H), 6.78 (d, *J* = 12.4 Hz, 1H), 4.83 (s, 2H), 3.72 (bs, 2H), 3.32 (s, 2H), 1.45 (s, 9H), 1.42-1.27 (m, 4H), 1.11-0.98 (m, 4H), 0.72 (t, *J* = 6.00 Hz, 6H)。

LCMS: (方法E) 506.2 (M⁺+H), Rt. 2.93 min, 97.25% (Max)。

【0268】

中間物39

5-氯-6-甲氧基苯并[d]噻唑-2-胺




在室溫下，向3-氯-4-甲氧基苯胺(10 g，63.4 mmol)於乙酸(100 mL)中之攪拌溶液中添加硫氰酸銨(5.3 g，69.8 mmol)，且將反應混合物在該溫度下攪拌30分鐘。隨後在15℃下將溴(3.2 mL，63.4 mmol)於乙酸(20 mL)中之溶液逐滴添加至反應混合物，且將所得反應混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成後，濾出所形成之固體，用乙酸(20 mL)洗滌且真空乾燥。隨後將所得固體懸浮於水(20 mL)中且用10% NaOH溶液鹼化至pH~10。將所得固體濾出，用水(3×25 mL)洗滌且真空乾燥，得到標題化合物。**產率**：80% (11 g，灰白色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.53 (s, 1H), 7.41 (bs, 2H), 7.36 (s, 1H), 3.82 (s, 3H)。**LCMS**: (方法A) 215.0 (M⁺+H), Rt. 1.39 min, 97.22% (Max)。

【0269】

中間物40

2-(((2-胺基-4-氯-5-甲氧苯基)硫基)甲基)-2-丁基己酸




向5-氯-6-甲氧基苯并[d]噻唑-2-胺(中間物39；10 g，0.046 mol)於水(150 mL)中之攪拌溶液中添加氫氧化鉀(40 g，0.74 mol)，且將反應混合物在120°C下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，將反應混合物冷卻至室溫。隨後逐滴添加2-(溴甲基)-2-丁基己酸(12.33 g，0.046 mol)於THF (50 mL)中之溶液且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，將反應混合物冷卻至0°C且用濃HCl (PH~2)酸化。用EtOAc (2×50 mL)萃取反應混合物。用水(50 mL)及鹽水(50 mL)洗滌合併之有機層，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮，獲得標題化合物。將所獲得之粗物質原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**：18.1 g (粗物質，棕色膠)。

UPLC: (方法A) 374.9 (M⁺+H), Rt. 1.74 min, 44.37% (Max)。

【0270】

中間物41

3,3-二丁基-7-氯-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮



在0°C下，向2-(((2-胺基-4-氯-5-甲氧苯基)硫基)甲基)-2-丁基己酸(中間物40；18.1 g，0.048 mol)於EtOAc(110 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加三乙胺(9.77 g，0.096 mol)及1-丙烷膦酸酐溶液(50%於EtOAc中；


18.47 g, 0.058 mol), 且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由UPLC監測)後, 將水(25 mL)添加至反應混合物且用EtOAc (2×25 mL)萃取水層。將合併之有機層用鹽水(25 mL)洗滌, 經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 10-12% EtOAc/PE; 矽膠: 230-400目)純化所得粗物質, 得到標題化合物。**產率**: 28% (4.78 g, 灰白色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 9.60 (s, 1H), 7.16 (t, *J* = 11.6 Hz, 1H), 6.90 (s, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.00 (s, 2H), 1.59-1.43 (m, 4H), 1.24-1.17 (m, 8H), 0.76 (t, *J* = 4.0 Hz, 6H)。**LCMS**: (方法A) 358.1 (M⁺+2), Rt. 3.10 min, 92.74% (Max)。

【0271】

中間物42

3,3-二丁基-7-氯-8-甲氧基-5-苯基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮



向3,3-二丁基-7-氯-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮(中間物41; 4.78 g, 0.013 mol)於碘苯(40 mL)中之攪拌溶液中添加碘化銅(I) (0.25 g, 0.0013 mol)及K₂CO₃ (3.7 g, 0.026 mol), 且將溶液用氮氣吹掃20分鐘以脫氣。隨後在氮氣氛圍下添加參[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺 (0.86 g, 0.0026 mol), 且將所得反應混合物在135℃下加熱40小時。反應完成(藉由UPLC監測)後, 經由矽藻土過濾反應混合物且用EtOAc (15 mL)洗滌矽藻土墊。真空濃縮濾液, 得到粗物質, 藉由Isolera管柱層析(溶離


劑：3-5% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)進行純化，得到標題化合物。**產率**：70.6% (4.1 g，淡棕色固體)。

LCMS: (方法C) 434.1 ($M^{+}+2$), Rt. 3.55 min, 96.03% (Max)。

【0272】

中間物43

3,3-二丁基-7-氯-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡




在0℃下，向3,3-二丁基-7-氯-8-甲氧基-5-苯基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮吡-4(5H)-酮(中間物42；4.1 g，0.009 mol)於THF (40mL)中之攪拌溶液中逐滴添加甲硼烷二甲基硫醚(1 M於THF中，47 mL，0.047 mol)，且將反應混合物在75℃下回流40小時。反應完成(藉由UPLC監測)後，將反應混合物冷卻至0℃且用甲醇(50 mL)淬滅。將所得溶液在65℃下加熱2小時，隨後冷卻至室溫且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：8-10% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所獲得之粗物質，得到標題化合物。**產率**：84% (3.3 g，無色液體)。

^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6): δ 7.21 (t, J = 9.6 Hz, 2H), 7.06 (s, 1H), 6.95 (d, J = 10.4 Hz, 2H), 6.83 (t, J = 9.2 Hz, 2H), 6.77 (s, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.57 (s, 2H), 3.32 (s, 2H), 1.30-1.20 (m, 4H), 1.10-1.00 (m, 8H), 0.76 (t, J = 4.00 Hz, 6H).

【0273】

中間物44

3,3-二丁基-7-氯-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物




在室溫下，向3,3-二丁基-7-氯-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡(中間物43；3.3 g，0.008 mol)於1,4-二噁烷(42 mL)中之攪拌溶液中添加水(16 mL)及過硫酸氫鉀(24.26 g，0.08 mol)，且將反應混合物在室溫下攪拌24小時。反應完成(藉由TLC監測)後，經由布赫納漏斗濾出反應混合物且用EtOAc (2×15 mL)萃取濾液。將合併之有機層用水(25 mL)及鹽水(25 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：10-12% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化粗物質，得到標題化合物。**產率**：68.7% (2.4 g，微黃色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.49 (s, 1H), 7.27 (t, *J* = 8.1 Hz, 2H), 7.08 (d, *J* = 7.5 Hz, 2H), 6.98 (s, 1H), 6.95 (t, *J* = 7.3 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 3.70 (bs, 2H), 3.35 (s, 2H), 1.36-1.24 (m, 4H), 1.17-1.00 (m, 8H), 0.75 (t, *J* = 4.00 Hz, 6H)。**LCMS**: (方法C) 452.3 (M⁺+2), Rt. 3.53 min, 96.85% (Max)。

【0274】

中間物45

3,3-二丁基-7-氯-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物




在 -10°C 下，向3,3-二丁基-7-氯-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物44；1.5 g，3.33 mmol)於DCM (10 mL)中之攪拌溶液中添加 BBr_3 (1 M於DCM中；6.6 mL，6.66 mmol)，且將所得混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用甲醇(5 mL)淬滅且將反應混合物真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：10-15% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：83% (1.2 g，灰白色固體)。

^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 10.79 (s, 1H), 7.50 (s, 1H), 7.24 (t, $J = 8.2$ Hz, 2H), 7.01 (d, $J = 7.8$ Hz, 2H), 6.91 (t, $J = 9.0$ Hz, 2H), 3.65 (bs, 2H), 3.29 (s, 2H), 1.40-1.30 (m, 5H), 1.20-1.12 (m, 7H), 0.74 (t, $J = 4.0$ Hz, 6H)。**LCMS**: (方法C) 438.1 (M^{++2}), Rt. 3.1 min, 96.07% (Max)。

【0275】

中間物46

2-((3,3-二丁基-7-氯-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸甲酯



向3,3-二丁基-7-氯-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物45；300 mg，0.68 mmol)於DMF (3 mL)中之溶液中添加


K_2CO_3 (191 mg, 1.37 mmol)及溴乙酸甲酯(158 mg, 1.03 mmol), 且將反應混合物在 $80^\circ C$ 下加熱16小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 將反應混合物冷卻、用稀HCl (1.5 N, 3 mL)淬滅且真空濃縮。將所獲得之殘餘物分配於冰冷的水(10 mL)與EtOAc (10 mL)之間。將水層用EtOAc (2×8 mL)萃取, 且隨後將合併之有機層用冰冷的水(10 mL)及鹽水(10 mL)洗滌。有機部分經無水 Na_2SO_4 乾燥且真空濃縮。將所得粗物質原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**: 98% (449 mg, 粉色固體)。

LCMS: (方法A) 508.2 (M^+), 510.2 (M^{++2}), Rt. 3.29 min, 89.65% (Max)。

【0276】

中間物47

2-(((2-胺基-5-甲氧苯基)硫基)甲基)-2-乙基己酸



向6-甲氧基苯并[d]噻唑-2-胺(270 g, 1.498 mol)於水(2700 mL)中之攪拌溶液中添加KOH (1345 g, 23.96 mol), 且將反應混合物在 $120^\circ C$ 下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後, 將反應混合物冷卻至室溫。隨後逐滴添加2-(溴甲基)-2-乙基己酸(533 g, 2.25 mol)於THF (1000 mL)中之溶液, 且將所得反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後, 將反應混合物冷卻至 $0^\circ C$ 且用濃HCl (pH~2)酸化。將反應混合物用EtOAc (2×4000 mL)萃取, 且將合併之有機層用水(1000 mL)及鹽水(1000 mL)洗滌。有機部分隨後經無水 Na_2SO_4 乾燥且真空濃縮, 得到


粗物質，將其原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**：590 g (粗物質，棕色膠)。

LCMS: (方法A) 312.1 ($M^+ + H$), Rt. 2.24 min, 97.34% (Max)。

【0277】

中間物48

3-丁基-3-乙基-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮




在0℃下，向2-(((2-胺基-5-甲氧苯基)硫基)甲基)-2-乙基己酸(中間物47；590 g，1.89 mol)於EtOAc (2500 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加三乙胺(530 mL，3.78 mol)及1-丙烷膦酸酐溶液(50%於EtOAc中；785 g，2.46 mol)，且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，將水(2000 mL)添加至反應混合物且用EtOAc (2×2000 mL)萃取水層。將合併之有機層用鹽水(800 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。The 藉由用甲醇洗滌純化粗物質，得到標題化合物。**產率**：48% (265 g，灰白色固體)。

¹H NMR (300 MHz, DMSO-*d*₆): δ 9.53 (s, 1H), 7.04-7.01 (m, 2H), 6.87-6.86 (m, 1H), 3.72 (s, 3H), 2.50 (s, 2H), 1.68-1.66 (m, 4H), 1.50-1.48 (m, 4H), 0.79-0.72 (m, 6H)。**LCMS:** (方法A) 294.3 ($M^+ + H$), Rt. 2.68 min, 99.47% (Max)。

【0278】

中間物49

7-溴-3-丁基-3-乙基-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮




向3-丁基-3-乙基-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮吡-4(5H)-酮(中間物48; 265 g, 0.903 mol)於DCM及乙腈之1:1混合物(2650 mL)中之攪拌溶液中逐份添加N-溴代丁二醯亞胺(209 g, 1.17 mol), 且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 濃縮反應混合物。將所獲得之粗物質用冷乙腈處理且攪拌30分鐘。將所獲得之沈澱物濾出且用冷乙腈(2×100 mL)洗滌且真空乾燥, 得到標題化合物。**產率**: 179 g (79%, 粗物質, 棕色固體)。

¹H NMR (300 MHz, DMSO-*d*₆): δ 9.61 (s, 1H), 7.33 (s, 1H), 7.10 (s, 1H), 3.82 (s, 3H), 2.98 (s, 2H), 1.70-1.68 (m, 4H), 1.48-1.45 (m, 4H), 0.84-0.82 (m, 6H)。 **LCMS**: (方法A) 372.0 (M⁺+H), Rt. 2.83 min, 99.20% (Max)。

【0279】

中間物50

7-溴-3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮吡-4(5H)-酮及3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-碘-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮吡-4(5H)-酮



向7-溴-3-丁基-3-乙基-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮吡-4(5H)-酮(中間物49; 15 g, 40.2 mmol)於1-氟-4-碘苯(50 mL)中之攪拌溶液中添加


碘化銅(I) (1.58 g, 0.8 mmol)及 K_2CO_3 (11 g, 80.5 mmol), 且將反應混合物用氮氣吹掃20分鐘以脫氣。隨後在氮氣氛圍下添加參[2-(2-甲氧基乙氧基)乙基]胺(1.3 mL, 4.0 mmol), 且將所得反應混合物在135°C下加熱16小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 經由矽藻土過濾反應混合物且用EtOAc (200 mL)洗滌矽藻土墊。將濾液用水(100 mL)及鹽水(75 mL)洗滌且經無水 Na_2SO_4 乾燥。藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 5% EtOAc/PE; 矽膠: 230-400目)純化所得粗物質, 得到標題化合物。產率: 64% (12.2 g, 灰白色固體)。

LCMS: (方法E) 467.1 (M^++2), 對於7-溴取代之化合物, 及514.1 (M^++H), 對於7-碘取代之化合物, Rt. 3.33 min, 92.83% (Max)。

【0280】

中間物51

7-溴-3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-8-甲氧基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋及
3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-碘-8-甲氧基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋



在0°C下, 向7-溴-3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮及3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-碘-8-甲氧基-2,3-二氫-1,5-苯并噻氮呋-4(5H)-酮之混合物(中間物50; 12 g, 25.7 mmol)於THF (100 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加甲硼烷二甲基硫醚(2 M於THF中; 38 mL, 77 mmol), 且將反應混合物在65°C下回流16小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 將反應混合物冷卻至0°C, 用甲醇(20 mL)淬滅且


隨後在65°C下加熱2小時。隨後將所得反應混合物冷卻至室溫，真空濃縮且用水(100 mL)稀釋殘餘物。將水層用DCM (2×100 mL)萃取，將合併之有機層用水(50 mL)及鹽水(50 mL)洗滌且隨後經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分，且將所得粗物質原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。**產率**：10 g (粗物質，黑色膠)。

LCMS: (方法E) 451.8 (M⁺+H)，對於7-溴取代之化合物，及499.7 (M⁺+H)，對於7-碘取代之化合物, Rt. 3.78 min, 75.13% (Max)。

【0281】

中間物52

7-溴-3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-8-甲氧基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物及3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-碘-8-甲氧基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



在0°C下，向7-溴-3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-8-甲氧基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡及3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-碘-8-甲氧基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡之混合物(中間物51；10 g，26.6 mmol)於THF (100 mL)及水(60 mL)中之攪拌溶液中添加過硫酸氫鉀(81 g，26.6 mmol)。將所得反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由TLC監測)後，經由布赫納漏斗濾出反應混合物且用EtOAc (2×200 mL)萃取濾液。用水(100 mL)及鹽水(100 mL)洗滌合併之有機層，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。


藉由Isolera管柱層析(溶離劑：15% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：54% (7 g，白色固體)。

LCMS: ((方法E) 486.0 (M^++2), 對於7-溴取代之化合物，及532.0 (M^++H), 對於7-碘取代之化合物, Rt. 2.87 min, 91.53% (Max)。

【0282】

中間物53

3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-8-羥基-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



在室溫下，向7-溴-3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-8-甲氧基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物及3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-碘-8-甲氧基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物之混合物(中間物52；3 g，6.2 mmol)於DMF (16 mL)中之攪拌溶液中添加硫代甲醇鈉(2.1 g，31 mmol)，且將反應混合物在65°C下攪拌16小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物冷卻至室溫且用水(25 mL)淬滅。用EtOAc (2×50 mL)萃取水層。隨後將合併之有機層用鹽水(20 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：10% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：77% (2.13 g，棕色固體)。


¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.49 (s, 1H), 7.28 (s, 1H), 7.06-

6.96 (m, 4H), 6.61 (s, 1H), 3.62 (bs, 2H), 3.21 (s, 2H), 2.17 (s, 3H), 1.61-1.25 (m, 4H), 1.20-1.01 (m, 4H), 0.81-0.74 (m, 6H) 。 **LCMS:** (方法A) 438.1 ($M^+ + H$), Rt. 2.78 min, 87.79% (Max) 。

【0283】

中間物54

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯




向3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-8-羥基-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物53；0.3 g，0.68 mmol)於DMF (10 mL)中之溶液中添加 K_2CO_3 (0.19 g，0.14 mmol)及溴乙酸第三丁酯(0.2 g，1.03 mmol)，且將反應混合物在80℃下加熱16小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用冰冷的水(10 mL)稀釋且用EtOAc (2×20 mL)萃取水層。將合併之有機層用鹽水(20 mL)洗滌，經無水 Na_2SO_4 乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：20% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：97% (0.37 g，白色固體)。

^1H NMR (400 MHz, $DMSO-d_6$): δ 7.16 (s, 1H), 7.11-7.08 (m, 4H), 6.63 (s, 1H), 4.79 (s, 2H), 3.78 (bs, 2H), 3.26 (s, 2H), 2.18 (s, 3H), 1.44 (s, 9H), 1.43-1.35 (m, 4H), 1.15-0.95 (m, 4H), 0.78-0.72 (m, 6H) 。 **LCMS:** (方法B) 496.1 ($M^+ - tBu + H$), Rt. 2.96 min, 97.24% (Max) 。

【0284】

中間物55

(S)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯及(R)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯



藉由對掌性SFC(方法I)分離外消旋2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯(中間物54；270 mg，0.49 mmol)之兩種對映異構體。在40℃下真空濃縮物質。第一溶離份對應於對映異構體1且第二溶離份對應於對映異構體2。兩種對映異構體之絕對組態為未知的。兩種溶離份中之每一者隨後獨立處理以進一步純化。用稀HCl (1.5 N，pH~4)酸化所獲得之殘餘物，且用EtOAc (3×5 mL)萃取水層。將合併之有機層用水(10 mL)及鹽水(10 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。將有機部分過濾且在40℃下真空濃縮，得到標題化合物之經純化之對映異構體。

對映異構體1：**產率**：37% (100 mg，白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.15 (s, 1H), 7.08-7.06 (m, 4H), 6.61 (s, 1H), 4.78 (s, 2H), 3.69 (bs, 2H), 3.25 (s, 2H), 2.17 (s, 3H), 1.44 (s, 9H), 1.42-1.35 (m, 4H), 1.20-1.10 (m, 4H), 0.75-0.70 (m, 6H)。**LCMS**: (方法D) 496.1 (M⁺-


^tBu+H), Rt. 4.26 min, 98.69% (Max)。對掌性SFC: (方法M) Rt. 3.4 min, 99.16% (Max)。

對映異構體2: 產率: 37% (100 mg, 白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.15 (s, 1H), 7.08-7.06 (m, 4H), 6.61 (s, 1H), 4.78 (s, 2H), 3.69 (bs, 2H), 3.25 (s, 2H), 2.17 (s, 3H), 1.44 (s, 9H), 1.42-1.35 (m, 4H), 1.20-1.10 (m, 4H), 0.75-0.69 (m, 6H)。LCMS: (方法D) 496.1 (M⁺-^tBu+H), Rt. 4.26 min, 92.55% (Max)。對掌性SFC (方法M) Rt. 3.9 min, 91.88% (Max)。

【0285】

中間物56

7-溴-3-丁基-3-乙基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



在0℃下，向7-溴-3-丁基-3-乙基-8-羥基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(1.0 g, 2 mmol)於無水DMF (15 mL)中之攪拌溶液中添加氫化鈉(60%於礦物油中) (0.09 mg, 2.40 mmol)，且將反應混合物攪拌10分鐘。隨後，將碘代甲烷(0.4 mL, 6 mmol)添加至反應混合物中且在室溫下攪拌混合物30分鐘。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用冰冷卻的水(2 mL)淬滅且將水層用EtOAc (2×10 mL)萃取。將合併之有機層用水(15 mL)、鹽水(15 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。將所得粗物質轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。產率: 96% (900


mg，粗物質，棕色膠狀固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.45 (s, 1H), 7.26 (t, *J* = 8.0 Hz, 2H), 7.18 - 7.16 (m, 1H), 7.06 - 7.04 (m, 2H), 6.93 (t, *J* = 7.2 Hz, 1H), 3.93 (s, 3H), 3.70 - 3.61 (m, 2H), 3.10 (s, 2H), 1.51 - 0.90 (m, 8H), 0.80 - 0.72 (m, 6H)。**LCMS**: (方法A) 468.1 (M+2), Rt. 3.21 min, 96.82% (Max)。

【0286】

中間物57

3-丁基-3-乙基-8-羥基-7-(甲硫基)-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



在室溫下，向7-溴-3-丁基-3-乙基-8-甲氧基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物56；0.9 g，1.90 mmol)於無水DMF (15 mL)中之攪拌溶液中添加硫代甲醇鈉(687 mg，9.5 mmol)，且將反應混合物在60℃下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，將反應混合物用冰冷的水(2 mL)淬滅且將水層用EtOAc (2×10 mL)萃取。將合併之有機層用水(15 mL)、鹽水(15 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：10-15% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：93% (750 mg，淡棕色固體)。


¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.16 - 7.12 (m, 3H), 6.85 - 6.83 (m, 2H), 6.71 (t, *J* = 7.2 Hz, 1H), 6.60 (s, 1H), 3.74 - 3.61 (m, 2H), 3.12

(s, 2H), 2.13 (s, 3H), 1.70 - 1.08 (m, 8H), 0.80 - 0.74 (m, 6H) 。 **UPLC:** (方法A) 420.5 (M+H), Rt. 1.86 min, 91.84% (Max) 。

【0287】

中間物58

5-(4-溴苯基)-3-丁基-3-乙基-8-羥基-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物




在0℃下，向3-丁基-3-乙基-8-羥基-7-(甲硫基)-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(中間物57；2.0 g，4.77 mmol)於DMF (20 mL)中之攪拌溶液中分批添加N-溴代丁二醯亞胺(1.0 g，5.72 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌1小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物倒入冰冷的水(50 mL)且將水層用EtOAc (2×50 mL)萃取。真空濃縮有機部分且藉由Isolera管柱層析(溶離劑：10-15% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：57% (1.35 g，灰白色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.66 (s, 1H), 7.40-7.20 (m, 3H), 6.95-6.68 (m, 3H), 3.80-3.50 (m, 2H), 3.25-3.15 (m, 2H), 2.23 (s, 3H), 1.70-1.42 (m, 2H), 1.42-1.25 (m, 2H), 1.25-1.00 (m, 4H), 0.92-0.68 (m, 6H) 。 **LCMS:** (方法E) 497.9 (M⁺+H), Rt. 3.16 min, 90.35% (Max) 。

【0288】

中間物59

3-丁基-3-乙基-8-羥基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物




在室溫下，向5-(4-溴苯基)-3-丁基-3-乙基-8-羥基-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物58；1.35 g，2.71 mmol)於DMF (10 mL)中之攪拌溶液中添加新製備之甲醇鈉(312 mg，13.55 mmol)及CuBr (39 mg，0.27 mmol)，且將反應混合物在120℃下攪拌48小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，用稀HCl (1.5 N，10 mL)淬滅反應混合物且用水稀釋(10 mL)。用EtOAc (2×50 mL)萃取水層。將合併之有機層用水(20 mL)及鹽水(20 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分且藉由Isolera管柱層析(溶離劑：20% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：68% (825 mg，灰白色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.32 (s, 1H), 7.25 (s, 1H), 7.02 (d, *J* = 11.6 Hz, 2H), 6.84 (d, *J* = 12.0 Hz, 2H), 6.49 (s, 1H), 3.71 (s, 3H), 3.68-3.52 (m, 2H), 3.26-3.18 (m, 2H), 2.11 (s, 3H), 1.60-1.43 (m, 1H), 1.43-1.28 (m, 3H), 1.20-0.95 (m, 4H), 0.82-0.65 (m, 6H)。**LCMS**: (方法E) 450.0 (M⁺+H), Rt. 3.013 min, 93.75% (Max)。**HPLC**: (方法B) Rt. 5.59 min, 96.74% (Max)。

【0289】

中間物60

(S)-3-丁基-3-乙基-8-羥基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物及(R)-3-丁基-3-乙基-8-羥基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物



藉由對掌性SFC儀器(方法Q)分離外消旋3-丁基-3-乙基-8-羥基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡1,1-二氧化物(0.6 g, 1.33 mmol)之兩種對映異構體。在40℃下真空濃縮物質。第一溶離份對應於對映異構體1且第二溶離份對應於對映異構體2。兩種對映異構體之絕對組態為未知的。

對映異構體1：產率：48% (290 mg, 白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.32 (s, 1H), 7.25 (s, 1H), 7.02 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H), 6.85 (d, *J* = 9.2 Hz, 2H), 6.49 (s, 1H), 3.71 (s, 3H), 3.70-3.50 (m, 2H), 3.22 (s, 2H), 2.12 (s, 3H), 1.60-1.45 (m, 1H), 1.45-1.26 (m, 3H), 1.18-0.93 (m, 4H), 0.77-0.69 (m, 6H)。對掌性SFC (方法Q) Rt. 2.13 min, 99.89% (Max)。


對映異構體2：產率：48% (311 mg, 灰白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 10.31 (s, 1H), 7.25 (d, *J* = 1.6 Hz, 1H), 7.02 (d, *J* = 10.8 Hz, 2H), 6.84 (d, *J* = 12.4 Hz, 2H), 6.49 (s, 1H), 3.71 (d, *J* = 1.6 Hz,

3H), 3.60-3.52 (m, 2H), 3.26-3.22 (m, 2H), 2.11 (s, 3H), 1.65-1.48 (m, 1H), 1.48-1.30 (m, 3H), 1.22-0.93 (m, 4H), 0.77-0.69 (m, 6H) 。 **LCMS:** (方法E) 450.0 ($M^+ + H$), Rt. 3.02 min, 94.90% (Max) 。 **對掌性SFC** (方法Q) Rt. 3.04 min, 99.79% (Max) 。

【0290】

中間物61

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯



向3-丁基-3-乙基-8-羥基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物(中間物59；100 mg，0.22 mmol)於DMF (3 mL)中之攪拌溶液中添加碳酸鉀(65 mg，0.33 mmol)及溴乙酸第三丁酯(61.2 mg，0.44 mmol)，且將反應混合物在70℃下加熱12小時。反應完成(藉由TLC監測)後，用稀HCl (1.5 N，2 mL)淬滅反應混合物且用水稀釋(5 mL)。將水層用EtOAc (2×5 mL)萃取，將合併之有機層用水(5 mL)及鹽水(5 mL)洗滌，且經無水Na₂SO₄乾燥。將有機部分過濾且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：10-15% MeOH/DCM；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：130 mg (粗物質，淡棕色固體)。


¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.13-7.11 (m, 3H), 6.89 (d, *J* = 9.2 Hz, 2H), 6.48 (s, 1H), 4.75 (s, 2H), 3.73 (s, 3H), 3.69 (bs, 2H), 3.28

(s, 2H), 2.15 (s, 3H), 1.46 (s, 9H), 1.42-1.32 (m, 4H), 1.27-1.01 (m, 4H), 0.75 (t, $J = 6.8$ Hz, 3H), 0.70 (t, $J = 7.2$ Hz, 3H)。LCMS: (方法E) 564.1 ($M^+ + H$), Rt. 3.34 min, 90.35% (Max)。

【0291】

中間物62

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯及2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯




在 -78°C 下，向2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯(中間物61；130 mg，0.23 mmol)於甲苯(3 mL)中之攪拌溶液中添加 BBr_3 (1 M於DCM中，0.34 mL，0.34 mmol)，且將反應混合物在 -10°C 下攪拌6小時。反應完成(藉由TLC及LCMS監測)後，用甲醇(2 mL)淬滅反應混合物且真空濃縮。將所獲得之殘餘物分配於水(5 mL)與EtOAc(5 mL)之間。將水層用EtOAc (2×5 mL)萃取，且將合併之有機層用水(5 mL)及鹽水(5 mL)洗滌。將有機部分經無水 Na_2SO_4 乾燥，過濾且真空濃縮，得到標題化合物之混合物。**產率**：110 mg (粗物質，棕色固體)。**LCMS**: (方法E) 508.0 ($M^+ + H$), Rt. 2.88 min, 66.09% (Max)表示化合物A，及522.0 ($M^+ + H$), Rt.

3.14 min, 27.57%表示化合物**B**。

【0292】

中間物63

(S)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯及(R)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯



向3-丁基-3-乙基-8-羥基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋1,1-二氧化物之對映異構體1 (中間物60; 100 mg, 0.22 mmol)於ACN (3 mL)中之攪拌溶液中添加 K_2CO_3 (61.2 mg, 0.44 mmol)。隨後在0℃下逐滴添加2-溴乙酸第三丁酯(65 mg, 0.33 mmol)且在70℃下攪拌16小時。反應完成(藉由TLC監測)後，用稀HCl (1.5 N, 2 mL)淬滅反應混合物，用水稀釋(5 mL)。用EtOAc (2×20 mL)萃取水層，隨後將合併之有機層用水(5 mL)及鹽水溶液(5 mL)洗滌。將有機部分經無水 Na_2SO_4 乾燥，過濾且真空濃縮，得到標題化合物。將所獲得之粗物質原樣轉移至下一步驟而不經任何進一步純化。

【0293】 遵循相同程序，以100 mg之中間物60之對映異構體2為起始物質獲得標題化合物之對映異構體2。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：15% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。

對映異構體1：產率：140 mg (粗物質，灰白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.13-7.11 (m, 3H), 6.89 (d, *J* = 9.2 Hz, 2H), 6.48 (s, 1H), 4.75 (s, 2H), 3.73 (s, 3H), 3.70-3.55 (m, 2H), 3.30-3.20 (m, 2H), 2.12 (s, 3H), 1.50-1.30 (m, 13H), 1.15-0.95 (m, 4H), 0.80-0.65 (m, 6H)。
LCMS: (方法E) 508.0 (M⁺+H-56), Rt. 3.35 min, 94.64% (Max)。


對映異構體2：產率：80% (100 mg，灰白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.12 (d, *J* = 6.4 Hz, 3H), 6.89 (d, *J* = 9.2 Hz, 2H), 6.48 (s, 1H), 4.75 (s, 2H), 3.80-3.60 (m, 5H), 3.30-3.20 (m, 2H), 2.11 (s, 3H), 1.52-1.30 (m, 13H), 1.20-1.10 (m, 2H), 1.10-0.98 (m, 2H), 0.76-0.68 (m, 6H)。
LCMS: (方法I) 508.0 (M⁺+H-56), Rt. 2.91 min, 97.23% (Max)。

【0294】兩種對映異構體之絕對組態為未知的。

【0295】

實例1

2-((3,3-二丁基-7-(二甲胺基)-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸



在0℃下，向2-((3,3-二丁基-7-(二甲胺基)-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯(中間物3；0.14 g，0.27 mmol)於1,4-二噁烷及水之混合物(5 mL，4:1)中之攪拌溶液中添加氫氧化鋰(23 mg，0.54 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌4小時。反應完成


(藉由TLC監測)後，將反應混合物用稀HCl (1.5 N, pH~4)酸化且將水層用EtOAc (2×15 mL)萃取。將合併之有機層用鹽水(15 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且隨後真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：2% MeOH/DCM，矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：20% (27 mg，灰白色固體)。

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 13.13 (s, 1H), 7.22 (t, *J* = 7.6 Hz, 2H), 7.17 (s, 1H), 7.01 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.86 (t, *J* = 7.2 Hz, 1H), 6.32 (s, 1H), 4.74 (s, 2H), 3.48 (s, 2H), 3.18 (s, 2H), 2.70 (s, 6H), 1.40-1.35 (m, 2H), 1.32-1.29 (m, 2H), 1.24-1.02 (m, 8H), 0.86-0.84 (m, 6H)。
LCMS: (方法C) 503.1 (M⁺+H), Rt. 3.02 min, 98.10% (Max)。
HPLC: (方法B) Rt. 5.19 min, 98.05% (Max)。

【0296】

實例2

2-((3,3-二丁基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸



在0℃下，向2-((3,3-二丁基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸甲酯(中間物6；0.08 g，0.14 mmol)於1,4-二噁烷及水之混合物(5 mL，4:1)中之攪拌溶液中添加氫氧化鋰(43 mg，1.01 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌4小時。


反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用稀HCl (1.5 N，pH~4)酸化且將水層用EtOAc (2×15 mL)萃取。將合併之有機層用鹽水(15 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且隨後真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：2% MeOH/DCM，矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。
產率：44% (34 mg，灰白色固體)。

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.16 (s, 1H), 7.12-7.06 (m, 2H), 6.87 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H), 6.48 (s, 1H), 4.57 (bs, 2H), 3.72 (s, 3H), 3.64 (bs, 2H), 3.24 (s, 2H), 2.11 (s, 3H), 1.37-1.35 (m, 4H), 1.24-1.10 (m, 4H), 1.07-1.01 (m, 4H), 0.75 (t, *J* = 6.80 Hz, 6H)。
LCMS: (方法A) 535.9 (M⁺+H), Rt. 2.84 min, 95.86% (max)。
HPLC: (方法B) Rt. 6.18 min, 94.13% (Max)。

【0297】

實例3

2-((5-(4-溴苯基)-3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸



在0°C下，向2-((5-(4-溴苯基)-3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸第三丁酯(中間物7；150 mg，0.23 mmol)於DCM (5 mL)中之攪拌溶液中添加TFA (0.5 mL)，且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由UPLC監測)後，將反應


混合物真空濃縮。藉由製備型HPLC (方法D)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：52% (70 mg，灰白色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.35 (d, *J* = 8.4 Hz, 2H), 7.19 (s, 1H), 6.88 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.81 (s, 1H), 4.85 (s, 2H), 3.75 (s, 2H), 3.18 (s, 2H), 2.25 (s, 3H), 1.47-1.41 (m, 2H), 1.39-1.25 (m, 2H), 1.16-1.07 (m, 8H), 0.79 (t, *J* = 6.4 Hz, 6H)。**LCMS**: (方法A) 586.0 (M⁺+H), Rt. 3.03 min, 98.92% (max)。**HPLC**: (方法A) Rt. 6.52 min, 99.57% (Max)。

【0298】

實例4

2-((3,3-二丁基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸



向2-((3,3-二丁基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯(中間物9；100 mg、0.19 mmol)於1,4-二噁烷(7 mL)中之攪拌溶液中添加氫氧化鋰(23 mg，0.57 mmol)於水(3 mL)中之溶液，且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由LCMS監測)後，真空濃縮反應混合物。藉由製備型HPLC (方法D)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：57% (56 mg，灰白色固體)。


¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 13.24 (s, 1H), 9.23 (s, 1H), 7.10

(s, 1H), 7.04 (d, $J = 8.4$ Hz, 2H), 6.71 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 6.39 (s, 1H), 4.70 (s, 2H), 3.62 (s, 2H), 3.28 (s, 2H), 2.07 (s, 3H), 1.39-1.35 (m, 4H), 1.11-1.00 (m, 8H), 0.77-0.74 (m, 6H)。LCMS: (方法A) 522.2 ($M^+ + H$), Rt. 2.48 min, 97.27% (max)。HPLC: (方法A) Rt. 5.47 min, 97.45% (Max)。

【0299】

實例5

2-((3,3-二丁基-5-(4-氰基苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸



在0℃下，向2-((3,3-二丁基-5-(4-氰基苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸第三丁酯(中間物11；110 mg，0.19 mmol)於DCM (2.5 mL)中之攪拌溶液中逐滴添加TFA (0.5 mL)，且將反應混合物在室溫下攪拌16小時。反應完成(藉由TLC監測)後，濃縮反應混合物且藉由製備型HPLC(方法D)純化，得到標題化合物。產率：40% (40 mg，灰白色固體)。


$^1\text{H NMR}$ (400 MHz, DMSO- d_6): δ 13.28 (s, 1H), 7.57 (d, $J = 8.6$ Hz, 2H), 7.23 (s, 1H), 6.96-6.88 (m, 3H), 4.90 (s, 2H), 3.89 (s, 2H), 3.26 (s, 2H), 2.08 (s, 3H), 1.59-1.50 (m, 2H), 1.31-1.13 (m, 10H), 0.83-0.80 (m, 6H)。LCMS: (方法A) 530.9 ($M^+ + H$), Rt. 2.65 min, 99.68% (max)。

HPLC: (方法B) Rt. 5.75 min, 99.88% (Max)。

【0300】

實例6

2-((3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸



向2-((3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯(中間物16; 60 mg, 0.1 mmol)於1,4-二噁烷(1 mL)中之攪拌溶液中添加含氫氧化鋰(8.6 mg, 0.2 mmol)之水(0.3 mL), 且將反應混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 將反應混合物用稀HCl (1.5 N, 2 mL)淬滅, 高真空濃縮且將殘餘物分配於冰冷的水(5 mL)與EtOAc (5 mL)之間。用EtOAc (2×5 mL)萃取水層, 且將合併之有機層用冰水(5 mL)且隨後用鹽水(5 mL)洗滌。有機層經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 13% MeOH/DCM; 矽膠: 230-400目)純化所得粗物質, 得到標題化合物。**產率:** 22% (13 mg, 灰白色固體)。


¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.48 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H), 7.20 (s, 1H), 6.94-6.91 (m, 3H), 4.62 (s, 2H), 3.95-3.59 (bs, 2H), 3.24 (s, 2H), 2.29 (s, 3H), 1.62-1.44 (m, 2H), 1.33-1.12 (m, 10H), 0.83 (t, *J* = 7.2 Hz, 6H)。**LCMS:** (方法C) 574.1 (M⁺+H), Rt. 3.05 min, 97.54% (max)。

HPLC: (方法B) Rt. 6.50 min, 96.80% (Max)。

【0301】

實例7

2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸




向2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯(中間物19；0.125 g，0.25 mmol)於1,4-二噁烷及水之混合物(5 mL，4:1)中之攪拌溶液中添加氫氧化鋰(0.032 g，0.76 mmol)，且將反應混合物在室溫下攪拌2小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用稀HCl (1.5 N，2 mL)酸化且將水層用EtOAc (2×10 mL)萃取。將合併之有機層用水(10 mL)、鹽水(10 mL)洗滌，且經無水Na₂SO₄脫水。真空濃縮有機部分且藉由製備型HPLC (方法A)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：45% (55 mg，灰白色固體)。

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.20 (t, *J* = 8.0 Hz, 1H), 7.16 (s, 2H), 6.96 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.82 (t, *J* = 7.2 Hz, 1H), 6.34 (s, 1H), 4.57 (s, 2H), 3.66 (bs, 2H), 3.16 (s, 2H), 2.71 (s, 6H), 1.55-1.53 (m, 1H), 1.43-1.32 (m, 3H), 1.30-1.06 (m, 4H), 0.79-0.77 (m, 6H)。**LCMS**: (方法A) 475.2 (M⁺+H), Rt. 2.66 min, 97.98% (Max), **HPLC**: (方法B) Rt. 4.63 min, 98.76% (Max)。

【0302】

實例8及9

(S)-2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸及(R)-2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸



藉由對掌性SFC(方法J)分離外消旋2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸(55 mg, 0.11 mmol)之兩種對映異構體。在40°C下真空濃縮物質。第一溶離份對應於對映異構體1且第二溶離份對應於對映異構體2。兩種對映異構體之絕對組態為未知的。

對映異構體1：產率：29% (16 mg, 白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.20 (t, *J* = 7.2 Hz, 1H), 7.16 (s, 2H), 6.97 (d, *J* = 8.0 Hz, 2H), 6.83 (t, *J* = 6.8 Hz, 1H), 6.34 (s, 1H), 4.63 (s, 2H), 3.67 (bs, 2H), 3.17 (s, 2H), 2.71 (s, 6H), 1.53-1.42 (m, 1H), 1.37-1.24 (m, 3H), 1.13-1.02 (m, 4H), 0.75 (t, *J* = 7.20 Hz, 6H)。LCMS: (方法A) 475.2 (M⁺+H), Rt. 2.64 min, 96.04% (Max)。HPLC: (方法B) Rt. 4.65 min, 94.8% (Max)。對掌性SFC (方法G) Rt. 5.36 min, 100% (Max)。


對映異構體2：產率：29% (17 mg, 白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.20 (t, *J* = 8.4 Hz, 1H), 7.16 (s, 2H), 6.96 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.82 (t, *J* = 7.2 Hz, 1H), 6.34 (s, 1H), 4.58 (s, 2H), 3.67 (bs, 2H), 3.17 (s, 2H), 2.71 (s, 6H), 1.56-1.29 (m, 4H), 1.24-1.08 (m, 4H), 0.75 (t,

$J = 8.00$ Hz, 6H)。**LCMS**: (方法A) 475.3 ($M^+ + H$), Rt. 2.64 min, 96.26% (Max)。**HPLC**: (方法B) Rt. 4.65 min, 94.31% (Max)。**對掌性純度**: (方法G) Rt. 6.25 min, 97.26% (Max)。

【0303】

實例10

2-((3,3-二丁基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸



向2-((3,3-二丁基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸甲酯(中間物27; 0.16 g, 0.32 mmol)於1,4-二噁烷及水之混合物(5 mL, 4:1)中之攪拌溶液中添加氫氧化鋰(0.04 g, 0.96 mmol), 且將反應混合物在室溫下攪拌2小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 將反應混合物用稀HCl (1.5 N, 2 mL)酸化且將水層用EtOAc (2×10 mL)萃取。將合併之有機部分用水(10 mL)及鹽水(10 mL)洗滌, 經無水 Na_2SO_4 乾燥且隨後真空濃縮。藉由製備型HPLC (方法A)純化粗物質, 得到標題化合物。**產率**: 33% (51 mg, 灰白色固體)。


$^1\text{H-NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 7.45 (d, $J = 8.8$ Hz, 1H), 7.29 (t, $J = 7.6$ Hz, 2H), 7.12 (d, $J = 7.6$ Hz, 2H), 6.98 (t, $J = 6.8$ Hz, 1H), 6.76 (d, $J = 12.8$ Hz, 1H), 4.85 (s, 2H), 3.73 (bs, 2H), 3.25 (s, 2H), 1.40-1.29 (m, 4H), 1.10-1.00 (m, 8H), 0.74 (t, $J = 6.40$ Hz, 6H)。**LCMS**: (方法A) 478.2 ($M^+ + H$), Rt. 3.03 min, 99.01% (Max), **HPLC**: (方法B) Rt. 6.18 min,

98.41% (Max)。

【0304】

實例11

2-((3,3-二丁基-7-氰基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸




在0℃下，向2-((3,3-二丁基-7-氰基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸第三丁酯(中間物30；85 mg，0.15 mmol)於DCM (2 mL)中之攪拌溶液中添加TFA (0.12 mL，1.5 mmol)，且將溶液在室溫下攪拌6小時。反應完成(藉由TLC監測)後，真空濃縮反應混合物且將殘餘物分配於冰冷的水(5 mL)與EtOAc (5 mL)之間。用EtOAc (2×5 mL)萃取水層且用冰冷的水(5 mL)及鹽水(5 mL)洗滌合併之有機層。有機部分經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：9%甲醇/DCM；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。產率：27% (21 mg，黃色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.45 (s, 1H), 7.33-7.27 (m, 3H), 7.11 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.99 (t, *J* = 6.8 Hz, 1H), 4.98 (s, 2H), 3.52 (bs, 2H), 3.42 (s, 2H), 1.45-1.30 (m, 4H), 1.21-0.95 (m, 8H), 0.74 (t, *J* = 6.4 Hz, 6H)。LCMS: (方法A) 483.2 (M⁺-H), Rt. 2.91 min, 94.28% (max)。HPLC: (方法B) Rt. 6.10 min, 97.36% (Max)。

【0305】

實例12

2-((3-丁基-3-乙基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸




在0℃下，向2-((3-丁基-3-乙基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸第三丁酯(中間物38；0.56 g，1.10 mmol)於DCM (5 mL)中之攪拌溶液中添加TFA (3.36 mL，6 vol)，且將反應混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成(藉由TLC監測)後，真空濃縮反應混合物。藉由製備型HPLC (方法D)純化所得粗物質，得到標題化合物。產率：10% (50 mg，灰白色固體)。

¹H-NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.44 (d, *J* = 8.8 Hz, 1H), 7.27 (t, *J* = 7.6 Hz, 2H), 7.08 (d, *J* = 8.0 Hz, 2H), 6.97-6.95 (m, 1H), 6.79 (d, *J* = 12.4 Hz, 1H), 4.77 (s, 2H), 3.73 (s, 2H), 3.29 (s, 2H), 1.51-1.32 (m, 4H), 1.24-0.99 (m, 4H), 0.73 (t, *J* = 6.00 Hz, 6H)。 **LCMS**: (方法A) 450.1 (M⁺+H), Rt. 2.53 min, 96.04% (Max)。 **HPLC**: (方法B) Rt. 5.61 min, 98.15% (Max)。

【0306】

實例13

2-((3,3-二丁基-7-氯-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸




向2-((3,3-二丁基-7-氯-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸甲酯(中間物46；449 mg，0.88 mmol)於1,4-二噁烷(3:1，4 mL)中之攪拌溶液中添加氫氧化鋰(112 mg，2.65 mmol)於水(1.34 mL)中之溶液，且將反應混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用稀HCl(1.5 N，2 mL)淬滅且真空濃縮。將所獲得之殘餘物分配於冰冷的水(10 mL)與EtOAc (10 mL)之間。用EtOAc (2×8 mL)萃取水層。將合併之有機層用冰冷的水(10 mL)及鹽水(10 mL)洗滌且隨後經無水Na₂SO₄乾燥。真空濃縮有機部分且藉由Isolera管柱層析(溶離劑：20% EtOAc/PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，得到標題化合物。**產率**：57% (252 mg，灰白色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 13.27 (s, 1H), 7.38 (s, 1H), 7.29 (t, *J* = 7.6 Hz, 2H), 7.11 (d, *J* = 7.6 Hz, 2H), 6.99-6.96 (m, 2H), 4.89 (s, 2H), 3.69 (bs, 2H), 3.34 (s, 2H), 1.40-1.30 (m, 4H), 1.27-1.08 (m, 8H), 1.00-0.75 (m, 6H)。**LCMS**: (方法A) 494.2 (M⁺), 496.2 (M⁺+2) Rt. 3.04 min, 95.69% (max)。**HPLC**: (方法B) Rt. 6.38 min, 96.63% (Max)。

【0307】

實例14

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸




在0℃下，向2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸第三丁酯(中間物54；0.1 g，0.18 mmol)於DCM (4 mL)中之溶液中添加TFA (1 mL)，且將反應混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成(藉由TLC監測)後，將反應混合物用冰冷的水(10 mL)淬滅且將水層用DCM (2×5 mL)萃取。將合併之有機層用水(2×5 mL)及鹽水(5 mL)洗滌，經無水Na₂SO₄乾燥且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑：90% EtOAc/ PE；矽膠：230-400目)純化所得粗物質，且藉由製備型HPLC(方法B)再純化所獲得之殘餘物，得到標題化合物。**產率**：43% (39 mg，白色固體)。

¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.16 (s, 1H), 7.12-7.04 (m, 4H), 6.64 (s, 1H), 4.54 (s, 2H), 3.64 (bs, 2H), 3.24 (s, 2H), 2.18 (s, 3H), 1.58-1.45 (m, 1H), 1.38-1.31 (m, 3H), 1.18-0.95 (m, 4H), 0.78-0.72 (m, 6H)。
LCMS: (方法D) 496.2 (M⁺+H), Rt. 2.56 min, 98.23% (max)。**HPLC**: (方法A) Rt. 5.40 min, 98.70% (Max)。

【0308】

實例15及16

(S)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸及(R)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸



向2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸第三丁酯之對映異構體1 (中間物55; 100 mg, 0.18 mmol)於DCM (3 mL)中之溶液中添加TFA (1 mL), 且將反應混合物在室溫下攪拌3小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 將反應混合物用冰冷的水(2 mL)稀釋且用EtOAc (2×10 mL)萃取水層。將合併之有機層用水(10 mL)及鹽水(10 mL)洗滌且經無水Na₂SO₄乾燥。將有機部分過濾且真空濃縮。藉由Isolera管柱層析(溶離劑: 45% EtOAc/PE; 矽膠: 230-400目)純化所得粗物質, 得到標題化合物之對映異構體1。

【0309】 遵循相同程序, 以100 mg之中間物55之對映異構體2為起始物質獲得標題化合物之對映異構體2。兩種對映異構體之絕對組態為未知的。

對映異構體1: 產率: 78% (70 mg, 白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.17 (s, 1H), 7.10-7.06 (m, 4H), 6.64 (s, 1H), 4.70 (s, 2H), 3.78 (bs, 2H), 3.26 (s, 2H), 2.18 (s, 3H), 1.58-1.32 (m, 4H), 1.29-0.95 (m, 4H), 0.78-0.74 (m, 6H)。LCMS: (方法D) 496.2 (M⁺+H), Rt. 2.59 min, 98.06% (Max)。HPLC: (方法D) Rt. 5.26 min, 97.18% (Max)。對掌性SFC (方法M) Rt. 7.42 min, 97.57% (Max)。


對映異構體2: 產率: 73% (65 mg, 白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): δ 7.16 (s, 1H), 7.10-7.05 (m, 4H), 6.63 (s, 1H), 4.64 (s, 2H),

3.78 (bs, 2H), 3.25 (s, 2H), 2.18 (s, 3H), 1.58-1.43 (m, 2H), 1.42-1.28 (m, 2H), 1.29-0.96 (m, 4H), 0.78-0.72 (m, 6H)。LCMS: (方法D) 496.2 ($M^+ + H$), Rt. 2.60 min, 96.56% (Max)。HPLC: (方法D) Rt. 5.26 min, 94.68% (Max)。對掌性SFC (方法M) Rt. 7.96 min, 97.28% (Max)。

【0310】

實例17及18

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸及2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸



向2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯及2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸甲酯之混合物(中間物62; 110 mg, 0.21 mmol)於1,4-二噁烷及水之混合物(3:1, 4 mL)中之攪拌溶液中添加單水合氫氧化鋰(18.2 mg, 0.43 mmol), 且將反應混合物在室溫下攪拌2小時。反應完成(藉由TLC監測)後, 用稀HCl (1.5 N, 1 mL)淬滅反應混合物且用水稀釋(1 mL)。用EtOAc (2×5 mL)萃取水層。將合併之有機層用水(5 mL)及鹽水(5 mL)洗滌且經無水 Na_2SO_4 乾燥。將有機部分過濾且真空濃縮。藉由製備型HPLC (方法A)純化所得粗物質, 得到標題化合物。


實例17：產率：28% (30 mg，灰白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): 9.24 (s, 1H), 7.12 (s, 1H), 7.04 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H), 6.72 (d, *J* = 8.8 Hz, 2H), 6.41 (s, 1H), 4.69 (s, 2H), 3.65 (bs, 2H), 3.28 (s, 2H), 2.09 (s, 3H), 1.49-1.33 (m, 4H), 1.24-1.09 (m, 2H), 1.08-1.01 (m, 2H), 0.81-0.69 (m, 6H)。LCMS: (方法E) 494.0 (M⁺+H), Rt. 2.69 min, 97.99% (Max)。HPLC: (方法B) Rt. 4.78 min, 95.98% (Max)。

實例18：產率：13% (15 mg，灰白色固體)。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): 7.14-7.12 (m, 3H), 6.88 (d, *J* = 9.2 Hz, 2H), 6.49 (s, 1H), 4.75 (s, 2H), 3.73 (s, 3H), 3.66 (bs, 2H), 3.28 (s, 2H), 2.11 (s, 3H), 1.52-1.36 (m, 4H), 1.34-1.24 (m, 2H), 1.12-1.03 (m, 2H), 0.81-0.69 (m, 6H)。LCMS: (方法E) 508.0 (M⁺+H), Rt. 2.97 min, 98.16% (Max)。HPLC: (方法B) Rt. 5.52 min, 98.81% (Max)。

【0311】

實例19及20

(S)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸及(R)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸



在-15℃至-30℃下，向2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫

基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呋-8-基)氧基)乙酸第三丁酯之對映異構體1 (中間物63 ; 140 mg , 0.24 mmol)於DCM (3 mL)中之溶液中逐滴添加 BBr_3 (1 M於DCM中 , 0.5 mL , 0.49 mmol) 。將反應混合物在低於 -10°C 下攪拌1.5小時且隨後在室溫下攪拌1.5小時 。反應完成(藉由TLC及UPLC監測)後 , 用冰水(5 mL)淬滅反應混合物且用DCM (2×20 mL)萃取水層 。將合併之有機層用水(5 mL)及鹽水(5 mL)洗滌且經無水 Na_2SO_4 乾燥 。過濾有機部分 , 真空濃縮且藉由用乙酸乙酯及石油醚(2×3 mL)濕磨純化所得粗物質 , 得到標題化合物之對映異構體1 。

【0312】 遵循相同程序 , 以100 mg之中間物63之對映異構體2為起始物質獲得標題化合物之對映異構體2 。兩種對映異構體之絕對組態為未知的 。

對映異構體1 : 產率 : 35% (42 mg , 灰白色固體) 。 $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 13.15 (s, 1H), 9.24 (s, 1H), 7.12-7.04 (m, 3H), 6.73 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 6.40 (s, 1H), 4.75 (s, 2H), 3.73-3.61 (m, 2H), 3.34-3.29 (m, 2H), 2.09 (s, 3H), 1.60-1.30 (m, 4H), 1.20-0.95 (m, 4H), 0.76-0.67 (m, 6H) 。**LCMS:** (方法G) 494.2 ($\text{M}^+\text{+H}$), Rt. 2.37 min, 95.72% (Max) 。**HPLC:** (方法B) Rt. 4.74 min, 93.32% (Max) 。**對掌性SFC** (方法R) Rt. 4.45 min, 99.59% (Max) 。

對映異構體2 : 產率 : 47% (41 mg , 灰白色固體) 。 $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$): δ 13.15 (s, 1H), 9.24 (s, 1H), 7.12 (s, 1H), 7.05 (d, $J = 8.8$ Hz, 2H), 6.73 (d, $J = 9.2$ Hz, 2H), 6.40 (s, 1H), 4.75 (s, 2H), 3.75-3.50 (m, 2H), 3.29 (s, 2H), 2.09 (s, 3H), 1.58-1.48 (m, 1H), 1.42-1.32 (m, 3H), 1.18-1.05 (m, 2H), 1.05-0.95 (m, 2H), 0.76-0.67 (m, 6H) 。**LCMS:** (方法

G) 494.2 (M^++H), Rt. 2.16 min, 99.03% (Max)。HPLC: (方法B) Rt. 4.78 min, 98.30% (Max)。對掌性SFC (方法R) Rt. 6.0 min, 100% (Max)。

【0313】

生物分析

IBAT (h/m) 分析方案

將10,000個細胞(人類或小鼠IBAT過度表現細胞)接種於96孔盤(Corning CLS3809)中之200 μ L MEM- α 培養基(Gibco 12571-063)中，該培養基補充有10% FBS (Gibco 10438026)且含有嘌呤黴素(Gibco A1113803) (10 μ g/mL)，且將該等細胞在37°C下5% CO₂中培育48小時。培育後，自孔中傾析出培養基且用300 μ L基礎MEM- α 培養基(不含FBS)洗滌細胞兩次。每次傾析基礎MEM- α 培養基後，將盤對著紙巾輕拍以確保最大程度地移除殘餘培養基。

【0314】 將在DMSO (Sigma D2650)中製備之測試抑制劑稀釋液(最高測試濃度為10 μ M，3倍連續稀釋，10個點)添加於含有0.25 μ M 3H-牛膽酸(ARC ART-1368)及5 μ M冷牛膽酸(Sigma T4009)之培育混合物(維持0.2%最終DMSO濃度)中。隨後將50 μ L含有測試抑制劑之培育混合物添加至孔中(一式兩份)，且將盤在CO₂培育箱中在37°C下培育20分鐘。培育後，藉由將盤保持在冰水混合物上2-3分鐘來停止反應，且隨後自孔中完全吸出培育混合物。用溶解於HEPES (Gibco 15630080)緩衝之(10 mM) HBSS (Gibco 14175079) (pH 7.4)中的250 μ L冷卻的未經標記之1 mM牛膽酸洗滌孔兩次。每次洗滌後，將盤對著紙巾輕拍以確保最大程度地移除阻斷緩衝液。

【0315】 將100 μ L MicroScint-20 (PerkinElmer 6013621)添加至孔

中且在室溫下保持隔夜，隨後在來自PerkinElmer之TopCount NXT™微量盤閃爍及發光計數器中根據3H測試方案(設定為每孔120秒讀取時間)讀取盤。

【0316】

LBAT (h/m) 分析方案

將20,000個細胞(人類或小鼠LBAT過度表現細胞)接種於96孔盤(Corning CLS3809)中之100 μ L MEM- α 培養基(Gibco 12571-063)中，該培養基補充有10% FBS (Gibco 10438026)且含有遺傳黴素(Gibco 10131-027) (1 mg/mL)，且將該等細胞在37°C下5% CO₂中培育24小時。培育後，自孔中傾析出培養基且用300 μ L基礎MEM- α 培養基(不含FBS)洗滌細胞兩次。每次傾析基礎MEM- α 培養基後，將盤對著紙巾輕拍以確保最大程度地移除殘餘培養基。

【0317】對於人類LBAT，藉由將測試抑制劑稀釋液(在DMSO (Sigma D2650)中之3倍連續稀釋液，10個點)添加於含有0.3 μ M 3H-牛膽酸(ARC ART-1368)及7.5 μ M冷牛膽酸(Sigma T4009)之MEM- α (無FBS) (維持0.2%最終DMSO濃度)中來製備培育混合物。對於小鼠LBAT，藉由將測試抑制劑稀釋液(在DMSO中之3倍連續稀釋液，10個點)添加於含有0.3 μ M 3H-牛膽酸及25 μ M冷牛膽酸之MEM- α (無FBS)(維持0.2%最終DMSO濃度)中來製備培育混合物。

【0318】隨後將50 μ L含有測試抑制劑之培育混合物添加至孔中(一式兩份)，且將盤在CO₂培育箱中在37°C下培育20分鐘。培育後，藉由將盤保持在冰水混合物上2-3分鐘來停止反應，且隨後自孔中完全吸出培育混合物。用溶解於HEPES (Gibco 15630080)緩衝之(10 mM) HBSS (Gibco

14175079) (pH 7.4)中的250 μ L冷卻的未經標記之1 mM牛膽酸洗滌孔兩次。每次洗滌後，將盤對著紙巾輕拍以確保最大程度地移除阻斷緩衝液。

【0319】 將100 μ L MicroScint-20 (PerkinElmer 6013621)添加至孔中且在室溫下保持隔夜，隨後在來自PerkinElmer之TopCount NXT™微量盤閃爍及發光計數器中根據3H測試方案(設定為每孔120秒讀取時間，正常盤方向)讀取盤。

【0320】

雙向滲透率分析(Caco-2細胞)

將Caco-2細胞(Evotec)以70,000個細胞/孔之密度接種於Millicell® 24孔插入式細胞培養盤中，且維持於培育箱(37°C，5% CO₂，95% RH)中持續21天，伴隨隔天更換一次培養基。

【0321】 在二甲亞砜(DMSO)中製備測試化合物阿替洛爾(atenolol) (低滲透率標記物)、普萘洛爾(propranolol) (高滲透率標記物)及地高辛(digoxin) (P-gp轉運路徑之受質)之儲備溶液(10 mM)。藉由用90 μ L純DMSO稀釋10 μ L之10 mM母儲備溶液來製備中間儲備溶液(1 mM)。藉由用4950 μ L之FaSSIF緩衝液稀釋50 μ L之1 mM中間儲備溶液來製備工作儲備溶液(10 μ M)。向FaSSIF後添加化合物，對樣品進行音波處理持續2小時，且在37°C下以4000 RPM離心30分鐘。將4 mL上清液直接用於分析中。轉運實驗中之最終DMSO濃度為1%。

【0322】 分析當天，用轉運緩衝液(HBSS，pH 7.4)洗滌Caco-2單細胞層兩次，且在培育箱中預培育30分鐘(37°C，5% CO₂，95% RH)。用Millicell®-ERS系統單細胞層之電阻。將跨上皮電阻(TEER)值超過350 ohm.cm²之單細胞層選用於分析。

【0323】沿吸收方向(A2B)及分泌方向(B2A)進行分析。藉由在孔(一式兩份(n=2))中向供體室(頂部室A-B；基側室B-A)添加由化合物組成之轉運分析緩衝液(在HBSS中製備之FaSSIF緩衝液)來啟動轉運實驗。將含有1%牛血清白蛋白(BSA)的不含藥物之HBSS緩衝液(pH 7.4)引入至接受者室(A-B-基側室；B-A-頂部室)。頂部室與基側室之體積分別為0.4 mL與0.8 mL。添加投配溶液之後，將培養板在培育箱中在37°C下培育120分鐘。120分鐘之後，收集供體與接受者樣品，用相反的緩衝液進行基質匹配(1:1，30 µL研究樣品+30 µL空白緩衝液)。投配樣品基質與相反的緩衝液匹配(1:1，30 µL研究樣品+30 µL空白緩衝液)。藉由添加含有內標物之乙腈來處理樣品(60 µL研究樣品+ 200 µL含有內標物甲苯磺丁脲之乙腈，500 ng/mL)。對樣品進行渦旋且以4000 rpm離心10分鐘。用100 µL水稀釋所獲得之上清液(100 µL)且轉移至新製96孔盤。若適用，使用發現級生物分析方法藉由液相層析聯合質譜分析(LC-MS/MS)法來分析化合物在樣品中之濃度。

【0324】測試化合物阿替洛爾、普萘洛爾及地高辛之平均表觀滲透率(P_{app} ， $\times 10^{-6}$ cm/秒)係計算如下：

$$P_{app} = \frac{dq}{dt} \times \frac{1}{C_0} \times \frac{1}{A}$$

其中 dq/dt = 轉運速率(接受者室中化合物之轉運速率)， C_0 = 供體室中之初始濃度， A = 有效濾膜之表面積。

【0325】

基於HepaRG之分析方案

按照Biopredic International提供之方案，在補充有200 mM Glutamax (Gibco 35050061)之HepaRG解凍/接種/通用培養基(Biopredic

International ADD670C)解凍冷凍保存之小瓶分化HepaRG細胞(Biopredic International HPR116080)。將每孔70,000個細胞接種於96孔盤(Corning CLS3809)中之100 μ L補充有200 mM Glutamax之HepaRG解凍/接種/通用培養基中，且在37°C下5% CO₂中培育24小時。培育後，將接種培養基替換為HepaRG維持/代謝培養基(Biopredic International ADD620C)且培育6天，每48小時補充新鮮的HepaRG維持/代謝培養基。接種後培育7天後，自孔中傾析出培育培養基，且用250 μ L威廉姆斯氏E基礎培養基(William's E Basal Media) (Gibco 12551032)洗滌細胞兩次。每次傾析威廉姆斯氏E基礎培養基後，將盤對著紙巾輕拍以確保最大程度地移除殘餘培養基。

【0326】 培育混合物係藉由將測試抑制劑稀釋液(在DMSO (Sigma D2650)中之3倍連續稀釋液)添加於含有0.3 μ M 3H-牛膽酸(ARC ART-1368)及7.5 μ M冷牛膽酸(Sigma T4009)之威廉姆斯氏E培養基(基礎)(維持0.2%最終DMSO濃度)中來製備。隨後將50 μ L含有測試抑制劑之培育混合物添加至孔中(一式兩份)，且將盤在5% CO₂培育箱中在37°C下培育30分鐘。培育後，藉由將盤保持在冰水混合物上2-3分鐘來停止反應，且隨後自孔中完全吸出培育混合物。用溶解於HEPES (Gibco 15630080)緩衝之(10 mM) HBSS (Gibco 14175079) (pH 7.4)中的250 μ L冷卻的未經標記之1 mM牛膽酸洗滌孔兩次。每次洗滌後，將盤對著紙巾輕拍以確保最大程度地移除阻斷緩衝液。

【0327】 將100 μ L MicroScint-20 (PerkinElmer 6013621)添加至孔中且在室溫下保持隔夜，隨後在來自PerkinElmer之TopCount NXT™微量盤閃爍及發光計數器中根據3H測試方案(設定為每孔120秒讀取時間，正

常盤方向)讀取盤。

【0328】

測試化合物稀釋液之製備

所有測試化合物在室溫下以粉末形式提供。製備測試化合物之10 mM DMSO儲備液，等分且儲存於-20℃下。由化合物之10 mM DMSO儲備液製備在DMSO中之3倍連續稀釋液，得到總共10個測試化合物稀釋液。將0.5 μL此DMSO中之稀釋液添加至含有3H-牛膽酸及冷牛膽酸之250 μL不含FBS的基礎培養基中以製備培育混合物。

【0329】

生物可用性研究

使用8至9週齡之雄性小鼠(C57BL/6或CD1)或威斯塔大鼠(Wistar rat)。對於每種測試化合物，使用兩組，每組3隻動物。一組經由尾部靜脈投與1 mg/kg (媒劑100% DMSO)之單次靜脈內劑量，另一組經由管飼針投與10 mg/kg之單次經口劑量。投與經口劑量之組禁食隔夜。靜脈內投與後0.083、0.25、0.5、1、2、4、6、8及24小時後以及經口投與後0.25、0.5、1、2、4、6、8及24小時後收集血液樣品。血液樣品取自於隱靜脈。使用0.2% EDTA作為抗凝血劑。藉由開發用於估計血漿中之測試化合物的發現級生物分析方法，使用LC-MS/MS系統分析樣品。

【0330】

結果

實例化合物之生物學資料顯示於下表8中。

表 8

實例	hLBAT IC ₅₀ (nM)	hIBAT IC ₅₀ (nM)	滲透率(Caco-2)		生物可用率(%)
			P _{app} A2B (×10 ⁻⁶ cm/秒)	P _{app} B2A (×10 ⁻⁶ cm/秒)	
1		24	3.2	9.4	
2		38	4.3	6.6	
3	2822	26	4.1	1.9	
4	1986	15	3.3	8.9	
5		58	5.5	14.5	6 (C57BL/6)
6	3609	59			
7		14			
8		9	7.9	23.7	26 (C57BL/6)
9		217			
10	1068	179			
11	2527	281			
12	473	350			
13	1620	268			
14		6.4			
15		2.4	8.7	12.9	
16		64			
17		19			
18		17			
19		705			
20	751	14			

【0331】

*PD*模型：測試化合物對雄性C57BL6小鼠之總膽酸含量的評估。

使用8至9週齡之C57BL/6N Tac小鼠來研究膽酸調節劑對膽酸含量的影響。在檢疫及適應期結束後，將動物基於體重隨機分成x個實驗組：(i) 媒劑對照，及(ii)每日經口投與y mg/kg測試化合物一次。用測試化合物處理動物7天。在研究之第5天，將動物單獨圈養於新籠中。在第7天，自各籠收集糞便，隨後經由眼眶後途徑自各動物抽取血液。對動物實施安樂死以自各動物收集肝臟及末端迴腸用於進一步分析。每週兩次量測體重及食

物消耗。在第7天之血清樣品中分析血清脂質概況。在第7天之血清樣品中量測血清中之總膽酸。在第7天之糞便樣品中量測糞便膽汁排泄。在第7天之肝臟樣品中量化CYP7A1及SHP之肝臟表現。在第7天之肝臟樣品中分析肝臟甘油三酯及總膽固醇。

【0332】

尿膽酸模型：測試化合物對雄性C57BL/6N小鼠之尿膽酸含量的評估。

使用8至9週齡之C57BL/6N Tac小鼠來研究膽酸調節劑對膽酸含量的影響。在檢疫及適應期結束後，將動物基於體重隨機分成x個實驗組：(i) 媒劑對照，及(ii)每日經口投與y mg/kg測試化合物一次。用測試化合物處理動物7天。在研究之第6天，將動物轉移至代謝籠中。在第7天，自各代謝籠收集糞便及尿液，隨後經由眼眶後途徑自各動物抽取血液。對動物實施安樂死以自各動物收集腎臟用於進一步分析。每週量測體重兩次。在第7天之血清樣品中量測血清中之總膽酸。在第7天之糞便樣品中量測糞便膽酸排泄。在第7天之樣品中量測膽酸之尿排泄。在第7天之樣品中量化ASBT、OSTa、OSTAb及MRP2之腎臟表現。

【序列表】

<110> 瑞典商艾爾比瑞歐公司(ALBIREO AB)

<120> 苯并噻氮呋化合物及其作為膽酸調節劑之用途

<130> NP0415TW

<150> IN 201911049985

<151> 2019-12-04

<160> 4

<170> PatentIn version 3.5

<210> 1

<211> 1251

<212> PRT

<213> 智人

<400> 1

Met Ser Thr Glu Arg Asp Ser Glu Thr Thr Phe Asp Glu Asp Ser Gln
1 5 10 15

Pro Asn Asp Glu Val Val Pro Tyr Ser Asp Asp Glu Thr Glu Asp Glu
20 25 30

Leu Asp Asp Gln Gly Ser Ala Val Glu Pro Glu Gln Asn Arg Val Asn
35 40 45

Arg Glu Ala Glu Glu Asn Arg Glu Pro Phe Arg Lys Glu Cys Thr Trp
50 55 60

Gln Val Lys Ala Asn Asp Arg Lys Tyr His Glu Gln Pro His Phe Met
65 70 75 80

Asn Thr Lys Phe Leu Cys Ile Lys Glu Ser Lys Tyr Ala Asn Asn Ala
85 90 95

Ile Lys Thr Tyr Lys Tyr Asn Ala Phe Thr Phe Ile Pro Met Asn Leu
100 105 110

Phe	Glu	Gln	Phe	Lys	Arg	Ala	Ala	Asn	Leu	Tyr	Phe	Leu	Ala	Leu	Leu
115					120					125					
Ile	Leu	Gln	Ala	Val	Pro	Gln	Ile	Ser	Thr	Leu	Ala	Trp	Tyr	Thr	Thr
130					135					140					
Leu	Val	Pro	Leu	Leu	Val	Val	Leu	Gly	Val	Thr	Ala	Ile	Lys	Asp	Leu
145					150					155					160
Val	Asp	Asp	Val	Ala	Arg	His	Lys	Met	Asp	Lys	Glu	Ile	Asn	Asn	Arg
165					170					175					
Thr	Cys	Glu	Val	Ile	Lys	Asp	Gly	Arg	Phe	Lys	Val	Ala	Lys	Trp	Lys
180					185					190					
Glu	Ile	Gln	Val	Gly	Asp	Val	Ile	Arg	Leu	Lys	Lys	Asn	Asp	Phe	Val
195					200					205					
Pro	Ala	Asp	Ile	Leu	Leu	Leu	Ser	Ser	Ser	Glu	Pro	Asn	Ser	Leu	Cys
210					215					220					
Tyr	Val	Glu	Thr	Ala	Glu	Leu	Asp	Gly	Glu	Thr	Asn	Leu	Lys	Phe	Lys
225					230					235					240
Met	Ser	Leu	Glu	Ile	Thr	Asp	Gln	Tyr	Leu	Gln	Arg	Glu	Asp	Thr	Leu
245					250					255					
Ala	Thr	Phe	Asp	Gly	Phe	Ile	Glu	Cys	Glu	Glu	Pro	Asn	Asn	Arg	Leu
260					265					270					
Asp	Lys	Phe	Thr	Gly	Thr	Leu	Phe	Trp	Arg	Asn	Thr	Ser	Phe	Pro	Leu
275					280					285					
Asp	Ala	Asp	Lys	Ile	Leu	Leu	Arg	Gly	Cys	Val	Ile	Arg	Asn	Thr	Asp
290					295					300					
Phe	Cys	His	Gly	Leu	Val	Ile	Phe	Ala	Gly	Ala	Asp	Thr	Lys	Ile	Met

305 310 315 320

Lys Asn Ser Gly Lys Thr Arg Phe Lys Arg Thr Lys Ile Asp Tyr Leu
325 330 335

Met Asn Tyr Met Val Tyr Thr Ile Phe Val Val Leu Ile Leu Leu Ser
340 345 350

Ala Gly Leu Ala Ile Gly His Ala Tyr Trp Glu Ala Gln Val Gly Asn
355 360 365

Ser Ser Trp Tyr Leu Tyr Asp Gly Glu Asp Asp Thr Pro Ser Tyr Arg
370 375 380

Gly Phe Leu Ile Phe Trp Gly Tyr Ile Ile Val Leu Asn Thr Met Val
385 390 395 400

Pro Ile Ser Leu Tyr Val Ser Val Glu Val Ile Arg Leu Gly Gln Ser
405 410 415

His Phe Ile Asn Trp Asp Leu Gln Met Tyr Tyr Ala Glu Lys Asp Thr
420 425 430

Pro Ala Lys Ala Arg Thr Thr Thr Leu Asn Glu Gln Leu Gly Gln Ile
435 440 445

His Tyr Ile Phe Ser Asp Lys Thr Gly Thr Leu Thr Gln Asn Ile Met
450 455 460

Thr Phe Lys Lys Cys Cys Ile Asn Gly Gln Ile Tyr Gly Asp His Arg
465 470 475 480

Asp Ala Ser Gln His Asn His Asn Lys Ile Glu Gln Val Asp Phe Ser
485 490 495

Trp Asn Thr Tyr Ala Asp Gly Lys Leu Ala Phe Tyr Asp His Tyr Leu
500 505 510

Ile	Glu	Gln	Ile	Gln	Ser	Gly	Lys	Glu	Pro	Glu	Val	Arg	Gln	Phe	Phe	
515				520				525								
Phe	Leu	Leu	Ala	Val	Cys	His	Thr	Val	Met	Val	Asp	Arg	Thr	Asp	Gly	
530				535				540								
Gln	Leu	Asn	Tyr	Gln	Ala	Ala	Ser	Pro	Asp	Glu	Gly	Ala	Leu	Val	Asn	
545				550				555				560				
Ala	Ala	Arg	Asn	Phe	Gly	Phe	Ala	Phe	Leu	Ala	Arg	Thr	Gln	Asn	Thr	
565				570				575								
Ile	Thr	Ile	Ser	Glu	Leu	Gly	Thr	Glu	Arg	Thr	Tyr	Asn	Val	Leu	Ala	
580				585				590								
Ile	Leu	Asp	Phe	Asn	Ser	Asp	Arg	Lys	Arg	Met	Ser	Ile	Ile	Val	Arg	
595				600				605								
Thr	Pro	Glu	Gly	Asn	Ile	Lys	Leu	Tyr	Cys	Lys	Gly	Ala	Asp	Thr	Val	
610				615				620								
Ile	Tyr	Glu	Arg	Leu	His	Arg	Met	Asn	Pro	Thr	Lys	Gln	Glu	Thr	Gln	
625				630				635				640				
Asp	Ala	Leu	Asp	Ile	Phe	Ala	Asn	Glu	Thr	Leu	Arg	Thr	Leu	Cys	Leu	
645				650				655								
Cys	Tyr	Lys	Glu	Ile	Glu	Glu	Lys	Glu	Phe	Thr	Glu	Trp	Asn	Lys	Lys	
660				665				670								
Phe	Met	Ala	Ala	Ser	Val	Ala	Ser	Thr	Asn	Arg	Asp	Glu	Ala	Leu	Asp	
675				680				685								
Lys	Val	Tyr	Glu	Glu	Ile	Glu	Lys	Asp	Leu	Ile	Leu	Leu	Gly	Ala	Thr	
690				695				700								
Ala	Ile	Glu	Asp	Lys	Leu	Gln	Asp	Gly	Val	Pro	Glu	Thr	Ile	Ser	Lys	

705 710 715 720

Leu Ala Lys Ala Asp Ile Lys Ile Trp Val Leu Thr Gly Asp Lys Lys
725 730 735

Glu Thr Ala Glu Asn Ile Gly Phe Ala Cys Glu Leu Leu Thr Glu Asp
740 745 750

Thr Thr Ile Cys Tyr Gly Glu Asp Ile Asn Ser Leu Leu His Ala Arg
755 760 765

Met Glu Asn Gln Arg Asn Arg Gly Gly Val Tyr Ala Lys Phe Ala Pro
770 775 780

Pro Val Gln Glu Ser Phe Phe Pro Pro Gly Gly Asn Arg Ala Leu Ile
785 790 795 800

Ile Thr Gly Ser Trp Leu Asn Glu Ile Leu Leu Glu Lys Lys Thr Lys
805 810 815

Arg Asn Lys Ile Leu Lys Leu Lys Phe Pro Arg Thr Glu Glu Glu Arg
820 825 830

Arg Met Arg Thr Gln Ser Lys Arg Arg Leu Glu Ala Lys Lys Glu Gln
835 840 845

Arg Gln Lys Asn Phe Val Asp Leu Ala Cys Glu Cys Ser Ala Val Ile
850 855 860

Cys Cys Arg Val Thr Pro Lys Gln Lys Ala Met Val Val Asp Leu Val
865 870 875 880

Lys Arg Tyr Lys Lys Ala Ile Thr Leu Ala Ile Gly Asp Gly Ala Asn
885 890 895

Asp Val Asn Met Ile Lys Thr Ala His Ile Gly Val Gly Ile Ser Gly
900 905 910

Gln Glu Gly Met Gln Ala Val Met Ser Ser Asp Tyr Ser Phe Ala Gln
915 920 925

Phe Arg Tyr Leu Gln Arg Leu Leu Leu Val His Gly Arg Trp Ser Tyr
930 935 940

Ile Arg Met Cys Lys Phe Leu Arg Tyr Phe Phe Tyr Lys Asn Phe Ala
945 950 955 960

Phe Thr Leu Val His Phe Trp Tyr Ser Phe Phe Asn Gly Tyr Ser Ala
965 970 975

Gln Thr Ala Tyr Glu Asp Trp Phe Ile Thr Leu Tyr Asn Val Leu Tyr
980 985 990

Thr Ser Leu Pro Val Leu Leu Met Gly Leu Leu Asp Gln Asp Val Ser
995 1000 1005

Asp Lys Leu Ser Leu Arg Phe Pro Gly Leu Tyr Ile Val Gly Gln
1010 1015 1020

Arg Asp Leu Leu Phe Asn Tyr Lys Arg Phe Phe Val Ser Leu Leu
1025 1030 1035

His Gly Val Leu Thr Ser Met Ile Leu Phe Phe Ile Pro Leu Gly
1040 1045 1050

Ala Tyr Leu Gln Thr Val Gly Gln Asp Gly Glu Ala Pro Ser Asp
1055 1060 1065

Tyr Gln Ser Phe Ala Val Thr Ile Ala Ser Ala Leu Val Ile Thr
1070 1075 1080

Val Asn Phe Gln Ile Gly Leu Asp Thr Ser Tyr Trp Thr Phe Val
1085 1090 1095

Asn Ala Phe Ser Ile Phe Gly Ser Ile Ala Leu Tyr Phe Gly Ile

1100	1105	1110
Met Phe Asp Phe His Ser Ala Gly Ile His Val Leu Phe Pro Ser		
1115	1120	1125
Ala Phe Gln Phe Thr Gly Thr Ala Ser Asn Ala Leu Arg Gln Pro		
1130	1135	1140
Tyr Ile Trp Leu Thr Ile Ile Leu Ala Val Ala Val Cys Leu Leu		
1145	1150	1155
Pro Val Val Ala Ile Arg Phe Leu Ser Met Thr Ile Trp Pro Ser		
1160	1165	1170
Glu Ser Asp Lys Ile Gln Lys His Arg Lys Arg Leu Lys Ala Glu		
1175	1180	1185
Glu Gln Trp Gln Arg Arg Gln Gln Val Phe Arg Arg Gly Val Ser		
1190	1195	1200
Thr Arg Arg Ser Ala Tyr Ala Phe Ser His Gln Arg Gly Tyr Ala		
1205	1210	1215
Asp Leu Ile Ser Ser Gly Arg Ser Ile Arg Lys Lys Arg Ser Pro		
1220	1225	1230
Leu Asp Ala Ile Val Ala Asp Gly Thr Ala Glu Tyr Arg Arg Thr		
1235	1240	1245
Gly Asp Ser		
1250		
<210> 2		
<211> 3756		
<212> DNA		
<213> 智人		
<400> 2		
atgagtacag aaagagactc agaaacgaca tttgacgagg attctcagcc taatgacgaa		

gtggttccct acagtgatga tgaacagaa gatgaacttg atgaccaggg gtctgctgtt	120
gaaccagaac aaaaccgagt caacaggga gacagaggaga accgggagcc attcagaaaa	180
gaatgtacat ggcaagtcaa agcaaacgat cgcaagtacc acgaacaacc tcactttatg	240
aacacaaaat tcttgtgtat taaggagagt aaatatgcga ataatgcaat taaaacatac	300
aagtaaacg catttacctt tataccaatg aatctgtttg agcagtttaa gagagcagcc	360
aatttatatt tcctggctct tcttatctta caggcagttc ctcaaatctc taccctggct	420
tggtaacca cactagtgcc cctgcttgtg gtgctgggcg tcaatgcaat caaagacctg	480
gtggacgatg tggctcgcca taaaatggat aaggaaatca acaataggac gtgtgaagtc	540
attaaggatg gcaggttcaa agttgctaag tggaaagaaa ttcaagttgg agacgtcatt	600
cgctgaaaa aaaatgattt tgttcagct gacattctcc tgctgtctag ctctgagcct	660
aacagcctct gctaigtgga aacagcagaa ctggatggag aaaccaattt aaaatttaag	720
atgtcacttg aaatcacaga ccagtacctc caaagagaag atacattggc tacatttgat	780
ggttttattg aatgtgaaga acccaataac agactagata agtttacagg aacactattt	840
tggagaaaca caagttttcc tttggatgct gataaaattt tgttacgtgg ctgtgttaatt	900
aggaacaccg atttctgcca cggttagtc atttttgcag gtgctgacac taaaataatg	960
aagaatagtg ggaaaaccag atttaaaaga actaaaattg attacttgat gaactacatg	1020
gtttacacga tctttgttgt tcttattctg ctttctgctg gtcttgccat cggccatgct	1080
tattgggaag cacaggtggg caattcctct tggtaacctc atgatggaga agacgataca	1140
ccctcctacc gtggattcct cattttctgg ggctataatc ttgttctcaa caccatggtg	1200
cccatctctc tctatgtcag cgtggaagtg attcgtcttg gacagagtca ctteatcaac	1260
tgggacctgc aaatgtacta tgcgtagaag gacacacccg caaaagctag aaccaccaca	1320
ctcaatgaac agctcgggca gatccattat atcttctctg ataagacggg gacactcaca	1380
caaaaatatc tgacctttaa aaagtgtgt atcaacgggc agatatatgg ggaccatcgg	1440
gatgcctctc aacacaacca caacaaaata gagcaagttg attttagctg gaatacatat	1500
gctgatggga agcttgcat tttatgaccac tatcttattg agcaaatcca gtcagggaaa	1560

gagccagaag tacgacagtt cttcttcttg ctgcagttt gccacacagt catggtggat	1620
aggactgatg gtcagctcaa ctaccaggca gccctctccc atgaagggtgc cctggtaaac	1680
gctgccagga actttggctt tgccttcctc gccaggaccc agaacaccat caccatcagt	1740
gaactgggca ctgaaaggac ttacaatgtt cttgccattt tggacttcaa cagtgaccgg	1800
aagcgaatgt ctatcattgt aagaacccca gaaggcaata tcaagcttta ctgtaaaggt	1860
gctgacactg ttatttatga acggttacct cgaatgaatc ctactaagca agaaacacag	1920
gatgccctgg atatctttgc aaatgaaact cttagaaccc tatgcccttg ctacaaggaa	1980
attgaagaaa aagaatttac agaatggaat aaaaagtta tggctgccag tgtggcctcc	2040
accaaccggg acgaagctct ggataaagta tatgaggaga ttgaaaaaga cttaatctc	2100
ctgggagcta cagctattga agacaagcta caggatggag ttccagaaac catttcaaaa	2160
cttgcaaaag ctgacattaa gatctgggtg cttactggag acaaaaagga aactgctgaa	2220
aatataggat ttgcttgtga acttctgact gaagacacca ccatctgcta tggggaggat	2280
attaattctc ttcttcatgc aaggatggaa aaccagagga atagagggtg cgtctacgca	2340
aagtttgca ctcctgtgca ggaatctttt ttccacccg gtggaaaccg tgccttaatc	2400
atcactggtt cttggttgaa tgaaattctt ctcgagaaaa agaccaagag aaataagatt	2460
ctgaagctga agttcccaag aacagaagaa gaaagacgga tgcggacca aagtaaaagg	2520
aggctagaag ctaagaaaga gcagcggcag aaaaactttg tggacctggc ctgcgagtgc	2580
agcgcagtca tctgtgccg cgtcaccccc aagcagaagg ccatggtggt ggacctggtg	2640
aagaggtaca agaaagccat cacgctggcc atcggagatg gggccaatga cgtgaacatg	2700
atcaaaactg cccacattgg cgttggataa agtggacaag aaggaatgca agctgtcatg	2760
tcgagtgact attcctttgc tcagttccga tatctgcaga ggctactgct ggtgcatggc	2820
cgatggctct acataaggat gtgcaagttc ctacgatact tcttttaca aaactttgcc	2880
tttactttgg ttcaattctg gtactccttc ttcaatggct actctgcgca gactgcatac	2940
gaggattggt tcatcaccct ctacaacgtg ctgtacacca gcctgcccgt gctcctcatg	3000
gggctgctcg accaggatgt gagtgacaaa ctgagcctcc gattccctgg gttatacata	3060

gtgggacaaa gagacttact attcaactat aagagattct ttgtaagctt gttgcatggg 3120

gtcctaacat cgatgatcct cttcttcata cctcttggag cttatctgca aaccgtaggg 3180

caggatggag aggcaccctc cgactaccag tcttttggcg tcaccattgc cttgctcttt 3240

gtaataacag tcaatttcca gattggcttg gatacttctt attggacttt tgtgaatgct 3300

ttttcaattt ttggaagcat tgcactttat ttggcatca tgtttgactt tcatagtgt 3360

ggaatacatg ttctctttcc atctgcattt caatttacag gcacagcttc aaacgtctg 3420

agacagccat acatttgggt aactatcacc ctggctgttg ctgtgtgctt actacccgtc 3480

gttgccattc gattcctgtc aatgaccatc tggccatcag aaagtataa gatccagaag 3540

catcgcaagc gggtgaaggc ggaggagcag tggcagcgac ggcagcaggt gttccgccgg 3600

ggcgtgtcaa cgcggcgctc ggcctacgcc ttctcgacc agcggggcta cgcggacctc 3660

atctcctccg ggcgagcat ccgcaagaag cgctcgccgc ttgatgccat cgtggcggat 3720

ggcaccgcgg agtacaggcg caccggggac agctga 3756

<210> 3

<211> 1321

<212> PRT

<213> 智人

<400> 3

Met Ser Asp Ser Val Ile Leu Arg Ser Ile Lys Lys Phe Gly Glu Glu
1 5 10 15

Asn Asp Gly Phe Glu Ser Asp Lys Ser Tyr Asn Asn Asp Lys Lys Ser
20 25 30

Arg Leu Gln Asp Glu Lys Lys Gly Asp Gly Val Arg Val Gly Phe Phe
35 40 45

Gln Leu Phe Arg Phe Ser Ser Ser Thr Asp Ile Trp Leu Met Phe Val
50 55 60

Gly Ser Leu Cys Ala Phe Leu His Gly Ile Ala Gln Pro Gly Val Leu

65					70						75					80
Leu	Ile	Phe	Gly	Thr	Met	Thr	Asp	Val	Phe	Ile	Asp	Tyr	Asp	Val	Glu	
				85					90					95		
Leu	Gln	Glu	Leu	Gln	Ile	Pro	Gly	Lys	Ala	Cys	Val	Asn	Asn	Thr	Ile	
			100					105					110			
Val	Trp	Thr	Asn	Ser	Ser	Leu	Asn	Gln	Asn	Met	Thr	Asn	Gly	Thr	Arg	
		115					120					125				
Cys	Gly	Leu	Leu	Asn	Ile	Glu	Ser	Glu	Met	Ile	Lys	Phe	Ala	Ser	Tyr	
	130				135						140					
Tyr	Ala	Gly	Ile	Ala	Val	Ala	Val	Leu	Ile	Thr	Gly	Tyr	Ile	Gln	Ile	
145				150					155						160	
Cys	Phe	Trp	Val	Ile	Ala	Ala	Ala	Arg	Gln	Ile	Gln	Lys	Met	Arg	Lys	
			165					170						175		
Phe	Tyr	Phe	Arg	Arg	Ile	Met	Arg	Met	Glu	Ile	Gly	Trp	Phe	Asp	Cys	
		180						185					190			
Asn	Ser	Val	Gly	Glu	Leu	Asn	Thr	Arg	Phe	Ser	Asp	Asp	Ile	Asn	Lys	
		195					200					205				
Ile	Asn	Asp	Ala	Ile	Ala	Asp	Gln	Met	Ala	Leu	Phe	Ile	Gln	Arg	Met	
	210				215						220					
Thr	Ser	Thr	Ile	Cys	Gly	Phe	Leu	Leu	Gly	Phe	Phe	Arg	Gly	Trp	Lys	
225				230						235					240	
Leu	Thr	Leu	Val	Ile	Ile	Ser	Val	Ser	Pro	Leu	Ile	Gly	Ile	Gly	Ala	
			245					250					255			
Ala	Thr	Ile	Gly	Leu	Ser	Val	Ser	Lys	Phe	Thr	Asp	Tyr	Glu	Leu	Lys	
		260						265					270			

Ala Tyr Ala Lys Ala Gly Val Val Ala Asp Glu Val Ile Ser Ser Met
275 280 285

Arg Thr Val Ala Ala Phe Gly Gly Glu Lys Arg Glu Val Glu Arg Tyr
290 295 300

Glu Lys Asn Leu Val Phe Ala Gln Arg Trp Gly Ile Arg Lys Gly Ile
305 310 315 320

Val Met Gly Phe Phe Thr Gly Phe Val Trp Cys Leu Ile Phe Leu Cys
325 330 335

Tyr Ala Leu Ala Phe Trp Tyr Gly Ser Thr Leu Val Leu Asp Glu Gly
340 345 350

Glu Tyr Thr Pro Gly Thr Leu Val Gln Ile Phe Leu Ser Val Ile Val
355 360 365

Gly Ala Leu Asn Leu Gly Asn Ala Ser Pro Cys Leu Glu Ala Phe Ala
370 375 380

Thr Gly Arg Ala Ala Ala Thr Ser Ile Phe Glu Thr Ile Asp Arg Lys
385 390 395 400

Pro Ile Ile Asp Cys Met Ser Glu Asp Gly Tyr Lys Leu Asp Arg Ile
405 410 415

Lys Gly Glu Ile Glu Phe His Asn Val Thr Phe His Tyr Pro Ser Arg
420 425 430

Pro Glu Val Lys Ile Leu Asn Asp Leu Asn Met Val Ile Lys Pro Gly
435 440 445

Glu Met Thr Ala Leu Val Gly Pro Ser Gly Ala Gly Lys Ser Thr Ala
450 455 460

Leu Gln Leu Ile Gln Arg Phe Tyr Asp Pro Cys Glu Gly Met Val Thr

465 470 475 480

Val Asp Gly His Asp Ile Arg Ser Leu Asn Ile Gln Trp Leu Arg Asp
485 490 495

Gln Ile Gly Ile Val Glu Gln Glu Pro Val Leu Phe Ser Thr Thr Ile
500 505 510

Ala Glu Asn Ile Arg Tyr Gly Arg Glu Asp Ala Thr Met Glu Asp Ile
515 520 525

Val Gln Ala Ala Lys Glu Ala Asn Ala Tyr Asn Phe Ile Met Asp Leu
530 535 540

Pro Gln Gln Phe Asp Thr Leu Val Gly Glu Gly Gly Gly Gln Met Ser
545 550 555 560

Gly Gly Gln Lys Gln Arg Val Ala Ile Ala Arg Ala Leu Ile Arg Asn
565 570 575

Pro Lys Ile Leu Leu Leu Asp Met Ala Thr Ser Ala Leu Asp Asn Glu
580 585 590

Ser Glu Ala Met Val Gln Glu Val Leu Ser Lys Ile Gln His Gly His
595 600 605

Thr Ile Ile Ser Val Ala His Arg Leu Ser Thr Val Arg Ala Ala Asp
610 615 620

Thr Ile Ile Gly Phe Glu His Gly Thr Ala Val Glu Arg Gly Thr His
625 630 635 640

Glu Glu Leu Leu Glu Arg Lys Gly Val Tyr Phe Thr Leu Val Thr Leu
645 650 655

Gln Ser Gln Gly Asn Gln Ala Leu Asn Glu Glu Asp Ile Lys Asp Ala
660 665 670

Thr	Glu	Asp	Asp	Met	Leu	Ala	Arg	Thr	Phe	Ser	Arg	Gly	Ser	Tyr	Gln	
		675					680					685				
Asp	Ser	Leu	Arg	Ala	Ser	Ile	Arg	Gln	Arg	Ser	Lys	Ser	Gln	Leu	Ser	
		690				695					700					
Tyr	Leu	Val	His	Glu	Pro	Pro	Leu	Ala	Val	Val	Asp	His	Lys	Ser	Thr	
705					710					715					720	
Tyr	Glu	Glu	Asp	Arg	Lys	Asp	Lys	Asp	Ile	Pro	Val	Gln	Glu	Glu	Val	
				725					730					735		
Glu	Pro	Ala	Pro	Val	Arg	Arg	Ile	Leu	Lys	Phe	Ser	Ala	Pro	Glu	Trp	
			740					745						750		
Pro	Tyr	Met	Leu	Val	Gly	Ser	Val	Gly	Ala	Ala	Val	Asn	Gly	Thr	Val	
		755					760						765			
Thr	Pro	Leu	Tyr	Ala	Phe	Leu	Phe	Ser	Gln	Ile	Leu	Gly	Thr	Phe	Ser	
		770					775						780			
Ile	Pro	Asp	Lys	Glu	Glu	Gln	Arg	Ser	Gln	Ile	Asn	Gly	Val	Cys	Leu	
785					790					795					800	
Leu	Phe	Val	Ala	Met	Gly	Cys	Val	Ser	Leu	Phe	Thr	Gln	Phe	Leu	Gln	
				805						810					815	
Gly	Tyr	Ala	Phe	Ala	Lys	Ser	Gly	Glu	Leu	Leu	Thr	Lys	Arg	Leu	Arg	
				820					825					830		
Lys	Phe	Gly	Phe	Arg	Ala	Met	Leu	Gly	Gln	Asp	Ile	Ala	Trp	Phe	Asp	
		835						840					845			
Asp	Leu	Arg	Asn	Ser	Pro	Gly	Ala	Leu	Thr	Thr	Arg	Leu	Ala	Thr	Asp	
		850					855						860			
Ala	Ser	Gln	Val	Gln	Gly	Ala	Ala	Gly	Ser	Gln	Ile	Gly	Met	Ile	Val	

865 870 875 880

Asn Ser Phe Thr Asn Val Thr Val Ala Met Ile Ile Ala Phe Ser Phe
885 890 895

Ser Trp Lys Leu Ser Leu Val Ile Leu Cys Phe Phe Pro Phe Leu Ala
900 905 910

Leu Ser Gly Ala Thr Gln Thr Arg Met Leu Thr Gly Phe Ala Ser Arg
915 920 925

Asp Lys Gln Ala Leu Glu Met Val Gly Gln Ile Thr Asn Glu Ala Leu
930 935 940

Ser Asn Ile Arg Thr Val Ala Gly Ile Gly Lys Glu Arg Arg Phe Ile
945 950 955 960

Glu Ala Leu Glu Thr Glu Leu Glu Lys Pro Phe Lys Thr Ala Ile Gln
965 970 975

Lys Ala Asn Ile Tyr Gly Phe Cys Phe Ala Phe Ala Gln Cys Ile Met
980 985 990

Phe Ile Ala Asn Ser Ala Ser Tyr Arg Tyr Gly Gly Tyr Leu Ile Ser
995 1000 1005

Asn Glu Gly Leu His Phe Ser Tyr Val Phe Arg Val Ile Ser Ala
1010 1015 1020

Val Val Leu Ser Ala Thr Ala Leu Gly Arg Ala Phe Ser Tyr Thr
1025 1030 1035

Pro Ser Tyr Ala Lys Ala Lys Ile Ser Ala Ala Arg Phe Phe Gln
1040 1045 1050

Leu Leu Asp Arg Gln Pro Pro Ile Ser Val Tyr Asn Thr Ala Gly
1055 1060 1065

Glu	Lys	Trp	Asp	Asn	Phe	Gln	Gly	Lys	Ile	Asp	Phe	Val	Asp	Cys
1070						1075					1080			
Lys	Phe	Thr	Tyr	Pro	Ser	Arg	Pro	Asp	Ser	Gln	Val	Leu	Asn	Gly
1085						1090					1095			
Leu	Ser	Val	Ser	Ile	Ser	Pro	Gly	Gln	Thr	Leu	Ala	Phe	Val	Gly
1100						1105					1110			
Ser	Ser	Gly	Cys	Gly	Lys	Ser	Thr	Ser	Ile	Gln	Leu	Leu	Glu	Arg
1115						1120					1125			
Phe	Tyr	Asp	Pro	Asp	Gln	Gly	Lys	Val	Met	Ile	Asp	Gly	His	Asp
1130						1135					1140			
Ser	Lys	Lys	Val	Asn	Val	Gln	Phe	Leu	Arg	Ser	Asn	Ile	Gly	Ile
1145						1150					1155			
Val	Ser	Gln	Glu	Pro	Val	Leu	Phe	Ala	Cys	Ser	Ile	Met	Asp	Asn
1160						1165					1170			
Ile	Lys	Tyr	Gly	Asp	Asn	Thr	Lys	Glu	Ile	Pro	Met	Glu	Arg	Val
1175						1180					1185			
Ile	Ala	Ala	Ala	Lys	Gln	Ala	Gln	Leu	His	Asp	Phe	Val	Met	Ser
1190						1195					1200			
Leu	Pro	Glu	Lys	Tyr	Glu	Thr	Asn	Val	Gly	Ser	Gln	Gly	Ser	Gln
1205						1210					1215			
Leu	Ser	Arg	Gly	Glu	Lys	Gln	Arg	Ile	Ala	Ile	Ala	Arg	Ala	Ile
1220						1225					1230			
Val	Arg	Asp	Pro	Lys	Ile	Leu	Leu	Leu	Asp	Glu	Ala	Thr	Ser	Ala
1235						1240					1245			
Leu	Asp	Thr	Glu	Ser	Glu	Lys	Thr	Val	Gln	Val	Ala	Leu	Asp	Lys

1250	1255	1260
Ala Arg Glu Gly Arg Thr Cys Ile Val Ile Ala His Arg Leu Ser		
1265	1270	1275
Thr Ile Gln Asn Ala Asp Ile Ile Ala Val Met Ala Gln Gly Val		
1280	1285	1290
Val Ile Glu Lys Gly Thr His Glu Glu Leu Met Ala Gln Lys Gly		
1295	1300	1305
Ala Tyr Tyr Lys Leu Val Thr Thr Gly Ser Pro Ile Ser		
1310	1315	1320
<210> 4		
<211> 3966		
<212> DNA		
<213> 智人		
<400> 4		
atgtctgact cagtaattct tcgaagtata aagaaatttg gagaggagaa tgatggtttt	60	
gagtcagata aatcatataa taatgataag aaatcaaggt tacaagatga gaagaaaggt	120	
gatggcgtaa gagttggctt ctttcaattg tttcggtttt cttcacaaac tgacatttgg	180	
ctgatgtttg tgggaagttt gtgtgcattt ctccatggaa tagcccagcc aggcgtgcta	240	
ctcatttttg gcacaatgac agatgttttt attgactacg acgttgagtt acaagaactc	300	
cagattccag gaaaagcatg tgtgaataac accattgtat ggactaacag ttcctcaac	360	
cagaacatga caaatggaac acgttgtggg ttgctgaaca tcgagagcga aatgatcaaa	420	
tttgccagtt actatgctgg aattgctgtc gcagtaccta tcacaggata tattcaaata	480	
tgcttttggg tcattgccgc agctcgtcag atacagaaaa tgagaaaatt ttactttagg	540	
agaataatga gaatggaaat aggggtggtt gactgcaatt cagtggggga gctgaataca	600	
agattctctg atgatattaa taaaatcaat gatgccatag ctgaccaaat ggcccttttc	660	
attcagcgca tgacctcgac catctgtggg ttccgtgttg gatttttcag gggttggaaa	720	
ctgaccttgg ttattatttc tgtcagccct ctcatggga ttggagcagc caccattggg	780	

ctgagtgtgt ccaagtttac ggactatgag ctgaaggcct atgccaaagc aggggtggtg	840
gctgatgaag tcatttcac c aatgagaaca gtggctgctt ttgggtggtga gaaaagagag	900
gttgaaaggt atgagaaaaa tcttgtgttc gccagcggtt ggggaattag aaaaggaata	960
gtgatgggat tctttactgg attcgtgtgg tgtctcatct ttttgtgtta tgcactggcc	1020
ttctgggtacg gctccacact tgtcctggat gaaggagaat atacaccagg aaccttgtc	1080
cagattttcc tcagtgtcat agtaggagct ttaaattctt gcaatgcctc tccttgtttg	1140
gaagcctttg caactggacg tgcagcagcc accagcattt ttgagacaat agacaggaaa	1200
cccatcattg actgcatgtc agaagatggt tacaagttag atcgaatcaa gggtgaaatt	1260
gaattccata atgtgacctt ccattatcct tccagaccag aggtgaagat tctaaatgac	1320
ctcaacatgg tcattaaacc aggggaaatg acagctctgg taggaccagc tggagctgga	1380
aaaagtacag cactgcaact cattcagcga ttctatgacc cctgtgaagg aatggtgacc	1440
gtggatggcc atgacattcg ctctcttaac attcagtggc ttagagatca gattgggata	1500
gtggagcaag agccagttct gtctcttacc accattgcag aaaatattcg ctatggcaga	1560
gaagatgcaa caatggaaga catagtccaa gctgccaagg aggccaatgc ctacaacttc	1620
atcatggacc tgccacagca atttgacacc ctgtttggag aaggaggagg ccagatgagt	1680
ggtggccaga aacaaagggt agctatcgcc agagccctca tccgaaatcc caagattctg	1740
cttttgaca tggccacctc agctctggac aatgagagtg aagccatggt gcaagaagtg	1800
ctgagtaaga ttcagcatgg gcacacaatc atttcagttg ctcatcgctt gtctacggtc	1860
agagctgcag ataccatcat tggttttgaa catggcactg cagtggaaag agggacccat	1920
gaagaattac tggaaaggaa aggtgtttac ttcactctag tgactttgca aagccaggga	1980
aatcaagctc ttaatgaaga ggacataaag gatgcaactg aagatgacat gcttgcgagg	2040
acctttagca gagggagcta ccaggatagt ttaagggctt ccatccggca acgtccaag	2100
tctcagcttt cttacctggt gcacgaacct ccattagctg ttgtagatca taagtctacc	2160
tatgaagaag atagaaagga caaggacatt cctgtgcagg aagaagtga acctgcccc	2220
gttaggagga ttctgaaatt cagtgtccca gaatggccct acatgctggt agggctctgtg	2280


gggtgcagctg tgaacggggac agtcacaccc ttgtatgcct ttttattcag ccagattctt	2340
gggacttttt caattccctga taaagaggaa caaagggtcac agatcaatgg tgtgtgccta	2400
ctttttgtag caatgggctg tgtatctctt ttcacccaat ttctacaggg atatgccttt	2460
gctaaatctg gggagctcct aacaaaaagg ctacgtaaat ttggtttcag ggcaatgctg	2520
gggcaagata ttgcctgggt tgatgacctc agaaatagcc ctggagcatt gacaacaaga	2580
cttgtctacag atgcttccca agttcaaggg gctgccggct ctcatatcgg gatgatagtc	2640
aattccttca ctaacgtcac tgtggccatg atcattgcct tctcctttag ctggaagctg	2700
agcctggtea tcttgtgctt cttcccttc ttggctttat caggagccac acagaccagg	2760
atgttgacag gatttgcctc tcgagataag caggccctgg agatgggtggg acagattaca	2820
aatgaagccc tcagtaacat ccgcactgtt gctggaattg gaaaggagag gcggttcatt	2880
gaagcacttg agactgagct ggagaagccc ttcaagacag ccattcagaa agccaatatt	2940
tacggattct gctttgcctt tgcccagtgc atcatgttta ttgcgaattc tgcttctac	3000
agatatggag gttacttaat ctccaatgag gggctccatt tcagctatgt gttcagggtg	3060
atctctgcag ttgtactgag tgcaacagct ctggaagag ccttctctta caccccaagt	3120
tatgcaaaag ctaaaatata agctgcacgc ttttttcaac tgctggaccg acaaccccca	3180
atcagtgtat acaatactgc aggtgaaaaa tgggacaact tccaggggaa gattgatttt	3240
gttgattgta aatttacata tcttctcga cctgactcgc aagtctgaa tggctctca	3300
gtgtcgatta gtccagggca gacactggcg tttgttggga gcagtggatg tggcaaaagc	3360
actagcattc agctgttga acgtttctat gatcctgac aagggaaggt gatgatagat	3420
ggtcattgaca gcaaaaaagt aaatgtccag ttccctccgt caaacattgg aattgtttcc	3480
caggaaccag tgttgtttgc ctgtagcata atggacaata tcaagtatgg agacaacacc	3540
aaagaaattc ccatggaaag agtcatagca gctgcaaac aggtcagct gcatgatttt	3600
gtcatgtcac tcccagagaa atatgaaact aacgttgggt cccaggggtc tcaactctct	3660
agaggggaga aacaacgcat tgctattgct cgggccattg tacagatcc taaaatcttg	3720
ctactagatg aagccacttc tgcttagac acagaaagtg aaaagacggt gcaggttgc	3780

ctagacaaag ccagagaggg tcggacctgc attgtcattg cccatcgctt gtccaccatc	3840
cagaacgcgg atatcattgc tgtcatggca cagggggtgg tgattgaaaa ggggacccat	3900
gaagaactga tggcccaaaa aggagcctac tacaaactag tcaccactgg atcccccatc	3960
agttga	3966

【發明申請專利範圍】

【請求項1】

一種式(I)化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，



其中

- R¹及R²各自獨立地為C₁₋₄烷基；
 - R³獨立地選自由以下組成之群：氫、鹵素、羥基、C₁₋₄烷基、C₁₋₄鹵烷基、C₁₋₄烷氧基、C₁₋₄鹵烷氧基、氰基、硝基、胺基、N-(C₁₋₄烷基)胺基、N,N-二(C₁₋₄烷基)胺基及N-(芳基-C₁₋₄烷基)胺基；
 - n為整數1、2或3；
 - R⁴係選自由以下組成之群：氫、鹵素、羥基、氰基、C₁₋₄烷基、C₃₋₆環烷基、C₁₋₄烷氧基、C₃₋₆環烷氧基、C₁₋₄烷硫基、C₃₋₆環烷硫基、胺基、N-(C₁₋₄烷基)胺基及N,N-二(C₁₋₄烷基)胺基，
- 其限制條件為該化合物並非來自由以下組成之群的化合物：

- 2-((3,3-二丙基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；
- 2-((3,3-二丁基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；
- 2-((3,3-二丁基-5-(4-氯苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-(甲硫基)-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-甲氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-異丙氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-甲氧基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((7-溴-3,3-二丁基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；及

2-((7-溴-3-丁基-3-乙基-5-苯基-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸。

【請求項2】

如請求項1之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，其中R¹為正丁基。

【請求項3】

如請求項1或2之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，其中R²為正丁基。

【請求項4】

如請求項1或2之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，其中R²為乙基。

【請求項5】

如請求項1或2之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，其中R³獨立地選自由以下組成之群：氫、鹵素、羥基、氰基、C₁₋₄鹵烷基、C₁₋₄烷氧基及C₁₋₄鹵烷氧基。

【請求項6】

如請求項1或2之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，其中R³獨立地選自由以下組成之群：氫、氟、氯、溴、羥基、氰基、三氟甲基、甲氧基及三氟甲氧基。

【請求項7】

如請求項1或2之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，其中R⁴係選自由以下組成之群：鹵素、羥基、氰基、C₁₋₄烷基、C₁₋₄烷氧基、C₁₋₄烷硫基、胺基、*N*-(C₁₋₄烷基)胺基及*N,N*-二(C₁₋₄烷基)胺基。

【請求項8】

如請求項1或2之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，其中R⁴係選自由以下組成之群：氟、氯、溴、羥基、氰基、甲基、甲氧基、乙氧基、甲硫基、乙硫基、胺基、甲胺基及二甲胺基。

【請求項9】

如請求項1之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，其中該化合物係選自由以下組成之群：

2-((3,3-二丁基-7-(二甲胺基)-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；

2-((5-(4-溴苯基)-3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-5-(4-氰苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-5-(4-(三氟甲基)苯基)-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

(S)-2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

(R)-2-((3-丁基-7-(二甲胺基)-3-乙基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-氰基-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-7-氟-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3,3-二丁基-7-氯-1,1-二氧離子基-5-苯基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮呼-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-

四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；

(S)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；

(R)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-氟苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-甲氧苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；

2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；

(S)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸；及

(R)-2-((3-丁基-3-乙基-5-(4-羥苯基)-7-(甲硫基)-1,1-二氧離子基-2,3,4,5-四氫-1,5-苯并噻氮吡-8-基)氧基)乙酸。

【請求項10】

一種醫藥組合物，其包含治療有效量之如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽，及一或多種醫藥學上可接受之賦形劑。

【請求項11】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備以下之藥物：用於治療或預防心血管疾病或脂肪酸代謝病症或葡萄糖利用病症；及用於增加高密度脂蛋白含量。

【請求項12】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備用於治療或預防以下之藥物：高膽固醇血症；脂肪酸代謝病症；1型及2型糖尿病；糖尿病之併發症；或高三酸甘油酯血症。

【請求項13】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備用於治療或預防以下之藥物：白內障、微血管疾病及大血管疾病、視網膜病變、神經病變、腎病變及傷口癒合延遲、組織缺血、糖尿病足、動脈硬化、心肌梗塞、急性冠狀動脈症候群、不穩定型心絞痛、穩定型心絞痛、中風、周邊動脈阻塞疾病、心病、心臟衰竭、心律不整及血管再狹窄；或糖尿病相關疾病。

【請求項14】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備用於治療或預防以下之藥物：胰島素抗性(葡萄糖恆定受損)、高血糖症、高胰島素血症、脂肪酸或甘油之血液含量升高、肥胖症、血脂異常、高脂質血症、代謝症候群(症候群X)、動脈粥樣硬化或高血壓。

【請求項15】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備治療或預防以下之藥物：胃腸道疾病或病症；克羅恩氏病(Crohn's disease)；原發性膽酸吸收障礙；大腸急躁症(IRS)；發炎性腸病(IRD)；迴腸發炎；或逆流性疾病及其併發症。

【請求項16】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備治療或預防以下之藥物：便秘、巴雷特氏食道(Barrett's esophagus)、膽汁逆流性食道炎或膽汁逆流性胃炎。

【請求項17】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備治療或預防以下之藥物：慢性便秘、功能性便秘、慢性特發性便秘(CIC)、間歇性/偶發性便秘、因糖尿病繼發之便秘、因中風繼發之便秘、因慢性腎病繼發之便秘、因多發性硬化症繼發之便秘、因帕金森氏病(Parkinson's disease)繼發之便秘、因全身性硬化症繼發之便秘、藥物誘發之便秘、伴有便秘之大腸急躁症(IRS-C)、混合型大腸急躁症(IRS-M)、小兒功能性便秘或類鴉片誘發之便秘。

【請求項18】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備用於治療或預防肝臟疾病或病症之藥物。

【請求項19】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備以下之藥物：用於治療或預防遺傳性肝臟代謝病症；膽酸合成之先天性錯誤；先天性膽管異常；膽道閉鎖；葛西術後膽道閉鎖(post-Kasai biliary atresia)；肝移植術後膽道閉鎖；新生兒肝炎；新生兒膽汁鬱積；遺傳性膽汁鬱積；腦腱性黃瘤病；次級BA合成缺陷；齊薇格氏症候群(Zellweger's syndrome)；囊腫性纖維化相關肝病； $\alpha 1$ -抗胰蛋白酶缺乏症；阿拉傑里症候群(Alagilles

syndrome, ALGS); 拜勒症候群(Byler syndrome); 初級膽酸(BA)合成缺陷; 進行性家族性肝內膽汁鬱積(PFIC); 良性復發性肝內膽汁鬱積(BRIC); 自體免疫肝炎; 原發性膽汁性肝硬化(PBC); 肝纖維化; 非酒精性脂肪肝病(NAFLD); 非酒精性脂肪變性肝炎(NASH); 門靜脈高血壓; 膽汁鬱積; 唐氏症候群膽汁鬱積(Down syndrome cholestasis); 藥物誘發性膽汁鬱積; 妊娠肝內膽汁鬱積(妊娠期黃疸); 肝內膽汁鬱積; 肝外膽汁鬱積; 非經腸式營養相關膽汁鬱積(PNAC); 低磷脂相關膽汁鬱積; 淋巴水腫膽汁鬱積症候群1 (LSC1); 原發性硬化性膽管炎(PSC); 免疫球蛋白G4相關膽管炎; 原發性膽汁性膽管炎; 膽石症(膽結石); 膽道結石; 輸膽管結石; 膽石性胰臟炎; 卡羅利病(Caroli disease); 膽管惡性腫瘤; 惡性腫瘤導致膽道梗阻; 膽道狹窄; AIDS膽管病; 缺血性膽管病; 膽汁鬱積或黃疸引起之搔癢病; 胰臟炎; 慢性自體免疫肝病導致進行性膽汁鬱積; 肝臟脂肪變性; 酒精性肝炎; 急性脂肪肝; 妊娠脂肪肝; 藥物誘發性肝炎; 鐵過載症; 先天性膽酸合成缺陷1型(BAS 1型); 藥物誘發性肝損傷(DILI); 肝纖維化; 先天性肝纖維化; 肝硬化; 蘭格漢氏細胞組織細胞增生症(Langerhans cell histiocytosis, LCH); 新生兒魚鱗癬硬化性膽管炎(NISCH); 紅血球生成性原卟啉症(EPP); 特發性成人期膽管缺失症(IAD); 特發性新生兒肝炎(INH); 非症候型小葉間膽管缺乏(NS PILBD); 北美印第安兒童期肝硬化(NAIC); 肝結節病; 澱粉樣變性; 壞死性小腸結腸炎; 血清膽酸引起之毒性; 多囊性肝病; 病毒性肝炎; 肝細胞癌(肝癌); 膽管癌; 膽酸相關之胃腸道癌症; 由肝臟、膽道及胰臟腫瘤及贅瘤引起之膽汁鬱積; 或用於增強肝臟疾病之皮質類固醇療法。

【請求項20】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫

藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備用於治療或預防以下之藥物：PFIC-1、PFIC-2、PFIC-3及非特異性PFIC、膽汁分流術後PFIC、肝移植術後PFIC、BRIC1、BRIC2及非特異性BRIC、膽汁分流術後BRIC、肝移植術後BRIC、A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎、D型肝炎或E型肝炎、血清膽酸分佈型態異常之心律不整、與肝硬化相關之心肌病或與膽汁鬱積性肝病相關之骨骼肌萎縮。

【請求項21】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備用於治療或預防以下之藥物：膽心病或血清膽酸分佈型態異常之心房微顫。

【請求項22】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備以下之藥物：用於治療或預防超吸收症候群；維生素過多症及骨質石化病；高血壓；腎小球高濾過；多囊性腎病(PKD)；腎衰竭之搔癢病；或用於對肝臟疾病或代謝疾病相關腎損傷的保護措施中。

【請求項23】

一種如請求項1至9中任一項之化合物或其光學異構體、水合物或醫藥學上可接受之鹽之用途，其係用於製備以下之藥物：無 β 脂蛋白血症、家族性低 β 脂蛋白血症(FHBL)、乳糜微粒滯留病(CRD)、植固醇血症、體染色體顯性多囊性腎病(ADPKD)或體染色體隱性多囊性腎病(ARPKD)。