(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105726915 A
(43)申请公布日 2016.07.06

(21)申请号 201610268963.9

(22)申请日 2016.04.27

(71)申请人 郑耀玲
地址 530318 广西壮族自治区南宁市横县峦城镇下滕村委下滕村9队112-2号

(72)发明人 郑耀玲

(74)专利代理机构 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340
代理人 但玉梅

(51)Int.Cl.
A61K 36/8966(2006.01)
A61P 15/14(2006.01)

权利要求书1页 说明书5页

(54)发明名称

一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，属于医药技术领域。该中药组合物包括如下重量份的原料：金果榄3-9份、仙人掌10-20份、紫苏梗5-10份、络石藤6-15份、三角风5-10份、连翘6-15份、大过路黄15-20份、太白贝母3-9份、花生衣8-16份、猫爪草9-15份。该中药组合物具有疏肝理气、活血通络、散瘀消肿、清热解毒等功效，用于治疗肝郁气滞型乳腺炎疗效显著，且药性温和，无任何毒副作用，安全性高。

CN 105726915 A

1.一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，其特征在于所述中药组合物包括如下重量份的原料：金果榄3-9份、仙人掌10-20份、紫苏梗5-10份、络石藤6-15份、三角风5-10份、连翘6-15份、大过路黄15-20份、太白贝母3-9份、花生衣8-16份、猫爪草9-15份。

2.如权利要求1所述的治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，其特征在于所述中药组合物包括如下重量份的原料：金果榄5-7份、仙人掌13-17份、紫苏梗7-9份、络石藤8-12份、三角风7-9份、连翘8-13份、大过路黄16-18份、太白贝母5-7份、花生衣10-14份、猫爪草11-13份。

3.如权利要求2所述的治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，其特征在于所述中药组合物包括如下重量份的原料：金果榄6份、仙人掌15份、紫苏梗8份、络石藤10份、三角风8份、连翘10份、大过路黄17份、太白贝母6份、花生衣12份、猫爪草12份。

4.如权利要求1-3任一所述的治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物的制备方法，其特征在于所述制备方法为：按照上述重量份捡取所述原料，洗净晾干后，将仙人掌、络石藤、三角风、大过路黄、猫爪草断碎至长度小于2cm，紫苏梗切成厚度小于0.5的薄片，再将以上处理后的原料与金果榄、连翘、太白贝母、花生衣混合，放入砂锅中，加入原料总重量6-8倍的的水浸泡40-60min，武火煮沸后转文火煎煮20-30min，而后过滤，滤液保留，滤渣则采用相同方法继续煎煮2次，最后合并3次煎煮所得滤液，即得所述中药组合物。

5.权利要求1-3任一所述中药组合物在制备治疗肝郁气滞型乳腺炎的药物中的应用。

6.一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药制剂，其特征在于：所述中药制剂是由有效药量的权利要求1-3中任一所述中药组合物和药学上可接受的辅料按照常规的中药制剂方法制备而成的口服制剂。

7.根据权利要求6所述的治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药制剂，其特征在于：所述中药制剂为颗粒剂、散剂、胶囊剂、片剂、丸剂或口服液。

一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物

【技术领域】

[0001] 本发明涉及医药技术领域，尤其是一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物。

【技术背景】

[0002] 乳腺炎是指乳腺的急性化脓性感染，是产褥期的常见病，是引起产后发热的原因之一，最常见于哺乳妇女，尤其是初产妇。近年来，随着人们工作模式的改变和生活节奏的加快，乳腺炎发病率呈逐年上升的趋势，其发病率占乳腺疾病的首位。急性单纯乳腺炎初期一般症状为乳房的胀痛，局部皮肤红、肿、热、痛，边界不清的硬结，触痛更加；有时还可能伴有寒战、高热、头痛、无力、脉快等全身虚状，及腋下淋巴结肿大、触痛；严重时还可能会引发局部组织坏死、液化，大小不等的感染灶相互融合形成脓肿。故对乳腺炎应当提高警惕，尽早治疗，否则，如若治疗措施不得力或者延误治疗使病情进一步加重，将可能导致难以估量的严重后果。

[0003] 目前，治疗乳腺炎的药物以西药居多，如乳癖舒、乳癖消、炎可宁、乳康灵、炎立消等，这些西药虽然在一定程度上可起到较好的治疗效果，但其中多数的疗效只是致力于消除表面疼痛症状，治标不治本，治疗后容易复发；其中还有一些激素类药物，长时间服用会对人体产生较大的毒副作用。西药的治病原理通常在于治疗，而中药与西药不同，中药在于通过调理实现治愈，治疗更为彻底，但目前临床却缺少针对性强、疗效确切的治疗急性乳腺炎的中药。

【发明内容】

[0004] 针对以上提出的问题，本发明提供了一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，该中药组合物用于治疗肝郁气滞型乳腺炎效果显著，治愈后不易复发，无毒副作用，安全可靠。

[0005] 为了实现上述的目的，本发明所采用的技术方案为：

[0006] 一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，其包括如下重量份的原料：金果榄3-9份、仙人掌10-20份、紫苏梗5-10份、络石藤6-15份、三角风5-10份、连翘6-15份、大过路黄15-20份、太白贝母3-9份、花生衣8-16份、猫爪草9-15份。

[0007] 进一步地，所述中药组合物包括如下重量份的原料：金果榄5-7份、仙人掌13-17份、紫苏梗7-9份、络石藤8-12份、三角风7-9份、连翘8-13份、大过路黄16-18份、太白贝母5-7份、花生衣10-14份、猫爪草11-13份。

[0008] 进一步地，所述中药组合物包括如下重量份的原料：金果榄6份、仙人掌15份、紫苏梗8份、络石藤10份、三角风8份、连翘10份、大过路黄17份、太白贝母6份、花生衣12份、猫爪草12份。

[0009] 进一步地，所述中药组合物的制备方法为：按照上述重量份捡取所述原料，洗净晾干后，将仙人掌、络石藤、三角风、大过路黄、猫爪草断碎至长度小于2cm，紫苏梗切成厚度小于0.5的薄片，再将以上处理后的原料与金果榄、连翘、太白贝母、花生衣混合，放入砂锅中，

加入原料总重量6-8倍的的水浸泡40-60min，武火煮沸后转文火煎煮20-30min，而后过滤，滤液保留，滤渣则采用相同方法继续煎煮2次，最后合并3次煎煮所得滤液，即得所述中药组合物。

[0010] 进一步地，所述中药组合物可应用于治疗肝郁气滞型乳腺炎的药物的制备中，可将其与药学上可接受的辅料按照常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂。

[0011] 进一步地，所述中药制剂为颗粒剂、散剂、胶囊剂、片剂、丸剂或口服液。

[0012] 服用方法：每次服用有效药量为1-2g的中药制剂，每日服用3次，早、中、晚饭后半小时温服，10月为一个疗程，服药期间停服其他药物，并忌食生冷、辛辣、刺激的食物。

[0013] 本发明所采用的中药详细情况如下：

[0014] 金果榄：为防己科植物青牛胆或金果榄的干燥块根，晒干。味苦；性寒。归脾经、肾经。具有清热解毒的功效。治急慢性扁桃体炎，急性咽喉炎，口腔炎，腮腺炎，乳腺炎，阑尾炎，痈疽疔疮，急慢性肠炎，菌痢，胃痛，热嗽失音。

[0015] 仙人掌：为仙人掌科植物仙人掌及绿仙人掌的根及茎。味苦；性寒。归心、肺、胃经。具有行气活血、清热解毒、凉血止血、清肺止咳的功效。主胃痛，痞块，痢疾，喉痛，肺热咳嗽，肺痨咯血，吐血，痔血，疮疡疔疖，乳痈，癣疾，蛇虫咬伤，烫伤，冻伤。

[0016] 紫苏梗：为唇形科植物皱紫苏、尖紫苏等的茎，干品。味辛甘，性微温。入脾经、胃经、肺经。具有理气、舒郁、止痛、安胎的功效。治气郁，食滞，胸膈痞闷，脘腹疼痛，胎气不和。《得配本草》：疏肝，利肺，理气，和血，解郁，止痛，定嗽，安胎。

[0017] 络石藤：为夹竹桃科植物络石的干燥带叶藤茎。味苦、辛，性微寒。归心经、肝经、肾经。具有祛风、通络、止血、消瘀的功效。治风湿痹痛，筋脉拘挛，痈肿，喉痹，吐血，跌打损伤，产后恶露不行。《江西草药》：祛风活络，凉血止血。治关节炎，肺结核，吐血，外伤出血，风火牙痛，瘰疬，毒蛇咬伤。

[0018] 三角风：为葡萄科植物大叶爬山虎的根或茎。味苦，性温。具有祛风除湿、通络、止血、解毒的功效。治风湿痹痛，偏头痛，风湿疮毒，骨折。

[0019] 连翘：为木犀科植物连翘的干燥果实。味苦，性微寒。归肺经、心经、小肠经。具有清热、解毒、散结、消肿的功效。治温热，丹毒，斑疹，痈疡肿毒，瘰疬，小便淋闭。

[0020] 大过路黄：为报春花科植物大过路黄的全草。味淡；性平。归肺、胃经。具有散风、清热解毒、化痰的功效。主风热咳嗽，咽喉疼痛，热毒疮疥。

[0021] 太白贝母：为百合科植物太白贝母的鳞茎。味苦甘，性微寒。具有润肺、化痰、止咳的功效。治肺热咳嗽，支气管炎，咳痰不利。

[0022] 花生衣：为豆科植物落花生的干燥种皮。味甘、涩，性平。归脾、肺经。具有止血、散瘀、消肿的功效。用于咳血，吐血，衄血，崩漏，外伤性渗血，血小板减少性紫癜，过敏性紫癜。

[0023] 猫爪草：为毛茛科植物小毛茛的干燥块根。味甘、辛，性温。归肝经、肺经。具有解毒、化痰散结、消肿的功效。用于肺结核，淋巴结结核，淋巴结炎，咽喉炎。

[0024] 本发明提供了一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，与现有技术相比，具有以下有益效果：

[0025] 本发明所提供的治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物根据肝郁气滞型乳腺炎的致病机理进行配药，以金果榄、仙人掌、紫苏梗、络石藤、三角风、连翘、大过路黄、太白贝母、花生衣、猫爪草为主要原料，其中金果榄、仙人掌与清热解毒、行气活血、清肺止咳等功效；

紫苏梗、络石藤、三角风具有疏肝通络、理气舒郁、祛风除湿、散瘀止痛等功效；连翘、大过路黄、太白贝母、花生衣、猫爪草有化痰消肿、活血散瘀等作用。以上诸药配伍，相得益彰，共奏疏肝理气、活血通络、散瘀消肿、清热解毒的功效，可从根本上治疗肝郁气滞型乳腺炎，疗效显著，药性温和，无毒副作用，安全可靠。

【具体实施方式】

[0026] 下面的实施例可以帮助本领域的技术人员更全面的理解本发明，但不可以以任何方式限制本发明。

[0027] 实施例1

[0028] 一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，其包括如下重量份的原料：金果榄3份、仙人掌10份、紫苏梗5份、络石藤6份、三角风5份、连翘6份、大过路黄15份、太白贝母3份、花生衣8份、猫爪草9份。具体制备方法为：按照上述重量份捡取所述原料，洗净晾干后，将仙人掌、络石藤、三角风、大过路黄、猫爪草断碎至长度小于2cm，紫苏梗切成厚度小于0.5的薄片，再将以上处理后的原料与金果榄、连翘、太白贝母、花生衣混合，放入砂锅中，加入原料总重量6倍的的水浸泡50min，武火煮沸后转文火煎煮25min，而后过滤，滤液保留，滤渣则采用相同方法继续煎煮2次，最后合并3次煎煮所得滤液，即得所述中药组合物。

[0029] 另外，该中药组合物可应用于制备治疗肝郁气滞型乳腺炎的药物，即按照该领域常规中药制剂方法，向该中药组合物中加入药学上可接受的辅料，制成胶囊剂、散剂等口服制剂。

[0030] 实施例2

[0031] 一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，其包括如下重量份的原料：金果榄5份、仙人掌13份、紫苏梗7份、络石藤8份、三角风7份、连翘8份、大过路黄16份、太白贝母5份、花生衣10份、猫爪草11份。具体制备方法为：按照上述重量份捡取所述原料，洗净晾干后，将仙人掌、络石藤、三角风、大过路黄、猫爪草断碎至长度小于2cm，紫苏梗切成厚度小于0.5的薄片，再将以上处理后的原料与金果榄、连翘、太白贝母、花生衣混合，放入砂锅中，加入原料总重量7倍的的水浸泡40min，武火煮沸后转文火煎煮20min，而后过滤，滤液保留，滤渣则采用相同方法继续煎煮2次，最后合并3次煎煮所得滤液，即得所述中药组合物。

[0032] 另外，该中药组合物可应用于制备治疗肝郁气滞型乳腺炎的药物，即按照该领域常规制剂方法，向该中药组合物中加入药学上可接受的辅料，制成颗粒剂、片剂等口服制剂。

[0033] 实施例3

[0034] 一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，其包括如下重量份的原料：金果榄6份、仙人掌15份、紫苏梗8份、络石藤10份、三角风8份、连翘10份、大过路黄17份、太白贝母6份、花生衣12份、猫爪草12份。具体制备方法为：按照上述重量份捡取所述原料，洗净晾干后，将仙人掌、络石藤、三角风、大过路黄、猫爪草断碎至长度小于2cm，紫苏梗切成厚度小于0.5的薄片，再将以上处理后的原料与金果榄、连翘、太白贝母、花生衣混合，放入砂锅中，加入原料总重量7倍的的水浸泡45min，武火煮沸后转文火煎煮30min，而后过滤，滤液保留，滤渣则采用相同方法继续煎煮2次，最后合并3次煎煮所得滤液，即得所述中药组合物。

[0035] 另外，该中药组合物可应用于制备治疗肝郁气滞型乳腺炎的药物，即按照该领域

常规制剂方法，向该中药组合物中加入药学上可接受的辅料，制成胶囊剂、丸剂等口服制剂。

[0036] 实施例4

[0037] 一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，其包括如下重量份的原料：金果榄7份、仙人掌17份、紫苏梗9份、络石藤12份、三角风9份、连翘13份、大过路黄18份、太白贝母7份、花生衣14份、猫爪草13份。具体制备方法为：按照上述重量份捡取所述原料，洗净晾干后，将仙人掌、络石藤、三角风、大过路黄、猫爪草断碎至长度小于2cm，紫苏梗切成厚度小于0.5的薄片，再将以上处理后的原料与金果榄、连翘、太白贝母、花生衣混合，放入砂锅中，加入原料总重量6倍的的水浸泡55min，武火煮沸后转文火煎煮25min，而后过滤，滤液保留，滤渣则采用相同方法继续煎煮2次，最后合并3次煎煮所得滤液，即得所述中药组合物。

[0038] 另外，该中药组合物可应用于制备治疗肝郁气滞型乳腺炎的药物，即按照该领域常规制剂方法，向该中药组合物中加入药学上可接受的辅料，制成颗粒剂、口服液等口服制剂。

[0039] 实施例5

[0040] 一种治疗肝郁气滞型乳腺炎的中药组合物，其包括如下重量份的原料：金果榄9份、仙人掌20份、紫苏梗10份、络石藤15份、三角风10份、连翘15份、大过路黄20份、太白贝母9份、花生衣16份、猫爪草15份。具体制备方法为：按照上述重量份捡取所述原料，洗净晾干后，将仙人掌、络石藤、三角风、大过路黄、猫爪草断碎至长度小于2cm，紫苏梗切成厚度小于0.5的薄片，再将以上处理后的原料与金果榄、连翘、太白贝母、花生衣混合，放入砂锅中，加入原料总重量8倍的的水浸泡60min，武火煮沸后转文火煎煮20min，而后过滤，滤液保留，滤渣则采用相同方法继续煎煮2次，最后合并3次煎煮所得滤液，即得所述中药组合物。

[0041] 另外，该中药组合物可应用于制备治疗肝郁气滞型乳腺炎的药物，即按照该领域常规制剂方法，向该中药组合物中加入药学上可接受的辅料，制成颗粒剂、片剂、丸剂等口服制剂。

[0042] 临床观察统计资料

[0043] 1、观察对象：

[0044] 选择确诊的肝郁气滞型乳腺炎患者200例进行临床观察，随机分成治疗组和对照组，治疗组100例，年龄22-43岁，平均年龄27.9岁，病程最短者1个月，最长者2年；对照组100例，年龄21-43岁，平均年龄27.8岁，病程最短者1个月，最长者2年。治疗组和对照组两组病例年龄、病程、症状轻重程度基本一致，无显著差异，具有可比性。

[0045] 2、治疗方法

[0046] 治疗组：内服本发明药物，每日3次，每次服用有效药量为1-2g的药物，早、中、晚饭后半小时温水送服，10天为一个疗程，服用1-3个疗程后进行观察，服药期间停服其他药物，并忌食生冷、辛辣、刺激的食物。

[0047] 对照组：口服市面上购买的治疗肝郁气滞型乳腺炎的药物(如乳癖舒片、乳康灵等)，按照服用说明服用，与治疗组进行同步观察，服药期间停服其他药物，并忌食生冷、辛辣、刺激的食物。

[0048] 4、治疗标准

[0049] 治愈：全身症状消失，肿块消散，身体恢复正常，经检查身体指标恢复正常；显效：

全身症状基本消失，局部疼痛明显减轻，经检查身体指标基本恢复正常；有效：全身症状基本消失，局部疼痛有所减轻，经检查身体指标部分；无效：用药后患者的症状未见好转。

[0050] 5、治疗结果

[0051] 治疗组和对照组临床治疗结果如表1所示：

[0052] 表1治疗组和对照组临床治疗结果

[0053]

	n	痊愈	显效	有效	无效	总有效率(%)
治疗组	100	37	29	25	9	91
对照组	100	25	18	30	27	73

[0054] 由上表1治疗组和对照组的临床治疗结果可以看出：治疗组100例，服用本发明治疗肝郁气滞型乳腺炎的药物1-3个疗程后，治愈37例(占总数37%)，显效29例(占总数29%)，有效25例(占总数25%)，无效9例，总有效率为91%；对照组100例，服用目前市售的治疗肝郁气滞型乳腺炎药物，与治疗组同步进行观察得，治愈25例(占总数25%)，显效18例(占总数18%)，有效30例(占总数30%)，无效27例，总有效率为73%；可见，本发明药物用于治疗肝郁气滞型乳腺炎效果明显优于对照组市售药物，治愈率高

[0055] 虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施方案对本发明作了详尽的描述，但在本发明基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本发明要求保护的范围。