



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103877476 A

(43) 申请公布日 2014.06.25

(21) 申请号 201410143833.3

(22) 申请日 2014.04.11

(71) 申请人 刘宝昌

地址 155607 黑龙江省宝清县七星泡镇福兴村

(72) 发明人 刘宝昌

(51) Int. Cl.

A61K 36/9062(2006.01)

A61P 1/04(2006.01)

A61K 35/37(2006.01)

A61K 33/06(2006.01)

A61K 35/56(2006.01)

A61K 35/36(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗胃病的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗胃病的中药组合物,它包含下述物质:瓦楞子、海螵蛸、皂角刺、刺猬皮、苦楝子、山楂、麦芽、姜半夏、莱菔子、槟榔、白矾、六神曲、白术、苍术、大枣、白鲜皮、香附、香橼、陈皮、枳实、鸡内金、栀子、高良姜、木香、茯苓、藿香、延胡索、甘草、三七、见肿消、威灵仙和凤尾草。本发明所述的治疗胃病的中药组合物具有活血止痛、理气消胀、降逆止呕、散结消积、敛疮消肿、清热祛寒、止酸消痞等作用。

1. 一种治疗胃病的中药组合物,其特征在於它包含下述重量配比的物质:瓦楞子 50-60 份、海螵蛸 25-30 份、皂角刺 20-25 份、刺猬皮 15-25 份、苦楝子 30-40 份、山楂 60-70 份、麦芽 15-20 份、姜半夏 25-30 份、莱菔子 40-50 份、槟榔 20-25 份、白矾 10-15 份、六神曲 10-15 份、白术 15-20 份、苍术 30-40 份、大枣 15-20 份、白鲜皮 35-40 份、香附 20-25 份、香橼 20-25 份、陈皮 15-20 份、枳实 15-20 份、鸡内金 10-15 份、栀子 20-25 份、高良姜 30-35 份、木香 30-35 份、茯苓 40-50 份、藿香 30-35 份、延胡索 60-70 份、甘草 15-20 份、三七 25-30 份、见肿消 25-30 份、威灵仙 30-35 份和凤尾草 50-60 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗胃病的中药组合物,其特征在於它包含下述重量配比的物质:瓦楞子 50 份、海螵蛸 25 份、皂角刺 20 份、刺猬皮 15 份、苦楝子 30 份、山楂 60 份、麦芽 15 份、姜半夏 25 份、莱菔子 40 份、槟榔 20 份、白矾 10 份、六神曲 10 份、白术 15 份、苍术 30 份、大枣 15 份、白鲜皮 35 份、香附 20 份、香橼 20 份、陈皮 15 份、枳实 15 份、鸡内金 10 份、栀子 20 份、高良姜 30 份、木香 30 份、茯苓 40 份、藿香 30 份、延胡索 60 份、甘草 15 份、三七 25 份、见肿消 25 份、威灵仙 30 份和凤尾草 50 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗胃病的中药组合物,其特征在於还包含下述重量配比的物质:八宝茶 30 份、十八症 30 份、大粘药 90 份、青叶胆 30 份、垂盆草 50 份、冬凌草 20 份、豆蔻 20 份、前胡 10 份、连钱草 50 份、忍冬藤 60 份、侧柏叶 10 份、山银花 10 份、杠板归 30 份、苦地丁 50 份、花椒 10 份、补骨脂 20 份和丝瓜络 50 份。

4. 根据权利要求 1 至 3 中任一项所述的治疗胃病的中药组合物,其特征在於,所述中药组合物可以为片剂、分散片、散剂或胶囊剂。

一种治疗胃病的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及中医药领域,具体地说,涉及一种治疗胃病的中药组合物。

背景技术

[0002] 门脉高压性胃病(PHG)是由门脉高压引起的胃粘膜非炎症性病变,是肝硬化门脉高压症的常见并发症。临床表现类似于胃炎,主要有胃痛、胃胀、反酸、恶心、呕吐等,少数患者会出现呕血、便血。肝硬化门脉高压患者半数以上可见PHG,平均约占49%,是肝硬化上消化道出血的重要原因,甚则有生命危险。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗胃病的中药组合物。

[0004] 为了实现本发明的目的,本发明提供一种治疗胃病的中药组合物,它包含下述重量配比的物质:瓦楞子 50-60 份、海螵蛸 25-30 份、皂角刺 20-25 份、刺猬皮 15-25 份、苦楝子 30-40 份、山楂 60-70 份、麦芽 15-20 份、姜半夏 25-30 份、莱菔子 40-50 份、槟榔 20-25 份、白矾 10-15 份、六神曲 10-15 份、白术 15-20 份、苍术 30-40 份、大枣 15-20 份、白鲜皮 35-40 份、香附 20-25 份、香橼 20-25 份、陈皮 15-20 份、枳实 15-20 份、鸡内金 10-15 份、栀子 20-25 份、高良姜 30-35 份、木香 30-35 份、茯苓 40-50 份、藿香 30-35 份、延胡索 60-70 份、甘草 15-20 份、三七 25-30 份、见肿消 25-30 份、威灵仙 30-35 份和凤尾草 50-60 份。

[0005] 优选地,本发明所述的治疗胃病的中药组合物包含下述重量配比的物质:瓦楞子 50 份、海螵蛸 25 份、皂角刺 20 份、刺猬皮 15 份、苦楝子 30 份、山楂 60 份、麦芽 15 份、姜半夏 25 份、莱菔子 40 份、槟榔 20 份、白矾 10 份、六神曲 10 份、白术 15 份、苍术 30 份、大枣 15 份、白鲜皮 35 份、香附 20 份、香橼 20 份、陈皮 15 份、枳实 15 份、鸡内金 10 份、栀子 20 份、高良姜 30 份、木香 30 份、茯苓 40 份、藿香 30 份、延胡索 60 份、甘草 15 份、三七 25 份、见肿消 25 份、威灵仙 30 份和凤尾草 50 份。

[0006] 更优选地,本发明所述的治疗胃病的中药组合物还包含下述重量配比的物质:八宝茶 30 份、十八症 30 份、大粘药 90 份、青叶胆 30 份、垂盆草 50 份、冬凌草 20 份、豆蔻 20 份、前胡 10 份、连钱草 50 份、忍冬藤 60 份、侧柏叶 10 份、山银花 10 份、杠板归 30 份、苦地丁 50 份、花椒 10 份、补骨脂 20 份和丝瓜络 50 份。

[0007] 最优选地,所述中药组合物可以为片剂、分散片、散剂或胶囊剂。

[0008] 在本发明的组合物中,

[0009] 见肿消

[0010]

中文学名	见肿消	门	被子植物门
别称	狭叶山胡椒	纲	双子叶植物纲
界	植物界	科	樟科 (Lauraceae)
		属	山胡椒属

[0011] 八宝茶

[0012] 基源：卫矛科卫矛属植物八宝茶的带翅枝。

[0013] 原植物：八宝茶 *Euonymus przewalskii* Maxim.

[0014] 十八症

[0015] 基源：胡椒科胡椒属植物光轴芫叶药的全株。

[0016] 原植物：光轴芫叶药 *Piper boehmeriae folium*(Miq.)C. DC. var. *tonkinense* C. DC.

[0017] 大粘药

[0018] 基源：荨麻科雾水葛属植物红雾水葛的根和叶。

[0019] 原植物：红雾水葛 *Pouzolzia sanguinea*(Bl.)Merr. [*Urtica sanguinea* Bl. ; *P. viminea*(Wall.)Wedd.]

[0020] 本发明所述的治疗胃病的中药组合物具有活血止痛、理气消胀、降逆止呕、散结消积、敛疮消肿、清热祛寒、止酸消痞等作用，治疗胃病新旧症状群，如：胃火溃疡、胃寒痉挛、胃脘疼痛、胃积食胀、胃热反酸、胃疡出血、胃气噎膈、胃郁呃逆、胃伤膜脱、胃毒斑肿、胃水浮肿、胃虚萎缩、胃实痞满、胃损下垂、胃脘饥饿、胃脘沉疴、胃病失眠、胃脘结石、胃经牙疼、胃湿便秘、胃燥便秘、胃疳口疮等等。

具体实施方式

[0021] 实施例 1：

[0022] 称取瓦楞子 50 克、海螵蛸 25 克、皂角刺 20 克、刺猬皮 15 克、苦楝子 30 克、山楂 60 克、麦芽 15 克、姜半夏 25 克、莱菔子 40 克、槟榔 20 克、白矾 10 克、六神曲 10 克、白术 15 克、苍术 30 克、大枣 15 克、白鲜皮 35 克、香附 20 克、香橼 20 克、陈皮 15 克、枳实 15 克、鸡内金 10 克、栀子 20 克、高良姜 30 克、木香 30 克、茯苓 40 克、藿香 30 克、延胡索 60 克、甘草 15 克、三七 25 克、见肿消 25 克、威灵仙 30 克和凤尾草 50 克，粉碎，过 100 目筛，混合均匀，然后分装到 100 个胶囊壳中，即得本发明所述的胶囊剂。

[0023] 实施例 2：

[0024] 称取瓦楞子 50 克、海螵蛸 25 克、皂角刺 20 克、刺猬皮 15 克、苦楝子 30 克、山楂 60 克、麦芽 15 克、姜半夏 25 克、莱菔子 40 克、槟榔 20 克、白矾 10 克、六神曲 10 克、白术 15 克、苍术 30 克、大枣 15 克、白鲜皮 35 克、香附 20 克、香橼 20 克、陈皮 15 克、枳实 15 克、鸡内金 10 克、栀子 20 克、高良姜 30 克、木香 30 克、茯苓 40 克、藿香 30 克、延胡索 60 克、甘草 15 克、三七 25 克、见肿消 25 克、威灵仙 30 克、凤尾草 50 克、八宝茶 30 克、十八症 30 克、大粘药 90 克、青叶胆 30 克、垂盆草 50 克、冬凌草 20 克、豆蔻 20 克、前胡 10 克、连钱草 50 克、忍冬藤 60 克、侧柏叶 10 克、山银花 10 克、杠板归 30 克、苦地丁 50 克、花椒 10 克、补骨脂 20 克和丝瓜络 50 克，粉碎，过 100 目筛，混合均匀，然后分装到 100 个胶囊壳中，即得本发明所

述的胶囊剂。

[0025] 实验例

[0026] 一般资料

[0027] 选择 80 例患者,分为第一组和第二组各 40 例。治疗组男 29 例,女 11 例;年龄 25-70 岁,平均 47.5 岁;病程 2-10 年,平均 6 年;胃镜下 PHG 分级:I 级 10 例,II 级 25 例,III 级 5 例;肝功能 Child 分级:A 级 35 例,B 级 5 例,C 级 0 例。第二组男 32 例,女 8 例,年龄 21-72 岁,平均 46.5 岁;病程 2-12 年,平均 7 年;胃镜下 PHG 分级:I 级 13 例,II 级 23 例,III 级 4 例;肝功能 Child 分级:A 级 37 例,B 级 3 例,C 级 0 例。两组患者在性别、年龄、病程、PHG 分级及 Child 分级方面差异均无显著性 ($P > 0.05$),具有可比性。

[0028] 诊断标准

[0029] 所选 80 例患者均符合肝硬化及 PHG 的诊断标准。肝硬化诊断标准按 2005 年病毒性肝炎防治方案制定的标准;内镜下确诊为 PHG 按 Tanoue 分类法分 3 级 (Tanoue K, Hashizume M, Wada H, et al. Effects of endoscopic injection sclerotherapy on portal hypertensive gastropathy: a prospective study[J]. Gastrointest Endosc, 1992, 38(5):582-585) I 级:轻度发红、粘膜充血但无马赛克征;II 级:重度发红-粘膜水肿呈细网状图案,有马赛克征;III 级:在 II 级基础上见点状出血。排除出现严重并发症、合并食道胃底静脉曲张破裂出血、肝性脑病、胃癌等恶性病变的患者。

[0030] 第一组患者口服实施例 1 制备的胶囊剂,每天 1 次,每次口服 2 粒,连续治疗 1 个月。第二组患者口服实施例 2 制备的胶囊剂,每天 1 次,每次口服 2 粒,连续治疗 1 个月。

[0031] 疗效标准

[0032] 显效:临床症状消失或明显改善,胃粘膜按 Tanoue 分类,恢复好转程度超过 1 个等级以上;有效:临床症状好转,胃粘膜较前改善,但好转未能超过 1 个等级;无效:临床症状及胃粘膜病变无改变。

[0033] 结果

[0034] 在第一组中,显效 21,有效 12,无效 7 例,总有效率为 82.5%;在第二组中,显效 30,有效 6,无效 4 例,总有效率为 90%。

[0035] 在治疗中观察,未出现严重不良反应,治疗结束后两组患者的血、尿、粪常规及肝肾功能检查均未见异常。