

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁷

C11B 9/00

A61K 7/46

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 98801999.X

[43]公开日 2000 年 2 月 9 日

[11]公开号 CN 1244211A

[22]申请日 1998.1.20 [21]申请号 98801999.X

[30]优先权

[32]1997.1.24 [33]EP [31]97300457.5

[32]1997.6.13 [33]EP [31]97304146.0

[32]1997.6.23 [33]EP [31]97304402.7

[32]1997.8.1 [33]EP [31]97305835.7

[86]国际申请 PCT/GB98/00166 1998.1.20

[87]国际公布 WO98/32820 英 1998.7.30

[85]进入国家阶段日期 1999.7.23

[71]申请人 探索国际股份有限公司

地址 荷兰纳尔登

[72]发明人 A·J·A·范德维尔德特

I·M·佩恩

[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 马崇德 温宏艳

权利要求书 1 页 说明书 7 页 附图页数 0 页

[54]发明名称 大环麝香混合物

[57]摘要

本发明涉及大环麝香香料十六内酯、环十五酮和十五内酯的至少两种的混合物。这些混合物对蛋白质和纤维素底物具有的亲和力明显地好于各组分对这些底物的亲和力,因而,非常适合作为香料用于打算处理皮肤、头发或纺织纤维的产品中,如盆浴和淋浴用产品,香波,衣物洗涤剂,漂洗调理剂,织物柔软剂等。该混合物因而能够在这些产品中替代多环麝香香料。

ISSN 1000-8427 4

权 利 要 求 书

1.处理皮肤、头发或纺织纤维的产品，其包括大环麝香十六内酯、环十五酮和十五内酯中至少两种的混合物。

5 2.根据权利要求1的产品，其中麝香混合物包含至多90%重量的每一种大环麝香。

3.根据权利要求2的产品，其中麝香混合物包含至多80%重量的每一种大环麝香。

4.根据权利要求1-3的产品，其中麝香混合物至少包含十六内酯和环十五酮。

10 5.根据权利要求1-4的产品，其中麝香混合物是香料的一部分。

6.香料，其包括大环麝香十六内酯、环十五酮和十五内酯中至少两种的混合物。

15 7.根据权利要求6的香料，其中麝香混合物包含至多90%重量的每一种大环麝香。

8.根据权利要求7的香料，其中麝香混合物包含至多80%重量的每一种大环麝香。

9.根据权利要求6-8的香料，其中麝香混合物至少包含十六内酯和环十五酮。

20 10.根据权利要求6-9的香料，其包括至少0.01%重量的所述混合物。

11.十六内酯和环十五酮和/或十五内酯的混合物。

12.根据权利要求11的混合物，其包含十六内酯和环十五酮和可任选的十五内酯。

说明书

大环麝香混合物

5 本发明涉及大环麝香混合物及其作为香料用于各种底物如纺织纤维的用途。

麝香香料是众所周知的，并且更多地使用香料中的香料组分应用于广泛的产品。用于衣物洗涤剂、织物柔软剂、漂洗调理剂和其它打算用在织物纤维上的产品中的香料，主要包含多环麝香类的麝香香料。已知这类香料的例子是以各种商品名如

10 Extralide, Tonalide, Traseolide, Galaxolide 等市售的产品。

用于衣物洗涤剂、织物柔软剂等香料中的香料组分的一种重要特性是它们的纤维亲和力，即它们附着在纺织纤维上而不是随洗涤或漂洗水被洗掉或在衣物干燥机内蒸发掉的能力。对纤维有良好的亲和性的香料能够在衣物洗涤和干燥数天或数周以后，仍赋予衣物可觉察到的香味，而亲和性差的香料可能在数小时后香味就不引人注意了。

通常的香料组分和特别是那些用于去污的香料组分，其另一重要特性是它们的生物降解性。香料组分具有好的生物降解性可以防止它们在环境中不希望有的积聚。

20 虽然多环麝香广泛地用于衣物处理产品中的香料，但它们对纤维的亲和力与其它香料组分相比是不同的，一些被评定为良好，另一些是适当的或仅仅是中等。

大环麝香在香料中也已知很久了；这类香料组分众所周知的例子是环十六酮，十六内酯，环十五酮，十五内酯和它们的各种不饱和的和/或甲基取代的类似物。迄今为止，这些化合物的应用很大程度上限制在所谓的“精细香料”中，即直接用于皮肤或在化妆品产品中的香料。此领域中的很多应用不要求特别的亲和力，即抗洗涤或漂洗性，虽然对有些如头发护理产品，这可能是一个明显的优点。大环麝香对纤维的亲和力还随化合物的不同而不同：有些被评定为适当，大多数仅仅是中等。另一方面大环麝香易于生物降解。

30 现已发现，大环麝香十六内酯、环十五酮和十五内酯中的至少两种的混合物具有对纤维素和蛋白质底物的亲和力，比得上更具亲

这些混合物并没有被描述为在不用分离出所希望的十五内酯的情况下适合用于香料。十六内酯与环十五酮或与十五内酯或与它们两个的混合物是新的。优选的是十六内酯和环十五酮和任选的十五内酯的混合物。特别优选的是十六内酯和环十五酮的混合物。

- 5 根据本发明的麝香混合物优选地包含至多 90% 重量的每一种组分。因而，如果由两种组分组成，则混合物优选地包含每一种为 10 - 90% 重量。更优选地，它们包含至多 80% 重量的每一种组分，对于两组分混合物来说意味着每一种为 20 - 80%。最优选地，混合物包含至多 70% 的每一种组分。特别优选的是至少包含十六内酯和环十五酮每一种的量为 70 - 30% 重量的麝香混合物。

- 10 在加香产品如用于棉织物的织物柔软剂或用于头发的香波处理底物试样之后，由选定的专门小组成员通过其嗅觉来评价亲和力，此加香产品包含本发明的麝香混合物或作为对照的其它麝香香料，根据下面描述的标准步骤来评价。因而，这种评价实质上是一种相对气味强度的测试。已知当照此评价时，香料组分混合物可觉察到的香气强度一般地不如各组分可觉察到的香气的总和。因而，本发明麝香混合物的两种组分 1:1 混合物可觉察到的香气强度，预计比各组分香气强度的总和要低，即在这种混合物中，总的来说存在香气抑制。与此截然不同是，用本发明麝香混合物处理的底物上可
- 15 觉察到的香气强度至少等同于，但大多数情况下是大于用等量各组分处理的底物可觉察到的香气强度。
- 20

- 在香料中，其它有利地与本发明麝香混合物组合的香料组分是，例如，某些天然提取物，精油，净油，香树脂，树脂，浸膏等，但还有合成材料如烃类，醇类，醛类，酮类，醚类，酸类，酯类，
- 25 缩醛类，缩酮类，腈类等，包括饱和和不饱和化合物，脂族，碳环和杂环化合物。

这些香料组分在以下出版物中提到，例如，S.Arctander 的《香料和香味化学品》(Perfume and Flavor Chemicals)

- (Montclair, N. J., 1969) 中，S.Arctander 的《天然来源的香料和香味材料》(Perfume and Flavor Materials of Natural
- 30 Origin) (Elizabeth, N. J., 1960) 中，和美国 Wheaton, Ill 的 Allured 出版公司的“香味和香料材料 - 1997”中，或这种年度出

Age Group	Male	Female
0-14	10	15
15-24	20	25
25-34	30	35
35-44	40	45
45-54	50	55
55-64	60	65
65-74	70	75
75-84	80	85
85+	90	95

醇, 乙酸香叶酯, 芳樟醇, 乙酸芳樟酯, 四氢芳樟醇, 香茅醇, 乙酸香茅酯, 二氢月桂烯醇, 乙酸二氢月桂烯基酯, 四氢月桂烯醇, 松油醇, 乙酸松油酯, 诺卜醇, 乙酸诺卜酯, 2-苯基乙醇, 乙酸2-苯乙基酯, 苜醇, 乙酸苜酯, 水杨酸苜酯, 乙酸甲基苜基原酯

10 3- (对叔丁基苯基) 丙醛, 2-甲基-3- (对异丙基苯基) 丙醛,
3- (对叔丁基苯基) 丙醛, 2,4-二甲基环己-3-烯基-甲醛,
乙酸三环癸烯基酯, 丙酸三环癸烯基酯, 4- (4-羟基-4-甲基
戊基) -3-环己烯-甲醛, 4- (4-甲基-3-戊烯基) -3-环
己烯-甲醛, 4-乙酰基-3-戊基-四氢吡喃, 3-羧甲基-2-戊
15 基环戊烷, 2-正庚基环戊酮, 3-甲基-2-戊基-2-环戊烯酮,
正癸醛, 正十二醛, 9-癸烯醇-1, 异丁酸苯氧乙基酯, 苯基-乙
醛缩二甲醇, 苯基-乙醛缩二乙醇, 香叶腈, 香茅腈, 乙酸柏木酯,
3-异茨基环己醇, 柏木基甲醚, 异长叶烷酮, 大茴香醛腈, 大茴
香醛, 胡椒醛, 香豆素, 丁子香酚, 香兰素, 二苯醚, 羟基-香茅
20 醛, 紫罗兰酮, 甲基紫罗兰酮, 异甲基紫罗兰酮, 鳶尾酮, 顺式-3
-己烯醇和它们的酯, 茛满麝香, 葑满麝香, 异色满麝香。

果。因此只可能规定宽的限度，对本领域技术人员来说，仍提供了足够的信息以使其能够使用本发明的麝香混合物用于其具体的目的。一般地，本发明麝香混合物在香料中的加量为 0.01% 重量或更多就有可觉察到的嗅觉效果，优选地加量至少为 0.1% 重量，更优选地至少 0.5%。本发明的麝香混合物在产品中的存在量一般地至少为 10ppm 重量，优选地至少为 50ppm，更优选地至少为 100ppm。

在下面的实例中进一步说明本发明。

实施例 1

单一的多环麝香和大环麝香与本发明麝香混合物对纤维亲和力的对照。

将 70% 的要被测试的麝香和麝香混合物的肉豆蔻酸异丙酯溶液，以 0.25% 重量配入单独的 Arquad 织物柔软剂 (GT117B) 中。

- 5 通过下面的步骤，室温下在搅动式去污测定仪中漂洗“6”×6”（重：16g）的棉毛巾织物片来进行测试：

将含有测试麝香的 3g 织物柔软剂加到 1 升水中，搅拌 1 分钟使其分散。然后加入织物片，在 100rpm 的恒定搅拌下洗涤 10 分钟。完成洗涤周期后，用手拧干所述片并悬挂晾干 20 小时。

- 10 由 14 个人的专门小组通过嗅觉对布样作出评价。使用 10 分等级，从 9（很好）到 0（很差）。结果如下面表 1 所示：

表 1

<u>麝香</u>	<u>等级</u>	<u>标准偏差</u>
麝香混合物 1*	6.9	1.5
十六内酯	4.8	2.1
环十五酮	5.9	2.9
Tonalid**	7.2	1.5
Galaxolide***	3.8	2.3

15

*由 50% 的十六内酯和 50% 的环十五酮组成的麝香混合物。

**PFW 公司市售的多环麝香的商品名。

***IFF 公司市售的多环麝香的商品名。

实施例 2

- 20 重复实施例 1 的步骤，用包括环十五内酯和一种或两种另外的大环麝香的混合物，以相等用量与单独的环十五内酯和单独的 Tonalid 相比较。结果如下面表 2 所示：

表 2

<u>麝香</u>	<u>等级</u>	<u>标准偏差</u>
十五内酯/环十五酮	5.2	2.8
十五内酯/十六内酯	5.7	2.1
十五内酯/环十五酮/十六内酯	6.5	1.4
环十五内酯	3.2	2.0
Tonalide	6.7	1.4

实施例 3

- 5 使用相同的羊毛织物碎片，重复实施例 1 的步骤。由 9 人专门小组通过嗅觉在织物晾干前后，即湿的和干的情况下对织物作出评价。以 Tonalid 处理的织物香气为基准，此香气被人为地给予 10 分值，来评价香气。结果如下面表 3A 和 B 所示：

表 3

<u>麝香</u>	<u>等级</u>	<u>标准偏差</u>
A (湿的)		
麝香混合物 1	10.0	3.9
十六内酯	5.8	4.0
环十五酮	9.4	4.5
Tonalid	10	0
B (干的)		
麝香混合物 1	9.8	3.8
十六内酯	6.4	3.0
环十五酮	6.1	4.2
Tonalid	10	0

实施例 4

比较一种单独的多环麝香，两种大环麝香和这二者 50/50 混合

Age Group	No	Not sure	Yes	Probably	Definitely
18-24	25%	10%	30%	25%	10%
25-34	15%	10%	45%	25%	5%
35-44	15%	10%	35%	35%	5%
45-54	15%	10%	30%	35%	10%
55-64	15%	10%	25%	35%	15%
65+	15%	10%	20%	35%	20%

5

从 1 (很差) 到 10 (很好) : 结果如下面表 4 所示:

表 4

<u>麝香</u>	<u>等级</u>	<u>标准偏差</u>
十六内酯	5.2	1.4
环十五酮/十六内酯	5.0	1.0
环十五酮	2.8	1.7
Galaxolide	4.9	1.6