



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103263645 B

(45) 授权公告日 2015. 03. 11

(21) 申请号 201310164310. 2

审查员 谢京晶

(22) 申请日 2013. 04. 19

(73) 专利权人 魏守刚

地址 262500 山东省青州市玲珑山南路
4138 号潍坊市益都中心医院

(72) 发明人 魏守刚 程秀菊

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

(56) 对比文件

CN 102397516 A, 2012. 04. 04, 全文.

刘安明等. 香砂养胃丸加味治疗脾虚型
慢性非萎缩性胃炎临床观察. 《内蒙古中医
药》. 2012, (第 2 期), 6-7.

许颖等. 汶明琦主任医师治疗慢性萎缩性胃
炎的经验. 《陕西中医》. 2007, 第 28 卷 (第 11
期), 1517-1518.

权利要求书1页 说明书5页

(54) 发明名称

一种治疗胃炎、胃溃疡的药物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗胃炎、胃溃疡的药物, 其特征在于, 所述药物由以下重量份的中药组成: 熟地 10-20 克、山药 5-15 克、莢肉 5-15 克、菟丝子 10-20 克、当归 5-15 克、川穹 5-15 克等中药组份, 其中以山药、党参、甘草、海螵、干姜、黄连为主药, 其他中药为辅药, 各组分药物相辅相成, 起到增进药效, 降低毒副作用的效果, 有效治疗腹痛、暖气、腹胀、食欲不振、恶心、呕吐等各种胃炎、胃溃疡症状。

1. 一种治疗胃炎、胃溃疡的药物,其特征在于,所述药物由以下重量份的中药组成:

熟地 10-20 克、山药 5-15 克、萸肉 5-15 克、菟丝子 10-20 克、当归 5-15 克、川芎 5-15 克、黄芪 25-35 克、桂枝 8-16 克、细辛 1-5 克、焦白术 10-20 克、党参 10-20 克、茯苓 10-20 克、甘草 2-10 克、海螵蛸 15-25 克、干姜 4-16 克、木香 3-17 克、黄连 1-3 克、附子 1-7 克、防风 4-16 克。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗胃炎、胃溃疡的药物,其特征在于,所述药物由以下重量份的中药组成:

熟地 15 克、山药 10 克、萸肉 10 克、菟丝子 15 克、当归 10 克、川芎 10 克、黄芪 30 克、桂枝 12 克、细辛 3 克、焦白术 15 克、党参 15 克、茯苓 15 克、甘草 6 克、海螵蛸 20 克、干姜 10 克、木香 10 克、黄连 2 克、附子 4 克、防风 10 克。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗胃炎、胃溃疡的药物,其特征在于,所述药物由以下重量份的中药组成:

熟地 10 克、山药 5 克、萸肉 5 克、菟丝子 10 克、当归 5 克、川芎 5 克、黄芪 25 克、桂枝 8 克、细辛 1 克、焦白术 10 克、党参 10 克、茯苓 10 克、甘草 2 克、海螵蛸 15 克、干姜 4 克、木香 3 克、黄连 1 克、附子 1 克、防风 4 克。

4. 根据权利要求 1 所述的一种治疗胃炎、胃溃疡的药物,其特征在于,所述药物由以下重量份的中药组成:

熟地 20 克、山药 15 克、萸肉 15 克、菟丝子 20 克、当归 15 克、川芎 15 克、黄芪 35 克、桂枝 16 克、细辛 5 克、焦白术 20 克、党参 20 克、茯苓 20 克、甘草 10 克、海螵蛸 25 克、干姜 16 克、木香 17 克、黄连 3 克、附子 7 克、防风 16 克。

一种治疗胃炎、胃溃疡的药物

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体地说,是一种治疗慢性胃炎、胃溃疡的药物。

背景技术

[0002] 慢性胃炎是以胃粘膜的非特异性慢性炎症为主要病理变化的慢性胃病,病变可局限于胃的一部分,也可弥漫到整个胃部,临床常有胃酸减少、食欲下降、上腹不适和疼痛、消化不良等。慢性胃炎无特异性,一般可表现为食欲减退,上腹部有饱胀憋闷感及疼痛感、恶心、嗝气、消瘦、腹泻等。引发慢性胃炎的致病因素有急性胃炎迁延不愈、细菌感染、药物刺激、饮食不当、鼻咽口腔的慢性病灶、胃酸缺乏等。

[0003] 胃溃疡是消化性溃疡中最常见的一种,主要是指胃黏膜被胃消化液自身消化而造成的超过粘膜肌层的组织损伤。胃溃疡症状常不典型可表现为上腹痛及上腹不适等。绝大部分人可出现各种消化不良的症状,但是有的也无任何症状,直至出现并发症。其常见的并发症主要有出血、穿孔、幽门梗阻、癌变。常见的胃肠道症状及全身症状主要有嗝气、反酸、上腹胀、胸骨后烧灼感、恶心、呕吐、纳差等。反酸及胸骨后烧灼感是由于贲门松弛,恶心、呕吐多反映溃疡可能提示溃疡处于活动期。频繁呕吐宿食,提示幽门梗阻。部分患者有失眠、多汗等植物神经功能紊乱症状。

[0004] 目前对胃炎、胃溃疡的治疗药物中存在着毒副作用大,治疗效果不明显的特点,例如复方氢氧化铝、解痉剂治疗慢性胃炎用于减轻痉挛性疼痛,但不可长期服用,地塞米松、强地松等药物对胃黏膜有刺激作用,可加重胃溃疡的病情,应尽量避免使用。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是克服上述缺陷,提供一种疗效显著、毒副作用小的治疗胃炎、胃溃疡的药物。

[0006] 本发明所采用的技术方案是:

[0007] 一种治疗胃炎、胃溃疡的药物,其特征在于,所述药物由以下重量份的中药组成:

[0008] 熟地 10-20 克、山药 5-15 克、莢肉 5-15 克、菟丝子 10-20 克、当归 5-15 克、川芎 5-15 克、黄芪 25-35 克、桂枝 8-16 克、细辛 1-5 克、焦白术 10-20 克、党参 10-20 克、茯苓 10-20 克、甘草 2-10 克、海螵蛸 15-25 克、干姜 4-16 克、木香 3-17 克、黄连 1-3 克、附子 1-7 克、防风 4-16 克。

[0009] 作为一种改进,所述药物由以下重量份的中药组成:

[0010] 熟地 15 克、山药 10 克、莢肉 10 克、菟丝子 15 克、当归 10 克、川芎 10 克、黄芪 30 克、桂枝 12 克、细辛 3 克、焦白术 15 克、党参 15 克、茯苓 15 克、甘草 6 克、海螵蛸 20 克、干姜 10 克、木香 10 克、黄连 2 克、附子 4 克、防风 10 克。

[0011] 可选的,所述药物由以下重量份的中药组成:

[0012] 熟地 10 克、山药 5 克、莢肉 5 克、菟丝子 10 克、当归 5 克、川芎 5 克、黄芪 25 克、桂

枝 8 克、细辛 1 克、焦白术 10 克、党参 10 克、茯苓 10 克、甘草 2 克、海螵蛸 15 克、干姜 4 克、木香 3 克、黄连 1 克、附子 1 克、防风 4 克。

[0013] 可选的,所述药物由以下重量份的中药组成:

[0014] 熟地 20 克、山药 15 克、萸肉 15 克、菟丝子 20 克、当归 15 克、川芎 15 克、黄芪 35 克、桂枝 16 克、细辛 5 克、焦白术 20 克、党参 20 克、茯苓 20 克、甘草 10 克、海螵蛸 25 克、干姜 16 克、木香 17 克、黄连 3 克、附子 7 克、防风 16 克。

[0015] 其中:

[0016] 熟地可补血调经、滋补肝肾,具滋养血管、降血糖、降血压作用。

[0017] 山药有补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的功效,用于脾虚食少、久泻不止、肺虚喘咳、肾虚遗精、带下、尿频、虚热消渴,是本发明的重要主药之一。

[0018] 萸肉养肝肾、敛阴、止汗、救脱,适用于肝肾两虚所致的腰膝酸软、眩晕耳鸣、阳痿、遗精、小便频数、虚汗不止等症。

[0019] 菟丝子具有补肾益精、养肝明目、健脾固胎的功效,主治腰痛耳鸣、阳痿遗精、消渴、不育、遗尿失禁、淋浊带下、头目昏暗、食少泄泻、胎动不安。

[0020] 当归有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效,用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。

[0021] 川芎有行气开郁、祛风燥湿、活血止痛的功效,治风冷头痛眩晕、胁痛腹疼、寒痹筋挛、经闭、难产、产后瘀阻块痛、痈疽疮疡。

[0022] 黄芪有补血气、益肝肾、调节机体免疫的作用。

[0023] 桂枝有散寒解表、温通经脉、通阳化气的功效,主风寒表证、寒湿痹痛、四肢厥冷、经闭痛经、症瘕结块、胸痹、心悸、痰饮、小便不利,用于风寒感冒、脘腹冷痛、血寒经闭、关节痹痛、痰饮、水肿、心悸、奔豚。

[0024] 细辛有祛风、散寒、行水、开窍的功效,可治风冷头痛、鼻渊、齿痛、痰饮咳逆、风湿痹痛等症。

[0025] 焦白术健脾止泻的功效,用于脾虚泄泻、久痢、妇女的淋带白浊等症。

[0026] 党参具有补中益气、健脾益肺的功效,用于脾肺虚弱、气短心悸、食少便溏、虚喘咳嗽、内热消渴等,现代药理学研究证明党参具有纠正病理状态的胃肠运动功能紊乱、抗溃疡、增强机体免疫力的作用,是本发明的重要主药之一。

[0027] 茯苓有利水渗湿、健脾化痰、宁心安神、败毒抗癌的作用,所含茯苓酸具有增强免疫力、抗肿瘤以及镇静、降血糖等的作用。

[0028] 甘草有益气补中、缓急止痛、润肺止咳、泻火解毒、调和诸药的功效,主倦怠食少、肌瘦面黄、心悸气短、腹痛便溏、四肢挛急疼痛、脏躁、咳嗽气喘、咽喉肿痛、痈疮肿痛、小儿胎毒、药物中毒、食物中毒,用于脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹、四肢挛急疼痛、痈肿疮毒、缓解药物毒性、烈性,本发明主要利用甘草治疗脾胃虚弱的功效缓解胃溃疡患者胃部不适。

[0029] 海螵蛸有收敛止血、涩精止带、制酸、敛疮的作用,用于溃疡病、胃酸过多、吐血衄血、崩漏便血、遗精滑精、赤白带下、胃痛吞酸,外治损伤出血、疮多脓汁,是本发明的重要主药之一。

[0030] 干姜有温中散寒、回阳通脉、燥湿消痰、温肺化饮的功效,对消化系统溃疡有一定

抑制作用,本发明主要利用干姜对消化系统溃疡的抑制作用治疗胃溃疡。

[0031] 木香芳香行散,可升可降,用于行气止痛、理气疏肝、健脾消滞。

[0032] 黄连具有清热燥湿、泻火解毒之功效,具有抗菌、抗肿瘤和抗心律失常等 药理活性,也具有抗菌、降血糖、抗肿瘤、保护胃黏膜等活性,用于湿热痞满、呕吐吞酸、泻痢、黄疸、高热神昏、心火亢盛、心烦不寐、血热吐衄、目赤、牙痛、消渴、痈肿疮疡;外治湿疹、湿疮、耳道流脓,是本发明的重要主药之一。

[0033] 附子有回阳救逆、补火助阳、散寒止痛的功效,用于阴盛克阳、大汗亡阳、吐泻厥逆、肢冷脉微、心腹冷痛、冷痢、脚气水肿、风寒湿痹、阳痿、宫冷、虚寒吐泻、阴寒水肿、阳虚外感、阴疽疮疡以及一切沉寒痼冷之疾。

[0034] 防风有祛风解表、胜湿止痛、解痉、止痒的功效。

[0035] 本发明以山药、党参、甘草、海螵蛸、干姜、黄连为主药,其他中药为辅药,各组份药物相辅相成,起到增进药效,降低毒副作用的效果,有效治疗腹痛、嗝气、腹胀、食欲不振、恶心、呕吐等多种胃炎、胃溃疡症状。

[0036] 具体实施方式

[0037] 下面结合实施例对本发明作进一步的说明,下述该实施例仅用于说明本发明而对本发明没有限制。

[0038] 实施例 1:一种治疗胃炎、胃溃疡的药物,所述药物由以下重量份的中药组成:

[0039] 熟地 15 克、山药 10 克、萸肉 10 克、菟丝子 15 克、当归 10 克、川芎 10 克、黄芪 30 克、桂枝 12 克、细辛 3 克、焦白术 15 克、党参 15 克、茯苓 15 克、甘草 6 克、海螵蛸 20 克、干姜 10 克、木香 10 克、黄连 2 克、附子 4 克、防风 10 克。

[0040] 实施例 2:一种治疗胃炎、胃溃疡的药物,所述药物由以下重量份的中药组成:

[0041] 熟地 10 克、山药 5 克、萸肉 5 克、菟丝子 10 克、当归 5 克、川芎 5 克、黄芪 25 克、桂枝 8 克、细辛 1 克、焦白术 10 克、党参 10 克、茯苓 10 克、甘草 2 克、海螵蛸 15 克、干姜 4 克、木香 3 克、黄连 1 克、附子 1 克、防风 4 克。

[0042] 实施例 3:一种治疗胃炎、胃溃疡的药物,所述药物由以下重量份的中药组成:

[0043] 熟地 20 克、山药 15 克、萸肉 15 克、菟丝子 20 克、当归 15 克、川芎 15 克、黄芪 35 克、桂枝 16 克、细辛 5 克、焦白术 20 克、党参 20 克、茯苓 20 克、甘草 10 克、海螵蛸 25 克、干姜 16 克、木香 17 克、黄连 3 克、附子 7 克、防风 16 克。

[0044] 此外,上述实施例中制成煎剂的步骤为:按重量选材、浸泡 30 分钟、煎煮 1 小时、滤除药渣得到药液煎剂。一日一次,晚饭后睡觉前服用,五天为一疗程,一般二到五个疗程可以痊愈。

[0045] 为了保证本发明药物的安全性和疗效,临床上使用本发明药物对治疗胃炎、胃溃疡进行了疗效观察。

[0046] 一、对治疗慢性胃炎的疗效观察

[0047] 将 200 例慢性胃炎患者随机分为四组,其中年龄 18-58 岁,病程最短 2 个月,最长 7 年,每组 50 例患者。对照组 50 例患者,口服庆大霉素片,每次 2 片,每日 3 次;治疗组有三组,分别为实施例 1 组、实施例 2 组和实施例 3 组,每组分别为 50 例患者,分别给予本发明实施例 1、实施例 2、实施例 3 中的煎剂。治疗时间均定为 20 天,治疗结束后复查胃镜统计疗效。

[0048] 诊断标准参照卫生部 1993 年颁布的《中药新药临床指导原则》胃镜诊断标准：粘液增多，附着在粘膜上不易脱落，小斑片状或线状发红，水肿，糜烂、皱襞面粘膜剥脱，常有白苔。

[0049] 疗效判定标准采用卫生部 1993 年颁布的《中药新药临床指导原则》：

[0050] 痊愈：症状、体征消失，胃镜下慢性炎症达轻度，胆汁返流消失；

[0051] 显效：症状基本消失，胃镜下慢性炎症程度好转，胆汁返流减少 2/3 以上；

[0052] 有效：症状改善，胃镜下粘膜病变范围缩小 1/2 以上，慢性炎症程度减轻，胆汁返流减少 1/2 以上；

[0053] 无效：达不到有效标准或反而恶化者。

[0054] 治疗结果见表 1。

[0055] 表 1

[0056]

	痊愈（例）	显效（例）	有效（例）	无效（例）	有效率（%）	副作用（例）
对照组	6	19	17	8	84	11
实施例 1 组	11	23	14	2	96	0
实施例 2 组	9	20	18	3	94	0
实施例 3 组	12	24	13	1	98	1

[0057] 本一种治疗胃炎、胃溃疡的药物其治疗胃炎痊愈率显著高于对照组药物，副作用小。

[0058] 二、对治疗胃溃疡的疗效观察

[0059] 将 80 例胃溃疡患者随机分为对照组、实施例 1 组、实施例 2 组和实施例 3 组，每组 20 例，对照组用雷尼替丁，1 次 150mg，每日 2 次；实施例 1 组、实施例 2 组、实施例 3 组分别口服实施例 1、实施例 2 和实施例 3 中的煎剂，1 次 1 剂，每日 3 次，两组治疗时间均定为 4 周，治疗结束后复查胃镜统计疗效。

[0060] 诊断标准参照卫生部 1993 年颁布的《消化系统药物临床研究指导原则》，胃热证：胃脘灼痛，口喜渴，喜冷饮，吞酸。牙龈肿痛，便干尿黄，舌红苔黄。胃寒证：胃脘冷痛，痛势较剧，寒重温轻，呕吐清水，苔白厚。血瘀胃脘痛：胃脘疼痛如针刺，固定不移，拒按，舌质紫暗。食滞胃脘证：胃脘胀满疼痛，吐酸，泻下酸腐臭秽，苔厚浊。

[0061] 疗效判定标准参照卫生部 1993 年颁布的《消化系统药物临床研究指导原则》

[0062] 痊愈：症状消失，胃镜下溃疡病灶愈合，病变黏膜恢复正常；

[0063] 显效：症状基本消失，胃镜下溃疡病灶基本愈合，病变黏膜组织仍有轻度炎症；

[0064] 有效：主次症状部分消失，病灶愈合 $\geq 50\%$ ；

[0065] 无效：主次症状全改善，溃疡病灶愈合 $\leq 50\%$ 。

[0066] 治疗结果见表 2。

[0067] 表 2

[0068]

	痊愈（例）	显效（例）	有效（例）	无效（例）	有效率（%）	副作用（例）
对照组	2	4	9	5	75	7
实施例 1 组	5	9	6	0	100	0
实施例 2 组	4	6	8	2	90	0
实施例 3 组	6	12	2	0	100	0

[0069] 本一种治疗胃炎、胃溃疡的药物其治疗胃溃疡痊愈率显著高于对照组药物，无明显副作用。

[0070] 典型病例：

[0071] 刘某，女，44 岁，高中教师，胃脘疼痛多年，患者形体消瘦，面色萎黄，胃脘部灼痛，进食后加重，口渴，便干，喜进酸味食物，舌红苔少，脉细弦。胃镜检查诊断为慢性萎缩性胃炎、浅表性胃炎急性活动期，伴肠上皮化生。多年中西医治疗，病情反复，无明显好转，采用本发明药物治疗，三个疗程后，上述症状消失，食欲如常，体重增加，继续服药 1 个疗程巩固，痊愈，随访 1 年无复发。

[0072] 张某，男，38 岁，公司职员，患者自述早起饱胀感，早餐后胀感更为严重，伴干呕，时有呕吐物，近 1 年来体重明显减轻，便秘，西医诊断为慢性胃炎，服多副西药治疗无明显好转，采用本发明药物，两个疗程后，饱胀感有所减轻，干呕症状消失，便秘有所改善，先后服药五个疗程，上述症状均消失，大便每日一次，体重增加 4.5 公斤，又巩固用药一个疗程，随访 1 年无复发。

[0073] 钱某，男，29 岁，IT 公司程序员，患者自述病史 3 年，胃脘胀满，嗳气，食欲差，胸肋胀痛，易怒，与人发生争吵时上述症状明显加重，胃镜检查慢性浅表性胃炎，西医治疗无明显好转，采用本发明药物，一个疗程后，上述症状减轻，二个疗程后，上述症状基本消失，偶感胸肋胀痛，继续服药一个疗程后，身体恢复健康，一年后随访无复发。