УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **128824** (13) **C2**

(51) МПК (2024.01)

A01C 1/06 (2006.01)	***A01H 5/10*** (2018.01)
A01C 1/08 (2006.01)	***A01N 43/50*** (2006.01)
A01M 1/20 (2006.01)	***A01N 43/54*** (2006.01)
A61K 45/00	***A01N 43/58*** (2006.01)
A61P 33/14 (2006.01)	***A01N 43/653*** (2006.01)
A61P 43/00	***A01N 43/707*** (2006.01)
C07D 401/04 (2006.01)	***A01N 43/90*** (2006.01)
C07D 471/04 (2006.01)	***A61K 31/4725*** (2006.01)
A01P 7/00	***A61K 31/502*** (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)	***A61K 31/517*** (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)	***A61K 31/519*** (2006.01)
C07D 519/00	***A61K 31/53*** (2006.01)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ"

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

(21) Номер заявки: **a 2021 05454**

(22) Дата подання заявки: **27.03.2020**

(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: **31.10.2024**

(31) Номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції: **2019-066002, 2019-235932**

(32) Дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції: **29.03.2019, 26.12.2019**

(33) Код держави-учасниці Паризької конвенції, до якої подано попередню заявку: **JP, JP**

(41) Публікація відомостей про заявку: **08.12.2021, Бюл.№ 49**

(46) Публікація відомостей про державну реєстрацію: **30.10.2024, Бюл.№ 44**

(86) Номер та дата подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору PCT: **PCT/JP2020/014004, 27.03.2020**

(72) Винахідник(и):
Цуруда Такесі (JP),
Нокура Йосіхіко (JP),
Саіто Ясумаса (JP)

(73) Володілець (володільці):
СУМІТОМО КЕМІКАЛ КОМПАНІ, ЛІМІТЕД,
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048260, Japan (JP)

(74) Представник:
Бочаров Максим Анатолійович, реєстр. №367

(56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою:
JP 2015117194 A, 25.06.2015
JP 2018076354 A, 17.05.2018
WO 2018/008727 A1, 11.01.2018
WO 2001/070671 A1, 27.09.2001

UA 128824 C2

(54) ГЕТЕРОЦИКЛІЧНА СПОЛУКА І КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ЧЛЕНИСТОНОГИМИ ШКІДНИКАМИ, ЯКА МІСТИТЬ ЇЇ

(57) Реферат:

Даний винахід стосується сполуки, яка має чудову ефективність для боротьби з членистоногими шкідниками, яка описується формулою (I) (де Q являє собою групу, представлену формулою Q1 і т. п., Z являє собою атом кисню і т. п., A^1 являє собою CR^{4a} і т. п., A^2 являє собою атом азоту і т. п., B^1 являє собою атом азоту або CR^{6a} і т. п., B^2 являє собою CR^1 і т. п., B^3 являє собою атом азоту або CR^{6c} і т. п., B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d} і т. п., R^1 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу і т. п., R^2 являє собою C1-C6-алкільну групу і т. п., R^{3a}, R^{3b} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову

вуглеводневу групу і т. п., R^{4a}, R^{6a}, R^{6c} і R^{6d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу і т. п. і n дорівнює 0, 1 або 2), або її N-оксиду і композиції для боротьби з членистоногими шкідниками, яка містить вказану сполуку, і способу боротьби з членистоногими шкідниками шляхом нанесення вказаної сполуки.



(I),

Q1

ГАЛУЗЬ ТЕХНІКИ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ВИНАХІД

За даною заявкою заявляється пріоритет і перевага за заявкою на патент Японії № 2019-066002, поданою 29 березня 2019 г., і за заявкою на патент Японії № 2019-235932, поданою 26 грудня 2019 р., повні зміст яких включені в даний винахід як посилання.

Даний винахід стосується деякого класу гетероциклічних сполук і композицій для боротьби з членистоногими шкідниками, які їх містять.

РІВЕНЬ ТЕХНІКИ

В даний час досліджені деякі сполуки для боротьби з членистоногими шкідниками. Наприклад, відомо, що деякий клас сполук забезпечує боротьбу зі шкідниками (див. патентний документ 1).

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

ПАТЕНТНИЙ ДОКУМЕНТ

Патентний документ 1: WO 2016/129684

СУТЬ ВИНАХОДУ

(ЗАДАЧІ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ ВИНАХОДОМ)

Об'єктом даного винаходу є сполука, яка має чудову ефективність для боротьби з членистоногими шкідниками.

(ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ)

Автори даного винаходу провели ретельний пошук сполук, які мають чудову ефективність для боротьби з членистоногими шкідниками, і в результаті установили, що сполука, представлена вказаною нижче формулою (I), має чудову ефективність для боротьби з членистоногими шкідниками.

Таким чином, даний винахід включає наступне.

[1] Сполука, представлена формулою (I):



(I),

[де

Q являє собою групу, представлену формулою Q1, або групу, представлену формулою Q2,



Q1



Q2

Z являє собою атом кисню або атом сірки,

комбінація A^1 і A^2 являє собою

комбінацію, в якій A^1 являє собою CR^{4a} і A^2 являє собою атом азоту або CR^{4b}; або

комбінацію, в якій A^1 являє собою атом азоту і A^2 являє собою атом азоту або CR^{4b},

комбінація B^1, B^2, B^3 і B^4 являє собою,

комбінацію, в якій B^1 являє собою атом азоту або CR^{6a}, B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою атом азоту або CR^{6c} і B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d};

комбінацію, в якій B^1 являє собою атом азоту або CR^{6a}, B^2 являє собою атом азоту або CR^{6b}, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d};

комбінацію, в якій B^1 являє собою атом азоту або CR^{6a}, B^2 являє собою атом азоту або CR^{6b}, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою CR^1;

комбінацію, в якій B^1 являє собою атом азоту або CR^{6a}, B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою атом азоту і B^4 являє собою CR^1; або

комбінацію, в якій B^1 являє собою CR^{6a}, B^2 являє собою атом азоту, B^3 являє собою атом азоту і B^4 являє собою CR^1,

R^1 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8, атом галогену або $OS(O)_2R^8$,

m дорівнює 0, 1 або 2,

R^8 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; або C3-C4 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену,

R^{4a}, R^{4b}, R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C1-C6 алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, NR^9R^{10}, $C(O)R^7$, $C(O)NR^{19}R^{20}$, $NR^9C(O)R^{18}$, $NR^9C(O)OR^{18}$, $NR^9C(O)NR^{19}R^{20}$, ціаногрупу, атом галогену або атом водню,

R^9 і R^{19} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, або атом водню,

R^{10} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи F, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J, C3-C7 циклоалкенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, шести(6)-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, атом водню або $S(O)_2R^{21}$,

R^{21} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, або фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D,

R^7, R^{18} і R^{20} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи F, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J, або атом водню,

n дорівнює 0, 1 або 2,

R^2 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу або циклопропілметильну групу,

G^1 являє собою атом азоту або CR^{3a},

G^2 являє собою атом азоту або CR^{3b},

G^3 являє собою атом азоту або CR^{3c},

G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d},

R^{3a}, R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи B, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи E, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи H, п'яти(5)- або шести(6)-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи H, OR^{12}, $NR^{11}R^{12}$, $NR^{11a}R^{12a}$, $NR^{24}NR^{11}R^{12}$, $NR^{24}OR^{11}$, $NR^{11}C(O)R^{13}$, $NR^{24}NR^{11}C(O)R^{13}$, $NR^{11}C(O)OR^{14}$, $NR^{24}NR^{11}C(O)OR^{14}$, $NR^{11}C(O)NR^{31}R^{32}$, $NR^{24}NR^{11}C(O)NR^{31}R^{32}$, $N{=}CHNR^{31}R^{32}$, $N{=}S(O)_pR^{15}R^{16}$, $C(O)R^{13}$, $C(O)OR^{17}$, $C(O)NR^{31}R^{32}$, $C(O)NR^{11}S(O)_2R^{23}$, $CR^{30}{=}NOR^{17}$, $NR^{11}CR^{24}{=}NOR^{17}$, $S(O)_qR^{23}$, ціаногрупу, нітрогрупу, атом водню або атом галогену,

p дорівнює 0 або 1,

q дорівнює 0 або 1,

R^{30} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, атом галогену OR^{35}, $NR^{36}R^{37}$, або атом водню,

R^{35} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену,

R^{17} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, або атом водню,

R^{11}, R^{24}, R^{36} і R^{37} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, або атом водню,

R^{12} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи F, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J, C3-C7 циклоалкенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, шести(6)-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, атом водню або $S(O)_2R^{23}$,

R^{23} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, або фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D,

R^{11a} і R^{12a} разом з атомом азоту, до якого вони приєднані, утворюють три(3)- - семи(7)-членну неароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи E,

R^{13} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, (C3-C6 циклоалкіл)C1-C3 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, п'яти(5)- або шести(6)-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, або атом водню,

R^{14} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, (C3-C6 циклоалкіл)C1-C3 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, або феніл C1-C3 алкільну групу {фенільний фрагмент феніл C1-C3 алкільної групи може необов'язково містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D},

R^{15} і R^{16} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену,

R^{31} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, або атом водню,

R^{32} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи F, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J, або атом водню,

якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d} об'єднували разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, оксадіазольне кільце, тіадіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце, піразинове кільце {бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце і піразинове кільце кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи H} або триазольне кільце, яке необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи I,

Група B: група, яка включає C1-C6 алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C6 алкенілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C6 алкінілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C1-C6 алкілсульфанільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C1-C6 алкілсульфінільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C1-C6-алкілсульфонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C6 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C1-C6 алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C2-C6 алкілкарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C2-C6 алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C2-C6 алкоксикарбонілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену,

амінокарбонільну групу, С1-С6-алкіламінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ді(С1-С4-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6-алкоксикарбоніламіногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, (С2-С6-алкоксикарбоніл)(С1-С6-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,

Група D: група, яка включає С1-С6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С1-С6 алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С3-С6 алкенілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С3-С6 алкінілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С1-С6 алкілсульфанільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С1-С6 алкілсульфінільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С1-С6-алкілсульфонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С3-С6 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С1-С6 алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ді(С1-С4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6 алкілкарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6 алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6 алкоксикарбонілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, амінокарбонільну групу, С1-С6-алкіламінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ді(С1-С4-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6-алкоксикарбоніламіногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, (С2-С6-алкоксикарбоніл)(С1-С6-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,

Група E: група, яка включає С1-С6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С1-С6 алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С3-С6 алкенілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С3-С6 алкінілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С1-С6 алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ді(С1-С4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6 алкілкарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6 алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6 алкоксикарбонілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, амінокарбонільну групу, С1-С6-алкіламінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ді(С1-С4-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6-алкоксикарбоніламіногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, (С2-С6-алкоксикарбоніл)(С1-С6-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу, оксогрупу і атом галогену,

Група F: група, яка включає С3-С7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, п'яти(5)- або шести(6)-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, С1-С6 алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С1-С6 алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ді(С1-С4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,

Група H: група, яка включає С1-С6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С3-С6 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, п'яти(5)- або шести(6)-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, С1-С6 алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С1-С6 алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ді(С1-С4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6 алкілкарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, С2-С6 алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить

один або більшу кількість атомів галогену, C2-C6 алкоксикарбонілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, амінокарбонільну групу, (C1-C6-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбоніламіногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, (C2-C6-алкоксикарбоніл)(C1-C6-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,

Група I: група, яка включає C2-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C6 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, п'яти(5)- або шести(6)-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D, C2-C6 алкілкарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C2-C6 алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, амінокарбонільну групу, (C1-C6-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену і ді(C1-C4-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену,

Група J: група, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C1-C6 алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C2-C6 алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, аміногрупу, ціаногрупу і атом галогену]

(яка нижче в даному винаході називається "пропонована сполука P" або "сполука P, яка пропонується в даному винаході") або її N-оксид (нижче в даному винаході, сполука, представлена формулою (I), або її N-оксид спільно називаються, як "пропонована сполука X" або "сполука X, яка пропонується в даному винаході").

[2] Сполука за параграфом [1], де

комбінація A^1 і A^2 являє собою

комбінацію, в якій A^1 являє собою CR^{4a} і A^2 являє собою атом азоту або CR^{4b}; або

комбінацію, в якій A^1 являє собою атом азоту і A^2 являє собою CR^{4b},

R^1 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8, або $OS(O)_2R^8$

(яка нижче в даному винаході називається "пропонована сполука N" або "сполука N, яка пропонується в даному винаході") або її N-оксид (нижче в даному винаході, сполука, представлена формулою (I), або її N-оксид спільно називаються, як "пропонована сполука" або "сполука, яка пропонується в даному винаході")

[3] Сполука за параграфом [1] або [2] або її N-оксид, де

R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}, OR^{12}, $CR^{30}=NOR^{17}$, атом водню або атом галогену і якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1 і R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[4] Сполука за параграфом [1] або [2] або її N-оксид, де

R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену і якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[5] Сполука за будь-яким з параграфів [1] - [4] або її N-оксид, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[6] Сполука за параграфом [1] або [2] або її N-оксид, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1 і R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену.

[7] Сполука за будь-яким з параграфів [1] - [4] або її N-оксид, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[8] Сполука за будь-яким з параграфів [1] - [7] або її N-оксид, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою CR^{6d}; комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CR^{6d}; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою CR^1.

[9] Сполука за будь-яким з параграфів [1] - [4], [7] або [8] або її N-оксид, де G^1 являє собою атом азоту або CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту або CH.

[10] Сполука за будь-яким з параграфів [1] - [4], [6] або [7] або її N-оксид, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[11] Сполука за будь-яким з параграфів [1] - [10] або її N-оксид, де R^1 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; атом галогену; або OR^8.

[12] Сполука за будь-яким з параграфів [1] - [10] або її N-оксид, де R^1 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; або OR^8.

[13] Сполука за будь-яким з параграфів [1] - [12] або її N-оксид, де R^2 являє собою етильну групу.

[14] Сполука за будь-яким з параграфів [1] - [13] або її N-оксид, де Z являє собою атом кисню.

[15] Композиція для боротьби з членистоногими шкідниками, яка включає сполуку за будь-яким з параграфів [1] - [14] або її N-оксид.

[16] Композиція, яка включає один або більшу кількість інгредієнтів, вибраних з групи, яка включає групу (a), групу (b), групу (c) і групу (d) і сполуку за будь-яким з параграфів [1] - [14] або її N-оксид (яка нижче в даному винаході називається "пропонована композиція" або "композиція, яка пропонується в даному винаході"):

Група (a): група, яка включає інсектицидні інгредієнти, акарицидні інгредієнти і нематоцидні інгредієнти;

Група (b): фунгіцидні інгредієнти,

Група (c): інгредієнти, які модулюють ріст рослин; і

Група (d): репелентні інгредієнти.

[17] Спосіб боротьби з членистоногим шкідником, який включає нанесення ефективної кількості сполуки за будь-яким з параграфів [1] - [14] або її N-оксиду, або ефективної кількості композиції за параграфом [16] на членистоногого шкідника або місто мешкання членистоногого шкідника.

[18] Насіння або вегетативний репродуктивний орган, який містить ефективну кількість сполуки за будь-яким з параграфів [1] - [14] або її N-оксиду, або ефективну кількість композиції за параграфом [16].

[19] Сполука, представлена формулою (II):



(II),

[де

комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою

комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою атом азоту або CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd};

комбінацію, в якій B^{2b} являє собою атом азоту або CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{1} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або

комбінацію, в якій B^{2b} являє собою атом азоту або CR^{6bb}, B^{3c} являє собою атом азоту або CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^{1}.

R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, атом галогену або атом водню і

інші символи є такими, як описано в параграфі [1]]

(яка нижче в даному винаході називається "проміжна сполука C") або її солі.

[20] Сполука за параграфом [19], де

R^{1} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8, або $OS(O)_2R^8$

(яка нижче в даному винаході називається "проміжна сполука A") або її солі.

[21] Сполука, представлена формулою (III):



(III),

[де

R^{33} являє собою атом водню або атом галогену,

комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою

комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{1}, B^{3c} являє собою атом азоту або CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd};

комбінацію, в якій B^{2b} являє собою атом азоту або CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{1} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або

комбінацію, в якій B^{2b} являє собою атом азоту або CR^{6bb}, B^{3c} являє собою атом азоту або CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^{1};

R^{4aa}, R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, атом галогену або атом водню і

інші символи є такими, як визначено в параграфі [1]],

(яка нижче в даному винаході називається "проміжна сполука D").

[22] Сполука за параграфом [21], де R^{1} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8 або $OS(O)_2R^8$

(яка нижче в даному винаході називається "проміжна сполука B").

[ЕФЕКТ ВИНАХОДУ]

За допомогою даного винаходу можна боротися з членистоногим шкідником.

РЕЖИМ ЗДІЙСНЕННЯ ВИНАХОДУ

Пояснений(і) замісник(замісники), описаний (описані) в даному винаході.

Термін "атом галогену" являє собою атом фтору, атом хлору, атом брому, або атом йоду.

Якщо замісники містять два або більшу кількість атомів галогену, ці атоми галогенів можуть бути однаковими або різними.

Вираз "CX-CY" при використанні в даному винаході являє собою, що кількість атомів вуглецю дорівнює від X до Y. Наприклад, вираз "C1-C6" являє собою, що кількість атомів вуглецю дорівнює від 1 до 6.

Термін "ланцюгова вуглеводнева група" являє собою алкільну групу, алкенільну групу або алкінільну групу.

Приклади "алкільної групи" включають метильну групу, етильну групу, пропільну групу, ізопропільну групу, 1,1-диметилпропільну групу, 1,2-диметилпропільну групу, 1-етилпропільну

групу, бутильну групу, втор-бутильну групу, трет-бутильну групу, пентильну групу і гексильну групу.

Приклади "алкенільної групи" включають вінільну групу, 1-пропенільну групу, 2-пропенільну групу, 1-метил-1-пропенільну групу, 1-метил-2-пропенільну групу, 1,2-диметил-1-пропенільну групу, 1-етил-1-пропенільну групу, 3-бутенільну групу, 4-пентенільну групу і 5-гексенільну групу.

Приклади "алкінільної групи" включають етинільну групу, 1-пропінільну групу, 2-пропінільну групу, 1-метил-2-пропінільну групу, 1,1-диметил-2-пропінільну групу, 1-етил-2-пропінільну групу, 2-бутинільну групу, 4-пентинильну групу і 5-гексинільну групу.

Приклади "алкоксигрупи" включають метоксигрупу, етоксигрупу, пропоксигрупу, ізопропоксигрупу, бутоксигрупу, трет-бутоксигрупу, пентоксигрупу і гексилоксигрупу.

Приклади "алкенілоксигрупи" включають 2-пропенілоксигрупу, 2-бутенілоксигрупу і 5-гексенілоксигрупу.

Приклади "алкінілоксигрупи" включають 2-пропінілоксигрупу, 2-бутинілоксигрупу і 5-гексинилоксигрупу.

Приклади "фторалкільної групи" включають трифторметильну групу, 2,2,2-трифторетильну групу, пентафторетильну групу, 2,2,3,3,3-пентафторпропільну групу, 1,1,1-трифторпропан-2-ільну групу і гептафторпропільну групу.

Приклади "фторалкоксигрупи" включають фторметоксигрупу, дифторметоксигрупу, трифторметоксигрупу, 2,2,2-трифторетоксигрупу, перфторетоксигрупу і перфторпропоксигрупу.

Приклади "циклоалкільної групи" включають циклопропільну групу, циклобутильну групу, циклопентильну групу, циклогексильну групу і циклогептильну групу.

Приклади "циклоалкенільної групи" включають циклопропенільну групу, циклобутенільну групу, циклопентенільну групу, циклогексенільну групу і циклогептенільну групу.

Приклади "три(3)- - семи(7)-членної неароматичної гетероциклічної групи" включають азиридинове кільце, азетидинове кільце, піролідинове кільце, імідазолінове кільце, імідазолідинове кільце, піперидинове кільце, тетрагідропіримідинове кільце, гексагідропіримідинове кільце, піперазинове кільце, азепанове кільце, оксазолідинове кільце, ізоксазолідинове кільце, 1,3-оксазинанове кільце, морфолінове кільце, 1,4-оксазепанове кільце, тіазолідинове кільце, ізотіазолідинове кільце, 1,3-тіазинанове кільце, тіоморфолінове кільце і 1,4-тіазепанове кільце.

Приклади три(3)- - семи(7)-членної неароматичної гетероциклічної групи, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи E, включають наступні:



Термін "п'яти(5)- або шести(6)-членна ароматична гетероциклічна група" являє собою п'яти(5)-членну ароматичну гетероциклічну групу або шести(6)-членну ароматичну гетероциклічну групу і приклади п'яти(5)-членної ароматичної гетероциклічної групи включають піролільну групу, фурильну групу, тієнільну групу, піразолільну групу, імідазолільну групу, триазолільну групу, тетразолільну групу, оксазолільну групу, ізоксазолільну групу, тіазолільну групу, ізотіазолільну групу, оксадіазолільну групу і тіадіазолільну групу. Приклади шести(6)-

членної ароматичної гетероциклічної групи включають піридильну групу, піридазинільну групу, піримідинільну групу, піразинільну групу, триазинільну групу і тетразинільну групу.

Приклади "(C3-C6 циклоалкіл)C1-C3 алкільної групи, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену" включають циклопропілметильну групу, (2-фторциклопропіл)метильну групу, циклопропіл(фтор)метильну групу і (2-фторциклопропіл)(фтор)метильну групу.

Приклади "феніл-C1-C3 алкільної групи {фенільний фрагмент феніл C1-C3 алкільної групи може необов'язково містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи D}" включають бензильну групу, 2-фторбензильну групу, 4-хлорбензильну групу, 4-(трифторметил)бензильну групу і 2-[4-(трифторметил)феніл]етильну групу.

Терміни "алкілсульфанільна група", "алкілсульфінільна група" і "алкілсульфонільна група" являє собою алкільну групу, яка містить фрагмент $S(O)_z$ відповідно.

Наприклад, приклади "алкілсульфанілу", якщо z дорівнює 0, включають метилсульфанільну групу, етилсульфанільну групу, пропілсульфанільну групу і ізопропілсульфанільну групу.

Наприклад, приклади "алкілсульфінілу", якщо z дорівнює 1, включають метилсульфінільну групу, етилсульфінільну групу, пропілсульфінільну групу і ізопропілсульфінільну групу.

Наприклад, приклади "алкілсульфонілу", якщо z дорівнює 2, включають метилсульфонільну групу, етилсульфонільну групу, пропілсульфонільну групу і ізопропілсульфонільну групу.

Приклади "N-оксиду сполуки, яка описується формулою (I)" включають сполуки, які описуються наступними формулами.





[де R^{40} являє собою будь-який замісник, вибраний з групи H, x дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4, y дорівнює 0, 1, 2 або 3 і інші символи є такими, як визначено.]

Пропонована сполука X, проміжна сполука C і проміжна сполука D може існувати у вигляді одного або більшої кількості стереоізомерів. Приклади стереоізомера включають енантіомер, діастереоізомер і геометричний ізомер. Кожен стереоізомер і суміш (суміші) стереоізомерів в будь-якому співвідношенні включені в пропоновану сполуку X, проміжну сполуку C і проміжну сполуку D.

Пропонована сполука X і проміжна сполука C можуть утворювати солі приєднання з кислотами. Приклади кислоти для утворення солі приєднання з кислотами включають неорганічні кислоти, такі як хлорид водню, фосфорна кислота, сірчана кислота; і органічні кислоти, такі як оцтова кислота, трифтороцтова кислота, бензойна кислота, п-толуолсульфонова кислота. Сіль приєднання з кислотою можна отримати шляхом змішування пропонованої сполуки X або проміжної сполуки C з кислотою.

Приклади варіантів здійснення пропонованої сполуки N включають наступні.

[Варіант здійснення 1] Пропонована сполука N, де R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}, OR^{12}, CR^{30}=NOR^{17}, атом водню або атом галогену і якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1 і R^{3b} і R^{3d} об'єднували разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення 2] Пропонована сполука N, де R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену і якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d} об'єднували разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить атоми галогенів, і атом галогену.

[Варіант здійснення 3] Пропонована сполука N, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення 4] Сполука за варіантом здійснення 1, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення 5] Сполука за варіантом здійснення 2, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення 6] Пропонована сполука N, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення 7] Сполука за варіантом здійснення 1, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення 8] Сполука за варіантом здійснення 2, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення 9] Пропонована сполука N, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і

ціаногрупу}, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}, OR^{12}, $CR^{30}=NOR^{17}$, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення 10] Пропонована сполука N, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення 11] Пропонована сполука N, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, оксадіазольне кільце, тіадіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце, піразинове кільце {бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце і піразинове кільце кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи H} або триазольне кільце, яке необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи I.

[Варіант здійснення 12] Пропонована сполука N, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення 13] Пропонована сполука N, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення 14] Пропонована сполука N, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою GR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 15] Пропонована сполука N, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою GR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 16] Пропонована сполука N, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 17] Сполука за варіантом здійснення 1, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення 18] Сполука за варіантом здійснення 2, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 19] Сполука за варіантом здійснення 3, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення 20] Сполука за варіантом здійснення 4, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення 21] Сполука за варіантом здійснення 5, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення 22] Сполука за варіантом здійснення 1, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 23] Сполука за варіантом здійснення 2, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 24] Сполука за варіантом здійснення 3, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 25] Сполука за варіантом здійснення 4, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 26] Сполука за варіантом здійснення 5, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 27] Сполука за варіантом здійснення 1, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 28] Сполука за варіантом здійснення 2, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 29] Сполука за варіантом здійснення 3, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 30] Сполука за варіантом здійснення 4, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 31] Сполука за варіантом здійснення 5, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 32] Сполука за варіантом здійснення 1, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення 33] Сполука за варіантом здійснення 2, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 34] Сполука за варіантом здійснення 3, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 35] Сполука за варіантом здійснення 4, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 36] Сполука за варіантом здійснення 5, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 37] Пропонована сполука N, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 38] Пропонована сполука N, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 39] Сполука за варіантом здійснення 1, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 40] Сполука за варіантом здійснення 2, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 41] Сполука за варіантом здійснення 3, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 42] Сполука за варіантом здійснення 4, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 43] Сполука за варіантом здійснення 5, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 44] Сполука за варіантом здійснення 6, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 45] Сполука за варіантом здійснення 7, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 46] Сполука за варіантом здійснення 8, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 47] Сполука за варіантом здійснення 9, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 48] Сполука за варіантом здійснення 10, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 49] Сполука за варіантом здійснення 11, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 50] Сполука за варіантом здійснення 12, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 51] Сполука за варіантом здійснення 13, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 52] Сполука за варіантом здійснення 14, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 53] Сполука за варіантом здійснення 15, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 54] Сполука за варіантом здійснення 16, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 55] Сполука за варіантом здійснення 17, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 56] Сполука за варіантом здійснення 18, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 57] Сполука за варіантом здійснення 19, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 58] Сполука за варіантом здійснення 20, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 59] Сполука за варіантом здійснення 21, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 60] Сполука за варіантом здійснення 22, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 61] Сполука за варіантом здійснення 23, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 62] Сполука за варіантом здійснення 24, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 63] Сполука за варіантом здійснення 25, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 64] Сполука за варіантом здійснення 26, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 65] Сполука за варіантом здійснення 27, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 66] Сполука за варіантом здійснення 28, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 67] Сполука за варіантом здійснення 29, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 68] Сполука за варіантом здійснення 30, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 69] Сполука за варіантом здійснення 31, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 70] Сполука за варіантом здійснення 32, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 71] Сполука за варіантом здійснення 33, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 72] Сполука за варіантом здійснення 34, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 73] Сполука за варіантом здійснення 35, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 74] Сполука за варіантом здійснення 36, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення 75] Сполука за варіантом здійснення 1, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 76] Сполука за варіантом здійснення 2, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 77] Сполука за варіантом здійснення 3, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 78] Сполука за варіантом здійснення 4, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 79] Сполука за варіантом здійснення 5, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 80] Сполука за варіантом здійснення 6, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 81] Сполука за варіантом здійснення 7, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 82] Сполука за варіантом здійснення 8, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 83] Сполука за варіантом здійснення 9, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 84] Сполука за варіантом здійснення 10, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 85] Сполука за варіантом здійснення 11, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 86] Сполука за варіантом здійснення 12, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 87] Сполука за варіантом здійснення 13, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 88] Сполука за варіантом здійснення 14, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 89] Сполука за варіантом здійснення 15, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 90] Сполука за варіантом здійснення 16, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 91] Сполука за варіантом здійснення 17, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 92] Сполука за варіантом здійснення 18, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 93] Сполука за варіантом здійснення 19, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 94] Сполука за варіантом здійснення 20, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 95] Сполука за варіантом здійснення 21, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 96] Сполука за варіантом здійснення 22, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 97] Сполука за варіантом здійснення 23, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 98] Сполука за варіантом здійснення 24, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 99] Сполука за варіантом здійснення 25, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 100] Сполука за варіантом здійснення 26, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 101] Сполука за варіантом здійснення 27, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 102] Сполука за варіантом здійснення 28, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 103] Сполука за варіантом здійснення 29, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 104] Сполука за варіантом здійснення 30, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 105] Сполука за варіантом здійснення 31, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 106] Сполука за варіантом здійснення 32, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 107] Сполука за варіантом здійснення 33, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 108] Сполука за варіантом здійснення 34, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 109] Сполука за варіантом здійснення 35, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 110] Сполука за варіантом здійснення 36, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення 111] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де R^1 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; або OR^8 і R^8 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу.

[Варіант здійснення 112] Сполука за варіантом здійснення 111, де A^1 являє собою CR^{4a}, A^2 являє собою атом азоту, R^{4a} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один

або більшу кількість атомів галогену, атом галогену або атом водню і R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню.

[Варіант здійснення 113] Сполука за варіантом здійснення 111, де R^{4a} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, атом галогену або атом водню, B^1 являє собою CR^{6a} і комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d}; комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d}; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою CR^1 і R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню.

[Варіант здійснення 114] Сполука за варіантом здійснення 113, де A^1 являє собою CR^{4a} і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 115] Сполука за варіантом здійснення 111, де A^1 являє собою CH, A^2 являє собою атом азоту, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1.

[Варіант здійснення 116] Сполука за варіантом здійснення 111, де R^{4a} і R^{4b} означають атом галогену, B^1 являє собою CH і комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1.

[Варіант здійснення 117] Сполука за варіантом здійснення 111, де A^1 являє собою CH, A^2 являє собою атом азоту, B^1 являє собою CH і комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1.

[Варіант здійснення 118] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу або $S(O)_mCF_3$ і R^{4a} і R^{4b} означають атом галогену.

[Варіант здійснення 119] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH, B^4 являє собою CR^1 і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу або $S(O)_mCF_3$ і R^{4a} і R^{4b} означають атом галогену.

[Варіант здійснення 120] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу або $S(O)_mCF_3$, A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 121] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу або $S(O)_mCF_3$, A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 122] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, B^4 являє собою атом азоту, комбінація B^2 і B^3 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1 і B^3 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH і B^3 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу або $S(O)_mCF_3$, A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 123] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де R^1 являє собою C1-C3

фторалкільну групу, A^1 являє собою CH, A^2 являє собою атом азоту і R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} означають атом галогену.

[Варіант здійснення 124] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу і R^{4a} і R^{4b} означають атом галогену.

[Варіант здійснення 125] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 126] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу і R^{4a} і R^{4b} означають атом галогену.

[Варіант здійснення 127] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, B^4 являє собою атом азоту, комбінація B^2 і B^3 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1 і B^3 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH і B^3 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 128] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінація B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення 129] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення 1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука N, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 130] Сполука за варіантом здійснення 111, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 131] Сполука за варіантом здійснення 112, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 132] Сполука за варіантом здійснення 113, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 133] Сполука за варіантом здійснення 114, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 134] Сполука за варіантом здійснення 115, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 135] Сполука за варіантом здійснення 116, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 136] Сполука за варіантом здійснення 117, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 137] Сполука за варіантом здійснення 118, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 138] Сполука за варіантом здійснення 119, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 139] Сполука за варіантом здійснення 120, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 140] Сполука за варіантом здійснення 121, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 141] Сполука за варіантом здійснення 122, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 142] Сполука за варіантом здійснення 123, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 143] Сполука за варіантом здійснення 124, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 144] Сполука за варіантом здійснення 125, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 145] Сполука за варіантом здійснення 126, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 146] Сполука за варіантом здійснення 127, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 147] Сполука за варіантом здійснення 128, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення 148] Пропонована сполука N, де Z являє собою атом кисню, A^1 являє собою CH, A^2 являє собою атом азоту, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою трифторметильну групу, R^2 являє собою етильну групу, G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, G^4 являє собою CH, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожне являє собою циклопропільну групу, атом галогену, або атом водню і R^{3d} являє собою атом водню.

Приклади варіантів здійснення пропонованої сполуки P включають наступні.

[Варіант здійснення P1] Пропонована сполука P, де R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}, OR^{12}, атом водню або атом галогену, якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення P2] Пропонована сполука P, де R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену, якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d} об'єднували разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення P3] Пропонована сполука P, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення P4] Сполука за варіантом здійснення P1, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення P5] Сполука за варіантом здійснення P2, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення P6] Пропонована сполука P, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення P7] Сполука за варіантом здійснення P1, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення P8] Сполука за варіантом здійснення P2, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення P9] Пропонована сполука P, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу

{фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}, OR^{12}, CR^{30}=NOR^{17}, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення P10] Пропонована сполука P, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення P11] Пропонована сполука P, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, оксадіазольне кільце, тіадіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце, піразинове кільце {бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце і піразинове кільце кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи H} або триазольне кільце, яке необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи I.

[Варіант здійснення P12] Пропонована сполука P, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення P13] Пропонована сполука P, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення P14] Пропонована сполука P, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P15] Пропонована сполука P, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P16] Пропонована сполука P, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P17] Сполука за варіантом здійснення P1, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення P18] Сполука за варіантом здійснення P2, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або H; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P19] Сполука за варіантом здійснення P3, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення P20] Сполука за варіантом здійснення P4, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення P21] Сполука за варіантом здійснення P5, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення P22] Сполука за варіантом здійснення P1, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P23] Сполука за варіантом здійснення P2, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P24] Сполука за варіантом здійснення P3, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P25] Сполука за варіантом здійснення P4, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P26] Сполука за варіантом здійснення P5, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P27] Сполука за варіантом здійснення P1, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P28] Сполука за варіантом здійснення P2, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P29] Сполука за варіантом здійснення P3, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P30] Сполука за варіантом здійснення P4, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P31] Сполука за варіантом здійснення P5, де G^1 являє собою атом азоту, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P32] Сполука за варіантом здійснення P1, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P33] Сполука за варіантом здійснення P2, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P34] Сполука за варіантом здійснення P3, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P35] Сполука за варіантом здійснення P4, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P36] Сполука за варіантом здійснення P5, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P37] Пропонована сполука P, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P38] Пропонована сполука P, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P39] Сполука за варіантом здійснення P1, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P40] Сполука за варіантом здійснення P2, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P41] Сполука за варіантом здійснення P3, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P42] Сполука за варіантом здійснення P4, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P43] Сполука за варіантом здійснення P5, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P44] Сполука за варіантом здійснення P6, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P45] Сполука за варіантом здійснення P7, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P46] Сполука за варіантом здійснення P8, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P47] Сполука за варіантом здійснення P9, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P48] Сполука за варіантом здійснення P10, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P49] Сполука за варіантом здійснення P11, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P50] Сполука за варіантом здійснення P12, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P51] Сполука за варіантом здійснення P13, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P52] Сполука за варіантом здійснення P14, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P53] Сполука за варіантом здійснення P15, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P54] Сполука за варіантом здійснення P16, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P55] Сполука за варіантом здійснення P17, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P56] Сполука за варіантом здійснення P18, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P57] Сполука за варіантом здійснення P19, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P58] Сполука за варіантом здійснення P20, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P59] Сполука за варіантом здійснення P21, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P60] Сполука за варіантом здійснення P22, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P61] Сполука за варіантом здійснення P23, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P62] Сполука за варіантом здійснення P24, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P63] Сполука за варіантом здійснення P25, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P64] Сполука за варіантом здійснення P26, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P65] Сполука за варіантом здійснення P27, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P66] Сполука за варіантом здійснення P28, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P67] Сполука за варіантом здійснення P29, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P68] Сполука за варіантом здійснення P30, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P69] Сполука за варіантом здійснення P31, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P70] Сполука за варіантом здійснення P32, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P71] Сполука за варіантом здійснення P33, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P72] Сполука за варіантом здійснення P34, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P73] Сполука за варіантом здійснення P35, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P74] Сполука за варіантом здійснення P36, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення P75] Сполука за варіантом здійснення P1, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P76] Сполука за варіантом здійснення P2, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P77] Сполука за варіантом здійснення P3, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P78] Сполука за варіантом здійснення P4, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P79] Сполука за варіантом здійснення P5, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P80] Сполука за варіантом здійснення P6, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P81] Сполука за варіантом здійснення P7, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P82] Сполука за варіантом здійснення P8, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P83] Сполука за варіантом здійснення P9, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P84] Сполука за варіантом здійснення P10, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P85] Сполука за варіантом здійснення P11, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P86] Сполука за варіантом здійснення P12, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P87] Сполука за варіантом здійснення P13, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P88] Сполука за варіантом здійснення P14, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P89] Сполука за варіантом здійснення P15, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P90] Сполука за варіантом здійснення P16, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P91] Сполука за варіантом здійснення P17, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P92] Сполука за варіантом здійснення P18, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P93] Сполука за варіантом здійснення P19, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P94] Сполука за варіантом здійснення P20, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P95] Сполука за варіантом здійснення P21, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P96] Сполука за варіантом здійснення P22, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P97] Сполука за варіантом здійснення P23, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P98] Сполука за варіантом здійснення P24, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P99] Сполука за варіантом здійснення P25, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P100] Сполука за варіантом здійснення P26, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P101] Сполука за варіантом здійснення P27, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P102] Сполука за варіантом здійснення P28, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P103] Сполука за варіантом здійснення P29, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P104] Сполука за варіантом здійснення P30, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P105] Сполука за варіантом здійснення P31, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P106] Сполука за варіантом здійснення P32, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P107] Сполука за варіантом здійснення P33, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P108] Сполука за варіантом здійснення P34, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P109] Сполука за варіантом здійснення P35, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P110] Сполука за варіантом здійснення P36, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P111] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де R1 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; або OR^8, R^8 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу.

[Варіант здійснення P112] Сполука за варіантом здійснення P111, де A^1 являє собою CR^{4a}, A^2 являє собою атом азоту, R^{4a} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, атом галогену або атом водню, R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню.

[Варіант здійснення P113] Сполука за варіантом здійснення P111, де R^{4a} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, B^1 являє собою CR^{6a}, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CR^{6c}, B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d}; комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d}; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою CR^1 і R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню.

[Варіант здійснення P114] Сполука за варіантом здійснення P113, де A^1 являє собою CR^{4a} і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P115] Сполука за варіантом здійснення P111, де A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1.

[Варіант здійснення P116] Сполука за варіантом здійснення P111, де R^{4a} і R^{4b} означають атом галогену, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1.

[Варіант здійснення P117] Сполука за варіантом здійснення P111, де A^1 являє собою CH, A^2 являє собою атом азоту, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1.

[Варіант здійснення P118] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1, B^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу і R^{4a} і R^{4b} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення P119] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$ і R^{4a} і R^{4b} означають атом галогену.

[Варіант здійснення P120] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P121] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$, A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P122] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де B^1 являє собою CH, B^4 являє собою атом азоту, комбінація B^2 і B^3 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1 і B^3 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH і B^3 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P123] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де R^1 являє собою C1-

C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$, A^1 являє собою CH, A^2 являє собою атом азоту і R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} означають атом галогену.

[Варіант здійснення P124] Сполука за варіантом здійснення P111, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту, R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню.

[Варіант здійснення P125] Сполука за варіантом здійснення P124, де B^1 являє собою CR^{6a}, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d}; комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b} і B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d}; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою CR^1.

[Варіант здійснення P126] Сполука за варіантом здійснення P124, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1.

[Варіант здійснення P127] Сполука за варіантом здійснення P124, де B1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1.

[Варіант здійснення P128] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1 і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу.

[Варіант здійснення P129] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1 і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$.

[Варіант здійснення P130] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту, B^1 являє собою CH, B^4 являє собою атом азоту, комбінація B^2 і B^3 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1 і B^3 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH і B^3 являє собою CR^1 і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу.

[Варіант здійснення P131] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення P110 або пропонована сполука P, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$ і R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} означають атом галогену.

[Варіант здійснення P132] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P1 до варіанта здійснення 110 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P133] Сполука за варіантом здійснення P111 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P134] Сполука за варіантом здійснення P112 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P135] Сполука за варіантом здійснення P113 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P136] Сполука за варіантом здійснення P114 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P137] Сполука за варіантом здійснення P115 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P138] Сполука за варіантом здійснення P116 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P139] Сполука за варіантом здійснення P117 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P140] Сполука за варіантом здійснення P118 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P141] Сполука за варіантом здійснення P119 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P142] Сполука за варіантом здійснення P120 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P143] Сполука за варіантом здійснення P121 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P144] Сполука за варіантом здійснення P122 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P145] Сполука за варіантом здійснення P123 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P146] Сполука за варіантом здійснення P124 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P147] Сполука за варіантом здійснення P125 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P148] Сполука за варіантом здійснення P126 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P149] Сполука за варіантом здійснення P127 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P150] Сполука за варіантом здійснення P128 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P151] Сполука за варіантом здійснення P129 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P152] Сполука за варіантом здійснення P130 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P153] Сполука за варіантом здійснення P131 або пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню.

[Варіант здійснення P2-1] Пропонована сполука P, де Z являє собою атом кисню, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1, B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість атомів галогену, $S(O)mR^8$, OR^8, або атом галогену, R^8 являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість атомів галогену.

[Варіант здійснення P2-2] Сполука за варіантом здійснення P2-1, де комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P2-3] Сполука за варіантом здійснення P2-1, де A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту або CH.

[Варіант здійснення P2-4] Сполука за варіантом здійснення P2-2, де A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту або CH.

[Варіант здійснення P2-5] Сполука за варіантом здійснення P2-1, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P2-6] Сполука за варіантом здійснення P2-2, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P2-7] Пропонована сполука P, де R^2 являє собою етильну групу, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C4 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, фенільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи P}, OR^{12}, атом водню або атом галогену, R^{12} являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C4 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, G^4 являє собою CR^{3d} або атом азоту, якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце, яке необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи P,

Група P: група, яка включає C1-C3 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C1-C3 алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену.

[Варіант здійснення P2-8] Пропонована сполука P, де R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C4 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, фенільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, піридильна група і піримідинільна група необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи P}, OR^{12}, атом водню або атом галогену, R^{12} являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C4 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, G^4 являє собою CH або атом азоту.

[Варіант здійснення P2-9] Сполука за варіантом здійснення P2-7, де Z являє собою атом кисню, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість атомів галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8, або атом галогену, R^8 являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість атомів галогену.

[Варіант здійснення P2-10] Сполука за варіантом здійснення P2-8, де Z являє собою атом кисню, B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CH, B^4 являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість атомів галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8, або атом галогену і R^8 являє собою C1-C3 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більшу кількість атомів галогену.

[Варіант здійснення P2-11] Сполука за варіантом здійснення P2-7, де комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P2-12] Сполука за варіантом здійснення P2-8, де комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CH, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P2-13] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P2-7, де A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту або CH.

[Варіант здійснення P2-14] Сполука за варіантом здійснення P2-8, де A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту або CH.

[Варіант здійснення P2-15] Сполука за варіантом здійснення P2-9, де A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту або CH.

[Варіант здійснення P2-16] Сполука за варіантом здійснення P2-10, де A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту або CH.

[Варіант здійснення P2-17] Сполука за варіантом здійснення P2-11, де A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту або CH.

[Варіант здійснення P2-18] Сполука за варіантом здійснення P2-7, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P2-19] Сполука за варіантом здійснення P2-8, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P2-20] Сполука за варіантом здійснення P2-9, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P2-21] Сполука за варіантом здійснення P2-10, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P2-22] Сполука за варіантом здійснення P2-11, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту.

[Варіант здійснення P2-23] Пропонована сполука P або сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P2-1 до варіанта здійснення P2-22, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення P2-24] Пропонована сполука P або сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P2-1 до варіанта здійснення P2-22, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення P2-25] Пропонована сполука P або сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P2-1 до варіанта здійснення P2-22, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1 і R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P2-26] Пропонована сполука P або сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P2-1 до варіанта здійснення P2-22, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2 і R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення P2-27] Пропонована сполука P або сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P2-1 до варіанта здійснення P2-22, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^2 являє собою етильну групу і n дорівнює 2.

[Варіант здійснення P2-28] Пропонована сполука P або сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення P2-1 до варіанта здійснення P2-22, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2, R^2 являє собою етильну групу і n дорівнює 2.

[Варіант здійснення P3-1] Пропонована сполука P, де комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CH і B^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення P3-2] Пропонована сполука P, де A^1 являє собою CH і A^2 являє собою атом азоту або CH.

[Варіант здійснення P3-3] Пропонована сполука P, де A^1 і A^2 являє собою атом азоту.

Приклади варіантів здійснення проміжної сполуки A включають наступні.

[Варіант здійснення A1] Проміжна сполука A, де R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}, OR^{12}, CR^{30}=NOR^{17}, атом водню або атом галогену, якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1 і R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення A2] Проміжна сполука A, де R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену, якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1 і R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення A3] Сполука за варіантом здійснення A1, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення A4] Сполука за варіантом здійснення A2, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

{Варіант здійснення A5] Сполука за варіантом здійснення A1, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

{Варіант здійснення A6] Сполука за варіантом здійснення A2, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення A7] Проміжна сполука A, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}.

[Варіант здійснення A8] Проміжна сполука A, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення 9] Проміжна сполука A, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких

вони приєднані, утворюють бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, оксадіазольне кільце, тіадіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце, піразинове кільце {бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце і піразинове кільце кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи H} або триазольне кільце, яке необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи I.

[Варіант здійснення A10] Проміжна сполука A, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення A11] Проміжна сполука A, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення A12] Проміжна сполука A, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення A13] Сполука за варіантом здійснення A1, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення A14] Сполука за варіантом здійснення A2, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення A15] Сполука за варіантом здійснення A3, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення A16] Сполука за варіантом здійснення A4, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення A17] Сполука за варіантом здійснення A1, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення A18] Сполука за варіантом здійснення A2, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення A19] Сполука за варіантом здійснення A3, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення A20] Сполука за варіантом здійснення A4, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення A21] Проміжна сполука A, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A22] Проміжна сполука A, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A23] Сполука за варіантом здійснення A1, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A24] Сполука за варіантом здійснення A2, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A25] Сполука за варіантом здійснення A3, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A26] Сполука за варіантом здійснення A4, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A27] Сполука за варіантом здійснення A5, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A28] Сполука за варіантом здійснення A6, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A29] Сполука за варіантом здійснення A7, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A30] Сполука за варіантом здійснення A8, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A31] Сполука за варіантом здійснення A9, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A32] Сполука за варіантом здійснення A10, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A33] Сполука за варіантом здійснення A11, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A34] Сполука за варіантом здійснення A12, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A35] Сполука за варіантом здійснення A13, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A36] Сполука за варіантом здійснення A14, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A37] Сполука за варіантом здійснення A15, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A38] Сполука за варіантом здійснення A16, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A39] Сполука за варіантом здійснення A17, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A40] Сполука за варіантом здійснення A18, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A41] Сполука за варіантом здійснення A19, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A42] Сполука за варіантом здійснення A20, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення A43] Сполука за варіантом здійснення A1, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A44] Сполука за варіантом здійснення A2, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A45] Сполука за варіантом здійснення A3, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A46] Сполука за варіантом здійснення A4, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A47] Сполука за варіантом здійснення A5, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A48] Сполука за варіантом здійснення A6, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A49] Сполука за варіантом здійснення A7, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A50] Сполука за варіантом здійснення A8, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A51] Сполука за варіантом здійснення A9, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A52] Сполука за варіантом здійснення A10, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A53] Сполука за варіантом здійснення A11, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A54] Сполука за варіантом здійснення A12, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A55] Сполука за варіантом здійснення A13, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A56] Сполука за варіантом здійснення A14, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A57] Сполука за варіантом здійснення A15, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A58] Сполука за варіантом здійснення A16, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A59] Сполука за варіантом здійснення A17, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A60] Сполука за варіантом здійснення A18, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A61] Сполука за варіантом здійснення A19, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A62] Сполука за варіантом здійснення A20, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення A63] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення A1 до варіанта здійснення A62 або проміжна сполука A, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^1, R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню, R^1 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; або OR^8, R^8 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу.

[Варіант здійснення A64] Сполука за варіантом здійснення A1 до варіанта здійснення A62 або проміжна сполука A, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^1, R^{6bb}, R^{6cc}и R^{6dd} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу або $S(O)mCF_3$.

[Варіант здійснення A65] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення A1 до варіанта здійснення A62 або проміжна сполука A, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR1 і B^{4d} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c}являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу або $S(O)_mCF_3$.

[Варіант здійснення A66] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення A1 до варіанта здійснення A62 або проміжна сполука A, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу.

[Варіант здійснення A67] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення A1 до варіанта здійснення A62 або проміжна сполука A, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1 і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу.

[Варіант здійснення A68] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення A1 до варіанта здійснення A62 або проміжна сполука A, де B^{4d} являє собою атом азоту, комбінація B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1 і B^{3c} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH і B^{3c} являє собою CR^1 і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу.

[Варіант здійснення A69] Проміжна сполука A, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1, R^1 являє собою трифторметильну групу, R^2 являє собою етильну групу, G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожне являє собою циклопропільну групу, атом галогену або атом водню і R^{3d} являє собою атом водню.

Приклади варіантів здійснення проміжної сполуки B включають наступні.

[Варіант здійснення B1] Проміжна сполука B, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом

азоту або CR^{6dd}; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^{1}, комбінацію, в якій R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню, R^{1} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; або OR^8, R^8 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу і R^{4aa} являє собою атом галогену або атом водню.

[Варіант здійснення B2] Проміжна сполука B, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{1}, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{1} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^{1}; R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню, R^{1} являє собою C1-C3 фторалкільну групу або $S(O)_mCF^3$ і R^{4aa} являє собою атом галогену або атом водню.

[Варіант здійснення B3] Проміжна сполука B, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{1}, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^{1} і B^{4d} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^{1} і R^{1} являє собою C1-C3 фторалкільну групу або $S(O)_mCF_3$.

[Варіант здійснення B4] Проміжна сполука B, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{1}, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^{1} і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^{1}, R^{1} являє собою C1-C3 фторалкільну групу і R^{4aa} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення B5] Проміжна сполука B, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{1}, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c}являє собою CR^{1} і B^{4d} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c}являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^{1}, R^{1} являє собою C1-C3 фторалкільну групу і R^{4aa} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення B6] Проміжна сполука B, де B^{4d} являє собою атом азоту, комбінація B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{1} і B^{3c} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH і B^{3c} являє собою CR^{1}, R^{1} являє собою C1-C3 фторалкільну групу і R^{4aa} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення B7] Проміжна сполука B, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення B8] Проміжна сполука B, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення B9] Сполука за варіантом здійснення B1, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення B10] Сполука за варіантом здійснення B2, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення B11] Сполука за варіантом здійснення B3, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення B12] Сполука за варіантом здійснення B4, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення B13] Сполука за варіантом здійснення B5, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення B14] Сполука за варіантом здійснення B6, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення B15] Сполука за варіантом здійснення B1, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення B16] Сполука за варіантом здійснення B2, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення B17] Сполука за варіантом здійснення B3, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення B18] Сполука за варіантом здійснення B4, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення B19] Сполука за варіантом здійснення B5, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення B20] Сполука за варіантом здійснення B6, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення B21] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення B1 до варіанта здійснення B20 або проміжна сполука B, де R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}, OR^{12}, CR^{30}=NOR^{17}, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення B22] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення B1 до варіанта здійснення 20 або проміжна сполука B, де R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення B23] Проміжна сполука B, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1, R^1 являє собою трифторметильну групу, G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, G^4 являє собою CH, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожне являє собою циклопропільну групу, атом галогену або атом водню, R^{3d} являє собою атом водню і R^{4aa} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення B24] Сполука за варіантом здійснення B21, де R^{33} являє собою атом галогену.

[Варіант здійснення B25] Сполука за варіантом здійснення B21, де R^{33} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення B26] Сполука за варіантом здійснення B22, де R^{33} являє собою атом галогену.

[Варіант здійснення B27] Сполука за варіантом здійснення B22, де R^{33} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення B28] Сполука за варіантом здійснення B23, де R^{33} являє собою атом галогену.

[Варіант здійснення B29] Сполука за варіантом здійснення B23, де R^{33} являє собою атом водню.

Приклади варіантів здійснення проміжної сполуки C включають наступні.

[Варіант здійснення C1] Проміжна сполука C, де R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}, OR^{12}, CR^{30}=NOR^{17}, атом водню або атом галогену, якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення C2] Проміжна сполука C, де R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену,

якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення C3] Сполука за варіантом здійснення C1, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення C4] Сполука за варіантом здійснення C2, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

[Варіант здійснення C5] Сполука за варіантом здійснення C1, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення C6] Сполука за варіантом здійснення C2, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

[Варіант здійснення C7] Проміжна сполука C, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}.

[Варіант здійснення C8] Проміжна сполука C, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення C9] Проміжна сполука C, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, оксадіазольне кільце, тіадіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце, піразинове кільце {бензольне кільце, пірольне кільце, фуранове кільце, тіофенове кільце, піразольне кільце, імідазольне кільце, оксазольне кільце, ізоксазольне кільце, тіазольне кільце, ізотіазольне кільце, піридинове кільце, піридазинове кільце, піримідинове кільце і піразинове кільце кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи H} або триазольне кільце, яке необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи I.

[Варіант здійснення C10] Проміжна сполука C, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце {бензольне кільце необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, і атом галогену}.

[Варіант здійснення C11] Проміжна сполука C, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення C12] Проміжна сполука C, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення C13] Сполука за варіантом здійснення C1, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення C14] Сполука за варіантом здійснення C2, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення C15] Сполука за варіантом здійснення C3, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення C16] Сполука за варіантом здійснення C4, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c}, комбінація G1 і G4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення C17] Сполука за варіантом здійснення C1, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення C18] Сполука за варіантом здійснення C2, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення C19] Сполука за варіантом здійснення C3, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення C20] Сполука за варіантом здійснення C4, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення C21] Проміжна сполука C, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C22] Проміжна сполука C, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C23] Сполука за варіантом здійснення C1, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C24] Сполука за варіантом здійснення C2, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C25] Сполука за варіантом здійснення C3, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C26] Сполука за варіантом здійснення C4, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C27] Сполука за варіантом здійснення C5, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C28] Сполука за варіантом здійснення C6, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C29] Сполука за варіантом здійснення C7, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C30] Сполука за варіантом здійснення C8, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C31] Сполука за варіантом здійснення C9, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C32] Сполука за варіантом здійснення C10, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C33] Сполука за варіантом здійснення C11, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C34] Сполука за варіантом здійснення C12, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C35] Сполука за варіантом здійснення C13, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C36] Сполука за варіантом здійснення C14, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C37] Сполука за варіантом здійснення C15, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C38] Сполука за варіантом здійснення C16, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C39] Сполука за варіантом здійснення C17, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C40] Сполука за варіантом здійснення C18, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C41] Сполука за варіантом здійснення C19, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C42] Сполука за варіантом здійснення C20, де R^2 являє собою C1-C6 алкільну групу.

[Варіант здійснення C43] Сполука за варіантом здійснення C1, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C44] Сполука за варіантом здійснення C2, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C45] Сполука за варіантом здійснення C3, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C46] Сполука за варіантом здійснення C4, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C47] Сполука за варіантом здійснення C5, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C48] Сполука за варіантом здійснення C6, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C49] Сполука за варіантом здійснення C7, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C50] Сполука за варіантом здійснення C8, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C51] Сполука за варіантом здійснення C9, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C52] Сполука за варіантом здійснення C10, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C53] Сполука за варіантом здійснення C11, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C54] Сполука за варіантом здійснення C12, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C55] Сполука за варіантом здійснення C13, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C56] Сполука за варіантом здійснення C14, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C57] Сполука за варіантом здійснення C15, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C58] Сполука за варіантом здійснення C16, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C59] Сполука за варіантом здійснення C17, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C60] Сполука за варіантом здійснення C18, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C61] Сполука за варіантом здійснення C19, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C62] Сполука за варіантом здійснення C20, де R^2 являє собою етильну групу.

[Варіант здійснення C63] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення C1 до варіанта здійснення C62 або проміжна сполука C, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^1, R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню, R^1 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; або OR^8, R^8 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу.

[Варіант здійснення C64] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення C1 до варіанта здійснення C62 або проміжна сполука C, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^1, R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$.

[Варіант здійснення C65] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення C1 до варіанта здійснення C62 або проміжна сполука C, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$.

[Варіант здійснення C66] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення C1 до варіанта здійснення C62 або проміжна сполука C, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH, B^{4d} являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1 і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF^3$.

[Варіант здійснення C67] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення C1 до варіанта здійснення C62 або проміжна сполука C, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1 і R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$.

[Варіант здійснення C68] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення C1 до варіанта здійснення C62 або проміжна сполука C, де B^{4d} являє собою атом азоту, комбінація B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1 і B^{3c} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH і B^{3c} являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$.

Приклади варіантів здійснення проміжної сполуки D включають наступні.

[Варіант здійснення D1] Проміжна сполука D, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^1, R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню, R^1 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; або OR^8, R^8 являє собою C1-C6 алкільну групу, яка містить один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу і R^{4aa} являє собою атом галогену або атом водню.

[Варіант здійснення D2] Проміжна сполука D, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^1, R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd}являються однаковими або різними і кожне являє собою атом галогену або атом водню, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$ і R^{4aa} являє собою атом галогену або атом водню.

[Варіант здійснення D3] Проміжна сполука D, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$.

[Варіант здійснення D4] Проміжна сполука D, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$ і R^{4aa} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення D5] Проміжна сполука D, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$ і R^{4aa} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення D6] Проміжна сполука D, де B^{4d} являє собою атом азоту, комбінація B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1 і B^{3c} являє собою CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH і B^{3c} являє собою CR^1, R^1 являє собою C1-C3 фторалкільну групу, C1-C3 фторалкоксигрупу або $S(O)_mCF_3$ і R^{4aa} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення D7] Проміжна сполука D, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою, G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення D8] Проміжна сполука D, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення D9] Сполука за варіантом здійснення D1, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a}, G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення D10] Сполука за варіантом здійснення D2, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення D11] Сполука за варіантом здійснення D3, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення D12] Сполука за варіантом здійснення D4, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення D13] Сполука за варіантом здійснення D5, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення D14] Сполука за варіантом здійснення D6, де G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CR^{3a} і G^4 являє собою CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d}.

[Варіант здійснення D15] Сполука за варіантом здійснення D1, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення D16] Сполука за варіантом здійснення D2, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення D17] Сполука за варіантом здійснення D3, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення D18] Сполука за варіантом здійснення D4, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення D19] Сполука за варіантом здійснення D5, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення D20] Сполука за варіантом здійснення D6, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

[Варіант здійснення D21] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення D1 до варіанта здійснення D20 або проміжна сполука D, де R^{3a} являє собою атом водню, R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, C2-C6 алкенільну групу, C3-C7 циклоалкільну групу {C1-C6 алкільна група, C2-C6 алкенільна група і C3-C7 циклоалкільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу}, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідинільну групу {фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідинільна група кожна необов'язково може містити один або більшу кількість замісників, вибраних з групи J}, OR^{12}, $CR^{30}{=}NOR^{17}$, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення D22] Сполука за будь-яким з варіантів здійснення від варіанта здійснення D1 до варіанта здійснення D20 або проміжна сполука D, де R^{3a} і R^{3d} означають атом галогену, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 алкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену.

[Варіант здійснення D23] Проміжна сполука D, де комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою CH, B^{4d} являє собою атом азоту або CH; комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CR^1, B^{4d} являє собою атом азоту або CH; або комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CH, B^{3c} являє собою CH і B^{4d} являє собою CR^1, R^1 являє собою трифторметильну групу, G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожне являє собою циклопропільну групу, атом галогену або атом водню, R^{3d} являє собою атом водню і R^{4aa} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення D24] Сполука за варіантом здійснення D21, де R^{33} являє собою атом галогену.

[Варіант здійснення D25] Сполука за варіантом здійснення D21, де R^{33} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення D26] Сполука за варіантом здійснення D22, де R^{33} являє собою атом галогену.

[Варіант здійснення D27] Сполука за варіантом здійснення D22, де R^{33} являє собою атом водню.

[Варіант здійснення D28] Сполука за варіантом здійснення D23, де R^{33} являє собою атом галогену.

[Варіант здійснення D29] Сполука за варіантом здійснення D23, де R^{33} являє собою атом водню.

Далі описана методика отримання сполуки X, яка пропонується в даному винаході.

Методика 1

Сполуку, представлену формулою (I-b) (яка нижче в даному винаході називається сполука (I-b)) або сполуку, представлену формулою (I-c) (яка нижче в даному винаході називається сполука (I-c)) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (I-a) (нижче в даному винаході, сполука (I-a)), з окиснювальним реагентом.



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Спочатку описана методика отримання сполуки (I-b) зі сполуки (I-a).

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинника, який використовується в реакції, включають галогеновані вуглеводні, такі як дихлорметан і хлороформ (які нижче в даному винаході спільно називаються галогенованими вуглеводнями); нітрили, такі як ацетонітрил (які нижче в даному винаході спільно називаються нітрилами); спирти, такі як метанол і етанол (які нижче в даному винаході спільно називаються спиртами; оцтова кислота; вода; і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади окиснювального реагенту, який використовується в реакції, включають перйодат натрію, м-хлорпероксибензойну кислоту (яка нижче в даному винаході позначається як mCPBA) і пероксид водню.

Якщо пероксид водню використовують як окиснювальний реагент, за необхідністю можна додати основу або каталізатор.

Приклади основи включають карбонат натрію.

Якщо основу використовують в реакції, основу звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 1 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (I-a).

Приклади каталізатора, який використовується в реакції, включають вольфрамову кислоту і вольфрамат натрію. Якщо каталізатор використовують в реакції, каталізатор звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 0,5 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (I-a).

В реакції окиснювальний реагент звичайно використовують в діапазоні від 1 до 1,2 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (I-a).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від -20 до 80 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,1 до 12 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками), і за необхідністю органічні шари промивають водним розчином відновлювального реагенту (такого як сульфіт натрію і тіосульфат натрію) і водним розчином основи (такої як гідрокарбонат натрію). Отримані органічні шари сушать і концентрують і отримують сполуку (I-b).

Далі описана методика отримання сполуки (I-c) зі сполуки (I-b).

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають галогеновані вуглеводні, нітрили, спирти, оцтову кислоту, воду і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади окиснювального реагенту, який використовується в реакції, включають mCPBA і пероксид водню.

В реакції окиснювальний реагент звичайно використовують в діапазоні від 1 до 2 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (I-b).

Якщо пероксид водню використовують як окиснювальний реагент, за необхідністю можна додати основу або каталізатор.

Приклади основи, яка використовується в реакції, включають карбонат натрію.

Якщо основу використовують в реакції, основу звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 1 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (I-b).

Приклади каталізатора, який використовується в реакції, включають вольфрамат натрію.

Якщо каталізатор використовують в реакції, основу звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 0,5 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (I-b).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від -20 до 120 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,1 до 12 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками), і за необхідністю органічні шари промивають водним розчином відновлювального реагенту (такого як сульфіт натрію і тіосульфат натрію) і водним розчином основи (такої як гідрокарбонат натрію). Отримані органічні шари сушать і концентрують і отримують сполуку (I-c).

Крім того, сполуку (I-c) можна отримати по реакції сполуки (I-a) з окиснювальним реагентом в одну стадію (в однореакторному режимі).

Реакцію можна провести шляхом використання окиснювального реагенту в діапазоні від 2 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (I-a) за методикою отримання сполуки (I-c) зі сполуки (I-b).

Методика 2

Сполуку, представлену формулою (II-b) (яка нижче в даному винаході називається сполука (II-b)) або сполуку, представлену формулою (II-c) (яка нижче в даному винаході називається сполука (II-c)), можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (II-a)) (яка нижче в даному винаході називається сполука (II-a)) з окиснювальним реагентом.



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Ці реакції можна провести за методикою 1.

Методика 3

Сполуку, представлену формулою (I-S) (яка нижче в даному винаході називається сполука (I-S)), можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (I-O) (яка нижче в даному винаході називається сполука (I-O)), з сульфуруючим реагентом.



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію здійснюють в присутності або відсутності розчинника. Приклади розчинника, який використовується в реакції, включають прості ефіри, такі як тетрагідрофуран (який нижче в даному винаході позначається як THF), 1,2-диметоксіетан (який нижче в даному винаході

позначається як DME), метил-трет-бутиловий ефір (який нижче в даному винаході позначається як MTBE) і діетиловий ефір (які нижче в даному винаході спільно називаються простими ефірами), галогеновані вуглеводні: ароматичні вуглеводні, такі як толуол і ксилол (які нижче в даному винаході називаються ароматичні вуглеводні); нітрили; азотовмісні ароматичні сполуки, такі як піридин, піколін, лутидин і хінолін (які нижче в даному винаході спільно називаються азотовмісними ароматичними сполуками); і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади сульфуруючого реагенту, який використовується в реакції, включають дипентасульфід фосфору, реагент Лавессона (2,4-біс-(4-метоксифеніл)-1,3-дитіа-2,4-дифосфетан 2,4-дисульфід) і т. п.

В реакції сульфуруючий реагент звичайно використовують в діапазоні від 1 до 3 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (I-O).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0 до 200 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 1 до 24 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні шари обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (I-S).

Методика 4

Сполуку (I-O) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-1) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-1)), зі сполукою, яка описується формулою (M-2) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-2)) в присутності основи.



(M-1) (M-2) (I-O) ,

[де X^a являє собою атом галогену і інші символи є такими, як визначено вище].

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають прості ефіри; ароматичні вуглеводні; нітрили; полярні апротонні розчинники, такі як диметилформамід (нижче в даному винаході позначається DMF), N-метилпіролідон (нижче в даному винаході позначається NMP) і диметилсульфоксид (нижче в даному винаході позначається DMSO) (які нижче в даному винаході спільно називаються полярними апротонними розчинниками); і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади основи включають органічні основи, такі як триетиламін, діізопропілетиламін, піридин і 4-диметиламінопіридин (які нижче в даному винаході спільно називаються полярними органічними основами); карбонати лужних металів, такі як карбонат натрію, і карбонат калію (які нижче в даному винаході спільно називаються карбонатами лужних металів); і гідриди лужних металів, такі як гідрид натрію (які нижче в даному винаході спільно називаються гідридами лужних металів).

В реакції сполуку (M-2) звичайно використовують в діапазоні від 0,8 до 1,2 моля і основу звичайно використовують в діапазоні від 1 до 3 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-1).

В реакції за необхідністю можна використовувати каталізатор на основі металу. Приклади каталізатора на основі металу включають каталізатори на основі міді, такі як йодид міді(I), бромід міді(I), бромід міді(I), оксид міді(I), комплекс трифторметансульфонату міді(I) з бензолом, тетракіс(ацетонітрил)гексафторфосфат міді(I) і 2-тіофенкарбоксилат міді(I); і каталізатори на основі нікелю, такі як біс(циклооктадієн)нікель(0) і хлорид нікелю(II); каталізатори на основі паладію, такі як ацетат паладію(II), тетракіс(трифенілфосфін)паладій(0), і тріс(дибензиліденацетон)дипаладій(II).

Якщо каталізатор на основі металу використовують в реакції, каталізатор на основі металу звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 0,5 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (M-1).

В реакції за необхідністю можна використовувати ліганд. Приклади ліганду включають трифенілфосфін, 4,5-біс(дифенілфосфіно)-9,9-диметилксантен (нижче в даному винаході позначається як Xantphos), 2,2'-біс(дифенілфосфіно)-1,1'-бінафтил, 1,1'-біс(дифенілфосфіно)фероцен, 2-дициклогексилфосфіно-2',4',6'-триізопропілбіфеніл, 2-

дициклогексилфосфіно-2',6'-диметоксибіфеніл, 1,2-біс(дифенілфосфіно)етан, 2,2'-біпіридин, 2-аміноетанол, 8-гідроксихінолін, 1,10-фенантролін, транс-1,2-циклогександіамін, транс-N,N'-диметилгексан-1,2-діамін, N,N'-діетилендіамін і т. п.

Якщо ліганд використовують в реакції, ліганд використовують в діапазоні від 0,01 до 0,5 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (M-1).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від -20 до 150 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,5 до 24 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні розчини обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (I-O).

Сполука (M-1) є в продажу або її можна отримати по добре відомій методиці.

Методика 5

Сполуку, представлену формулою (I-O-a) (яка нижче в даному винаході називається сполука (I-O-a)), можна отримати по наведеній нижче схемі.



[де X^b являє собою атом фтору, атом хлору, або атом брому і інші символи є такими, як визначено вище].

Сполуку, представлену формулою (M-4) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-4)), можна отримати з використанням сполуки, яка описується формулою (M-3) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-3)) замість сполуки (M-2) за методикою 4.

Сполука (M-3) загальновідома або її можна отримати за методикою, описаною, наприклад, в WO 2015/187845.

Сполуку (I-O-a) можна отримати по реакції сполуки (M-4) зі сполукою, яка описується формулою (R-1) (яка нижче в даному винаході називається сполука (R-1)), в присутності основи.

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають прості ефіри, ароматичні вуглеводні, нітрили, полярні апротонні розчинники, воду і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади основ, які використовуються в реакції, включають карбонати лужних металів, гідриди лужних металів і органічні основи.

В реакції сполуку (R-1) звичайно використовують в діапазоні від 1 до 3 молів і основу звичайно використовують в діапазоні від 1 до 3 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-4).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від -20 до 150 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,5 до 24 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні розчини обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (I-O-a).

Сполука (R-3) є в продажу або її можна отримати за добре відомою методикою.

Методика 6

Сполуку, представлену формулою (II-O-a) (яка нижче в даному винаході називається сполука (II-O-a)), можна отримати по наведеній нижче схемі.



[де X^c являє собою атом хлору, атом брому або атом йоду і інші позначення є такими же, як вище].

Сполуку, представлену формулою (M-6) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-6)), можна отримати з використанням сполуки, яка описується формулою (M-5) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-5)) замість сполуки (M-2) за методикою 4.

Сполука (M-5) загальновідома або її можна отримати за методикою, описаною, наприклад, в WO 2015/157093, WO 2016/109706, Organic & Biomolecular Chemistry, 2017, 15, 4199, і Europian Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 123, 916.

Сполуку, представлену формулою (M-7) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-7)), можна отримати по реакції сполуки (M-6) з галогенуючим реагентом.

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинника включають спирти, нітрили, прості ефіри, ароматичні вуглеводні, прості ефіри, ароматичні вуглеводні, полярні апротонні розчинники, галогеновані вуглеводні, воду і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади галогенуючого реагенту включають хлор, бром, йод, N-хлорсукцинімід, N-бромсукцинімід і N-йодсукцинімід.

В реакції галогенуючий реагент звичайно використовують в діапазоні від 1 до 20 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-6).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від -20 до 200 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,1 до 72 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні розчини обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (M-7).

Сполука (II-O-a) можна отримати по реакції сполуки (M-6), сполуки (R-1) і галогенуючого реагенту.

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинника включають спирти, нітрили, прості ефіри, ароматичні вуглеводні, прості ефіри, ароматичні вуглеводні, полярні апротонні розчинники, галогеновані вуглеводні, воду і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади галогенуючого реагенту включають хлор, бром, йод, N-хлорсукцинімід, N-бромсукцинімід і N-йодсукцинімід.

В реакції сполуку (R-1) звичайно використовують в діапазоні від 1 до 20 молів і галогенуючий реагент звичайно використовують в діапазоні від 1 до 20 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-6).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від -20 до 200 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,1 до 72 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні розчини обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (II-O-a).

Сполуку (II-O-a) також можна отримати по реакції сполуки (M-7) зі сполукою (R-1) в присутності каталізатора на основі металу і основи.

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають спирти, нітрили, прості ефіри, ароматичні вуглеводні, полярні апротонні

розчинники, воду і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади каталізатора на основі металу, який використовується в реакції, включають каталізатори на основі паладію, такі як тетракіс(трифенілфосфін)паладій(0), дихлорид 1,1'-біс(дифенілфосфіно)фероценпаладію(II), тріс(дибензиліденацетон)дипаладій(0) і ацетат паладію(II); каталізатори на основі нікелю, такі як біс(циклооктадиен)нікель(0) і хлорид нікелю(II); і каталізатор на основі міді, такі як йодид міді(I) і хлорид міді(I).

Приклади основи, яка використовується в реакції, включають гідриди лужних металів, карбонати лужних металів і органічні основи.

В реакції можна використовувати ліганд. Приклади ліганду, який використовується в реакції, включають трифенілфосфін, Xantphos, 2,2'-біс(дифенілфосфіно)-1,1'-бінафтил, 1,1'-біс(дифенілфосфіно)фероцен, 2-дициклогексилфосфіно-2',4',6'-триізопропілбіфеніл, 2-дициклогексилфосфіно-2',6'-диметоксибіфеніл, 1,2-біс(дифенілфосфіно)етан, 2,2'-біпіридин, 2-аміноетанол, 8-гідроксихінолін і 1,10-фенантролін.

В реакції сполуку (R5) звичайно використовують в діапазоні від 1 до 20 молів, каталізатор на основі металу звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 0,5 моля, ліганд звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 1 моля і основу звичайно використовують в діапазоні від 0,1 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-6).

Якщо ліганд використовують в реакції, ліганд звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 1 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (M-7).

В реакції сполуку (R-1) звичайно використовують в діапазоні від 1 до 20 молів, каталізатор на основі металу звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 0,5 моля і основу звичайно використовують в діапазоні від 0,1 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-7).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від -20 до 200 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,1 до 72 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні розчини обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (II-O-a).

Методика 7

Сполуку, представлену формулою (I-1) (яка нижче в даному винаході називається сполука (I-1)), можна отримати по наведеній нижче схемі.



,

[де R^{50} являє собою метильну групу або етильну групу, R^{4ab} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, або атом водню і інші символи є такими, як визначено вище].

Сполуку, представлену формулою (M-10) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-10)), можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-8) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-8)), зі сполукою, яка описується формулою (M-9) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-9)).

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають спирти, прості ефіри, ароматичні вуглеводні, нітрили, полярні апротонні розчинники і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

За необхідністю в реакції можна використовувати основу. Приклади основи включають органічні основи. Якщо основу використовують в реакції, основу звичайно використовують в діапазоні від 1 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-8).

В реакції сполука (M-9) звичайно використовують в діапазоні від 1 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-8).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0 до 150 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,5 до 12 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні розчини обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (M-10).

Сполуку (M-8) можна отримати за методикою, описаною, наприклад, в Jounal of Biological Chemistry, 2016, 291, 14146.

Сполуку (I-1) можна отримати по реакції сполуки (M-10) зі сполукою, яка описується формулою (R-2) (яка нижче в даному винаході називається сполука (R-2)).

Реакцію здійснюють в присутності або відсутності розчинника. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають прості ефіри, ароматичні вуглеводні, галогеновані вуглеводні, нітрили, полярні апротонні розчинники і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

В реакції сполука (R-2) звичайно використовують в діапазоні від 1 до 50 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-10).

За необхідністю в реакції можна використовувати кислоту або основу.

Приклади кислоти, яка використовується в реакції, включають сульфонові кислоти, такі як пара-толуолсульфонова кислота; карбонові кислоти, такі як оцтова кислота; і поліфосфорні кислоти.

Приклади основи, яка використовується в реакції, включають органічні основи.

Якщо кислоту або основу використовують в реакції, кислоту звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 5 молів і основу звичайно використовують в діапазоні від 1 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-10).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0 до 150 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,5 до 24 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні шари обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (I-1).

Сполука (M-1) є в продажу або її можна отримати за добре відомою методикою.

Крім того, сполуку (I-1) можна отримати по реакції сполуки (M-8), сполуки (M-9) і сполуки (R-2) в одну стадію (в однореакторному режимі).

В реакції сполуку (M-9) звичайно використовують в діапазоні від 1 до 5 молів і сполука (R-2) звичайно використовують в діапазоні від 1 до 50 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-8) відповідно до методики отримання сполуки (I-1) зі сполуки (M-10).

Методика 8

Сполуку, представлену формулою (I-2) (яка нижче в даному винаході називається сполука (I-2) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-11) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-11)), зі сполукою, яка описується формулою (R-3) (яка нижче в даному винаході називається сполука (R-3)) в присутності основи.



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають прості ефіри, ароматичні вуглеводні і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади основи, яка використовується в реакції, включають бутиллітій, втор-бутиллітій, трет-бутиллітій, діізопропіламід літію, біс(триметилсиліл)амід літію, біс(триметилсиліл)амід натрію; і біс(триметилсиліл)амід калію.

В реакції сполуку (R-3) звичайно використовують в діапазоні від 1 до 15 молів і основу звичайно використовують в діапазоні від 1 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-11).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від -78 до 25 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,5 до 12 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні шари обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (I-2).

Сполука (R-3) є в продажу або її можна отримати за добре відомою методикою.

Методика 9

Сполуку, представлену формулою (I-3) (яка нижче в даному винаході називається сполука (I-3)), можна отримати по наведеній нижче схемі.



,

[де X^d являє собою атом хлору або атом брому і інші символи є такими, як визначено вище].

Сполуку, представлену формулою (M-14) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-14)), можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-12) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-12)), зі сполукою, яка описується формулою (M-13) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-13)). Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в Journal of Medicinal Chemistry, 2011, 54, 2102.

Сполуку, представлену формулою (M-15) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-15)), можна отримати по реакції сполуки (M-14) з галогенуючим реагентом.

Реакцію здійснюють в присутності або відсутності розчинника. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають прості ефіри, ароматичні вуглеводні, галогеновані вуглеводні і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади галогенуючого реагенту, який використовується в реакції, включають тіонілхлорид, оксалілхлорид, оксихлорид фосфору, трихлорид фосфору, пентахлорид фосфору, тіонілбромід, оксибромід фосфору, трибромід фосфору і пентахлорид фосфору.

В реакції галогенуючий реагент звичайно використовують в діапазоні від 1 до 30 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-14).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0 до 100 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,1 до 24 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні шари обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (M-15).

Сполуку (I-3) можна отримати по реакції сполуки (M-15) з воднем в присутності каталізатора.

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику при тиску від 1 до 100 бар в атмосфері водню. Приклади розчинника, який використовується в реакції, включають прості ефіри; складні ефіри (такі як етилацетат і бутилацетат) (які нижче в даному винаході спільно називаються складними ефірами); спирти; вода; і змішані розчинники, які включають два або більшу кількість з них.

Приклади каталізаторів, які використовуються в реакції, включають паладій на вугіллі.

В реакції каталізатор звичайно використовують в діапазоні від 0,001 до 0,5 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (M-15).

За необхідністю в реакції можна використовувати основу або кислоту.

Приклади кислоти, яка використовується в реакції, включають оцтову кислоту і хлористоводневу кислоту і Приклади основи, яка використовується в реакції, включають третинні аміни, такі як триетиламін. Якщо кислоту використовують в реакції, кислоту звичайно використовують в діапазоні від 0,1 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-15). Якщо

основу використовують в реакції, основу звичайно використовують в діапазоні від 0,1 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-15).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від -20 до 100 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,1 до 24 год.

Якщо реакція завершена, реакційні суміші фільтрують і за необхідністю екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і отримані органічні шари обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (I-3).

Методика 10

Оксид сполуки, яка описується формулою (I), можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (I), з окиснювальним реагентом. Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в методиці 1, публікація патенту U.S. № 2018/0009778 або WO 2016/121970.

Методика 11

Сполуку, представлену формулою (I-4) (яка нижче в даному винаході називається сполука (I-4)), можна отримати по реакції сполуки (M-10) з сульфітом натрію в присутності галогенуючого реагенту.



(M-10) (I-4)

Реакцію здійснюють в присутності або відсутності розчинника. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають нітрили, полярні апротонні розчинники і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади галогенуючого реагенту, який використовується в реакції, включають хлор, бром, йод, N-хлорсукцинімід, N-бромсукцинімід і N-йодсукцинімід.

В реакції сульфіт натрію звичайно використовують в діапазоні від 1 до 10 молів і галогенуючий реагент звичайно використовують в діапазоні від 0,1 до 5 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-10).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0 до 100 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,5 до 12 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні шари обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (I-4).

Далі описана методика отримання проміжної сполуки.

Еталонна методика 1

Сполуку, представлену формулою (M-2A-b) і сполуку, представлену формулою (M-2A-c) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-2A-a) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-2A-a)), з окиснювальним реагентом.



(M-2A-a) (M-2A-b) (M-2A-c)

,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Ці реакції можна провести за методикою 1.

Еталонна методика 2

Сполуку (M-2A-a) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-2A-1) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-2A-1)), зі сполукою (R-1) в присутності основи.



(M-2A-1) (M-2A-a) ,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести за методикою, описаною в методиці 5 отримання сполуки (I-O-a) зі сполуки (M-4).

Сполука (M-2A-1) є в продажу або її можна отримати за добре відомою методикою.

Еталонна методика 3

Сполуку, представлену формулою (M-2B-b) і сполуку, представлену формулою (M-2B-c) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-2B-a) з окиснювальним реагентом.



(M-2B-a) (M-2B-b) (M-2B-c)

,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Ці реакції можна провести за методикою 1.

Еталонна методика 4

Сполуку, представлену формулою (M-2B-d) можна отримати по наведеній нижче схемі.



(M-5-d) (M-16) (M-2B-d)

,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Сполуку, представлену формулою (M-16) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-16)), можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-5-d) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-5-d)), з N-йодсукцинімідом. Реакцію можна провести за методикою, описаною в методиці 6 отримання сполуки (M-7) зі сполуки (M-6).

Сполуку (M-2B-d) можна отримати по реакції сполуки (M-16) або сполуки (M-5-d) зі сполукою (R-1). Ці реакції можна провести за методикою, описаною в методиці 6 отримання сполуки (II-O-a) зі сполуки (M-6) або сполуки (M-7).

Еталонна методика 5

Сполуку, представлену формулою (M-2B-f) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-2B-e) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-2B-e)), з фторидом срібла в присутності каталізатора на основі металу.



(M-2B-e) (M-2B-f) ,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 3792.

Еталонна методика 6

Сполуку, представлену формулою (M-2B-g) можна отримати по реакції сполуки (M-2B-e) з йодидом натрію в присутності каталізатора на основі металу.



(M-2B-e) (M-2B-g) ,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в Journal of the American Chemical Society, 2002, 124, 14844.

Еталонна методика 7

Сполуку, представлену формулою (M-4A) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-4A)), можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-17) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-17)), зі сполукою (R-3) в присутності основи.



(M-17) (M-4A) ,

[де позначення є такими, як визначено вище]

Реакцію можна провести з використанням сполуки (M-17) замість сполуки (M-11) за методикою 8.

Еталонна методика 8

Сполуку (M-4B) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-18) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-18)), зі сполукою (R-3) в присутності основи.



(M-18) (R-3) (M-4B)

,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести з використанням сполуки (M-18) замість сполуки (M-11) за методикою 8.

Еталонна методика 9

Сполуку (M-11) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-19) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-19)), зі сполукою (M-9) в присутності конденсуючого реагенту.



(M-19) (M-9) (M-11)

,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію звичайно здійснюють в розчиннику. Приклади розчинників, які використовуються в реакції, включають прості ефіри, галогеновані вуглеводні, ароматичні вуглеводні, складні ефіри, полярні апротонні розчинники, азотовмісні ароматичні вуглеводні і змішані розчинники, які складаються з двох або більшої кількості типів розчинників.

Приклади конденсуючого реагенту включають 1-етил-3-83-диметиламінопропіл)карбодіімід (нижче в даному винаході позначається як WSC) і 1,3-дициклогексилкарбодіімід.

В реакції сполука (M-9) звичайно використовують в діапазоні від 0,8 до 1,2 моля і конденсуючий реагент звичайно використовують в діапазоні від 1 до 2 молів в перерахунку на 1 моль сполуки (M-19).

В реакції за необхідністю можна використовувати каталізатор. Приклади каталізатора включають 1-гідроксибензотриазол (нижче в даному винаході позначається як HOBt). Якщо каталізатор використовують в реакції, каталізатор звичайно використовують в діапазоні від 0,01 до 1 моля в перерахунку на 1 моль сполуки (M-19).

Температура реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0 до 200 °C. Тривалість реакції звичайно знаходиться в діапазоні від 0,1 до 24 год.

Якщо реакція завершена, до реакційної суміші додають воду і реакційні суміші екстрагують органічним розчинником (розчинниками) і органічні шари обробляють (наприклад, сушать і концентрують) і отримують сполуку (M-11).

Сполука (M-19) є в продажу або її можна отримати за добре відомою методикою.

Еталонна методика 10

Сполуку (M-17) можна отримати по реакції сполуки (M-19) зі сполукою, яка описується формулою (M-20) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-20)) в присутності конденсуючого реагенту.



(M-19) (M-20) (M-17)

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести з використанням сполуки (M-20) замість сполуки (M-9) по еталонній методиці 9.

Еталонна методика 11

Сполука (M-18) можна отримати по реакції сполуки (M-19) зі сполукою, яка описується формулою (M-21) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-21)) в присутності конденсуючого реагенту.



(M-19) (M-21) (M-18)

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести з використанням сполуки (M-21) замість сполуки (M-9) по еталонній методиці 9.

Еталонна методика 11

Сполуку, представлену формулою (M-4C) можна отримати по наведеній нижче схемі.



(M-22) (M-4C) (M-8) (M-20)

[де позначення є такими, як визначено вище].

Ці реакції можна провести за методикою 7.

Еталонна методика 12

Сполуку, представлену формулою (M-4D) можна отримати по наведеній нижче схемі.



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Ці реакції можна провести за методикою 7.

Еталонна методика 13

Сполуку (M-12) можна отримати за допомогою дегідратуючої конденсації сполуки, представленої формулою (M-24) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-24)).



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в Organic Letters, 2010, 12, 4796.

Сполука (M-24) є в продажу або її можна отримати за добре відомою методикою.

Еталонна методика 14

Сполуку, представлену формулою (M-4E) можна отримати по наведеній нижче схемі.



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Ці реакції можна провести за методикою 9.

Сполуку, представлену формулою (M-4F) можна отримати по наведеній нижче схемі.



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Ці реакції можна провести за методикою 9.

Еталонна методика 16

Сполуку (M-9) можна отримати по реакції сполуки (M-2) з аміаком.



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в Journal of Medicinal Chemistry, 1980, 23, 1376 або WO 2010/130665.

Сполуку (M-9) можна отримати за методикою, описаною в WO 2018/052136.

Еталонна методика 17

Сполуку (M-20) можна отримати по реакції сполуки (M-3) з аміаком.



,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести по еталонній методиці 16.

Еталонна методика 18

Сполуку (M-21) можна отримати по реакції сполуки (M-5) з аміаком.



(M-5) (M-21) ,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести по еталонній методиці 16.

Еталонна методика 19

Сполуку (M-13) можна отримати по реакції сполуки (M-2) з гідразинмоногідратом.



(M-2) (M-13) ,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в WO 2018/008727.

Еталонна методика 20

Сполуку (M-25) можна отримати по реакції сполуки (M-3) з гідразинмоногідратом.



(M-3) (M-25) ,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести по еталонній методиці 19.

Еталонна методика 21

Сполуку (M-28) можна отримати по реакції сполуки (M-5) з гідразинмоногідратом.



(M-5) (M-28) ,

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести по еталонній методиці 19.

Еталонна методика 22

Сполуку, представлену формулою (M-1A) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-31) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-31)), зі сполукою, яка описується формулою (M-32) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-32)).



(M-31) (M-32) (M-1A)

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в European Journal of Medicinal Chemistry, 2012, 50, 264.

Сполука (M-31) і сполука (M-32) є в продажу або їх можна отримати за добре відомою методикою.

Еталонна методика 23

Сполуку, представлену формулою (M-1B) можна отримати по наведеній нижче схемі.



(M-33) (M-33) (R-4) (M-35) (M-1B)

[де R^{4bc} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, C3-C7 циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більшу кількість атомів галогену, або атом водню і інші символи є такими, як визначено вище.

Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в European Journal of Organic Chemistry, 2016, 4171.

Сполуку, представлену формулою (M-33) і сполуку, представлену формулою (M-34) є в продажу або їх можна отримати за добре відомою методикою.

Еталонна методика 24

Сполуку, представлену формулою (M-1C) можна отримати по реакції сполуки, яка описується формулою (M-36) (яка нижче в даному винаході називається сполука (M-36)), з гідразинмоногідратом.



(M-36) (M-1C)

[де позначення є такими, як визначено вище].

Реакцію можна провести за методикою, описаною, наприклад, в WO 2011/159854.

Сполуку (M-36) можна отримати за методикою, описаною, наприклад, в Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2013, 23, 1063.

Пропоновану сполуку або пропоновану сполуку X можна змішати або об'єднати з одним або більшою кількістю типів інгредієнтів, вибраних з групи, яка включає групу (a), групу (b), групу (c) і групу (d) (які нижче в даному винаході називаються як пропонований інгредієнт).

Вказане вище змішування або об'єднання являє собою застосування пропонованої сполуки або пропонованої сполуки X і пропонованого інгредієнта одночасно, окремо або через деякі проміжки часу.

Якщо пропоновану сполуку або пропоновану сполуку X і пропонований інгредієнт використовують одночасно, пропонована сполука або пропонована сполука X і пропонований інгредієнт можуть міститися в окремих препаратах відповідно або можуть міститися в одному препараті.

Одним об'єктом даного винаходу є композиція, яка містить один або більшу кількість інгредієнтів, вибраних з групи, яка включає групу (a), групу (b), групу (c) і групу (b), а також пропоновану сполуку.

Одним об'єктом даного винаходу є композиція, яка містить один або більшу кількість інгредієнтів, вибраних з групи, яка включає групу (a), групу (b), групу (c) і групу (d), а також пропоновану сполуку X (яка нижче в даному винаході називається композиція A).

Група (a) є групою, яка складається з наступних

кожен активний інгредієнт, як інгібітори ацетилхолінестерази (наприклад, карбаматні інсектициди або фосфорорганічні інсектициди), GABAергічні блокатори каналів хлоридних іонів (наприклад, фенілпіразолові інсектициди), модулятори натрієвих каналів (наприклад, піретроїдні інсектициди), конкурентні модулятори нікотинового ацетилхолінового рецептора (наприклад, неонікотиноїдні інсектициди), алостеричні модулятори нікотинового ацетилхолінового рецептора, алостеричні модулятори каналів хлоридних іонів (наприклад, макролідні інсектициди), імітатори ювенільного гормону, багатоцентрові інгібітори, модулятори каналів TRPV хордотонального органу, інгібітори росту кліщів, інгібітори біосинтетичного ферменту мітохондріальної ATP, роз'єднувальні агенти окиснювального фосфорилування, блокатори каналів нікотинового ацетилхолінового рецептора (наприклад, нереістоксинові інсектициди), інгібітори синтезу хітину, інгібітори линяння, агоніста екдизонового рецептора, агоніст октопамінового рецептора, інгібітори мітохондріального комплексу I, II, III і IV системи перенесення електронів, блокатори потенціалозалежних натрієвих каналів, інгібітор ацетил CoA карбоксилази, модулятор ріанодинового рецептора (наприклад, діамідні інсектициди), модулятори хордотонального органу, мікробні пестициди; і

інші інсектицидно, акарицидно або нематоцидно активні інгредієнти.

Ці інгредієнти класифікуються як клас на основі механізму дії IRAC.

Група (b) є групою, яка складається з наступних

інгібітори синтезу нуклеїнової кислоти (наприклад, феніламідні фунгіциди або ациламінокислотні фунгіциди), інгібітори поділу клітин і цитоскелету (наприклад, MBC фунгіциди),

інгібітори дихання (наприклад, QoI фунгіциди або QiI фунгіциди), інгібітори синтезу амінокислоти і синтезу білка (наприклад, анілінопіридинові фунгіциди), інгібітори передачі сигналів, інгібітори синтезу ліпідів і синтезу мембран, інгібітори біосинтезу стерину (наприклад, DMI фунгіциди, такі як триазол), інгібітори синтезу стінок клітин, інгібітори синтезу меланіну, індуктори захисту рослин, інші активні в точці контакту фунгіциди, мікробні фунгіциди і інші фунгіцидні інгредієнти. Ці інгредієнти класифікуються як клас на основі механізму дії FRAC.

Група (c) є групою інгредієнтів, які модулюють ріст (включаючи мікоризні гриби і кореневі бульбочкові бактерії).

Група (d) є групою репелентних інгредієнтів.

Приклади комбінації пропонованого інгредієнта і пропонованої сполуки X описані нижче. Наприклад, аланікарб+SX являє собою комбінацію аланікарбу і SX.

Абревіатура "SX" являє собою будь-яку з пропонованих сполук X, вибраних зі сполук класу SX_1 - класу SX_{2832}. Крім того, всі активні інгредієнти, які пропонуються в даному винаході, описані нижче є відомими інгредієнтами, які можна отримати з наявних в продажу препаратів або їх можна отримати відомими методиками. Якщо пропонованим інгредієнтом є бактерія, її можна отримати з затвердженого депозитарія бактерій. Числа в дужках є реєстраційними номерами CAS RN (зареєстрована торговельна марка).

Комбінація пропонованого інгредієнта указаної вище групи (a) і пропонованої сполуки:

абамектин+SX, ацефат+SX, ацехіноцил+SX, ацетаміприд+SX, ацетопрол+SX, акринатрин+SX, ацинонапір+SX, афидопіропен+SX, афоксоланер+SX, аланікарб+SX, альдикарб+SX, алетрин+SX, альфа-циперметрин+SX, альфа-ендосульфан+SX, фосфід алюмінію+SX, амітраз+SX, азадирахтин+SX, азаметифос+SX, азинфос-етил+SX, ainphos-метил+SX, axocyclotin+SX, bark of Celastrus angulatus+SX, бендіокарб+SX, бенфлутрин+SX, бенфуракарб+SX, бенсултап+SX, бензоксимат+SX, бензпіримоксан+SX, бета-цифлутрин+SX, бета-циперметрин+SX, біфеназат+SX, біфентрин+SX, біоалетрин+SX, біоресметрин+SX, бістрифлурон+SX, бура+SX, борна кислота+SX, брофланілід+SX, бромпропілат+SX, бупрофезин+SX, бутокарбоксим+SX, бутоксикарбоксим+SX, кадусафос+SX, фосфід кальцію+SX, карбарил+SX, карбофуран+SX, карбосульфан+SX, гідрохлорид картапу+SX, картап+SX, хінометіонат+SX, хлорантраніліпрол+SX, хлордан+SX, хлоретоксифос+SX, хлорфенапір+SX, хлорфенвинфос+SX, хлорфлуазурон+SX, хлормефос+SX, хлорпикрин+SX, хлорпірифос+SX, хлорпірифос-метил+SX, хромафенозид+SX, клофентезин+SX, клотіанідин+SX, конканаміцин A+SX, кумафос+SX, кріоліт+SX, ціанофос+SX, ціантраніліпрол+SX, циклоніліпрол+SX, циклопротрин+SX, циклоксаприд+SX, цієнопірафен+SX, цифлуметофен+SX, цифлутрин+SX, цигалодіамід+SX, цигалотрин+SX, цигексатин+SX, циперметрин+SX, цифенотрин+SX, циромазин+SX, дазомет+SX, дельтаметрин+SX, деметон-S-метил+SX, діафентіурон+SX, діазинон+SX, дихлорвос+SX, дихлормезотіаз+SX, дикофол+SX, дикротофос+SX, дифловідазин+SX, дифлубензурон+SX, димефлутрин+SX, диметоат+SX, диметилвінфос+SX, димпропіридаз+SX, динотефуран+SX, динатрійоктаборат+SX, дисульфотон+SX, DNOC(2-метил-4,6-динітрофенол) + SX, дорамектин+SX, висушене листя Dryopteris filix-mas+SX, емамектин-бензоат+SX, емпентрин+SX, ендосульфан+SX, EPN(O-етил O-(4-нітрофеніл)фенілфосфонотіоат) + SX, епсилон-метофлутрин+SX, епсилон-момфлуоротрин+SX, есфенвалерат+SX, етіофенкарб+SX, етіон+SX, етипрол+SX, етопрофос+SX, етофенпрокс+SX, етоксазол+SX, екстракт Artemisia absinthium+SX, екстракт Cassia nigricans+SX, екстракт clitoria ternatea+SX, екстракт Symphytum officinale+SX, екстракти або штучна суміш Chenopodium ambrosioides+SX, екстракт Tanacetum vulgare+SX, екстракт Urtica dioica+SX, екстракт Viscum album+SX, фампур+SX, фенамифос+SX, феназахин+SX, фенбутатиноксид+SX, фенітротіон+SX, фенобукарб+SX, феноксикарб+SX, фенпропатрин+SX, фенпіроксимат+SX, фентіон+SX, фенвалерат+SX, фіпроніл+SX, флометоквін+SX, флонікамід+SX, флуакрипірим+SX, флуазаіндолізин+SX, флуазурон+SX, флубендіамід+SX, флуциклоксурон+SX, флуцитринат+SX, флуенсульфон+SX, флуфенопрокс+SX, флуфеноксурон+SX, флуфіпрол+SX, флуметрин+SX, флупірадифурон+SX, флупіримін+SX, флураланер+SX, флувалінат+SX, флуксаметамід+SX, форметанат+SX, фостіазат+SX, фураметрин+SX, фуратіокарб+SX, гамма-цигалотрин+SX, GS-омега/каппа HXTX-Hv1a пептид+SX, галфенпрокс+SX, галофенозид+SX, гептафлутрин+SX, гептенофос+SX, гексафлумурон+SX, гекситіазокс+SX, калієва сіль бета-кислоти хмелю+SX, гідраметилнон+SX, гідропрен+SX, іміціафос+SX, імідаклоприд+SX, імідаклотиз+SX, іміпротрин+SX, індоксакарб+SX, ізоциклосерам+SX, ізофенфос+SX, ізопрокарб+SX, ізопропіл-O-(метоксіамінотіофосфорил)саліцилат+SX, ізоксатіон+SX, івермектин+SX, кадетрин+SX, каппа-тефлутрин+SX, каппа-біфентрин+SX, кінопрен+SX, лямбда-цигалотрин+SX, лепереміцин+SX, лепімектин+SX, сірчисте вапно+SX, лотиланер+SX, луфенурон+SX, машинне масло+SX, малатіон+SX, мекарбам+SX, меперфлутрин+SX, метафлумізон+SX, метам+SX, метамідофос+SX, метидатіон+SX, метіокарб+SX, метоміл+SX, метопрен+SX, метоксихлор+SX, метоксифенозид+SX, метилбромід+SX, метофлутрин+SX, метолкарб+SX, метоксадіазон+SX, мевінфос+SX, мілбемектин+SX, мілбеміциноксим+SX, момфлуоротрин+SX, монокротофос+SX, моксидектин+SX, полій+SX, олія насіння маргози+SX, нікотин+SX, нікотинсульфат+SX, нітенпірам+SX, новалурон+SX, новіфлумурон+SX, масло насіння Chenopodium anthelminticum+SX, ометоат+SX, оксаміл+SX, оксазосульфіл+SX, оксидеметон-метил+SX, паратіон+SX, паратіон-метил+SX, перметрин+SX, фенотрин+SX, фентоат+SX, форат+SX, фозалон+SX, фосмет+SX, фосфамідон+SX, фосфін+SX, фоксим+SX, піримікарб+SX, піриміфос-метил+SX, пралетрин+SX, профенофос+SX, профлутрин+SX, пропаргіт+SX, пропетамфос+SX, пропоксур+SX, пропіленгліколь альгінат+SX, протіофос+SX, піфлубумід+SX, піметрозин+SX, піраклофос+SX, піретрини+SX, піридабен+SX, піридаліл+SX, піридафентіон+SX, пірифлухіназон+SX, піримідифен+SX, піриміностробін+SX, пірипрол+SX, пірипроксифен+SX, хіналфос+SX, ресметрин+SX, ротенон+SX, ріанодин+SX, сароланер+SX, селамектин+SX, сигма-циперметрин+SX, силафлуофен+SX, борат натрію+SX, метаборат натрію+SX, спінеторам+SX, спіносад+SX, спіродиклофен+SX, спіромезифен+SX, спіропідіон+SX, спіротетрамат+SX, сульфлурамід+SX, сульфотеп+SX, сульфоксафлор+SX, сірка+SX, сульфурилфторид+SX, виннокислий антимонілкалій+SX, тау-флувалінат+SX,

тебуфенозид+SX, тебуфенпірад+SX, тебупіримфос+SX, тефлубензурон+SX, тефлутрин+SX, темефос+SX, тербуфос+SX, терпенові компоненти екстракту chenopodium ambrosioides near ambrosioides+SX, тетрахлорантранілпрол+SX, тетрахлорвінфос+SX, тетрадифон+SX, тетраметрин+SX, тетраметилфлутрин+SX, тетраніліпрол+SX, тета-циперметрин+SX, тіаклоприд+SX, тіаметоксам+SX, тіоциклам+SX, тіодикарб+SX, тіофанокс+SX, тіометон+SX, тіосултап-динатрій+SX, тіосултап-мононатрій+SX, тіоксазафен+SX, толфенпірад+SX, тралометрин+SX, трансфлутрин+SX, триазамат+SX, триазофос+SX, трихлорфон+SX, трифлумезопірим+ SX, трифлумурон+SX, триметакарб+SX, тиклопіразофлор+SX, вамідотіон+SX, екстракт деревини Cassia amara+SX, XMC (3,5-диметилфеніл N-метилкарбамат)+SX, ксилілкарб+SX, дзета-циперметрин+SX, фосфід цинку+SX, N-[3-хлор-1-(піридин-3-іл)-1H-піразол-4-іл]-N-етил-3-(3,3,3-трифторпропансульфініл)пропанамід (1477923-37-7)+SX, 4-[5-(3,5-дихлорфеніл)-5-(трифторметил)-4,5-дигідро-1,2-оксазол-3-іл]-2-метил-N-(1-oxothietan-3-іл)бензамід (1241050-20-3)+SX, 3-метокси-N-(5-{5-(трифторметил)-5-[3-(трифторметил)феніл]-4,5-дигідро-1,2-оксазол-3-іл}індан-1-іл)пропанамід (1118626-57-5)+SX, N-[2-бром-6-хлор-4-(1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан-2-іл)феніл]-3-{етил[(піридин-4-іл)карбоніл]аміно}-2-метоксибензамід (1429513-53-0)+SX, N-[2-бром-6-хлор-4-(1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан-2-іл)феніл]-3-[етил(4-ціанобензоїл)аміно]-2-метоксибензамід (1609007-65-9)+SX, N-[2-бром-6-(дифторметокси)-4-(1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан-2-іл)феніл]-3-{метил[(піридин-4-іл)карбоніл]аміно}-2-метоксибензамід (1630969-78-6)+SX, 1-{2-фтор-4-метил-5-[(2,2,2-трифторетил)сульфаніл]феніл}-3-(трифторметил)-1H-1,2,4-триазол-5-амін (885026-50-6) + SX, BT білок культури Cry1Ab+SX, BT білок культури Cry1Ac+SX, BT білок культури Cry1Fa+SX, BT білок культури Cry1A105+SX, BT білок культури Cry2Ab+SX, BT білок культури Vip3A+SX, BT білок культури Cry3A+SX, BT білок культури Cry3Ab+SX, BT білок культури Cry3Bb+SX, BT білок культури Cry34AB1/Cry35AB1+SX, Adoxophyes orana granulosis virus штам BV-0001+SX, Anticarsia gemmatalis mNPV+SX, Autographa californica mNPV+SX, Cydia pomonella GV штам V15+SX, Cydia pomonella GV штам V22+SX, Cryptophlebia leucotreta GV+SX, Dendrolimus punctatus cypovirus+SX, Helicoverpa armigera NPV штам BV-0003+SX, Helicoverpa zea NPV+SX, Lymantria dispar NPV+SX, Mamestra brassicae NPV+SX, Mamestra configurata NPV+SX, Neodiprion abietis NPV+SX, Neodiprion lecontei NPV+SX, Neodiprion sertifer NPV+SX, Nosema locustae+SX, Orgyia pseudotsugata NPV+SX, Pieris rapae GV+SX, Plodia interpunctella GV+SX, Spodoptera exigua mNPV+SX, Spodoptera littoralis mNPV+SX, Spodoptera litura NPV+SX, Arthrobotrys dactyloides+SX, Bacillus firmus штам GB126+SX, Bacillus firmus штам I-1582+SX, Bacillus megaterium+SX, Bacillus sp. штам AQ175+SX, Bacillus sp. штам AQ177+SX, Bacillus sp. штам AQ178+SX, Bacillus sphaericus штам 2362+SX, Bacillus sphaericus штам ABTS1743+SX, Bacillus sphaericus Serotype штам H5a5b+SX, Bacillus thuringiensis штам AQ52+SX, Bacillus thuringiensis штам BD#32+SX, Bacillus thuringiensis штам CR37 1+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai штам ABTS-1857+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai штам AM65-52+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai штам GC-91+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai Serotype штам H-7+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам ABTS351+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам BMP123+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам EG234+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам EG7841+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам EVB113-19+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам F810+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам HD-1+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам PB54+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам SA11+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki штам SA12+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Tenebriosis штам NB176+SX, Bacillus thuringiensis subsp. Thuringiensis штам MPPL002+SX, Bacillus thuringiensis subsp.morrisoni+SX, Bacillus thuringiensis var. colmeri+SX, Bacillus thuringiensis var. darmstadiensis штам 24-91+SX, Bacillus thuringiensis var. dendrolimus+SX, Bacillus thuringiensis var. galleriae+SX, Bacillus thuringiensis var. israelensis штам BMP144+SX, Bacillus thuringiensis var. israelensis serotype штам H-14+SX, Bacillus thuringiensis var. japonensis штам buibui+SX, Bacillus thuringiensis var. san diego штам M-7+SX, Bacillus thuringiensis vaR7216+SX, Bacillus thuringiensis var.aegypti+SX, Bacillus thuringiensis var. T36+SX, Beauveria bassiana штам ANT-03+SX, Beauveria bassiana штам ATCC74040+SX, Beauveria bassiana штам GHA+SX, Beauveria brongniartii+SX, Burkholderia rinojensis штам A396+SX, Chromobacterium subtsugae штам PRAA4-1T+SX, Dactyllela ellipsospora+SX, Dectylaria thaumasia+SX, Hirsutella minnesotensis+SX, Hirsutella rhossiliensis+SX, Hirsutella thompsonii+SX, Lagenidium giganteum+SX, Lecanicillium lecanii штам KV01+SX, Lecanicillium lecanii конідії штаму DAOM198499+SX, Lecanicillium lecanii конідії штаму DAOM216596+SX, Lecanicillium muscarium штам Ve6+SX, Metarhizium anisopliae штам F52+SX, Metarhizium anisopliae var. acridum+SX, Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52+SX, Metarhizium flavoviride+SX, Monacrosporium phymatopagum+SX, Paecilomyces fumosoroseus Apopka штам 97+SX,

Paecilomyces lilacinus штам 251+SX, Paecilomyces tenuipes штам T1+SX, Paenibacillus popilliae+SX, Pasteuria nishizawae штам Pn1+SX, Pasteuria penetrans+SX, Pasteuria usgae+SX, Pasteuria thoynei+SX, Serratia entomophila+SX, Verticillium chlamydosporium+SX, Verticillium lecani штам NCIM1312+SX, 2-хлор-4-фтор-5-{[5-(трифторметилтіо)пентил]окси}феніл-2,2,2-трифторетилсульфоксид (1472050-04-6)+SX, 4-хлор-5-[2,2-дифтор-2-(3,4,5-трифторфеніл)етокси]-2-метилфеніл-2,2,2-трифторетилсульфоксид (1632218-00-8)+SX, 4-фтор-5-[2,2-дифтор-2-(3,4,5-трифторфеніл)етокси]-2-метилфеніл-2,2,2-трифторетилсульфоксид (1632217-98-1)+SX, 2-({2-фтор-4-метил-5-[(2,2,2-трифторетил)сульфініл]феніл}іміно)-3-(2,2,2-трифторетил)-1,3-тіазолідин-4-он (1445683-71-5)+SX, (1Z)-2-(4-трет-бутилфеніл)-2-ціано-1-(1-етил-3-метил-1H-піразол-5-іл)етеніл-2,2-диметилпропаноат (1253429-01-4)+SX, N-[(1S,2S)-2-(2,4-дихлорфеніл)циклобутил]-2-(трифторметил)піридин-3-карбоксамід (1644251-74-0)+SX, (3R)-3-(2-хлортіазол-5-іл)-8-метил-7-оксо-6-феніл-2,3-дигідротіазоло[3,2-a]піримідин-4-ій-5-олат (2249718-27-0)+SX.

Комбінація пропонованого інгредієнта вказаної вище групи (b) і пропонованої сполуки X:

ацибензолар-S-метил+SX, альдиморф+SX, аметоктрадин+SX, амінопірифен+SX, амісулбром+SX, анілазин+SX, азаконазол+SX, азоксистробін+SX, основний сульфат міді+SX, беналаксил+SX, беналаксил-M+SX, беноданіл+SX, беноміл+SX, бентіавалікарб+SX, бентивалікарб-ізопропіл+SX, бензовіндифлупір+SX, бінапакрил+SX, біфеніл+SX, бітертанол+SX, біксафен+SX, бластицидин-S+SX, бордоська рідина+SX, боскалід+SX, бромталоніл+SX, бромуконазол+SX, бупіримат+SX, каптафол+SX, каптан+SX, карбендазим+SX, карбоксин+SX, карпропамід+SX, хіометіонат+SX, хітин+SX, хлоронеб+SX, хлороталоніл+SX, хлозолінат+SX, колетохлорин B+SX, ацетат міді(II) + SX, гідроксид міді(II) + SX, оксихлорид міді+SX, сульфат міді(II) + SX, кумоксистробін+SX, ціазофамід+SX, цифлуфенамід+SX, цимоксаніл+SX, ципроконазол+SX, ципродиніл+SX, дихлобентіазокс+SX, дихлофлуанід+SX, диклоцимет+SX, дикломезин+SX, диклоран+SX, діетофенкарб+SX, дифеноконазол+SX, дифлуметорим+SX, іметахлон+SX, диметиримол+SX, диметоморф+SX, димоксистробін+SX, диніконазол+SX, диніконазол-M+SX, динокап+SX, дикалійгідрофосфіт+SX, дипіметитрон+SX, дитіанон+SX, сіль міді(II) бісетилендіаміндодецилбензолсульфонової кислоти+SX, додеморф+SX, додин+SX, едифенфос+SX, еноксастробін+SX, епоксиконазол+SX, етаконазол+SX, етабоксам+SX, етиримол+SX, етридіазол+SX, екстракт Melaleuca alternifolia+SX, екстракт Reynoutria sachalinensis+SX, екстракт сім'ядолей паростків люпину ("BLAD") + SX, екстракт Allium sativum+SX, екстракт Equisetum arvense+SX, екстракт Tropaeolum majus+SX, фамоксадон+SX, фенамідон+SX, фенамінстробін+SX, фенаримол+SX, фенбуконазол+SX, фенфурам+SX, фенгексамід+SX, феноксаніл+SX, фенпіклоніл+SX, фенпікоксамід+SX, фенпропідин+SX, фенпропіморф+SX, фенпіразамін+SX, ацетат фентину+SX, хлорид фентину+SX, гідроксид фентину+SX, фербам+SX, феримзон+SX, флорилпікоксамід+SX, флуазинам+SX, флудіоксоніл+SX, флуфеноксистробін+SX, флуїндапір+SX, флуморф+SX, флуопіколід+SX, флуопірам+SX, флуопімомід+SX, фторимід+SX, флуоксапипролін +SX, флуоксастробін+SX, флухінконазол+SX, флусилазол+SX, флусульфамід+SX, флутаніл+SX, флутоланіл+SX, флутриафол+SX, фluксапіроксад+SX, фолпет+SX, фосетил+SX, фосетилалюміній+SX, фуберидазол+SX, фуралаксил+SX, фураметпір+SX, гуазатин+SX, гексаконазол+SX, гімексазол+SX, имазалил+SX, імібенконазол+SX, іміноктадин+SX, іміноктадинтриацетат+SX, інпірфлуксам+SX, йодокарб+SX, іпконазол+SX, іпфентрифлуконазол+SX, іпфлуфенохин+SX, іпробенфос+SX, іпродион+SX, іпроваліkарб+SX, ізофетамід+SX, ізофлуципрам+SX, ізопротіолан+SX, ізопіразам+SX, ізотіаніл+SX, касугаміцин+SX, крезоксим-метил+SX, ламінарин+SX, листя і кора дуба+SX, манкозеб+SX, мандестробін+SX, мандипропамід+SX, манеб+SX, мефентрифлуконазол+SX, мепаніпірим+SX, мепроніл+SX, мептилдинокап+SX, металаксил+SX, металаксил-M+SX, метконазол+SX, метасульфокарб+SX, метирам+SX, метоміностробін+SX, метрафенон+SX, метилтетрапрол+SX, мінеральні масла+SX, міклобутаніл+SX, нафтифін+SX, нуаримол+SX, октилінон+SX, офурац+SX, орисастробін+SX, оксадиксил+SX, оксатіопіпролін+SX, оксин-копер+SX, оксолінова кислота+SX, окспоконазол+SX, фумарат окспоконазолу+SX, оксикарбоксин+SX, окситетрациклін+SX, перфуразоат+SX, пенконазол+SX, пенцикурон+SX, пенфлуфен+SX, пентіопірад+SX, фенамакрил+SX, фосфориста кислота+SX, фталід+SX, пікарбутразокс+SX, пікоксистробін+SX, піпералін+SX, поліоксини+SX, гідрокарбонат калію+SX, дигідрофосфит калію+SX, пробеназол+SX, прохлораз+SX, процимідон+SX, пропамідин+SX, пропамокарб+SX, пропіконазол+SX, пропінеб+SX, проквіназид+SX, протіокарб+SX, протіоконазол+SX, підифлуметофен+SX, піраклостробін+SX, піраметостробін+SX, піраоксистробін+SX, пірапропоїн+SX, піразифлумід+SX, піразофос+SX, пірибенкарб+SX, пірибутикарб+SX, піридахлометил+SX, пірифенокс+SX, піриметаніл+SX, піриморф+SX,

піріофенон+SX, пірізоксазол+SX, пірохілон+SX, екстракт кори кілайї+SX, хінконазол+SX, квінофумелін+SX, хіноксифен+SX, квінтоцен+SX, сапоніни Chenopodium quinoa+SX, седаксан+SX, силтіофам+SX, симеконазол+SX, гідрокарбонат натрію+SX, спіроксамін+SX, стрептоміцин+SX, сірка+SX, тебуконазол+SX, тебуфлохін+SX, теклофталам+SX, текназен+SX, тербинафін+SX, тетраконазол+ SX, тіабендазол+SX, тифлузамід+SX, тіофанат+SX, тіофанат-метил+SX, тирам+SX, тимол+SX, тіадиніл+SX, толклофос-метил+SX, толфенпірад+SX, толпрокарб+SX, толілфлуанід+SX, триадимефон+SX, триадименол+SX, триазоксид+SX, триклопірикарб+SX, трициклазол+SX, тридеморф+SX, трифлоксистробін+SX, трифлумізол+SX, трифорин+SX, тритиконазол+SX, валідаміцин+SX, валіфеналат+SX, вінклозолін+SX, порошкоподібна гірчиця біла+SX, тіазолат цинку+SX, зинеб+SX, зирам+SX, зоксамід+SX, N'-[4-({3-[(4-хлорфеніл)метил]-1,2,4-тіадіазол-5-іл}окси)-2,5-диметилфеніл]-N-етил-N-метилметанімідамід (1202781-91-6)+SX, 4-(2-бром-4-фторфеніл)-N-(2-хлор-6-фторфеніл)-1,3-диметил-1H-піразол-5-амін (1362477-26-6)+SX, 2-[6-(3-фтор-4-метоксифеніл)-5-метилпіридин-2-іл]хіназолін (1257056-97-5)+SX, 5-фтор-2-[(4-метилфеніл)метокси]піримідин-4-амін (1174376-25-0)+SX, 5-фтор-4-іміно-3-метил-1-тозил-3,4-дигідропіримідин-2(1H)-он (1616664-98-2)+SX, N'-(2,5-диметил-4-феноксифеніл)-N-етил-N-метилметанімідамід (1052688-31-9)+SX, N'-{4-[(4,5-дихлортіазол-2-іл)окси]-2,5-диметилфеніл}-N-етил-N-метилметанімідамід (929908-57-6)+SX, етил (2Z)-3-аміно-2-ціано-3-фенілакрилат (39491-78-6)+SX, N-[(2-хлортіазол-5-іл)метил]-N-етил-6-метокси-3-нітропіридин-2-амін (1446247-98-8)+SX, 5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентан-1-ол (1394057-11-4)+SX, (1R,2S,5S)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентан-1-ол (1801930-06-2)+SX, (1S,2R,5R)-5-(4-хлорбензил)-2-(хлорметил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентан-1-ол (1801930-07-3)+SX, 2-(хлорметил)-5-(4-фторбензил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентан-1-ол (1394057-13-6)+SX, (1R,2S,5S)-2-(хлорметил)-5-(4-фторбензил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентан-1-ол (1801930-08-4)+SX, (1S,2R,5R)-2-(хлорметил)-5-(4-фторбензил)-2-метил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентан-1-ол (1801930-09-5)+SX, метил-3-[(4-хлорфеніл)метил]-2-гідрокси-1-метил-2-(1H-1,2,4-триазол-1-ілметил)циклопентан-1-карбоксилат (1791398-02-1) + SX, метил ({2-метил-5-[1-(4-метокси-2-метилфеніл)-1H-піразол-3-іл]феніл}метил)карбамат (1605879-98-8)+SX, 2-(дифторметил)-N-[1,1,3-триметил-2,3-дигідро-1H-інден-4-іл]піридин-3-карбоксамід (1616239-21-4)+SX, 2-(дифторметил)-N-[3-етил-1,1-диметил-2,3-дигідро-1H-інден-4-іл]піридин-3-карбоксамід (1847460-02-9)+SX, 2-(дифторметил)-N-[3-пропіл-1,1-диметил-2,3-дигідро-1H-інден-4-іл]піридин-3-карбоксамід (1847460-05-2)+SX, (2E, 3Z)-5-{[1-(4-хлорфеніл)-1H-піразол-3-іл]окси}-2-(метоксііміно)-N, 3-диметилпент-3-енамід (1445331-27-0)+SX, Agrobacterium radiobactor штам K1026+SX, Agrobacterium radiobactor штам K84+SX, Bacillus amyloliquefaciens (Aveo(Trade mark) EZ Нематоцид)+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам AT332+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам B3+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам D747+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам DB101+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам DB102+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам GB03+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам FZB24+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам FZB42+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам IN937a+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам MBI600+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам QST713+SX, Bacillus amyloliquefaciens isolate штам B246+SX, Bacillus amyloliquefaciens штам F727+SX, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum штам D747+SX, Bacillus licheniformis штам HB2+SX, Bacillus licheniformis штам SB3086+SX, Bacillus pumilus штам AQ717+SX, Bacillus pumilus штам BUF-33+SX, Bacillus pumilus штам GB34+SX, Bacillus pumilus штам QST2808+SX, Bacillus simplex штам CGF2856+SX, Bacillus subtilis штам AQ153+SX, Bacillus subtilis штам AQ743+SX, Bacillus subtilis штам BU1814+SX, Bacillus subtilis штам D747+SX, Bacillus subtilis штам DB101+SX, Bacillus subtilis штам FZB24+SX, Bacillus subtilis штам GB03+SX, Bacillus subtilis штам HAI0404+SX, Bacillus subtilis штам IAB/BS03+SX, Bacillus subtilis штам MBI600+SX, Bacillus subtilis штам QST30002/AQ30002+SX, Bacillus subtilis штам QST30004/AQ30004+SX, Bacillus subtilis штам QST713+SX, Bacillus subtilis штам QST714+SX, Bacillus subtilis var. Amyloliquefaciens штам FZB24+SX, Bacillus subtilis штам Y1336+SX, Burkholderia cepacia+SX, Burkholderia cepacia type Wisconsin штам J82+SX, Burkholderia cepacia type Wisconsin штам M54+SX, Candida oleophila штам O+SX, Candida saitoana+SX, Chaetomium cupreum+SX, Clonostachys rosea+SX, Coniothyrium minitans штам CGMCC8325+SX, Coniothyrium minitans штам CON/M/91-8+SX, cryptococcus albidus+SX, Erwinia carotovora subsp.carotovora штам CGE234M403+SX, Fusarium oxysporum штам Fo47+SX, Gliocladium catenulatum штам J1446+SX, Paenibacillus polymyxa штам AC-1+SX, Paenibacillus polymyxa штам BS-0105+SX, Pantoea agglomerans штам E325+SX, Phlebiopsis gigantea штам VRA1992+SX, Pseudomonas aureofaciens штам TX-1+SX, Pseudomonas chlororaphis штам 63-28+SX, Pseudomonas chlororaphis штам AFS009+SX, Pseudomonas chlororaphis штам MA342+SX, Pseudomonas

fluorescens штам 1629RS+SX, Pseudomonas fluorescens штам A506+SX, Pseudomonas fluorescens штам CL145A+SX, Pseudomonas fluorescens штам G7090+SX, Pseudomonas sp. штам CAB-02+SX, Pseudomonas syringae штам 742RS+SX, Pseudomonas syringae штам MA-4+SX, Pseudozyma flocculosa штам PF-A22UL+SX, Pseudomonas rhodesiae штам HAI-0804+SX, Pythium oligandrum штам DV74+SX, Pythium oligandrum штам M1+SX, Streptomyces griseoviridis штам K61+SX, Streptomyces lydicus штам WYCD108US+SX, Streptomyces lydicus штам WYEC108+SX, Talaromyces flavus штам SAY-Y-94-01+SX, Talaromyces flavus штам V117b+SX, Trichoderma asperellum штам ICC012+SX, Trichoderma asperellum SKT-1+SX, Trichoderma asperellum штам T25+SX, Trichoderma asperellum штам T34+SX, Trichoderma asperellum штам TV1+SX, Trichoderma atroviride штам CNCM 1-1237+SX, Trichoderma atroviride штам LC52+SX, Trichoderma atroviride штам IMI 206040+SX, Trichoderma atroviride штам SC1+SX, Trichoderma atroviride штам SKT-1+SX, Trichoderma atroviride штам T11+SX, Trichoderma gamsii штам ICC080+SX, Trichoderma harzianum штам 21+SX, Trichoderma harzianum штам DB104+SX, Trichoderma harzianum штам DSM 14944+SX, Trichoderma harzianum штам ESALQ-1303+SX, Trichoderma harzianum штам ESALQ-1306+SX, Trichoderma harzianum штам IIHR-Th-2+SX, Trichoderma harzianum штам ITEM908+SX, Trichoderma harzianum штам kd+SX, Trichoderma harzianum штам MO1+SX, Trichoderma harzianum штам SF+SX, Trichoderma harzianum штам T22+SX, Trichoderma harzianum штам T39+SX, Trichoderma harzianum штам T78+SX, Trichoderma harzianum штам TH35+SX, Trichoderma polysporum штам IMI206039+SX, trichoderma stromaticum+SX, Trichoderma virens штам G41+SX, Trichoderma virens штам GL-21+SX, Trichoderma viride+SX, Variovorax paradoxus штам CGF4526+SX, Гарпин protein+SX, N'-[5-хлор-4-(2-фторфенокси)-2-метилфеніл)-N-етил-N-метилметанімідамід (2055589-28-9) + SX, N'-[2-хлор-4-(2-фторфенокси)-5-метилфеніл)-N-етил-N-метилметанімідамід (2055756-21-1)+SX, N'-[4-(1-гідрокси-1-феніл-2,2,2-трифторетил)-2-метил-5-метоксифеніл)-N-ізопропіл-N-метилметанімідамід (2101814-55-3)+SX, N'-[5-бром-6-(1-метил-2-пропоксіетокси)-2-метилпіридин-3-іл)-N-етил-N-метилметанімідамід (1817828-69-5)+SX, 1-(2,4-дифторфеніл)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-1-[1-(4-бром-2,6-дифторфенокси)циклопропіл]етанол (2019215-86-0)+SX, 1-(2,4-дифторфеніл)-2-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)-1-[1-(4-хлор-2,6-дифторфенокси)циклопропіл]етанол (2019215-84-8)+SX, 1-[2-(1-хлорциклопропіл)-3-(2-фторфеніл)-2-гідроксипропіл]-1H-імідазол-5-карбонітрил (2018316-13-5)+SX, 1-[2-(1-хлорциклопропіл)-3-(2,3-дифторфеніл)-2-гідроксипропіл]-1H-імідазол-5-карбонітрил (2018317-25-2)+SX, 4-({6-[2-(2,4-дифторфеніл)-1,1-дифтор-2-гідрокси-3-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)пропіл]піридин-3-іл}окси)бензонітрил (2046300-61-0)+SX, 2-[6-(4-бромфенокси)-2-(трифторметил)піридин-3-іл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (2082661-43-4)+SX, 2-[6-(4-хлорфенокси)-2-(трифторметил)піридин-3-іл]-1-(1H-1,2,4-триазол-1-іл)пропан-2-ол (2082660-27-1)+SX, (2E,3Z)-5-{[1-(2,4-дихлорфеніл)-1H-піразол-3-іл]окси}-2-(метоксііміно)-N, 3-диметилпент-3-енамід (1445331-54-3)+SX, 5-хлор-4-({2-[6-(4-хлорфенокси)піридин-3-іл]етил}аміно)-6-метилпіримідин (1605340-92-8) + SX, N-(1-бензил-1,3-диметилбутил)-8-фторхінолін-3-карбоксамід (2132414-04-9), N-(1-бензил-3,3,3-трифтор-1-метилпропіл)-8-фторхінолін-3-карбоксамід (2132414-00-5)+SX, 4,4-диметил-2-({4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл}метил)ізоксазолідин-3-он (2098918-25-1)+SX, 5,5-диметил-2-({4-[5-(трифторметил)-1,2,4-оксадіазол-3-іл]феніл}метил)ізоксазолідин-3-он (2098918-26-2)+SX.

Комбінація пропонованого інгредієнта вказаної вище групи (c) і пропонованої сполуки X:

1-метилциклопропен+SX, 1,3-дифенілсечовина+SX, 2,3,5-трийодбензойна кислота+SX, IAA ((1H-індол-3-іл)оцтова кислота)+SX, IBA (4-(1H-індол-3-іл)масляна кислота)+SX, MCPA (2-(4-хлор-2-метилфеноксі)оцтова кислота)+SX, MCPB (4-(4-хлор-2-метилфенокси)масляна кислота)+SX, 4-CPA (4-хлорфеноксіоцтова кислота) + SX, гідрохлорид 5-амінолевулінової кислоти+SX, 6-бензиламінопурин+SX, абсцизова кислота+SX, AVG (аміноетоксивінілгліцин) + SX, анцимідол+SX, бутралін+SX, карбонат кальцію+SX, хлорид кальцію+SX, форміат кальцію+SX, пероксид кальцію+SX, полісульфід кальцію+SX, сульфат кальцію+SX, хлормекват-хлорид+SX, хлорпрофам+SX, хлорид холіну+SX, клопроп+SX, ціанамід+SX, цикланілід+SX, дамінозид+SX, декан-1-ол+SX, дихлорпроп+SX, дикегулак+SX, диметипін+SX, дикват+SX, етефон+SX, етихлозат+SX, флуметралін+SX, флурпримідол+SX, форхлорфенурон+SX, формононетин+SX, гіберелін A+SX, гіберелін A3+SX, інабенфід+SX, Кінетин+SX, ліпохитоолігосахарид SP104+SX, гідразид малеїнової кислоти+SX, мефлуїдид+SX, мепікват-хлорид+SX, окиснений глутатіон+SX, паклобутразол+SX, пендиметалін+SX, прогександіон-кальцій+SX, прогідрожасмон+SX, пірафлуфен-етил+SX, синтофен+SX, sodium 1-нафталінацетат+SX, ціанат натрію+SX, стрептоміцин+SX, тидіазурон+SX, триапентенол+SX, трибуфос+SX, тринексапак-етил+SX, уніконазол-P+SX, 2-(нафталин-1-іл)ацетамід+SX, [4-оксо-4-(2-фенілетил)аміно]масляна кислота+SX, метил-5-(трифторметил)бензо[b]тіофен-2-

карбоксилат+SX, 3-[(6-хлор-4-фенілхіназолін-2-іл)аміно]-1-пропанол+SX, Claroideoglomus etunicatum+SX, Claroideoglomus claroideum+SX, Funneliformis mosseae+SX, Gigaspora margarita+SX, Gigaspora rosea+SX, Glomus aggregatum+SX, Glomus deserticola+SX, Glomus monosporum+SX, Paraglomus brasillianum+SX, Rhizophagus clarus+SX, Rhizophagus intraradices RTI-801+SX, Rhizophagus irregularis DAOM 197198+SX, Azorhizobium caulinodans+SX, Azospirillum amazonense+SX, Azospirillum brasilense XOH+SX, Azospirillum brasilense Ab-V5+SX, Azospirillum brasilense Ab-V6+SX, Azospirillum caulinodans+SX, Azospirillum halopraeferens+SX, Azospirillum irakense+SX, Azospirillum lipoferum+SX, Bradyrhizobium elkanii SEMIA 587+SX, Bradyrhizobium elkanii SEMIA 5019+SX, Bradyrhizobium japonicum TA11+SX, Bradyrhizobium japonicum USDA110+SX, Bradyrhizobium liaoningense+SX, Bradyrhizobium lupini+SX, Delftia acidovorans RAY209+SX, Mesorhizobium ciceri+SX, Mesorhizobium huakii+SX, Mesorhizobium loti+SX, Rhizobium etli+SX, Rhizobium galegae+SX, Rhizobium leguminosarum bv. Phaseoli+SX, Rhizobium leguminosarum bv. Trifolii+SX, Rhizobium leguminosarum bv. Viciae+SX, Rhizobium trifolii+SX, Rhizobium tropici+SX, Sinorhizobium fredii+SX, Sinorhizobium meliloti+SX, Zucchini Yellow Mosaik Virus weak штам+SX.

Комбінація пропонованого інгредієнта вказаної вище групи (d) і пропонованої сполуки X:

антрахінон+SX, ДЕТА+SX, ікаридин+SX.

Відношення кількості пропонованої сполуки X до кількості пропонованого інгредієнта включає, але не обмежується лише ними, відношення мас (пропонована сполука X: пропонований інгредієнт) від 1000:1 до 1:1000, від 500:1 до 1:500, від 100:1 до 1:100, 50:1, 20:1, 10:1, 9:1, 8:1, 7:1, 6:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:20 і 1:50 і інш.

Приклади шкідників, для боротьби з деякими ефективна пропонована сполука X, включають членистоногих шкідників, таких як комахи-шкідники, кліщі-шкідники, нематоди-шкідники і молюски-шкідники. Конкретні приклади шкідників включають, але не обмежуються лише ними, наступні.

Шкідники Hemiptera:

із сімейства Delphacidae, наприклад, темна цикадка (Laodelphax striatella), коричневий дельфацид (Nilaparvata lugens), білоспинна цикадка (Sogatella furcifera), цикадка кукурудзяна (Peregrinus maidis), свинушка (Javesella pellucida), цикадка цукрової тростини (Perkinsiella saccharicida) і Tagosodes orizicolus;

із сімейства Cicadellidae, наприклад, зелена рисова цикадка (Nephotettix cincticeps), зелена цикадка (Nephotettix virescens), цикадка рисова (Nephotettix nigropictus), зигзагоподібна цикадка (Recilia dorsalis), цикадка зеленого чаю (Empoasca onukii), цикадка картопляна (Empoasca fabae), цикадка кукурудзяна (Dalbulus maidis) і цикадка рисова (Cofana spectra);

із сімейства Cercopidae, наприклад, Mahanarva posticata і Mahanarva fimbriolata;

із сімейства Aphididae, наприклад, попелиця бурякова (Aphis fabae), попелиця соєва (Aphis glycines), попелиця бавовникова (Aphis gossypii), попелиця яблунева зелена (Aphis pomi), попелиця яблунева (Aphis spiraecola), попелиця персикова зелена (Myzus persicae), попелиця геліхризова (Brachycaudus helichrysi), попелиця капустяна (Brevicoryne brassicae), попелиця трояндова (Dysaphis plantaginea), попелиця гірчична листкова (Lipaphis erysimi), попелиця картопляна (Macrosiphum euphorbiae), попелиця картопляна звичайна (Aulacorthum solani), попелиця салатна зелена (Nasonovia ribisnigri), попелиця велика злакова (Rhopalosiphum padi), попелиця кукурудзяна (Rhopalosiphum maidis), попелиця цитрусова (Toxoptera citricida), попелиця борошниста сливова (Hyalopterus pruni), попелиця цукрової тростини (Melanaphis sacchari), чорна рисова коренева попелиця (Tetraneura nigriabdominalis), шерстиста попелиця цукрової тростини (Ceratovacuna lanigera) і шерстиста яблунева попелиця (Eriosoma lanigerum);

із сімейства Phylloxeridae, наприклад, філоксера виноградна (Daktulosphaira vitifoliae), філоксера гікорі (Phylloxera devastatrix), філоксера гікорі листова (Phylloxera notabilis) і південна філоксера гікорі листова (Phylloxera russellae);

із сімейства Adelgidae, наприклад, тсуговий хермес (Adelges tsugae), хермес ялицевий стовбуровий (Adelges piceae) і Aphrastasia pectinatae;

із сімейства Pentatomidae, наприклад, клоп рисовий чорний (Scotinophara lurida), малайський клоп чорний рисовий (Scotinophara coarctata), щитник зелений (Nezara antennata), клоп білий плямистий колючий (Eysarcoris aeneus), клоп-щитник Льюїса (Eysarcoris lewisi), білий плямистий клоп (Eysarcoris ventralis), Eysarcoris annamita, коричнево-мармуровий клоп (Halyomorpha halys), незара зелена (Nezara viridula), щитник коричневий (Euschistus heros), червоносмуговий вонючий жук (Piezodorus guildinii), Oebalus pugnax і Dichelops melacanthus;

із сімейства Cydnidae, наприклад, Burrower brown bug (Scaptocoris castanea);

із сімейства Alydidae, наприклад, бобовий клоп (Riptortus pedestris), клоп рисовий (Leptocorisa chinensis) і клоп рисовий (Leptocorisa acuta);

із сімейства Coreidae, наприклад, Cletus punctiger і лептоглоссус австралійський (Leptoglossus australis);

із сімейства Lygaeidae, наприклад, клоп західний (Caverelius saccharivorus), наземник (Togo hemipterus) і земляний клоп (Blissus leucopterus);

із сімейства Miridae, наприклад, рисовий листовий клоп (Trigonotylus caelestialium), сліпняк сорговий (Stenotus rubrovittatus), сліпняк (Stenodema calcarata) і клоп-сліпняк (Lygus lineolaris);

із сімейства Aleyrodidae, наприклад, білокрила теплична (Trialeurodes vaporariorum), білокрила тютюнова (Bemisia tabaci), білокрила цитрусова (Dialeurodes citri), колюча горна білокрила (Aleurocanthus spiniferus), білокрила камелієва колюча (Aleurocanthus camelliae) і Pealius euryae;

із сімейства Diaspididae, наприклад, Abgrallaspis cyanophylli, щитівка червона померанцева (Aonidiella aurantii), щитівка каліфорнійська (Diaspidiotus perniciosus), щитівка тутова (Pseudaulacaspis pentagona), щитівка західна цитрусова (Unaspis yanonensis) і щитівка апельсинова (Unaspis citri);

із сімейства Coccidae, наприклад, рубінова хибнощитівка (Ceroplastes rubens);

із сімейства Margarodidae, наприклад, червець австралійський жолобчатий (Icerya purchasi) і seychelles fluted scale (Icerya seychellarum);

із сімейства Pseudococcidae, наприклад, борошнистий червець (Phenacoccus solani), бавовниковий борошнистий червець (Phenacoccus solenopsis), червець японський (Planococcus kraunhiae), щитівка тутова (Pseudococcus comstocki), борошнистий червець виноградний (Planococcus citri), борошнистий червець цитрусовий (Pseudococcus calceolariae), борошнистий червець щетинистий (Pseudococcus longispinus) і tuttle mealybug (Brevennia rehi);

із сімейства Psyllidae, наприклад, західна листоблішка (Diaphorina citri), африканська цитрусова листоблішка (Trioza erytreae), листоблішка велика грушева (Cacopsylla pyrisuga), Cacopsylla chinensis, листоблішка Кокерелля (Bactericera cockerelli) і мідяниця грушева (Cacopsylla pyricola);

із сімейства Tingidae, наприклад, клоп-мереживниця платановий (Corythucha ciliata), клоп-мереживниця хризантемний (Corythucha marmorata), клопик грушоподібний (Stephanitis nashi) і клоп азалієвий американський (Stephanitis pyrioides);

із сімейства Cimicidae, наприклад, клоп постільний (Cimex lectularius);

із сімейства Cicadidae, наприклад, гігантська американська цикада (Quesada gigas);

із сімейства Triatoma spp., наприклад, Triatoma infestans;

і інш.

Шкідники Lepidoptera:

із сімейства Crambidae, наприклад, свердляк рисовий стебловий (Chilo suppressalis), свердляк чорноголовий смугастий (Chilo polychrysus), білий стебловий точильник (Scirpophaga innotata), вогнівка рисова стеблова (Scirpophaga incertulas), Rupela albina, листовійка рисова (Cnaphalocrocis medinalis), Marasmia patnalis, листовійка рисова (Marasmia exigua), листовійка бавовникова (Notarcha derogata), метелик кукурудзяний (Ostrinia furnacalis), метелик кукурудзяний (Ostrinia nubilalis), вогнівка капустяна (Hellula undalis), листовійка виноградна (Herpetogramma luctuosale), вогнівка (Pediasia teterrellus), рисова вогнівка (Nymphula depunctalis) і вогнівка цукрової тростини (Diatraea saccharalis);

із сімейства Pyralidae, наприклад, метелик малий кукурудзяний (Elasmopalpus lignosellus) вогнівка комірна південна (Plodia interpunctella) і вогнівка яблунева (Euzophera batangensis);

із сімейства Noctuidae, наприклад, гусениця совки бавовникової американської (Spodoptera litura), совка мала (Spodoptera exigua), похідний черв'як рисовий (Mythimna separata), совка капустяна (Mamestra brassicae), шашіль рожева (Sesamia inferens), лугова совка (Spodoptera mauritia), зелена рисова гусениця (Naranga aenescens), Spodoptera frugiperda, гладкий похідний черв'як (Spodoptera exempta), совка-іпсилон (Agrotis ipsilon), напівп'ядун буряковий (Autographa nigrisigna), металовидка злакова (Plusia festucae), п'ядун соєвий (Chrysodeixis includens), Trichoplusia spp., Heliothis spp. (такі як тютюнова листовійка (Heliothis virescens)), Helicoverpa spp. (такі як тютюнова листовійка (Helicoverpa armigera) і совка кукурудзяна (Helicoverpa zea)), гусениця, яка шкодить соєвим культурам (Anticarsia gemmatalis), совка азіатська бавовникова (Alabama argillacea) і склівка хмелева (Hydraecia immanis);

із сімейства Pieridae, наприклад, білянка капустяна (Pieris rapae);

із сімейства Tortricidae, наприклад, плодожерка західна персикова (Grapholita molesta), Grapholita dimorpha, соєва плодожерка (Leguminivora glycinivorella), Matsumuraeses azukivora, сітчаста листовійка (Adoxophyes orana fasciata), мала чайна листовійка (Adoxophyes honmai),

західна чайна міль (Homona magnanima), яблунева листовійка (Archips fuscocupreanus), плодожерка яблунева (Cydia pomonella), сірий метелик цукрової тростини (Tetramoera schistaceana), свердляк бобовий (Epinotia aporema) і цитрусова совка (Ecdytolopha aurantiana);

із сімейства Gracillariidae, наприклад, чайна листовійка (Caloptilia theivora) і мушка мінуюча яблунева (Phyllonorycter ringoniella);

із сімейства Carposinidae, наприклад, персикова плодожерка (Carposina sasakii);

із сімейства Lyonetiidae, наприклад, кавова мінуюча мушка (Leucoptera coffeella), персикова мінуюча міль (Lyonetia clerkella) і Lyonetia prunifoliella;

із сімейства Lymantriidae, наприклад, Lymantria spp. (такі як шовкопряд непарний (Lymantria dispar)) і Euproctis spp. (такі як хвилянка чайна (Euproctis pseudoconspersa));

із сімейства Plutellidae, наприклад, міль капустяна (Plutella xylostella);

із сімейства Gelechiidae, наприклад, виямкокрила міль фруктова (Anarsia lineatella), листовійка бататова (Helcystogramma triannulella), трояндовий коробочний черв'як (Pectinophora gossypiella), міль картопляна бульбочкова (Phthorimaea operculella) і Tuta absoluta;

із сімейства Arctiidae, наприклад, метелик білий американський (Hyphantria cunea);

із сімейства Castniidae, наприклад, великий тростинний свердляк (Telchin licus);

із сімейства Cossidae, наприклад, Cossus insularis;

із сімейства Geometridae, наприклад, Ascotis selenaria;

із сімейства Limacodidae, наприклад, гусениця кропиви (Parasa lepida);

із сімейства Stathmopodidae, наприклад, плодова міль хурми (Stathmopoda masinissa);

із сімейства Sphingidae, наприклад, бджолиний грабіжник (Acherontia lachesis);

із сімейства Sesiidae, наприклад, Nokona feralis, свердляк вишневий (Synanthedon hector) і Synanthedon tenuis;

із сімейства Hesperiidae, наприклад, товстоголівка рисова (Parnara guttata);

із сімейства Tineidae, наприклад, міль платтяна (Tinea translucens) і кімнатна міль (Tineola bisselliella);

і інш.

Шкідники Thysanoptera:

із сімейства Thripidae, наприклад, трипс квітковий західний (Frankliniella occidentalis), трипс Пальми (Thrips palmi), трипс жовтий чайний (Scirtothrips dorsalis), трипс цибулевий (Thrips tabaci), трипс пшеничний (Frankliniella intonsa), трипс рисовий азіатський (Stenchaetothrips biformis) і Echinothrips americanus;

із сімейства Phlaeothripidae, наприклад, трипс пустоцвітий (Haplothrips aculeatus);

і інш.

Шкідники Diptera:

із сімейства Anthomyiidae, наприклад, личинка мухи паросткової (Delia platura), личинка мухи цибулевої (Delia antiqua) і муха бурякова (Pegomya cunicularia);

із сімейства Ulidiidae, наприклад, личинка бурякового черв'яка (Tetanops myopaeformis);

із сімейства Agromyzidae, наприклад, рисовий листовий мінер (Agromyza oryzae), томатний листовий мінер (Liriomyza sativae), американський конюшиновий мінер (Liriomyza trifolii) і гороховий листовий мінер (Chromatomyia horticola);

із сімейства Chloropidae, наприклад, рисова стеблова мушка (Chlorops oryzae);

із сімейства Tephritidae, наприклад, муха динна (Bactrocera cucurbitae), муха західна фруктова (Bactrocera dorsalis), пасльонова плодова муха (Bactrocera latifrons), маслинна муха (Bactrocera oleae), квінслендська фруктова муха (Bactrocera tryoni), муха плодова середземноморська (Ceratitis capitata), личинка строкатокрилки яблуневлї (Rhagoletis pomonella) і японська вишнева муха (Rhacochlaena japonica);

із сімейства Ephydridae, наприклад, ячмінний мінер (Hydrellia griseola), береговушка (Hydrellia philippina) і рисова листова личинка (Hydrellia sasakii);

із сімейства Drosophilidae, наприклад, вишнева дрозофіла (Drosophila suzukii);

із сімейства Phoridae, наприклад, Megaselia spiracularis;

із сімейства Psychodidae, наприклад, Clogmia albipunctata;

із сімейства Sciaridae, наприклад, Bradysia difformis;

із сімейства Cecidomyiidae, наприклад, гессенська мушка (Mayetiola destructor) і азиатская рисова галиця (Orseolia oryzae);

із сімейства Diopsidae, наприклад, Diopsis macrophthalma;

із сімейства Tipulidae, наприклад, велика рисова довгоніжка (Tipula aino), довгоніжка капустяна (Tipula oleracea) і довгоніжка болотна (Tipula paludosa);

із сімейства Culicidae, наприклад, комар звичайний (Culex pipiens pallens), жовтопропасницевий комар (Aedes aegypti), азіатський тигровий комар (Aedes albopictus),

китайський малярійний комар (Malaria mosquito hyracanus sinensis), Culex quinquefasciatus, Culex pipiens molestus Forskal і комар п'ятисмуговий (Culex quinquefasciatus);

із сімейства Simulidae, наприклад, Prosimulium yezoensis і Simulium ornatum;

із сімейства Tabanidae, наприклад, Tabanus trigonus;

із сімейства Muscidae, наприклад, муха кімнатна (Musca domestica), муха домова (Muscina stabulans), жигалка звичайна (Stomoxys calcitrans) і жигалка коров'яча мала (Haematobia irritans);

із сімейства Tabanidae, наприклад, Tabanus trigonus;

із сімейства Calliphoridae;

із сімейства Sarcophagidae;

із сімейства Chironomidae, наприклад, Chironomus plumosus, Chironomus yoshimatsui і Glyptotendipes tokunagai;

із сімейства Fannidae;

і інш.

Шкідники Coleoptera:

із сімейства Chrysomelidae, наприклад, західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera), блішка 11-крапкова Говарда (Diabrotica undecimpunctata howardi), північний кукурудзяний кореневий жук (Diabrotica barberi), мексиканський кукурудзяний кореневий жук (Diabrotica virgifera zeae), жук-блішка облямована (Diabrotica balteata), діабротика особлива (Diabrotica speciosa), листоїд бобовий (Cerotoma trifurcata), п'явиця червоногруда (Oulema melanopus), листогриз гарбузовий (Aulacophora femoralis), блішка смугаста (Phyllotreta striolata), блішка хрестоцвіта (Phyllotreta хрестоцвіті), жук-блішка крихітна (Phyllotreta pusilla), блішка капустяна синя (Psylliodes chrysocephala), колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata), рисовий листогриз (Oulema oryzae), коласпис виноградний (Colaspis brunnea), земляна кукурудзяна блішка (Chaetocnema pulicaria), солодка блішка (Chaetocnema confinis), бульбочковий жук-блішка (Epitrix cucumeris), рисовий листогриз (Dicladispa armigera), південний кукурудзяний листоїд (Myochrous denticollis), Laccoptera quadrimaculata і тютюновий жук-блішка (Epitrix hirtipennis);

із сімейства Carabidae, наприклад, зерновик (Stenolophus lecontei) і малий зерновик (Clivina impressifrons);

із сімейства Scarabaeidae, наприклад, мідний хрущ (Anomala cuprea), жук соєвий (Anomala rufocuprea), Anomala albopilosa, хрущик японський (Popillia japonica), жовтуватий довгастий жук (Heptophylla picea), європейський хрущ (Rhizotrogus majalis), Tomarus gibbosus, Holotrichia spp., Phyllophaga spp. (такі як июньский хрущ (Phyllophaga crinita)) і Diloboderus spp. (такі як Diloboderus abderus);

із сімейства Curculionidae, наприклад, хибнослоник кавовий (Araecerus coffeae), довгоносик бататовий (Cylas formicarius), західно-індійський картопляний довгоносик (Euscepes postfasciatus), довгоносик люцерновий (Hypera postica), кукурудзяний довгоносик (Sitophilus zeamais), рисовий кущовий довгоносик (Echinocnemus squameus), довгоносик рисовий водяний (Lissorhoptrus oryzophilus), Rhabdoscelus lineaticollis, довгоносик бавовниковий (Anthonomus grandis), мисливський довгоносик (Sphenophorus venatus), південний кукурудзяний довгоносик (Sphenophorus callosus), довгоносик соєвий (Sternechus subsignatus), довгоносик тростинний (Sphenophorus levis), rusty gourd-shaped weevil (Scepticus griseus), brown gourd-shaped weevil (Scepticus uniformis), бразильська бобова зернівка (Zabrotes subfasciatus), лубоїд сосновий великий (Tomicus piniperda), жук кавовий (Hypothenemus hampei), Aracanthus spp. (такі як Aracanthus mourei) і довгоносик бразильський (Eutinobothrus brasiliensis);

із сімейства Tenebrionidae, наприклад, хрущак каштановий (Tribolium castaneum) і малий борошняний хрущак (Tribolium confusum);

із сімейства Coccinellidae, наприклад, 28-крапкове сонечко (Epilachna vigintioctopunctata);

із сімейства Bostrychidae, наприклад, жук-деревогриз (Lyctus brunneus);

із сімейства Ptinidae;

із сімейства Cerambycidae, наприклад, біло-плямистий довгорогий жук (Anoplophora malasiaca) і Migdolus fryanus;

із сімейства Elateridae, наприклад, Melanotus okinawensis, barley wireworm (Agriotes fuscicollis), Melanotus legatus, Anchastus spp., Conoderus spp., Ctenicera spp., Limonius spp. і Aeolus spp.;

із сімейства Staphylinidae, наприклад, Paederus fuscipes;

із сімейства Dermestidae, наприклад, домовий шкіроїд (Anthrenus verbasci) і шкіроїд плямистий (Dermestes maculates);

із сімейства Anobiidae, наприклад, жук тютюновий (Lasioderma serricorne) і хлібний шашіль (Stegobium paniceum);

і інш.

Шкідники Orthoptera:

із сімейства Acrididae, наприклад, азіатська сарана (Locusta migratoria), сарана марокканська (Dociostaurus maroccanus), австралійська сарана (Chortoicetes terminifera), червона сарана (Nomadacris septemfasciata), коричнева сарана (Locustana pardalina), сарана єгипетська (Anacridium melanorhodon), сарана італійська (Calliptamus italicus), диференціальний коник (Melanoplus differentialis), кобилка двосмугова (Melanoplus bivittatus), міграційний коник (Melanoplus sanguinipes), кобилка червононога (Melanoplus femurrubrum), кобилка прозорокрила (Camnula pellucida), сарана африканська (Schistocerca gregaria), кобилка жовтокрила (Gastrimargus musicus), сарана-колючка (Austracris guttulosa), кобилка рисова короткокрила (Oxya yezoensis), кобилка рисова японська (rice grasshopper) і бомбейська сарана (Patanga succincta);

із сімейства Gryllotalpidae, наприклад, дальнозахідна капустянка (Gryllotalpa orientalis);

із сімейства Gryllidae, наприклад, домашній цвіркун (Acheta domestica) і азіатський цвіркун (Teleogryllus emma);

із сімейства Tettigoniidae, наприклад, коник-мормон (Anabrus simplex);

і інш.

Шкідники Hymenoptera:

із сімейства Tenthredinidae, наприклад, трач ріпаковий (Athalia rosae) і японський моркв'яно-хрестоцвітий трач (Athalia japonica);

із сімейства Formicidae, наприклад, Solenopsis spp. (такі як мураха вогняна імпортна червона (Solenopsis invicta) і тропічна вогняна мураха (Solenopsis geminata)), Atta spp. (такі як коричневий мураха-листоріз (Atta capiguara)), Acromyrmex spp., Paraponera clavata, чорна домашня мураха (Ochetellus glaber), фараонова мураха (Monomorium pharaonis), мураха аргентинська (Linepithema humile), Formica japonica, Pristomyrmex punctutus, Pheidole noda, африканська великоголова мураха (Pheidole megacephala), Camponotus spp. (такі як Camponotus japonicus і Camponotus obscuripes), Pogonomyrmex spp. (такі як західна мураха-збирач (Pogonomyrmex occidentalis)), Wasmania spp. (такі як Wasmania auropunctata) і довгонога мураха (Anoplolepis gracilipes);

із сімейства Vespidae, наприклад, гігантський японський шершень (Vespa mandarinia japonica), Vespa simillima, Vespa analis Fabriciusi, шершень вбивця (Vespa velutina) і Polistes jokahamae;

із сімейства Siricidae, наприклад, рогохвіст великий (Urocerus gigas);

із сімейства Bethylidae;

і інш.

Шкідники Blattodea:

із сімейства Blattellidae, наприклад, тарган рудий (Blattella germanica);

із сімейства Blattidae, наприклад, димчасто-коричневий тарган (Periplaneta fuliginosa), тарган американський (Periplaneta americana), коричневий тарган (Periplaneta brunnea) і тарган чорний (Blatta orientalis);

із сімейства Termitidae, наприклад, японський терміт (Reticulitermes speratus), тайванський підземний терміт (Coptotermes formosanus), західний суходеревний терміт (Incisitermes minor), Cryptotermes domesticus, Odontotermes formosanus, Neotermes koshunensis, Glyptotermes satsumensis, Glyptotermes nakajimai, Glyptotermes fuscus, Hodotermopsis sjostedti, Coptotermes guangzhouensis, Reticulitermes amamianus, Reticulitermes miyatakei, Reticulitermes kanmonensis, Nasutitermes takasagoensis, Pericapritermes nitobei, Sinocapritermes mushae і Cornitermes cumulans;

і інш.

Шкідники Siphonaptera:

наприклад, блоха котяча (Ctenocephalides felis), блоха собача (Ctenocephalides canis), блоха людська (Pulex irritans), блоха щуряча південна (Xenopsylla cheopis), піщана блоха (Tunga penetrans), блоха куряча (Echidnophaga gallinacea) і щуряча блоха (Nosopsyllus fasciatus);

і інш.

Шкідники Anoplura:

наприклад, воша свиняча (Haematopinus suis), воша коров'яча коротконога (Haematopinus eurysternus), волосоїд овечий (Dalmalinia ovis), Linognathus seypsus, Pediculus humanis, Pediculuc humanus corporis, Pediculus humanus humanus і Phthirus pubis;

і інш.

Шкідники Mallophagida:

наприклад, Bovicola spp. (такі як волосоїд бичачий (Dalmalinia bovis) і волосоїд овечий (Dalmalinia ovis)), Trichodestes spp. (такі як пухоїд собачий (Trichodectes canis)), Felicola spp. (такі як воша котяча (Felicola subrostrata)), Lipeurus spp. (такі як пір'яїд курячий тонкочеревний (Lipeurus caponis)) і із сімейства Menoponidae (такі як Trimenopon spp. і, Menopon spp.);

і інш.

Шкідники Acari:

із сімейства Tetranychidae, наприклад, звичайний павутинний кліщ (Tetranychus urticae), паутинний кліщ Kanzawa (Tetranychus kanzawai), червоний павутинний кліщ (Tetranychus evansi), кліщик червоний цитрусовий (Panonychus citri), червоний плодовий кліщ (Panonychus ulmi) і Oligonychus spp.;

із сімейства Eriophyidae, наприклад, ржавий чотириногий кліщ (Aculops pelekassi), Phyllocoptruta citri, кліщ томатний ржавий (Aculops lycopersici), чайний листовой кліщ (Calacarus carinatus), трояндовий чайний галловий кліщ (Acaphylla theavagrans), Eriophyes chibaensis, яблуневий іржавий кліщ (Aculus schlechtendali), Aceria diospyri, Aceria tosichella і Shevtchenkella sp.;

із сімейства Tarsonemidae, наприклад, оранжерейний прозорий кліщ (Polyphagotarsonemus latus);

із сімейства Tenuipalpidae, наприклад, Brevipalpus phoenicis;

із сімейства Tuckerellidae;

із сімейства Ixodidae, наприклад, Haemaphysalis longicornis, Haemaphysalis flava, Dermacentor taiwanensis, собачий іксодовий кліщ (Dermacentor variabilis), Dermacentor andersoni, Ixodes ovatus, Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus, черноногий кліщ (Ixodes scapularis), іксодовий кліщ Amblyomma (Amblyomma americanum), Amblyomma maculatum, кліщ кільчастий (Boophilus microplus), Boophilus annulatus і коричневий собачий кліщ (Rhipicephalus sanguineus);

із сімейства Acaridae, наприклад, хлібний кліщ (Tyrophagus putrescentiae) і grassland mite (Tyrophagus similis);

із сімейства Pyroglyphidae, наприклад, американський пиловий кліщ (Dermatophagoides farinae) і європейський пиловий кліщ (Dermatophagoides pteronyssinus);

із сімейства Cheyletidae, наприклад, Cheyletus eruditus, Cheyletus malaccensis, Cheyletus moorei і Cheyletiella yasguri;

із сімейства Sarcoptidae, наприклад, собачий вушний кліщ (Otodectes cynotis) і кліщ коростявий (Sarcoptes scabiei);

із сімейства Demodicidae, наприклад, залізниця собача (Demodex canis);

із сімейства Listrophoridae;

із сімейства Haplochthoniidae;

із сімейства Macronyssidae, наприклад, кліщ тропічний щурячий (Ornithonyssus bacoti) і північний пташиний кліщ (Ornithonyssus sylviarum);

із сімейства Dermanyssidae, наприклад, червоний курячий кліщ (Dermanyssus gallinae);

із сімейства Trombiculidae, наприклад, Leptotrombidium akamushi;

і інш.

Шкідники Araneae:

із сімейства Eutichuridae, наприклад, Cheiracanthium japonicum;

із сімейства Theridiidae, наприклад, австралійська червоноспинна чорна вдова (Latrodectus hasseltii);

і інш.

Polydesmida:

із сімейства Paradoxosomatidae, наприклад, теплична багатоніжка (Oxidus gracilis) і Nedyopus tambanus;

і інш.

Isopoda:

із сімейства Armadillidiidae, наприклад, мокриця-броненосець звичайна (Armadillidium vulgare);

і інш.

Шкідники Chilopoda:

із сімейства Scutigeridae, наприклад, Thereuonema hilgendorfi;

із сімейства Scolopendridae, наприклад, сколопендра в'єтнамська (Scolopendra subspinipes);

із сімейства Ethopolidae, наприклад, Bothropolys rugosus;

і інш.

Gastropoda:

із сімейства Limacidae, наприклад, смугастий слимак (Limax marginatus) і жовтий слимак (Limax flavus);

із сімейства Philomycidae, наприклад, Meghimatium bilineatum;

із сімейства Ampullariidae, наприклад, золотий яблуневий равлик (Pomacea canaliculata);

із сімейства Lymnaeidae, наприклад, Austropeplea ollula;

і інш.

Шкідники Nematoda:

із сімейства Aphelenchoididae, наприклад, рисова листова нематода (Aphelenchoides besseyi);

із сімейства Pratylenchidae, наприклад, рослинно-патогенна нематода, яка заражає кількох хазяїв (Pratylenchus coffeae), Pratylenchus brachyurus, каліфорнійська лугова нематода (Pratylenchus neglectus) і Radopholus similis;

із сімейства Heteroderidae, наприклад, яванська галлова нематода (Meloidogyne javanica), південна галлова нематода (Meloidogyne incognita), північна галлова нематода (Meloidogyne hapla), соєва цистоутворювальна нематода (Heterodera glycines), картопляна цистоутворювальна нематода (Globodera rostochiensis) і бліда картопляна нематода (Globodera pallida);

із сімейства Hoplolaimidae, наприклад, Rotylenchulus reniformis;

із сімейства Anguinidae, наприклад, суницева брунькова нематода (Nothotylenchus acris) і стеблова нематода (Ditylenchus dipsaci);

із сімейства Tylenchulidae, наприклад, цитрусова нематода (Tylenchulus semipenetrans);

із сімейства Longidoridae, наприклад, каліфорнійська кинджальна нематода (Xiphinema index);

із сімейства Trichodoridae;

із сімейства Parasitaphelenchidae, наприклад, соснова стовбурова нематода (Bursaphelenchus xylophilus);

і інш.

Метою можуть бути, членистоногі шкідники, такі як комахи шкідники, кліщі шкідники, молюски шкідники і нематоди шкідники, кожен з яких має знижену чутливість до засобу або резистентність, яка розвинулася, до інсектициду, майтициду, молюскоциду і нематоциду, відповідно.

Спосіб боротьби з членистоногими шкідниками, пропонований в даному винаході, здійснюють шляхом нанесення ефективної кількості пропонованої сполуки, пропонованої сполуки X або композиції A прямо на членистоногого шкідника і/або на місце мешкання (рослину, ґрунт, в приміщеннях, на тіла тварин і т. п.) організму шкідника. Приклади способу боротьби з членистоногими шкідниками, який пропонується в даному винаході, включають некорневу обробку, обробку ґрунту, обробку коренів, обробку поливом, обробку обкурюванням, обробку поверхні води і обробку насіння.

Пропоновану сполуку, пропоновану сполуку X або композицію A звичайно змішують з інертним носієм, таким як твердий носій, рідкий носій або газоподібний носій, і за необхідністю додають поверхнево-активні речовини і інші допоміжні агенти для приготування препаратів і отримують емульговані концентрати, масляні розчини, дусти препаратів, гранули, змочувані порошки, диспергувані у воді гранули, сипкі препарати, сухі сипкі суміші, мікрокапсули, аерозолі, отруйні приманки, смоляні препарати, препарати шампуню, пастоподібні препарати, піни, препарати діоксиду вуглецю і таблетки і інш. Такі препарати можна приготувати, як спіралі для відлякування комарів, пластинки для електричного відлякувача комарів, рідкі препарати для відлякування комарів, обкурювальні агенти, фуміганти, пластинчаті препарати, препарати для точкового нанесення або препарати для перорального введення. Ці препарати звичайно містять від 0,0001 до 95 мас. % пропонованої сполуки, пропонованої сполуки A або композиції A.

Приклади твердого носія, який використовується в препараті, включають тонкоподрібнені порошки або гранули глини (такої як каолінова глина, діатомова земля, бентоніт або кисла біла глина), сухий діоксид кремнію, вологий діоксид кремнію, тальки, кераміку, інші неорганічні мінерали (серицит, кварц, сірка, активоване вугілля або карбонат кальцію) або хімічні добрива (наприклад, сульфат амонію, фосфат амонію, нітрат амонію, сечовина або хлорид амонію) і інш.; а також синтетичні смоли (наприклад, складні поліефірні смоли, такі як поліпропілен, поліакрилонітрил, поліметилметакрилат або поліетилентерефталат; нейлонові смоли (наприклад, нейлон-6, нейлон-11 або нейлон-66); поліамідні смоли; полівінілхлорид, полівініліденхлорид, співполімери вінілхлорид-пропілен і інш.).

Приклади рідких носіїв включають воду; спирти (наприклад, метанол, етанол, ізопропіловий спирт, бутанол, гексанол, бензиловий спирт, етиленгліколь, пропіленгліколь або

феноксіетанол); кетони (наприклад, ацетон, метилетилкетон або циклогексанон); ароматичні вуглеводні (наприклад, толуол, ксилол, етилбензол, додецилбензол, фенілксилілетан або метилнафталін); аліфатичні вуглеводні (наприклад, гексан, циклогексан, керосин або легке масло); складні ефіри (наприклад, етилацетат, бутилацетат, ізопропілміристат, етилолеат, діізопропіладипат, діізобутиладипат або ацетат монометилового ефіру пропіленгліколю); нітрили (наприклад, ацетонітрил або ізобутиронітрил); прості ефіри (наприклад, діізопропіловий ефір, 1,4-діоксан, 1,2-диметоксіетан, диметиловий ефір діетиленгліколю, монометиловий ефір діетиленгліколю, монометиловий ефір пропіленгліколю, димонометиловий ефір пропіленгліколю або 3-метокси-3-метил-1-бутанол); аміди (наприклад, DMF або N, N-диметилацетамід); сульфоксиди (наприклад, диметилсульфоксид); пропіленкарбонат; і рослинні олії (наприклад, соєва олія або бавовникова олія).

Приклади газоподібного носія включають фторзаміщений вуглеводень, газоподібний бутан, зріджений нафтовий газ (LPG), диметиловий ефір газоподібний і діоксид вуглецю.

Приклади поверхнево-активних речовин включають неіоногенні поверхнево-активні речовини, такі як алкілові прості ефіри поліоксіетилену, алкіларилові прості ефіри поліоксіетилену і ефіри поліетиленгліколю жирної кислоти; і аніоногенні поверхнево-активні речовини, такі як алкілсульфонати, алкілбензолсульфонати і алкілсульфати.

Приклади інших допоміжних речовин для приготування препаратів включають зв'язуюче, диспергувальний засіб, забарвлювальний агент і стабілізатор. Конкретні приклади включають казеїн, желатин, полісахариди (наприклад, крохмаль, гуміарабік, похідні целюлози і альгінова кислота), похідні лігніну, бентоніт, синтетичні розчинні у воді полімери (наприклад, полівініловий спирт, полівінілпіролидон і поліакрилові кислоти), кислий ізопропілфосфат, 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол і суміш 2-трет-бутил-4-метоксифенолу і 3-трет-бутил-4-метоксифенолу.

Приклади матеріалу основи для смоляного препарату включають полімери на основі вінілхлориду, поліуретан і інш. і пластифікатор, такий як фталати (наприклад, диметилфталат, діоктилфталат), ефіри адипінової кислоти і стеаринову кислоту за необхідністю можна додати до цих матеріалів основи. Смоляний препарат можна отримати змішуванням сполуки, яка пропонується в даному винаході, з вказаним вище матеріалом основи, замішуванням суміші, з наступним проведенням формування шляхом інжекційного формування, екструзійного формування, формування під тиском і т. п. Отриманий смоляний препарат можна додатково сформувати або нарізати і т. п., за необхідністю переробити з наданням такої форми, як пластинка, плівка, стрічка, сітка і смужка. Ці смоляні препарати можна виготовити у вигляді ошийників для тварин, вушних бирок для тварин, пластинчатих препаратів, смужок атрактантів, садових опор і інших продуктів.

Приклади матеріалу основи для отруйної приманки включають інгредієнти приманки, такі як злакове борошно, рослинна олія, цукор і кристалічна целюлоза, і за необхідністю з додаванням антиоксидантів, таких як дибутилгідрокситолуол і нордигідрогваяретова кислота, консерванти, такі як дегідрооцтова кислота, засоби, які попереджують помилкове поїдання дітьми і тваринами, такі як порошкоподібний перець однорічний, віддушки, які приманюють шкідників, такі як віддушка з ароматом сиру, віддушка з ароматом цибулі і арахісове масло.

Рослини при використанні в даному винаході включають цілу рослину, листя, квітки, колосся, плоди, стебла, гілки, крони дерев, насіння, вегетативні репродуктивні органи і розсаду.

Вегетативні репродуктивні органи являють собою частину рослини, яка здатна рости, якщо частина відділена від рослини і вміщена в ґрунт, в тому числі коріння, стебла, листя і т. п. рослини. Приклади вегетативних репродуктивних органів включають бульбоподібний корінь, повзучий корінь, цибулину, бульбоцибулину або щільну цибулину, бульбу, кореневище, підземний пагін, ризофор, зрізані стебла цукрової тростини, живці і зрізані стебла виноградної лози. В цьому випадку підземний пагін також називають відсадком, живець також називають виводковою брунькою, які розділяють на маточну бруньку і виводкову бруньку. Лоза являє собою пагони (родове найменування листя і стебел) батату і японського батату. Дископодібне стебло, бульбоцибулину, бульбу, кореневище, фрагменти стебла, ризофор і бульбоподібний корінь також спільно називаються цибулинами. Наприклад, хоча вирощування картоплі починається з висаджування бульб в ґрунт, використовувані бульбоплоди звичайно називаються насінням картоплі.

Приклади способу боротьби з членистоногими шкідниками шляхом нанесення ефективної кількості пропонованої сполуки, пропонованої сполуки X або композиції A на ґрунт включають спосіб нанесення ефективної кількості пропонованої сполуки, пропонованої сполуки X або композиції A на ґрунт до висівання рослин або після висівання рослин, спосіб нанесення ефективної кількості пропонованої сполуки, пропонованої сполуки X або композиції A на кореневі частини культури, які захищаються від ураження, такий як споживання членистоногими

шкідниками і спосіб боротьби з членистоногими шкідниками, які харчуються рослинами, шляхом забезпечення проникнення і перенесення ефективної кількості пропонованої сполуки, пропонованої сполуки X або композиції A з коренів і т. п. у внутрішню частину рослини. Більш переважні приклади способу боротьби з членистоногими шкідниками включають обробку ямки для посадки (обприскування ямок для посадки, змішування з ґрунтом після обробки ямки для посадки), обробку нижньої частини рослини (обприскування нижньої частини рослини, змішування з ґрунтом після обробки нижньої частини рослини, полив нижньої частини рослини, обробку нижньої частини рослини на пізній стадії росту розсади), обробку посадкової борозни (обприскування посадкової борозни, змішування з ґрунтом після обробки посадкової борозни), обробку рядків посадки (обприскування рядків посадки, змішування з ґрунтом після обробки рядків посадки, обприскування рядків посадки на стадії росту), обробку рядків посадки під час висівання (обприскування рядків посадки під час висівання, змішування з ґрунтом після обробки рядків посадки під час висівання), поверхневу обробку (обприскування всієї поверхні ґрунту, змішування з ґрунтом після поверхневої обробки), бокову обробку, обробку поверхні води (нанесення на поверхню води, нанесення на поверхню води після залива), другу обробку ґрунту розпиленням (розпилення гранульованого препарату на листя на стадії росту, обприскування під кроною або навколо стовбура дерева, обприскування поверхні ґрунту, змішування з поверхневим ґрунтом, обприскування ямок для посадки, обприскування поверхонь ґрунту в боронах, обприскування між рослинами), другу обробку зрошуванням (зрошування ґрунту, зрошування на стадії росту розсади, обробку інжектуванням розчину лікарського засобу, полив частини рослини, яка знаходиться безпосередньо над ґрунтом, крапельне зрошування розчином лікарського засобу, внесення отрутохімікатів з поливною водою), обробку ящика для вирощування розсади (обприскування ящика для вирощування розсади, зрошування ящика для вирощування розсади, затоплення ящика для вирощування розсади розчином лікарського засобу), обробку лотка для вирощування розсади (обприскування лотка для вирощування розсади, зрошування лотка для вирощування розсади, затоплення лотка для вирощування розсади розчином лікарського засобу), обробку розсадника (обприскування розсадника, зрошування розсадника, обприскування низин рисового розсадника, занурення розсади), обробку шляхом включення в ґрунт розсадника (змішування з ґрунтом розсадника, змішування з ґрунтом розсадника до висівання, обприскування при висіванні до закривання ґрунтом, обприскування при висіванні після закривання ґрунтом, змішування з закривним ґрунтом і другу обробку (змішування з орним ґрунтом, з, змішування з поверхневим ґрунтом, змішування з ґрунтом на місці падіння крапель дощу з крони, обробку на місці висівання, розпилення гранульованого препарату на ботричні суцвіття, змішування з пастоподібним добривом).

При використанні в даному винаході насіння або вегетативні репродуктивні органи, які містять пропоновану сполуку, пропоновану сполуку X або композицію A, означають насіння або вегетативні репродуктивні органи в стані, коли пропонована сполука, пропонована сполука X або композиція A прилипає до поверхні насіння або вегетативного репродуктивного органу. Крім того, пропонована сполука, пропонована сполука X або композиція A, які можуть прилипнути до поверхні насіння або вегетативного репродуктивного органу, можуть проникнути з поверхні у внутрішню частину рослини.

Крім того, якщо композиція A прилипає до поверхні насіння або вегетативних репродуктивних органів, шар, який складається з одного активного інгредієнта, можна нанести кілька разів, множину активних інгредієнтів можна змішати з утворенням одного шару, шар, який складається з одного активного інгредієнта, і шар, який складається з множини активних інгредієнтів можна нанести кілька разів, або шар, який складається з множини активних інгредієнтів можна нанести кілька разів.

Пропоновану сполуку або композицію, які використовуються для обробки насіння можна використовувати самі по собі або будь-які матеріали, крім пропонованої сполуки, пропонованої сполуки A або композиції A можна нанести, так щоб вони прилипнули, до або після обробки пропонованою сполукою, пропонованою сполукою A або композицією A.

Приклади нанесення на насіння (або засоби для обробки насіння) включають нанесення пропонованої сполуки X або композиції A на насіння або вегетативні репродуктивні органи і конкретні його приклади включають обробку обприскуванням, за якої суспензію пропонованої сполуки X або композиції A наносять обприскуванням на поверхню насіння або на поверхню вегетативного репродуктивного органу в формі туману; обробку обмазуванням, за якої пропоновану сполуку X або композицію A наносять обмазуванням на поверхню насіння або вегетативного репродуктивного органу; обробку замочуванням, за якої насіння замочують в розчині пропонованої сполуки X або композиції A протягом деякого часу; і методику нанесення на насіння або вегетативний репродуктивний орган за допомогою носія, який містить

пропоновану сполуку X або композицію A (обробка шляхом нанесення плівкового покриття, обробка шляхом нанесення пелет). Приклади описаного вище вегетативного репродуктивного органу, зокрема, включають насіння картоплі.

Якщо композицію A наносять на насіння або вегетативні репродуктивні органи, композицію A також можна нанести на насіння або вегетативні репродуктивні органи у вигляді одного препарату або композиції A, можна нанести на насіння або вегетативні репродуктивні органи у вигляді множини розділених препаратів кілька разів. Приклади методики, за якої композицію A наносять у вигляді множини розділених препаратів кілька разів, включають, наприклад, методику, за якої препарати, які містять як активний компонент лише пропоновану сполуку X, і насіння або вегетативні репродуктивні органи сушать на повітрі, потім наносять препарати, які містять пропонований інгредієнт; і методику, за якої наносять препарати, які містять як активний компонент пропоновану сполуку X і пропоновані інгредієнти, і насіння або вегетативні репродуктивні органи сушать на повітрі, потім наносять препарати, які містять пропоновані інгредієнти крім уже нанесених пропонованих інгредієнтів.

При використанні в даному винаході насіння або вегетативні репродуктивні органи, які містять пропоновану сполуку X або композицію A, означають насіння або вегетативні репродуктивні органи в стані, коли пропонована сполука X або композиція A прилипає до поверхні насіння або вегетативного репродуктивного органу. Описане вище насіння або вегетативні репродуктивні органи, які містять пропоновану сполуку X або композицію A, можуть містити будь-які інші матеріали, які прилипли, які відрізняються від пропонованої сполуки X або композиції A, які нанесені до або після прилипання пропонованої сполуки X або композиції A до насіння або вегетативних репродуктивних органів.

Крім того, якщо композиція A прилипає у вигляді шару (шарів) до поверхні насіння або вегетативного репродуктивного органу, шар (шари) складається (складаються) з одного шару або множини шарів. Крім того, якщо утворюється множина шарів, кожен з шарів може складатися з шару, який містить один або більшу кількість активних інгредієнтів, або являти собою комбінацію шару, який містить один або більшу кількість активних інгредієнтів, і шару, не містить активний інгредієнт.

Насіння або вегетативні репродуктивні органи, які містять пропоновану сполуку X або композицію A можна отримати, наприклад, шляхом нанесення препаратів, які містять пропоновану сполуку X або композицію A, за отриманою вище методикою нанесення для насіння або вегетативних репродуктивних органів.

Якщо пропоновану сполуку, пропоновану сполуку A або композицію A наносять для боротьби з членистоногими шкідниками в галузі сільського господарства, її доза, яка наноситься, звичайно знаходиться в діапазоні від 1 до 10000 г пропонованої сполуки або пропонованої сполуки X на 10000 $м^2$. У випадку нанесення на насіння або вегетативні репродуктивні органи, її доза, яка наноситься, звичайно знаходиться в діапазоні від 0,001 до 100 г пропонованої сполуки X на 1 кг насіння. Якщо пропоновану сполуку, пропоновану сполуку X або композицію A готують як емульгований концентрат, змочуваний порошок або сипкий препарат і т. п., їх звичайно наносять з розбавленням водою для забезпечення ефективної концентрації активних інгредієнтів, що дорівнює від 0,01 до 10000 част./млн, і дуст препарату або гранульований препарат і т. п. звичайно наносять без розбавлення.

Крім того, смоляний препарат, який перероблений на пластинку або смужку, можна використовувати шляхом обмотування рослини пластинкою або смужкою смоляного препарату, розміщення смужки смоляного препарату біля рослини, так щоб рослина була оточена смужкою, або розміщення смужки смоляного препарату на поверхні ґрунту поблизу від коренів рослини.

Якщо пропоновану сполуку, пропоновану сполуку A або композицію A використовують для боротьби з організмами шкідниками, які мешкають в приміщенні, кількість, яка наноситься, пропонованої сполуки або пропонованої сполуки X звичайно знаходиться в діапазоні від 0,01 до 1000 мг на 1 $м^2$ оброблюваної площі у випадку використання на плоскій ділянці. У випадку використання в об'ємі кількість, яка наноситься, пропонованої сполуки або пропонованої сполуки X звичайно знаходиться в діапазоні від 0,01 до 500 мг на 1 $м^3$ оброблюваного об'єму. Якщо пропоновану сполуку, пропоновану сполуку X або композицію A готують як емульговані концентрати, змочувані порошки або сипкі препарати і інш., такі препарати звичайно наносять після розбавлення водою таким чином, щоб концентрація активного інгредієнта знаходилась в діапазоні від 0,1 до 10000 част./млн. У випадку, якщо готують, як масляні розчини, аерозолі, засоби для обкурювання, отруйні приманки і інш., такі препарати використовують без розбавлення.

Якщо пропоновану сполуку, пропоновану сполуку X або композицію використовують для боротьби із зовнішніми паразитами на домашній худобі, такій як велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози і кури і невеликі тварини, такі як собаки, кішки, щури і миші, композицію, яка пропонується в даному винаході, можна наносить на тварин за відомими ветеринарними методиками. Зокрема, якщо необхідна системна боротьба, композицію, яка пропонується в даному винаході, вводять тваринам за допомогою таблеток, суміші з кормом, супозиторіїв і ін'єкції (включаючи внутрішньом'язові, підшкірні, внутрішньовенні і внутрішньоочеревинні ін'єкції). З іншого боку, якщо необхідна несистемна боротьба, композицію, яка пропонується в даному винаході, вводять тваринам за допомогою оббризкування масляним розчином або водним розчином, обробкою зануренням або за допомогою точкового нанесення, або миття тварини препаратом шампуню, або накладання на тварину смоляного препарату, який приготований у вигляді ошийника або вушної бирки. У випадку введення в організм тварини кількість сполуки пропонованої сполуки або пропонованої сполуки X звичайно знаходиться в діапазоні від 0,1 до 1000 мг на 1 кг маси тіла тварини.

Крім того, композицію пропонованої сполуки, пропонованої сполуки X або композицію A можна використовувати як засоби для боротьби з членистоногими шкідниками на сільськогосподарських ділянках, таких як зрошувані рисові поля, поля, газони і плодові сади. Приклади рослин, на які здійснюють нанесення, включають наступні:

кукурудза, рис, пшениця, ячмінь, жито, овес, сорго, бавовник, соя, арахіс, гречка, цукровий буряк, ріпак, соняшник, цукрова тростина, тютюн,

пасльонові овочі (наприклад, баклажан, томат, зелений перець, гострий перець або картопля),

хрестоцвіті овочі (наприклад, огірок, гарбуз, цукіні, кавун або диня),

хрестоцвіті овочі (наприклад, дайкон, білий турнепс, хрін, кольрабі, китайська капуста, кочанна капуста, гірчиця суріптська, броколі або цвітна капуста),

складноцвіті овочі (наприклад, лопух, хризантема увінчана, артишок або латук),

лілейні овочі (наприклад, цибуля-батун, цибуля, часник або спаржа),

зонтичні овочі (наприклад, морква, петрушка, селера або пастернак),

лободові овочі (наприклад, шпинат або мангольд),

губоцвіті овочі (наприклад, Perilla frutescens, м'ята або базилік),

суниця, батат, Dioscorea japonica, колоказія,

насіннячкові плоди (наприклад, яблуня, груша звичайна, груша піщана, китайська айва або айва),

кісточкові м'ясисті плоди (наприклад, персик, слива, нектарин, Prunus mume, вишня, абрикос або чорнослив),

цитрусові плоди (наприклад, Citrus unshiu, апельсин, лимон, лайм або грейпфрут),

горіхи (наприклад, каштан, грецький горіх, фундук, мигдаль, фісташка, кеш'ю або горіх макадамія),

ягідні плоди (наприклад, лохина, журавлина, чорниця або малина),

виноград, хурма, олива, мушмула японська, банан, кофе, фінік, кокос, чай, шовковиця, декоративні листяні рослини, лісонасадження, газони, вигони.

На вказані вище рослини не накладають особливі обмеження, якщо вони є звичайно вирощуваними сортами. Вказані вище рослини можуть включать рослини, які можна отримати природним схрещуванням, рослини, які розвинулись за допомогою мутації, F1 гібридні рослини і генетично модифіковані рослини. Приклади генетично модифікованих рослин включають рослини, яким додана резистентність до гербіцидів, включаючи інгібітори HPPD (тобто, 4-гідроксифенілпіруватдіоксигеназа), такі як ізоксафлутол; інгібітори ALS (тобто, ацетоацетатсинтаза), такі як імазетапір і тифенсульфурон-метил; інгібітори EPSP (тобто, 5-енолпірувоїлшикімат-3-фосфатсинтаза); інгібітори глутамінсинтетази; інгібітори PPO (тобто, протопорфіриногеноксидаза); бромоксиніл; дикамба і т. п.; рослини, яким додана здатність синтезувати деякі токсини і т. п. (наприклад, роду Bacillus, такі як Bacillus thuringiensis); і рослини, здатні синтезувати сегмент гена, який частково відповідає ендогенному гену, утвореному з комахи-шкідника, і також додана специфічна інсектицидна активність шляхом індукування мовчання гена (RNAi; RNA інтерференція) в мішені - комасі-шкіднику.

ПРИКЛАДИ

Нижче даний винахід детальніше пояснений з використанням прикладів отримання, еталонних прикладів отримання і прикладів дослідження, однак даний винахід не обмежується цими прикладами.

При використанні в даному винаході "Me" являє собою метильну групу, "Et" являє собою етильну групу, "Pr" являє собою пропільну групу, "i-Pr" являє собою ізопропільну групу, "c-Pr"

являє собою циклопропільну групу, "c-Bu" являє собою циклобутильну групу, "c-Pen" являє собою циклопентильну групу, "c-Hex" являє собою циклогексильну групу, "Ph" являє собою фенільну групу, "Py2" являє собою 2-піридильну групу, "Py3" являє собою 3-піридильну групу, "Py4" являє собою 4-піридильну групу, "Bn" являє собою бензильну групу. "Boc" являє собою трет-бутоксикарбонільну групу. Якщо c-Pr, c-Bu, c-Pen, c-Hex, Ph, Py2, Py3 і Py4 містять замісник, замісник описаний разом з вказуванням положення заміщення перед позначенням. Наприклад, "1-CN-c-Pr" являє собою 1-ціаноциклопропільну групу, "3,4-F_2-Ph" являє собою 3,4-дифторфенільну групу, "4-CF_3-Py2" являє собою 4-(трифторметил)-2-піридильну групу і "5-$OCH_2CF_2CF_3$-Py2" являє собою 5-(2,2,3,3,3-пентафторпропокси)-2-піридильну групу.

В даному винаході при посиланні на "пропоновану сполуку X" вона включає "пропоновану сполуку", якщо не вказане інше. Крім того, в даному винаході при посиланні на "пропоновану сполуку P" вона включає "пропоновану сполуку N" якщо не указано інше.

Спочатку описані приклади пропонованої сполуки X і методика отримання її проміжної сполуки.

Еталонний приклад отримання 1

Суміш 4-(трифторметил)антранілової кислоти 3,00 г і формаміду 6 мл перемішували при 140 °C протягом 11 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали воду і суміш фільтрували. Отримані тверді речовини сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 1, представлену наступною формулою, 2,90 г.



Проміжна сполука 1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 10,46 (1H, br s), 8,43 (1H, d), 8,14 (1H, s), 8,05 (1H, d), 7,75 (1H, dd).

Еталонний приклад отримання 2

До суміші 4-(трифторметил)антранілової кислоти 3,00 г і THF 22 мл по краплях додавали суміш трифосгену 1,52 г і THF 15 мл при охолодженні льодом. Отриману суміш перемішували за кімнатної температури протягом 4 год. До отриманої суміші додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 2, представлену наступною формулою, 3,30 г.



Проміжна сполука 2: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 11,98 (1H, br s), 8,10 (1H, d), 7,54 (1H, d), 7,37 (1H, s).

Еталонний приклад отримання 3

До суміші 6-бром-3-(етилтіо)імідазо[1,2-a]піридин-2-аміну 300 мг (отримували, як описано в WO/2018052136) і THF 4 мл по краплях додавали розчин біс(триметилсиліл)аміду калію (1 моль/л розчин в THF) 2,2 мл при -78 °C в атмосфері азоту і суміш перемішували протягом 30 хв. Суміш проміжної сполуки 2 і THF 4 мл додавали до отриманої суміші і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 30 хв. Насичений водний розчин хлориду амонію додавали до отриманої суміші і суміш екстрагували етилацетатом. Отриману суміш сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. До отриманого залишку додавали гексан і отримані тверді речовини відфільтровували. Відфільтровані речовини промивали гексаном і отримували проміжну сполуку 3, представлену наступною формулою, 491 мг.



Проміжна сполука 3-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,54 (1H, dd), 8,35 (1H, s), 7,67 (1H, d), 7,60 (1H, dd), 7,41 (1H, dd), 7,00 (1H, s), 6,98 (1H, d), 5,95 (2H, br s), 2,75 (2H, q), 1,27 (3H, t).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 3, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.

Сполука, представлена формулою (B-1):



(B-1),

де комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою будь-яку комбінацію, вказану в таблиці B1.

Таблиця B1

Проміжна сполука	B^2	B^3	B^4
3-2	CCF_3	CH	CH
3-3	CH	CH	CCF_3
3-4	CH	CCF_3	N
3-5	CH	CCl	CH
3-6	CH	Cl	CH
3-7	$COCF_3$	CH	CH

Проміжна сполука 3-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,53-8,53 (1H, m), 8,33 (1H, s), 7,80 (1H, s), 7,57 (1H, d), 7,50 (1H, dd), 7,39 (1H, dd), 6,78 (1H, d), 6,14 (2H, s), 2,74 (2H, q), 1,26 (3H, t).

Проміжна сполука 3-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,51 (1H, dd), 8,25 (1H, br s), 7,73 (1H, d), 7,62 (1H, d), 7,57 (1H, dd), 7,38 (1H, dd), 6,77 (1H, t), 6,39 (2H, br s), 2,72 (2H, q), 1,24 (3H, t).

Проміжна сполука 3-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,52 (1H, d), 8,35 (1H, br s), 7,98 (1H, d), 7,56 (1H, d), 7,40 (1H, dd), 7,03 (1H, d), 6,69 (2H, br s), 2,73 (2H, q), 1,24 (3H, t).

Проміжна сполука 3-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,50 (1H, dd), 8,29 (1H, s), 7,56 (1H, dd), 7,47 (1H, d), 7,37 (1H, dd), 6,73 (1H, d), 6,68 (1H, dd), 5,87 (2H, s), 2,71 (2H, q), 1,23 (3H, t).

Проміжна сполука 3-6: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,49 (1H, d), 8,28 (1H, br s), 7,56 (1H, d), 7,36 (1H, dd), 7,23 (1H, d), 7,13 (1H, d), 7,04 (1H, dd), 5,79 (2H, br s), 2,71 (2H, q), 1,22 (3H, t).

Проміжна сполука 3-7: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,51 (1H, s), 8,26 (1H, s), 7,56 (1H, d), 7,39-7,36 (2H, m), 7,18 (1H, d), 6,72 (1H, d), 5,77 (2H, s), 2,73 (2H, q), 1,24 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 4

До суміші 6-бромімідазо[1,2-a]піридин-2-аміну 0,47 г (отримували, як описано в WO2012/173412) і THF 5 мл по краплях додавали розчин біс(триметилсиліл)аміду калію (1 моль/л розчин в THF) 4,4 мл при -78 °C в атмосфері азоту і суміш перемішували протягом 30 хв. Суміш проміжної сполуки 2, 0,61 г і THF 5 мл додавали до отриманої суміші і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 30 хв. Насичений водний розчин хлориду амонію додавали до отриманої суміші і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. До отриманого залишку додавали гексан і отримані тверді речовини відфільтровували. Відфільтровані речовини промивали гексаном і отримували проміжну сполуку 4, представлену наступною формулою, 0,66 г.



Проміжна сполука 4: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 11,20 (1H, s), 8,95 (1H, dd), 8,29 (1H, s), 7,94 (1H, d), 7,46 (1H, d), 7,36 (1H, dd), 7,11 (1H, d), 6,82 (1H, d), 6,81 (2H, br s).

Еталонний приклад отримання 5

Суміш проміжної сполуки 4 0,66 г і триетилортоформіату 20 мл перемішували при 100 °C протягом 4 год. Триетилортоформіат 10 мл додавали до отриманої суміші і суміш перемішували при 100 °C протягом 2 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і концентрували при зниженому тиску. Отримані тверді речовини промивали гексаном і отримували проміжну сполуку 5, представлену наступною формулою, 0,54 г.



Проміжна сполука 5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,50 (1H, s), 8,53-8,52 (1H, m), 8,54 (1H, d), 8,36 (1H, dd), 8,10 (1H, d), 7,77 (1H, dd), 7,53 (1H, d), 7,38 (1H, dd).

Еталонний приклад отримання 6

До суміші проміжної сполуки 5, 0,54 г і DMF, 26 мл додавали N-йодсукцинімід 0,44 г при охолодженні льодом і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 10 год. N-йодсукцинімід, 0,30 г додавали до отриманої суміші при охолодженні льодом і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 6 год. До отриманої суміші додавали воду і отримані тверді речовини розчиняли в хлороформі і промивали насиченим водним розчином тіосульфату натрію. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 6, представлену наступною формулою, 0,32 г.



Проміжна сполука 6: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,53 (1H, d), 8,37 (1H, d), 8,26 (1H, s), 8,10-8,07 (1H, m), 7,79 (1H, dd), 7,57 (1H, d), 7,47 (1H, dd).

Еталонний приклад отримання 7

До суміші 3-(трифторметилтіо)аніліну, 5,00 г і толуолу, 150 мл додавали N-бромсукцинімід 4,83 г за кімнатної температури і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 1 год. До отриманої суміші додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 7-1, представлену наступною формулою, 2,99 г.



Проміжна сполука 7-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 7,44 (1H, d), 7,03 (1H, d), 6,87 (1H, dd), 4,23 (2H, s).

Еталонний приклад отримання 8

Проміжну сполуку 7-2 отримували з використанням 4-(трифторметилтіо)аніліну замість 3-(трифторметилтіо)аніліну за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 7.



Проміжна сполука 7-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 7,71 (1H, d), 7,37 (1H, dd), 6,75 (1H, d), 4,41 (2H, s).

Еталонний приклад отримання 9

Суміш проміжної сполуки 7-1 2,99 г, ди-трет-бутилдикарбонату 2,88 г і THF 22 мл перемішували при 70 °C протягом 4 год. До отриманої суміші додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриману суміш сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 8-1, представлену наступною формулою, 4,64 г.



Проміжна сполука 8-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 7,68 (1H, d), 7,53 (1H, d), 7,46 (1H, dd), 1,39 (18H, s).

Еталонний приклад отримання 10

Проміжну сполуку 8-2 отримували з використанням проміжної сполуки 7-2 замість проміжної сполуки 7-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 9.



Проміжна сполука 8-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 7,92 (1H, d), 7,61 (1H, dd), 7,28 (1H, d), 1,39 (18H, s).

Еталонний приклад отримання 11

До суміші проміжної сполуки 8-1 2,0 г і THF 42 мл по краплях додавали бутиллітій, 3 мл при -78 °C в атмосфері азоту і суміш перемішували протягом 15 хв. Насичений водний розчин хлориду амонію додавали до отриманої суміші і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 9-1, представлену наступною формулою, 0,93 г.



Проміжна сполука 9-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 10,36 (1H, s), 8,77 (1H, s), 7,96 (1H, d), 7,22 (1H, d), 1,61 (9H, s), 1,54 (9H, s).

Еталонний приклад отримання 12

Проміжну сполуку 9-2 отримували з використанням проміжної сполуки 8-2 замість проміжної сполуки 8-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 11.



Проміжна сполука 9-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 10,50 (1H, s), 8,53 (1H, d), 8,20 (1H, d), 7,71 (1H, dd), 1,62 (9H, s), 1,54 (9H, s).

Еталонний приклад отримання 13

Суміш проміжної сполуки 9-1, 0,93 г, трифтороцтової кислоти, 6 мл і хлороформу, 23 мл перемішували за кімнатної температури протягом 20 год. Отриману суміш концентрували і отримані тверді речовини промивали гексаном і отримували проміжну сполуку 10-1, представлену наступною формулою, 0,57 г.



Проміжна сполука 10-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 7,93 (1H, d), 6,96 (1H, s), 6,89 (1H, d).

Еталонний приклад отримання 14

Проміжну сполуку 10-2 отримували з використанням проміжної сполуки 9-2 замість проміжної сполуки 9-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 13.



Проміжна сполука 10-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,23 (1H, d), 7,53 (1H, dd), 6,70 (1H, d).

Еталонний приклад отримання 15

До суміші 2-фтор-4-йодбензойної кислоти, 3,00 г і хлороформу, 28 мл за кімнатної температури послідовно додавали оксалілхлорид, 2,2 мл і DMF, 0,1 мл і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 1 год. Отриману суміш концентрували і суміш розчиняли в THF, 28 мл і до отриманої суміші по краплях послідовно додавали бензиловий спирт, 1,8 мл і триетиламін, 4,7 мл при охолодженні льодом і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 1 год. Насичений водний розчин бікарбонату натрію додавали до отриманої суміші і суміш екстрагували етилацетатом. Отриману суміш сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 11, представлену наступною формулою, 3,78 г.



Проміжна сполука 11: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 7,68-7,64 (1H, m), 7,57-7,54 (2H, m), 7,45-7,44 (2H, m), 7,41-7,33 (3H, m), 5,37 (2H, s).

Еталонний приклад отримання 16

Суміш проміжної сполуки 11, 2,45 г, фториду калію, 0,76 г, йодиду міді(I), 3,14 г, триметил(пентафторетил)силану, 2,4 мл і DMF, 15 мл перемішували при 80 °C при нагріванні мікрохвильовим випромінюванням протягом 6 год. Насичений водний розчин аміаку і MTBE послідовно додавали до отриманої суміші і суміш фільтрували через целіт (зареєстрована торговельна марка). Отримані фільтрати екстрагували за допомогою MTBE. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 12, представлену наступною формулою, 1,97 г.



Проміжна сполука 12: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,11-8,09 (1H, m), 7,47-7,33 (7H, m), 5,39 (2H, s).

Еталонний приклад отримання 17

До суміші проміжної сполуки 12, 0,80 г і DMSO, 5 мл додавали азид натрію 194 мг за кімнатної температури і суміш перемішували при 80 °C протягом 1 год. Азид натрію 75 мг додавали до отриманої суміші за кімнатної температури і суміш перемішували при 80 °C протягом 3 год. Отриману суміш охолоджували льодом і до неї додавали воду і суміш екстрагували за допомогою MTBE. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 13, представлену наступною формулою, 0,85 г.



Проміжна сполука 13: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 7,98 (1H, d), 7,47-7,31 (7H, m), 5,38 (2H, s).

Еталонний приклад отримання 18

Суміш проміжної сполуки 13, 0,85 г, 10% паладію на вугіллі, 0,21 г, і метанолу 5 мл перемішували протягом 8 год. в атмосфері водню. Отриману суміш фільтрували через целіт (зареєстрована торговельна марка) і фільтрати концентрували при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 14, представлену наступною формулою, 0,64 г.



Проміжна сполука 14: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,01 (1H, d), 6,89 (1H, s), 6,85 (1H, d).

Еталонний приклад отримання 19

Проміжну сполуку 15 отримували з використанням 2-аміно-5-йодбензойної кислоти замість проміжної сполуки 7-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 9.



Проміжна сполука 15: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,32 (1H, d), 7,84 (1H, dd), 6,93 (1H, d), 3,87 (3H, s), 1,38 (18H, s).

Еталонний приклад отримання 20

Проміжну сполуку 16 отримували з використанням проміжної сполуки 15 замість проміжної сполуки 11 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 16.



Проміжна сполука 16: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,25 (1H, s), 7,76 (1H, d), 7,37 (1H, d), 3,90 (3H, s), 1,38 (18H, s).

Еталонний приклад отримання 21

До суміші проміжної сполуки 16, 2,44 г і етанолу, 13 мл по краплях додавали 15% водний розчин гідроксиду натрію при охолодженні льодом. Отриману суміш перемішували за кімнатної температури протягом 6 год. і концентрували при зниженому тиску, і нейтралізували за допомогою 2 н. хлористоводневої кислоти. Отриману суміш екстрагували етилацетатом, і отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 17, представлену наступною формулою, 1,80 г.



Проміжна сполука 17: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 8,13 (1H, s), 7,94-7,93 (1H, m), 7,62-7,61 (1H, m), 7,53 (1H, d), 1,48 (9H, s).

Еталонний приклад отримання 22

Проміжну сполуку 18 отримували з використанням проміжної сполуки 17 замість проміжної сполуки 9-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 13.



Проміжна сполука 18: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 7,91 (1H, d), 7,45 (1H, dd), 6,92 (1H, d).

Еталонний приклад отримання 23

До суміші етил імідазо[1,2-a]піридин-2-карбоксилату 5,66 г і DMF 40 мл додавали N-хлорсукцинімід 4,37 г при охолодженні льодом і суміш перемішували при 60 °C протягом 6 год. До отриманої суміші додавали воду і осаджені тверді речовини відфільтровували. Отримані тверді речовини промивали водою і сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 19-1, представлену наступною формулою, 6,60 г.



Проміжна сполука 19-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,16-8,15 (1H, m), 7,71-7,69 (1H, m), 7,36-7,31 (1H, m), 7,05-7,01 (1H, m), 4,50 (2H, q), 1,47 (3H, t).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 23, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 19-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,19 (1H, d), 7,65 (1H, d), 7,29 (1H, dd), 4,49 (2H, q), 1,46 (3H, t).



Проміжна сполука 19-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,41 (1H, dd), 7,51-7,45 (2H, m), 4,49 (2H, q), 1,46 (3H, t).



Проміжна сполука 19-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,52 (1H, dd), 7,82 (1H, dd), 7,47 (1H, dd), 4,52 (2H, q), 1,48 (3H, t).



Проміжна сполука 19-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,10 (1H, dd), 7,89 (1H, dd), 7,25 (1H, dd), 4,49 (2H, q), 1,46 (3H, t).



Проміжна сполука 19-6: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,74 (1H, dd), 8,47 (1H, dd), 7,10 (1H, dd), 4,51 (2H, q), 1,47 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 24

До суміші проміжної сполуки 19-1, 6,60 г, карбонату цезію, 24,2 г і DMF, 45 мл додавали етантриол, 2,4 мл за кімнатної температури і суміш перемішували протягом 4 год. До отриманої суміші додавали воду і осаджені тверді речовини відфільтровували. Отримані тверді речовини промивали водою і сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 20-1, представлену наступною формулою, 6,76 г.



Проміжна сполука 20-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,57-8,55 (1H, m), 7,73-7,70 (1H, m), 7,36-7,32 (1H, m), 7,01-6,98 (1H, m), 4,51 (2H, q), 2,94 (2H, q), 1,48 (3H, t), 1,19 (3H, t).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 24, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 20-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,59 (1H, s), 7,66 (1H, d), 7,30 (1H, d), 4,50 (2H, q), 2,95 (2H, q), 1,47 (3H, t), 1,21 (3H, t).



Проміжна сполука 20-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,80 (1H, dd), 7,52-7,48 (2H, m), 4,50 (2H, q), 2,95 (2H, q), 1,47 (3H, t), 1,21 (3H, t).



Проміжна сполука 20-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,92 (1H, s), 7,82 (1H, d), 7,47 (1H, d), 4,52 (2H, q), 2,99 (2H, q), 1,48 (3H, t), 1,22 (3H, t).



Проміжна сполука 20-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,29 (1H, dd), 8,12 (1H, dd), 7,22 (1H, dd), 4,50 (2H, q), 2,93 (2H, q), 1,47 (3H, t), 1,18 (3H, t).



Проміжна сполука 20-6: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,84 (1H, dd), 8,73 (1H, dd), 7,06 (1H, dd), 4,51 (2H, q), 2,97 (2H, q), 1,47 (3H, t), 1,19 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 25

Проміжну сполуку 21-1 отримували з використанням проміжної сполуки 20-1 замість проміжної сполуки 16 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 21.



Проміжна сполука 21-1: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 8,67-8,65 (1H, m), 7,71-7,69 (1H, m), 7,49-7,45 (1H, m), 7,18-7,14 (1H, m), 2,87 (2H, q), 1,05 (3H, t).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 25, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 21-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,74 (1H, s), 7,76 (1H, d), 7,52 (1H, d), 2,89 (2H, q), 1,07 (3H, t).



Проміжна сполука 21-3: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 8,77 (1H, dd), 7,61 (1H, dd), 7,50 (1H, dd), 2,86 (2H, q), 1,03 (3H, t).



Проміжна сполука 21-4: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 8,89 (1H, s), 7,82 (1H, d), 7,62 (1H, d), 2,92 (2H, q), 1,03 (3H, t).



Проміжна сполука 21-5: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 8,40 (1H, dd), 8,15-8,13 (1H, m), 7,34 (1H, dd), 2,85 (2H, q), 1,01 (3H, t).



Проміжна сполука 21-6: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 9,46 (1H, dd), 8,66 (1H, dd), 7,26 (1H, dd), 3,23 (2H, q), 1,37 (3H, t).



Проміжна сполука 44: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,51-8,50 (1H, m), 8,18-8,15 (1H, m), 7,39-7,33 (1H, m), 3,01 (2H, q), 1,23 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 26

До суміші проміжної сполуки 21-1, 5,45 г, триетиламіну, 8,5 мл, і трет-бутилового спирту, 50 мл додавали дифенілфосфорилазид, 9,2 мл і суміш перемішували при 90 °C протягом 5 год. Отриману суміш концентрували і до неї додавали насичений водний розчин бікарбонату натрію і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 22-1, представлену наступною формулою, 4,96 г.



Проміжна сполука 22-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,34-8,32 (1H, m), 7,63-7,61 (1H, m), 7,25-7,23 (1H, m), 7,00 (1H, s), 6,92-6,88 (1H, m), 2,64 (2H, q), 1,54 (9H, s), 1,19 (3H, t).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 26, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 22-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,34 (1H, dd), 7,56 (1H, dd), 7,20 (1H, dd), 7,02 (1H, s), 2,66 (2H, q), 1,55 (9H, s), 1,21 (3H, t).



Проміжна сполука 22-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,54 (1H, dd), 7,44-7,39 (2H, m), 7,01 (1H, s), 2,65 (2H, q), 1,55 (9H, s), 1,20 (3H, t).



Проміжна сполука 22-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,67 (1H, s), 7,72 (1H, d), 7,41 (1H, d), 7,08 (1H, s), 2,69 (2H, q), 1,57 (9H, s), 1,22 (3H, t).



Проміжна сполука 22-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,07 (1H, d), 8,01 (1H, s), 7,15 (1H, d), 6,99 (1H, s), 2,64 (2H, q), 1,58 (9H, s), 1,19 (3H, t).



Проміжна сполука 22-6: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,50 (1H, dd), 8,15 (1H, dd), 6,89 (1H, dd), 6,30 (1H, s), 3,22 (2H, q), 1,53 (9H, s), 1,36 (3H, t).



Проміжна сполука 22-7: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,26-8,25 (1H, m), 7,60-7,58 (1H, m), 7,16-7,14 (1H, m), 7,00 (1H, s), 2,65 (2H, q), 1,55 (9H, s), 1,20 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 27

Суміш проміжної сполуки 22-1, 4,96 г і 4 моль/л розчину хлориду водню в 1,4-діоксані, 40 мл перемішували за кімнатної температури протягом 10 год. Отриману суміш концентрували і до неї додавали воду і суміш нейтралізували за допомогою 10 н. водного розчину гідроксиду натрію. Отриману суміш екстрагували хлороформом і отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 23-1, представлену наступною формулою, 3,20 г.



Проміжна сполука 23-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,25-8,23 (1H, m), 7,35-7,33 (1H, m), 7,19-7,15 (1H, m), 6,82-6,79 (1H, m), 4,30 (2H, s), 2,60 (2H, q), 1,20 (3H, t).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 27, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 23-2: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 8,34 (1H, dd), 7,26 (1H, dd), 7,20 (1H, dd), 5,57 (2H, s), 2,61 (2H, q), 1,09 (3H, t).



Проміжна сполука 23-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,43 (1H, dd), 7,34 (1H, dd), 7,13 (1H, dd), 4,31 (2H, s), 2,61 (2H, q), 1,21 (3H, t).



Проміжна сполука 23-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,56 (1H, dd), 7,41 (1H, dd), 7,32 (1H, dd), 4,43 (2H, s), 2,64 (2H, q), 1,23 (3H, t).



Проміжна сполука 23-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 7,97 (1H, dd), 7,71 (1H, dd), 7,05 (1H, dd), 4,32 (2H, s), 2,59 (2H, q), 1,19 (3H, t).



Проміжна сполука 23-6: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 8,44 (1H, dd), 8,27 (1H, dd), 6,93 (1H, dd), 5,23 (2H, s), 2,87 (2H, q), 1,18 (3H, t).



Проміжна сполука 23-7: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,17-8,17 (1H, m), 7,31-7,27 (1H, m), 7,08-7,04 (1H, m), 4,29 (2H, s), 2,61 (2H, q), 1,22 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 28

Суміш 6-бром-3-(етилтіо)імідазо[1,2-b]піридин-2-аміну, 1,00 г, який отримували за методикою, описаною в WO 2018/052136, триметилбороксину, 507 мг, комплексу [1,1'-біс(дифенілфосфіно)фероцен]дихлорпаладію(II) з дихлорметаном, 340 мг, карбонату калію, 1,52 г і 1,4-діоксану, 36 мл перемішували при 100 °C протягом 8 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і потім до неї додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 24, представлену наступною формулою, 0,19 г.



Проміжна сполука 24: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,03-8,02 (1H, m), 7,26-7,23 (1H, m), 7,02 (1H, dd), 4,22 (2H, s), 2,59 (2H, q), 2,34 (3H, s), 1,21 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 29

До суміші 2-аміно-5-бромпіримідину, 50,0 г і піридину, 280 мл по краплях додавали суміш п-толуолсульфонілхлориду, 164 г і піридину, 280 мл протягом 40 хв. за кімнатної температури. Отриману суміш перемішували при 80 °C протягом 15 год. і витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали воду. Осаджені тверді речовини відфільтровували. Отримані тверді речовини послідовно промивали водою і етанолом і сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 25-1, представлену наступною формулою, 70,6 г.



Проміжна сполука 25-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,69 (1H, s), 8,58 (2H, s), 7,99 (2H, d), 7,31 (2H, d), 2,42 (3H, s).

Еталонний приклад отримання 30

Проміжну сполуку 25-2 отримували з використанням 2-аміно-5-йодпіримідину замість 2-аміно-5-бромпіримідину за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 29.



Проміжна сполука 25-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,56 (1H, s), 8,68 (2H, s), 7,99 (2H, d), 7,31 (2H, d), 2,42 (3H, s).

Еталонний приклад отримання 31

До суміші проміжної сполуки 25-1 60,8 г і DMF 370 мл по краплях додавали діізопропілетиламін 39 мл за кімнатної температури і суміш перемішували протягом 50 хв. 2-Йодацетамід, 41,1 г додавали до отриманої суміші і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 8,5 год. До отриманої суміші додавали воду і осаджені тверді речовини відфільтровували. Отримані тверді речовини промивали водою і сушили при зниженому тиску.

Отримані тверді речовини розчиняли в хлороформі, 500 мл і до додавали ним трифтороцтовий ангідрид, 500 мл і суміш перемішували при 40 °C протягом 6 год. Отриману суміш концентрували при зниженому тиску і до отриманого залишку послідовно додавали етилацетат і насичений водний розчин бікарбонату натрію і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 26-1, представлену наступною формулою, 16,4 г.



Проміжна сполука 26-1: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 12,76 (1H, s), 9,33 (1H, d), 8,56 (1H, d), 8,17 (1H, s).

Еталонний приклад отримання 32

Проміжну сполуку 26-2 отримували з використанням проміжної сполуки 25-2 замість проміжної сполуки 25-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 31.



Проміжна сполука 26-2: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 12,73 (1H, s), 9,35 (1H, d), 8,60 (1H, d), 8,13 (1H, s).

Еталонний приклад отримання 33

До суміші проміжної сполуки 26-1, 8,20 г і NMP, 88 мл послідовно додавали діетилдисульфід, 6,5 мл і йод, 12,1 г за кімнатної температури і суміш перемішували при 110 °C протягом 2,5 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї послідовно додавали етилацетат, воду і насичений водний розчин тіосульфату натрію і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 27-1, представлену наступною формулою, 3,84 г.



Проміжна сполука 27-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,81 (1H, d), 8,63 (1H, d), 2,82 (2H, q), 1,25 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 34

Проміжну сполуку 27-2 отримували з використанням проміжної сполуки 26-2 замість проміжної сполуки 26-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 33.



Проміжна сполука 27-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,90 (1H, d), 8,69 (1H, d), 2,84-2,81 (2H, m), 1,25 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 35

Суміш проміжної сполуки 27-1 3,84 г, карбонату калію 7,19 г, води 100 мл і метанолу 200 мл перемішували при 80 °C протягом 1 год. Отриману суміш концентрували і до неї додавали воду і осаджені тверді речовини відфільтровували. Отримані тверді речовини сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 28-1, представлену наступною формулою, 2,00 г.



Проміжна сполука 2-81: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,52 (1H, d), 8,34 (1H, d), 4,60 (2H, s), 2,63 (2H, q), 1,23 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 36

Проміжну сполуку 28-2 отримували з використанням проміжної сполуки 27-2 замість проміжної сполуки 27-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 35.



Проміжна сполука 28-2: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 8,75 (1H, d), 8,33 (1H, d), 6,02 (2H, s), 2,64 (2H, d), 1,09 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 37

До суміші хлороцтової кислоти, 9,49 г і води, 15 мл при 0 °C протягом 30 хв. додавали триетиламін, 16,7 мл. 2-Аміно-5-(трифторметил)піридин, 16,1 г додавали до отриманої суміші і суміш перемішували при кип'ятінні зі зворотним холодильником протягом 2 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і осаджені тверді речовини відфільтровували. Отримані тверді речовини промивали водою і сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 29-1, представлену наступною формулою, 11,0 г.



Проміжна сполука 29-1: LCMS: 219 $[M-H]^-$, RT=0,42 хв.

Сполука, яку отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 37, і значення її фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 29-2: LCMS: 229 $[M-H]^-$, RT=0,34 хв.

Еталонний приклад отримання 38

Суміш неочищеної проміжної сполуки 29-1, 13,21 г, яку отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 37, оксихлориду фосфору, 18 мл і толуолу, 150 мл перемішували при кип'ятінні зі зворотним холодильником протягом 6 год. Отриману суміш по краплях додавали до водному розчину гідроксиду натрію і суміш екстрагували толуолом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 30-1, представлену наступною формулою, 13,2 г.



Проміжна сполука 30-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,44 (1H, s), 7,65 (1H, d), 7,62 (1H, s), 7,38 (1H, d).

Еталонний приклад отримання 39

До суміші проміжної сполуки 30-1, 15,44 г і DMF, 75 мл додавали N-йодсукцинімід, 17,32 г при охолодженні льодом і суміш перемішували при 70 °C протягом 5 год. Водний розчин тіосульфату натрію додавали до отриманої суміші і осаджені тверді речовини збирали фільтруванням. Отримані тверді речовини промивали водою і сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 31-1, представлену наступною формулою, 18,0 г.



Проміжна сполука 31-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,41 (1H, s), 7,65 (1H, d), 7,44 (1H, d).

Сполука, яку отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 39, і значення її фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 31-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,20 (1H, s), 7,43 (1H, d), 7,35 (1H, d).

Еталонний приклад отримання 40

Суміш проміжної сполуки 31-1, 18,0 г, 1,4-діоксану, 140 мл, трис(дибензиліденацетон)дипаладію(0), 2,38 г, Xantphos, 3,01 г, діізопропілетиламіну, 27,2 мл і

етантриолу, 3,75 мл перемішували при кип'ятінні зі зворотним холодильником протягом 3 год. Отриману суміш охолоджували до кімнатної температури і концентрували при зниженому тиску. Залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 32-1, представлену наступною формулою, 13,39 г.



Проміжна сполука 32-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,74 (1H, s), 7,67 (1H, d), 7,48 (1H, d), 2,78 (2H, d), 1,24 (3H, t).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 40, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 32-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,51 (1H, s), 7,46 (1H, d), 7,38 (1H, d), 2,73 (2H, d), 1,23 (3H, t).



Проміжна сполука 32-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,49-8,48 (1H, m), 7,70 (1H, dd), 7,29-7,24 (1H, m), 4,50 (2H, q), 2,95 (2H, q), 1,47 (3H, t), 1,20 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 41

До суміші проміжної сполуки 32-2, 2,66 г і хлороформу, 10 мл додавали mCPBA (чистота 70%, 30% вміст води), 5,16 г при охолодженні льодом і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 2 год. Насичений водний розчин гідрокарбонату натрію і водний розчин тіосульфату натрію послідовно додавали до отриманої суміші і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 33-1, представлену наступною формулою, 1,79 г.



Проміжна сполука 33-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,15 (1H, s), 7,60 (1H, d), 7,57 (1H, d), 3,36 (2H, q), 1,36 (3H, t).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 41, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 33-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,39 (1H, s), 7,81 (1H, d), 7,67 (1H, d), 3,39 (2H, q), 1,37 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 42

До суміші проміжної сполуки 33-1, 324 мг, транс-N,N'-диметилциклогексан-1,2-диаміну, 0,32 мл, йодиду натрію, 225 мг, йодиду міді(I), 190 мг і толуолу, 4 мл перемішували при 120 °C протягом 21 год. Отриману суміш охолоджували до кімнатної температури і потім фільтрували. До отриманого фільтрату додавали воду і суміш екстрагували хлороформом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували проміжну сполуку 34, представлену наступною формулою, 70 мг.



Проміжна сполука 34: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,23 (1H, s), 7,70 (1 H, d), 7,46 (1 H, d), 3,35 (2H, m), 1,35 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 43

Суміш проміжної сполуки 33-2, 936 мг, фториду цезію, 4,56 г і DMSO, 10 мл перемішували при 95 °C протягом 2 год. Отриману суміш охолоджували до кімнатної температури і потім до отриманої суміші послідовно додавали етилацетат і воду і суміш фільтрували через целіт (Зареєстрована торговельна марка). Отримані фільтрати розділяли за допомогою ділильної лійки і отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок очищали за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі і отримували неочищену проміжну сполуку 35-1, представлену наступною формулою (вміст 22% проміжної сполуки 27), 330 мг.



Проміжна сполука 35-1: LCMS: 297 $[M+H]^+$, RT=1,76 хв.

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 43, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 35-2: LCMS: 307 $[M+H]^+$, RT=1,64 хв.



Проміжна сполука 35-3: LCMS: 355 $[M+H]^+$, RT=1,72 хв.

Еталонний приклад отримання 44

До суміші 2-амінобензальдегіду, 12,1 г і DMF, 100 мл порціями за кімнатної температури додавали N-йодсукцинімід, 22,5 г і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 4 год. Водний розчин бікарбонату натрію і водний розчин тіосульфату натрію послідовно додавали до отриманої суміші при охолодженні льодом і осаджені тверді речовини відфільтровували. Отримані тверді речовини промивали водою і сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 36-1, представлену наступною формулою, 23,6 г.



Проміжна сполука 36-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) 9,79 (1H, s), 7,75 (1H, d), 7,52 (1H, dd), 6,47 (1H, d), 6,15 (2H, s).

Еталонний приклад отримання 45

Проміжну сполуку 36-2 отримували з використанням N-бромсукциніміду замість N-йодсукциніміду за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 44.



Проміжна сполука 36-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,80 (1H, s), 7,58 (1H, d), 7,37 (1H, dd), 6,57 (1H, d), 6,15 (2H, s).

Еталонний приклад отримання 46

До суміші 2-(етансульфоніл)оцтової кислоти, 15,23 г, DMF, 0,1 мл і хлороформу, 60 мл по краплях додавали оксалілхлорид 12,9 мл при охолодженні льодом. Отриману суміш перемішували за кімнатної температури протягом 1 год. і потім концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок розчиняли в ацетонітрилі, 20 мл, і отриману суміш по краплях додавали до суміші проміжної сполуки 36-1, 23,6 г і ацетонітрилу, 100 мл при охолодженні льодом. Отриману суміш перемішували за кімнатної температури протягом 4 год. і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок розчиняли в ацетонітрилі, 100 мл і до нього по краплях додавали триетиламін, 19,9 мл при охолодженні льодом і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 1 год. До отриманої суміші додавали воду при охолодженні льодом. Осаджені тверді речовини відфільтровували і отримані тверді речовини промивали водою. Отримані тверді речовини промивали розчином MTBE : етилацетат=1 : 1 і концентрували при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 37-1, представлену наступною формулою, 13,12 г.



Проміжна сполука 37-1: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 8,69 (1H, s), 8,43 (1H, d), 7,97 (1H, dd), 7,20 (1H, d), 3,51 (2H, q), 1,15 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 47

Проміжну сполуку 37-2 отримували з використанням проміжної сполуки 36-2 замість проміжної сполуки 36-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 46.



Проміжна сполука 37-2: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 8,71 (1H, s), 8,28 (1H, d), 7,84 (1H, dd), 7,34 (1H, d), 3,52 (2H, q), 1,15 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 48

До суміші проміжної сполуки 37-1, 13,1 г і толуолу, 100 мл додавали оксихлорид фосфору, 16,9 мл і суміш перемішували при 110 °C протягом 11 год. Отриману суміш концентрували і отримані тверді речовини промивали водою і потім промивали змішаними розчинниками MTBE : гексан=1 : 4 і концентрували при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 38-1 13,35 г.



Проміжна сполука 38-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,88 (1H, s), 8,40 (1H, d), 8,17 (1H, dd), 7,83 (1H, d), 3,58 (2H, q), 1,33 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 49

Проміжну сполуку 38-2 отримували з використанням проміжної сполуки 37-2 замість проміжної сполуки 37-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 48.



Проміжна сполука 38-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,91 (1H, s), 8,17 (1H, d), 8,01-7,98 (2H, m), 3,59 (2H, q), 1,34 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 50

До суміші проміжної сполуки 38-1, 5,0 г і DMSO, 30 мл додавали фторид цезію, 3,63 г за кімнатної температури і суміш перемішували при 50 °C протягом 4 год. До отриманої суміші додавали воду з льодом і осаджені тверді речовини відфільтровували. Отримані тверді речовини послідовно промивали водою і гексаном і сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 39-1, представлену наступною формулою, 4,83 г.



Проміжна сполука 39-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,82 (1H, s), 8,40 (1H, d), 8,15 (1H, dd), 7,76 (1H, d), 3,44 (2H, q), 1,36 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 50-1

Проміжну сполуку 39-2 отримували з використанням проміжної сполуки 38-2 замість проміжної сполуки 38-1 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 50.



Проміжна сполука 39-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,85 (1H, s), 8,18 (1H, d), 8,00 (1H, dd), 7,91 (1H, d), 3,45 (2H, q), 1,36 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 51

Проміжну сполуку 40-1 отримували з використанням проміжної сполуки 10-1 замість 4-(трифторетил)антранілової кислоти за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 2.



Проміжна сполука 40-1: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 11,90 (1H, s), 8,03 (1H, d), 7,50 (1H, dd), 7,42 (1H, d).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 51, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Проміжна сполука 40-2: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 12,06 (1H, s), 8,15 (1H, d), 8,03 (1H, dd), 7,28 (1H, d).



Проміжна сполука 40-3: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 11,96 (1H, s), 8,15 (1H, d), 7,53 (1H, d), 7,39 (1H, s).



Проміжна сполука 40-4: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 12,14 (1H, s), 8,08 (1H, d), 8,04 (1H, dd), 7,37 (1H, d).



Проміжна сполука 40-5: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 11,88 (1H, s), 8,05 (1H, d), 7,21 (1H, dd), 7,04 (1H, d).



Проміжна сполука 40-6: ^{1}H-NMR (DMSO-D$_6$) δ: 9,92 (1H, s), 5,83 (1H, d), 5,80-5,77 (1H, m), 5,26 (1H, d).

Еталонний приклад отримання 52

Проміжну сполуку 41-1 отримували з використанням проміжної сполуки 23-1 замість 6-бром-3-(етилтіо)імідазо[1,2-a]піридин-2-аміну за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 3.



Проміжна сполука 41-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,40-8,39 (2H, m), 7,67 (1H, s), 7,65 (1H, s), 7,34-7,29 (1H, m), 6,99-6,92 (3H, m), 5,91 (2H, s), 2,70 (2H, q), 1,22 (3H, t).

Сполуки, які отримували відповідно до еталонного прикладу отримання 52, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.

Сполука, представлена формулою (C-1):



(C-1),

де комбінація B^2, B^3, G^4, R^{3b} і R^{3c} являє собою будь-яку комбінацію, вказану в таблиці C-1.

Таблиця C-1

Проміжна сполука	B^2	B^3	G^4	R^{3b}	R^{3c}
41-2	CH	CCF_3	CH	F	H
41-3	CH	CCF_3	CH	Cl	H
41-4	CH	CCF_3	CH	I	H
41-5	CH	CCF_3	CH	CF_3	H
41-6	CH	CCF_3	CH	Me	H
41-7	CH	CCF_3	CH	H	I
41-8	CCF_3	CH	CH	H	H
41-9	CCF_3	CH	CH	Cl	H
41-10	CCF_3	CH	CH	I	H
41-11	CCF_3	CH	CH	CF_3	H
41-12	CCF_3	CH	CH	H	I
41-13	CCF_3	CH	CH	H	CF_3
41-14	CH	$CSCF_3$	CH	I	H
41-15	$CSCF_3$	CH	CH	I	H
41-16	$COCF_3$	CH	CH	H	H
41-17	CH	$COCF_3$	CH	I	H
41-18	$COCF_3$	CH	CH	I	H
41-19	CH	CC_2F_5	CH	I	H
41-20	CC_2F_5	CH	CH	I	H
41-21	CH	CCF_3	N	Br	H
41-22	CCF_3	CH	N	Br	H
41-23	CH	CCF_3	N	I	H
41-24	CCF_3	CH	N	I	H
41-25	$COCF_3$	CH	N	Br	H
41-26	$COCF_3$	CH	N	I	H
41-27	$COCF_3$	CH	N	H	H

Проміжна сполука 41-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,34-8,31 (2H, m), 7,66-7,64 (2H, m), 7,25-7,20 (1H, m), 6,98-6,93 (2H, m), 5,92 (2H, s), 2,72 (2H, q), 1,23 (3H, t).

Проміжна сполука 41-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,41-8,40 (1H, m), 8,29 (1H, s), 7,64-7,62 (2H, m), 7,30-7,28 (1H, m), 6,96-6,92 (2H, m), 5,92 (2H, s), 2,72 (2H, q), 1,23 (3H, t).

Проміжна сполука 41-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,62-8,60 (1H, m), 8,35 (1H, s), 7,64 (1H, d), 7,50 (1H, dd), 7,47-7,44 (1H, m), 6,98-6,95 (1H, m), 6,95-6,93 (1H, m), 5,92 (2H, s), 2,72 (2H, q), 1,24 (3H, t).

Проміжна сполука 41-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,88-8,87 (1H, m), 8,52 (1H, d), 8,22 (1H, s), 8,09 (1H, s), 7,83 (1H, d), 7,79 (1H, dd), 7,59 (1H, dd), 2,80 (2H, q), 1,20 (3H, t).

Проміжна сполука 41-6: ^{1}H-NMR (DMSO-D_6) δ: 10,31 (1H, s), 8,39-8,38 (1H, m), 7,89 (1H, d), 7,52-7,51 (1H, m), 7,27 (1H, dd), 7,11-7,10 (1H, m), 6,85 (1H, dd), 6,75 (2H, s), 2,72 (2H, q), 2,38 (3H, s), 1,07 (3H, t).

Проміжна сполука 41-7: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,60 (1H, s), 8,18 (1H, dd), 8,07-8,06 (1H, m), 7,86-7,84 (1H, m), 7,50 (1H, dd), 7,25-7,23 (1H, m), 6,78 (1H, d), 6,14 (2H, s), 2,74 (2H, q), 1,25 (3H, t).

Проміжна сполука 41-8: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,41-8,40 (1H, m), 8,31 (1H, s), 7,82-7,79 (1H, m), 7,67 (1H, d), 7,48 (1H, dd), 7,34-7,30 (1H, m), 6,98-6,96 (1H, m), 6,77 (1H, d), 6,12 (2H, s), 2,72 (2H, q), 1,26 (3H, t).

Проміжна сполука 41-9: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,43-8,41 (1H, m), 8,28 (1H, s), 7,80-7,77 (1H, m), 7,61 (1H, d), 7,49 (1H, dd), 7,30-7,27 (1H, m), 6,77 (1H, d), 6,12 (2H, s), 2,73 (2H, q), 1,26 (3H, t).

Проміжна сполука 41-10: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,64-8,61 (1H, m), 8,46-8,43 (1H, m), 7,81 (1H, s), 7,50-7,48 (3H, m), 6,77 (1H, d), 6,13 (2H, s), 2,74 (2H, q), 1,26 (3H, t).

Проміжна сполука 41-11: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,74 (1H, s), 8,46 (1H, s), 7,80 (1H, s), 7,76 (1H, d), 7,50-7,45 (2H, m), 6,77 (1H, d), 6,14 (2H, s), 2,76 (2H, q), 1,26 (3H, t).

Проміжна сполука 41-12: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,39 (1H, s), 8,14-8,12 (1H, m), 8,06-8,05 (1H, m), 7,65 (1H, d), 7,21 (1H, dd), 6,95-6,93 (2H, m), 5,91 (2H, s), 2,70 (2H, q), 1,21 (3H, t).

Проміжна сполука 41-13: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,50 (1H, d), 8,48 (1H, s), 7,95 (1H, s), 7,82-7,79 (1H, m), 7,48 (1H, dd), 7,14 (1H, dd), 6,76 (1H, d), 6,13 (2H, s), 2,75 (2H, q), 1,25 (3H, t).

Проміжна сполука 41-14: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,61-8,60 (1H, m), 8,42 (1H, s), 7,56 (1H, d), 7,50-7,44 (2H, m), 7,00 (1H, s), 6,95 (1H, d), 5,87 (2H, s), 2,72 (2H, q), 1,23 (3H, t).

Проміжна сполука 41-15: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,60 (1H, s), 8,37 (1H, s), 7,80 (1H, s), 7,47-7,42 (3H, m), 6,71 (1H, d), 6,09 (2H, s), 2,72 (2H, q), 1,25 (3H, t).

Проміжна сполука 41-16: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,41-8,39 (1H, m), 8,27 (1H, s), 7,67 (1H, d), 7,42-7,41 (1H, m), 7,34-7,29 (1H, m), 7,18-7,15 (1H, m), 6,98-6,94 (1H, m), 6,72 (1H, d), 5,77 (2H, s), 2,71 (2H, q), 1,23 (3H, t).

Проміжна сполука 41-17: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,61-8,60 (1H, m), 8,28 (1H, s), 7,56 (1H, d), 7,50-7,44 (2H, m), 6,57-6,54 (2H, m), 5,96 (2H, s), 2,71 (2H, q), 1,23 (3H, t).

Проміжна сполука 41-18: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,62-8,61 (1H, m), 8,30 (1H, s), 7,49-7,45 (2H, m), 7,40-7,39 (1H, m), 7,19-7,16 (1H, m), 6,72 (1H, d), 5,78 (2H, s), 2,72 (2H, q), 1,24 (3H, t).

Проміжна сполука 41-19: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,61-8,60 (1H, m), 8,32 (1H, s), 7,64 (1H, d), 7,50-7,45 (2H, m), 6,94-6,91 (2H, m), 5,92 (2H, s), 2,72 (2H, q), 1,24 (3H, t).

Проміжна сполука 41-20: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,62 (1H, s), 8,27 (1H, s), 7,73 (1H, s), 7,51-7,45 (3H, m), 6,79 (1H, d), 6,14 (2H, s), 2,72 (2H, q), 1,25 (3H, t).

Проміжна сполука 41-21: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,90 (1H, s), 8,80 (1H, d), 8,59 (1H, d), 7,79 (1H, d), 6,96-6,90 (2H, m), 5,90 (2H, s), 2,80 (2H, q), 1,23 (3H, t).

Проміжна сполука 41-22: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,80 (1H, d), 8,58 (1H, d), 8,51 (1H, s), 7,84 (1H, s), 7,49 (1H, d), 6,77 (1H, d), 6,10 (2H, s), 2,80 (2H, q), 1,26 (3H, t).

Проміжна сполука 41-23: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,93 (1H, s), 8,88 (1H, d), 8,66 (1H, d), 7,82 (1H, d), 6,95 (1H, s), 6,91 (1H, d), 5,90 (2H, s), 2,79 (2H, q), 1,27 (3H, t).

Проміжна сполука 41-24: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,89 (1H, d), 8,66 (1H, d), 8,45 (1H, s), 7,83 (1H, s), 7,49 (1H, d), 6,77 (1H, d), 6,10 (2H, s), 2,79 (2H, q), 1,26 (3H, t).

Проміжна сполука 41-25: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,79 (1H, d), 8,65 (1H, s), 8,57 (1H, d), 7,51 (1H, s), 7,17 (1H, d), 6,71 (1H, d), 5,77 (2H, s), 2,79 (2H, q), 1,25 (3H, t).

Проміжна сполука 41-26: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,88 (1H, d), 8,68 (1H, s), 8,65 (1H, d), 7,51 (1H, s), 7,17 (1H, d), 6,71 (1H, d), 5,78 (2H, s), 2,79 (2H, q), 1,26 (3H, t).

Проміжна сполука 41-27: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,54 (1H, dd), 8,12 (1H, dd), 7,78 (1H, s), 7,49 (1H, s), 7,31-7,21 (1H, m), 6,91 (1H, dd), 6,76 (1H, d), 5,72 (2H, s), 3,25 (2H, q), 1,38 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 53

Проміжну сполуку 42 отримували з використанням етил-6-фторімідазо[1,2-a]піридин-2-карбоксилата замість проміжної сполуки 5 за методикою, описаною в еталонному прикладі отримання 6.



Проміжна сполука 42: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,24-8,23 (1H, m), 7,71-7,68 (1H, m), 7,28-7,25 (1H, m), 4,50 (2H, q), 1,48 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 54

Суміш проміжної сполуки 35-2, 1,00 г, гідразинмоногідрату, 0,48 мл і етанолу, 5 мл перемішували при 80 °C протягом 15 хв. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали воду, і отримані тверді речовини відфільтровували і промивали водою і сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 43, представлену наступною формулою, 0,73 г.



Проміжна сполука 43: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,69 (1H, dd), 7,46 (1H, dd), 7,36 (1H, dd), 6,74 (1H, s), 3,98 (2H, s), 3,19 (2H, q), 1,32 (3H, t).

Приклад отримання 1

До суміші проміжного продукту 1, 0,50 г, 3-(етансульфоніл)-2-фторпіридину, 0,49 г і NMP, 5 мл додавали гідрид натрію (60%, дисперсія в мінеральному маслі), 103 мг в атмосфері азоту і суміш перемішували при 110 °C протягом 1 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали воду і суміш фільтрували. Отримані тверді речовини промивали водою і сушили при зниженому тиску і отримували пропоновану сполуку 1-1, представлену наступною формулою, 0,54 г.



Пропонована сполука 1-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,94-8,93 (1H, m), 8,54-8,52 (1H, m), 8,45 (1H, d), 8,13 (1H, s), 8,11 (1H, s), 7,80-7,77 (2H, m), 3,36-3,34 (2H, m), 1,34 (3H, t).

Приклад отримання 2

Пропоновану сполуку 1-2 отримували з використанням 5-циклопропіл-3-(етансульфоніл)-2-фторпіридину замість 3-(етансульфоніл)-2-фторпіридину відповідно до прикладу отримання 1.



Пропонована сполука 1-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,65 (1H, d), 8,44 (1H, d), 8,09 (1H, d), 8,08 (1H, s), 8,05 (1H, d), 7,76 (1H, dd), 3,30-3,28 (2H, m), 2,14-2,09 (1H, m), 1,31 (3H, t), 1,29-1,24 (2H, m), 0,98-0,92 (2H, m).

Приклад отримання 3

Суміш проміжної сполуки 3-1, 491 мг і триетилортоформіату, 11 мл перемішували при 100 °C протягом 1 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і концентрували. Отримані тверді речовини промивали гексаном і отримували пропоновану сполуку 2-1, представлену наступною формулою, 447 мг.



Пропонована сполука 2-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,65 (1H, dd), 8,51 (1H, d), 8,20 (1H, s), 8,08 (1H, d), 7,77 (1H, dd), 7,61 (1H, dd), 7,50 (1H, dd), 2,77 (2H, q), 1,18 (3H, t).

Приклад отримання 4

Сполуки, які отримували відповідно до прикладу отримання 3, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.

Сполука, представлена формулою (A-1):



(A-1),

де комбінація R^{4a}, B^2, B^3 і B^4 являє собою будь-яку комбінацію, вказану в таблиці A-1.

Таблиця A-1

Пропонована сполука	R^{4a}	B^2	B^3	B^4
2-2	H	CCF_3	CH	CH
2-3	H	CH	CH	CCF_3
2-4	H	CH	CCF_3	N
2-5	H	CH	CCl	CH
2-6	H	CH	Cl	CH
2-7	H	$COCF_3$	CH	CH

Пропонована сполука 2-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,69-8,67 (1H, m), 8,65-8,64 (1H, m), 8,22 (1H, s), 8,03 (1H, dd), 7,92-7,90 (1H, m), 7,61 (1H, dd), 7,52-7,49 (1H, m), 2,78 (2H, q), 1,19 (3H, t).

Пропонована сполука 2-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,64 (1H, d), 8,60 (1H, d), 8,25 (1H, s), 8,15 (1H, d), 7,63 (1H, t), 7,61 (1H, d), 7,50 (1H, dd), 2,77 (2H, q), 1,19 (3H, t).

Пропонована сполука 2-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,93 (1H, d), 8,66 (1H, d), 8,46 (1H, s), 7,89 (1H, d), 7,63 (1H, d), 7,53 (1H, dd), 2,77 (2H, q), 1,19 (3H, t).

Пропонована сполука 2-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,65-8,63 (1H, m), 8,32 (1H, d), 8,14 (1H, s), 7,79 (1H, d), 7,60 (1H, dd), 7,52 (1H, dd), 7,49 (1H, dd), 2,76 (2H, q), 1,18 (3H, t,).

Пропонована сполука 2-6: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,64 (1H, dd), 8,21 (1H, d), 8,11 (1H, s), 8,06 (1H, d), 7,88 (1H, dd), 7,60 (1H, dd), 7,49 (1H, dd), 2,75 (2H, q), 1,17 (3H, t).

Пропонована сполука 2-7: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,67-8,64 (1H, m), 8,23-8,20 (1H, m), 8,16 (1H, s), 7,87-7,85 (1H, m), 7,67-7,59 (2H, m), 7,51-7,49 (1H, m), 2,77 (2H, q,), 1,19 (3H, t).

Сполука, представлена формулою (A-1-2):



(A-1-2),

де комбінація B^2, B^3, G^4, R^{3b} і R^{3c} являє собою будь-яку комбінацію, вказану в таблиці А-1-2.

Таблиця А-1-2

Пропонована сполука	B^2	B^3	G^4	R^{3b}	R^{3c}
2-8	CH	CCF_3	CH	H	H
2-9	CH	CCF_3	CH	F	H
2-10	CH	CCF_3	CH	Cl	H
2-11	CH	CCF_3	CH	I	H
2-12	CH	CCF_3	CH	CF_3	H
2-13	CH	CCF_3	CH	Me	H
2-14	CH	CCF_3	CH	H	I
2-16	CCF_3	CH	CH	H	H
2-17	CCF_3	CH	CH	Cl	H
2-18	CCF_3	CH	CH	I	H
2-19	CCF_3	CH	CH	CF_3	H
2-20	CCF_3	CH	CH	H	I
2-21	CCF_3	CH	CH	H	CF_3
2-22	CH	$CSCF_3$	CH	I	H
2-23	$CSCF_3$	CH	CH	I	H
2-24	$COCF_3$	CH	CH	H	H
2-25	CH	$COCF_3$	CH	I	H
2-26	$COCF_3$	CH	CH	I	H
2-27	CH	CC_2F_5	CH	I	H
2-28	CC_2F_5	CH	CH	I	H
2-29	CH	CCF_3	N	Br	H
2-30	CCF_3	CH	N	Br	H
2-31	CH	CCF_3	N	I	H
2-32	CCF_3	CH	N	I	H
2-33	$COCF_3$	CH	N	Br	H
2-34	$COCF_3$	CH	N	I	H
2-37	$COCF_3$	CH	N	H	H

Пропонована сполука 2-8: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,53-8,52 (2H, m), 8,23 (1H, s), 8,08 (1H, s), 7,77 (1H, dd), 7,73-7,70 (1H, m), 7,45-7,43 (1H, m), 7,10-7,09 (1H, m), 2,75 (2H, q,), 1,17 (3H, t,).

Пропонована сполука 2-9: ^{1}H NMR ($CDCl_3$) δ: 8,51 (1H, d), 8,46-8,45 (1H, m), 8,21 (1H, s), 8,08-8,08 (1H, m), 7,77 (1H, dd), 7,72-7,68 (1H, m), 7,39-7,34 (1H, m), 2,76 (2H, q), 1,18 (3H, t).

Пропонована сполука 2-10: ^{1}H NMR ($CDCl_3$) δ: 8,56-8,53 (1H, m), 8,51 (1H, d), 8,20 (1H, s), 8,08 (1H, s), 7,79-7,77 (1H, m), 7,68-7,65 (1H, m), 7,41 (1H, dd), 2,77 (2H, q), 1,18 (3H, t).

Пропонована сполука 2-11: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,75-8,74 (1H, m), 8,51 (1H, d), 8,20 (1H, s), 8,08 (1H, s), 7,77 (1H, dd), 7,61 (1H, dd), 7,50 (1H, dd), 2,76 (2H, q), 1,18 (3H, dd).

Пропонована сполука 2-12: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,89-8,87 (1H, m), 8,51 (1H, d), 8,21 (1H, s), 8,10-8,08 (1H, m), 7,83 (1H, d), 7,79 (1H, dd), 7,59 (1H, dd), 2,80 (2H, q), 1,20 (3H, t).

Пропонована сполука 2-13: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,51 (1H, d), 8,30-8,28 (1H, m), 8,21 (1H, s), 8,07 (1H, s), 7,76 (1H, dd), 7,61 (1H, d), 7,28 (1H, dd), 2,73 (2H, q), 2,45 (3H, s), 1,17 (3H, t).

Пропонована сполука 2-14: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,51 (1H, d), 8,26 (1H, dd), 8,20 (1H, s), 8,12-8,11 (1H, m), 8,08 (1H, s), 7,77 (1H, dd), 7,33 (1H, dd), 2,74 (2H, q), 1,17 (3H, t).

Пропонована сполука 2-16: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,69-8,68 (1H, m), 8,54-8,52 (1H, m), 8,25 (1H, s), 8,03 (1H, dd), 7,91 (1H, d), 7,71 (1H, d), 7,45-7,43 (1H, m), 7,10-7,09 (1H, m), 2,76 (2H, q), 1,18 (3H, t).

Пропонована сполука 2-17: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,69-8,67 (1H, m), 8,56-8,55 (1H, m), 8,22 (1H, s), 8,03 (1H, dd), 7,92-7,90 (1H, m), 7,66 (1H, dd), 7,41 (1H, dd), 2,78 (2H, q), 1,19 (3H, t).

Пропонована сполука 2-18: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,76-8,74 (1H, m), 8,69-8,67 (1H, m), 8,22 (1H, s), 8,03 (1H, dd), 7,91 (1H, d), 7,62 (1H, dd), 7,50 (1H, d), 2,77 (2H, q), 1,19 (3H, t).

Пропонована сполука 2-19: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,89-8,87 (1H, m), 8,69-8,68 (1H, m), 8,24 (1H, s), 8,04 (1H, dd), 7,93 (1H, d), 7,83 (1H, d), 7,59 (1H, dd), 2,81 (2H, q), 1,21 (3H, t).

Пропонована сполука 2-20: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,69-8,66 (1H, m), 8,27-8,25 (1H, m), 8,22 (1H, s), 8,13-8,12 (1H, m), 8,03 (1H, dd), 7,92-7,90 (1H, m), 7,33 (1H, dd), 2,76 (2H, q), 1,18 (3H, t).

Пропонована сполука 2-21: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,69-8,68 (1H, m), 8,65 (1H, d), 8,24 (1H, s), 8,05-8,04 (2H, m), 7,93 (1H, d), 7,28-7,26 (1H, m), 2,81 (2H, q), 1,20 (3H, t).

Пропонована сполука 2-22: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,76-8,74 (1H, m), 8,41 (1H, d), 8,17 (1H, s), 8,09 (1H, d), 7,77 (1H, dd), 7,61 (1H, dd), 7,49 (1H, dd), 2,76 (2H, q), 1,19 (3H, t).

Пропонована сполука 2-23: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,76-8,74 (1H, m), 8,68 (1H, d), 8,20 (1H, s), 8,05 (1H, dd), 7,84 (1H, d), 7,61 (1H, dd), 7,49 (1H, dd), 2,78 (2H, q), 1,19 (3H, t).

Пропонована сполука 2-24: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,54-8,52 (1H, m), 8,23-8,21 (1H, m), 8,18 (1H, s), 7,85 (1H, d), 7,72-7,70 (1H, m), 7,66 (1H, dd), 7,46-7,41 (1H, m), 7,10-7,08 (1H, m), 2,76 (2H, q), 1,18 (3H, t).

Пропонована сполука 2-25: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,76-8,74 (1H, m), 8,43 (1H, d), 8,16 (1H, s), 7,62-7,59 (2H, m), 7,49 (1H, dd), 7,39-7,37 (1H, m), 2,76 (2H, q), 1,18 (3H, t).

Пропонована сполука 2-26: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,76-8,74 (1H, m), 8,22-8,20 (1H, m), 8,14 (1H, s), 7,85 (1H, d), 7,66 (1H, dd), 7,61 (1H, dd), 7,49 (1H, d), 2,77 (2H, q), 1,19 (3H, t).

Пропонована сполука 2-27: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,76-8,74 (1H, m), 8,52 (1H, d), 8,20 (1H, s), 8,08-8,07 (1H, m), 7,76-7,74 (1H, m), 7,61 (1H, dd), 7,50 (1H, dd), 2,76 (2H, q), 1,18 (3H, t).

Пропонована сполука 2-28: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,77-8,75 (1H, m), 8,66-8,65 (1H, m), 8,23 (1H, s), 8,00 (1H, dd), 7,92 (1H, d), 7,61 (1H, dd), 7,50 (1H, d), 2,78 (2H, q), 1,19 (3H, t).

Пропонована сполука 2-29: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,90 (1H, d), 8,73 (1H, d), 8,51 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,10-8,07 (1H, m), 7,79 (1H, dd), 2,82 (2H, q), 1,21 (3H, t).

Пропонована сполука 2-30: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,91 (1H, d), 8,73 (1H, d), 8,70-8,69 (1H, m), 8,31 (1H, s), 8,04 (1H, dd), 7,92 (1H, d), 2,84 (2H, q), 1,22 (3H, t).

Пропонована сполука 2-31: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,00 (1H, d), 8,81 (1H, d), 8,51 (1H, d,), 8,28 (1H, s), 8,10-8,07 (1H, m), 7,78 (1H, dd), 2,81 (2H, q), 1,20 (3H, t).

Пропонована сполука 2-32: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,00 (1H, d), 8,81 (1H, d), 8,69-8,68 (1H, m), 8,31 (1H, s), 8,04 (1H, dd), 7,92 (1H, d), 2,83 (2H, q), 1,21 (3H, t).

Пропонована сполука 2-33: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,90 (1H, d), 8,73 (1H, d), 8,23 (1H, s), 8,22-8,21 (1H, m), 7,86 (1H, d), 7,68-7,65 (1H, m), 2,83 (2H, q), 1,22 (3H, t).

Пропонована сполука 2-34: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,00 (1H, d), 8,80 (1H, d), 8,23 (1H, s), 8,22-8,21 (1H, m), 7,86 (1H, d), 7,67-7,66 (1H, m), 2,83 (2H, q), 1,21 (3H, t).

Пропонована сполука 2-37: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,65 (1H, dd), 8,19 (1H, d), 8,08 (1H, s), 7,97 (1H, dd), 7,91 (1H, d), 7,72 (1H, dd), 6,98 (1H, dd), 3,30 (2H, q), 1,38 (3H, t).

Приклад отримання 4-1

До суміші 7-(трифторметил)-3-(етилтіо)-імідазо[1,2-а]піридин-2-аміну, 310 мг, який отримували за методикою, описаною в WO 2016/129684, і THF, 2 мл по краплях додавали розчин біс(триметилсиліл)аміду калію (1 моль/л розчин в THF), 2,2 мл при -78 °С в атмосфері азоту і суміш перемішували протягом 30 хв. Проміжну сполуку 2, 350 мг додавали до отриманої суміші і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 30 хв. Насичений водний розчин хлориду амонію додавали до отриманої суміші і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і сушили при зниженому тиску. Триетилортоформіат, 13 мл додавали до отриманого залишку і суміш перемішували при 100 °С протягом 1 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і концентрували. Отримані тверді речовини промивали гексаном і отримували пропоновану сполуку 2-15, представлену наступною формулою, 525 мг.



Пропонована сполука 2-15: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,65 (1H, d), 8,51 (1H, d), 8,22 (1H, s), 8,09 (1H, s), 8,03-8,02 (1H, m), 7,79 (1H, dd), 7,27 (1H, dd), 2,79 (2H, q), 1,19 (3H, t,).

Сполуки, які отримували відповідно до прикладу отримання 4-1, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Пропонована сполука 2-35: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,90 (1H, d), 8,73 (1H, d), 8,69 (1H, d), 8,29 (1H, s), 8,06 (1H, dd), 7,85 (1H, d), 2,84 (2H, q), 1,22 (3H, t).



Пропонована сполука 2-36: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,00 (1H, d), 8,80 (1H, d), 8,69 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,06 (1H, dd), 7,85 (1H, d), 2,83 (2H, q), 1,23 (3H, d).

Приклад отримання 5

До суміші пропонованої сполуки 2-1, 252 мг і хлороформу, 11 мл додавали mCPBA (чистота 70%, 30% вміст води), 296 мг при охолодженні льодом і суміш перемішували при охолодженні льодом протягом 8 год. Насичений водний розчин гідрокарбонату натрію і водний розчин тіосульфату натрію послідовно додавали до отриманої суміші і суміш екстрагували хлороформом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі (гексан : етилацетат=1 : 2) і отримували пропоновану сполуку 3-1 178 мг.



Пропонована сполука 3-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,06 (1H, dd), 8,47 (1H, d), 8,26 (1H, s), 8,09 (1H, d), 7,78 (1H, dd), 7,73 (1H, dd), 7,68 (1H, dd), 3,56 (2H, q), 1,46 (3H, t).

Приклад отримання 6

Сполуки, які отримували відповідно до прикладу отримання 5, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.

Сполука, представлена формулою (A-2):



(A-2),

де комбінація R^{4a}, B^2, B^3 і B^4 являє собою будь-яку комбінацію, вказану в таблиці А-2.

Таблиця А-2

Пропонована сполука	R^{4a}	B^2	B^3	B^4
3-2	H	CCF_3	CH	CH
3-3	H	CH	CH	CCF_3
3-4	H	CH	CCF_3	N
3-5	H	CH	CCl	CH
3-6	H	CH	Cl	CH
3-7	H	$COCF_3$	CH	CH

Пропонована сполука 3-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,06-9,05 (1H, m), 8,64-8,63 (1H, m), 8,28 (1H, s), 8,04 (1H, dd), 7,93-7,91 (1H, m), 7,73 (1H, dd), 7,69 (1H, dd), 3,59 (2H, q), 1,47 (3H, t).

Пропонована сполука 3-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,06 (1H, dd), 8,55 (1H, dd), 8,31 (1H, s), 8,16 (1H, dd), 7,73 (1H, dd), 7,68 (1H, dd), 7,64 (1H, t), 3,58 (2H, q), 1,46 (3H, t).

Пропонована сполука 3-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,04 (1H, dd), 8,88 (1H, d), 8,52 (1H, s), 7,88 (1H, d), 7,74 (1H, dd), 7,70 (1H, dd), 3,56 (2H, q), 1,47 (3H, t).

Пропонована сполука 3-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,05 (1H, dd), 8,27 (1H, d), 8,19 (1H, s), 7,80 (1H, d), 7,72 (1H, dd), 7,67 (1H, dd), 7,52 (1H, dd), 3,56 (2H, q), 1,45 (3H, t).

Пропонована сполука 3-6: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,05 (1H, dd), 8,22 (1H, d), 8,17 (1H, s), 8,01 (1H, d), 7,88 (1H, dd), 7,72 (1H, dd), 7,67 (1H, dd), 3,56 (2H, q), 1,44 (3H, t).

Пропонована сполука 3-7: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,07-9,05 (1H, m), 8,20 (1H, s), 8,17-8,15 (1H, m), 7,86 (1H, d), 7,72 (1H, dd), 7,68-7,66 (2H, m), 3,58 (2H, q), 1,46 (3H, t).

Сполука, представлена формулою (А-2-2):



(А-2-2),

де комбінація n, B^2, B^3, G^4, R^{3b} і R^{3c} являє собою будь-яку комбінацію, вказану в таблиці А-2-2.

Таблиця А-2-2

Пропонована сполука	n	B^2	B^3	G^4	R^{3b}	R^{3c}
3-8	2	CH	CCF_3	CH	H	H
3-9	2	CH	CCF_3	CH	F	H
3-10	2	CH	CCF_3	CH	Cl	H
3-11	1	CH	CCF_3	CH	I	H
3-12	2	CH	CCF_3	CH	I	H
3-13	2	CH	CCF_3	CH	CF_3	H
3-14	2	CH	CCF_3	CH	Me	H
3-15	2	CH	CCF_3	CH	H	I
3-16	2	CH	CCF_3	CH	H	CF_3
3-17	2	CCF_3	CH	CH	H	H
3-18	2	CCF_3	CH	CH	Cl	H
3-19	1	CCF_3	CH	CH	I	H
3-20	2	CCF_3	CH	CH	I	H
3-21	2	CCF_3	CH	CH	CF_3	H
3-22	2	CCF_3	CH	CH	H	I
3-23	2	CCF_3	CH	CH	H	CF_3
3-24	2	CH	$CSCF_3$	CH	I	H
3-25	2	$CSCF_3$	CH	CH	I	H

Таблиця A-2-2

Пропонована сполука	n	B^2	B^3	G^4	R^{3b}	R^{3c}
3-26	2	$COCF_3$	CH	CH	H	H
3-27	2	CH	$COCF_3$	CH	I	H
3-28	2	$COCF_3$	CH	CH	I	H
3-29	2	CH	CC_2F_5	CH	I	H
3-30	2	CC_2F_5	CH	CH	I	H
3-31	2	CH	CCF_3	N	Br	H
3-32	2	CCF_3	CH	N	Br	H
3-33	2	CH	CCF_3	N	I	H
3-34	2	CCF_3	CH	N	I	H
3-35	2	$COCF_3$	CH	N	Br	H
3-36	2	$COCF_3$	CH	N	I	H
3-37	2	$CSCF_3$	CH	N	Br	H
3-38	2	$CSCF_3$	CH	N	I	H
3-39	2	$COCF_3$	CH	N	H	H

Пропонована сполука 3-8: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,93 (1H, d), 8,47 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,08 (1H, s), 7,85-7,83 (1H, m), 7,77 (1H, dd), 7,64-7,61 (1H, m), 7,24-7,22 (1H, m), 3,57-3,52 (2H, m), 1,44 (3H, t).

Пропонована сполука 3-9: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,91-8,90 (1H, m), 8,47 (1H, d), 8,26 (1H, s), 8,09 (1H, s), 7,83 (1H, dd), 7,79-7,77 (1H, m), 7,56-7,51 (1H, m), 3,56 (2H, q), 1,45 (3H, t).

Пропонована сполука 3-10: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,97 (1H, dd), 8,47 (1H, d), 8,26 (1H, s), 8,09-8,08 (1H, m), 7,80-7,77 (2H, m), 7,59 (1H, dd), 3,56 (2H, q), 1,46 (3H, t).

Пропонована сполука 3-11: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,28 (1H, dd), 8,58 (1H, s), 8,45 (1H, d), 8,09 (1H, s), 7,78 (1H, dd), 7,69 (1H, dd), 7,55 (1H, dd), 3,71-3,61 (2H, m), 1,60 (3H, t).

Пропонована сполука 3-12: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,14-9,13 (1H, m), 8,46 (1H, d), 8,25 (1H, s), 8,10-8,07 (1H, m), 7,80-7,77 (2H, m), 7,61 (1H, dd), 3,56 (2H, q), 1,45 (3H, t).

Пропонована сполука 3-13: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,30-9,27 (1H, m), 8,47 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,10 (1H, s), 7,96 (1H, d), 7,80-7,75 (2H, m), 3,61 (2H, q), 1,47 (3H, t).

Пропонована сполука 3-14: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,69-8,67 (1H, m), 8,47 (1H, d), 8,26 (1H, s), 8,08 (1H, s), 7,77 (1H, dd), 7,72 (1H, d), 7,46 (1H, dd), 3,52 (2H, q), 2,48 (3H, s), 1,44 (3H, t).

Пропонована сполука 3-15: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,65 (1H, dd), 8,47-8,45 (1H, m), 8,26-8,24 (2H, m), 8,09-8,07 (1H, m), 7,78 (1H, dd), 7,46 (1H, dd), 3,58-3,53 (2H, m), 1,43 (3H, t).

Пропонована сполука 3-16: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,07 (1H, d), 8,47 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,16-8,13 (1H, m), 8,10 (1H, s), 7,79 (1H, dd), 7,39 (1H, dd), 3,63-3,59 (2H, m), 1,47 (3H, t).

Пропонована сполука 3-17: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,95-8,93 (1H, m), 8,65-8,64 (1H, m), 8,31 (1H, s), 8,04 (1H, dd), 7,93 (1H, d), 7,86-7,83 (1H, m), 7,64-7,62 (1H, m), 7,24-7,23 (1H, m), 3,60-3,56 (2H, m), 1,46 (3H, t).

Пропонована сполука 3-18: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,97 (1H, dd), 8,64 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,04 (1H, dd), 7,92 (1H, d), 7,78 (1H, dd), 7,59 (1H, dd), 3,59 (2H, q), 1,47 (3H, t).

Пропонована сполука 3-19: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,28 (1H, dd), 8,62 (1H, d), 8,60 (1H, s), 8,05 (1H, dd), 7,93 (1H, d), 7,69 (1H, dd), 7,55 (1H, dd), 3,72-3,63 (2H, m), 1,62 (3H, t).

Пропонована сполука 3-20: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,14 (1H, dd), 8,63 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,04 (1H, dd), 7,92 (1H, d), 7,80 (1H, dd), 7,61 (1H, dd), 3,58 (2H, q), 1,47 (3H, t).

Пропонована сполука 3-21: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,29-9,27 (1H, m), 8,66-8,63 (1H, m), 8,30 (1H, s), 8,05 (1H, dd), 7,98-7,92 (2H, m), 7,77 (1H, dd), 3,64 (2H, q), 1,49 (3H, t).

Пропонована сполука 3-22: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,65 (1H, dd), 8,64-8,62 (1H, m), 8,27 (1H, s), 8,26-8,25 (1H, m), 8,04 (1H, dd), 7,92 (1H, d), 7,46 (1H, dd), 3,58-3,56 (2H, m), 1,45 (3H, t).

Пропонована сполука 3-23: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,08-9,06 (1H, m), 8,65-8,63 (1H, m), 8,30 (1H, s), 8,15-8,13 (1H, m), 8,05 (1H, dd), 7,93 (1H, d), 7,39 (1H, dd), 3,64-3,60 (2H, m), 1,48 (3H, t).

Пропонована сполука 3-24: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,14 (1H, dd), 8,37 (1H, d), 8,23 (1H, s), 8,10 (1H, d), 7,80-7,76 (2H, m), 7,60 (1H, dd), 3,56 (2H, q), 1,45 (3H, t).

Пропонована сполука 3-25: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,15-9,14 (1H, m), 8,63 (1H, d), 8,25 (1H, s), 8,05 (1H, dd), 7,84 (1H, d), 7,79 (1H, dd), 7,60 (1H, dd), 3,57 (2H, q), 1,46 (3H, t).

Пропонована сполука 3-26: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,94-8,93 (1H, m), 8,23 (1H, s), 8,18-8,17 (1H, m), 7,86 (1H, d), 7,84-7,82 (1H, m), 7,66 (1H, dd), 7,64-7,59 (1H, m), 7,23-7,21 (1H, m), 3,59-3,55 (2H, m), 1,45 (3H, t).

Пропонована сполука 3-27: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,15-9,13 (1H, m), 8,38 (1H, d), 8,21 (1H, s), 7,79 (1H, dd), 7,64-7,62 (1H, m), 7,60 (1H, dd), 7,38 (1H, dd), 3,56 (2H, q), 1,45 (3H, t).

Пропонована сполука 3-28: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,14 (1H, dd), 8,20 (1H, s), 8,17-8,15 (1H, m), 7,85 (1H, d), 7,79 (1H, dd), 7,67-7,65 (1H, m), 7,60 (1H, dd), 3,57 (2H, q), 1,46 (3H, t).

Пропонована сполука 3-29: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,15-9,13 (1H, m), 8,47 (1H, d), 8,26 (1H, d), 8,07 (1H, s), 7,81-7,78 (1H, m), 7,76-7,74 (1H, m), 7,61 (1H, d), 3,56 (2H, q), 1,47-1,44 (3H, m).

Пропонована сполука 3-30: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,14 (1H, dd), 8,61 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,01 (1H, dd), 7,93 (1H, d), 7,80 (1H, dd), 7,61 (1H, dd), 3,58 (2H, q), 1,47 (3H, t).

Пропонована сполука 3-31: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,33 (1H, d), 8,88 (1H, d), 8,47 (1H, d), 8,35 (1H, s), 8,10-8,09 (1H, m), 7,79 (1H, dd), 3,67 (2H, q), 1,49 (3H, t).

Пропонована сполука 3-32: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,33 (1H, d), 8,88 (1H, d), 8,65-8,63 (1H, m), 8,37 (1H, s), 8,05 (1H, dd), 7,93 (1H, d), 3,69 (2H, q), 1,51 (3H, t).

Пропонована сполука 3-33: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,41 (1H, d), 8,95 (1H, d), 8,47 (1H, d), 8,35 (1H, s), 8,10-8,08 (1H, m), 7,79 (1H, dd), 3,67 (2H, q), 1,49 (3H, t).

Пропонована сполука 3-34: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,41 (1H, d), 8,95 (1H, d), 8,64-8,63 (1H, m), 8,37 (1H, s), 8,05 (1H, dd), 7,93 (1H, d), 3,69 (2H, q), 1,50 (3H, t).

Пропонована сполука 3-35: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,33 (1H, d), 8,87 (1H, d), 8,30 (1H, s), 8,17-8,16 (1H, m), 7,87 (1H, d), 7,69-7,67 (1H, m), 3,69 (2H, q), 1,50 (3H, t).

Пропонована сполука 3-36: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,41 (1H, d), 8,95 (1H, d), 8,29 (1H, s), 8,17-8,16 (1H, m), 7,86 (1H, d), 7,68-7,67 (1H, m), 3,68 (2H, q), 1,49 (3H, t).

Пропонована сполука 3-37: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,33 (1H, d), 8,88 (1H, d), 8,64 (1H, d), 8,35 (1H, s), 8,07 (1H, dd), 7,86 (1H, d), 3,69 (2H, q), 1,50 (3H, t).

Пропонована сполука 3-38: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,41 (1H, d), 8,95 (1H, d), 8,64 (1H, d), 8,35 (1H, s), 8,06 (1H, dd), 7,85 (1H, d), 3,68 (2H, q), 1,50 (3H, t).

Пропонована сполука 3-39: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,91 (1H, dd), 8,18 (1H, s), 8,16-8,12 (2H, m), 7,92 (1H, d), 7,73 (1H, d), 7,18 (1H, dd), 3,60-3,39 (2H, m), 1,33 (3H, t).

Приклад отримання 7

Суміш проміжної сполуки 6, 318 мг, 1,4-діоксану, 12 мл, тріс(дибензиліденацетон)дипаладію(0), 55 мг і Xantphos, 69 мг, діізопропілетиламіну, 0,31 мл і етантриолу, 0,043 мл перемішували при 50 °C протягом 2 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали етантриол 0,021 мл і суміш перемішували при 50 °C протягом 2 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали етантриол 0,021 мл і суміш перемішували при 50 °C протягом 1,5 год., і потім отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі (гексан : етилацетат : 1 : 1) і отримували пропоновану сполуку 2-1 191 мг.

Приклад отримання 8

До суміші проміжної сполуки 3-1 300 мг і ацетонітрилу, 4,4 мл додавали сульфіт натрію, 135 мг і йод, 166 мг і суміш перемішували за кімнатної температури протягом 4 год. До отриманої суміші додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі (гексан : етилацетат=1 : 1) і отримували пропоновану сполуку 4-1, представлену наступною формулою, 174 мг.



Пропонована сполука 4-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,67 (1H, dd), 8,60 (1H, d), 8,56-8,53 (1H, m), 8,09 (1H, dd), 7,64 (1H, dd), 7,50 (1H, dd), 2,78 (2H, q), 1,20 (3H, t).

Приклад отримання 9

Пропоновану сполуку 4-2, представлену наступною формулою, отримували з використанням проміжної сполуки 3-2 замість проміжної сполуки 3-1 за методикою, описаною в прикладі отримання 8.



Пропонована сполука 4-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,75-8,74 (1H, m), 8,67 (1H, d), 8,41 (1H, d), 8,24 (1H, dd), 7,65 (1H, d), 7,50 (1H, dd), 2,78 (2H, q), 1,20 (3H, t).

Приклад отримання 10

Пропонована сполука, представлену наступною формулою 5-1, отримували з використанням пропонованої сполуки 4-1 замість пропонованої сполуки 2-1 за методикою, описаною в прикладі отримання 5.



Пропонована сполука 5-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,07 (1H, dd), 8,58 (1H, d), 8,56-8,53 (1H, m), 8,09 (1H, dd), 7,78 (1H, dd), 7,69 (1H, dd), 3,48 (2H, q), 1,44 (3H, t).

Приклад отримання 11

Пропоновану сполуку 5-2, представлену наступною формулою, отримували з використанням пропонованої сполуки 4-2 замість пропонованої сполуки 2-1 за методикою, описаною в прикладі отримання 5.



Пропонована сполука 5-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,07-9,06 (1H, m), 8,72-8,71 (1H, m), 8,41 (1H, d), 8,25 (1H, dd), 7,78 (1H, dd), 7,69 (1H, dd), 3,49 (2H, q), 1,45 (3H, t).

Приклад отримання 12

Пропоновану сполуку 6-1, представлену наступною формулою, отримували з використанням 6-(трифторметил)ізохінолін-1(2H)-ону замість проміжної сполуки 1 і з використанням проміжної сполуки 35-2 замість 3-(етансульфоніл)-2-фторпіридину.



Пропонована сполука 6-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,07 (1H, dd), 8,55 (1H, d), 7,87-7,84 (1H, m), 7,73 (1H, dd), 7,69 (1H, dd), 7,64 (1H, dd), 7,37 (1H, d), 6,69 (1H, d), 3,63 (2H, q), 1,46 (3H, t).

Приклад отримання 13

Сполуки, які отримували відповідно до прикладу отримання 12, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Пропонована сполука 6-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,15 (1H, dd), 8,55 (1H, d), 7,87-7,84 (1H, m), 7,76-7,73 (2H, m), 7,57 (1H, dd), 7,36 (1H, d), 6,69 (1H, d), 3,62 (2H, q), 1,46 (3H, t).



Пропонована сполука 6-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,06 (1H, dd), 8,73-8,70 (1H, m), 7,90 (1H, dd), 7,71-7,67 (2H, m), 7,64 (1H, dd), 7,39 (1H, d), 6,68 (1H, d), 3,68-3,62 (2H, m), 1,48 (3H, t).



Пропонована сполука 6-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,16-9,15 (1H, m), 8,72-8,70 (1H, m), 7,91-7,89 (1H, m), 7,75 (1H, dd), 7,69 (1H, d), 7,58-7,55 (1H, m), 7,39 (1H, d), 6,68 (1H, d), 3,68-3,61 (2H, q), 1,47 (3H, t).

Приклад отримання 14

Пропоновану сполуку 6-5, представлену наступною формулою, отримували з використанням проміжної сполуки 38-2 замість 3-(етансульфоніл)-2-фторпіридину.



Пропонована сполука 6-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,97 (1H, s), 8,46 (1H, d), 8,31-8,30 (1H, m), 8,20 (1H, s), 8,14-8,13 (1H, m), 8,10-8,09 (2H, m), 7,79 (1H, dd), 3,48-3,34 (2H, m), 1,37 (3H, t).

Приклад отримання 15

Пропоновану сполуку 6-6, представлену наступною формулою, отримували з використанням проміжної сполуки 38-1 замість 3-(етансульфоніл)-2-фторпіридину.



Пропонована сполука 6-6: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,94 (1H, s), 8,54 (1H, d), 8,46 (1H, d), 8,25 (1H, dd), 8,19 (1H, s), 8,14-8,12 (1H, m), 7,94 (1H, d), 7,79 (1H, dd), 3,47-3,33 (2H, m), 1,36 (3H, t).

Приклад отримання 16

Суміш пропонованої сполуки 3-1, 0,18 г, циклопропілборонової кислоти, 92 мг, аддукту [1,1'-біс(дифенілфосфіно)фероцен]дихлорпаладію(II) з дихлорметаном, 52 мг, трикалійфосфату, 377 мг, толуолу, 2,5 мл і води, 0,7 мл перемішували при 100 °C протягом 6 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі (етилацетат: гексан : 2 : 1) і отримували пропоновану сполуку 7-1, представлену наступною формулою, 90 мг.



Пропонована сполука 7-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,69 (1H, dd), 8,46 (1H, d), 8,25 (1H, s), 8,09-8,06 (1H, m), 7,76 (1H, dd), 7,71 (1H, dd), 7,29 (1H, dd), 3,52 (2H, q), 2,07-1,99 (1H, m), 1,44 (3H, t), 1,13-1,10 (2H, m), 0,82-0,77 (2H, m).

Приклад отримання 17

Сполуки, які отримували відповідно до прикладу отримання 16, і значення їхніх фізичних характеристик наведені нижче.



Пропонована сполука 7-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,70-8,69 (1H, m), 8,64-8,62 (1H, m), 8,27 (1H, s), 8,02 (1H, dd), 7,91 (1H, d), 7,71 (1H, dd), 7,29 (1H, dd), 3,57-3,52 (2H, m), 2,05-2,03 (1H, m), 1,45 (3H, t), 1,14-1,09 (2H, m), 0,81-0,78 (2H, m).



Пропонована сполука 7-3: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,75 (1H, dd), 8,46 (1H, d), 8,26 (1H, s), 8,09-8,06 (1H, m), 7,76 (1H, dd), 7,46-7,43 (1H, m), 6,88 (1H, dd), 3,54-3,47 (2H, m), 2,07-2,03 (1H, m), 1,41 (3H, t), 1,24-1,19 (2H, m), 0,91-0,87 (2H, m).



Пропонована сполука 7-4: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,75 (1H, d), 8,65-8,62 (1H, m), 8,28 (1H, s), 8,02 (1H, dd), 7,91 (1H, d), 7,46-7,44 (1H, m), 6,89 (1H, dd), 3,58-3,48 (2H, m), 2,07-2,02 (1H, m), 1,43 (3H, t), 1,22-1,19 (2H, m), 0,90-0,88 (2H, m).



Пропонована сполука 7-5: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,02 (1H, s), 8,48 (1H, d), 8,29 (1H, s), 8,09 (1H, s), 7,89 (1H, d), 7,81-7,77 (2H, m), 7,60-7,56 (2H, m), 7,25-7,21 (2H, m), 3,57 (2H, q), 1,46 (3H, t).



Пропонована сполука 7-6: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,90 (1H, s), 8,47 (1H, d), 8,27 (1H, s), 8,08 (1H, s), 7,81-7,74 (3H, m), 5,55 (1H, s), 5,34 (1H, s), 3,58-3,52 (2H, m), 2,23 (3H, s), 1,45 (3H, t).

Еталонний приклад отримання 55

Суміш пропонованої сполуки 3-1, 2,0 г, біс(пінаколято)дибору, 1,1 г, аддукту [1,1'-біс(дифенілфосфіно)фероцен]дихлорпаладію(II) з дихлорметаном, 0,086 г, ацетату калію, 1,17 г і толуолу, 20 мл перемішували при 120 °C протягом 8 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали воду і суміш екстрагували хлороформом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом магнію і сушили при зниженому тиску і отримували проміжну сполуку 47, представлену наступною формулою, 1,9 г.



Проміжна сполука 47: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,17 (1H, s), 8,47 (1H, d), 8,28 (1H, s), 8,08 (1H, s), 7,89 (1H, dd), 7,80-7,75 (2H, m), 3,55 (2H, q), 1,45 (3H, t), 1,38 (12H, s).

Приклад отримання 19

Суміш проміжної сполуки 47, 300 мг, 2-бромпіридину, 130 мг, аддукту [1,1'-біс(дифенілфосфіно)фероцен]дихлорпаладію(II) з дихлорметаном, 8,0 мг, трикалійфосфату, 350 мг, диметоксіетану, 3,0 мл і води, 0,3 мл перемішували при 80 °C протягом 4 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і потім до неї додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі (етилацетат: гексан : 4 : 1) і отримували пропоновану сполуку 8-1, представлену наступною формулою, 190 мг.



Пропонована сполука 8-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,55 (1H, s), 8,77 (1H, d), 8,48 (1H, d), 8,31-8,27 (2H, m), 8,09 (1H, s), 7,93-7,84 (2H, m), 7,82-7,76 (2H, m), 7,40-7,35 (1H, m), 3,60 (2H, q), 1,48 (3H, t).

Приклад отримання 20

Пропоновану сполуку 8-2, представлену наступною формулою, отримували з використанням 2-бромпіримідину замість 2-бромпіридину.



Пропонована сполука 8-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 10,02 (1H, s), 8,87 (2H, d), 8,69 (1H, dd), 8,48 (1H, d), 8,32 (1H, s), 8,10 (1H, s), 7,90 (1H, dd), 7,78 (1H, dd), 7,33 (1H, t), 3,62 (2H, q), 1,50 (3H, t).

Приклад отримання 21

До суміші проміжної сполуки 47, 1,1 г, ацетату натрію, 1,2 г, THF, 4 мл і води, 2 мл додавали 30% водний розчин пероксиду водню, 1,1 мл і суміш перемішували при 0 °C протягом 4 год. До отриманої суміші додавали насичений водний розчин тіосульфату натрію, 20 мл і суміш перемішували протягом 1 год. Насичений водний розчин гідрокарбонату натрію додавали до отриманої суміші і суміш екстрагували хлороформом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску і отримували пропоновану сполуку 9, представлену наступною формулою, 0,63 г.



Пропонована сполука 9: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,56-8,47 (2H, m), 8,33-8,27 (1H, m), 8,11 (1H, s), 7,80 (1H, d), 7,71-7,64 (1H, m), 7,40-7,32 (1H, m), 3,50 (2H, q), 1,42 (3H, t).

Приклад отримання 22

Суміш пропонованої сполуки 9, 30 мг, карбонату цезію, 443 мг, етил-п-толуолсульфонату, 136 мг і NMP, 3 мл перемішували при 80 °C протягом 1 год. Насичений водний розчин тіосульфату натрію, 20 мл додавали до отриманої суміші і суміш перемішували протягом 1 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і потім до неї додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок

обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі (етилацетат : гексан=1 : 1) і отримували пропоновану сполуку 10-1, представлену наступною формулою, 100 мг.



Пропонована сполука 10-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 8,51-8,46 (2H, m), 8,28 (1H, s), 8,11 (1H, s), 7,80 (1H, d), 7,72 (1H, d), 7,41-7,38 (1H, m), 4,14 (2H, q), 3,54 (2H, q), 1,54 (3H, t), 1,46 (3H, t).

Приклад отримання 23

До суміші проміжної сполуки 43, 150 мг і етанолу, 5 мл додавали метил-2-формил-5-(трифторметил)бензоат, який отримували за методикою, описаною в Tetrahedron Letters, 2018, 59, 1564, 164 мг, і концентровану хлористоводневу кислоту, 18 мкл при охолодженні льодом і суміш перемішували протягом 30 хв. при охолодженні льодом. Отриману суміш концентрували при зниженому тиску і до неї додавали толуол, 20 мл і пара-толуолсульфонову кислоту, 24 мг і суміш перемішували при 110 °C протягом 6 год. Отриману суміш витримували до охолодження до кімнатної температури і до неї додавали насичений водний розчин бікарбонату і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі (гексан : етилацетат=1 : 2) і отримували пропоновану сполуку 11, представлену наступною формулою, 155 мг.



Пропонована сполука 11: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,05 (1H, d), 8,76 (1H, d), 8,40 (1H, s), 8,11 (1H, dd), 7,93 (1H, d), 7,72 (1H, d), 7,63 (1H, dd), 3,58 (2H, q), 1,46 (3H, t).

Приклад отримання 24

Суміш пропонованої сполуки 3-7, 500 мг, піразолу, 73 мг, йодиду міді(I), 19 мг і N,N'-диметилетилендіаміну, 19 мг, карбонату цезію, 63 мг і DMF, 1 мл перемішували при 150 °C протягом 9 год. До отриманої суміші додавали воду і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі (гексан : етилацетат=1 : 2) і отримували пропоновану сполуку 12-1, представлену наступною формулою, 40 мг.



Пропонована сполука 12-1: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,33 (1H, d), 8,24 (1H, s), 8,17 (1H, d), 8,05 (1H, dd), 7,98 (1H, d), 7,91 (1H, d), 7,86 (1H, d), 7,83 (1H, d), 7,67 (1H, dd), 6,60 (1H, t), 3,61 (2H, q), 1,48 (3H, t).

Сполука, яку отримували відповідно до прикладу отримання 24, і значення її фізичних характеристик наведені нижче.



Пропонована сполука 12-2: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,40 (1H, s), 8,68 (1H, s), 8,26 (1H, s), 8,22 (1H, s), 8,18 (1H, d), 7,99-7,96 (2H, m), 7,87 (1H, d), 7,68 (1H, dd), 3,63 (2H, q), 1,49 (3H, t).

Приклад отримання 25

Суміш пропонованої сполуки 3-7 1,00 г, трет-бутилкарбамату, 272 мг, 2-дициклогексилфосфіно-2',4',6'-триізопропілбіфенілу, 184 мг, ацетату паладію(II), 69 мг, карбонату цезію, 880 мг і діоксану, 15 мл перемішували при 100 °C в атмосфері азоту протягом 18 год. До отриманої суміші додавали воду за кімнатної температури і суміш екстрагували етилацетатом. Отриманий органічний шар промивали насиченим розсолом, сушили над безводним сульфатом натрію і концентрували при зниженому тиску. Отриманий залишок обробляли за допомогою колонкової хроматографії на силікагелі (етилацетат : гексан=1 : 1) і отримували пропоновану сполуку 13, представлену наступною формулою, 173 мг.



Пропонована сполука 13: ^{1}H-NMR ($CDCl_3$) δ: 9,31 (1H, s), 8,21 (1H, s), 8,17-8,15 (1H, m), 7,85 (1H, d), 7,72-7,70 (1H, m), 7,68-7,63 (2H, m), 6,64 (1H, s), 3,59-3,50 (2H, m), 1,58 (9H, s), 1,46 (3H, t).

Нижче описані приклади пропонованої сполуки X, яку отримували за будь-якою методикою прикладів отримання, описаною в прикладах, або за методикою, описаною в даному винаході. В цьому випадку T1 - T36 означають будь-яку групу, вказану нижче.




T16


T17


T18


T19


T20


T21


T22


T23


T24


T25


T26


T27


T28


T29


T30


T31


T32


T33


T34


T35


T36

Сполука, представлена формулою (L-1):


(L-1)

(яка нижче в даному винаході називається сполука (L-1)), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_1).

[Таблиця L1]
CF_3
CHF_2
CH_2CF_3
CF_2CF_3
$CH_2CF_2CF_3$
$CF_2CF_2CF_3$
$CF_2CF_2CF_2CF_3$
$CF_2CF_2CF_2CF_2CF_3$
$CF(CF_3)_2$

[Таблиця L2]
SCF_3
SCH_2CF_3
SCF_2CF_3
$SCH_2CF_2CF_3$
$SCF_2CF_2CF_3$
$SCH_2CF_2CF_2CF_3$
$SCF_2CF_2CF_2CF_3$
$S(O)CF_3$
$S(O)CH_2CF_3$

[Таблиця L3]
OCF_3
$OCHF_2$
OCH_2CF_3
OCH_2CHF_2
OCF_2CF_3
$OCH(CH_3)CF_3$
$OCH_2CF_2CHF_2$
$OCH_2CF_2CF_3$
$OCF_2CF_2CF_3$

[Таблиця L1]
$C(Me)_2CN$
$CH_2C(Me)_2CN$
$CH_2CH_2C(Me)_2CN$
c-Pr
c-Bu
1-CN-c-Pr
2,2-F_2-c-Pr
Oc-Pr
Oc-Bu
O(1-CN-c-Pr)
O(2,2-F_2-c-Pr)

[Таблиця L2]
$S(O)CF_2CF_3$
$S(O)CH_2CF_2CF_3$
$S(O)CF_2CF_2CF_3$
$S(O)CH_2CF_2CF_2CF_3$
$S(O)CF_2CF_2CF_2CF_3$
$S(O)_2CF_3$
$S(O)_2CH_2CF_3$
$S(O)_2CF_2CF_3$
$S(O)_2CH_2CF_2CF_3$
$S(O)_2CF_2CF_2CF_3$
$S(O)_2CH_2CF_2CF_2CF_3$
$S(O)_2CF_2CF_2CF_2CF_3$

[Таблиця L3]
$OCH_2CF_2CHFCF_3$
$OCH_2CF_2CF_2CF_3$
$OCF_2CF_2CF_2CF_3$
$OCH_2CF_2CF_2CF_2CF_3$
$OCH_2C(Me)_2CN$
$OCH_2CH_2C(Me)_2CN$
$OS(O)_2CF_3$
$OS(O)_2CF_2CF_3$
$OS(O)_2CF_2CF_2CF_3$
F
Cl
Br
I

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_2).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_3).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_4).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_5).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_6).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_7).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_8).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_9).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{10}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{11}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{12}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{13}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{14}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{15}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{16}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{17}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{18}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{19}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{20}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{21}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{22}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{23}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{24}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{25}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{26}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{27}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{28}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{29}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{30}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{31}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{32}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{33}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{34}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{35}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{36}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{37}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{38}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{39}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{40}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{41}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{42}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{43}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{44}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{45}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{46}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{47}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{48}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{49}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{50}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{51}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{52}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{53}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{54}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{55}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{56}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{57}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{58}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{59}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{60}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{62}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{62}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{63}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{64}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{65}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{66}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{67}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{68}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{69}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{70}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{71}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{72}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{73}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{74}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{75}).

Сполука, представлена формулою (L-2):



(L-2)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-2)), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{76}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{77}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{78}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{79}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{80}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{81}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{82}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{83}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{84}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{85}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{86}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{87}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{88}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{89}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{90}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{91}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{92}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{93}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{94}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{95}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{96}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{97}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{98}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{99}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{100}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{101}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{102}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{103}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{104}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{105}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{106}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{107}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{108}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{109}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{110}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{111}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{112}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{113}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{114}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{115}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{116}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{117}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{118}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{119}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{120}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{121}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{122}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{123}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{124}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{125}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{126}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{127}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{128}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{129}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{130}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{131}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{132}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{133}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{134}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{135}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{136}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{137}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{138}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{139}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{140}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{141}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{142}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{143}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{144}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{145}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{146}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{147}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{148}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{149}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{150}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{151}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{152}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{153}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{154}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{155}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{156}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{157}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{158}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{159}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{160}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{161}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{162}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{163}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{164}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{165}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{166}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{167}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{168}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{169}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{170}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{171}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{172}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{173}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{174}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{175}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{176}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{177}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{178}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{179}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{180}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{181}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{182}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{183}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{184}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{185}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{186}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{187}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{188}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{189}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{190}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{191}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{192}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{193}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{194}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{195}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{196}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{197}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{198}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{199}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{200}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{201}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{202}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{203}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{204}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{205}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{206}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{207}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{208}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{209}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{210}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{211}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{212}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{213}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{214}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{215}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{216}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{217}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{218}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{219}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{220}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{221}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{222}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{223}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{224}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{225}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{226}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{227}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{228}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{229}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{230}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{231}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{232}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{233}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{234}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{235}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{236}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{237}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{238}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{239}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{240}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{241}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{242}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{243}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{244}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{245}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{246}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{247}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{248}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{249}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{250}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{251}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{252}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{253}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{254}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{255}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{256}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{257}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{258}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{259}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{260}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{261}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{262}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{263}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{264}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{265}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{266}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{267}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{268}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{269}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{270}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{271}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{272}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{273}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{274}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{275}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{276}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{277}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{278}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{279}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{280}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{281}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{282}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{283}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{284}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{285}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{286}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{287}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{288}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{289}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{290}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{291}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{292}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{293}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{294}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{295}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{296}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{297}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{298}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{299}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{300}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{301}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{302}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{303}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{304}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{305}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{306}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{307}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{308}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{309}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{310}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{311}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{312}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{313}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{314}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{315}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{316}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{317}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{318}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{319}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{320}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{321}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{322}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{323}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{324}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{325}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{326}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{327}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{328}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{329}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{330}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{331}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{332}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{333}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{334}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{335}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{336}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{337}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{338}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{339}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{340}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{341}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{342}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{343}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{344}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{345}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{346}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{347}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{348}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{349}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{350}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{351}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{352}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{353}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{354}).

Сполука, представлена формулою (L-3):



(L-3)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-3)), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{355}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{356}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{357}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{358}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{359}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{360}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{361}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{362}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{363}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{364}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{365}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{366}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{367}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{368}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{369}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{370}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{371}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{372}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{373}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{374}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{375}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{376}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{377}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{378}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{379}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{380}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{381}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{382}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{383}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{384}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{385}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{386}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{387}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{388}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{389}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{390}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{391}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{392}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{393}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{394}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{395}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{396}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{397}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{398}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{399}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{400}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{401}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{402}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{403}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{404}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{405}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{406}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{407}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{408}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{409}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{410}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{411}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{412}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{413}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{414}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{415}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{416}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{417}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{418}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{419}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{420}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{421}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{422}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{423}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{424}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{425}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{426}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{427}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{428}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{429}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{430}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{431}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{432}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{433}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{434}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{435}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{436}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{437}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{438}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{439}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{440}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{441}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{442}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{443}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{444}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{445}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{446}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{447}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{448}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{449}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{450}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{451}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{452}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{453}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{454}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{455}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{456}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{457}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{458}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{459}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{460}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{461}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{462}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{463}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{464}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{465}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{466}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{467}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{468}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{469}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{470}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{471}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{472}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{473}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{474}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{475}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{476}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{477}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{478}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{479}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{480}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{481}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{482}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{483}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{484}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{485}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{486}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{487}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{488}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{489}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{490}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{491}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{492}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{493}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{494}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{495}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{496}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{497}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{498}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{499}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{500}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{501}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{502}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{503}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{504}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{505}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{506}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{507}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{508}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{509}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{510}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{511}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{512}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{513}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{514}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{515}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{516}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{517}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{518}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{519}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{520}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{521}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{522}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{523}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{524}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{525}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{526}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{527}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{528}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{529}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{530}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{531}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{532}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{533}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{534}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{535}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{536}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{537}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{538}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{539}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{540}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{541}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{542}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{543}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{544}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{545}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{546}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{547}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{548}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{549}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{550}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{551}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{552}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{553}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{554}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{555}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{556}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{557}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{558}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{559}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{560}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{561}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{562}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{563}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{564}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{565}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{566}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{567}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{568}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{569}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{570}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{571}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{572}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{573}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{574}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{575}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{576}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{577}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{578}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{579}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{580}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{581}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{582}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{583}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{584}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{585}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{586}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{587}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{588}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{589}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{590}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{591}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{592}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{593}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{594}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{595}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{596}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{597}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{598}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{599}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{600}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{601}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{602}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{603}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{604}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{605}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{606}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{607}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{608}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{609}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{610}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{611}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{612}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{613}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{614}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{615}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{616}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{617}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{618}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{619}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{620}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{621}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{622}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{623}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{624}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{625}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{626}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{627}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{628}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{629}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{630}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{631}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{632}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{633}).

Сполука, представлена формулою (L-4):



(L-4)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-4)), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{634}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{635}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{636}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{637}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{638}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{639}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{640}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{641}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{642}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{643}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{644}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{645}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{646}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{647}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{648}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{649}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{650}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{651}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{652}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{653}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{654}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{655}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{656}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{657}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{658}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{659}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{660}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{661}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{662}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{663}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{664}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{665}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{666}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{667}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{668}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{669}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{670}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{671}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{672}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{673}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{674}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{675}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{676}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{677}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{678}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{679}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{680}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{681}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{682}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{683}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{684}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{685}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{686}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{687}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{688}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{689}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{690}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{691}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{692}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{692}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{693}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{694}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{695}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{696}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{697}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{699}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{700}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{701}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{702}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{703}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{704}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{705}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{706}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{707}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{708}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{709}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{710}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{711}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{712}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{713}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{714}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{715}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{716}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{717}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{718}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{719}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{720}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{721}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{722}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{723}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{724}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{725}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{726}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{727}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{728}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{729}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{730}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{731}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{732}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{733}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{734}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{735}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{736}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{737}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{738}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{739}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{740}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{741}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{742}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{743}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{744}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{745}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{746}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{747}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{748}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{749}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{750}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{751}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{752}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{753}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{754}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{755}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{756}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{757}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{758}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{759}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{760}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{761}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{762}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{763}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{764}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{765}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{766}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{767}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{768}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{769}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{770}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{771}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{772}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{773}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{774}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{775}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{776}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{777}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{778}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{779}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{780}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{781}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{782}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{783}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{784}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{785}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{786}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{787}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{788}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{789}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{790}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{791}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{792}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{793}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{794}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{795}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{796}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{797}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{798}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{799}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{800}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{801}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{802}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{803}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{804}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{805}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{806}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{807}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{808}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{809}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{810}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{811}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{812}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{813}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{814}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{815}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{816}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{817}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{818}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{819}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{820}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{821}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{822}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{823}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{824}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{825}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{826}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{827}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{828}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{829}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{830}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{831}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{832}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{833}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{834}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{835}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{836}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{837}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{838}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{839}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{840}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{841}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{842}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{843}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{844}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{845}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{846}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{847}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{848}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{849}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{850}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{851}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{852}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{853}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{854}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{855}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{856}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{857}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{858}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{859}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{860}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{861}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{862}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{863}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{864}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{865}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{866}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{867}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{868}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{869}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{870}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{871}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{872}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{873}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{874}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{875}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{876}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{877}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{878}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{879}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{880}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{881}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{882}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{883}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{884}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{885}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{886}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{887}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{888}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{889}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{890}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{891}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{892}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{893}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{894}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{895}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{896}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{897}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{898}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{899}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{900}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{901}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{902}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{903}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{904}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{905}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{906}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{907}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{908}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{909}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{910}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{911}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{912}).

Сполука, представлена формулою (L-5):



(L-5)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-5)), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{913}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{914}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{915}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{916}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{917}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{918}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{919}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{920}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{921}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{922}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{923}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{924}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{925}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{926}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{927}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{928}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{929}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{930}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{931}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{932}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{933}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{934}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{935}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{936}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{937}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{938}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{939}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{940}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{941}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{942}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{943}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{944}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{945}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{946}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{947}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{948}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{949}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{950}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{951}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{952}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{953}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{954}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{955}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{956}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{957}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{958}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{959}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{960}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{961}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{962}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{963}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{964}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{965}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{966}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{967}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{968}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{969}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{970}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{971}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{972}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{973}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{974}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{975}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{976}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{977}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{978}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{979}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{980}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{981}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{982}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{983}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{984}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{985}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{986}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{987}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{988}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{989}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{990}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{991}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{992}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{993}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{994}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{995}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{996}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{997}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{998}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{999}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1000}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1001}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1002}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1003}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1004}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1005}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1006}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1007}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1008}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1009}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1010}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1011}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1012}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1013}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1014}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1015}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1016}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1017}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1018}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1019}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1020}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1021}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1022}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1023}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1024}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1025}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1026}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1027}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1028}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1029}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1030}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1031}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1032}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1033}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1034}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1035}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1036}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1037}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1038}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1039}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1040}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1041}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1042}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1043}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1044}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1045}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1046}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1047}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1048}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1049}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1050}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1051}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1052}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1053}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1054}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1055}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1056}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1057}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1058}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1059}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1060}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1061}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1062}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1063}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1064}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1065}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1066}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1067}).

Сполука, представлена формулою (L-6):



(L-6)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-6)), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1068}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1069}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1070}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1071}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1072}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1073}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1074}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1075}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1076}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1077}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1078}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1079}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1080}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1081}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1082}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1083}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1084}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1085}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1086}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1087}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1088}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1089}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1090}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1091}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1092}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1093}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1094}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1095}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1096}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1097}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1098}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1099}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1100}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1101}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1102}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1103}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1104}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1105}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1106}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1107}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1108}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1109}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1110}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1111}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1112}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1113}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1114}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1115}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1116}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T10, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1117}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1118}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1119}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1120}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1121}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1122}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1123}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1124}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1125}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1126}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1127}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1128}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1129}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1130}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1131}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1132}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1133}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1134}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1135}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1136}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T14, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1137}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1138}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1139}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1140}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1141}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T15, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1142}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1143}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1144}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1145}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1146}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T16, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1147}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1148}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1149}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1150}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1151}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T17, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1152}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1153}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1154}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1155}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1156}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T18, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1157}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1158}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1159}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1160}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1161}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T19, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1162}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1163}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1164}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1165}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1166}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T20, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1167}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1168}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1169}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1170}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1171}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T21, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1172}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1173}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1174}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1175}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1176}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T22, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1177}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1178}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1179}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1180}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1181}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T23, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1182}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1183}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1184}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1185}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1186}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T24, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1187}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1188}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1189}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1190}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1191}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T25, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1192}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1193}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1194}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1195}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1196}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T26, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1197}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1198}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1199}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1200}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1201}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T27, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1202}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1203}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1204}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1205}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1206}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T28, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1207}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1208}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1209}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1210}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1211}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T29, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1212}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1213}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1214}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1215}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1216}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T30, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1217}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1218}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1219}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1220}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1221}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T31, R^{3b} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1222}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1223}).

[Таблиця L4]
F
Br
I
Me
Et
Pr
i-Pr
CHF_2
$CH=CH_2$
$CMe=CH_2$
c-Pr
c-Bu
c-Pen
c-Hex
1-F-c-Pr
2,2-F_2-c-Pr
1-CN-c-Pr
1-CN-c-Bu
1-CN-c-Pen
1-CN-c-Hex
CHO
C(O)Me
C(O)c-Pr
C(O)OEt
C(O)NHc-Pr
CH=N-OH
CH=N-OMe
CH=N-OEt
$CH=N-OCH_2CF_3$
CMe=N-OH
CMe=N-OMe
CMe=N-OEt
$CMe=N-OCH_2CF_3$
$C(NH_2)=N-OCH_2CF_3$
NO_2
CN

[Таблиця L5]
Ph
3-F-Ph
4-F-Ph
3-Cl-Ph
4-Cl-Ph
3-CF_3-Ph
4-CF_3-Ph
3-NMe_2-Ph
4-NMe_2-Ph
3-CN-Ph
4-CN-Ph
4-$C(O)NMe_2$-Ph
4-NHC(O)Me-Ph
3,4-F_2-Ph
3,5-F_2-Ph
2,4-F_2-Ph
3,4,5-F_3-Ph
3,4-Cl_2-Ph
3,5-Cl_2-Ph
3,5-Cl_2-4-F-Ph
OPh
O-2-F-Ph
O-3-CF_3-Ph
O-4-CF_3-Ph
NH_2
$NHCH_2CF_3$
NHc-Pr
NH(1-CN-c-Pr)
NHOMe
NMe_2
NHC(O)Me
NHC(O)c-Pr
NMeC(O)c-Pr
SEt
S(O)Et
$S(O)_2Et$

[Таблиця L6]
Py2
4-F-Py2
5-F-Py2
4-Cl-Py2
5-Cl-Py2
4-CF_3-Py2
5-CF_3-Py2
6-CF_3-Py2
3-Me-Py2
4-Me-Py2
5-Me-Py2
6-Me-Py2
4-CN-Py2
5-CN-Py2
5-$OCH_2CF_2CF_3$-Py2
3,5-F_2-Py2
Py3
6-CF_3-Py3
5-CF_3-Py3
6-F-Py3
6-Cl-Py3
Py4
OPy2
OPy3
OPy4
O-5-CF_3-Py2
O-6-CF_3-Py2
OMe
OEt
OPr
Oi-Pr
Oc-Pr
$OCMe_2CN$
CMe_2CN
$CMeCN_2$
CH_2CMe_2CN

[Таблиця L7]	[Таблиця L8]	[Таблиця L9]
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

[Таблиця L10]	[Таблиця L11]	[Таблиця L12]
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1224}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1225}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1226}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1227}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1228}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1229}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1230}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1231}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1232}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1233}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1234}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1235}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1236}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1237}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1238}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1239}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1240}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1241}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1242}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1243}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1244}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1245}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1246}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1247}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1248}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1249}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1250}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1251}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1252}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1253}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1254}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1255}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1256}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1257}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1258}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1259}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1260}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1261}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1262}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1263}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1264}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1265}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1266}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1267}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1268}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1269}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1270}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1271}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1272}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1273}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1274}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1275}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1276}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1277}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1278}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1279}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1280}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1281}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1282}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1283}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1284}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1285}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1286}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1287}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1288}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1289}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1290}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1291}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1292}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1293}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1294}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1295}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1296}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1297}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1298}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1299}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1300}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1301}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1302}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1303}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1304}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1305}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1306}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1307}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1308}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1309}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1310}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1311}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1312}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1313}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1314}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1315}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1316}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1317}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1318}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1319}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1320}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1321}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1322}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1323}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1324}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1325}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1326}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1327}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1328}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1329}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1330}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1331}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1332}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1333}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1334}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1335}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1336}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1337}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1338}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1339}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1340}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1341}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1342}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1343}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1344}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1345}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1346}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1347}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1348}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1349}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1350}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1351}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1352}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1353}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1354}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1355}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1356}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1357}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1358}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1359}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1360}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1361}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1362}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1363}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1364}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1365}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1366}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1367}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1368}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1369}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1370}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1371}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1372}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1373}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1374}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1375}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1376}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1377}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1378}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1379}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1380}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1381}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1382}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1383}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1384}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1385}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1386}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1387}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1388}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1389}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1390}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1391}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1392}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1393}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1394}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1395}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1396}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1397}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1398}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1399}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1400}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1401}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1402}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1403}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1404}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1405}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1406}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1407}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1408}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1409}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1410}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1411}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1412}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1413}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1414}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1415}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1416}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1417}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1418}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1419}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1420}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1421}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1422}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1423}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1424}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1425}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1426}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1427}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1428}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1429}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1430}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1431}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1432}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1433}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1434}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1435}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1436}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1437}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1438}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1439}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1440}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1441}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1442}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1443}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1444}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1445}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1446}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1447}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1448}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1449}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1450}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1451}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1452}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1453}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1454}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1455}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1456}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1457}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1458}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1459}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1460}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1461}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1462}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1463}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1464}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1465}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1466}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1467}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1468}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1469}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1470}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1471}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1472}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1473}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1474}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1475}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1476}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1477}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1478}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1479}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1480}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1481}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1482}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1483}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1484}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1485}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1486}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1487}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1488}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1489}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1490}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1491}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1492}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1493}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1494}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1495}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1496}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1497}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1498}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1499}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1500}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1501}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1502}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1503}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1504}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1505}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1506}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1507}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1508}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1509}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1510}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1511}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1512}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1513}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1514}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1515}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1516}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1517}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1518}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1519}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1520}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1521}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1522}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1523}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1524}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1525}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1526}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1527}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1528}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1529}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1530}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1531}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1532}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою CF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1533}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1534}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою SCF_3, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1535}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1536}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3b} являє собою атом водню і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1537}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1538}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1539}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1540}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1541}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1542}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1543}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1544}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1545}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1546}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1547}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1548}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1549}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1550}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1551}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1552}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою CF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1553}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1554}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1555}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1556}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1557}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою CF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1558}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1559}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1560}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1561}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1562}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою CF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1563}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1564}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1565}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1566}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1567}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою CF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1568}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1569}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1570}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1571}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1572}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою CF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1573}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1574}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1575}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1576}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1577}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою CF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1578}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1579}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1580}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1581}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3c} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1582}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1583}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1584}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1585}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1586}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1587}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1588}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1589}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1590}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1591}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1592}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1593}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1594}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1595}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1596}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1597}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1598}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1599}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1600}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1601}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1602}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1603}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1604}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1605}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1606}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1607}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1608}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1609}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1610}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1611}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1612}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T9, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1613}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1614}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1615}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1616}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1617}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1618}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1619}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1620}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1621}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1622}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1623}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1624}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1625}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1626}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1627}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1628}).

Сполука, представлена формулою (L-7):



(L-7)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1629}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1630}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1631}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1632}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1633}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1634}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1635}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1636}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1637}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1638}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1639}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1640}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1641}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1642}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1643}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1644}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1645}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1646}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1647}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1648}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1649}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1650}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1651}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1652}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1653}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1654}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1655}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1656}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1657}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1658}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1659}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1660}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1661}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1662}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1663}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1664}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1665}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1666}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1667}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1668}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1669}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1670}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1671}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1672}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1673}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1674}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1675}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1676}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1677}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1678}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1679}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1680}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1681}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1682}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1683}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1684}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1685}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1686}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1687}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1688}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1689}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1690}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1691}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1692}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1693}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1694}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1695}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1696}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1697}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1698}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1699}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1700}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1701}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1702}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1703}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1704}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1705}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1706}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1707}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1708}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1709}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1710}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1711}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1712}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1713}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1714}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1715}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1716}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1717}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1718}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1719}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1720}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1721}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1722}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1723}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1724}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1725}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1726}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1727}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1728}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1729}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1730}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1731}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1732}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1733}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1734}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1735}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1736}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1737}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1738}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1739}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1740}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1741}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1742}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1743}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1744}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1745}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1746}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1747}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1748}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1749}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1750}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1751}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1752}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1753}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1754}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1755}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1756}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1757}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1758}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1759}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1760}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1761}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1762}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1763}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1764}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1765}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1766}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1767}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1768}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1769}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1770}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1771}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1772}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1773}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1774}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1775}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1776}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1777}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1778}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1779}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1780}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1781}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1782}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1783}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1784}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1785}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1786}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1787}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1788}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1789}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1790}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1791}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1792}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1793}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1794}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1795}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1796}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1797}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1798}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1799}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1800}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1801}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, g дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1802}).

Сполука (L-7), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, g дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1803}).

Сполука, представлена формулою (L-8):



(L-8)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1804}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1805}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1806}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1807}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1808}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1809}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1810}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1811}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1812}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1813}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1814}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1815}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1816}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1817}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1818}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1819}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1820}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1821}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1822}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1823}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1824}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1825}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1826}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1827}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1828}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1829}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1830}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1831}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1832}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1833}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1834}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1835}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1836}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1837}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1838}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1839}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1840}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1841}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1842}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1843}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1844}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1845}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1846}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1847}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1848}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1849}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1850}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1851}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1852}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1853}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1854}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1855}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1856}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1857}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1858}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1859}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1860}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1861}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1862}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1863}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1864}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1865}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1866}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1867}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1868}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1869}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1870}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1871}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1872}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1873}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1874}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1875}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1876}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1877}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1878}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1879}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1880}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1881}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1882}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1883}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1884}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1885}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1886}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1887}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1888}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1889}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1890}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1891}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1892}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1893}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1894}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1895}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1896}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1897}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1898}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1899}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1900}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1901}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1902}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1903}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1904}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1905}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1906}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1907}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1908}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1909}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1910}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1911}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1912}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1913}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1914}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1915}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1916}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1917}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1918}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1919}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1920}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1921}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1922}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1923}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1924}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1925}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1926}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1927}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1928}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1929}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1930}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1931}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1932}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1933}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1934}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1935}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1936}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1937}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1938}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1939}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1940}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1941}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1942}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1943}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1944}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1945}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1946}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1947}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1948}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1949}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1950}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою циклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1951}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою 1-ціаноциклопропільну групу і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1952}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1953}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1954}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1955}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1956}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1957}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1958}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1959}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1960}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1961}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1962}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1963}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1964}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1965}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1966}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1967}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1968}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1969}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1970}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1971}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1972}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1973}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1974}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1975}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1976}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1977}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1978}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1979}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1980}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1981}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1982}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1983}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1984}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1985}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1986}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1987}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1988}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1989}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1990}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1991}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1992}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1993}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1994}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1995}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1996}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1997}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1998}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{1999}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2000}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2001}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2002}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2003}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2004}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2005}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2006}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2007}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2008}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2009}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2010}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2011}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2012}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2013}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2014}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2015}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2016}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2017}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2018}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2019}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2020}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2021}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2022}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2023}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2024}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2025}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2026}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2027}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2028}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2029}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2030}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2031}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2032}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2033}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2034}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2035}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2036}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2037}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2038}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2039}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2040}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2041}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2042}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2043}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2045}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2046}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2047}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2048}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2049}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2050}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2051}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2052}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2053}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2054}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2055}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2056}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2057}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2058}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2059}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2060}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2061}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2062}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2063}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2064}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2065}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2066}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2067}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2068}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2069}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2070}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2071}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2072}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2073}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2074}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2075}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2076}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2077}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2078}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2079}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2080}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2081}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2082}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2083}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2084}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2085}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2086}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2087}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2088}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2089}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2090}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2091}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2092}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2093}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3c} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2095}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2095}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2096}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2097}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2098}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3c} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2099}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2100}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2101}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2102}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2103}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3c} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2104}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2105}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2106}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2107}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2108}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3c} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2109}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2110}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2111}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2112}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2113}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3c} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2114}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2115}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2116}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2117}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2118}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2119}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2120}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2121}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2122}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2123}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2124}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2125}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2126}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2127}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2128}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2129}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2130}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2131}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2132}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2133}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2134}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2135}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2136}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2137}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2138}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2139}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2140}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2141}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2142}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2143}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2144}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2145}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2146}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2147}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2148}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2149}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2150}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2151}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2152}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2153}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу $SX_{2153\text{-}1}$).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2154}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2155}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2156}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2157}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2158}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2159}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2160}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2161}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2162}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2163}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2164}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2165}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2166}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2167}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2168}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2169}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2170}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2171}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2172}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2173}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2174}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2175}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2176}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2177}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2178}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2179}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2180}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2181}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2182}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2183}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2184}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2185}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2186}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2187}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2188}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2189}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2190}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2191}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2192}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2193}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2194}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2195}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2196}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2197}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2198}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2199}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2200}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2201}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2202}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2203}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2204}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2205}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2206}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2207}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2208}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2209}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2210}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2211}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2212}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2213}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2214}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2215}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2216}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2217}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2218}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2219}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2220}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2221}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2222}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2223}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2224}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2225}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2226}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2227}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2228}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2229}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2230}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2231}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2232}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2233}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2234}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2235}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2236}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2237}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2238}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2239}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2240}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2241}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2242}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2243}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2244}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2245}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2246}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2247}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2248}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2249}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2250}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2251}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2252}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2253}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2254}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2255}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2256}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2257}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2258}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2259}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2260}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2261}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2262}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2263}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2264}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2265}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2266}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2267}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2268}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2269}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2270}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2271}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2272}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2273}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2274}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2275}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2276}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2277}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2278}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2279}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2280}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2281}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2282}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2283}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2284}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2285}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2286}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2287}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2288}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2289}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2290}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2291}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2292}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2293}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2294}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2295}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2296}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2297}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2298}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2299}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2300}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2301}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2302}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2303}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2304}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2305}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2306}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2307}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2308}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2309}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2310}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2311}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2312}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2313}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2314}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2315}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2316}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2317}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2318}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2319}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2320}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2321}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2322}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2323}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2324}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2325}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2326}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2327}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2328}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2329}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2330}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2331}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2332}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2333}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2334}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2335}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2336}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2337}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2338}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2339}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2340}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2341}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2342}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2343}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2344}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2345}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2346}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2347}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2348}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2349}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2350}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2351}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2352}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2353}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2354}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2355}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2356}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2357}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2358}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2359}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2360}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2361}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2362}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2363}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2364}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2365}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2366}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2367}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2368}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2369}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2370}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2371}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2372}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2373}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2374}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2375}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2376}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2377}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2378}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2379}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2380}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2381}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2382}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2383}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2384}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2385}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2386}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2387}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2388}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2389}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2390}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2391}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2392}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32 R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2393}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2394}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2395}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2396}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2397}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T32, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2398}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2399}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2400}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2401}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2402}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33 R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2403}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2404}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2405}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2406}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2407}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T33, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2408}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2409}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2410}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2411}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2412}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34 R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2413}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2414}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2415}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2416}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2417}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T34, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2418}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2419}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2420}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2421}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2422}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2423}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2424}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2425}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2426}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2427}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T35, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2428}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою CF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2429}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою C_2F_5 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2430}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2431}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою SCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2432}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2433}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$ і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2434}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2435}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2436}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2437}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T36, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2438}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2439}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2440}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2441}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2442}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2443}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2444}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2445}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2446}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2447}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2448}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2449}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2450}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2451}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2452}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2453}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2454}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2455}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2456}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2457}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2458}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2459}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2460}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2461}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2462}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2463}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2464}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2465}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2466}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2467}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2468}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2469}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2470}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2471}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2472}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2473}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2474}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2475}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2476}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2477}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2478}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2479}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2480}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2481}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2482}).

Сполука (L-1), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2483}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2484}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2485}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2486}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2487}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2488}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2489}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2490}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2491}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2492}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2493}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2494}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2495}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2496}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2497}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2498}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2499}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2500}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2501}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2502}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2503}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2504}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2505}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2506}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2507}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2508}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2509}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2510}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2511}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2512}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2513}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2514}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2515}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2516}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2517}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2518}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2519}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2520}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2521}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2522}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2523}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2524}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2525}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2526}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2527}).

Сполука (L-2), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2528}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2529}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2530}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2531}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2532}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2533}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2534}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2535}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2536}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2537}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2538}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2539}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2540}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2541}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2542}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2543}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2544}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2545}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2546}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2547}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2548}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2549}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2550}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2551}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2552}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2553}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2554}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2555}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2556}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2557}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2558}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2559}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2560}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2561}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2562}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2563}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2564}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2565}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2566}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2567}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2568}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2569}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2570}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2571}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2572}).

Сполука (L-3), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2573}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2574}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2575}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2576}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2577}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2578}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2579}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2580}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2581}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2582}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2583}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2584}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2585}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2586}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2587}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2588}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2589}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2590}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2591}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2592}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2593}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2594}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2595}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2596}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2597}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2598}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2599}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2600}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2601}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2602}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2603}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2604}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2605}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2606}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2607}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2608}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2609}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2610}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2611}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2612}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2613}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2614}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2615}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2616}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2617}).

Сполука (L-4), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2618}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2619}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2620}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2621}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2622}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2623}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2624}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2625}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2626}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2627}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2628}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2629}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2630}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2631}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2632}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2633}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2634}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2635}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2636}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2637}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2638}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2639}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2640}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2641}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2642}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2643}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2644}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2645}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2646}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2647}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2648}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2649}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2650}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2651}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2652}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2653}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2654}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2655}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2656}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2657}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2658}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2659}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2660}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2661}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2662}).

Сполука (L-5), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2663}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2664}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2665}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2666}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2667}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2668}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2669}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2670}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2671}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2672}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2673}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2674}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2675}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2676}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2677}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2678}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2679}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2680}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2681}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2682}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T6, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2683}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2684}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2685}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2686}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2687}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T7, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2688}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2689}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2690}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2691}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2692}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T8, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2693}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2694}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2695}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2696}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2697}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T11, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2698}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2699}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2700}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2701}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2702}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T12, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2703}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою OCF_3 і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2704}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом фтору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2705}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом хлору і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2706}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом брому і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2707}).

Сполука (L-6), де T являє собою групу, позначену за допомогою T13, R^1 являє собою атом йоду і R^{3b} являє собою будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2708}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу $SX_{2709\text{-}1}$).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу $SX_{2709\text{-}2}$).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2710}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2711}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2712}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2713}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2714}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору,

CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2715}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2716}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2717}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2718}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2719}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2720}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2721}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2722}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2723}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2724}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2725}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2726}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2727}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2728}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2729}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору,

CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2730}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2731}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом фтору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2732}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2733}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2734}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2735}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2736}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2737}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2738}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2739}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2740}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2741}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2742}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2743}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2744}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору,

CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2745}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2746}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2747}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2748}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2749}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2750}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2751}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2752}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2753}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2754}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2755}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2756}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом хлору, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2757}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2758}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2759}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору,

CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2760}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2761}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2762}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2763}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2764}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2765}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2766}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2767}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2768}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2769}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2770}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2771}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2772}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2773}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2774}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору,

CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2775}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2776}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2777}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2778}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2779}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2780}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2781}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом брому, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2782}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2783}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2784}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2785}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2786}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2787}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2788}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2789}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору,

CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2790}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2791}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2792}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2793}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2794}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2795}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2796}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2797}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2798}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2799}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2800}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2801}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2802}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2803}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2804}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору,

CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2805}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2806}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою атом йоду, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2807}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2808}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2809}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2810}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2811}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2812}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2813}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2814}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2815}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2816}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2817}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2818}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2819}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або

будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2820}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2821}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2822}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2823}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2824}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2825}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2826}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T4, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2827}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2828}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2829}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2830}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T5, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2831}).

Сполука (L-8), де T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою етильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-який замісник, вказаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2832}).

Нижче описани приклади проміжної сполуки, которое отримували відповідно до еталонними прикладами отримання, описанними в прикладах, або еталонній методиці отримання, опиманою в даному винаході. В цьому випадку T37 - T39 означають любие групи, вказані нижче.



T37



T38



T39

Сполука, представлена формулою (L-9):



(L-9)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-9)),

де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2833}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2834}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2835}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2836}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2837}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2838}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2839}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2840}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2841}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2842}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2843}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2844}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2845}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2846}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2847}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2848}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2849}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2850}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2851}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2852}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2853}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2854}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2855}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2856}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2857}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2858}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2859}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2860}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2861}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2862}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2863}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2864}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2865}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2866}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2867}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2868}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2869}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2870}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2871}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2872}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2873}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2874}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2875}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2876}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2877}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2878}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2879}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2880}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2881}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2882}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2883}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2884}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2885}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2886}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2887}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2888}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2889}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2890}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2891}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2892}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2893}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2894}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2895}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2896}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2897}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2898}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2899}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2900}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2901}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2902}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2903}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2904}).

Сполука, представлена формулою (L-10):



(L-10)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-10)),

де n дорівнює 0, T являє собою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2905}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2906}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2907}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2908}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2909}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2910}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2911}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2912}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2913}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2914}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2915}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2916}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2917}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2918}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2919}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2920}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2921}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2922}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2923}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2924}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2925}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2926}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2927}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2928}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2929}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2930}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2931}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2932}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2933}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2934}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2935}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2936}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2937}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2938}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2939}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2940}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2941}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2942}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2943}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2944}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2945}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2946}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2947}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2948}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2949}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2950}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2951}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2952}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2953}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2954}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2955}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2956}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2957}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2958}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2959}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2960}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2961}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2962}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2963}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2964}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2965}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2966}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2967}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2968}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2969}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2970}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2971}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2972}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2973}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2974}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2975}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2976}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2977}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2978}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2979}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2980}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2981}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2982}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2983}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2984}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2985}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2986}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2987}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2988}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2989}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2990}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2991}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2992}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2993}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2994}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2995}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2996}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2997}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2998}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{2999}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3000}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3001}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3002}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3003}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3004}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3005}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3006}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3007}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3008}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3009}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3010}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3011}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3012}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3013}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3014}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3015}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3016}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3017}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3018}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3019}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3020}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3021}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3022}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3023}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3024}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3025}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3026}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3027}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3028}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3029}).

Сполука (L-9), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3030}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3031}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3032}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3033}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3034}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3035}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3036}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3037}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3038}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3039}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3040}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3041}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник,

описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3042}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3043}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3044}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3045}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3046}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3047}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3048}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3049}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3050}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3051}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3052}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3053}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3054}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3055}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3056}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3057}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3058}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3059}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник,

описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3060}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3061}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3062}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3063}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3064}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3065}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3066}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3067}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3068}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3069}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3070}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3071}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 0, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3072}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3073}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3074}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3075}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1 T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3076}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3077}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 1, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник,

описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3078}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3079}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3080}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3081}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3082}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3083}).

Сполука (L-10), де n дорівнює 2, T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3084}).

Сполука, представлена формулою (L-11):



(L-11)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-11)),

де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3085}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3086}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3087}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3088}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3089}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3090}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або

будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3091}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3092}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою CF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3093}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3094}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3095}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3096}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3097}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3098}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3099}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3100}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3101}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою C_2F_5, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3102}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3103}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3104}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3105}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3

або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3106}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3107}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3108}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3109}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3110}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою SCF_3, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3111}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3112}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3113}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3114}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3115}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3116}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3117}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3118}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3119}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3120}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом

хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3121}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3122}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T37, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3123}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3124}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3125}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T38, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3126}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 0, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3127}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 1, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3128}).

Сполука (L-11), де T являє собою групу, позначену за допомогою T39, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, n дорівнює 2, R^2 являє собою метильну групу і R^{3b} являє собою атом водню, атом хлору, CF_3 або будь-які замісники, описані в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3129}).

Сполука, представлена формулою (L-12):



(L-12)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-12))

, де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3130}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3131}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3132}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3133}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3134}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3135}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3136}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3137}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3138}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3139}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3140}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3141}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3142}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3143}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3144}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3145}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3146}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3147}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3148}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3149}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3150}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3151}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3152}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3153}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3154}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3155}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3156}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3157}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3158}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3159}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3160}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3161}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3162}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3163}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3164}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3165}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3166}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3167}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3168}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3169}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3170}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3171}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3172}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3173}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3174}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3175}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3176}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3177}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3178}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3179}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3180}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3181}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3182}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3183}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3184}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3185}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3186}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3187}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3188}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3189}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3190}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3191}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3192}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3193}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3194}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3195}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3196}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3197}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3198}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3199}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3200}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3201}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3202}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3203}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3204}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3205}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3206}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3207}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3208}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3209}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3210}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3211}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3212}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3213}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3214}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3215}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3216}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3217}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3218}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3219}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3220}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3221}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3222}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3223}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3224}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3225}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3226}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3227}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3228}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3229}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3230}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3231}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3232}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3233}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню,R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3234}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3235}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3236}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3237}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3238}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3239}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3240}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3241}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню,R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3242}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3243}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3244}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3245}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом йоду і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3246}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3247}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3248}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3249}).

Сполука, представлена формулою (L-13):



(L-13)

(нижче в даному винаході називається сполука (L-13))

, де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3250}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який

замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3251}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3252}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3253}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3254}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3255}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3256}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3257}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3258}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3259}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3260}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3261}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3262}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3263}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3264}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3265}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою

будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3266}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3267}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3268}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3269}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3270}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3271}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3272}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3273}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3274}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3275}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3276}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3277}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3278}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3279}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3280}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою

будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3281}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3282}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3283}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3284}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3285}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3286}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3287}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3288}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3289}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3290}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3291}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3292}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3293}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3294}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3295}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-

який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3296}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3297}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3298}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3299}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3300}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3301}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3302}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3303}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3304}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3305}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3306}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3307}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3308}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3309}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3310}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який

замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3311}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3312}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3313}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3314}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3315}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3316}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3317}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3318}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3319}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3320}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3321}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3322}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3323}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3324}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3325}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-

який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3326}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3327}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3328}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3329}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3330}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3331}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3332}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3333}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3334}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3335}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3336}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3337}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3338}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3339}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3340}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою

будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3341}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3342}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3343}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3344}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3345}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3346}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3347}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3348}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3349}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3350}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3351}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3352}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3353}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3354}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3355}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-

який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3356}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3357}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3358}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3359}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3360}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3361}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3362}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3363}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом хлору, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3364}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом брому, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3365}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом йоду, R^{3c} являє собою атом водню і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3366}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою CF_3 і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3367}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом хлору і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3368}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^{3b} являє собою атом водню, R^{3c} являє собою атом брому і R^1 являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L1 - таблиці L3 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3369}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3370}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який

замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3371}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3372}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3373}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3374}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3375}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3376}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3377}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3378}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3379}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3380}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3381}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3382}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3383}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3384}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3385}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-

який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3386}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3387}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3388}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3389}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3390}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3391}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3392}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3393}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3394}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3395}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3396}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3397}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3398}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3399}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3400}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який

замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3401}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3402}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3403}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3404}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3405}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3406}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3407}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3408}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3409}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3410}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3411}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3412}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3413}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3414}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3415}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-

який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3416}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3417}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3418}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3419}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3420}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3421}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3422}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3423}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3424}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3425}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3426}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3427}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3428}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3429}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3430}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який

замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3431}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3432}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3433}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3434}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3435}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3436}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3437}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3438}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3439}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3440}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3441}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3442}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3443}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3444}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3445}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-

який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3446}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3447}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3448}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3449}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3450}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3451}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3452}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3453}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3454}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3455}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3456}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3457}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3458}).

Сполука (L-12), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3459}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3460}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який

замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3461}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3462}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3463}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3464}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3465}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3466}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3467}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3468}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3469}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3470}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3471}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3472}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3473}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3474}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3475}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-

який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3476}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3477}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3478}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3479}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3480}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3481}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3482}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3483}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3484}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3485}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3486}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3487}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3488}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T1, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3489}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3490}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який

замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3491}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3492}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3469}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3494}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3495}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3496}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3497}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3498}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3499}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3500}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3501}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3502}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3503}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3504}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3505}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-

який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3506}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3507}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3508}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3509}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3510}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3511}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3512}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3513}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3514}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3515}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3516}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3517}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3518}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T2, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3519}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3520}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який

замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3521}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3522}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3523}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3524}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом водню, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3525}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3526}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3527}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3528}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3529}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3530}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом фтору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3531}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору,

T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3532}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3533}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3534}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3535}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-

який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3536}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом хлору, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3537}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3538}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3539}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3540}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3541}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3542}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом брому, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3543}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою CF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3544}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою C_2F_5, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3545}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою OCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3546}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою SCF_3, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3547}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3548}).

Сполука (L-13), де R^{33} являє собою атом йоду, T являє собою групу, позначену за допомогою T3, R^1 являє собою $S(O)_2CF_3$, R^{3c} являє собою атом водню і R^{3b} являє собою будь-який замісник, описаний в таблиці L4 - таблиці L12 (яка нижче в даному винаході називається сполука класу SX_{3549}).

Нижче наведені приклади препаратів пропонованої сполуки X. "Частини" являє собою "мас. част.". Крім того, пропонована сполука S являє собою сполуки, описані як сполуки груп SX1 - SX2832.

Приклад препарату 1

До суміші 10 частин будь-якої з пропонованих сполук S додають 35 частин ксилолу і 35 частин DMF і потім 14 частин поліоксіетиленстирилфенілового ефіру і 6 частин додецилбензолсульфонату кальцію, потім їх змішують і отримують кожен препарат.

Приклад препарату 2

Чотири (4) частини лаурилсульфату натрію, 2 частини лігнінсульфонату кальцію, 20 частин отриманого за вологою технологією діоксиду кремнію і 54 частини діатомової землі змішують і до них додають ще 20 частин будь-якої з пропонованих сполук S, потім їх змішують і отримують кожен препарат.

Приклад препарату 3

До 2 частин будь-якої з пропонованих сполук S додають 1 частину отриманого за вологою технологією діоксиду кремнію, 2 частини лігнінсульфонату кальцію, 30 частин бентоніту і 65 частин каолінової глини, потім їх змішують. До сумішей потім додають відповідну кількість води і суміші додатково перемішують, гранулюють в грануляторі і сушать потоком повітря і отримують кожен препарат.

Приклад препарату 4

3 відповідною кількістю ацетону змішують 1 частину будь-якої з пропонованих сполук S і потім додають 5 частин отриманого за вологою технологією діоксиду кремнію, 0,3 частини кислого ізопропілфосфату і 93,7 частини каолінової глини, потім їх ретельно змішують при перемішуванні і ацетон видаляють з суміші шляхом випарювання і отримують кожен препарат.

Приклад препарату 5

Суміш 35 частин амонієвої солі сульфату поліоксіетиленалкілового ефіру і отриманого за вологою технологією діоксид кремнію (відношення мас 1:1), 20 частин будь-якої з пропонованих сполук S і 45 частин води в достатньому ступені змішують і отримують кожен препарат.

Приклад препарату 6

Десять (10) частин будь-якої з пропонованих сполук S, 18 частин бензилового спирту, 18 частин і 9 частин DMSO змішують і до них додають 6,3 частини GERONOL (зареєстрована торговельна марка) TE250, 2,7 частини Ethylane (зареєстрована торговельна марка) NS-500LQ і 54 частини розчинника нафта і потім змішують і отримують кожен препарат.

Приклад препарату 7

Суміш 5 частин ксилолу і 5 частин трихлоретану, 0,1 частини будь-якої з пропонованих сполук S перемішують і потім отриману суміш змішують з 89,9 частинами керосину і отримують кожен розчин.

Приклад препарату 8

0,5 мл Ацетону, 10 мг будь-якої з пропонованих сполук S змішують, і розчин по краплях додають до 5 г твердого порошкоподібного корму для тварин (твердий порошкоподібний корм для розведення і схрещування CE-2, фірми CLEA Japan, Inc.), потім отримані суміші рівномірно перемішують і потім їх сушать шляхом випарювання ацетону і отримують кожну отруєну приманку.

Приклад препарату 9

В аерозольний балон вміщують 0,1 частини будь-якої з пропонованих сполук S і 49,9 частин Neothiozole (випускає фірма Chuo Kasei Co., Ltd.). Після встановлення аерозольного клапана вводять 25 частин диметилового ефіру і 25 частин LPG, потім струшують і додатково встановлюють пускач і отримують кожен маслоподібний аерозоль.

Приклад препарату 10

Суміш 0,6 частини будь-якої з пропонованих сполук S, 0,01 частини 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенолу, 5 частин ксилолу, 3,39 частин керосину і 1 частини Rheodol (зареєстрована торговельна марка) MO-60 (випускає фірма Kao Corporation) і 50 частин дистильованої води вміщують в аерозольний контейнер і приєднують клапанну частину контейнера. Потім через клапан вводять 40 частин LPG під тиском і отримують кожен водний аерозоль.

Приклад препарату 11

0,1 г Будь-якої з пропонованих сполук S змішують з 2 мл пропіленгліколю і отриманим розчином просочують керамічну пластину розміром 4,0 см×4,0 см і товщиною 1,2 см і отримують кожен термічний фумігант.

Приклад препарату 12

П'ять (5) частин будь-якої з пропонованих сполук S і 95 частин співполімеру етилен-метилметакрилат (вміст метилметакрилату в співполімері: 10 мас.%) розплавляють і замішують і отриманий замішаний продукт екструдують з екструзійної формувальної машини і отримують кожен стрижнеподібний формований продукт довжиною 15 см і діаметром 3 мм.

Приклад препарату 13

П'ять (5) частин будь-якої з пропонованих сполук S і 95 частин пластифікованої полівінілхлоридої смоли розплавляють і замішують і отриманий замішаний продукт екструдують з екструзійної формувальної машини і отримують кожен стрижнеподібний формований продукт довжиною 15 см і діаметром 3 мм.

Приклад препарату 14

Сто (100) мг будь-якої з пропонованих сполук S, 68,75 мг лактози, 237,5 мг кукурудзяного крохмалю, 43,75 мг мікрокристалічної целюлози, 18,75 мг полівінілпіролідону, 28,75 мг натрієвої солі карбоксиметилкрохмалю і 2,5 мг стеарату магнію змішують і отримані суміші пресують до прийнятного розміру і отримують кожну таблетку.

Приклад препарату 15

Двадцять п'ять (25) мг будь-якої з пропонованих сполук S, 60 мг лактози, 25 мг кукурудзяного крохмалю, 6 мг кальцієвої солі кармелози і відповідну кількість 5% водного розчину гідроксипропілметилцелюлози змішують, і отримані суміші вміщують в капсулу з твердого желатину або в капсулу з гідроксипропілметилцелюлози і отримують кожну капсулу.

Приклад препарату 16

До 100 мг будь-якої з пропонованих сполук S, 500 мг фумарової кислоти, 2000 мг хлориду натрію, 150 мг метилпарабену, 50 мг пропілпарабену, 25000 мг гранульованого цукру, 13000 мг сорбіту (70% розчин), 100 мг Вігуму (зареєстрована торговельна марка) K (випускає фірма Vanderbilt Co.), 35 мг віддушки і 500 мг забарвлювального агенту додають дистильовану воду до кінцевого об'єму в 100 мл, потім суміші перемішують і отримують кожну суспензію для перорального введення.

Приклад препарату 17

Суміш 5 частин емульгатора, 3 частин бензилового спирту і 30 частин пропіленгліколю, 5 частин будь-якої з пропонованих сполук S перемішують і до неї додають фосфатний буфер для встановлення pH розчину, що дорівнює від 6,0 до 6,5, і додають воду як решту частини і отримують кожен розчин для перорального введення.

Приклад препарату 18

До суміші 57 частин підданої фракційній перегонці пальмовій олії і 3 частин полісорбату 85 додають 5 частин дистеарату алюмінію і нагрівають для диспергування. Отриману суміш охолоджують до кімнатної температури і 25 частин сахарину диспергують в масляному розріджувачі. В неї вводять десять (10) частин будь-якої з пропонованих сполук S і отримують кожну пасту для перорального введення.

Приклад препарату 19

П'ять (5) частин будь-якої з пропонованих сполук S змішують з 95 частинами наповнювача вапняку, потім здійснюють мокре гранулювання отриманої суміші і отримують кожну гранулу для перорального введення.

Приклад препарату 20

80 Частин моноетилового ефіру діетиленгліколю, 5 частин будь-якої з пропонованих сполук S змішують і до них додають 15 частин пропіленкарбонату, і отриману суміш змішують і отримують кожен розчин для точкового нанесення.

Приклад препарату 21

70 Частин моноетилового ефіру діетиленгліколю, 10 частин будь-якої з пропонованих сполук S змішують і до них додають 20 частин 2-октилдодеканолу, і отриману суміш змішують і отримують кожен розчин для занурення.

Приклад препарату 22

До 0,1 частини будь-якої з пропонованих сполук S додають 40 частин поліоксіетиленлауретсульфату натрію (25% водний розчин), 5 частин лаурамідопропілбетаїну, 5 частин моноетаноламіду жирної кислоти кокосового масла, 0,5 частини карбоксивінілового полімеру і 49,4 частини очищеної води і отриману суміш в достатньому ступені перемішують і отримують кожен препарат шампуню.

Приклад препарату 23

0,15 Частини будь-якої з пропонованих сполук S, 95 частин корму для тварин, а також 4,85 частини суміші гідрофосфату кальцію, діатомової землі, Aerosil (зареєстрована торговельна марка) і вапняку (або крейди) в достатньому ступені змішують і отримують кожен премікс корму для тварин.

Приклад препарату 24

7,2 г Будь-якої з пропонованих сполук S і 92,8 г Hosco (зареєстрована торговельна марка) S-55 змішують при 100 °C і отриману суміш виливають у форму для супозиторію потім забезпечують отвердження шляхом охолодження і отримують кожен супозиторій.

Нижче приклади дослідження використовують, щоб показати ефективність пропонованої сполуки X для боротьби з членистоногими шкідниками.

Наступні приклади дослідження проводили при 25 °C.

Методика дослідження 1

Досліджувані сполуки готують у вигляді препарату за методикою, аналогічною описаній в прикладі препарату 6, і додають воду, яка містить 0,03 об./об.% розподілювального засобу, для отримання розбавленого розчину, який містить досліджувану сполуку в заданій концентрації.

Розсаду огірків (Cucumis sativus) (на стадії розвитку другого справжнього листка) висівають у контейнер і приблизно 30 попелиць бавовникових (Aphis gossypii) (всі стадії життя) наносять на листя огірків. Через день розбавленим розчином обприскують розсаду в кількості 10 мл/розсаду. Ще через 5 днів визначають кількість комах, які вижили, і ступінь боротьби розраховують за наступним виразом.

Ступінь боротьби (%) = {1-(Cb×Tai)/(Cai×Tb)}×100

де позначення у формулі мають наступні значення.

Cb: Кількість досліджуваних комах в необробленій групі;

Cai: Кількість комах, які вижили, в момент обстеження в необробленій групі;

Tb: Кількість досліджуваних комах в обробленій групі;

Tai: Кількість комах, які вижили, в момент обстеження в обробленій групі;

В цьому випадку "необроблена група" являє собою групу, в якій здійснюють таку ж операцію, як в обробленій групі, з тією відмінністю, що досліджувану сполуку не використовують.

Приклад дослідження 1-1

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 500 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 1. За даними дослідження вказані нижче пропоновані сполуки X мають ступінь боротьби, який більший або дорівнює 90%.

Пропонована сполука: 1-1, 1-2, 2-1, 2-5, 2-7, 2-11, 2-12, 2-15, 2-18, 2-19, 2-21, 2-25, 2-26, 2-36, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36, 3-38, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-6, 8-1, 8-2, 9, 11, 12-1, 12-2 і 13

Приклад дослідження 1-2

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 200 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 1. За даними дослідження вказані нижче пропоновані сполуки X мають ступінь боротьби, який більший або дорівнює 90 %.

Пропонована сполука: 1-1, 1-2, 2-1, 2-5, 2-7, 2-11, 2-12, 2-15, 2-18, 2-19, 2-21, 2-25, 2-26, 2-36, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36, 3-38, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-6, 8-1, 8-2, 9, 11, 12-1, 12-2 і 13

Методика дослідження 2

Досліджувані сполуки готують у вигляді препарату за методикою, аналогічною описаній в прикладі препарату 6, і додають воду, яка містить 0,03 об./об.% розподілювального засобу, для отримання розбавленого розчину, який містить досліджувану сполуку в заданій концентрації.

Розсаду рису (Oryza sativa) (на стадії розвитку другого справжнього листка) висівають у контейнер і розбавленим розчином обприскують розсаду в кількості 10 мл/розсаду. Потім на листя рису випускають 20 личинок коричневого дельфациду 3-й личинковій стадії. Через 6 днів смертність визначають за наступним виразом.

Смертність (%) = {1- Кількість комах, які вижили/20}×100

Приклад дослідження 2-1

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 500 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 2. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X має ступінь боротьби, який більший або дорівнює 90 %.

Пропонована сполука: 7-3

Приклад дослідження 2-2

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 200 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 2. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X має ступінь боротьби, який більший або дорівнює 90 %.

Пропонована сполука: 7-3

Методика дослідження 3

Досліджувані сполуки готують у вигляді препарату за методикою, аналогічною описаній в прикладі препарату 6, і додають воду, яка містить 0,03 об./об.% розподілювального засобу, для отримання розбавленого розчину, який містить досліджувану сполуку в заданій концентрації.

Білокрилку тютюнову (Bemisia tabaci) випускають на розсаду томатів (Lycopersicon esculentum), яку висівають в контейнер, і потім вирощують протягом приблизно 24 год. Розсаду зберігають протягом 8 днів і личинки білокрилки тютюнової виводяться з відкладених яєць. Розбавленим розчином обприскують розсаду в кількості 10 мл/розсаду. Через 7 днів визначають кількість комах, які вижили, і ступінь боротьби розраховують за наступним виразом.

Ступінь боротьби (%) = {1-(Cb×Tai)/(Cai×Tb)}×100

де позначення у формулі мають наступні значення.

Cb: Кількість комах в необробленій групі незадовго до обробки;

Cai: Кількість комах, які вижили, в момент обстеження в необробленій групі;

Tb: Кількість комах в обробленій групі незадовго до обробки;

Tai: Кількість комах, які вижили, в момент обстеження в обробленій групі;

В цьому випадку "необроблена група" являє собою групу, в якій здійснюють таку же операцію, як в обробленій групі, з тією відмінністю, що досліджувану сполуку не використовують.

Приклад дослідження 3-1

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 500 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 3. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X має ступінь боротьби, який більший або дорівнює 90 %.

Пропонована сполука: 3-28 і 3-30

Приклад дослідження 3-2

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 200 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 3. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X має ступінь боротьби, який більший або дорівнює 90 %.

Пропонована сполука: 3-28 і 3-30

Методика дослідження 4

Досліджувані сполуки готують у вигляді препарату за методикою, аналогічною описаній в прикладі препарату 6, і додають воду, яка містить 0,03 об./об.% Shindain (зареєстрована торговельна марка), для отримання розбавленого розчину, який містить досліджувану сполуку в заданій концентрації.

Розсаду капусти (Brassicae oleracea) (на стадії розвитку від другого до третього справжнього листка) висівають в чашку і розбавленим розчином обприскують розсаду в кількості 20 мл/розсаду. Потім стебло і листок цієї розсади відрізають і вміщують в чашку, яку накривають фільтрувальним папером. В чашку випускають п'ять (5) особин молю капустяного (Plutella xylostella) другої личинковій стадії. Через 5 днів визначають кількість комах, які вижили, і смертність комах розраховують за наступним виразом.

Смертність (%) = (1- Кількість комах, які вижили/5)×100

Приклад дослідження 4-1

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 500 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 4. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X приводите до смертності комах, яка більша або дорівнює 80 %.

Пропонована сполука: 1-1, 1-2, 2-1, 2-5, 2-6, 2-11, 2-12, 2-15, 2-18, 2-19, 2-21, 2-25, 2-26, 2-36, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36, 3-38, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 8-1, 8-2, 9, 11, 12-1, 12-2 і 13

Приклад дослідження 4-2

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 200 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 4. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X приводить до смертності комах, яка більша або дорівнює 80 %.

Пропонована сполука: 1-1, 1-2, 2-1, 2-5, 2-6, 2-11, 2-12, 2-15, 2-18, 2-19, 2-21, 2-25, 2-26, 2-36, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36, 3-38, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 8-1, 8-2, 9, 11, 12-1, 12-2 і 13

Методика дослідження 5

Досліджувані сполуки готують у вигляді препарату за методикою, аналогічною описаній в прикладі препарату 6, і додають воду, яка містить 0,03 об./об.% Shindain (зареєстрована торговельна марка), для отримання розбавленого розчину, який містить досліджувану сполуку в заданій концентрації.

Розсаду капусти (Brassicae oleracea) (на стадії розвитку від третього до четвертого справжнього листка) висівають в чашку і розбавленим розчином обприскують розсаду в кількості 20 мл/розсаду. Потім 10 випускають особин азиатской бавовникової совки (Spodoptera litura) на третьей личинковій стадії. Через 6 днів визначають кількість комах, які вижили, і смертність комах розраховують за наступним виразом.

Смертність (%) = (1- Кількість комах, які вижили/10)×100

Приклад дослідження 5-1

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 500 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 5. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X приводить до смертності комах, яка більша або дорівнює 80 %.

Пропонована сполука: 1-1, 1-2, 2-1, 2-5, 2-11, 2-12, 2-15, 2-18, 2-19, 2-21, 2-25, 2-26, 2-36, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-6, 8-1, 8-2, 9, 11, 12-1, 12-2 і 13.

Приклад дослідження 5-2

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 200 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 5. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X приводить до смертності комах, яка більша або дорівнює 80 %.

Пропонована сполука: 1-1, 1-2, 2-1, 2-5, 2-11, 2-12, 2-15, 2-18, 2-19, 2-21, 2-25, 2-26, 2-36, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-6, 8-1, 8-2, 9, 11, 12-1, 12-2 і 13.

Методика дослідження 6

Досліджувані сполуки готують у вигляді препарату за методикою, аналогічною описаній в прикладі препарату 5, і до нього додають воду для отримання розбавленого розчину, який містить досліджувану сполуку в заданій концентрації.

Фільтрувальний папір діаметром 5,5 см вміщують на дно чашки і потім 0,7 мл розбавленого розчину по краплях наносять на фільтрувальний папір і 30 мг сахарози рівномірно наносять на фільтрувальний папір як приманку. В чашку випускають десять (10) дорослих самиць мухи кімнатної (Musca domestica) і потім чашку закривають кришкою. Через 24 год. визначають кількість комах, які загинули, і смертність комах розраховують за наступним виразом.

Смертність (%) = (кількість комах, які загинули/кількість досліджуваних комах)×100

Приклад дослідження 6

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 500 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 6. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X приводить до смертності комах, яка більша або дорівнює 70 %.

Пропонована сполука: 2-2, 2-6, 2-11, 2-12, 2-15, 3-1, 3-2, 3-6, 3-12, 3-13, 3-20, 3-24, 6-1

Методика дослідження 7

Розчин в ацетоні, який містить 800 част./млн досліджуваної сполуки виливають у контейнер об'ємом 20 мл і досліджувану сполуку рівномірно наносять на внутрішній бік контейнера в кількості 40 мг/м^2 і контейнеру дають висохнути.

У контейнер випускають п'ять (5) дорослих самиць мухи кімнатної (Musca domestica) і потім контейнер закривають кришкою. Через заданий час визначають стан мух кімнатних і смертність комах розраховують за наступним виразом.

Смертність (%) = (кількість комах, які загинули/кількість досліджуваних комах)×100

Приклад дослідження 7-1

Дослідження здійснюють з використанням заданого часу витримування, який дорівнює 1 год., і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 7. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X приводить до смертності комах, яка більша або дорівнює 80 %.

Пропонована сполука: 2-5, 3-5, 4-2, 6-2, 6-3, 8-1, 8-2

Приклад дослідження 7-2

Дослідження здійснюють з використанням заданого часу витримування, який дорівнює 1 дню, і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 7 і підтверджують результат дослідження.

Методика дослідження 8

Досліджувані сполуки готують у вигляді препарату за методикою, аналогічною описаній в прикладі препарату 5, і до нього додають воду для отримання розбавленого розчину, який містить досліджувану сполуку в заданій концентрації.

В розбавлений розчин випускають 30 особин комара звичайного (Culex pipiens pallens) на останній личинковій стадії і через день визначають стан комара звичайного і смертність комах розраховують за наступним виразом.

Смертність (%) = (кількість комах, які загинули/кількість досліджуваних комах)×100

Приклад дослідження 8

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 3,5 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 8. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X приводить до смертності комах, яка дорівнює або більша 91 %.

Пропонована сполука: 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 2-6, 2-11, 2-12, 2-15, 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-12, 3-13, 3-16, 3-17, 3-20, 3-24, 3-26, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-5, 6-6, 8-1, 8-2 і 11

Методика дослідження 9

1 мг кожної з досліджуваних сполук розчиняють в 50 мкл змішаного розчину поліоксіетиленсорбітанмонококоату і ацетону (поліоксіетиленсорбітанмонококоат : ацетон=5 : 95 (об./об. співвідношення)). До них додають воду, яка містить 0,03 об.% Shindain (зареєстрована торговельна марка) для отримання розбавленого розчину, який містить досліджувану сполуку в заданій концентрації.

Цільні молоді паростки кукурудзи (Zea mays) занурюють в розбавлений розчин на 30 сек. Потім кожні два зерна паростків вміщують в пластмасову чашку Петрі (радіус 90 мм) і в чашку випускають 10 личинок західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera) у другій личинковій стадії. Через 5 днів визначають кількість комах, які загинули, і смертність комах розраховують за наступним виразом.

Смертність (%) = (кількість комах, які загинули/10}×100

Приклад дослідження 9-1

Дослідження здійснюють шляхом приготування однакових 500 част./млн заданих концентрацій 500 част./млн і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 9. За даними дослідження вказана нижче пропонована сполука X приводить до смертності комах, яка більша або дорівнює 80 %.

Пропонована сполука X: 1-2, 2-1, 2-11, 2-18, 2-19, 2-21, 2-25, 2-26, 3-1, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-15, 3-16, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 4-2, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-2, 7-6, 8-1, 11, 12-1 і 13.

Приклад дослідження 9-2

Дослідження здійснюють з використанням заданій концентрації, яка дорівнює 200 част./млн, і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 9 і підтверджують результат дослідження.

Методика дослідження 10

Розчин в ацетоні, який містить 800 част./млн досліджуваної сполуки виливають у контейнер об'ємом 50 мл і досліджувану сполуку рівномірно наносять на внутрішній бік контейнера в кількості 40 мг/м^2 і контейнеру дають висохнути.

У контейнер випускають 5 дорослих самців таргана рудого (Blattella germanica) і потім контейнер закривають кришкою. Через заданий час визначають стан тарганів рижих і смертність комах розраховують за наступним виразом.

Смертність (%) = (кількість комах, які загинули/кількість досліджуваних комах)×100

Приклад дослідження 10-1

Дослідження здійснюють з використанням заданого часу витримування, який дорівнює 1 год., і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 10 і підтверджують результат дослідження.

Приклад дослідження 10-2

Дослідження здійснюють з використанням заданого часу витримування, який дорівнює 1 дню, і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 10 і підтверджують результат дослідження.

Приклад дослідження 10-3

Дослідження здійснюють з використанням заданого часу витримування, який дорівнює 3 дням, і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 10 і підтверджують результат дослідження.

Методика дослідження 11

Розчин в ацетоні, який містить 50 част./млн досліджуваної сполуки виливають у контейнер об'ємом 20 мл і досліджувану сполуку рівномірно наносять на внутрішній бік контейнера в кількості 2,5 мг/м^2 і потім контейнеру дають висохнути.

У контейнер випускають 5 лялечок Haemaphysalis longicornis і потім контейнер закривають кришкою. Через заданий час визначають стан Haemaphysalis longicornis і смертність комах розраховують за наступним виразом.

Смертність (%) = (кількість комах, які загинули/кількість досліджуваних комах)×100

Приклад дослідження 11

Дослідження здійснюють з використанням заданого часу витримування, який дорівнює 2 дням, і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 11 і підтверджують результат дослідження.

Методика дослідження 12

Розчин в ацетоні, який містить 50 част./млн досліджуваної сполуки виливають у контейнер об'ємом 20 мл і досліджувану сполуку рівномірно наносять на внутрішній бік контейнера в кількості 2,5 мг/м^2 і потім контейнеру дають висохнути.

У контейнер випускають 10 робочих мурах Monomorium pharaonis і потім контейнер закривають кришкою. Через заданий час визначають стан Monomorium pharaonis і смертність комах розраховують за наступним виразом.

Смертність (%) = (кількість комах, які загинули/кількість досліджуваних комах)×100

Приклад дослідження 12

Дослідження здійснюють з використанням заданого часу витримування, який дорівнює 1 год. і використання вказаних нижче пропонованих сполук X як досліджуваної сполуки відповідно до методики дослідження 12 і підтверджують результат дослідження.

Методика дослідження 13

1 мг кожної пропонованої сполуки X розчиняють в 10 мкл змішаного розчину ксилолу, DMF і поверхнево-активної речовини (ксилол : DMF: поверхнево-активна речовина=4 : 4: 1 (об./об. співвідношення)). До них додають воду, яка містить 0,02 об.% розподілювального засобу, для отримання розбавленого розчину A, який містить пропоновану сполуку в заданій концентрації.

1 мг Кожної пропонованої сполуки X розчиняють в 10 мкл змішаного розчину ксилолу, DMF і поверхнево-активного речовини (ксилол : DMF: поверхнево-активна речовина=4 : 4: 1 (об./об. співвідношення)). До них додають воду, яка містить 0,02 об.% розподілювального засобу, для отримання розбавленого розчину B, який містить пропонований інгредієнт в заданій концентрації.

Розбавлений розчин A змішують з розбавленим розчином B і отримують розбавлений розчин C.

Диски листя сім'ядоль огірка (cucumber sativus) (довжина 1,5 см) вміщують в кожну ямку 24-ямкового мікропланшета. Випускають (2) безкрилих дорослих і 8 личинок попелиці бавовникової (Aphis gossypii) на ямку і кожну ямку обприскують за допомогою 20 мкл розбавленого розчину C. Цю групу визначають, як "оброблена група". Ямку, яку обприскували за допомогою 20 мкл води, що містить 0,02 об.% розподілювального засобу замість розбавленого розчину C, визначають, як "необроблена група".

Після висихання розбавленого розчину C мікропланшет зверху закривають листом плівки. Через 5 днів визначають кількість комах, які вижили, в кожній ямці.

Ступінь боротьби розраховують за наступним виразом.

Ступінь боротьби (%) = {1 - (Tai)/(Cai)}×100

де позначення у формулі мають наступні значення.

Cai: Кількість комах, які вижили, в момент обстеження в необробленій групі;

Tai: Кількість комах, які вижили, в момент обстеження в обробленій групі.

Конкретні розбавлені розчини C, які можуть підтвердити ефект відповідно до методики дослідження 13, описані нижче в параграфах 1) - 5).

1) Розбавлений розчин C містить комбінацію, вказану в переліку A, де концентрація пропонованої сполуки X дорівнює 200 част./млн і концентрація пропонованого інгредієнта дорівнює 2000 част./млн. В переліку A сполука X являє собою будь-яку сполуку, вибрану з числа пропонованих сполук 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13,

3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36, 3-37, 3-38, 3-39, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 8-1, 8-2, 9, 10-1, 11, 12-1, 12-2 і 13.

Перелік A:

сполука X+клотіанідин; сполука X+тіаметоксам; сполука X+імідаклоприд; сполука X+тіаклоприд; сполука X+флупірадифурон; сполука X+сульфоксафлор; сполука X+трифлумезопірим; сполука X+дихлормезотіаз; сполука X+бета-цифлутрин; сполука X+тефлутрин; сполука X+фіпроніл; сполука X+хлорантраніліпрол; сполука X+ціантраніліпрол; сполука X+тетраніліпрол; сполука X+тіодикарб; сполука X+карбофуран; сполука X+флуксаметамід; сполука X+афоксоланер; сполука X+флураланер; сполука X+брофланілід; сполука X+абамектин; сполука X+флуопірам; сполука X+флуенсульфон; сполука X+флуазаіндолізин; сполука X+тіоксазафен; сполука X+флупіримін; сполука X+мікоризні гриби; сполука X+Bradyrhizobium japonicum TA-11; сполука X+Bacillus firmus; сполука X+Bacillus firmus I-1582; сполука X+Bacillus amyloliquefaciens; сполука X+Bacillus amyloliquefaciens FZB42; сполука X+Pasteuria nishizawae; сполука X+Pasteuria nishizawae Pn1; сполука X+Pasteuria penetrans; сполука X+тебуконазол; сполука X+протіоконазол; сполука X+метконазол; сполука X+іпконазол; сполука X+тритиконазол; сполука X+дифеноконазол; сполука X+імазаліл; сполука X+триадименол; сполука X+тетраконазол; сполука X+флутриафол; сполука X+мандестробін; сполука X+азоксистробін; сполука X+піраклостробін; сполука X+трифлоксистробін; сполука X+флуоксастробін; сполука X+пікоксистробін; сполука X+фенамідон; сполука X+металаксил; сполука X+металаксил-M; сполука X+флудиоксоніл; сполука X+седаксан; сполука X+пенфлуфен; сполука X+флуксапіроксад; сполука X+бензовіндифлупір; сполука X+боскалід; сполука X+карбоксин; сполука X+пентіопірад; сполука X+флутоланіл; сполука X+каптан; сполука X+тирам; сполука X+толклофос-метил; сполука X+тіабендазол; сполука X+етабоксам; сполука X+манкозеб; сполука X+пікарбутразокс; сполука X+оксатіопипролін; сполука X+силтіофам; сполука X+інпірфлуксам.

2) Розбавлений розчин C містить комбінацію, вказану в переліку A, де концентрація пропонованої сполуки дорівнює 200 част./млн і концентрація пропонованого інгредієнта дорівнює 200 част./млн.

3) Розбавлений розчин C містить комбінацію, вказану в переліку A, де концентрація пропонованої сполуки X дорівнює 500 част./млн і концентрація пропонованого інгредієнта дорівнює 50 част./млн.

4) Розбавлений розчин C містить комбінацію, вказану в переліку A, де концентрація пропонованої сполуки X дорівнює 500 част./млн і концентрація пропонованого інгредієнта дорівнює 5 част./млн.

5) Розбавлений розчин C містить комбінацію, вказану в переліку A, де концентрація пропонованої сполуки X дорівнює 500 част./млн і концентрація пропонованого інгредієнта дорівнює 0,5 част./млн.

Промислове застосування

Пропонована сполука X (включаючи пропоновану сполуку) забезпечує ефективну боротьбу з членистоногими шкідниками.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

1. Сполука, представлена формулою (I):



, (I)

де

Q являє собою групу, представлену формулою Q1, або групу, представлену формулою Q2:



Q1

,



Q2

,

Z являє собою атом кисню,

комбінація A^1 і A^2 являє собою

комбінацію, в якій A^1 являє собою CR^{4a} і A^2 являє собою атом азоту або CR^{4b}; або

комбінацію, в якій A^1 являє собою атом азоту і A^2 являє собою атом азоту або CR^{4b},

комбінація B^1, B^2, B^3 і B^4 являє собою

комбінацію, в якій B^1 являє собою атом азоту або CR^{6a}, B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою атом азоту або CR^{6c} і B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d};

комбінацію, в якій B^1 являє собою атом азоту або CR^{6a}, B^2 являє собою атом азоту або CR^{6b}, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою атом азоту або CR^{6d};

комбінацію, в якій B^1 являє собою атом азоту або CR^{6a}, B^2 являє собою атом азоту або CR^{6b}, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою CR^1;

комбінацію, в якій B^1 являє собою атом азоту або CR^{6a}, B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою атом азоту і B^4 являє собою CR^1; або

комбінацію, в якій B^1 являє собою CR^{6a}, B^2 являє собою атом азоту, B^3 являє собою атом азоту і B^4 являє собою CR^1,

R^1 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8, атом галогену або $OS(O)_2R^8$,

m дорівнює 0, 1 або 2,

R^8 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; або C3-C4-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену,

R^{4a}, R^{4b}, R^{6a}, R^{6b}, R^{6c} і R^{6d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, NR^9R^{10}, $C(O)R^7$, $C(O)NR^{19}R^{20}$, $NR^9C(O)R^{18}$, $NR^9C(O)OR^{18}$, $NR^9C(O)NR^{19}R^{20}$, ціаногрупу, атом галогену або атом водню,

R^9 і R^{19} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, або атом водню,

R^{10} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи F, C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи J, C3-C7-циклоалкенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи J, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, 6-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, атом водню або $S(O)_2R^{21}$,

R^{21} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, або фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D,

R^7, R^{18} і R^{20} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи F, C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи J, або атом водню,

n дорівнює 0, 1 або 2,

R^2 являє собою етильну групу,

G^2 являє собою CR^{3b},
G^3 являє собою CR^{3c},
комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d};
R^{3a} являє собою атом водню,
R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6-алкільну групу, C2-C6-алкенільну групу, C3-C7-циклоалкільну групу, де кожна C1-C6-алкільна група, C2-C6-алкенільна група та C3-C7-циклоалкільна група може необов'язково містити один або більше замісників, вибраних з групи, яка складається з атома галогену і ціаногрупи, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідильну групу, де кожна фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідильна група може необов'язково містити один або більше замісників, вибраних групи J, OR^{12}, $NR^{11}C(O)OR^{14}$, атом водню або атом галогену,
R^{11} являє собою атом водню,
R^{12} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи F, C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи J, C3-C7-циклоалкенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи J, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, 6-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, атом водню або $S(O)_2R^{23}$,
R^{23} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, або фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D,
R^{14} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену,
якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d}, об'єднані разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце, де бензольне кільце може необов'язково містити один або більше замісників, вибраних із групи, яка складається з C1-C6-алкільної групи, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, і атома галогену,
група D: група, яка включає C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C6-алкенілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C6-алкінілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкілсульфанільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкілсульфінільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкілсульфонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C6-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкілкарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбонілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, амінокарбонільну групу, C1-C6-алкіламінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбоніламіногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, (C2-C6-алкоксикарбоніл)(C1-C6-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,
група F: група, яка включає C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, 5- або 6-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,
група J: група, яка включає C1-C6-алкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, аміногрупу, ціаногрупу і атом галогену,

або її N-оксид.

2. Сполука за п. 1, де

комбінація A^1 і A^2 являє собою

комбінацію, в якій A^1 являє собою CR^{4a} і A^2 являє собою атом азоту або CR^{4b}; або

комбінацію, в якій A^1 являє собою атом азоту і A^2 являє собою CR^{4b},

R^1 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8 або $OS(O)_2R^8$,

або її N-оксид.

3. Сполука за п. 1 або 2 або її N-оксид, де

R^{3d} являє собою атом галогену, R^{3b} і R^{3c} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6-алкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, циклопропільну групу, атом водню або атом галогену і якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d} разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, можуть утворювати бензольне кільце (бензольне кільце необов'язково може містити один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає C1-C6-алкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, і атом галогену).

4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 або її N-оксид, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1.

5. Сполука за п. 1 або 2 або її N-оксид, де Q являє собою групу, представлену формулою Q1 і R^{3d} являє собою атом галогену.

6. Сполука за будь-яким з пп. 1-3 або її N-оксид, де Q являє собою групу, представлену формулою Q2.

7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6 або її N-оксид, де B^1 являє собою CH, комбінація B^2, B^3 і B^4 являє собою комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^1, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою CR^{6d}; комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою CR^1 і B^4 являє собою CR^{6d}; або комбінацію, в якій B^2 являє собою CR^{6b}, B^3 являє собою CR^{6c} і B^4 являє собою CR^1.

8. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, 5 або 6 або її N-оксид, де G^1 являє собою CH, G^2 являє собою CR^{3b}, G^3 являє собою CR^{3c} і G^4 являє собою CH.

9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8 або її N-оксид, де R^1 являє собою C1-C6-алкільну групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; атом галогену; або OR^8.

10. Сполука за будь-яким з пп. 1-8 або її N-оксид, де R^1 являє собою C1-C6-алкільну групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає атом галогену і ціаногрупу; циклопропільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; $S(O)_mR^8$; або OR^8.

11. Композиція для боротьби з членистоногими шкідниками, яка містить сполуку за будь-яким з пп. 1-10 або її N-оксид.

12. Композиція, яка містить один або більше інгредієнтів, вибраних з групи, яка включає групу (a), групу (b), групу (c) і групу (d) і сполуку за будь-яким з пп. 1-10 або її N-оксид:

група (a): група, яка включає інсектицидні інгредієнти, акарицидні інгредієнти і нематоцидні інгредієнти;

група (b): фунгіцидні інгредієнти,

група (c): інгредієнти, які модулюють ріст рослин; і

група (d): репелентні інгредієнти.

13. Спосіб боротьби з членистоногим шкідником, який включає нанесення ефективної кількості сполуки за будь-яким з пп. 1-10 або її N-оксиду, або ефективної кількості композиції за п. 12 на членистоногого шкідника або місце мешкання членистоногого шкідника.

14. Насіння або вегетативний репродуктивний орган, який містить ефективну кількість сполуки за будь-яким з пп. 1-10 або її N-оксиду, або ефективну кількість композиції за п. 12.

15. Сполука, представлена формулою (II):



, (II)

де
Q являє собою групу, представлену формулою Q1, або групу, представлену формулою Q2:



Q1



Q2

де
комбінація B^{2b}, B^{3c} і B^{4d} являє собою
комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою атом азоту або CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd};
комбінацію, в якій B^{2b} являє собою атом азоту або CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або
комбінацію, в якій B^{2b} являє собою атом азоту або CR^{6bb}, B^{3c} являє собою атом азоту або CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^1,
R^1 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8, атом галогену або $OS(O)_2R^8$,
m дорівнює 0, 1 або 2,
R^8 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; або C3-C4-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену,
R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, атом галогену або атом водню,
n дорівнює 0, 1 або 2,
R^2 являє собою етильну групу,
G^2 являє собою CR^{3b},
G^3 являє собою CR^{3c},
комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d};
R^{3a} являє собою атом водню,
R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6-алкільну групу, C2-C6-алкенільну групу, C3-C7-циклоалкільну групу, де кожна C1-C6-алкільна група, C2-C6-алкенільна група та C3-C7-циклоалкільна група може необов'язково містити один або більше замісників, вибраних з групи, яка складається з атома галогену і ціаногрупи, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідильну групу, де кожна фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідильна група може необов'язково містити один або більше замісників, вибраних групи J, OR^{12}, $NR^{11}C(O)OR^{14}$, атом водню або атом галогену,
R^{11} являє собою атом водню,
R^{12} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи F, C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи J, C3-C7-циклоалкенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи J, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, 6-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, атом водню або $S(O)_2R^{23}$,
R^{23} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, або фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D,

R^{14} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену,

якщо Q являє собою групу, представлену формулою Q1, R^{3b} і R^{3d}, об'єднані разом з двома атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють бензольне кільце, де бензольне кільце може необов'язково містити один або більше замісників, вибраних із групи, яка складається з C1-C6-алкільної групи, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, і атома галогену,

група D: група, яка включає C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C6-алкенілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C6-алкінілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкілсульфанільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкілсульфінільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкілсульфонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C6-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкілкарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбонілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, амінокарбонільну групу, C1-C6-алкіламінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбоніламіногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, (C2-C6-алкоксикарбоніл)(C1-C6-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,

група F: група, яка включає C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, 5- або 6-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,

група J: група, яка включає C1-C6-алкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, аміногрупу, ціаногрупу і атом галогену,

або її солі.

16. Сполука за п. 15 або її солі, де

R^1 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8, або $OS(O)_2R^8$.

17. Сполука, представлена формулою (III):



, (III)

де

R^{33} являє собою атом водню або атом галогену,

комбінація B^{2b}, B^{3c}и B^{4d} являє собою

комбінацію, в якій B^{2b} являє собою CR^1, B^{3c} являє собою атом азоту або CR^{6cc} і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd};

комбінацію, в якій B^{2b} являє собою атом азоту або CR^{6bb}, B^{3c} являє собою CR^1 і B^{4d} являє собою атом азоту або CR^{6dd}; або

комбінацію, в якій B^{2b} являє собою атом азоту або CR^{6bb}, B^{3c} являє собою атом азоту або CR^{6cc} і B^{4d} являє собою CR^1,

R^1 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8, атом галогену або $OS(O)_2R^8$,

m дорівнює 0, 1 або 2,

R^8 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену; або C3-C4-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену,

R^{4aa}, R^{6bb}, R^{6cc} і R^{6dd} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, атом галогену або атом водню,

G^2 являє собою CR^{3b},

G^3 являє собою CR^{3c},

комбінація G^1 і G^4 являє собою комбінацію, в якій G^1 являє собою CH і G^4 являє собою атом азоту або CR^{3d}; або комбінацію, в якій G^1 являє собою атом азоту і G^4 являє собою CR^{3d};

R^{3b}, R^{3c} і R^{3d} є однаковими або різними і кожен являє собою C1-C6-алкільну групу, C2-C6-алкенільну групу, C3-C7-циклоалкільну групу, де кожна C1-C6-алкільна група, C2-C6-алкенільна група та C3-C7-циклоалкільна група може необов'язково містити один або більше замісників, вибраних з групи, яка складається з атома галогену і ціаногрупи, фенільну групу, триазолільну групу, піридильну групу, піримідильну групу, де кожна фенільна група, триазолільна група, піридильна група і піримідильна група може необов'язково містити один або більше замісників, вибраних з групи J, OR^{12}, $NR^{11}C(O)OR^{14}$, атом водню або атом галогену,

R^{11} являє собою атом водню,

R^{12} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи F, C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи J, C3-C7-циклоалкенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи J, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, 6-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, атом водню або $S(O)_2R^{23}$,

R^{23} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, або фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D,

R^{14} являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену,

група D: група, яка включає C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C6-алкенілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C6-алкінілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкілсульфанільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкілсульфінільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкілсульфонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C3-C6-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкілкарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбонілоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, амінокарбонільну групу, C1-C6-алкіламінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)амінокарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбоніламіногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, (C2-C6-алкоксикарбоніл)(C1-C6-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,

група F: група, яка включає C3-C7-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, фенільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи D, 5- або 6-членну ароматичну гетероциклічну групу, яка необов'язково містить

один або більше замісників, вибраних з групи D, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкіламіногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ді(C1-C4-алкіл)аміногрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, ціаногрупу, аміногрупу, нітрогрупу, гідроксигрупу і атом галогену,

група J: група, яка включає C1-C6-алкільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C1-C6-алкоксигрупу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, C2-C6-алкоксикарбонільну групу, яка необов'язково містить один або більше атомів галогену, аміногрупу, ціаногрупу і атом галогену.

18. Сполука за п. 17, де R^1 являє собою C1-C6 ланцюгову вуглеводневу групу, яка містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, C3-C4-циклоалкільну групу, яка необов'язково містить один або більше замісників, вибраних з групи, яка включає ціаногрупу і атом галогену, $S(O)_mR^8$, OR^8 або $OS(O)_2R^8$.

Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська

ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ – 42, 01601