



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102133360 A

(43) 申请公布日 2011. 07. 27

(21) 申请号 201110044832. X

(22) 申请日 2011. 02. 21

(71) 申请人 蒋保珍

地址 252300 山东省聊城市阳谷县科学技术局

(72) 发明人 蒋保珍

(51) Int. Cl.

A61K 36/90 (2006. 01)

A61P 1/00 (2006. 01)

A61P 35/00 (2006. 01)

A61K 35/37 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗噎膈的内服药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗噎膈的内服药物及其制备方法,它是由下述中药原料组成的,三七、血竭、半枝莲、白花蛇舌草、猪苓、生山楂、鸡内金、菝葜、葵树子、大枣、甘草。制备方法是:先将三七、血竭共粉碎过 300 目筛,收瓶备用;然后将其它 9 味药共放砂锅内倒水过药 2 厘米高,用武火熬开,再用文火熬 30 分钟,把药水倒出,再按同样方法熬一遍,把两次熬的药水倒在一起进行浓缩,浓缩至膏时迅速将三七、血竭共粉碎的药粉倒入砂锅内并搅拌使之充分混合均匀,然后把药膏倒出放在烘干箱内,温度控制在 45-55℃ 烘干,再粉碎过 300 目筛,将药粉装胶囊,每粒胶囊装 0.3 克。本发明药物治疗噎膈病,效果明显,有效率 96%,治愈率 80%。

1. 一种治疗噎膈的内服药物,其特征在于:它是由下述重量份的中药原料组成的,三七 30、血竭 25、半枝莲 18、白花蛇舌草 18、猪苓 50、生山楂 100、鸡内金 20、菝葜 18、葵树子 18、大枣 60、甘草 15。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗噎膈的内服药物,其特征在于:它的制备方法是,先将三七 30、血竭 25 共粉碎过 300 目筛,收瓶备用,然后将半枝莲 18、白花蛇舌草 18、猪苓 50、生山楂 100、鸡内金 20、菝葜 18、葵树子 18、大枣 60、甘草 15,将以上 9 味药放在砂锅内,然后向砂锅内倒水过药 2 厘米浸泡 20 分钟,把水倒出,再向砂锅内倒水过药 2 厘米,用武火熬开,然后用文火熬 30 分钟,然后把药水倒出;再向砂锅内倒水过药 2 厘米,用武火熬开,然后用文火熬 30 分钟,然后把药水倒出,再把两次熬的药水倒在一起进行浓缩,将药水浓缩至膏时迅速将三七 30、血竭 25 共粉碎过 300 目筛的药粉倒入砂锅内并搅拌使之充分混合均匀,然后把药膏倒出放在烘干箱内烘干,温度控制在 45-55℃,再粉碎过 300 目筛,将药粉装胶囊,每粒胶囊装 0.3 克。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种治疗噎膈的内服药物,其特征在于:本发明药物按以上方法还可加工成片剂、散剂、蜜丸、水丸。

一种治疗噎膈的内服药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于纯中药技术领域,具体地说是一种治疗噎膈的内服药物及其制备方法。

背景技术

[0002] 噎膈一病是中医之病名,类似于现代医学的食道癌、胃癌、幽门梗阻,是一种消化道疾病。噎,指咽食物难下,膈,是指胸膈阻塞,吃食物咽不下,或咽下去又吐出来,统称噎膈。中医学认为,有因痰瘀者,有因血瘀者,有因胃气上冲者,有因喷门枯干者致食物难下而成噎膈者。西医用西药保守治疗和手术治疗,给人造成生命危险和经济上很大的负担。中医用医学心语《启膈散》治疗效果也不明显。

发明内容

[0003] 本发明的目的就在于提供一种治疗噎用后见效快,效果显著,廉价,药源易取纯中药药物。

[0004] 本发明的技术方案是这样实现的,一种治疗噎膈的内服药物,其特征在于:它是由下述重量份的中药原料制成的,三七30、血竭25、半枝莲18、白花蛇舌草18、猪苓50、生山楂100、鸡内金20、菝葜18、葵树子18、大枣60、甘草15。

[0005] 本发明药物的制备方法如下:先将三七30、血竭25共粉碎过300目筛,收瓶备用,然后将半枝莲18、白花蛇舌草18、猪苓50、生山楂100、鸡内金20、菝葜18、葵树子18、大枣60、甘草15。将以上9味药放在砂锅内,然后向砂锅内倒水过药2厘米浸泡20分钟,把水倒出,再向砂锅内倒水过药2厘米,用武火熬开,然后用文火熬30分钟,然后把水倒出,再砂锅内倒水过药2厘米,用武火熬开,然后用文火熬30分钟,然后把水倒出,再把两次熬的药水倒在一起进行浓缩,将药水浓缩至膏时迅速将三七30、血竭25共粉碎过300目筛的药粉倒入砂锅内并搅拌使之充分混合均匀,然后把药膏倒出放在烘干箱内(温度控制在45-55℃)烘干,再粉碎过300目筛,将药粉装胶囊,每粒胶囊装0.3克。

[0006] 本发明药物按以上方法还可加工成片剂、散剂、蜜丸、水丸。

[0007] 本发明药物具有清热解毒,活血祛瘀,消痈止痛,软坚散结,消食化积,渗湿利尿的功能。

[0008] 本发明药物适用噎膈症,包括食道癌、胃癌、幽门梗阻。

[0009] 主要症见:食难咽下,脘腹胀满,胃隐隐疼痛,消化不良,噯气,或食后吐出,口渴欲饮,小便黄,气短面白,面浮足肿,消瘦。

[0010] 服用方法:口服3次,每次服3粒,饭前服。

[0011] 治疗疗程:90天为一个疗程,轻者,1-2个疗程可治愈,重者,2-3个疗程可治愈。

[0012] 应用本发明药物治疗噎膈病,效果明显,无毒副作用,有效率96%,治愈率80%。

[0013] 本发明的药物机理如下:

[0014] 半枝莲:味苦,性微寒。具有清热解毒,利水消肿之功。本品为常用抗癌药,可用于

多种癌症的治疗,见(《中医方药学》813页,广东中医学院编,广东人民出版社出版。

[0015] 菝葜:味甘、淡,性微寒。具有清热解毒,祛风湿之功。本品多用于食道癌,如食道癌、胃癌、结肠癌等,(同上,见812页)

[0016] 葵树子:味甘、涩,性平。具有软坚散结之功。可用于多种癌症的治疗,(同上,见820页)

[0017] 白花蛇舌草:味甘、淡,,性微寒。具有清热解毒,清利湿热之功。(同上,见179页)

[0018] 三七:味甘、微苦,性温。入肝、胃经。具有祛瘀止血,消肿止痛之功(同上,见527页)

[0019] 血竭:味甘、咸。性平。入心、肝经。具有收敛止血,祛瘀止痛,敛疮生肌之功。(同上,见530-531页)

[0020] 猪苓:味甘、淡,性平。入肾、膀胱经。具有利尿渗湿之功。(同上,见305页)

[0021] 生山楂:味酸、甘,性温。入脾、胃、肝经。具有消食导滞,化瘀散结之功。(同上,见461页)

[0022] 鸡内金:味甘、涩,性平。入脾、胃、小肠、膀胱经。具有消食化积,止遗尿,化石通淋之功。(同上,见463-464页)

[0023] 大枣:味甘、性平。质润多液,入脾、胃经。具有补脾益胃,调和药性之功。(同上,见601-602页)

[0024] 甘草:味甘、性平。入脾、肺经。具有补脾益气,清热解毒,润肺止咳,调和药性,缓急止痛之功能。(同上,见602-603页)

[0025] 中医学认为,噎膈病起因多为情志不舒,气机不畅所致。气机不畅使肝气郁结,肝胃不和,往往出现脏腑器质性的并发症。中医讲,“忧伤脾,怒伤肝”。脾伤则气结,气结则津液不布,津液不布则聚集成痰;肝伤则气郁,气郁则血液运行不畅,血液运行不畅,则成瘀,痰瘀交阻于食道,则食不易进;交阻于胃易吐,腹胀,进食少则生化资源少,久聚胃腑必化火则出现灼热,大便燥结,甚至血管破裂流血。症见食难咽下,脘腹胀满,噎气,或食后吐出,口渴欲饮,小便黄,气短面白,面浮足肿,消瘦。治宜清热解毒,活血祛瘀,消痞止痛,消食化积,渗湿利水以达治噎膈病之事半功倍。

[0026] 本发明选用三七、血竭活血祛瘀,消肿止痛;半枝莲、白花蛇舌草、菝葜、葵树子清热解毒,软坚散结;生山楂、鸡内金消食化积;猪苓利尿渗湿;大枣、甘草化阴生津,调和诸药,诸药合成具有清热解毒,活血祛瘀,消痞止痛,消食化积,渗湿利水之功,能迅速治愈噎膈病。

具体实施方案

[0027] 下面结合实施例对本发明作进一步说明:

[0028] 实施例:取三七30、血竭25、半枝莲18、白花蛇舌草18、猪苓50、生山楂100、鸡内金20、菝葜18、葵树子18、大枣60、甘草15。

[0029] 本发明药物的治法如下:先将三七30、血竭25共粉碎过300目筛,收瓶备用,然后将半枝莲18、白花蛇舌草18、猪苓50、生山楂100、鸡内金20、菝葜18、葵树子18、大枣60、甘草15。将以上9味药放在砂锅内,然后向砂锅内倒水过药2厘米浸泡20分钟,把水倒出,再向砂锅内倒水过药2厘米,用武火熬开,然后用文火熬30分钟,然后把药水倒出;再

向砂锅内倒水过药 2 厘米,用武火熬开,然后用文火熬 30 分钟,然后把药水倒出;再把两次熬的药水倒在一起进行浓缩,将药水浓缩至膏时迅速将三七 30、血竭 25 共粉碎过 300 目筛的药粉倒入砂锅内并搅拌使之充分混合均匀,然后把药膏倒出放在烘干箱内(温度控制在 45-55℃)烘干,再粉碎过 300 目筛,将药粉装胶囊,每粒胶囊装 0.3 克。

[0030] 本发明药物按以上方法还可加工成片剂、散剂、蜜丸、水丸。

[0031] 本发明药物具有清热解毒,活血祛瘀,消痈止痛,软坚散结,消食化积,渗湿利水的功能。

[0032] 本发明药物适用噎膈症,包括食道癌、胃癌、幽门梗阻。

[0033] 主要症见:食难咽下,脘腹胀满,胃隐隐疼痛,消化不良,噎气,或食后吐出,口渴欲饮,小便黄,气短面白,面浮足肿,消瘦。

[0034] 服用方法:日服 3 次,每次服 3 粒,饭前服。

[0035] 治疗疗程:90 天为一个疗程,轻者,1-2 个疗程可治愈,重者,2-3 个疗程可治愈。

[0036] 应用本发明祖传秘方治疗噎膈病,效果明显,无毒副作用,有效率 96%,治愈率 80%。

[0037] 为表明本发明药物的疗效,将治疗的 200 例患者分为对照组和实验组,立档留查加以统计对比。对照组 100 例,其中 40 例食道癌,50 例胃癌,幽门梗阻 10 例,用《启膈散》治疗 1-3 个疗程,每天服 1 剂,晚饭后半小时服;实验组 100 例,其中 40 例食道癌,50 例胃癌,幽门梗阻 10 例,用本发明药物治疗 1-3 个疗程,按日服 3 次,每次服 3 粒,饭前服;皆以症状食难咽下,脘腹胀满,胃隐隐疼痛,消化不良,噎气,或食后吐出,口渴欲饮,小便黄,气短面白,面浮足肿,消瘦减轻为有效;症状食难咽下,脘腹胀满,噎气,或食后吐出,口渴欲饮,小便黄,气短面白,面浮足肿,消瘦消失为痊愈,统计表明结果如下:

[0038] 表 1:对照组疗效情况

[0039]

标准 疗效率	有 效		见效时间	痊 愈		治愈时间
	人数	百分比		人数	百分比	
100	50	50%	20—30 天	30	30%	90—270 天

[0040] 表 2、实验组疗效情况

[0041]

标准 疗效率	有 效		见效时间	痊 愈		治愈时间
	人数	百分比		人数	百分比	
100	96	96%	10—15 天	80	80%	60—180 天

[0042] 为表明疗效举例说明:

[0043] 例 1、吴 X, 现年 61 岁, 阳谷县西湖人, 2006 年来所就诊, 5 年前患病, 经聊城市人民医院诊断为幽门梗阻, 症见:噎气, 呃逆, 食后吐出, 腹胀如鼓, 苔腻, 脉细。临床诊断为幽门

梗阻,取本发明药物按日服 3 次,每次服 3 粒,饭前服,服 90 天,症状全部消失,随访至今没有复发。

[0044] 例 2、杨 X,男,现年 69 岁,阳谷县寿张镇人,2007 来所就诊,3 年前,患胃病,胃脘胀痛,消化不良,进食后疼痛加重,呕吐带血,经聊城市人民医院 B 超检查,诊断为胃溃疡、胃癌,症见:噯气,胃部拒按疼痛,消瘦,气短面白,苔腻,脉细。咐停服一切药物,服本发明药物,按日服 3 次,每次服 3 粒,饭前服,服 180 天,症状全部消失,随访至今没有复发。