



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104547736 A

(43) 申请公布日 2015. 04. 29

(21) 申请号 201410818851. 7

(22) 申请日 2014. 12. 25

(71) 申请人 张祯

地址 276200 山东省临沂市蒙阴县蒙山路
48 号 1 号楼 2 单元 601 室

(72) 发明人 张祯 姜兆明

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 贾波

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994(2006. 01)

A61P 5/14(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗甲状腺肿的药物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗甲状腺肿的药物,属于中医药技术领域。本发明的药物是根据中医基础理论、中药现代药理研究、长期临床应用调整后制订的,诸药配伍合理,具有软坚散结、活血化瘀等功效,对甲状腺肿患者治疗彻底,疗效好,无毒副作用,患者康复快,不易复发,而且治疗周期短,费用低,所选用中药原料药源丰富,便于推广应用。

1. 一种治疗甲状腺肿的药物,其特征在于,它是由以下重量份的原料药组成:叶下红 10-20 份、柴胡 20-30 份、黄芪 15-20 份、夏枯草 10-20 份、川穹 20-30 份、当归 20-25 份、牡丹皮 10-20 份、川楝子 20-30 份、薏苡仁 10-15 份、川楝子 5-10 份、地榆 8-15 份、制香附 20-30 份、枳壳 8-16 份、生牡蛎 25-30 份、皂角刺 15-25 份、浙贝母 10-20 份、王不留行 15-25 份、桑寄生 8-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其特征在于,它是由以下重量份的原料药组成:叶下红 15 份、柴胡 25 份、黄芪 18 份、夏枯草 15 份、川穹 25 份、当归 22 份、牡丹皮 15 份、川楝子 25 份、薏苡仁 12 份、川楝子 8 份、地榆 10 份、制香附 25 份、枳壳 10 份、生牡蛎 28 份、皂角刺 20 份、浙贝母 15 份、王不留行 22 份、桑寄生 12 份。

一种治疗甲状腺肿的药物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种纯中草药制备的药物,具体的说是一种治疗甲状腺肿的药物,属于中医药技术领域。

背景技术

[0002] 甲状腺肿是临床常见病,多发于中青年女性。甲状腺肿大症状早期仅颈前区出现硬性无痛性肿块,表面不平,肿块增长速度迅速,吞咽时上下移动度不大。继而,出现颈淋巴结转移;并可出现压迫症状,如呼吸不畅、吞咽阻噎、声音嘶哑;后期严重者可能造成甲状腺囊肿挤压气管、食管和挤压支配声带活动的喉返神经或甲状腺挤入胸内,就可能出现气管被推压向另一侧,造成气管弯曲和狭窄引起呼吸困难,进食咽东西困难,说话声音嘶哑,挤压胸内大血管等,严重威胁人们的身体健康。虽然甲状腺肿是一种高发疾病,但多数患者未及时接受有效治疗,以至于影响患者的正常生活和工作,重者甚至危及到生命安全。目前对于甲状腺肿的治疗一般采用外科手术疗法,但传统甲状腺切除手术虽然见效较快,但会在患者颈部留下较大的手术瘢痕,会造成甲状腺功能的部分衰退,且手术费用高昂,给患者带来较大的经济负担。而在药物治疗方面,临床上一般选用碘制剂与甲状腺素片等药物来进行治疗,但治疗效果不理想,副作用大,疗程长。

发明内容

[0003] 为克服现有技术中存在的问题,本发明提供了一种治疗甲状腺肿的药物。该药物配方合理,疗效好,疗程短,成本低,安全无副作用。

[0004] 本发明采用以下技术方案:

一种治疗甲状腺肿的药物,其特征在于,它是由以下重量份的原料药组成:叶下红 10-20 份、柴胡 20-30 份、黄芪 15-20 份、夏枯草 10-20 份、川穹 20-30 份、当归 20-25 份、牡丹皮 10-20 份、川楝子 20-30 份、薏苡仁 10-15 份、川楝子 5-10 份、地榆 8-15 份、制香附 20-30 份、枳壳 8-16 份、生牡蛎 25-30 份、皂角刺 15-25 份、浙贝母 10-20 份、王不留行 15-25 份、桑寄生 8-15 份。

[0005] 作为本发明药物的一种优选,它是由以下重量份的原料药组成:叶下红 15 份、柴胡 25 份、黄芪 18 份、夏枯草 15 份、川穹 25 份、当归 22 份、牡丹皮 15 份、川楝子 25 份、薏苡仁 12 份、川楝子 8 份、地榆 10 份、制香附 25 份、枳壳 10 份、生牡蛎 28 份、皂角刺 20 份、浙贝母 15 份、王不留行 22 份、桑寄生 12 份。

[0006] 上述药物的制备方法为:

(1) 按照配方量称取上述原料药,加入 8 倍重量的冷水浸泡 1-2 小时后开火煎煮,先以武火烧至沸腾后再文火煎煮 30 分钟,过滤得一次滤液;

(2) 向滤渣中继续加水 600ml 煎煮至沸腾后 35 分钟,过滤得二次滤液;

(3) 将一、二次滤液合并加热浓缩至 300ml 即可。

[0007] 本发明药物的用法与用量:水煎口服,一日一剂,一日两次,早晚饭后 1 小时各服

用 150ml。10 天为疗程，一般 1-3 疗程即可治愈，重症患者需 3-5 个疗程可治愈。

[0008] 本发明配方的药理作用如下：

叶下红：苦、涩，凉；入肝、脾、肺三经；具有通经活血、清热燥湿、化积消食的功效。柴胡：苦、平；归肝、胆经；具有发表、退热、疏肝、解郁、升阳之功效。黄芪：甘，微温；归肺、脾、肝、肾经，具有补气固表、托毒排脓、利尿、生肌之功效。夏枯草：性寒，味苦、辛；归肝、胆经；具有清火明目，散结消肿的功效。川穹：辛、温；归肝、胆、心包经；具有活血行气、祛风止痛之功效。当归：甘、辛、温；归肝、心、脾经；具有补血、活血、调经止痛、润燥滑肠的功效。牡丹皮：苦、辛，微寒；归心、肝、肾经；具有清热凉血、活血化淤、退虚热等功效。川楝子：苦、寒；归肝、胃、小肠经；具有疏肝、行气止痛的功效。薏苡仁：甘淡、微寒；归脾、胃、肺经；具有利水消肿、健脾去湿、舒筋除痹、清热排脓等功效。川楝子：苦，寒；归肝、小肠、膀胱经；具有除湿热，清肝火，止痛，杀虫的功效。地榆：苦、酸，微寒；归肝、胃、大肠经；具有凉血止血，解毒敛疮的功效。制香附：味辛、微苦、甘，性平；入肝、脾、三焦经；具有疏肝理气，调经止痛的功效。枳壳：味苦、酸，性微寒；归脾、胃、大肠经；具有破气消积、化痰、除痞的功效。生牡蛎：咸，微寒；归肝、胆、肾经；具有滋阴、养血、补五脏、活血、充肌等功效。皂角刺：辛，温；归肝、胃经；具有消肿托毒，排脓，杀虫的功效。浙贝母：味苦，性寒；归肺、心经；具有宣肺清热，化痰止咳，开郁散结的功效。王不留行：味苦，性平；归肝、胃经；具有活血通经，不乳消痈。桑寄生：味苦、甘，性平；归肝、肾经；具有补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎的功效。本发明的药物是根据中医基础理论、中药现代药理研究、长期临床应用调整后制订的，诸药配伍合理，其疗效显著，治愈率高。

[0009] 本发明的有益效果是：本发明药物具有软坚散结、活血化瘀等功效，对甲状腺肿患者治疗彻底，疗效好，无毒副作用，患者康复快，不易复发，而且治疗周期短，费用低，所选中药原料药源丰富，便于推广应用。

具体实施方式

[0010] 下面结合具体实施例对本发明做进一步的详细说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗甲状腺肿的药物，它是由以下重量的原料药组成：叶下红 10g、柴胡 20g、黄芪 15g、夏枯草 10g、川穹 20g、当归 20g、牡丹皮 10g、川楝子 20g、薏苡仁 10g、川楝子 5g、地榆 8g、制香附 20g、枳壳 8g、生牡蛎 25g、皂角刺 15g、浙贝母 10g、王不留行 15g、桑寄生 8g。

[0012] 上述药物的制备方法如下：

(1) 按照配方量称取上述原料药，加入 8 倍重量的冷水浸泡 1-2 小时后开火煎煮，先以武火烧至沸腾后再文火煎煮 30 分钟，过滤得一次滤液；

(2) 向滤渣中继续加水 600ml 煎煮至沸腾后 35 分钟，过滤得二次滤汁；

(3) 将一、二次滤汁合并加热浓缩至 300ml 即可。

[0013] 实施例 2

一种治疗甲状腺肿的药物，它是由以下重量的原料药组成：叶下红 15g、柴胡 25g、黄芪 18g、夏枯草 15g、川穹 25g、当归 22g、牡丹皮 15g、川楝子 25g、薏苡仁 12g、川楝子 8g、地榆 10g、制香附 25g、枳壳 10g、生牡蛎 28g、皂角刺 20g、浙贝母 15g、王不留行 22g、桑寄生 12g。

[0014] 上述药物的制备方法同实施例 1。

[0015] 实施例 3

一种治疗甲状腺肿的药物,它是由以下重量的原料药组成:叶下红 20g、柴胡 30g、黄芪 20g、夏枯草 20g、川穹 30g、当归 25g、牡丹皮 20g、川楝子 30g、薏苡仁 15g、川楝子 10g、地榆 15g、制香附 30g、枳壳 16g、生牡蛎 30g、皂角刺 25g、浙贝母 20g、王不留行 25g、桑寄生 15g。

[0016] 上述药物的制备方法同实施例 1。

[0017] 临床试验例

1、临床资料:随机收治门诊甲状腺肿患者 180 例,其中男 63 例,女 117 例,平均年龄 38 岁。

[0018] 2、诊断标准:依据西医甲状腺肿的诊断标准进行诊断。

[0019] 3、治疗方法:选择实施例 2 制得的药物,水煎口服,一日一剂,一日两次,早晚饭后 1 小时各服用 150ml。10 天为疗程,一般 1-3 疗程即可治愈,重症患者需 3-5 个疗程可治愈。

[0020] 4、疗效判定标准:

治愈:临床症状消失,甲状腺大小正常,一年内未见复发。

[0021] 显效:临床症状消失,甲状腺肿块明显减小。

[0022] 无效:甲状腺肿块未见明显变化。

[0023] 5、治疗结果见下表。

	病例数	治愈 n (%)	显效 n (%)	无效 n (%)	总有效率 n (%)
治疗组	180	169 (93.9)	10 (5.5)	1 (0.6)	179 (99.4)

[0024] 6、临床典型病例

病例 1:黄某某,女,35 岁,颈部疼痛 2 个月,B 超检查见左侧甲状腺肿块为 2.1 厘米 × 2.3 厘米大小,后服用本发明的药物一个疗程后,肿块明显减小至 1.7 厘米 × 1.8 厘米,后继续服用本发明药物两个疗程后肿块全部消失,患者生活恢复正常。随访 2 年内未复发。

[0025] 病例 2:孙某,男,42 岁,颈部疼痛 2 个月,经检查确诊为右侧甲状腺肿,B 超检查见右侧甲状腺肿块 2.1 厘米 × 2.6 厘米大小,边界清楚,按之有囊性感觉。后服用本发明的药物服用三个疗程以后,症状基本消失,后继续服用一周巩固,随访 1 年未复发。

[0026] 病例 3:蔡某某,女,38 岁,经检查确诊为左侧甲状腺囊肿,因不愿意手术来我院要求中药治疗。经检查发现左侧甲状腺部位有 2 厘米 × 2 厘米大小肿物,边界清楚,局部有压痛,随吞咽上下活动。服用本发明药物两个疗程后,肿物明显缩小,继续服用两个疗程后,肿块消失,随访 2 年未复发。

[0027] 病例 4:李某,女,28 岁,5 个月前发现左颈部肿物,疼痛,B 超检查可见左侧颈部大小为 2.1 厘米 × 4 厘米的肿块,部分边界欠清,病灶呈环形轻度强化,双侧颈部可见多发大小不等的肿大淋巴结。后经服用本发明药物一个疗程后,肿块明显减小,后继续服用两个疗程后,临床症状全部消失。