(19) REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

(10) Identifikator dokumenta:

HR P20231448 T1

HR P20231448 T1

(12) PRIJEVOD PATENTNIH ZAHTJEVA EUROPSKOG PATENTA

(51) MKP:
A61K 31/519 (2006.01)
A61K 9/06 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 17/04 (2006.01)
A61P 43/00 (2006.01)

(46) Datum objave prijevoda patentnih zahtjeva: 01.03.2024.

(21) Broj predmeta: P20231448T

(22) Datum podnošenja : 20.01.2017.

(86) Broj međunarodne prijave: PCT/EP2017051133
Datum podnošenja međunarodne prijave: 20.01.2017.

(96) Broj europske prijave patenta: EP 17701828.0
Datum podnošenja europske prijave patenta: 20.01.2017.

(87) Broj međunarodne objave: WO 2017125523
Datum međunarodne objave: 27.07.2017.

(97) Broj objave europske prijave patenta: EP 3405197 A1
Datum objave europske prijave patenta: 28.11.2018.

(97) Broj objave europskog patenta: EP 3405197 B1
Datum objave europskog patenta: 06.09.2023.

(31) Broj prve prijave: 16152215 (32) Datum podnošenja prve prijave: 21.01.2016. (33) Država ili organizacija podnošenja prve prijave: EP

(73) Nositelj patenta: **LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK**
(72) Izumitelji: **Tero Wennberg, LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK**
Anders Per Sørensen, Bøgehaven 122, 3500 Værløse, DK


(74) Zastupnik: PRODUCTA d.o.o., 10000 Zagreb, HR

(54) Naziv izuma: **PRIMJENA DELGOCITINIBA ZA LIJEČENJE KRONIČNOG EKCEMA RUKU**

HR P20231448 T1

PATENTNI ZAHTJEVI

1. Spoj opće formule (I)



(I) ,

3-[(3S,4R)-3-metil-6-(7H-pirolo[2,3d]pirimidin-4-il)-1,6-diazaspiro[3,4]oktan-1-il]-3-oksopropannitril, ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol za upotrebu u liječenju kroničnog ekcema ruku, pri čemu se spoj formule (I), ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol, primjenjuje primjenom dva puta dnevno i pri čemu je liječenje lokalno liječenje.

2. Spoj za upotrebu prema zahtjevu 1, naznačen time što se spoj formule (I) ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol primjenjuje u obliku masti.
3. Spoj za upotrebu prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, naznačen time što se spoj formule (I), ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol, primjenjuje u koncentraciji od 30 mg/g.
4. Spoj za upotrebu prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva 1-2, naznačen time što se spoj formule (I) ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol primjenjuje u farmaceutskom pripravku u koncentraciji od 2,00 tež.% cjelokupnog farmaceutskog pripravka.
5. Spoj za upotrebu u skladu s bilo kojim od prethodnih zahtjeva, naznačen time što se spoj formule (I) ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol primjenjuje dva puta dnevno tijekom 8 tjedana.
6. Spoj za upotrebu prema bilo kojem od prethodnih zahtjeva, naznačen time što se spoj formule (I), ili njegova farmaceutski prihvatljiva sol, primjenjuje u količini od 1,7 mg/cm^2.