

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2021 年 9 月 16 日 (16.09.2021)



(10) 国际公布号
WO 2021/180237 A1

(51) 国际专利分类号:
A61K 48/00 (2006.01) *A61P 11/00* (2006.01)
A61K 9/127 (2006.01) *C12N 5/0775* (2010.01)
A61K 9/00 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2021/080869

(22) 国际申请日: 2021 年 3 月 15 日 (15.03.2021)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202010177541.7 2020年3月13日 (13.03.2020) CN

(71) 申请人: 西比曼生物科技(上海)有限公司
(CELLULAR BIOMEDICINE GROUP (SHANGHAI)
LTD.) [CN/CN]; 中国上海市徐汇区桂平路333号1
号楼6楼, Shanghai 200233 (CN)。 西比曼生物科
技(无锡)有限公司(CELLULAR BIOMEDICINE
GROUP (WUXI) LTD.) [CN/CN]; 中国江苏省无
锡市无锡惠山经济开发区惠山大道 1699
号1103室, Jiangsu 214174 (CN)。

(72) 发明人: 戴成祥(DAI, Chengxiang); 中国上海市
徐汇区桂平路333号1号楼6楼, Shanghai 200233
(CN)。 李萍(LI, Ping); 中国上海市徐汇区桂平
路333号1号楼6楼, Shanghai 200233 (CN)。 王
静(WANG, Jing); 中国上海市徐汇区桂平路333
号1号楼6楼, Shanghai 200233 (CN)。 李苏克(LI,
Suke); 中国上海市徐汇区桂平路333号1号楼6楼,

Shanghai 200233 (CN)。 雷继刚(LEI, Jigang); 中
国上海市徐汇区桂平路333号1号楼6楼, Shanghai
200233 (CN)。 陈应炉(CHEN, Yinglu); 中国上
海市徐汇区桂平路333号1号楼6楼, Shanghai
200233 (CN)。 宋晓乐(SONG, Xiaole); 中国上海
市徐汇区桂平路333号1号楼6楼, Shanghai 200233
(CN)。 刘必佐(LIU, Bizuo); 中国上海市徐汇区桂
平路333号1号楼6楼, Shanghai 200233 (CN)。

(74) 代理人: 上海一平知识产权代理有限公司
(XU & PARTNERS, LLC.); 中国上海市普陀
区真北路958号天地科技广场1号楼106
室, Shanghai 200333 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家
保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG,
BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU,
CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT,
JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,

(54) Title: ATOMIZED INHALATION FORMULATION CONTAINING HUMAN CELL-DERIVED EXTRACELLULAR VESICLES, PREPARATION METHOD AND USE THEREOF

(54) 发明名称: 含人体细胞衍生的细胞膜外囊泡的雾化吸入制剂、制法及其应用

(57) Abstract: A pharmaceutical composition for treating diseases related to inflammation or injury such as ARDS, comprising: (a) an active material derived from human somatic cells, the active ingredient being an extracellular vesicle produced by human somatic cells; and (b) a pharmaceutically acceptable carrier. The somatic cells are selected from human tissue, bone marrow and/or blood-derived stem cells, etc. The dosage form of the pharmaceutical composition is selected from an atomized inhalation agent, eye drops and nasal drops. The pharmaceutical composition has storage stability and high dispersibility superior to those of a living cell formulation. A method for preparing an extracellular vesicle, comprising steps of culturing human somatic cells, removing cells from a culture system, mixing a culture solution with polyethylene glycol to form an extracellular vesicle modified by PEG, centrifuging, resuspending, etc. The formulation of the extracellular vesicle can be used for preparing a medicament for preventing and/or treating inflammations or injuries.

(57) 摘要: 一种可用于治疗ARDS等炎症或损伤相关的疾病的药物组合物, 它含有 (a) 人的体细胞衍生的活性物质, 所述活性成分为人的体细胞产生的细胞膜外囊泡; 和 (b) 药学上可接受的载体, 所述体细胞选自人体组织、骨髓和/或血液来源的干细胞等, 所述药物组合物的剂型选自雾化吸入剂、滴眼剂、滴鼻剂, 所述药物组合物具有优于活细胞制剂的保存稳定性和高分散性。一种制备细胞膜外囊泡的方法, 包括培养人的体细胞、从培养体系中去除细胞、将培养液与聚乙二醇混合形成经PEG修饰的细胞膜外囊泡、离心、重悬等步骤。所述细胞膜外囊泡制剂可用于制备预防和/或治疗炎症、或损伤的药物。

AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布：

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

含人体细胞衍生的细胞膜外囊泡的雾化吸入制剂、制法及其应用

技术领域

5 本发明涉及生物医药领域，具体地涉及含人体细胞衍生的细胞膜外囊泡的雾化吸入制剂、制法及其应用。

背景技术

10 急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)是危重病人呼吸衰竭的常见原因，其定义为急性发作的非心源性肺水肿、低氧血症和需要机械通气。

ARDS 最常见于肺炎、败血症、胃内容物误吸或严重创伤，约占全世界重症监护病房患者的 10%。尽管在过去的几十年里取得了一些进步，但在大多数研究中，死亡率仍然高达 30-40%。在美国每年总计约 20 万例 ARDS，医院死亡率高达 38.5%，而且在过去的几十年里，这种状况并没有明显的改善。

15 急性肺损伤(acute lung injury, ALI)和 ARDS 具有性质相同的病理改变，最常见的是弥漫性肺泡损伤。ALI / ARDS 的病理基础是由多种炎症细胞(巨噬细胞、嗜中性粒细胞和淋巴细胞等)介导的肺局部炎症反应和炎症反应失控所致的肺泡上皮和肺泡毛细血管内皮损伤。其主要病理特征为由肺微血管通透性增高而导致的肺泡渗出液中富含蛋白质的肺水肿及透明膜形成，可伴有肺间质纤维化。病理生理改变以肺顺应性降低，肺内分流增加及通气血流比例失衡为主。临床表现为呼吸频数和呼吸窘迫、顽固性低氧血症，胸部 X 线显示双肺弥漫性浸润影，后期常并发多器官功能衰竭。

20 ARDS 的诊断是基于专家共识的临床诊断标准。患者管理的重点是实施肺保护通气策略。目前还没有确定具体的药物疗法。ARDS 存活患者的长期预后越来越被认为是重要的研究目标，因为许多 ARDS 患者存活下来后，器官功能和/或认知心理等后遗症仍在继续。未来的研究方向包括促进 ARDS 的早期识别，在临床研究中增加预后和/或预测功能，以识别可能具有治疗效果的亚群，以及继续努力了解肺损伤的基本机制。

30 现有的用于治疗急性呼吸窘迫综合征的方法旨在调节炎症或炎症级联效应的治疗方法，已被用于治疗 ARDS 的研究。然而，目前抗炎治疗药物如皮质类固醇、中性粒细胞弹性蛋白酶抑制剂、粒细胞集落刺激因子、他汀类药物和 ω -3 脂肪酸，以及针对改善肺呼吸力学的表面活性剂如吸入 β 受体激动剂和一氧化氮等，都未能显示降低死亡率的收益。只有减少机械通气过程中压力性肺损伤(气压性创伤)的支持性治疗，如使用神经肌肉阻滞剂的肺保护性通气或俯卧位通气，才显示出死亡率的改善，因此这些治疗仍然是 ARDS 治疗的主要手段。截止目前，ARDS 现有的治疗方法，既不能降低死亡率，也不能降低存活患者的肺纤维化等器官功能损害以及神经精神等方面的后遗症。

2019 年底和 2020 年，在中国和世界各地爆发新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染性肺炎，引起重症肺炎和急性呼吸窘迫综合征(ARDS)等。针对 SARS-CoV-2 等冠状病毒导致的重症肺炎和 ARDS，目前尚无特效的疫苗和抗病毒药物治疗。这些感染性疾病严重影响了人类的生命健康，研发效果好的治疗药物迫在眉睫。针对 SARS-CoV-2 等冠状病毒引起的肺炎和 ARDS 等疾病开发出低毒高效的药物，以满足国内外患者的临床需求，具有重大的社会意义。

综上所述，本领域迫切需要开发高效、低毒、安全和可大规模生产的治疗 ARDS 等疾病的药物。

发明内容

本发明的目的是提供一种高效、低毒、安全和可大规模生产的治疗 ARDS 等疾病的药物。

在本发明的第一方面，提供了一种药物组合物，所述的药物组合物含有(a) 人的体细胞衍生的活性物质，所述的活性物质为人的体细胞所产生的细胞膜外囊泡；和(b) 药学上可接受的载体。

在另一优选例中，所述的药物组合物是无细胞的药物组合物。

在另一优选例中，所述的“无细胞”指所述的药物组合物不含有活细胞和死细胞。

在另一优选例中，所述的体细胞选自下组：人体组织、骨髓和/或血液来源的干细胞、祖细胞、免疫细胞、或其组合。

在另一优选例中，所述的药物组合物的剂型选自下组：液态剂型、固态剂型(如冻干剂型)。

在另一优选例中，所述的药物组合物的剂型选自下组：雾化吸入剂、滴眼液、滴鼻液。

在另一优选例中，所述的药物组合物具有以下特性：

(P1) 优于活细胞制剂的保存稳定性；优选地，所述的保存包括在常温和/或低温下(如-196℃至 25℃，较佳地-100℃至 0℃)进行保存；所述的“优于活细胞制剂的保存稳定性”指所述的药物组合物的稳定性优于相同条件下含活细胞制剂的稳定性；和

(P2) 高分散性；较佳地，当所述药物组合物为含水的液态制剂时(如以生理盐水配制的溶液时)，在 0-25℃放置 6-24 小时，呈现无色透明，且无肉眼可见的絮状物和沉淀物。

在另一优选例中，所述的药物组合物被施用于除了皮肤之外的部位。

在另一优选例中，所述的药物组合物被施用于选自下组的部位：眼球结膜、眼睑结膜、视网膜、口腔、鼻腔、上呼吸道、下呼吸道、胃肠道、肺部、或其组合。

在另一优选例中，所述的药物组合物被施用于选自下组的细胞：血管内皮细胞、

肺泡 1 型上皮细胞、肺泡 2 型上皮细胞、单核巨噬细胞、中性粒细胞、树突状细胞、抗原递呈细胞、T 淋巴细胞、纤维母细胞、中枢神经细胞、周围神经细胞及其末梢神经纤维、或其组合。

5 在另一优选例中，所述的干(祖)细胞选自下组：人体脂肪组织来源的间充质干细胞、人体肺组织来源的肺泡上皮祖细胞、人体脐带华通氏胶来源的间充质干细胞、人体子宫内膜组织来源的间充质干细胞、人体胎盘组织来源的干细胞、人体胎盘羊膜来源的上皮细胞、人体血液中的单个核细胞、人体骨髓组织中的造血干细胞、人体骨髓组织中的间充质干细胞、人体骨膜来源的间充质干细胞、人体皮肤组织来源的角质细胞、人体血液组织来源的树突状细胞、人体血液组织来源的 CD4 阳性 T 淋巴细胞、人
10 体血液组织来源的血小板、或其组合。

在另一优选例中，所述的细胞膜外囊泡包括由脂质双分子层膜结构包绕形成的纳米囊泡。

在另一优选例中，所述的纳米囊泡的直径在 30-1000 纳米之间。

15 在另一优选例中，所述的纳米囊泡内含有不同种类的、具有特定功能的微小核糖核酸(miRNA)、小核糖核酸(sRNA)、非编码的 DNA 片段、转运核糖核酸(t-RNA)、可溶性细胞因子、生长因子、和其他蛋白质。

在另一优选例中，所述的可溶性活性细胞因子选自下组：可溶性的游离的脂蛋白质分子、糖蛋白分子、生物信号分子、组织生长因子 β (TGF β)、肝细胞生长因子(HGF)、血管内皮细胞生长因子(VEGF)、表皮细胞生长因子(KGF)、白细胞介素-10(IL-10)、
20 白细胞介素-1 β 受体拮抗剂(IL-1 β A)、或其组合。

在另一优选例中，所述的可溶性活性细胞因子是所述的人的体细胞所产生的可溶性活性细胞因子。

在另一优选例中，所述的可溶性活性细胞因子包括自然状态下培养的人的体细胞旁分泌所产生的活性细胞因子、用外源基因修饰的人的体细胞所表达产生的活性细胞
25 因子、或其组合。

在另一优选例中，所述的细胞膜外囊泡特异性表达以下蛋白： CD9、CD63、CD81 和 TSG101；不表达或基本不表达蛋白 CANX。

在另一优选例中，所述的细胞膜外囊泡的直径优选为 50-500nm。

在另一优选例中，所述的直径为平均直径。

30 在另一优选例中，用于生产所述细胞膜外囊泡的细胞包括以下来源的细胞：

(a) 从人体组织直接分离纯化所获得的细胞；

(b) 从人体组织直接分离纯化后，再经过 GMP 实验室最小程度的操作，使这些细胞增殖后所获得的细胞；

35 (c) 在 GMP 实验室经过特定基因修饰、特定基因编辑、特定基因转导、特定微小核糖核酸 miRNA 的导入所获得的细胞；

(d) 在 GMP 实验室经过特殊培养条件的预处理所获得的细胞。

在另一优选例中,所述的用于生产所述细胞膜外囊泡的细胞包括原代细胞、传代次数为 1-10 次的传代细胞。

5 在另一优选例中,所述的用于生产所述细胞膜外囊泡的细胞包括未经基因操作的细胞、经基因操作的细胞。

在另一优选例中,所述的基因操作包括基因编辑、基因导入、基因下调(knock-down)、基因敲除(knock-out)、或其组合。

在另一优选例中,所述的用于生产所述细胞膜外囊泡的细胞是经预处理的细胞。

10 在另一优选例中,所述的体细胞为脂肪来源的间充质干(祖)细胞、胎盘羊膜来源的间充质干细胞、或其组合。

在另一优选例中,所述的脂肪来源的间充质干(祖)细胞是通过以下方式获得的:对于经过伦理审查备案的、签署知情同意书的、经过严格实验室检查符合脂肪干(祖)细胞产品建库入组标准的男性或女性健康志愿者,经过腹壁皮肤穿刺抽脂、或腹壁手术切取脂肪,置于细胞保存液中保存的、低温运输至合格的 GMP 实验室,经过分离、
15 纯化、增殖处理,所获得的脂肪间充质祖细胞,即工作库细胞(中间产品)。

在另一优选例中,所述的人体脂肪组织来源的间充质干(祖)细胞是在 GMP 生产实验室,按照中间产品生产工艺流程生产的、符合各种病原学检测阴性标准的、符合特定表面标志物如 CD73 阳性、CD90 阳性、CD105 阳性细胞百分率大约 98%,CD34 阳性/CD45 阳性和 HLA-DR 阳性的细胞百分率小于 2%的、符合抗生素残余和血清及血清替代物残余检测标准的、P1-P6 代脂肪间充质干(祖)细胞。
20

在另一优选例中,所述的脂肪间充质干(祖)细胞为 P3-P4 代脂肪间充质干(祖)细胞。

在另一优选例中,所述的体细胞是在-196℃至-80℃(较佳地,-196℃至-135℃)深低温条件下储存 0-36 个月(较佳地 0-24 个月或 0.5-24 个月)的脂肪组织来源的间充质干(祖)细胞。
25

在另一优选例中,所述的人的体细胞衍生的细胞膜外囊泡及可溶性活性细胞因子,其生产工艺包括步骤:

(1)通过接种所述的人的体细胞于含 5% EliteGro 的 α MEM 基础培养基中,在 HyperFlask 培养瓶中培养,培养条件为 $37 \pm 1^\circ\text{C}$, $5 \pm 0.5\%$ CO_2 ,至细胞融合度达到 $80 \pm 10\%$,再使用特定的预处理培养基进行培养,培养条件为 $37 \pm 1^\circ\text{C}$, $5 \pm 0.5\%$ CO_2 ,培养 36-72 小时;
30

(2)收集细胞培养上清液,进行差速离心联合聚乙二醇(PEG)沉淀法分离。

在另一优选例中,所述的差速离心分离联合聚乙二醇 PEG 沉淀,包括步骤:使用 PEG3000-PEG9000 的 PEG,用 PBS 配置为 8%-30%的 PEG,经过滤除菌(如用 $0.22 \mu\text{m}$ 的过滤器过滤)后,按照一定比例(如约 1:1 体积比)加入到处理后的条件培养基中,置
35

于 4℃ 过夜孵育后。4℃, 3,000–5000g 离心 30–60 分钟, 弃去上清。加入预冷的 PBS 重悬沉淀, 4℃, 100000–120000g 超高速离心 60–120 分钟, 弃去上清, 加入适量等渗氯化钠溶液, 重悬沉淀, 从而获得人体细胞衍生的细胞膜外囊泡及可溶性活性细胞因子。

5 在另一优选例中, 用所述生产工艺获得的细胞膜外囊泡, 具有以下生物标志物特征: CD9 阳性(即 CD9⁺)、CD63 阳性、CD81 阳性、TSG101 阳性、和 CANX 阴性。

在另一优选例中, 所述的生产工艺具有以下特性: 在 GMP 实验室条件下, 具有临床级细胞制品生产规模。

10 在另一优选例中, 所述的临床级生产规模指 1 个生产操作单元可以分离 2 个细胞工厂所获得的 800–1200ml 条件培养基, 可分离获得 $2-5 \times 10^{11}$ 个细胞膜外囊泡, 按照一个病人 $2-5 \times 10^9$ 个细胞膜外囊泡在局部使用的总剂量计算, 一个生产操作单元, 一个批次生产量可以满足 100–250 个病人的局部使用量。或者, 100 个生产操作单元, 一个批次生产量可达到 10000–25000 人使用总量, 用时 5–6 天。

15 在另一优选例中, 所述的生产工艺的特点是: 分离获得的细胞膜外囊泡、可溶性活性细胞因子与特定分子量的 PEG 交联成特定粒径(如小于 3 微米)的亲水性粒子, 从而具有在 -196℃ 至 -20℃ 冻存条件下的高稳定性, 以及在常温水溶液中的高分散性。

在另一优选例中, 所述的细胞膜外囊泡、可溶性活性细胞因子及聚乙二醇 PEG 交联的亲水粒子, 分散于等渗氯化钠溶液、低分子透明质酸溶液、人工泪液、凝胶溶液中, 从而制成雾化吸入液、滴眼液、滴鼻液、和外用凝胶制剂。

20 在另一优选例中, 所述的药物组合物并施用于粘膜细胞, 并且所述粘膜细胞可摄取细胞膜外囊泡。

在另一优选例中, 本发明的药物组合物为雾化吸入剂。

25 在另一优选例中, 本发明的药物组合物(尤其是雾化吸入剂)被用于治疗感染性肺损伤, 较佳地用于病毒性肺损伤, 更佳地用于冠状病毒(如 SARS-CoV 病毒、SARS-CoV-2 病毒)感染引起的肺损伤。

在另一优选例中, 所述的药物组合物是脂肪组织来源的祖细胞和胎盘羊膜来源的间充质干细胞衍生的膜外囊泡和可溶性细胞因子与等渗氯化钠溶液制备的雾化吸入液。

在另一优选例中, 所述的药物组合物用于治疗病毒引起的疾病。

30 在另一优选例中, 所述的病毒选自下组: 流感病毒、SARS 冠状病毒、SARS 冠状病毒 2、MERS 冠状病毒感染。

35 在另一优选例中, 所述的药物组合物(如雾化吸入液)用于治疗病毒性急性肺损伤, 通过雾化吸入治疗, 从而达到阻止急性肺损伤炎症因子的释放、减轻肺泡内高蛋白液的渗入和肺泡上皮细胞损伤、显著提高急性肺损伤患者的抢救成功率, 以及改善存活患者肺功能和生活质量。

在本发明的第二方面，提供了一种制备细胞膜外囊泡的方法，包括步骤：

(S1) 培养人的体细胞(如脂肪间充质干(祖)细胞)，使其达到预定的汇合度(如75-90%)；

5 (S2) 在适合产生 EV 的条件下，继续培养所述的细胞一段时间 T1；其中，所述的 T1 通常为 24-72 小时，较佳地 30-60 小时；

(S3) 从培养体系中去除细胞，从而分离获得含细胞膜外囊泡的培养液，即为“条件培养液(conditioned medium)”；

10 (S4) 将所述的条件培养液(conditioned medium)与聚乙二醇(PEG)进行混合，形成第一混合物，并放置一段时间 T2，从而形成经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡；其中，所述的 T2 通常为 6-60 小时，较佳地 12-48 小时；

(S5) 对上一步骤的第一混合物进行离心，使得所述的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀，并弃去上清，获得经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀；

15 (S6) 对上一步骤获得的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀进行重悬，从而获得第一重悬混合物；

(S7) 对第一重悬混合物进行离心，使所述的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀，并弃去上清，获得经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀；

(S8) 对上一步骤中获得的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀进行重悬，从而获得可医用的细胞膜外囊泡制剂(即 PEG-EVs-factors 制剂)。

20 在另一优选例中，所述方法还包括：

(S9) 将可医用的细胞膜外囊泡制剂(或活性物质)与药学上可接受的载体混合，从而制得药物组合物。

在另一优选例中，所述方法还包括将所述的药物组合物制成雾化吸入制剂、注射剂、或冻干制剂。

25

在本发明的第三方面，提供了一种细胞膜外囊泡制剂，所述的细胞膜外囊泡制剂是用本发明第二方面所述的方法制备的。

在另一优选例中，所述的细胞膜外囊泡制剂包括由脂质双分子层膜结构包绕形成的纳米囊泡。

30 在另一优选例中，所述的纳米囊泡的直径在 30-1000 纳米之间。

在另一优选例中，所述的纳米囊泡内含有不同种类的、具有特定功能的微小核糖核酸(miRNA)、小核糖核酸(sRNA)、非编码的 DNA 片段、转运核糖核酸(t-RNA)、可溶性细胞因子、生长因子、和其他蛋白质。

35 在另一优选例中，所述的可溶性活性细胞因子选自下组：可溶性的游离的脂蛋白质分子、糖蛋白分子、生物信号分子、组织生长因子 β (TGF β)、肝细胞生长因子(HGF)、

血管内皮细胞生长因子(VEGF)、表皮细胞生长因子(KGF)、白细胞介素-10(IL-10)、白细胞介素-1 β 受体拮抗剂(IL-1 β A)、或其组合。

在另一优选例中,所述的可溶性活性细胞因子是所述的人的体细胞所产生的可溶性活性细胞因子。

5 在另一优选例中,所述的可溶性活性细胞因子包括自然状态下培养的人的体细胞旁分泌所产生的活性细胞因子、用外源基因修饰的人的体细胞所表达产生的活性细胞因子、或其组合。

在另一优选例中,所述的细胞膜外囊泡特异性表达以下蛋白: CD9、CD63、CD81和TSG101;不表达或基本不表达蛋白CANX。

10

在本发明的第四方面,提供了一种本发明第一方面所述的药物组合物或第三方面所述的细胞膜外囊泡制剂的用途,它们被用于制备预防和/或治疗炎症、或损伤的药物。

15 在另一优选例中,所述的炎症选自下组:病毒感染性炎症、细菌感染性炎症、真菌感染性炎症、自身免疫反应性炎症、或其组合;

所述的损伤选自下组:缺血性损伤、缺氧性损伤、化学性损伤、物理性损伤、或其组合。

在另一优选例中,所述的药物用于治疗病毒引起的疾病。

20 在另一优选例中,所述的病毒选自下组:流感病毒、SARS 冠状病毒、SARS 冠状病毒 2、MERS 冠状病毒感染。

在本发明的第五方面,提供了一种预防和/或治疗炎症、或损伤的方法,包括步骤:给需要的对象施用本发明第一方面所述的药物组合物,或第三方面所述的细胞膜外囊泡制剂。

25 在另一优选例中,所述的炎症选自下组:病毒感染性炎症、细菌感染性炎症、真菌感染性炎症、自身免疫反应性炎症、或其组合。

在另一优选例中,所述的损伤选自下组:缺血性损伤、缺氧性损伤、化学性损伤、物理性损伤、或其组合。

在另一优选例中,所述的药物用于治疗急性呼吸窘迫综合征。

30 在另一优选例中,所述的药物为雾化吸入液。

在另一优选例中,所述的药物用于治疗病毒性急性肺损伤。

在另一优选例中,所述的药物通过雾化吸入治疗,从而达到阻止急性肺损伤炎症因子的释放、减轻肺泡内高蛋白液的渗入和肺泡上皮细胞损伤。

在另一优选例中,所述的对象是人。

35

应理解,在本发明范围内中,本发明的上述各技术特征和在下文(如实施例)中具体描述的各技术特征之间都可以互相组合,从而构成新的或优选的技术方案。限于篇幅,在此不再一一累述。

5 附图说明

图1显示了Western印迹法和NTA检测PEG沉淀法和超速离心法收集的细胞膜外囊泡的产量。其中,图(1A):M为Marker;1~4分别为8%PEG 6000、12%PEG 6000、16%PEG 6000、20%PEG 6000分离出的细胞膜外囊泡的CD63表达量(同蛋白量上样);图(1B):M为Marker;1为haMSCs;2和4为超速离心分离的细胞膜外囊泡的蛋白表达情况;3和5为12%PEG 6000分离出的细胞膜外囊泡的蛋白表达情况;图(1C):NTA检测PEG 6000和超速离心分离出的细胞膜外囊泡粒子浓度;图(1D):NTA检测PEG 6000和超速离心分离出的细胞膜外囊泡粒径大小;* $p < 0.05$ 。

图2显示了成纤维细胞摄取细胞膜外囊泡。其中,蓝色:Hoechst染色的细胞核;绿色:PKH-67标记的细胞膜外囊泡;标尺:100 μm 。

图3显示了在4℃、-20℃和-80℃条件下贮存9周的细胞膜外囊泡数量。

图4显示了在4℃、-20℃和-80℃条件下贮存9周的细胞膜外囊泡的特异性标志物CD81的表达情况。

图5显示了常温复融半小时后,透射电镜下的细胞膜外囊泡状态。其中,图5A为-80℃贮存1周的细胞膜外囊泡在透射电镜的状态,图5B为复融常温半小时后的细胞膜外囊泡在透射电镜的状态。

图6显示了常温复融半小时后细胞膜外囊泡的粒径浓度和大小。

图7显示了人源脂肪间充质祖细胞细胞膜外囊泡抑制LPS诱导巨噬细胞活化。其中,(A)促炎症型巨噬细胞形态学观察;(B)促炎症型巨噬细胞形态学统计分析。Control为对照组,LPS为单独使用脂多糖处理巨噬细胞组,LPS+Dex为脂多糖和地塞米松处理组,LPS+haMPCs-Exo为脂多糖和脂肪间充质祖细胞膜外囊泡处理组,红色箭头表示活化的巨噬细胞(促炎症型巨噬细胞);* $P < 0.05$,标尺为50 μm 。

图8显示了人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡抑制LPS诱导巨噬细胞促炎症因子基因表达。其中,(A)、(B)和(C)分别显示了实时荧光定量PCR检测巨噬细胞炎症因子TNF- α 、IL-1 β 和IL-6的基因表达水平。Control为对照组,LPS为单独使用脂多糖处理巨噬细胞组,LPS+Dex为脂多糖和地塞米松处理组,LPS+haMPCs-Exo为脂多糖和脂肪间充质祖细胞膜外囊泡处理组;*** $P < 0.001$ 。

图9显示了人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡抑制LPS诱导巨噬细胞促炎症因子释放。其中,(A)LPS诱导巨噬细胞并经人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡处理流程示意图,(B)ELISA检测巨噬细胞释放的炎症因子IL-6和TNF- α 蛋白水平。Control为对照组,LPS为单独使用脂多糖处理巨噬细胞组,LPS+Dex为脂多糖和地塞米松处理

组, LPS+haMPCs-Exo 为脂多糖和脂肪间充质祖细胞膜外囊泡处理组; ** $P<0.01$, *** $P<0.001$ 。

图 10 为细胞膜外囊泡、可溶性细胞因子与 PEG 交联形成亲水性粒子的示意图。

图 11 显示了本发明一种示意性的工艺路线(从步骤 S4 到 S8)。

5

具体实施方式

本发明人经过广泛而深入的研究, 通过大量筛选和研究, 首次意外地开发了一类可有效治疗 ARDS 的无细胞的生物医药制剂, 该生物医药制剂含有人体细胞来源的细胞膜外囊泡, 具有特定的粒径并且经特定 PEG 修饰, 因此不仅可以稳定地长期保存, 而且在医用溶剂(如生理盐水等)中具有极其优异的分散性, 特别适合通过雾化吸入方式等方式直接施用于患者的肺部(尤其是下呼吸道)等部位, 从而快速、高效地治疗或缓解肺炎、ARDS 等疾病的症状, 显著降低冠状病毒等因素所导致的感染症状和死亡率。在此基础上完成了本发明。

10

15

冠状病毒

冠状病毒 (Coronavirus, CoV) 属于套式病毒目 (Nidovirales) 冠状病毒科 (Coronaviridae), 是一种有包膜的正链 RNA 病毒, 其亚科包含 α 、 β 、 δ 及 γ 四属。

目前已知的感染人的冠状病毒中, HCoV-229E 和 HCoV-NL63 属于 α 属冠状病毒, HCoV-OC43、SARS-CoV、HCoV-HKU1、MERS-CoV 和 SARS-CoV-2 均为 β 属冠状病毒。

20

2003 年和 2012 年分别爆发的高致病性冠状病毒“非典”SARS-CoV 和“中东呼吸综合征”MERS-CoV 均属于 β 属冠状病毒。2019 年年底爆发的新型冠状病毒 (SARS-CoV-2) 与 SARS-CoV 有约 80% 相似性、与 MERS-CoV 有 40% 的相似性, 也属于 β 属冠状病毒。

25

细胞膜外囊泡

1. 间充质干细胞膜外囊泡的生物学特征

细胞膜外囊泡 (extracellular vesicles, EVs) 有三个主要类型, 分别为外泌体 (Exosomes)、微囊泡 (Microvesicles) 和凋亡小体 (Apoptotic bodies)。所有这三个主要类型的 EVs 都被脂质双分子层包裹, 其直径范围在 30-2000nm。

30

外泌体一词指的是由胞内体衍生的直径在 50-100 nm 的 EVs 亚类, 它们是包括间充质干细胞 (mesenchymal stem cells, MSCs) 在内的多种细胞类型旁分泌物的主要组成部分。

MSCs 外泌体 (Exosomes) 是 MSCs 衍生的 EVs 中的一类直径在 50-100nm 范围内的、具有完整脂质双分子层膜结构的 EVs。

35

外泌体是一种运载丰富货物的载体, 其功能主要是通过不断转运微小核糖核酸

(miRNAs)和蛋白来发挥的。在 MSCs 来源的外泌体中,已经鉴定出 150 多个 miRNAs 和 850 多个独特的蛋白质,通过不同的途径,改变靶细胞的各种活性。MSC 外泌体参与了机体发育、表观遗传调控、免疫调节(miR-155 和 miR-146)、肿瘤发生和肿瘤进展(miR-23b、miR-451、miR-223、miR-24、miR-125b、miR-31、miR-214 和 miR-122)等生理和病理过程。根据 ExoCarta 的资料,已经从 MSCs 外泌体中收集了 900 多种蛋白质。一些研究表明, MSC 外泌体载有一些细胞因子和生长因子,如 TGF β 1、白细胞介素-6(IL-6)、IL-10 和肝细胞生长因子(HGF)等,这些因子已被证实有助于免疫调节。血管内皮生长因子(VEGF)、细胞外基质金属蛋白酶诱导剂(extracellular matrix metalloproteinase inducer, EMMPRIN)和 MMP-9 在 MSC 外泌体中均有报道,这三种蛋白在刺激血管生成中发挥重要作用,可能是外泌体组织修复作用的基础。

2. 间充质干细胞膜外囊泡在动物体内的生物分布

在不同的动物模型中,已经采用了几种体内示踪策略来确定 EVs 或外泌体在全身给药后的生物分布。近红外(Near-infrared, NIR)染料因其信噪比高,是体内应用的理想染料。标记超顺磁性氧化铁纳米颗粒的 EVs 具有高分辨率和灵敏的磁共振分析功能,为深部器官的准确检测提供了依据。

在脑出血大鼠模型中,经静脉注射后,DiI 标记的 MSC 外泌体可以被显示到达脑、肝、肺和脾。在急性肾损伤(AKI)小鼠模型中,与健康对照组相比,DiI 标记的 EVs 在 AKI 小鼠肾脏中特异性积聚,预示着外泌体似乎能够归巢到损伤部位。

与静脉注射相比,经鼻给药可使损伤部位的脑外泌体更好地积聚。EVs 经系统给药的生物分布是一个动态过程:给药后约 30 分钟内, EVs 在肝脏、脾脏和肺中的快速分布阶段,然后通过肝脏和肾脏处理进入消除阶段,在给药后 1 至 6 小时内清除 EVs。

3. 间充质炎细胞膜外囊泡的免疫调节和抗炎作用

研究表明,外泌体通过携带和递呈功能性 MHC 肽复合物,在调节肿瘤特异性 T 细胞活化方面起着关键作用。

骨髓来源的 MSCs 释放的外泌体通过抑制 CD4 阳性 T 细胞的活化和浸润,减少促炎细胞因子的产生,促进表达 IL-10 的 Treg 的生成,抑制 Th17 细胞,可有效改善小鼠慢性移植物抗宿主病(cGVHD)。

人多能基质细胞来源的 EVs 在 1 型糖尿病(T1D)和实验性自身免疫性葡萄膜视网膜炎(EAU)模型中具有抑制自身免疫的作用。EVs 可通过抑制抗原提呈细胞(APC)的活化,抑制 Th1 和抑制 Th17 细胞的发育,增加免疫抑制因子 IL-10 的表达。

人骨髓 MSCs 外泌体可以促进调节性 T 细胞亚群增殖和通过上调外周血单核细胞(PBMCs)表达细胞因子 IL-10 和 TGF- β 1,使哮喘病人的免疫抑制能力增强。

人脐带 MSCs 来源的外泌体中 miR-181c 通过下调 TLR4 信号通路在烧伤大鼠炎症

模型中发挥抗炎作用。

单次肾内注射猪自体脂肪 MSCs-EVs 可以使肾动脉狭窄猪模型的肾静脉中多种促炎细胞因子(TNF- α , IL-6, IL-1 β)的水平降低, 而抑制炎症因子 IL-10 水平升高, 并伴有巨噬细胞从促炎细胞向修复性巨噬细胞的迁移, 再次证明了 EVs 的免疫调节潜能。

已有不少研究报道 MSCs 在肝纤维化/肝硬化动物模型和急性肝损伤中的应用, 最终可以改善患者的病情进展。脂肪 MSCs 外泌体可以显著降低刀豆蛋白 A (Con A) 诱导的 C57BL/6 小鼠肝炎模型的血清丙氨酸转氨酶和天冬氨酸转氨酶水平的升高, 减轻肝脏炎症, 降低肝炎模型小鼠血清中促炎细胞因子 (TNF- α 、IFN- γ 、IL-6、IL-18、IL-1 β 的水平, 抑制了模型小鼠肝脏中炎症小体(inflammasome)的激活。

脓毒症是一种机体对抗微生物感染所引起的全身性炎症反应。尽管有先进的抗生素的应用, 但是重症监护病房的脓毒血症死亡率仍然居高不下, 于是研究者们将 MSCs 的治疗目标锁定在此类全身炎症性疾病。近年来, MSC-EVs 在盲肠结扎致脓毒血症的动物模型中的疗效被广泛研究。在脓毒症大鼠模型中, 静脉给予脂肪 MSCs-EVs 的治疗减轻了全身性炎症反应、器官损伤和随后的致死性。另一项治疗脓毒症的研究中, 使用 IL-1 β 预处理的 MSCs 产生的 EVs 治疗脓毒血症的效果比无预处理的 MSCs 来源的 EVs 有显著的提高。

研究还表, 从诱导的 MSCs 得到的 EVs 能有效地极化巨噬细胞, 使其分化为 M2 型, M2 型是巨噬细胞的抗炎表型。miR-146a 作为一种抗炎作用的 miRNA, 在 IL-1 β 预处理 MSCs 及其 EVs 中的含量都显著增加。将 EVs 中包装的 miR-146a 转入巨噬细胞, 可以使其极化为 M2 型[Casado JG, et al. Frontiers in Veterinary Science. 2017;4:39]

4. 基因修饰 MSCs 可增加其细胞膜外囊泡的疗效

为了改善人骨髓 MSCs 向肺的迁移和增强 MSCs 的治疗潜力, 一种含有 AT2R DNA 的构建物, 通过慢病毒介导的基因转染, 使其在骨髓 MSCs 中获得高而稳定的长期表达。体外检测了 AT2R-MSCs (AT2R-MSCs) 的迁移。随后, 在脂多糖(LPS)诱导的急性肺损伤体内模型中研究 AT2R-MSCs 的潜在治疗效率, 并评估了 MSCs 向损伤肺组织的迁移。与此同时, 使用 AT2R 基因敲除的 MSCs (MSC-ShAT2R), 以确定 AT2R 在 MSCs 体内迁移能力中的作用以及对 ARDS 的治疗作用。

MSCs 外泌体通过转运抗凋亡的 miR-21-5p 来减轻小鼠肺缺血/再灌注损伤。外泌体中的 miR-21-5p 通过靶向肺组织中的 PTEN 和 PDCD4, 减少氧化应激诱导的细胞凋亡。

最近的研究发现, 超表达 miR-30b-3p 的 MSCs 来源的外泌体, 可抑制血清淀粉样蛋白 A3 (SAA3)。

在盲肠结扎和穿孔诱导的脓毒症模型中, 外泌体 miR-146a 增强了 IL-1 β 预处理 MSC 的治疗效果, 进一步发现 IL-1 β 刺激 MSCs, 可以上调 MSCs miR-146a 的表达,

后者可以被包装在外泌体中。然后,这一外泌体 miR-146a 转移到巨噬细胞,导致 M2 极化,最终导致脓毒症小鼠存活率增加。因此,利用特异性 miRNA 的过表达修饰 MSCs 的外泌体,是发展 ARDS 治疗的一个有希望的新方向。

5 急性呼吸窘迫综合征

ARDS 是由于吸烟、溺水、误吸、败血症、创伤、缺血和接触毒素等因素引起的直接或间接性肺损伤引起的急性全身性炎症反应。严重的炎症反应引起血管通透性改变,导致急性肺水肿。

ARDS 病理过程主要有三个阶段:渗出期、增殖期和纤维增生期。

10 在渗出期,肺损伤引起的炎症级联反应,肺泡-毛细血管屏障功能障碍,导致肺泡上皮和肺毛细血管内皮细胞通透性增加,是渗出期的特征。肺组织病理表现为弥漫性肺泡损伤伴随渗出,微血管损伤伴继发肺水肿,肺泡 1 型(AT1)上皮细胞坏死,炎症细胞聚集,释放活性介质。肺泡炎症主要是由多形核中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞引起的。其他促炎机制也参与其中,如肺细胞、炎性细胞和成纤维细胞释放大量促炎细胞因子。

15 在增殖期,肺泡内形成透明膜,并伴有炎症细胞的浸润,包括 T 淋巴细胞、中性粒细胞和巨噬细胞。在炎症和氧化应激导致的严重损伤后,细胞外基质沉积于肺泡内,并伴随持续的慢性炎症。炎症级联作用在与 ARDS 密切相关的细胞凋亡、增殖、迁移等过程中起关键作用。持续损伤与损伤不能及时修复,是 ARDS 纤维增殖期的主要病理表现。

20 在此纤维增殖期中,有成纤维细胞增殖、AT2 细胞增生和肺组织修复。受损肺泡上皮的修复机制尚不完全清楚,它包括 AT2 细胞的增生,AT2 细胞沿基底膜迁移形成新的上皮屏障,与细胞外基质和包括肺泡巨噬细胞在内的其他细胞发生复杂的相互作用,导致某些病例的肺结构和功能发生明显改变。肺部计算机断层扫描(CT)可以在 ARDS 的纤维增殖期,检测到致密纤维化和蜂窝状结构。

25 与 ARDS 相关的严重性疾病会引发呼吸机获得性肺炎、急性心肌梗死和急性肺栓塞的高风险。

细胞膜外囊泡

30 本发明提供了一种间充质干细胞(包括脂肪间充质干祖细胞,脐带间充质干细胞和胎盘羊膜间充质干细胞)来源的细胞膜外囊泡。

在本发明中,采用本发明特定的优化工艺所制备的细胞膜外囊泡,具有特定的粒径分布,并且与 PEG 交联形成亲水性粒子,不仅极其适合通过气雾剂形式施用于并作用于肺部(尤其是下呼吸道),而且能够在水溶液中长期稳定存在,且具有优异的分散性(均优于细胞本身)。

为了便于理解，申请人提供了示意性的图 10。如图 10 所示，代表性的细胞膜外囊泡、可溶性细胞因子与 PEG 交联形成亲水性粒子。

在另一优选例中，用本发明所描述的分离方法和工艺获得的细胞膜外囊泡，粒径在 50-150nm 范围内。细胞膜外囊泡、可溶性细胞因子与 PEG 交联形成亲水性粒子，
5 粒径小于 3 微米(如约 1-3 微米或 0.5-3 微米)，在水溶液中稳定性、分散性均优于细胞本身。利用这种细胞膜外囊泡、可溶性细胞因子与 PEG 交联形成亲水性粒子，分别与生理盐水、人工泪液、透明质酸等溶液配制的雾化吸入液、滴眼液、滴鼻液和外用，有利于局部粘膜细胞吸收利用这些细胞膜外囊泡和可溶性活性细胞因子。其在体内的生物分布与单纯膜外囊泡一致。

10 在本发明中，宜采用间充质干细胞来制备细胞膜外囊泡的细胞。代表性的间充质干细胞例子包括(但并不限于)：脂肪间充质干细胞，脐带间充质干细胞、胎盘羊膜间充质干细胞或其组合。

药物组合物和雾化吸入制剂

15 本发明还提供了一种药物组合物，所述的药物组合物含有(a) 人的体细胞衍生的活性物质，所述的活性物质为人的体细胞所产生的细胞膜外囊泡；和(b) 药学上可接受的载体。

在另一优选例中，所述的药物组合物是无细胞的药物组合物。

在本发明中，优选地，所述的活性成分还包括可溶性活性细胞因子，这些可溶性
20 活性细胞因子主要存在于细胞膜外囊泡中。此外，一些可溶性活性细胞因子可能存在于细胞膜外囊泡之外。一些可溶性活性细胞因子还可被 PEG 修饰。

在本发明中，一种特别优选的药物制剂是雾化吸入制剂。

制备方法

25 本发明还提供了制备细胞膜外囊泡的方法。

一种典型的方法是采用间充质干细胞(包括脂肪间充质干(祖)细胞，脐带间充质干细胞和胎盘羊膜间充质干细胞)作为原料，来制备本发明的细胞膜外囊泡。

以脂肪间充质干(祖)细胞为例，一种典型的制备方法包括步骤：

(S1) 培养细胞(如脂肪间充质干(祖)细胞)，使其达到预定的汇合度(如 75-90%)；

30 (S2) 在适合产生 EV 的条件下，继续培养所述的细胞一段时间 T1；其中，所述的 T1 通常为 24-72 小时，较佳地 30-60 小时；

(S3) 从培养体系中去除细胞，从而分离获得含细胞膜外囊泡的培养液，即为“条件培养液”(conditioned medium)”；

(S4) 将所述的条件培养液”(conditioned medium)与聚乙二醇(PEG)进行混合，
35 形成第一混合物，并放置一段时间 T2，从而形成经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡；其中，

所述的 T2 通常为 6-60 小时, 较佳地 12-48 小时;

(S5) 对上一步骤的第一混合物进行离心, 使得所述的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀, 并弃去上清, 获得经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀;

5 (S6) 对上一步骤获得的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀进行重悬, 从而获得第一重悬混合物;

(S7) 对第一重悬混合物进行离心, 使所述的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀, 并弃去上清, 获得经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀;

(S8) 对上一步骤中获得的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀进行重悬, 从而获得可医用的细胞膜外囊泡制剂(即 PEG-EVs-factors 制剂)。

10 一种示意性的从步骤 S4 到 S8 的工艺路线, 示于图 11 中。

GMP 条件生产细胞膜外囊泡的工艺规模

一个 HyperFlask 细胞工厂可以生产 500ml 条件培养基的细胞膜外囊泡, 预计分离 5×10^{10} — 10×10^{10} 细胞膜外囊泡总量。

15 目前实验室产能一个生产操作单元可以分离两个细胞工厂共计 800-1200ml 条件培养基的细胞膜外囊泡, 预计分离 $2-5 \times 10^{11}$ 细胞膜外囊泡, 按照一个病人 $2-5 \times 10^9$ 的使用量, 一个生产操作单元一批次生产量可以满足 100-250 个病人的使用量。

发明的主要优点包括:

20 (a) 适合规模化生产, 尤其是适合临床工业化规模生产。一个 HyperFlask 细胞工厂可以生产 500-600ml 条件培养基的细胞膜外囊泡, 预计分离 $2-5 \times 10^{11}$ 细胞膜外囊泡总量。以 GMP 实验室产能, 一个生产操作单元可以分离两个细胞工厂所产生的 800-1200ml 条件培养基的细胞膜外囊泡, 预计可分离纯化 $2-5 \times 10^{11}$ 个细胞膜外囊泡。按照一个病人 $2-5 \times 10^9$ 的局部使用剂量, 一个生产操作单元一批次生产量可以满足
25 100-250 个病人的使用量。

(b) 稳定性好: 无需 DMSO 等对人体有害的防冻液, 在低温(-20°C)和超低温(-80°C 至 -196°C)条件下保存 36 个月或更长时间, 其膜结构和内容物性质稳定。

(c) 分散性高: 在药学可接受的载体, 特别是在等渗氯化钠水溶液中分散性好。冻融后置于 4°C , 24 小时及以上, 不会析出和沉淀, 显著优于细胞类制剂。

30 (c) 本发明的药物组合物在水溶液中均匀分散的、小于 3 微米的亲水粒子, 经雾化吸入给药, 可以异乎寻常地高效进入了呼吸道, 尤其是下呼吸道。

下面结合具体实施例, 进一步阐述本发明。应理解, 这些实施例仅用于说明本发明而并不用于限制本发明的范围。下列实施例中未注明具体条件的实验方法, 通常按照
35 常规条件, 例如 Sambrook 等人, 分子克隆: 实验室手册(New York: Cold Spring Harbor

Laboratory Press, 1989)中所述的条件, 或按照制造厂商所建议的条件。除非另外说明, 否则百分比和份数是重量百分比和重量份数。

材料

- 5 脂肪间充质干(祖)细胞: 对于经过伦理审查备案的、签署知情同意书的、经过严格实验室检查符合脂肪组干细胞产品建库入组标准的男性或女性健康志愿者, 经过腹壁穿刺抽脂、或腹壁手术切取脂肪, 置于细胞保存液中保存的、低温运输至合格的 GMP 实验室, 经过分离、纯化、增殖处理, 所获得的脂肪间充质祖细胞, 即工作库细胞(中间产品)。

10

通用方法

1. 培养基预处理

将含有 5% EliteGro 的 α MEM, 于 4℃ 条件下, 120,000g 离心 6h。

15

2. PEG 沉淀法获得细胞膜外囊泡

用 PBS 配制 12% PEG6000, 用 0.22 μ m 的过滤器过滤后, 按照 1:1 体积比加入到处理后的条件培养基, 置于 4℃ 过夜孵育后, 4℃, 3,000 g 离心 1 h, 去掉上清。加入预冷的 PBS 重悬沉淀, 4℃, 12,000g 超速离心 70 min, 吸去上清, 加入适量等渗氯化钠溶液重悬沉淀即为细胞膜外囊泡。

20

3. 粒子直径分布和粒子浓度的测定

取适量样品, 稀释 300 倍, 用 ZetaView 测定样品的粒子直径分布和粒子浓度。

4. 蛋白浓度的测定

- 25 取适量样品, 以 BCA 法测定蛋白浓度, 加入 5×SDS 上样缓冲液, 100℃ 加热 5 min, 将同蛋白量样品上样于 SDS 聚丙烯酰胺凝胶, 100V 电泳至染料迁移至凝胶底部, 250 mA, 90 min 转移至 PVDF 膜上。用 TBST 缓冲液配制 5% 脱脂牛奶作为封闭液和一抗二抗稀释液, 封闭 PVDF, 用一抗孵育, 分别为阳性蛋白 CD63、CD81、TSG101, 阴性蛋白 CANX, 并用相应二抗孵育后, 加入显影液观察蛋白条带情况。

30

实施例 1

含细胞膜外囊泡的培养液的制备(条件培养基的制备)

取 2×10^7 个脂肪间充质干细胞(P4 代), 接种于含 5% EliteGro 的 α MEM 基础培养基中, 在 HyperFlask 培养瓶中培养, 培养条件为 37℃, 5% CO₂。

- 35 当培养至细胞融合度达到约 80%, 换液, 使用预处理的培养基进行培养, 条件为

37℃, 5%CO₂, 培养 48h。

收集培养上清, 3,000g 离心 15 分钟后取上清, 10000 g, 4℃ 条件离心 30 分钟。取上清, 即为含细胞膜外囊泡的培养液, 以下称为“条件培养基”(conditioned medium)。

5

实施例 2

细胞膜外囊泡的制备

在本实施例中, 分别通过 PEG 沉淀法和超速离心法来制备细胞膜外囊泡。

超速离心法:

10 取条件培养基(实施例 1), 于 4℃, 120,000g 超速离心 70 min 后, 用预冷的 PBS 重悬, 再次 120,000g 超速离心 70 min 后, 用适量等渗氯化钠溶液重悬沉淀, 获得细胞膜外囊泡。

PEG 沉淀法:

15 用 PBS 配制浓度为 8%、12%、16%、或 20% PEG6000, 用 0.22 μm 的过滤器过滤后, 按照 1:1 体积比加入到处理后的条件培养基(实施例 1), 置于 4℃ 过夜孵育后。

4℃, 3,000 g 离心 1 小时, 弃去上清。加入预冷的 PBS 重悬沉淀, 4℃, 120,000g 超速离心 70 分钟, 弃去上清, 加入适量等渗氯化钠溶液重悬沉淀, 获得细胞膜外囊泡。

20

性能测定:

将分别添加含 8% PEG 6000、12% PEG 6000、16% PEG 6000、20% PEG 6000 的分离出的细胞膜外囊泡按照相同的总蛋白量上样, 进行 CD63 鉴定。

25 结果如图 1A 所示, 12% PEG 6000 和 16% PEG 6000 分离出的细胞膜外囊泡的 CD63 表达量最高。因此, 在后续实验, 使用 12% PEG 6000。

此外, 将使用 12% PEG 6000 分离 200 ml 培养基所获得的细胞膜外囊泡和超速离心分离 350 ml 培养基所获得的细胞膜外囊泡, 按照同体积和同蛋白量上样进行 CANX、TSG101 和 CD81 鉴定和 NTA 检测。

30 结果如图 1B 至图 1D 所示。结果表明, 无论是同体积还是同蛋白做 Western 鉴定, PEG 6000 分离出的细胞膜外囊泡的目的蛋白量都远大于超速离心法分离出的细胞膜外囊泡的量。

NTA 结果显示, PEG 6000 分离出的细胞膜外囊泡的浓度为 1.35×10^8 细胞膜外囊泡/ml 培养基, 超速离心分离出的细胞膜外囊泡的浓度为 6.8×10^7 细胞膜外囊泡/ml 培养基。

35 PEG 6000 分离出的细胞膜外囊泡粒径大小为 126.6 ± 2.09 nm, 超速离心分离出

的细胞膜外囊泡的粒径大小为 $137.8 \pm 3.8 \text{ nm}$ 。

这些实验结果证明，12% PEG 6000 分离出的细胞膜外囊泡产量比超速离心分离出的产量高的多，且 PEG 并不影响细胞膜外囊泡的粒径大小。

5

实施例 3
成纤维细胞摄取细胞膜外囊泡

使用 PKH-67，将 PEG 6000 分离出的细胞膜外囊泡进行标记。

图 2 可以发现，PEG 6000 分离出的细胞膜外囊泡并不影响成纤维细胞对细胞膜外囊泡进行摄取。

10

实施例 4
细胞膜外囊泡的稳定性和性能测定

将分离制备完成的细胞膜外囊泡，用生理盐水配制成水溶液，分别置于 4℃、-20℃和-80℃，贮存 9 周。9 周以后，将置于 3 个温度的细胞膜外囊泡做 NTA 检测和相关性能测定。

NTA 检测结果如图 3 和表 1 所示。

表 1 NTA 测量的粒子数

单位：(10^{10} 细胞膜外囊泡 (particle)/ml)			
初次分离	存放9周		
初次分离	4℃	-20℃	-80℃
1.3	1.5	1.6	1.8
1.2	1.4	1.5	1.8
1.2	1.4	1.6	1.8

结果表明，3 个不同温度贮存 9 周的细胞膜外囊泡粒径数量与第 0 天初次分离的细胞膜外囊泡数量没有显著性减少(图 3)。

Western 蛋白电泳的结果显示，在-20℃和-80℃条件下，储存 9 周的细胞膜外囊泡的特异性标志物 CD81 和 TSG101 都表达稳定。4℃条件下，储存 3 周的细胞膜外囊泡的特异性标志物 TSG101 能够稳定表达，从第 5 周开始，该标志物的表达量开始下降(图 4)。

在透射电镜下，于-80℃贮存 1 周的细胞膜外囊泡，呈“茶托样”(图 5A)。在常温复融半小时以后，该细胞膜外囊泡在透射电镜下，仍然呈“茶托样”(图 5B)，没有显著性变化。

在-80℃贮存 1 周的细胞膜外囊泡和常温复融半小时后的细胞膜外囊泡经 NTA 检测，发现其细胞膜外囊泡的粒径浓度(图 6A)和大小(图 6B)没有显著性差异。

实施例 5

含细胞膜外囊泡和细胞因子的冻干制剂的多种细胞因子检测

在本实施例中,对本发明方法制备的膜外囊泡进行细胞因子检测。测试样品包括:

- 5 样品 1: 基础培养基的冻干粉(阴性对照), 4℃ 保存 4 周;
 样品 2: 干细胞培养液冻干粉(阳性对照), 4℃ 保存 4 周;
 样品 3: 细胞膜外囊泡冻干粉, 常温保存 4 周;
 样品 4: 细胞膜外囊泡冻干粉, 4℃ 保存 4 周;
 样品 5: 细胞膜外囊泡冻干粉, -20℃ 保存 4 周;

10 针对多个活性细胞因子的检测结果如表 2 所示。

表 2 细胞因子的检测结果

	PDGF-BB (pg/ml)	MMP-2 (pg/ml)	EGF (pg/ml)	VEGF (pg/ml)	FGF (pg/ml)	HGF (pg/ml)
样品 1	<1.96	339.41	<1.50	5.24	10.09	3.63
样品 2	9501.00	26600.00	7.80	1243.00	28.59	49.74
样品 3	34.92	23195.00	7.80	1243.00	28.59	49.74
样品 4	91.91	22960.00	10.95	2161.00	53.15	87.98
样品 5	94.00	21276.00	10.62	2164.00	53.96	92.82

结果表明,本发明所描述的分离纯化制备工艺方法所制备的细胞膜外囊泡含有丰富的活性细胞因子。在-20℃和-4℃条件下保存 4 周,细胞因子的稳定性很好。

15

实施例 6

人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡抑制 LPS 诱导巨噬细胞活化

为了证实人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡对脂多糖(LPS)诱导小鼠 Raw264.7 巨噬细胞炎症,具有抗炎作用,在本实施例中,首先以 LPS 诱导该巨噬细胞发生炎症为模型,体外研究人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡对其活化水平的影响。具体方法如下:

20

首先设置了四组试验,分别是不做任何药物处理的对照组(control), 0.1 μg/ml LPS 单独处理组, 0.1 μg/ml LPS 和 5 μg/ml 地塞米松(Dex)共同处理组,以及 0.1 μg/ml LPS 和适当浓度的人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡(haMPCs-Exo)处理组。

向 12 孔培养板的每个孔中加入 1 ml 的 Raw264.7 巨噬细胞悬液(1×10^4 细胞/孔),
 25 置于 CO₂ 恒温培养箱中培养(5% CO₂, 37 °C) 1 h, 然后按照上述试验分组进行药物处理,并在 CO₂ 恒温培养箱中培养(5% CO₂, 37 °C)中继续培养 4 小时。最后,取出培养板,在倒置显微镜下观察活化的小鼠 Raw264.7 巨噬细胞的形态变化情况,并在 20 倍物镜下随机选取视野进行拍照记录和统计分析。

结果如图 7 所示,与对照组(control)组相比,单独使用 LPS 诱导 4 小时后,活

化的巨噬细胞(促炎症型巨噬细胞)的形态呈分枝状(图 7A),且统计分析发现其活化数目也显著增加(图 7B),这表明已成功建立了体外的 LPS 诱导巨噬细胞炎症模型。

与 LPS 单独处理组相比,经 LPS 和地塞米松处理 4 小时后,呈分枝状的巨噬细胞明显减少(图 7A),且统计分析发现其活化的巨噬细胞数被显著抑制(图 7B)。

5 同样地,经 LPS 和人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡处理 4 小时后,呈分枝状的巨噬细胞也明显减少(图 7A),且统计分析发现其活化的巨噬细胞数也被显著抑制(图 7B)。

因此,这些结果表明,人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡能够抑制 LPS 诱导的巨噬细胞活化,进而削弱了促炎症型巨噬细胞的形成。

10

实施例 7

人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡抑制 LPS 诱导巨噬细胞促炎症因子基因表达水平

在本实施例中,为了证实人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡对 LPS 诱导小鼠 Raw264.7 巨噬细胞的炎症反应具有抑制作用,采用实时荧光定量 PCR 检测其主要炎症因子基因的表达水平。其具体操作方法基本同实施例 1 所述,但药物处理时间为 24 小时。总 RNA 提取方法采用碧云天 RNA 提取试剂盒说明书进行,而实时荧光定量 PCR 检测则采用 TaqMan 探针法进行靶基因和内参基因的同时检测,并按 $2^{-\Delta\Delta CT}$ 方法进行相对定量分析。

20 结果如图 8 所示,与对照组相比,LPS 单独处理 24 小时后,小鼠 Raw264.7 巨噬细胞的促炎症因子基因表达水平显著增加,然而在 LPS 和地塞米松共同处理 24 小时后,TNF- α 、IL-1 β 和 IL-6 的基因表达水平均极显著降低(图 8A、B 和 C)。

同样地,经 LPS 和人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡处理 24 小时后,TNF- α 、IL-1 β 和 IL-6 的基因表达水平也都极显著降低,基本达到了地塞米松处理后的水平(图 8A、B 和 C)。

25 因此,这些结果表明,人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡能够显著抑制 LPS 诱导巨噬细胞促炎症因子基因的表达水平,进而抑制其炎症反应。

实施例 8

人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡抑制 LPS 诱导巨噬细胞促炎症因子释放

在本实施例中,为了进一步确认人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡能够抑制 LPS 诱导小鼠 Raw264.7 巨噬细胞炎症反应,采用 ELISA 法检测其分泌出的炎症因子水平。其具体操作方法同实施例 2 所述,但药物处理时间为 24 小时。实验方案参见图 9A。ELISA 法检测巨噬细胞炎症因子的操作按照碧云天 TNF- α 和 IL-6 试剂盒说明书进行,然后进行统计分析。

35

结果表明,与对照组相比,LPS单独处理24小时后,小鼠Raw264.7巨噬细胞释放的促炎症因子TNF- α 和IL-6均显著增加(图9B),然而在LPS和地塞米松共同处理24小时后,TNF- α 和IL-6水平均极显著降低(图9B)。

同样地,经LPS和人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡处理24小时后,TNF- α 和IL-6水平也都极显著降低,达到了地塞米松处理后的水平(图9B)。其中,膜外囊泡对于IL-6的抑制作用更为优异,提示其在抑制新冠病毒肺炎细胞因子风暴干预治疗中有更好的应用前景。

因此,上述数据表明,人源脂肪间充质祖细胞膜外囊泡能够显著抑制LPS诱导巨噬细胞促炎症因子的释放,进而抑制其促炎症反应。

实施例9

雾化吸入荧光标记的EV在裸鼠体内生物分布研究方案

在本实施例中,研究人源脂肪间充质祖细胞外泌体经雾化吸入后,在小鼠肺组织中的分布情况及其持续时间。采用荧光标记外泌体示踪法,对其进行探究。

使用PKH67标记的人源脂肪间充质祖细胞外泌体(1×10^6 细胞膜外囊泡/g),经雾化处理30分钟并吸入裸鼠(N=3)肺部后,分别选取雾化吸入后的2h、4h、6h、8h、12h和24h时间点,采用活体荧光成像技术对PKH67标记的外泌体在裸鼠肺组织中的分布情况进行观察,并分析其在裸鼠肺部的滞留时间。

实施例10

雾化吸入EV治疗感染性肺损伤动物模型有效性研究方案

在本实施例中,研究人源脂肪间充质祖细胞外泌体经雾化吸入后,治疗耐多药铜绿菌(PA)诱导的小鼠肺炎模型的有效性。分别设置PBS诱导小鼠的空白对照组,PA诱导小鼠肺炎组,人源脂肪间充质祖细胞外泌体雾化吸入治疗PA诱导小鼠肺炎组,以及小鼠成纤维细胞外泌体治疗小鼠肺炎组。每组均为6只8-10周龄的C57BL/6野生型雄性小鼠,且治疗组中的每只小鼠外泌体用量均按 1×10^6 细胞膜外囊泡/g计算。耐多药铜绿菌诱导4小时后,进行外泌体雾化吸入,每日雾化1次,持续5天。之后,收集血液样本用于外周血白细胞和中性粒细胞计数及细菌负荷测量。收集肺泡灌洗液,用于中性粒细胞计数、细菌负荷测量,以及相关促炎症因子水平测定。另外,测定肺组织细菌负荷,对肺组织进行HE染色的形态学观察。

实施例11

雾化吸入EV治疗新冠病毒肺炎急性肺损伤临床试验方案

在本实施例中,初步探索异体脂肪间充质干细胞外泌体经雾化吸入治疗新型冠状病毒肺炎(Novel Coronavirus Pneumonia, NCP)重型和危重型患者的安全性和有效性。

拟定纳入 30 例重型和危重型 NCP 受试者，分为低、中、高三个剂量组爬坡。所有受试者除 ICU 常规治疗外，联合给予雾化吸入异体脂肪 MSCs-Exo 治疗，每次 $2-8 \times 10^8$ 细胞膜外囊泡/3ml，每日 1 次，连续 5 天。记录并分析 28 天内的不良反应发生率和临床改善时间，以及患者脱机例数，ICU 护理天数，幸存者机械通气持续时间和死亡率等。此外，通过每日 SOFA 评分，相关生化指标的检测和肺部影像学观察，以及患者呼吸道标本中新冠病毒转阴时间，对患者经治疗后的症状改善进行评判。本研究入组标准主要包括 1) 年龄 18-75 岁，男女不限，且本人或家属自愿加入并签署知情同意书；2) RT-PCR 检测呈阳性或明确诊断为新型冠状病毒肺炎患者；3) 符合重型和危重型患者的诊断标准。排除标准主要包括 1) 相关病毒携带者或较严重过敏体质患者，其他病毒引起的肺炎患者；2) 肺癌或长期使用免疫抑制药物的患者；3) 进行血液透析或腹膜透析的患者，以及肝功能异常患者；4) 正在使用 ECMO 或高频振荡通气的患者；5) 孕期、哺乳期或半年内计划孕育的患者；6) 研究者评判不能参与研究的或未能理解和执行该方案的患者。

讨论

对于急性呼吸窘迫综合征的治疗，一些可供选择的细胞疗法包括胚胎干细胞 (embryonic stem cells, ESCs) 治疗、体外诱导的多能干细胞 (induced pluripotent stem cells, iPSCs) 治疗、间充质干细胞 (Mesenchymal stromal/stem cells, MSCs) 治疗、肺上皮祖细胞 (Pulmonary epithelial progenitor cells, EpPCs) 治疗和内皮祖细胞 (Endothelial progenitor cells, EnPCs) 治疗等。

MSCs 是研究最多的一种干细胞疗法。MSCs 是一种可自我更新和增殖的多能性干细胞，能够在体外抑制免疫反应，并具有分化成肺泡 2 型细胞 (AT2 细胞) 的潜能。MSCs 介导的炎症抑制和 MSC 相关的肺修复和再生作用，是其有可能成为治疗 ARDS、肺炎、哮喘、慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 和肺间质纤维化 (IPF) 等肺脏疾患的主要原因。

如前所述，ARDS 是一种严重的临床综合征，是肺泡上皮屏障破坏所引起的，伴有间质性水肿和炎性细胞浸润，导致进行性急性呼吸衰竭。尽管合成的皮质类固醇激素、表面活性剂、吸入型一氧化氮、抗氧化剂、蛋白酶抑制剂，以及各种其他抗炎治疗，如辛伐他汀和布洛芬等许多药物已被用于治疗 ARDS，但没有一种药物能显著降低 ARDS 的死亡率，ARDS 的死亡率仍然维持在 34%-44%。

最近几项临床前研究表明，MSC 及其旁分泌细胞因子和细胞外微囊泡可被认为是治疗 ARDS 的一种新的、有效的治疗手段。ARDS 通常是严重脓毒症的并发症，尤其是在革兰氏阴性菌感染后。MSCs 治疗可以阻止大肠杆菌源性脂多糖 (LPS) 诱导的脓毒症动物模型中 ARDS 的发生 [Curley G F, et al. Critical Care Med. 2017, 45(2) :e202 - e212.] [Lee JW, et al. Stem Cell 2011, 29(6):913 - 919.]。

在脂多糖诱导的 ARDS 小鼠模型，经静脉注射间 MSCs 能显著改善肺泡损伤和炎症

反应。MSCs 通过旁分泌和白细胞介素-10(IL-10)依赖的方式,减少中性粒细胞在肺内浸润,减少肺内浸润的免疫细胞产生炎症因子 TNF- α [Gupta N, et al. Journal of Immunology 2007, 179, (3): 1855 - 1863.][Mei SHJ, et al. PLoS Medicine, 2007, 4(9) :e269.]。

5 此外,通过角化细胞生长因子(KGF)、血管内皮生长因子(VEGF)和肝细胞生长因子(HGF)的产生, MSCs 促进了 AT 2 型细胞的再生,阻止内皮细胞的凋亡,促进 ARDS 损伤的肺上皮屏障的修复[Lee JW, et al. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2009, 106(38):16357 - 16362.][Hu S, et al. Stem Cell Research & Therapy 2016, 7(1): 66.]。经 MSCs 处理的动物模型, 10 炎症损伤减少,水肿减轻,氧合改善,生存期延长。通过增加巨噬细胞产生抗炎因子 IL-10, MSCs 以依赖 PGE-2 的方式来保护自身免受脓毒症相关 ARDS 的侵袭。

经静脉输注骨髓 MSCs 治疗 ARDS 的早期临床试验已经完成。[J. G. Wilson JG, et al. Lancet Respir. Med. 2015, 3(1):24 - 32.][Zheng G, et al. Respir. Res. 2014, 15(1):39.]。Wilson 等临床研究(NCT01775774)报告,在 9 例中重度 ARDS 患者中,单 15 次静脉输注同种异体骨髓 MSCs (100 万、500 万、1000 万 cells /kg),具有良好的耐受性。9 例接受异体骨髓 MSCs 治疗的患者均未观察到不良反应和剂量限制性毒性。在这项 I 期临床试验结束后,一个随机多中心的 II 期临床试验从 2014 年到 2018 年在美国进行(NCT02097641)。该试验招募 60 名成年 ARDS 患者,分别给予单剂量同种异体骨髓 MSCs (1000 万 cells/kg)或安慰剂治疗。结果尚未见报告。

20 在另一项静脉注射同种异体脂肪组织来源的 MSCs 治疗 ARDS 的 I 期临床试验(NCT01902082),纳入 12 例成人 ARDS 患者,一次静脉注射同种异体脂肪 MSCs (100 万 cells /kg),但 AT-MSCs 治疗并不能显著降低 ARDS 患者血清炎症细胞因子(IL-6 和 IL-8)水平,也不能改善 ARDS 患者的肺功能,预示这是一个安全但无效的治疗研究。

最近研究发现, MSCs 产生的微囊泡(extracellular vesicles, EVs),促进肺泡 25 巨噬细胞的吞噬活性,从而减轻革兰氏阴性大肠杆菌诱导的细菌性肺炎[Monseil A, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2015, 192(3): 324 - 336.]。此外, MSCs 产生抗菌蛋白,能够直接抑制炎症肺内的细菌生长。

气管内注射 MSCs 可显著减轻肺损伤和炎症反应,并通过以脂钙素-2 依赖的方式促进细菌清除,从而提高实验动物细菌性肺炎的存活率。LPS 诱导的 MSCs 中 TLR-4 的 30 激活,增强了脂钙素-2 的分泌,而脂钙素-2 可以结合细菌的铁载体,减少铁的吸收,抑制细菌的生长。与这些发现相一致的是最近报道的研究结果:在细菌性肺炎的实验模型中, Gupta 等[Gupta N, et al. Thorax 2012, 67(6): 533 - 539]发现 MSCs 中 TLR-4 的突变显著地削弱了它们的治疗效果。因此,预示一种潜在的新的基于细胞的治疗方法,可能消除肺部的抗生素耐药性革兰氏阴性菌株。

35 本发明的研究表明,间充质干细胞膜外囊泡的显著优势。干细胞在多种疾病的治

疗中具有巨大的潜力。干细胞治疗效果很大程度上依赖于其旁分泌的细胞因子和膜外囊泡(extracellular vesicles, EVs)或外泌体(exosomes)所介导的。

EVs 是一种纳米大小的膜结构囊泡,具有细胞与细胞间通讯的中介功能。MSCs 来源的 EVs 包含细胞因子、生长因子、信号脂质、mRNA、miRNA/siRNA 等物质。

- 5 越来越多的研究证据表明, MSC-EVs 可能代表一种新的无细胞治疗方法,与现有的 MSCs 疗法相比,具有明显的优势: 1)在体内无肿瘤形成风险; 2)较低的免疫原性; 3)EVs 可以来源于内源性 MSCs,也可以由异体人 MSCs 培养过程中的上清液(条件培养基)经分离纯化获得,可以满足临床级规模化生产和纯化,批次产量高,便于批次质量控制检测; 4)可以对产生 EVs 的特定增殖代次的种子干细胞进行体外修饰,富集更加特异性的 EVs,用于不同的治疗目的; 5)单个悬浮状态的 MSC 直径(18-40 μm)是红细胞直径(6 μm)的 3-7 倍,易于沉积和粘连形成微凝块。经静脉注射后,有堵塞微血管的风险。EVs 为 50-500nm 直径范围内的纳米膜结构囊泡,在水溶液中分散性好,易于制成注射制剂; 6)EVs 具有很好的膜结构稳定性,对低温冻存和冻融过程有较强的耐受性; 7)因 EVs 的膜结构特点和纳米粒子特性,可被靶组织细胞主动吞噬摄取,进而获得 EVs 携带的生物信息和(或)活性药物,以发挥 EVs 对细胞的直接信号传导和药物靶向递送功能。8)EVs 可以被装载某些活性药物,成为一种天然的药物递送系统。9)多个研究小组已经报道了 MSC 衍生的 EVs 的治疗潜力。MSCs-EVs 有可能作为未来 ARDS 的生物标志物和治疗制剂。MSCs-EVs 在 ARDS 恢复过程中似乎也起着关键作用。
- 10
- 15

- 多项研究发现, MSC 来源的微囊泡(microvesicles, MVs)经气道或静脉给药途径具有治疗优势。Zhu 等的研究表明,在大肠杆菌内毒素诱导的肺损伤中,气管内灌注 MSCs 衍生的 MVs 可以减少肺组织细胞外含水量,减少肺水肿,降低肺泡膜对蛋白质通透性。MSC-MVs 还减少了中性粒细胞的流入,降低了巨噬细胞炎症蛋白-2 在肺泡灌洗液(BAL)中的水平。
- 20

- MSCs 通过 EVs 介导的线粒体转移来调节 ALI 中的巨噬细胞。MSC-MVs 中含有大量的血管生成素-1,而巨噬细胞上 MSCs 的免疫调节特性部分是通过向巨噬细胞转移血管生成素-1 mRNA 介导的。MSCs 外泌体(exosome)通过肝细胞生长因子(HGF),减少内皮细胞凋亡、增加 IL-10 的产生和减少 IL-6 的产生,部分地改善了 LPS 诱导的小鼠急性肺损伤模型的肺微血管通透性。
- 25

- MSCs-MVs 可恢复肺泡膜紧密联接的完整性,也可减低 IL-1 β 、TNF- α 和 IFN- γ 对人肺微血管内皮细胞渗透性增强作用。抗 CD44 和血管生成素-1 siRNA 预处理,可以消除 MSCs-MVs 的这种治疗作用,表明 CD-44 和血管生成素-1 mRNA 转移,参与了 MSCs-MVs 的修复治疗机制。可以通过预处理 MSCs 来丰富 MVs 亚群的表达,从而增加其治疗潜力。
- 30

- 35 基于本发明人的研究,提供了以下各项发明:

发明项 1:一种含有人体细胞衍生的活性物质的药物制剂, 该制剂的成分的稳定性好, 分散度高, 易于被人体除皮肤以外的局部所吸收, 适用于预防和治疗各种原因导致的炎症和损伤。

5 **发明项 2:**发明项 1 所述的人体细胞衍生的活性物质, 其中, 包括但不限于人体组织、骨髓和血液来源的干细胞、祖细胞和免疫细胞所产生的细胞膜外囊泡与可溶性活性细胞因子。

发明项 3:发明项 1 所述的药物制剂, 其中, 包括但不限于雾化吸入液、滴眼液、滴鼻液。

10 **发明项 4:**发明项 1 所述的药物制剂稳定性好, 其中, 包括但不限于在常温条件下保存、-20℃以下保存、-70℃以下低温条件下保存、-135℃以下低温条件下保存、-196℃低温条件下保存, 其活性物质的稳定性显著优于相同条件下含有活细胞制剂的保存时间。

发明项 5:发明项 1 所述的药物制剂分散度高, 其中, 在 0-25℃条件下, 静置 6-24 小时, 呈现无色透明, 且无肉眼可见的絮状物和沉淀物。

15 **发明项 6:**发明项 1 所述的药物制剂易于在人体除皮肤以外的其他部位使用, 其中, 这些部位包括但不限于眼球结膜、眼睑结膜、视网膜、口腔、鼻腔、上呼吸道、下呼吸道、胃肠道、血管内皮细胞、肺泡 1 型上皮细胞、肺泡 2 型上皮细胞、单核巨噬细胞、中性粒细胞、树突状细胞、抗原递呈细胞、T 淋巴细胞、纤维母细胞、中枢神经细胞、周围神经细胞及其末梢神经纤维。

20 **发明项 7:**发明项 1 所述的药物制剂, 适用于预防和治疗各种原因所致的炎症和损伤, 其中, 包括但不限于病毒感染性炎症、细菌感染性炎症、真菌感染性炎症、自身免疫反应性炎症、缺血性损伤、化学性损伤、物理性损伤。

发明项 8:发明项 2 所述的人体组织、骨髓和血液来源的干细胞、祖细胞和免疫细胞, 其中, 包括但不限于人体脂肪组织来源的间充质干细胞、人体肺组织来源的肺泡上皮祖细胞、人体脐带华通氏胶来源的间充质干细胞、人体子宫内膜组织来源的间充质干细胞、人体胎盘组织来源的干细胞、人体胎盘羊膜来源的上皮细胞、人体血液中的单个核细胞、人体骨髓组织中的造血干细胞、人体骨髓组织中的间充质干细胞、人体骨膜来源的间充质干细胞、人体皮肤组织来源的角质细胞、人体血液组织来源的树突状细胞、人体血液组织来源的 CD4 阳性 T 淋巴细胞、人体血液组织来源的血小板。

30 **发明项 9:**发明项 2 所述的人体细胞衍生的细胞膜外囊泡, 其中, 包括但不限于由脂质双分子层膜结构包绕形成的纳米囊泡, 直径在 30-1000 纳米之间、内含丰富的不同种类的、具有特定功能的微小核糖核酸(miRNA)、小核糖核酸(sRNA)、非编码的 DNA 片段、转运核糖核酸 t-RNA、可溶性细胞因子、生长因子、其他蛋白质。

35 **发明项 10:**发明项 2 所述的人体细胞衍生的可溶性活性细胞因子, 其中, 包括但不限于由可溶性的游离的脂蛋白质分子、糖蛋白分子、生物信号分子、组织生长因子

B(TGF β)、干细胞生长因子(HGF)血管内皮细胞生长因子(VEGF)、表皮细胞生长因子(KGF)、白细胞介素-10(IL-10)、白细胞介素-1受体拮抗剂(IL-1 β A)。

发明项 11: 发明项 2 和发明项 10 中所述的人体细胞衍生的可溶性活性细胞因子, 其中, 包括但不限于由自然状态下培养的人体细胞旁分泌所产生的、用特定基因修饰人体细胞超表达产生的。

发明项 12: 发明项 2 和发明项 9 所述的细胞膜外囊泡, 其中, 特异性表达膜蛋白标志物 CD9、CD63、CD81 和 TSG101, 不表达 CANX。细胞膜外囊泡其直径优选为 50-500nm。

发明项 13: 发明项 2 和发明项 8 所述的人体组织、骨髓和血液来源的干细胞、祖细胞和免疫细胞, 其中, 这些细胞可以从人体组织直接分离纯化所获得, 或这些细胞可以从人体组织直接分离纯化后, 再经过 GMP 实验室最小程度的操作, 使这些细胞增殖后所得, 或这些细胞在 GMP 实验室经过特定基因修饰、特定基因编辑、特定基因转导、特定微小核糖核酸 miRNA 的导入所得, 或这些细胞在 GMP 实验室经过特殊培养条件的预处理所得。

发明项 14: 发明项 2 和发明项 8 所述的人体组织、骨髓和血液来源的干细胞、祖细胞和免疫细胞, 其中, 这些细胞优选为脂肪来源的间充质干细胞、胎盘羊膜来源的间充质干细胞。

发明项 15: 发明项 2、发明项 8、发明项 13、发明项 14 中所述的人体组织、骨髓和血液来源的干细胞、祖细胞和免疫细胞, 进一步优选为脂肪来源的间充质干(祖)细胞、胎盘羊膜来源的间充质干细胞。

发明项 16: 发明项 15 所述的进一步优选为脂肪来源的干(祖)细胞, 其中, 经过伦理审查备案的、签署知情同意书的、经过严格实验室检查符合脂肪组干细胞产品建库入组标准的男性或女性健康志愿者, 经过腹壁穿刺抽脂、或腹壁手术切取脂肪, 置于专利保护的细胞保存液中保存的、低温运输至合格的 GMP 实验室, 经过专利保护的分离、纯化、增殖的脂肪间充质祖细胞产品的工作库细胞(中间产品)。

发明项 17: 发明项 15 和发明项 16 所述的进一步优选的人体脂肪组织来源的间充质祖细胞, 其中, 这种特定的人体脂肪组织来源的间充质干(祖)细胞是在 GMP 生产实验室, 按照中间产品生产工艺流程生产的、符合各种病原学检测阴性标准的、符合特定表面标志物如 CD73 阳性、CD90 阳性、CD105 阳性细胞百分率大约 98%, CD34 阳性、CD45 阳性和 HLA-DR 阳性的细胞百分率小于 2%的、符合抗生素残余和血清及血清替代物残余检测标准的、P1-P6 代脂肪间充质干(祖)细胞, 进一步优选为 P3-P4 代脂肪间充质干(祖)细胞。

发明项 18: 发明项 15-17 所述的进一步优选的脂肪组织来源的间充质干(祖)细胞为-196℃至-80℃深低温条件下储存 0-36 个月的, 进一步优选为-196℃至-135℃, 储存 0-24 个月的。

发明项 19: 发明项 2 和发明项 9-12 所述的人体细胞衍生的细胞膜外囊泡及可溶

性活性细胞因子，其中，其生产工艺是：

(1)通过接种这些类型的人体细胞于含 5% EliteGro 的 α MEM 基础培养基中，在 HyperFlask 培养瓶中培养，培养条件为 37℃，5% CO₂，至细胞融合度达到 80%，再使用特定的预处理培养基进行培养，培养条件为 37℃，5%CO₂，培养 48 小时。

5 (2)收集细胞培养上清液，进行差速离心联合聚乙二醇(PEG)沉淀法分离。

发明项 20：发明项 19 所述的生产工艺(2)中所述的差速离心联合聚乙二醇 PEG 沉淀，其中，使用 PEG3000-PEG9000，用 PBS 配置为 8%-30%的 PEG，用 0.22 μ m 的过滤器过滤后，按照 1:1 体积比加入到处理后的条件培养基中，置于 4℃过夜孵育后，4℃，
10 100000-120000g 超高速离心 60-120 分钟，弃去上清，加入适量等渗氯化钠溶液，重悬沉淀，即可获得人体细胞衍生的细胞膜外囊泡及可溶性活性细胞因子。

发明项 21：发明项 19 和发明项 20 所述的生产工艺获得的细胞膜外囊泡，其特征为生物标志物 CD9 阳性、CD63 阳性、CD81 阳性、TSG101 阳性和 CANX 阴性。

发明项 22：发明项 19-21 所述的生产工艺，其中，在 GMP 实验室条件下，可以放
15 大到细胞制品临床级生产规模，其突出优势为：1 个生产操作单元可以分离 2 个细胞工厂所获得的 800-1200ml 条件培养基，可分离获得 $2-5 \times 10^{11}$ 细胞膜外囊泡。按照一个病人 $2-5 \times 10^9$ 的细胞膜外囊泡局部使用的总剂量计算，一个生产操作单元，一个批次的生产量可以满足 100-250 个病人的局部使用量。100 个生产操作单元，一个批次生产量可达到 10000-25000 人使用总量，用时 5-6 天。

20 **发明项 23：**发明项 19-22 所述的生产工艺，其中，分离获得的细胞膜外囊泡、可溶性活性细胞因子与特定分子量的 PEG 交联成小于 3 微米的亲水性粒子，在-196℃至-20℃冻存条件下的稳定性和在常温水溶液中的分散性都优于现有技术。

发明项 24：发明项 23 所述的细胞膜外囊泡、可溶性活性细胞因子及聚乙二醇 PEG 交联的亲水粒子，其中，包括但不限于其在等渗氯化钠溶液、低分子透明质酸溶液、
25 人工泪液、凝胶溶液中，制备成雾化吸入液、滴眼液、滴鼻液外用凝胶制剂。局部粘膜细胞对本发明工艺所获得的细胞膜外囊泡的摄取不受 PEG 的影响。

发明项 25：发明项 1 和发明项 23-24 所述的含有人体细胞膜外囊泡及可溶性活性细胞因子的药物制剂，优先选择制备雾化吸入剂，适于治疗感染性肺损伤。

发明项 26：发明项 1 和发明项 25 所述药物制剂，其中，优选脂肪组织来源的干(祖)
30 细胞和胎盘羊膜来源的间充质干细胞衍生的膜外囊泡和可溶性细胞因子与等渗氯化钠水溶液制备的雾化吸入液，适用于病毒，包括但不限于流感病毒、SARS 冠状病毒、SARS 冠状病毒 2、MERS 冠状病毒感染，所引起的急性肺损伤雾化吸入治疗，以达到阻止急性肺损伤炎症因子的释放、减轻肺泡内高蛋白液的渗入和肺泡上皮细胞损伤、显著提高急性肺损伤患者的抢救成功率、以及改善存活患者肺功能和生活质量。

在本发明提及的所有文献都在本申请中引用作为参考，就如同每一篇文献被单独引用作为参考那样。此外应理解，在阅读了本发明的上述讲授内容之后，本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

权 利 要 求

1. 一种药物组合物，其特征在于，所述的药物组合物含有(a) 人的体细胞衍生的活性物质，所述的活性物质为人的体细胞所产生的细胞膜外囊泡；和(b) 药
5 学上可接受的载体。

2. 如权利要求 1 所述的药物组合物，其特征在于，所述的体细胞选自下组：人体组织、骨髓和/或血液来源的干细胞、祖细胞、免疫细胞、或其组合。

3. 如权利要求 1-2 中任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的药物组合物的剂型选自下组：雾化吸入剂、滴眼液、滴鼻液。

10 4. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的药物组合物具有以下特性：

(P1) 优于活细胞制剂的保存稳定性；优选地，所述的保存包括在常温和/或低温下进行保存；所述的“优于活细胞制剂的保存稳定性”指所述的药物组合物的稳定性优于相同条件下含活细胞制剂的稳定性；和

15 (P2) 高分散性；较佳地，当所述药物组合物为含水的液态制剂时(如以生理盐水配制的溶液时)，在 0-25℃放置 6-24 小时，呈现无色透明，且无肉眼可见的絮状物和沉淀物。

5. 如权利要求 1-4 中任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的药物组合物被施用于选自下组的部位：眼球结膜、眼睑结膜、视网膜、口腔、鼻腔、上呼
20 吸道、下呼吸道、胃肠道、肺部、或其组合。

6. 如权利要求 1-5 中任一项所述的药物组合物，其特征在于，所述的细胞膜外囊泡的直径优选为 50-500nm。

7. 一种制备细胞膜外囊泡的方法，其特征在于，包括步骤：

(S1) 培养人的体细胞，使其达到预定的汇合度(如 75-90%)；

25 (S2) 在适合产生 EV 的条件下，继续培养所述的细胞一段时间 T1；

(S3) 从培养体系中去除细胞，从而分离获得含细胞膜外囊泡的培养液，即为“条件培养液(conditioned medium)”；

(S4) 将所述的条件培养液与聚乙二醇(PEG)进行混合，形成第一混合物，并放置一段时间 T2，从而形成经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡；其中，所述的 T2 通常为
30 6-60 小时，较佳地 12-48 小时；

(S5) 对上一步骤的第一混合物进行离心，使得所述的经 PEG 修饰的细胞膜外

囊泡沉淀，并弃去上清，获得经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀；

(S6) 对上一步骤获得的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀进行重悬，从而获得第一重悬混合物；

5 (S7) 对第一重悬混合物进行离心，使所述的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀，并弃去上清，获得经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀；

(S8) 对上一步骤中获得的经 PEG 修饰的细胞膜外囊泡沉淀进行重悬，从而获得可医用的细胞膜外囊泡制剂。

8. 一种细胞膜外囊泡制剂，其特征在于，所述的细胞膜外囊泡制剂是用权利要求 7 所述的方法制备的。

10 9. 一种权利要求 1-6 中任一项所述的药物组合物或权利要求 8 所述的细胞膜外囊泡制剂的用途，其特征在于，被用于制备预防和/或治疗炎症、或损伤的药物。

10. 如权利要求 9 所述的用途，其特征在于，所述的炎症选自下组：病毒感染性炎症、细菌感染性炎症、真菌感染性炎症、自身免疫反应性炎症、或其组合；

15 所述的损伤选自下组：缺血性损伤、缺氧性损伤、化学性损伤、物理性损伤、或其组合。

11. 如权利要求 9 所述的用途，其特征在于，所述的药物用于治疗急性呼吸窘迫综合征。

12. 如权利要求 9 所述的用途，其特征在于，所述的药物为雾化吸入液。

20 13. 如权利要求 9 所述的用途，其特征在于，所述的药物用于治疗病毒性急性肺损伤。

14. 如权利要求 13 所述的用途，其特征在于，所述的药物通过雾化吸入治疗，从而达到阻止急性肺损伤炎症因子的释放、减轻肺泡内高蛋白液的渗入和肺泡上皮细胞损伤。






图 2






图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 10




图 11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2021/080869

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61K 48/00(2006.01)i; A61K 9/127(2006.01)i; A61K 9/00(2006.01)i; A61P 11/00(2006.01)i; C12N 5/0775(2010.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61K, A61P, C12N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNABS, VEN(DWPI+SIPOABS), CNTXT, EPTXT, USTXT, WOTXT, 中国药物专利数据库, CTCMPD, CNKI, 百度学术搜索, Baidu Academic Search, ISI-WEB OF SCIENCE: 细胞膜外囊泡, extracellular vesicle?, 外泌体, exosome?, 微囊泡, microvesicle?, 凋亡小体, apoptotic bodies, 聚乙二醇, PEG, 滴鼻剂, 滴眼剂, 雾化, nose, eye, aerosol

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2020030817 A1 (OMNISPIRANT LIMITED) 13 February 2020 (2020-02-13) the abstract, description, page 1, lines 4-9 and 29-34, page 6, lines 7-11 and 32-34, page 7, lines 1-4 and 21-26, page 8, lines 8-11 and 16-20, page 9, line 33 to page 10, line 3 and page 15, lines 26-30, embodiments 1 and 2, and claims 1-21	1-14
X	CN 107137426 A (TIANJIN PURUI SAIER BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD.) 08 September 2017 (2017-09-08) claims 1-3	1-14
X	CN 110312515 A (UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA; FONDAZIONE CITTA DELLA SPERANZA-ONLUS) 08 October 2019 (2019-10-08) claims 1-19, and description, paragraph [0049]	1-14
X	CN 105267240 A (TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY EYE HOSPITAL) 27 January 2016 (2016-01-27) claims 1-5, and description, paragraphs [0012]-[0019]	1-14
X	CN 109419770 A (XIAMEN AISAI BIOTECHNOLOGY CO., LTD.) 05 March 2019 (2019-03-05) claims 1-10	1-14



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 May 2021

Date of mailing of the international search report

10 June 2021

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/
CN)
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing
100088
China

Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2021/080869**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 110072991 A (VBC HOLDINGS LLC; NIAZI KAYVAN) 30 July 2019 (2019-07-30) claims 1-28, and description, paragraph [0076]	1-14
X	CN 110072534 A (VBC HOLDINGS LLC; NIAZI KAYVAN) 30 July 2019 (2019-07-30) claims 1-25, and description, paragraphs [0112], [0014] and [0151]	1-14
A	CN 105796599 A (CELLULAR BIOMEDICINE GROUP (SHANGHAI) CO., LTD.) 27 July 2016 (2016-07-27) entire document	1-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2021/080869

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
WO	2020030817	A1	13 February 2020	CA	3108605	A1	13 February 2020
				AU	2019316742	A1	11 February 2021
CN	107137426	A	08 September 2017	None			
CN	110312515	A	08 October 2019	AU	2017374947	A8	16 January 2020
				CA	3052739	A1	21 June 2018
				WO	2018109700	A1	21 June 2018
				EP	3554513	A1	23 October 2019
				WO	2018109525	A1	21 June 2018
				AU	2017374947	A1	01 August 2019
CN	105267240	A	27 January 2016	CN	105267240	B	14 May 2019
CN	109419770	A	05 March 2019	None			
CN	110072991	A	30 July 2019	EP	3526318	A1	21 August 2019
				US	2020046779	A1	13 February 2020
				WO	2018071682	A1	19 April 2018
CN	110072534	A	30 July 2019	US	2021024893	A1	28 January 2021
				WO	2018071677	A1	19 April 2018
				EP	3525801	A1	21 August 2019
CN	105796599	A	27 July 2016	None			

国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2021/080869

A. 主题的分类 A61K 48/00(2006.01)i; A61K 9/127(2006.01)i; A61K 9/00(2006.01)i; A61P 11/00(2006.01)i; C12N 5/0775(2010.01)i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类		
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) A61K, A61P, C12N 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNABS, VEN(DWPI+SIP0ABS), CNTXT, EPTXT, USTXT, WOTXT, 中国药物专利数据库, CNKI, 百度学术搜索, ISI-WEB OF SCIENCE: 细胞膜外囊泡, extracellular vesicle?, 外泌体, exosome?, 微囊泡, microvesicle?, 凋亡小体, apoptotic bodies, 聚乙二醇, PEG, 滴鼻剂, 滴眼剂, 雾化, nose, eye, aerosol		
C. 相关文件		
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
X	WO 2020030817 A1 (OMNISPIRANT LTD) 2020年 2月 13日 (2020 - 02 - 13) 摘要, 说明书第1页第4-9、29-34行, 第6页第7-11、32-34行, 第7页第1-4、21-26行, 第8页第8-11、16-20行, 第9页第33行-第10页第3行, 第15页第26-30行, 实施例1、2, 权利要求1-21	1-14
X	CN 107137426 A (天津普瑞赛尔生物科技有限公司) 2017年 9月 8日 (2017 - 09 - 08) 权利要求1-3	1-14
X	CN 110312515 A (帕多瓦大学 希望之城基金会-非营利性社会组织) 2019年 10月 8日 (2019 - 10 - 08) 权利要求1-19, 说明书第0049段	1-14
X	CN 105267240 A (天津医科大学眼科医院) 2016年 1月 27日 (2016 - 01 - 27) 权利要求1-5, 说明书第0012-0019段	1-14
X	CN 109419770 A (厦门艾赛生物科技有限公司) 2019年 3月 5日 (2019 - 03 - 05) 权利要求1-10	1-14
X	CN 110072991 A (VBC控股有限责任公司 K 尼亚齐) 2019年 7月 30日 (2019 - 07 - 30) 权利要求1-28, 说明书0076段	1-14
☒ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。		
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件		
国际检索实际完成的日期 2021年 5月 24日		国际检索报告邮寄日期 2021年 6月 10日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局(ISA/CN) 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088 传真号 (86-10)62019451		受权官员 尹婷 电话号码 86-(010)-62411039

C. 相关文件		
类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
X	CN 110072534 A (VBC控股有限责任公司 K 尼亚齐) 2019年 7月 30日 (2019 - 07 - 30) 权利要求1-25, 说明书第0112、0014、0151段	1-14
A	CN 105796599 A (西比曼生物科技上海有限公司) 2016年 7月 27日 (2016 - 07 - 27) 全文	1-14

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2021/080869

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利		公布日 (年/月/日)
WO	2020030817	A1	2020年 2月 13日	CA	3108605	A1 2020年 2月 13日
				AU	2019316742	A1 2021年 2月 11日
CN	107137426	A	2017年 9月 8日	无		
CN	110312515	A	2019年 10月 8日	AU	2017374947	A8 2020年 1月 16日
				CA	3052739	A1 2018年 6月 21日
				WO	2018109700	A1 2018年 6月 21日
				EP	3554513	A1 2019年 10月 23日
				WO	2018109525	A1 2018年 6月 21日
				AU	2017374947	A1 2019年 8月 1日
CN	105267240	A	2016年 1月 27日	CN	105267240	B 2019年 5月 14日
CN	109419770	A	2019年 3月 5日	无		
CN	110072991	A	2019年 7月 30日	EP	3526318	A1 2019年 8月 21日
				US	2020046779	A1 2020年 2月 13日
				WO	2018071682	A1 2018年 4月 19日
CN	110072534	A	2019年 7月 30日	US	2021024893	A1 2021年 1月 28日
				WO	2018071677	A1 2018年 4月 19日
				EP	3525801	A1 2019年 8月 21日
CN	105796599	A	2016年 7月 27日	无		