

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
18. April 2002 (18.04.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/30870 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **C07C 217/52**,
A61K 31/133, A61P 23/00, C07C 233/41

Babette-Yvonne [DE/DE]; Am Daens 28, 52379 Langer-
wehe-Hamich (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP01/11246

(22) Internationales Anmeldedatum:
28. September 2001 (28.09.2001)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
100 49 481.1 29. September 2000 (29.09.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **GRÜNENTHAL GMBH** [DE/DE]; Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SUNDERMANN, Bernd** [DE/DE]; Oppenhoffallee 83 - 85, 52066 Aachen (DE). **MAUL, Corinna** [DE/DE]; Oppenhoffallee 83 - 85, 52066 Aachen (DE). **BUSCHMANN, Helmut** [DE/DE]; Austraße 2, 52066 Aachen (DE). **FINKAM, Michael** [DE/DE]; Salierallee 18, 52066 Aachen (DE). **KÖGEL,**

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.



WO 02/30870 A2

(54) Title: SUBSTITUTED C-CYCLOHEXYLMETHYLAMINE DERIVATIVES

(54) Bezeichnung: SUBSTITUIERTE C-CYCLOHEXYLMETHYLAMIN-DERIVATE

(57) Abstract: The invention relates to substituted C-cyclohexylmethylamine derivatives, methods for the production thereof, pharmaceuticals containing said compounds and the use of substituted C-cyclohexylmethylamine derivatives for producing pharmaceuticals.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung, Arzneimittel enthaltend diese Verbindungen und die Verwendung von substituierten C-Cyclohexylmethylamin-Derivaten zur Herstellung von Arzneimitteln.

Patentanmeldung der Grünenthal GmbH, D-52078 Aachen
(eigenes Zeichen G 3020)

5

Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate

Die vorliegende Erfindung betrifft substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung, Arzneimittel enthaltend diese Verbindungen und die
10 Verwendung von substituierten C-Cyclohexylmethylamin-Derivaten zur Herstellung von Arzneimitteln.


Die Behandlung chronischer und nichtchronischer Schmerzzustände hat in der Medizin eine große Bedeutung. Es besteht ein weltweiter Bedarf an gut wirksamen
15 Schmerztherapien. Der dringende Handlungsbedarf für eine patientengerechte und zielorientierte Behandlung chronischer und nicht chronischer Schmerzzustände, wobei hierunter die erfolgreiche und zufriedenstellende Schmerzbehandlung für den Patienten zu verstehen ist, dokumentiert sich in der großen Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten, die auf dem Gebiet der angewandten Analgetik bzw. der
20 Grundlagenforschung zur Nociception in letzter Zeit erschienen sind.

Klassische Opiode wie Morphin sind bei der Therapie starker bis stärkster Schmerzen gut wirksam. Ihr Einsatz wird jedoch durch die bekannten Nebenwirkungen z.B. Atemdepression, Erbrechen, Sedierung, Obstipation und
25 Toleranzentwicklung limitiert. Außerdem sind sie bei neuropathischen oder inzidentiellen Schmerzen, unter denen insbesondere Tumorpatienten leiden, weniger wirksam.

Eine der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe bestand darin, neue analgetisch wirksame Substanzen zur Verfügung zu stellen, die sich zur Schmerztherapie -
30 insbesondere auch chronischer und neuropathischer Schmerzen - eignen.

Gegenstand der Erfindung sind daher substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate der allgemeinen Formel I,

2



I

5

, bei denen

A ausgewählt ist aus H; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

10

R¹ ausgewählt ist aus C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl, Heteroaryl, über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem C₃₋₁₀-Cycloalkyl, oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

20

F, Cl, Br, I, OR¹⁸, SR¹⁸, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Silyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

25

mit R^{18} ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

R^{19} und R^{20} unabhängig voneinander ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

oder R^{19} und R^{20} zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^{21}CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bilden,

mit R^{21} ausgewählt aus H; Phenyl, unsubstituiert oder substituiert; C_{1-10} -Alkyl gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

R^2 und R^3 , unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder


unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-,
 oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
 unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-
 Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils
 5 einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R² und R³ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂,
 CH₂CH₂NR⁶CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bedeuten,

10 mit R⁶ ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils
 gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder
 mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl,
 jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder
 über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen
 15 gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach
 oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;


X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I

(Teilformel Ia)



20

ausgewählt ist aus den folgenden Bedeutungen



mit B ausgewählt aus OH, OR⁷, H, F, Cl oder NR⁸R⁹,

mit R⁷ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl,
jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt,
einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-,
oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt,
oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder
Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert;

R⁸ und R⁹, unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H;
C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder
ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach
substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, einfach
oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-
Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen
gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils
einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;


oder die Reste R⁸ und R⁹ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂,
CH₂CH₂NR¹⁰CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden

mit R¹⁰ ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-
Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt
oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder
mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-


6

Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen
gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl,
jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert,

5



ausgewählt ist aus



10

mit R⁴ ausgewählt aus H, COR⁵, SO₂R⁵; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-
Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder
unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;
Aryl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder
C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl,
jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

15

mit R⁵ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl,
jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt,
einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-,
oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt,
oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder
Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert,

20

25

mit V ausgewählt aus OR^4 oder NR^4R^{11} ,

mit W ausgewählt aus R^{11} , OR^{12} oder $NR^{11}R^{12}$,

5

mit R^{11} und R^{12} unabhängig voneinander ausgewählt aus H,
C₇₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder
ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach
substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils
einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder
über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen
gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils
einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

10

gegebenenfalls in Form ihrer Racemate, ihrer reinen Stereoisomeren,
insbesondere Enantiomeren oder Diastereomeren, oder in Form von
Mischungen der Stereoisomeren, insbesondere der Enantiomeren oder
Diastereomeren, in einem beliebigen Mischungsverhältnis; in dargestellter Form
oder in Form ihrer Säuren oder ihrer Basen oder in Form ihrer Salze,
insbesondere der physiologisch verträglichen Salze, oder in Form ihrer Solvate,
insbesondere der Hydrate.

20

Die erfindungsgemäßen Verbindungen zeigen hervorragende analgetische
Eigenschaften.

25

Im Sinne dieser Erfindung versteht man unter Alkyl- bzw. Cykloalkyl-Resten
gesättigte und ungesättigte (aber nicht aromatische), verzweigte, unverzweigte und
cyclische Kohlenwasserstoffe, die unsubstituiert oder ein- oder mehrfach substituiert
sein können. Dabei steht C₁₋₂-Alkyl für C1- oder C2-Alkyl, C₁₋₃-Alkyl für C1-, C2- oder
C3-Alkyl, C₁₋₄-Alkyl für C1-, C2-, C3- oder C4-Alkyl, C₁₋₅-Alkyl für C1-, C2-, C3-, C4-
oder C5-Alkyl, C₁₋₆-Alkyl für C1-, C2-, C3-, C4-, C5- oder C6-Alkyl, C₁₋₇-Alkyl für C1-,

30

C2-, C3-, C4-, C5-, C6- oder C7-Alkyl, C₁₋₈-Alkyl für C1-, C2-, C3-, C4-, C5-, C6-, C7- oder C8-Alkyl, C₁₋₁₀-Alkyl für C1-, C2-, C3-, C4-, C5-, C6-, C7-, C8-, C9- oder C10-Alkyl und C₁₋₁₈-Alkyl für C1-, C2-, C3-, C4-, C5-, C6-, C7-, C8-, C9-, C10-, C11-, C12-, C13-, C14-, C15-, C16-, C17- oder C18-Alkyl. Weiter steht C₃₋₄-Cycloalkyl für C3- oder C4-Cycloalkyl, C₃₋₅-Cycloalkyl für C3-, C4- oder C5-Cycloalkyl, C₃₋₆-Cycloalkyl für C3-, C4-, C5- oder C6-Cycloalkyl, C₃₋₇-Cycloalkyl für C3-, C4-, C5-, C6- oder C7-Cycloalkyl, C₃₋₈-Cycloalkyl für C3-, C4-, C5-, C6-, C7- oder C8-Cycloalkyl, C₄₋₅-Cycloalkyl für C4- oder C5-Cycloalkyl, C₄₋₆-Cycloalkyl für C4-, C5- oder C6-Cycloalkyl, C₄₋₇-Cycloalkyl für C4-, C5-, C6- oder C7-Cycloalkyl, C₅₋₆-Cycloalkyl für C5- oder C6-Cycloalkyl und C₅₋₇-Cycloalkyl für C5-, C6- oder C7-Cycloalkyl. In Bezug auf Cycloalkyl umfaßt der Begriff auch gesättigte Cycloalkyle, in denen ein oder 2 Kohlenstoffatome durch ein Heteroatom, S, N oder O ersetzt sind. Unter den Begriff Cycloalkyl fallen aber insbesondere auch ein- oder mehrfach, vorzugsweise einfach, ungesättigte Cycloalkyle ohne Heteroatom im Ring, solange das Cycloalkyl kein aromatisches System darstellt. Vorzugsweise sind die Alkyl- bzw. Cycloalkyl-Reste Methyl, Ethyl, Vinyl (Ethenyl), Propyl, Allyl (2-Propenyl), 1-Propinyl, Methylethyl, Butyl, 1-Methylpropyl, 2-Methylpropyl, 1,1-Dimethylethyl, Pentyl, 1,1-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 2,2-Dimethylpropyl, Hexyl, 1-Methylpentyl, Cyclopropyl, 2-Methylcyclopropyl, Cyclopropylmethyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclopentylmethyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl, Cyclooctyl, aber auch Adamantyl, CHF₂, CF₃ oder CH₂OH sowie Pyrazolinon, Oxopyrazolinon, [1,4]Dioxan oder Dioxolan.

Dabei versteht man im Zusammenhang mit Alkyl und Cycloalkyl – solange dies nicht ausdrücklich anders definiert ist - unter dem Begriff substituiert im Sinne dieser Erfindung die Substitution mindestens eines (gegebenenfalls auch mehrerer) Wasserstoffreste(s) durch F, Cl, Br, I, NH₂, SH oder OH, wobei unter „mehrfach substituiert“ bzw. „substituiert“ bei mehrfacher Substitution zu verstehen ist, daß die Substitution sowohl an verschiedenen als auch an gleichen Atomen mehrfach mit den gleichen oder verschiedenen Substituenten erfolgt, beispielsweise dreifach am gleichen C-Atom wie im Falle von CF₃ oder an verschiedenen Stellen wie im Falle von -CH(OH)-CH=CH-CHCl₂. Besonders bevorzugte Substituenten sind hier F, Cl und OH. In Bezug auf Cycloalkyl kann der Wasserstoffrest auch durch OC₁₋₃-Alkyl oder C₁₋₃-Alkyl (jeweils ein- oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert),

insbesondere Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, CF₃, Methoxy oder Ethoxy, ersetzt sein.

Unter dem Begriff (CH₂)₃₋₆ ist -CH₂-CH₂-CH₂-, -CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-, -CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂- und CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂- zu verstehen, unter (CH₂)₁₋₄ ist -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -CH₂-CH₂-CH₂- und -CH₂-CH₂-CH₂-CH₂- zu verstehen, unter (CH₂)₄₋₅ ist -CH₂-CH₂-CH₂-CH₂- und -CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂- zu verstehen, etc.

Unter einem Aryl-Rest werden Ringsysteme mit mindestens einem aromatischen Ring aber ohne Heteroatome in auch nur einem der Ringe verstanden. Beispiele sind Phenyl-, Naphthyl-, Fluoranthenyl-, Fluorenyl-, Tetralinyl- oder Indanyl, insbesondere 9H-Fluorenyl- oder Anthracenyl-Reste, die unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert sein können.

Unter einem Heteroaryl-Rest werden heterocyclische Ringsysteme mit mindestens einem ungesättigten Ring verstanden, die ein oder mehrere Heteroatome aus der Gruppe Stickstoff, Sauerstoff und/oder Schwefel enthalten und auch einfach oder mehrfach substituiert sein können. Beispielhaft seien aus der Gruppe der Heteroaryle Furan, Benzofuran, Thiophen, Benzothiophen, Pyrrol, Pyridin, Pyrimidin, Pyrazin, Chinolin, Isochinolin, Phthalazin, Benzo[1,2,5]thiadiazol, Benzothiazol, Indol, Benzotriazol, Benzodioxolan, Benzodioxan, Carbazol, Indol und Chinazolin aufgeführt.

Dabei versteht man im Zusammenhang mit Aryl und Heteroaryl unter substituiert die Substitution des Aryls oder Heteroaryls mit R²³, OR²³ einem Halogen, vorzugsweise F und/oder Cl, einem CF₃, einem CN, einem NO₂, einem NR²⁴R²⁵, einem C₁₋₆-Alkyl (gesättigt), einem C₁₋₆-Alkoxy, einem C₃₋₈-Cycloalkoxy, einem C₃₋₈-Cycloalkyl oder einem C₂₋₆-Alkylen.

Dabei steht der Rest R²³ für H, einen C₁₋₁₀-Alkyl-, vorzugsweise einen C₁₋₆-Alkyl-, einen Aryl- oder Heteroaryl- oder für einen über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder eine C₁₋₃-Alkylen-Gruppe gebundenen Aryl- oder Heteroaryl-Rest, wobei diese Aryl und Heteroarylreste nicht selbst mit Aryl- oder Heteroaryl-Resten substituiert sein dürfen,

die Reste R^{24} und R^{25} , gleich oder verschieden, für H, einen C_{1-10} -Alkyl-, vorzugsweise einen C_{1-6} -Alkyl-, einen Aryl-, einen Heteroaryl- oder einen über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder eine C_{1-3} -Alkylen-Gruppe gebundenen Aryl- oder Heteroaryl-Rest bedeuten, wobei diese Aryl und Heteroarylreste nicht selbst mit Aryl- oder Heteroaryl-Resten substituiert sein dürfen,

oder die Reste R^{24} und R^{25} bedeuten zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^{26}CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$, und

der Rest R^{26} für H, einen C_{1-10} -Alkyl-, vorzugsweise einen C_{1-6} -Alkyl-, einen Aryl-, oder Heteroaryl- Rest oder für einen über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder eine C_{1-3} -Alkylen-Gruppe gebundenen Aryl- oder Heteroaryl-Rest, wobei diese Aryl und Heteroarylreste nicht selbst mit Aryl- oder Heteroaryl-Resten substituiert sein dürfen.

Unter dem Begriff Salz ist jegliche Form des erfindungsgemäßen Wirkstoffes zu verstehen, in dem dieser eine ionische Form annimmt bzw. geladen ist und mit einem Gegenion (einem Kation oder Anion) gekoppelt ist bzw. sich in Lösung befindet. Darunter sind auch Komplexe des Wirkstoffes mit anderen Molekülen und Ionen zu verstehen, insbesondere Komplexe, die über ionische Wechselwirkungen komplexiert sind. Insbesondere versteht man darunter physiologisch verträgliche Salze mit Kationen oder Basen und physiologisch verträgliche Salze mit Anionen oder Säuren.


Unter dem Begriff des physiologisch verträglichen Salzes mit Kationen oder Basen versteht man im Sinne dieser Erfindung Salze mindestens einer der erfindungsgemäßen Verbindungen - meist einer (deprotonierten) Säure - als Anion mit mindestens einem, vorzugsweise anorganischen, Kation, die physiologisch – insbesondere bei Anwendung im Menschen und/oder Säugetier – verträglich sind. Besonders bevorzugt sind die Salze der Alkali- und Erdalkalimetalle aber auch mit NH_4^+ , insbesondere aber (Mono-) oder (Di-) Natrium-, (Mono-) oder (Di-) Kalium-, Magnesium- oder Calcium-Salze.

Unter dem Begriff des physiologisch verträglichen Salzes mit Anionen oder Säuren versteht man im Sinne dieser Erfindung Salze mindestens einer der erfindungsgemäßen Verbindungen – meist, beispielsweise am Stickstoff, protoniert - als Kation mit mindestens einem Anion, die physiologisch – insbesondere bei Anwendung im Menschen und/oder Säugetier – verträglich sind. Insbesondere versteht man darunter im Sinne dieser Erfindung das mit einer physiologisch verträglichen Säure gebildete Salz, nämlich Salze des jeweiligen Wirkstoffes mit anorganischen bzw. organischen Säuren, die physiologisch - insbesondere bei Anwendung im Menschen und/oder Säugetier - verträglich sind. Beispiele für physiologisch verträgliche Salze bestimmter Säuren sind Salze der: Salzsäure, Bromwasserstoffsäure, Schwefelsäure, Methansulfonsäure, Ameisensäure, Essigsäure, Oxalsäure, Bernsteinsäure, Apfelsäure, Weinsäure, Mandelsäure, Fumarsäure, Milchsäure, Zitronensäure, Glutaminsäure, 1,1-Dioxo-1,2-dihydro-1-benzodithiazol-3-on (Saccharinsäure), Monomethylsebacinsäure, 5-Oxo-prolin, Hexan-1-sulfonsäure, Nicotinsäure, 2-, 3- oder 4-Aminobenzoessäure, 2,4,6-Trimethyl-benzoessäure, α -Liponsäure, Acetylglycin, Acetylsalicylsäure, Hippursäure und/oder Asparaginsäure. Besonders bevorzugt ist das Hydrochlorid-Salz.


Das Analgetikum Tramadol wird in vielen Ländern seit Jahren erfolgreich zur Therapie mäßig starker bis starker Schmerzen eingesetzt. Strukturell vom Codein abgeleitet und ursprünglich als Hustenmittel konzipiert, stellte man schon bei frühen Untersuchungen fest, das Tramadol eine ausgeprägte analgetische Wirksamkeit aufweist. Erklärt wird dies heute dadurch, das in vivo der Tramadol-Metabolit M1, der eine deutliche Affinität zum μ -Subtyp des Opiatrezeptors zeigt, zügig gebildet wird. Anders als bei Codein bzw. Morphin konnte aber die Beteiligung weiterer Mechanismen, der Hemmung der synaptosomalen Noradrenalin- und Serotonin-Wiederaufnahme, an der analgetischen Wirksamkeit von Tramadol nachgewiesen werden (M.C. Frink et al., *Arzneim.-Forsch/Drug Res.* 46 (1996) 1029-1036; K. Flick et al., *Arzneim.-Forsch/Drug Res.* 28 (1978) 107-113). Trotzdem ist nach heutigem Verständnis die Wirkung von M1 auf den μ -Subtyp des Opiatrezeptors maßgeblich für die analgetische Wirksamkeit verantwortlich. Die Wechselwirkung von M1 mit diesem Rezeptor ist dabei der von Morphin vergleichbar, d.h. neben dem basischen Stickstoffatom ist vor allem die phenolische OH-Gruppe, die im Codein bzw.

12

Tramadol methyliert ist, für die Bindung an und die Aktivierung des μ -Opiatrezeptors entscheidend, die schließlich zur analgetischen Wirkung führt.



Codein (R = CH₃)
Morphin (R = H)



Tramadol (R = CH₃)
M1 (R = H)

5

Mitte der neunziger Jahre wurde dann gefunden, daß ein Substituent in 4-Position des Cyclohexanrings von Tramadol die analgetische Wirksamkeit verstärkt. Dies trifft dabei nicht nur für die 3-Phenole, sondern auch für 3-Thiophenole und Prodrugs zu (I. Graudums et al., DE 19547766, Grünenthal GmbH, 1995).

10

Verbindungen gemäß der allgemeinen Formel I sind dann nicht Teil dieser Erfindung, wenn

A Wasserstoff ist,

15


R¹ ein einfach in 3-Position O- oder S-substituierter Phenylring ist, und

R² und R³ beide Methyl sind und


20

X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I

(Teilformel Ia)




die folgende Bedeutung hat




5

, also X



bedeutet, und B für OH steht

und gleichzeitig die Gruppierung $Y \text{---} Z$ ausgewählt ist aus



10

mit R^4 ausgewählt aus C_{1-6} -Alkyl, C_{2-6} -Alkenyl, C_{5-7} -Cycloalkylmethyl, substituiertem oder unsubstituiertem Phenyl oder substituiertem oder unsubstituiertem Benzyl.

15

Solche Verbindungen sind bereits aus der DE 195 47 766 A1 (Graudums et al.) bekannt. Aber wie an der dort gezeigte Formel I zu sehen ist, gingen die Erfinder auch dort davon aus, daß prinzipiell ein einfach in 3-Position O- oder S-substituierter Phenylring für die analgetische Wirkung, insbesondere die μ -Bindung, notwendig sei. Das ist auch in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre wie z.B. Chen, Z. R.; Irvine, R.J.; Somogyi, A. A.; Bochner, F. „Mu receptor binding of some commonly used opioids and their metabolites“. Life Sci. 1991, 48, 2165-2171 zu entnehmen.

20

Überraschenderweise wurde in dieser Erfindung nun gefunden, daß dies keine notwendige Voraussetzung für μ -Bindung und insbesondere Analgesie ist.


Entsprechend sind ein bevorzugter Gegenstand dieser Erfindung erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, in denen R^1 kein einfach in 3-Position O- oder S-substituierter Phenylring ist.

Ebenfalls entsprechend bevorzugt sind erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, in denen

R^1 ausgewählt ist aus C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Naphtyl, Heteroaryl, über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

F, Cl, Br, I, OR^{18} , SR^{18} , SO_2R^{18} , SO_2OR^{18} , CN, $COOR^{18}$, $NR^{19}R^{20}$; C_{1-10} -Alkyl, C_{1-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Silyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

oder R¹ einer Verbindung gemäß der allgemeinen Formel II entspricht



II

, worin

R¹³, R¹⁵ und R¹⁷ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, OR¹⁸, SR¹⁸, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

R¹⁴ und R¹⁶ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl,

oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R^{13} und R^{14} oder R^{14} und R^{15} zusammen jeweils die Gruppe OCH_2O , OCH_2CH_2O , $CH=CHO$, $CH=C(CH_3)O$ oder $CH=CHNH$ bilden und R^{15} - R^{17} oder R^{13} , R^{16} und R^{17} die oben genannte Bedeutung haben,

mit R^{18} ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

R^{19} und R^{20} unabhängig voneinander ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;


17

oder R^{19} und R^{20} zusammen $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2$,
 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NR}^{21}\text{CH}_2\text{CH}_2$ oder $(\text{CH}_2)_{3-6}$ bilden,


mit R^{21} ausgewählt aus H, C_{1-10} -Alkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder
 unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach
 substituiert.

In der DE 195 47 766 A1 (Graudums et al.) ist ebenfalls davon ausgegangen
 worden, daß für eine analgetische Wirkung das Cyclohexanol notwendig sei.
 Überraschenderweise ist dies aber nicht notwendig, wie die analgetischen Daten
 einer Reihe von erfindungsgemäßen Verbindungen zeigen. Ebenfalls bevorzugt sind
 daher erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, in denen

X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I



ausgewählt ist aus den folgenden Bedeutungen



mit B ausgewählt aus OR^7 , H, F, Cl oder NR^8R^9 ,

mit R^7 ausgewählt aus C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

R^8 und R^9 , unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R^8 und R^9 zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^{10}CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bilden

mit R^{10} ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert.

Überraschenderweise zeigen erfindungsgemäße Substanzen, in denen A gemäß der allgemeinen Formel ausgewählt ist aus Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder

mehrfach substituiert oder unsubstituiert, eine höhere Affinität zum α -Rezeptor als die beispielsweise aus der DE 195 47 766 A1 bekannten Verbindungen, auch wenn R^1 ein einfach in 3-Position O- oder S-substituierter Phenylring ist. Damit eröffnen die erfindungsgemäßen Verbindungen die Möglichkeit, die mit der Bindung an den μ -
5 Rezeptor einhergehenden Nebenwirkungen zu mindern oder ganz zu vermeiden.

Ein entscheidendes Kriterium bleibt aber auch hier natürlich die analgetische Wirkung, insbesondere in vivo.

10 Ein weiterer bevorzugter Gegenstand sind erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, in denen A Wasserstoff ist. Auch dies sind neue Analgetika.

Andere Verbindungen gemäß der allgemeinen Formel I sind dann nicht Teil dieser
15 Erfindung, wenn

R^2, R^3 unabhängig voneinander ausgewählt sind aus

20 H, C_1 - C_{10} -Alkyl, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert, gesättigt oder ungesättigt; C_3 - C_7 -Cycloalkyl, gesättigt oder ungesättigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert, bzw. einem entsprechenden Heterocyclus, bei dem ein C-Atom im Ring durch N, S oder O ersetzt ist; Alkylaryl oder Alkylheteroaryl, gesättigt oder ungesättigt, einfach oder mehrfach
25 substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;


oder

30 R^2 und R^3 zusammen einen Ring bilden und $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^6CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bedeuten;


X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I

20


(Teilformel Ia)



die folgende Bedeutung hat



5



, also X

bedeutet,

A Wasserstoff ist,

10

R1 ein unsubstituierter oder ein- oder zweifach substituierter Phenylring ist,

B ausgewählt ist aus

H, F, Cl, OH oder OR⁷, wobei R⁷ ausgewählt ist aus

15


C₁-C₁₀-Alkyl, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; gesättigt oder ungesättigt; C₃-C₇-

Cycloalkyl, gesättigt oder ungesättigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert, bzw. einem entsprechenden

20

Heterocyclus, bei dem ein C-Atom im Ring durch N, S oder O ersetzt ist; Alkylaryl oder Alkylheteroaryl, gesättigt oder ungesättigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

21

und gleichzeitig die Gruppierung $Y \text{ --- } Z$  $V \text{ --- } CH$  bedeutet

mit V ausgewählt aus OR^4 mit R^4 ausgewählt aus COR^5 und mit R^5 ausgewählt aus C_{1-6} -Alkyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert.

5

Verbindungen dieser Art sind in der WO01/57232 A1 beschrieben und finden sich z.T. auch in Gais H.J., Griebel C. und Buschmann H., Tetrahedron: Asymmetry 11, 917-928 (2000).

10 Es ist bevorzugt, wenn für erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gilt, daß


R^1 ausgewählt ist aus C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder
 15 unsubstituiert; Naphtyl, Heteroaryl, über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl
 20 gebundenem Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

25 F, Cl, Br, I, OR^{18} , SR^{18} , SO_2R^{18} , SO_2OR^{18} , CN, $COOR^{18}$, $NR^{19}R^{20}$; C_{1-10} -Alkyl, C_{1-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Silyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -

Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert.

Es ist ebenso bevorzugt, wenn für erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexyl-methylamin-Derivate gilt, daß

R¹ einer Verbindung gemäß der allgemeinen Formel II entspricht



II

, worin

R¹³, R¹⁵ und R¹⁷ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, OR¹⁸, SR¹⁸, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

R¹⁴ und R¹⁶ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl,


- 5 C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;
- 10 oder die Reste R¹³ und R¹⁴ oder R¹⁴ und R¹⁵ zusammen jeweils die Gruppe OCH₂O, OCH₂CH₂O, CH=CHO, CH=C(CH₃)O oder CH=CHNH bilden und R¹⁵-R¹⁷ oder R¹³, R¹⁶ und R¹⁷ die oben genannte Bedeutung haben,
- 15 mit R¹⁸ ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder
- 20 über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;
- 25 R¹⁹ und R²⁰ unabhängig voneinander ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder

einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;


oder R¹⁹ und R²⁰ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂, CH₂CH₂NR²¹CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden,

mit R²¹ ausgewählt aus H, C₁₋₁₀-Alkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert,

und



ausgewählt ist aus



mit R⁴ ausgewählt aus H, COR^{5a}, SO₂R⁵; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder

C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl,
jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

mit R⁵ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl,
jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt,
einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-,
oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt,
oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder
Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert,

mit R^{5a} ausgewählt aus C₃₋₁₀-Cycloalkyl, gesättigt oder
ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach
substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils
einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder
über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen
gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils
einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

mit V ausgewählt aus OR⁴ oder NR⁴R¹¹,

mit W ausgewählt aus R¹¹, OR¹² oder NR¹¹R¹²,

mit R¹¹ und R¹² unabhängig voneinander ausgewählt aus H, C₇₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-
Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach
oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach
oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder
ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl,
jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert.

Bevorzugt sind insbesondere auch erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexyl-methylamin-Derivate, in denen

5 R^2 und R^3 , unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-6} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R^2 und R^3 zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^6CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bedeuten,

15 mit R^6 ausgewählt aus H; C_{1-6} -Alkyl, insbesondere CH_3 , oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-6} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

und/oder

25 R^7 ausgewählt aus C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt,

oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

und/oder

5

R⁸ und R⁹, unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-
10 Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

15

oder die Reste R⁸ und R⁹ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂,
CH₂CH₂NR¹⁰CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden

20

mit R¹⁰ ausgewählt aus H; C₁₋₆-Alkyl, oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder
mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

und/oder

25

R⁴ ausgewählt ist aus H, COR⁵, SO₂R⁵; C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt

oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

mit R⁵ ausgewählt aus C₁₋₆-Alkyl-, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

und/oder

R¹¹ und R¹² unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

und/oder

R¹³, R¹⁵ und R¹⁷ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, OR¹⁸, SR¹⁸, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₆-Alkyl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

und/oder

R¹⁴ und R¹⁶ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R¹³ und R¹⁴ oder R¹⁴ und R¹⁵ zusammen jeweils die Gruppe OCH₂O, OCH₂CH₂O, CH=CHO, CH=C(CH₃)O oder CH=CHNH bilden und R¹⁵-R¹⁷ oder R¹³, R¹⁶ und R¹⁷ die oben genannte Bedeutung haben,

und/oder

R¹⁸ ausgewählt ist aus H; C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

und/oder

R¹⁹ und R²⁰ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl,

gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

oder R¹⁹ und R²⁰ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂, CH₂CH₂NR²¹CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden,

und/oder

R²¹ ausgewählt ist aus H, C₁₋₆-Alkyl gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert.

Besonders bevorzugt sind weiter erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, in denen A ausgewählt ist aus Wasserstoff oder Phenyl; unsubstituiert oder ein- oder mehrfach substituiert; vorzugsweise Wasserstoff.

Weiter bevorzugt sind erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, in denen

R² und R³ ausgewählt sind aus C₁₋₆-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder ein oder mehrfach substituiert, vorzugsweise CH₃, insbesondere beide CH₃,

oder die Reste R² und R³ zusammen CH₂CH₂NR⁶CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bedeuten, mit R⁶ ausgewählt aus H oder C₁₋₆-Alkyl, gesättigt, verzweigt oder unverzweigt und unsubstituiert; insbesondere H oder CH₃.


Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sind erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, in denen

R¹ ausgewählt ist aus; C₁₋₆-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt; C₃₋₆-Cycloalkyl, Naphthyl, Phenyl, Furyl, Thiophenyl, über C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Naphthyl, Phenyl, C₃₋₆-


31

Cycloalkyl oder über C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Thiophenyl oder Furyl, die gemäß Anspruch 1 unsubstituiert oder ein- oder mehrfach unsubstituiert sein können.

- 5 Besonders bevorzugt sind weiter erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate, in denen




ausgewählt ist aus



10

Ein ganz besonders bevorzugter Gegenstand der Erfindung sind substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate der allgemeinen Formel I,



15

I

, worin

20

A ausgewählt ist aus H; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

R^1 ausgewählt ist aus Naphthyl oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Naphthyl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

5

F, Cl, Br, I, OR^{18} , SR^{18} , SO_2R^{18} , SO_2OR^{18} , CN, $COOR^{18}$, $NR^{19}R^{20}$; C_{1-10} -Alkyl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Silyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

10

15

mit R^{18} ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

20

25

R^{19} und R^{20} unabhängig voneinander ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

30

oder R^{19} und R^{20} zusammen $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2$,
 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NR}^{21}\text{CH}_2\text{CH}_2$ oder $(\text{CH}_2)_{3-6}$ bilden,

5 mit R^{21} ausgewählt aus H, C_{1-10} -Alkyl gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;


10 R^2 und R^3 , unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils
15 einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R^2 und R^3 zusammen $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2$,
 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NR}^6\text{CH}_2\text{CH}_2$ oder $(\text{CH}_2)_{3-6}$ bedeuten,


20 mit R^6 ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen
25 gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I

(Teilformel 1a)



ausgewählt ist aus den folgenden Bedeutungen



5

mit B ausgewählt aus OH, OR⁷, H, F, Cl oder NR⁸R⁹,

10

mit R⁷ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

15

20

R⁸ und R⁹, unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H;
C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder
ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach
substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, einfach
oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-
Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen


gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R⁸ und R⁹ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂,
CH₂CH₂NR¹⁰CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden

mit R¹⁰ ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,



ausgewählt ist aus



mit V ausgewählt aus OR⁴,

mit R⁴ ausgewählt aus COR⁵; C₁₋₁₀-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; C₃₋₁₀-Cycloalkyl, gesättigt oder

ungesättigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;
Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-
Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert
oder unsubstituiert,

mit R⁵ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt,
verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert
oder unsubstituiert; C₃₋₁₀-Cycloalkyl, gesättigt oder
ungesättigt, einfach oder mehrfach substituiert oder
unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder
mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl,
gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl,
C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder
mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

gegebenenfalls in Form ihrer Racemate, ihrer reinen Stereoisomeren,
insbesondere Enantiomeren oder Diastereomeren, oder in Form von
Mischungen der Stereoisomeren, insbesondere der Enantiomeren oder
Diastereomeren, in einem beliebigen Mischungsverhältnis; in dargestellter
Form oder in Form ihrer Säuren oder ihrer Basen oder in Form ihrer
Salze, insbesondere der physiologisch verträglichen Salze, oder in Form
ihrer Solvate, insbesondere der Hydrate.

Bezüglich dieser ganz besonders bevorzugten substituierten C-Cyclohexylmethyl-
amin-Derivate gilt, daß in der bevorzugten Ausführungsform

A ausgewählt ist aus H oder Phenyl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert
oder unsubstituiert; vorzugsweise H

und/oder

R¹ ausgewählt ist aus Naphthyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

5 F, Cl, Br, I, OR¹⁸; C₁₋₄-Alkyl, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

mit R¹⁸ ausgewählt aus H; C₁₋₄-Alkyl, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

10 vorzugsweise R¹ ausgewählt ist aus Naphthyl, unsubstituiert oder substituiert mit OH oder OCH₃,

und/oder


15 R₂ und R₃ ausgewählt sind aus C₁₋₆-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder ein oder mehrfach substituiert, vorzugsweise CH₃, insbesondere beide CH₃,

20 oder die Reste R₂ und R₃ zusammen CH₂CH₂NR₆CH₂CH₂ oder (CH₂)₄₋₅ bedeuten, insbesondere zusammen CH₂CH₂NR₆CH₂CH₂ bedeuten, mit R⁶ ausgewählt aus H oder C₁₋₆-Alkyl, gesättigt, verzweigt oder unverzweigt und unsubstituiert; insbesondere H oder CH₃;


25 **und/oder**

X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I


(Teilformel Ia)



ausgewählt ist aus den folgenden Bedeutungen




5

, also X  bedeutet, mit B ausgewählt aus OH, OR⁷, H, F, Cl, mit R⁷ ausgewählt aus C₁₋₄-Alkyl, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

10


vorzugsweise mit B ausgewählt aus OH,

und/oder



ausgewählt ist aus

15



mit V ausgewählt aus OR⁴,

mit R⁴ ausgewählt aus COR⁵; Phenyl oder Benzyl, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; , insbesondere COR⁵ oder Benzyl, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; ,

mit R⁵ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl, insbesondere C₁₋₆-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder Phenyl, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert.

Weiter besonders bevorzugte erfindungsgemäße Verbindungen sind ausgewählt aus der folgenden Gruppe:

- 4-Benzyloxy-1-(4-brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3,4-difluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-4-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3,4-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3,4-dimethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3-chlor-4-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(5-chlor-2-methoxy-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(2-brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methylsulfanyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(4-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3-brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(4-brom-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(2-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;

- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-pentyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-isopropyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 5 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,3-dimethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3,5-bis-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-ethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 10 • 4-Benzyloxy-1-(3,5-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-o-tolyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-phenyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 15 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(3,4-dimethyl-phenyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3,5-dimethyl-phenyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-isopropyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 20 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol;
- 1-(3,4-Difluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 25 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-fluor-4-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 1-(2-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 30 • 1-(3-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 1-(3,4-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 35 • 1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;

- 1-(4-Chlor-2-methoxy-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 5 • 1-(3,5-Bis-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(2-methylsulfanyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 10 • (5-Benzyloxy-2-thiophen-2-yl-cyclohex-2-enylmethyl)-dimethyl-amin;
- [5-(4-Fluor-benzyloxy)-2-thiophen-2-yl-cyclohex-2-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- 3,4-Dichlor-N-[3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-benzamid;
- 15 • Naphthalin-2-carbonsäure [3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-amid;
- N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-3-phenyl-propionamid;
- N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-4-nitro-benzamid;
- 20 • N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-4-methyl-3-nitro-benzamid;
- N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-3,4,5-trimethoxy-benzamid;
- 25 • 2-(4-Chlor-phenoxy)-N-[3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-acetamid;
- N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-3-nitro-benzamid;
- Furan-2-carbonsäure [3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-amid;
- 30 • N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-2-phenoxy-acetamid;
- N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-4-trifluormethyl-benzamid;
- 35 • N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-4-methoxy-benzamid;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;

- 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-ethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-isopropyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,4-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 5 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(2-methylsulfanyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-phenethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 10 • 1-(3-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-phenethyl-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3,4-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 15 • 1-(3,4-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-4-methyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3,5-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Brom-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 20 • 1-(3,4-Difluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,3-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-naphthalin-1-yl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(3,5-Bis-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 25 • 1-(3-Brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-phenethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyl-1-(3,4-difluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 30 • 4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol;
- 1-(4-Brom-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol;
- 35 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol;

- Dimethyl-[2-(5-methyl-thiophen-2-yl)-5-phenethyl-cyclohex-2-enylmethyl]-amin;
- [2-(3,5-Bis-trifluormethyl-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-1-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- 5 • Dimethyl-(5-phenethyl-2-p-tolyl-cyclohex-1-enylmethyl)-amin;
- [2-(3-Chlor-4-fluor-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-1-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- [2-(2,5-Dimethyl-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-1-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- Dimethyl-(5-phenethyl-2-p-tolyl-cyclohex-2-enylmethyl)-amin;
- [2-(3,5-Bis-trifluormethyl-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-2-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- 10 • [2-(3-Chlor-4-fluor-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-2-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- [2-(3-Chlor-4-fluor-phenyl)-2-fluor-5-phenethyl-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [2-Fluor-5-(4-fluor-benzyl)-2-p-tolyl-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- 15 • Benzyl-2-(dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-vinyl-cyclohexanol
- 1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-(dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 20 • 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-phenethyl-4-phenyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-(3-methoxy-phenyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-(4-methoxy-phenyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 25 • 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-(2-methoxy-phenyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-phenyl-cyclohexanol
- 1-Benzyl-4-benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-o-tolyl-cyclohexanol
- 30 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-vinyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-1-cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-bicyclohexyl-1-ol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 35 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol

- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 5 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 10 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2,3-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 15 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3,5-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 20 • 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 25 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 1,4-Bis-(4-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2-chlor-6-fluor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-cyclohexanol
- 30 • 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2,4-dichlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-phenyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(4-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 35 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-o-tolyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-vinyl-cyclohexanol

- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-bicyclohexyl-1-ol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 5 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-phenethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 10 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-trimethylsilanylethynyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3-chlor-4-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 15 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-phenyl-cyclohexanol
- 1-(4-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 20 • 1-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-o-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-vinyl-cyclohexanol
- 25 • 1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-Cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-bicyclohexyl-1-ol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 30 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-phenethyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol
- 35 • 1-(2,3-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 1-Cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol

- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(5-fluor-2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 5 • 1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(2-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1,4-bis-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 10 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(2-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3-chlor-4-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 15 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(4-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 20 • 1-(2-chlor-6-fluor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 25 • 1-(2,4-Dichlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-phenyl-cyclohexanol
- 1-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 30 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-o-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-vinyl-cyclohexanol
- 1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-Cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 35 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-bicyclohexyl-1-ol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-phenethyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-phenylethynyl-cyclohexanol

- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol
- 1-(2,3-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 1-Cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methoxy-phenyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol
- 1-(2-chlor-6-fluor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-phenyl-cyclohexanol
- 1-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-vinyl-cyclohexanol
- 1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 1-Cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-bicyclohexyl-1-ol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-phenethyl-cyclohexanol

- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 5 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 1-Cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 10 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 15 • 1-(3-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- [5-Benzyloxy-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [5-(3-Chlor-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [2-(3-Methoxy-phenyl)-5-(naphthalin-2-ylmethoxy)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- 20 • [5-(3-Methoxy-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [5-(4-Chlor-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [5-(4-Methoxy-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- 25 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-(naphthalin-2-ylmethoxy)-cyclohexanol;
- [5-(4-Methoxy-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohex-2-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 30 • 4-Amino-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-(naphthalin-2-ylmethoxy)-cyclohexanol
- 4-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 35 • 3-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2,2-Dimethyl-propionsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 40 • Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 45 • 3-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;

- 2,2-Dimethyl-propionsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,4-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 5 • 3,4-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Naphthalin-2-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Methyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 10 • 3,4-Dichlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 15 • 3-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Trifluormethyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 20 • 3,5-Difluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 25 • 3-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Cyclopentancarbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 30 • (4-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- (3-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester
- 35 • Phenyl-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,4,5-Trimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,5-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 40 • Naphthalin-1-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 45 • Naphthalin-2-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2-Hydroxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;

- 4-Methyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,4-Dichlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 5 • 4-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 10 • 2-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Trifluormethyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,5-Difluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 15 • 4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 20 • 2-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Cyclopentancarbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- (4-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 25 • (3-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Phenyl-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,4,5-Trimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 30 • 3,5-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Naphthalin-1-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 35 • 2-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2-Dimethylaminomethyl-1,4-bis-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexan-1,4-diol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1,4-bis-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexan-1,4-diol;
- 6-(4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-hydroxy-cyclohexyl)-naphthalin-2-ol;
- 40 • 4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-cyclohexanol;
- Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester
- Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester
- 45 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-methylamino-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-methylamino-cyclohexanol;
- Valeriansäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;

- [3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylidene]-essigsäure ethylester;
- [3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylidene]-essigsäure ethylester;
- 5 • 3-[2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-hydroxy-cyclohexyl]-phenol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol; ,
- 10 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 15 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 20 • [2,5-Bis-(4-fluor-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethylamin;
- 5-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohex-3-enol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexan-1,4-diol
- Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexylester
- 25 • Benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 2-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 30 • 3-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 4-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 2-Fluor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 35 • 3- Fluor -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 4- Fluor -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 40 • 2-Methyl-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 3- Methyl -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 4- Methyl -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 45 • 2-Methoxy-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 3- Methoxy -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;

- 4-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 2,6-Dichlor-benzoesäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 5 • 2,6-Difluor-benzoesäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 2-Chlor-5-fluor-benzoesäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 10 • Biphenyl-4-carbonsäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexylester;
- 2-Chlor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 3-Chlor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 15 • 4-Chlor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 2-Fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 20 • 3-Fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 4-Fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 2-Methyl-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 25 • 3-Methyl-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 4-Methyl-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 30 • 2-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 3-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 4-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 35 • 2,6-Dichlor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 2,6-Fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 40 • 2-Chlor-6-fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- Biphenyl-4-carbonsäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 4-(2-Chlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 45 • 4-(3-Chlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(4-Chlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;

- 4-(2-Fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(3-Fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 5 • 4-(4-Fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(2-Methyl-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 10 • 4-(3-Methyl-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(4-Methyl-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(2-Methoxy-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 15 • 4-(3-Methoxy-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(4-Methoxy-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 20 • 4-(2,6-DiChlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol,
- 4-(2,6-Difluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol,
- 4-(2-Chlor-6-fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol,
- 25 • 4-(2-Chlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(3-Chlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 30 • 4-(4-Chlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(2-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(3-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 35 • 4-(4-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(2-Methyl-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(3-Methyl-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 40 • 4-(4-Methyl-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(2-Methoxy-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 45 • 4-(3-Methoxy-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(4-Methoxy-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;

- 4-(2,6-Dichlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(2,6-Difluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 5 • 4-(2-Chlor-6-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol
- 4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-cyclohexylester
- 10 • 4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-naphthalin-2-yl-cyclohexylester
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-cyclohexanol
- 6-[2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-hydroxy-cyclohexyl]-naphthalin-2-ol
- 15

gegebenenfalls in Form ihrer Racemate, ihrer reinen Stereoisomeren, insbesondere Enantiomeren oder Diastereomeren, oder in Form von Mischungen der Stereoisomeren, insbesondere der Enantiomeren oder Diastereomeren, in einem beliebigen Mischungsverhältnis; in dargestellter Form oder in Form ihrer Säuren oder ihrer Basen oder in Form ihrer Salze, insbesondere der physiologisch verträglichen Salze, oder in Form ihrer Solvate, insbesondere der Hydrate, insbesondere des Hydrochlorid- oder des Bishydrochloridsalzes.

25

Die erfindungsgemäßen Substanzen sind toxikologisch unbedenklich, so daß sie sich als pharmazeutischer Wirkstoff in Arzneimittel eignen. Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind daher Arzneimittel enthaltend wenigstens ein erfindungsgemäßes substituiertes C-Cyclohexylmethylamin-Derivat, sowie gegebenenfalls geeignete Zusatz- und/oder Hilfsstoffe und/oder gegebenenfalls weitere Wirkstoffe.

30

Die erfindungsgemäßen Arzneimittel enthalten neben mindestens einem erfindungsgemäßen substituierten C-Cyclohexylmethylamin-Derivat gegebenenfalls geeignete Zusatz- und/oder Hilfsstoffe, so auch auch Trägermaterialien, Füllstoffe, Lösungsmittel, Verdünnungsmittel, Farbstoffe und/oder Bindemittel und können als flüssige Arzneiformen in Form von Injektionslösungen, Tropfen oder Säfte, als halbfeste Arzneiformen in Form von Granulaten, Tabletten, Pellets, Patches, Kapseln, Pflaster oder Aerosolen verabreicht werden. Die Auswahl der Hilfsstoffe

35

etc. sowie die einzusetzenden Mengen derselben hängen davon ab, ob das Arzneimittel oral, peroral, parenteral, intravenös, intraperitoneal, intradermal, intramuskulär, intranasal, buccal, rektal oder örtlich, zum Beispiel auf die Haut, die Schleimhäute oder in die Augen, appliziert werden soll. Für die orale Applikation eignen sich Zubereitungen in Form von Tabletten, Dragees, Kapseln, Granulaten, Tropfen, Säften und Sirupen, für die parenterale, topische und inhalative Applikation Lösungen, Suspensionen, leicht rekonstituierbare Trockenzubereitungen sowie Sprays. Erfindungsgemäße substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate in einem Depot, in gelöster Form oder in einem Pflaster, gegebenenfalls unter Zusatz von die Hautpenetration fördernden Mitteln, sind geeignete perkutane Applikationszubereitungen. Oral oder perkutan anwendbare Zubereitungsformen können die erfindungsgemäßen substituierten C-Cyclohexylmethylamin-Derivate verzögert freisetzen. Prinzipiell können den erfindungsgemäßen Arzneimitteln andere dem Fachmann bekannte weitere Wirkstoffe zugesetzt werden.

Die an den Patienten zu verabreichende Wirkstoffmenge variiert in Abhängigkeit vom Gewicht des Patienten, von der Applikationsart, der Indikation und dem Schweregrad der Erkrankung. Üblicherweise werden 0,005 bis 1000 mg/kg, bevorzugt 0,05 bis 5 mg/kg wenigstens eines erfindungsgemäßen substituierten C-Cyclohexylmethylamin-Derivats appliziert.

In einer bevorzugten Form des Arzneimittel liegt ein enthaltenes erfindungsgemäßes substituiertes C-Cyclohexylmethylamin-Derivat als reines Diastereomer und/oder Enantiomer, als Razemat oder als nicht-äquimolare oder äquimolare Mischung der Diastereomere und/oder Enantiomere vor.


Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung eines erfindungsgemäßen substituierten C-Cyclohexylmethylamin-Derivats zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Schmerz, insbesondere von neuropathischem oder chronischem Schmerz. Dabei kann es bevorzugt sein, wenn ein verwendetes substituiertes C-Cyclohexylmethylamin-Derivat gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, als reines Diastereomer und/oder Enantiomer, als Razemat

oder als nicht-äquimolare oder äquimolare Mischung der Diastereomere und/oder Enantiomere vorliegt.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen substituierten C-Cyclohexylmethylamin-Derivats wie in der folgenden Beschreibung und Beispielen ausgeführt.


Einige Verfahren zur Herstellung erfindungsgemäßer Verbindungen gemäß der allg. Formel I, die hier analog angewandt werden, sind schon in DE 19547766 beschrieben worden (I. Gaudums et al., Grünenthal GmbH, 1995). Zur Herstellung erfindungsgemäßer Substanzen der allgemeinen Formel I, in denen A nicht Wasserstoff bedeutet, wurden die von Gaudums et al. beschriebenen Verfahren mit literaturbekannten Verfahren zur Darstellung substituierter Mannichbasen kombiniert (Risch et al., Houben-Weyl - Methoden der Organischen Chemie, E21b (1995) 1925-1929; Angew. Chem. 106 (1994) 2531-2533; Synlett (1997) 974-976).

Zur Herstellung erfindungsgemäßer Substanzen, in denen die Olefine



stehen, wurden tertiäre Alkohole gegebenenfalls in einem Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemisch bei Temperaturen zwischen 20 und 120 °C mit organischen oder anorganischen Säuren oder anderen wasserentziehenden Mitteln wie Säurehalogeniden behandelt. Bevorzugt wurden Ameisensäure oder Bromwasserstoffsäure eingesetzt. In Abhängigkeit von den

gewählten Reaktionsbedingungen wird auf diesen Weg eines der oben aufgeführten Olefine bevorzugt oder auch ausschließlich erhalten.




Aus diesen Olefinen

oder

wurden durch

5 Reduktion der CC-Doppelbindung erfindungsgemäße Verbindungen erhalten, bei



denen


für die Gruppierung

steht. Hierzu

wurden die Olefine bevorzugt unter Wasserstoffatmosphäre oder auch

Wasserstoffüberdruck in Gegenwart eines Übergangsmetalls, das ggf. an einen Träger gebunden war, hydriert.


10



Die Umsetzung der tertiären Alkohole

mit Salzsäure bei

Temperaturen zwischen -20 und +20 °C führte zu Chlorderivaten





. Bei dieser Umsetzung hat die Reaktionsdauer, die


Konzentration der verwendeten Salzsäure und der Einsatz eines ggf. zugesetzten

15 Lösungsmittels Einfluß auf den Verlauf der Reaktion. Unter drastischeren


Bedingungen, also bei Verwendung konzentrierterer Salzsäure, langen


Reaktionszeiten oder Anwendung höherer Temperaturen, wurden bei dieser



Umsetzung auch Olefine  oder  erhalten.

Die Umsetzung der tertiären Alkohole  mit Fluorierungs-

5 Reagenzien wie Dimethylaminoschwefeltrifluorid (DAST) oder Deoxofluor® führte zu

Fluorderivaten 


Zur Herstellung erfindungsgemäßer Substanzen, in denen  für die

Gruppierung  steht, wurden Ketone  mit Ammoniak bzw.


10 Ammoniaksalzen, primären oder sekundären Aminen unter reduktiven Bedingungen umgesetzt. Eine Vielzahl literaturbekannter Verfahren ist hierfür geeignet (R.C. Larock; *Comprehensive Organic Transformations*; VCH Publishers; New York, Weinheim, Cambridge 1989). Bevorzugt wurden komplexe Hydride wie Natriumborhydrid, Natriumcyanoborhydrid oder besonders bevorzugt Natriumtri-

acetoxyborhydrid eingesetzt. Soweit auf diesem Weg primäre oder sekundäre Amine erhalten wurden, können diese nach literaturbekannten Methoden mit Säurehalogeniden oder Säuren zu Amiden umgesetzt werden, mit Alkyl-, Arylalkyl- oder Heteroarylalkylhalogeniden nach literaturbekannten Methoden alkyliert oder mit Aldehyden nach ebenfalls literaturbekannten Methoden reduktiv aminiert werden (R.C. Larock; *Comprehensive Organic Transformations*; VCH Publishers; New York, Weinheim, Cambridge 1989).



Die Herstellung erfindungsgemäße Substanzen, in denen



für die Gruppierung




steht, kann nach einer Vielzahl von literaturbekannten Methoden (R.C. Larock; *Comprehensive Organic Transformations*; VCH Publishers; New York, Weinheim, Cambridge 1989) unter anderem ausgehend vom Ester



und/oder vom Aldehyd

durchgeführt



werden. Der Ester



ist dabei nach den oben beschriebenen

Verfahren ausgehend vom kommerziell erhältlichen Cyclohexanon-4-

60



beispielsweise durch Wittig-Reaktion mit Methoxymethylphosphoniumchlorid oder -bromid und saure Spaltung des zunächst gebildeten Enolethers erhalten werden (G. Wittig et al., Chem. Ber. 95 (1962) 2514-2525; S.O. Bhanot et al., J. Chem. Soc. C (1968) 2583-2588).

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Behandlung, insbesondere Schmerzbehandlung, eines nichthumanen Säugetieres oder Menschen, das oder der eine Behandlung von Schmerzen, insbesondere chronischer Schmerzen, benötigt, durch Verabreichung einer therapeutisch wirksamen Dosis eines erfindungsgemäßen substituierten C-Cyclohexylmethylamin-Derivats, oder eines erfindungsgemäßen Arzneimittels.

Im folgenden wird die Erfindung weiter durch Beispiele erläutert, ohne sie darauf zu beschränken.

Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen erfindungsgemäße Verbindungen sowie deren Darstellung und mit diesen durchgeführte Wirksamkeitsuntersuchungen.


Dabei gelten generell folgende Angaben:

Die eingesetzten Chemikalien und Lösungsmittel wurden kommerziell bei den herkömmlichen Anbietern erworben (Acros, Avocado, Aldrich, Fluka, Lancaster, Maybridge, Merck, Sigma, TCI etc.) oder synthetisiert.

- 5 Die Analytik erfolgte über mittels NMR-Spektroskopie, ESI-Massenspektrometrie und/oder HPLC.

Grignard-Reaktion 1

10 Reaktionsgleichung:



Allgemeine Arbeitsvorschrift 1 (AAV 1):

Das Reaktionsgefäß wurde im Trockenschrank ausgeheizt. Das Aryliodid wurde vorgelegt und mit 1 ml THF versetzt. Bei -20 °C wurde Isopropylmagnesiumchlorid-Lsg. zugegeben und 60 Minuten gerührt, bevor die Mannichbase sowie weitere 0,25 ml THF zugegeben wurden. Unter Rühren ließ man den Ansatz langsam auf Raumtemperatur auftauen und über Nacht nachrühren. Anschließend wurde erneut auf -20 °C abgekühlt und mit Ammoniumchlorid-Lsg. hydrolisiert.

Das Reaktionsgemisch wurde dreimal mit jeweils 3 ml Ether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden über Magnesiumsulfat getrocknet und bei 40 °C im Vakuum eingeeengt. Die Reinigung erfolgte über eine Hydrochloridfällung: Lösen der Rohbase in ca. 10 ml 2-Butanon je Gramm Base; Zugabe eines halben Moläquivalents Wasser, gefolgt von 1,1 Moläquivalenten Chlortrimethylsilan und Rühren über Nacht. Bildete sich auch bei Kühlung auf ca. 4 °C kein Hydrochlorid,

wurde der Fällungsansatz im doppelten Volumen Wasser aufgenommen, mit drei kleinen Portionen Ether gewaschen, die wäßrige Phase mit wenig ca. 30 %iger Natronlauge alkalisch gestellt und dreimal mit Ether extrahiert ("Säure-Base-Extraktion"). Diese letzten Extrakte wurden wiederum vereinigt und einer erneuten Hydrochloridfällung zugeführt.

Ansatz A: $R' = H$ (Beispiel 1 bis 28)

10	2,68 mmol (700 mg)	Mannichbase (1,22 M in THF)
	5,36 mmol	Aryliodid (R-I)
	4,02 mmol (2,01 ml)	Isopropymagnesiumchlorid-Lsg. (2 M in THF)
	1,25 ml	THF
15	2 ml	20%-ige Ammoniumchlorid-Lsg.

sowie zur Aufarbeitung Ether und Magnesiumsulfat.

20 Ansatz B: $R' = 4-F$ (Beispiel 29 bis 50)

	2,15 mmol (600 mg)	Mannichbase (1,00 M in THF)
	4,30 mmol	Aryliodid (R-I)
	3,22 mmol (1,61 ml)	Isopropymagnesiumchlorid- Lsg. (2 M in THF)
25	1,25 ml	THF
	2 ml	20%-ige Ammoniumchlorid-Lsg.

sowie zur Aufarbeitung Ether und Magnesiumsulfat.

Beispiel		Aryliodid	Ausbeute	Reinigung
Nr.			g Hydrochlorid	Säure-Base-Extraktion
1		1-Brom-4-iodbenzol	0,190	
2		1-Iod-4-trifluormethylbenzol	0,310	
3		1,2-Difluor-4-iodbenzol	0,172	x
4		2-Fluor-4-iodtoluol	0,098	x
5		4-Iod-1,2-dichlorbenzol	0,340	
6		1-Iodnaphthalin	0,191	x
7		4-Iod-1,2-dimethylbenzol	0,246	x
8		2-Fluor-5-iodtoluol	0,167	x
9		4-Fluor-2-iodtoluol	0,148	x
10		1-Chlor-2-fluor-4-iodbenzol	0,151	x
11		4-Chlor-2-iodanisol	0,556	x
12		1-Brom-2-iodbenzol	0,208	x
13		2-Iodanisol	0,644	
14		1-Iod-2-methylsulfanylbenzol	0,665	
15		1-Chlor-4-iodbenzol	0,194	x
16		1-Brom-3-iodbenzol	0,152	x
17		1-Brom-2-fluor-4-iodbenzol	0,287	x
18		4-Iodanisol	0,296	x
19		1-Chlor-2-iodbenzol	0,218	x
20		1-Iod-3-trifluormethylbenzol	0,240	x
21		1-Iod-4-pentylbenzol	0,164	
22		2-Iod-1,4-dimethylbenzol	0,084	x


23		1-Iod-4-isopropylbenzol	0,151	x
24		1-Iod-2,3-dimethylbenzol	0,127	x
25		1-Fluor-3-iodbenzol	0,195	x
26		1-Iod-3,5-bis(trifluor-methyl)benzol	0,220	
27		1-Ethyl-4-iodbenzol	0,096	x
28		3,5-Dichlor-5-iodbenzol	0,349	
29		2-Iodtoluol	0,083	x
30		4-Iodtoluol	0,105	x
31		2-Iod-1,4-dimethylbenzol	0,089	
32		4-Iod-1,2-dimethylbenzol	0,066	x
33		1-Iod-3,5-dimethylbenzol	0,098	
34		1-Iod-4-isopropylbenzol	0,129	x
35		1-Fluor-3-iodbenzol	0,065	x
36		1-Fluor-4-iodbenzol	0,100	x
37		1,2-Difluor-4-iodbenzol	0,081	
38		2-Fluor-4-iodtoluol	0,161	
39		2-Fluor-5-iodtoluol	0,105	
40		1-Chlor-2-iodbenzol	0,077	
41		1-Chlor-3-iodbenzol	0,212	
42		1-Chlor-4-iodbenzol	0,107	
43		1,2-Dichlor-4-iodbenzol	0,255	
44		1-Chlor-2-fluor-4-iodbenzol	0,092	
45		1,3-Dichlor-5-iodbenzol	0,183	
46		4-Chlor-2-iodanisol	0,173	x
47		1-Iod-4-trifluormethylbenzol	0,106	
48		1-Iod-3,5-bis(trifluor-methyl)benzol	0,087	
49		2-Iodanisol	0,243	x

65

50		1-Iod-2-methylsulfonyl-benzol	0,240	x
----	--	-------------------------------	-------	---

Grignard-Reaktion unter Eliminierung 1

5 Reaktionsgleichung:



Durchführung: Siehe AAV 1.

Ansatz A: R' = H (Beispiel 51)

10


Ansatz B: R' = 4-F (Beispiel 52)

Beispiel		Aryliodid	Ausbeute	Reinigung
Nr.			g Hydrochlorid	Säure-Base-Extraktion
51		2-Iodthiophen	0,308	x
52		2-Iodthiophen	0,102	

15

Acylierung 1

Reaktionsgleichung:



Allgemeine Arbeitsvorschrift 2 (AAV 2):

- 5 Die Apparatur wurde im Trockenschrank ausgeheizt. Das Säurechlorid wurde vorgelegt und mit 1 ml Dichlormethan versetzt. Bei -10 °C wurde Triethylamin zugegeben und 20 Minuten gerührt, bevor das Amin, gelöst in 4 ml Dichlormethan, zugegeben wurde. Unter Rühren ließ man den Ansatz langsam auf Raumtemperatur auftauen und über Nacht nachrühren.
- 10 Bei Raumtemperatur wurde verdünnte Kaliumhydroxidlösung zugefügt und anschließend zentrifugiert. Die Phasen wurden getrennt, die organische Phase mittels Magnesiumsulfat getrocknet und bei 40 °C im Vakuum eingeeengt. Die Reinigung erfolgte über Hydrochloridfällung, ggf. nach Säure-Base-Extraktion (siehe AAV 1).

15

Ansatz A: (Beispiel 53 bis 62)

3,59 mmol (1,00 g)	4-Amino-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol
5,39 mmol	Säurechlorid (RCOCl)
9,74 mmol (1,36 ml)	Triethylamin
5 ml	Dichlormethan
2 ml	Kaliumhydroxidlösung (2 M)


20

68

61		2-Furoylchlorid	0,746	x
62		Phenoxyacetylchlorid	0,527	x
63		4-(Trifluormethyl)benzoylchlorid	0,212	x
64		4-Methoxybenzoylchlorid	0,510	x

Grignard-Reaktion 2

5 Reaktionsgleichung:



Allgemeine Arbeitsvorschrift 3 (AAV 3):

Die Apparatur wurde ausgeheizt und mit Stickstoff belüftet. Das Aryliodid wurde vorgelegt und mit 1 ml THF versetzt. Bei -20°C wurde Isopropylmagnesiumchlorid-Lsg. zugegeben und 60 Minuten gerührt, bevor die Mannichbase sowie weitere 0,25 ml THF zugegeben wurden. Unter Rühren ließ man den Ansatz langsam auf Raumtemperatur auftauen und über Nacht nachrühren. Anschließend wurde erneut auf -20°C abgekühlt und mit Ammoniumchlorid-Lsg. hydrolisiert.

Das Reaktionsgemisch wurde dreimal mit jeweils 10 ml Ether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden über Magnesiumsulfat getrocknet und bei 40°C im Vakuum eingeeengt. Die Reinigung erfolgte über Säulenchromatographie.

Anschließend wurde das gereinigte Produkt als Hydrochlorid gefällt und umkristallisiert (siehe AAV 1).

Ansatz: (Beispiel 65 bis 97)

5

2,00 mmol (0,52g) Mannichbase (1,0 M in THF)
 4,00 mmol Aryliodid (R-I)
 3,00 mmol (1,73 ml) Isopropylmagnesiumchlorid-Lsg.
 (2 M in THF)
 10 1,25 ml THF
 2 ml 20%-ige Ammoniumchlorid-Lsg.

sowie zur Aufarbeitung Ether und Magnesiumsulfat.

15

Beispiel		Aryliodid	Ausbeute	Reinigung	
Nr.				Säulen- chromato- graphie	Kristallisation
65*		1-Fluor-4-iodbenzol	0,134	Ether/Hexan/MeOH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
66*		1-Fluor-4-iodbenzol	0,072	Ether/Hexan/MeOH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
67		1-Brom-4-iodbenzol	0,154	Ether/Hexan/MeOH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
68*		1-Ethyl-4-iodbenzol	0,114	Hexan/Essigester/MeOH (9/3/1)	2-Butanon/ Ether
69*		1-Ethyl-4-iodbenzol	0,225	Ether/Hexan/MeOH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
70		1-Iod-4-isopropylbenzol	0,093	Ether/Hexan/MeOH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether

71*		4-Iodanisol	0,175	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
72*		4-Iodanisol	0,107	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
73		1-Iod-2,4-di- methylbenzol	0,136	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
74		1-Iod-2- methyl- sulfanyl- benzol	0,204	Hexan/Essig- ester/MeOH (9/3/1)	2-Butanon/ Ether
75		4-Fluor-2-iod- toluol	0,136	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
76		2-Iod-1,4-di- methylbenzol	0,176	Hexan/Essig- ester/MeOH (12/3/1)	2-Butanon/ Ether
77		4-Iodtoluol	0,140	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
78		1-Fluor-3-iod- benzol	0,126	Hexan/Essig- ester/MeOH (12/3/1)	2-Butanon/ Ether
79		1-Chlor-3-iod- benzol	0,255	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
80		1-Chlor-2- fluor-4-iod- benzol	0,110	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
81		1-Iod-3-tri- fluormethyl- benzol	0,220	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
82		1,2-Dichlor-5- iodbenzol	0,324	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
83		4-Iod-1,2-di- methylbenzol	0,170	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
84		1,2-Dichlor-4- iodbenzol	0,390	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
85		1-Chlor-4-iod- benzol	0,202	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
86		2-Fluor-4-iod- toluol	0,173	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
87		1-Iod-3,5-di-	0,083	Ether/Hexan/Me	2-Butanon/

71

		methylbenzol		OH (25/25/1)	Ether
88		1-Brom-2-fluor-4-iodbenzol	0,096	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
89*		1-Iod-2,3-dimethylbenzol	0,145	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
90*		1-Iod-2,3-dimethylbenzol	0,096	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
91		1-Iod-naphthalin	0,082	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
92		1-Iod-3,5-bis-trifluormethylbenzol	0,168	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
93		1-Brom-3-iodbenzol	0,081	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
94		2-Fluor-5-iodtoluol	0,216	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
95*		3-Iodtoluol	0,079	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether
96*		3-Iodtoluol	0,088	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether


Bei den mit einem * gekennzeichneten Beispielen konnten Diastereomere isoliert werden.

5

Grignard-Reaktion 3

Reaktionsgleichung:

72



Durchführung: Siehe AAV 3.

Ansatz A: $R' = H$ (Beispiel 97 und 99)

5

Ansatz B: $R' = 3-OCH_3$ (Beispiel 100 bis 102)Ansatz C: $R' = 4-F$ (Beispiel 103 und 104)

10


Beispiel		Aryliodid	Ausbeute	Reinigung	
Nr.				Säulen- chromato- graphie	Kristallisation
97		3-Iodtoluol	0,033	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	Ether/ Essigester
98		1,2-Difluor-4- iodbenzol	0,125	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	Ether/ Essigester
99		4-Iodtoluol	0,080	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	Ether/ Essigester
100		4-Iodtoluol	0,097	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	Ether/ Essigester
101		1-Chlor-4-iod- benzol	0,104	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	Ether/ Essigester
102		1-Brom-2-fluor-4-iod- benzol	0,101	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	Ether/ Essigester

73

103		4-Iodtoluol	0,080	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	Ether/ Essigester
104		1-Chlor-4-iod- benzol	0,080	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	Ether/ Essigester

Grignard-Reaktion unter Eliminierung 2

5 Reaktionsgleichung:




Durchführung: Siehe AAV 3.

Beispiel		Aryliodid	Ausbeute	Reinigung	
Nr.			g Hydro- chlorid	Säulen- chromato- graphie	Kristallisation
105		2-Iod-5- methyl- thiophen	0,122	Ether/Hexan/Me OH (25/25/1)	2-Butanon/ Ether

10

Eliminierung 1

Reaktionsgleichung:



Allgemeine Arbeitsvorschrift 4 (AAV 4):

Der tertiäre Alkohol wurde vorgelegt und mit Bromwasserstoffsäure versetzt. Bei einer Ölbadtemperatur von 80 °C wurde 4 Stunden gerührt (gegebenenfalls wurde über Nacht bei Raumtemperatur nachgerührt). Anschließend wurde der Ansatz mit 40 g Eis versetzt und unter Kühlung mit Natronlauge auf pH 10-11 eingestellt, bevor mit je ca. 20 ml Essigester dreimal extrahiert wurde. Die organischen Phasen wurden vereinigt, mit Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Die Trennung der isomeren Olefine erfolgte über Säulenchromatographie. Anschließend wurde das gereinigte Produkt als Hydrochlorid gefällt und umkristallisiert.

Ansatz: (Beispiel 106 bis 110)

3,00 mmol	tert. Alkohol (als Hydrochlorid)
30,0 ml	48 %ige Bromwasserstoffsäure

sowie zur Aufarbeitung 32 %ige Natronlauge und Essigester.

1,2-Olefine:

Beispiel	Code	Ausbeute	Reinigung
----------	------	----------	-----------

75

Nr.		g Hydrochlorid	Säulenchromatographie	Kristallisation
106		0,050	Ether / Hexan / MeOH (25/25/1)	MEK / Ether
107		0,214	Ether / Hexan / MeOH (25/25/1)	MEK / Ether
108		0,074	Ether / Hexan / MeOH (25/25/1)	MEK / Ether
109		0,098	Essigester / Hexan / MeOH (3/12/1)	MEK / Ether

1,6-Olefine:


Beispiel		Ausbeute	Reinigung	
Nr.		g Hydrochlorid	Säulenchromatographie	Kristallisation
110		0,175	Ether / Hexan/ MeOH (25/25/1)	MEK / Ether
111		0,027	Ether / Hexan / MeOH (25/25/1)	MEK / Ether
112		0,161	Ether / Hexan / MeOH (25/25/1)	MEK / Ether

5

Fluorierung 1

10 Reaktionsgleichung:

76



Allgemeine Arbeitsvorschrift 5 (AAV 5):

Die Apparatur wurde ausgeheizt und mit Stickstoff belüftet. Anschließend wurden 5 ml Dichlormethan vorgelegt und mit Deoxofluor versetzt. Bei einer Temperatur von -15 °C wurde das Edukt, gelöst im restlichen Dichlormethan, langsam zugetropft und 90 Minuten nachgerührt. Unter Kühlung wurde dann etwas Wasser zugegeben und mittels Natriumcarbonat-Lsg. auf pH 11 gestellt. Anschließend wurde dreimal mit Dichlormethan extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen wurden mittels Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Die Reinigung erfolgte über Säulenchromatographie. Anschließend wurde das gereinigte Produkt als Hydrochlorid gefällt und umkristallisiert.

Ansatz: (Beispiel 113)

15	1,50 mmol	Edukt (tert. Alkohol)
	5,00 mmol	Deoxofluor
	15 ml	Dichlormethan (getrocknet)

sowie zur Aufarbeitung 32 %ige Natronlauge und Essigester.


Beispiel		Ausbeute	Reinigung	
Nr.		g Hydrochlorid	Säulenchromatographie	Kristallisation

77

113		0,050	Ether / Hexan/ MeOH (25/25/1)	MEK / Ether
-----	--	-------	----------------------------------	-------------

Fluorierung 2

5 Reaktionsgleichung:




Durchführung: Siehe AAV 5:

Beispiel		Ausbeute	Reinigung	
Nr.		g Hydrochlorid	Säulenchromatographie	Kristallisation
114		0,032	Essigester	Ether

10

Grignard-Reaktion 4

Reaktionsgleichung:



15 Allgemeine Arbeitsvorschrift 6 (AAV 6)

In einem ausgeheizten und unter Inertgas auf -10°C abgekühlten Reaktionsgefäß wurde die in THF gelöste Mannichbase (400 μl , 0,5 M) vorgelegt. Unter Rühren wurden daraufhin 2 Äquivalente des vorbereiteten Grignard- oder Organolithium-Reagenzes zugegeben (0,5 M in THF oder Diethylether, 800 μl). Das Reaktionsgemisch wurde bei Raumtemperatur gerührt. Nach drei Stunden wurde

erneut auf -10°C gekühlt und mit Ammoniumchlorid-Lösung hydrolysiert. Das Reaktionsgemisch wurde zweimal mit Ethylacetat extrahiert und bei 40°C im Vakuum eingengt.

10 Zur Charakterisierung wurde ein ESI-MS aufgenommen.

Die eingesetzten Grignard- oder Organolithium-Reagenzien wurden hergestellt aus:

Phenylmagnesiumbromid

15 4-Chlorphenylmagnesiumbromid

Benzylmagnesiumchlorid

4-Fluor-3-methylphenylmagnesiumbromid

o-Tolylmagnesiumbromid

Vinylmagnesiumbromid

20 4-t-Butylphenylmagnesiumbromid

Cyclopentylmagnesiumchlorid

m-Tolylmagnesiumchlorid

Cyclohexylmagnesiumchlorid

4-Fluorphenylmagnesiumbromid

25 Phenethylmagnesiumbromid

Lithiumphenylacetylid

2-Thienyllithium

1-Brommagnesium-2,4-dichlorbenzol

3-Bromanisolmagnesiumbromid

- Phenylpropylmagnesiumbromid
 2,3-Dichlorphenylmagnesiumbromid
 p-Toluylmagnesiumbromid
 4-Bromanisolmagnesiumbromid
 5 Cyclohexylmethylmagnesiumbromid
 2-Brommagnesium-4-fluoranol
 3-Fluorphenylmagnesiumbromid
 3-Chlorphenylmagnesiumbromid
 3,5-Dichlorphenylmagnesiumbromid
 10 2-Chlorbenzylmagnesiumchlorid
 4-Fluorbenzylmagnesiumchlorid
 3-Methoxybenzylmagnesiumchlorid
 5-Brommagnesium-2-chlorbenzotrifluorid
 3-Fluorbenzylmagnesiumchlorid
 15 2-Methoxyphenylmagnesiumbromid
 2-Methylbenzylmagnesiumchlorid
 3-Chlor-4-fluorphenylmagnesiumbromid
 3-Brommagnesiumbenzotrifluorid
 3-Methylbenzylmagnesiumchlorid
 20 4-Chlorbenzylmagnesiumchlorid
 2-Chlor-6-fluorbenzylmagnesiumchlorid
 2,5-Dimethylbenzylmagnesiumchlorid
 3-Chlorbenzylmagnesiumchlorid
 2,4-Dichlorbenzylmagnesiumchlorid
 25 2-Brommethyl-1,4-dimethylbenzol
 4-Brom-1-chlor-2-trifluormethylbenzol

Beispiel	Name	berechnete Masse	gefundene Masse
115	1-Benzyl-2-(dimethylamino-phenyl-methyl)-	399.57	400,4

	4-phenyl-cyclohexanol		
116	2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-vinyl-cyclohexanol	335.49	336,3
117	1-(4- <i>tert</i> -Butyl-phenyl)-2-(dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-cyclohexanol	441.65	442,4
118	2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-m-tolyl-cyclohexanol	399.57	400,3
119	2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-phenethyl-4-phenyl-cyclohexanol	413.6	414,5
120	2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-phenylethynyl-cyclohexanol	409.57	410,3
121	2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-(3-methoxy-phenyl)-4-phenyl-cyclohexanol	415.57	416,3
122	2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol	427.63	428,5
123	2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-(4-methoxy-phenyl)-4-phenyl-cyclohexanol	415.57	416,3
124	2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-(2-methoxy-phenyl)-4-phenyl-cyclohexanol	415.57	416,3
125	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-phenyl-cyclohexanol	339.47	340,4
126	1-Benzyl-4-benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	353.5	354,4
127	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol	371.49	372,4
128	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-o-tolyl-cyclohexanol	353.5	354,4
129	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-vinyl-cyclohexanol	289.41	290,3
130	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	331.49	332,4
131	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol	353.5	354,4
132	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-bicyclohexyl-1-ol	345.52	346,4
133	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol	357.46	358,3
134	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-phenylethynyl-cyclohexanol	363.5	364,3
135	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol	345.5	346,4
136	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	369.5	370,4
137	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol	381.55	382,4
138	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol	353.5	354,4
139	4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	369.5	370,3

140	4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol	357.46	358,4
141	4-Benzyloxy-1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	373.92	374,4
142	4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	383.53	384,4
143	4-Benzyloxy-1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	441.92	442,3
144	4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol	371.49	372,4
145	4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methyl-benzyl)-cyclohexanol	367.53	368,4
146	4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-cyclohexanol	381.55	382,4
147	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	387.95	388,8
148	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol	400	400,8
149	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2,3-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	426.81	427,0/428,9
150	4-(4-Chlor-benzyl)-1-cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	377.99	378,8
151	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	405.94	406,7
152	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol	375.91	376,7
153	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	392.36	393,0
154	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3,5-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	426.81	426,5/428,3
155	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	406.39	406,9
156	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	389.94	390,8
157	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol	389.94	390,7
158	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	387.95	388,8
159	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methyl-benzyl)-cyclohexanol	385.97	386,8
160	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methyl-benzyl)-cyclohexanol	385.97	386,7
161	1,4-Bis-(4-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	406.39	407,1
162	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2-chlor-6-fluor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	424.38	425,1
163	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-cyclohexanol	400	400,8
164	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3-chlor-benzyl)-2-	406.39	407,0

	dimethylaminomethyl-cyclohexanol		
165	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2,4-dichlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	440.84	440,9/442,4
166	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-phenyl-cyclohexanol	357.92	358,5
167	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(4-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	392.36	392,7/394,5
168	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol	389.94	390,6
169	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-o-tolyl-cyclohexanol	371.95	372,5
170	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-vinyl-cyclohexanol	307.86	308,5
171	4-(4-Chlor-benzyl)-1-cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	349.94	350,3
172	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol	371.95	372,5
173	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-bicyclohexyl-1-ol	363.97	364,4
174	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol	375.91	376,5
175	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-phenethyl-cyclohexanol	385.97	386,5
176	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-phenylethynyl-cyclohexanol	381.94	382,5
177	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol	363.95	364,4
178	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol	371.95	372,6
179	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	387.95	388,6
180	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-trimethylsilanylethynyl-cyclohexanol	378.03	378,7
181	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	460.36	460,8/462,1
182	4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3-chlor-4-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol	410.35	410,6/412,4
183	4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol	425.92	426,6
184	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-phenyl-cyclohexanol	341.46	342,4
185	1-(4-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	375.91	376,5
186	1-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	355.49	356,4
187	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol	373.48	374,4
188	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-o-tolyl-cyclohexanol	355.49	356,4

189	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-vinyl-cyclohexanol	291.4	292,3
190	1-(4- <i>tert</i> -Butyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	397.57	398,4
191	1-Cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	333.49	334,5
192	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-m-tolyl-cyclohexanol	355.49	356,3
193	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-bicyclohexyl-1-ol	347.51	348,4
194	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol	359.45	360,4
195	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-phenethyl-cyclohexanol	369.52	370,4
196	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-phenylethynyl-cyclohexanol	365.49	366,3
197	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol	347.49	348,3
198	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	371.49	372,3
199	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol	383.55	384,4
200	1-(2,3-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	410.35	410,6/412,4
201	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol	355.49	356,4
202	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	371.49	372,3
203	1-Cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	361.54	362,4
204	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(5-fluor-2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	389.48	390,4
205	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol	359.45	360,4
206	1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	375.91	376,5/377,5
207	1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	410.35	410,6/412,3
208	1-(2-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	389.94	390,7
209	2-Dimethylaminomethyl-1,4-bis-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	373.48	374,5
210	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	385.52	386,4
211	1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	443.91	444,5/445,4


212	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol	373.48	374,4
213	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	371.49	372,4
214	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(2-methyl-benzyl)-cyclohexanol	369.52	370,4
215	1-(3-chlor-4-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	393.9	394,5
216	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol	409.46	410,5
217	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-methyl-benzyl)-cyclohexanol	369.52	370,4
218	1-(4-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	389.94	390,5
219	1-(2-chlor-6-fluor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	407.93	408,5
220	2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	383.55	384,4
221	1-(3-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	389.94	390,4/391,3
222	1-(2,4-Dichlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol	424.38	424,5/426,3
223	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-phenyl-cyclohexanol	353.5	354,5
224	1-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	367.53	368,6
225	2-Dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	385.52	386,4
226	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-o-tolyl-cyclohexanol	367.53	368,5
227	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-vinyl-cyclohexanol	303.44	304,3
228	1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	409.61	410,7
229	1-Cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	345.52	346,4
230	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-m-tolyl-cyclohexanol	367.53	368,4
231	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-bicyclohexyl-1-ol	359.55	360,4
232	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-phenethyl-cyclohexanol	381.55	382,4
233	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-phenylethynyl-cyclohexanol	377.52	378,4
234	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol	359.53	360,3

235	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	383.53	384,4
236	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol	395.58	396,6
237	1-(2,3-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	422.39	422,8/424,5
238	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol	367.53	368,5
239	1-Cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	373.58	374,8
240	2-Dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methoxy-phenyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	401.52	402,5
241	1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	387.95	388,5
242	1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	422.39	422,7/424,5
243	1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	455.94	456,6/457,4
244	2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	385.52	386,4
245	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	383.53	384,4
246	2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol	421.5	422,6
247	1-(2-chlor-6-fluor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	419.96	420,9/422,6
248	2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	395.58	396,7
249	1-(3-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol	401.97	402,9
250	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-phenyl-cyclohexanol	357.46	358,4
251	1-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol	371.49	372,8
252	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol	389.48	390,4
253	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-vinyl-cyclohexanol	307.4	308,6
254	1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol	413.57	414,6
255	1-Cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol	349.48	350,4

256	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-m-tolyl-cyclohexanol	371.49	372,5
257	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-bicyclohexyl-1-ol	363.51	364,6
258	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-phenethyl-cyclohexanol	385.52	386,5
259	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-phenylethynyl-cyclohexanol	381.49	382,6
260	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol	363.49	364,6
261	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	387.49	388,6
262	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-p-tolyl-cyclohexanol	371.49	372,6
263	1-Cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol	377.54	379,0
264	2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol	389.48	390,7
265	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol	387.49	388,8
266	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-methyl-benzyl)-cyclohexanol	385.52	387,0
267	2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol	399.54	400,9
268	1-(3-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol	405.94	406,8
340	4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol; Hydrochlorid		
341	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol; Hydrochlorid		
342	2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol; Hydrochlorid		
343	4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol; Hydrochlorid		
344	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-p-tolyl-cyclohexanol; Hydrochlorid		
345	4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol; Hydrochlorid		
346	2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol; Hydrochlorid		
347	4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-cyclohexanol; Hydrochlorid		
348	1-(4-Chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol; Hydrochlorid		
349	4-Benzyloxy-1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol; Hydrochlorid		

Alkylierung

Reaktionsgleichung:



5

Allgemeine Arbeitsvorschrift 7 (AAV 7):

360 mg 3-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochlorid wurden in 3 ml THF p.a. vorgelegt, 340 mg Kalium-tert.-butylat (2,5 Moläquivalente) zugegeben und 15 Minuten nachgerührt. Anschließend wurde das entsprechende substituierte Benzylbromid (1,5 Moläquivalente) gelöst in 0,6 ml THF p.a. zugetropft und 16 Stunden bei Raumtemperatur nachgerührt.

10

Zur Aufarbeitung wurden 2,2 ml Wasser zugegeben, zweimal mit je 10 ml Ethylacetat extrahiert, die vereinigten Extrakte über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Die Rohprodukte wurden mit Ethylacetat/Methanol/Hexan (V/V/V = 1:1:1) an Kieselgel chromatographiert. Die erhaltenen Produkte wurden in Analogie zur AAV 1 mit Chlortrimethylsilan in wäßrigem 2-Butanon in die korrespondierenden Hydrochloride überführt.

15

Bei der Herstellung von [5-(4-Methoxybenzyloxy)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexylmethyl]dimethylamin wurde das Cyclohexenderivat [5-(4-Methoxy-benzyloxy)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohex-2-enylmethyl]dimethylamin als Nebenprodukt isoliert, da das eingesetzte 3-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochlorid mit der Vorstufe 5-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohex-3-enol Hydrochlorid verunreinigt war, die zur Herstellung von 3-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol katalytisch über Palladium hydriert wurde.

20


Beispiele gemäß AAV 7:

269	[5-Benzoyloxy-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin; Hydrochlorid
270	[5-(3-Chlor-benzoyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin; Hydrochlorid
271	[2-(3-Methoxy-phenyl)-5-(naphthalin-2-ylmethoxy)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin; Hydrochlorid
272	[5-(3-Methoxy-benzoyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin; Hydrochlorid
273	[5-(4-Chlor-benzoyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin; Hydrochlorid
274	[5-(4-Methoxy-benzoyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin; Hydrochlorid
275	2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-(naphthalin-2-ylmethoxy)-cyclohexanol; Hydrochlorid
276	[5-(4-Methoxy-benzoyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohex-2-enylmethyl]-dimethyl-amin; Hydrochlorid

5

Acylierung 2

Reaktionsgleichung:



Allgemeine Arbeitsvorschrift 9 (AAV 8):

- 10 Im getrockneten Reaktionsgefäß wurden 5 ml einer 0,5 M Lösung von Kalium-tert.-butylat in THF p.a. vorgelegt, bei -10 °C 2 ml einer 1 M Lösung des jeweiligen Alkohols in THF p.a. zugegeben, 30 Minuten unter Erwärmung auf Raumtemperatur gerührt, erneut auf -10 °C gekühlt, 2 ml einer 1,25 M Lösung des

korrespondierenden Säurechlorids in THF p.a. zugegeben und eine Stunde bei 30 °C gerührt.

Zur Aufarbeitung wurden bei 0 °C 2 ml 1 M Natriumhydrogencarbonatlösung zugegeben, die überstehende THF-Phase abgetrennt, mit Diisopropylether/Methanol (V/V = 1/1) an Kieselgel chromatographiert und das erhaltene Produkt in Analogie zur AAV 1 durch Lösen in 2-Butanon und Zugabe von Wasser und Chlortrimethylsilan in das Hydrochlorid überführt.

Ansätze gemäß AAV 8 mit 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,4-diol Hydrochlorid (äquatorialer Alkohol) :

282	2,2-Dimethyl-propionsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
281	3-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
280	4-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
307	2-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
306	Naphthalin-1-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
305	3,5-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
304	3,4,5-Trimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
303	Phenyl-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
302	(3-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
301	(4-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
300	Cyclopentancarbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
299	2-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
298	3-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
297	4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
296	3,5-Difluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
295	4-Trifluormethyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
294	2-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-

	methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
293	3-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
292	4-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
291	3,4-Dichlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
290	4-Methyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
309	2-Hydroxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
289	Naphthalin-2-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
287	3,4-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
336	Valeriansäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid

Ansätze gemäß AAV 8 mit 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,4-diol Hydrochlorid (axialer Alkohol):

277	Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
286	2,2-Dimethyl-propionsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
285	3-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
284	4-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
327	2-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
326	Naphthalin-1-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
325	3,5-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
324	3,4,5-Trimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
323	Phenyl-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
322	(3-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
321	(4-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
320	Cyclopentancarbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
319	2-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
318	3-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid

317	4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
316	3,5-Difluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
315	4-Trifluormethyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
314	2-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
313	3-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
312	4-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
311	3,4-Dichlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
310	4-Methyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
308	Naphthalin-2-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid
288	3,4-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester; Hydrochlorid

Beispiel 278:

4-Amino-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Dihydrochlorid:

5

In eine Lösung von 2,64 g Natriumcyanoborhydrid in 45 ml getrocknetem Methanol wurden unter Rühren portionsweise 2,43 g trockenes Zinkchlorid eingetragen und 30 Minuten nachgerührt. Diese Lösung wurde langsam zu einer Suspension von 16,7 g trockenem Ammoniumacetat und 9,0 g 3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanon in 45 ml trockenem Methanol getropft und 72 Stunden bei Raumtemperatur nachgerührt.

10

Zur Aufarbeitung wurden im Eisbad 45 ml halbkonzentrierte Salzsäure zugetropft, nach beendeter Zugabe eine Stunde nachgerührt und das Methanol im Vakuum entfernt. Zum Rückstand wurden unter Eiskühlung 30 g Kaliumhydroxid gegeben und dreimal mit je 25 ml Dichlormethan extrahiert, die vereinigten Extrakte über Kaliumcarbonat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das isolierte Rohprodukt (8,8 g) wurde an Kieselgel chromatographiert. Die erhaltenen 6,25 g 4-Amino-2-

15

dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol wurden in Analogie zur AAV 1 in das korrespondierende Dihydrochlorid überführt.

5 Beispiel 334 und 335:

2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-methylamino-cyclohexanol

Dihydrochlorid (äquatoriales und axiales Amin)

18,8 g 3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanon wurden
10 unter Stickstoffatmosphäre in 210 ml THF p.a. gelöst, im Eis-/Methanol-Bad 24,3 ml
5,6 M Methylaminlösung in THF zugegeben, gefolgt von 5,72 ml Eisessig und
portionsweise insgesamt 20,0 g Natriumtriacetoxymborhydrid. Nach beendeter Zugabe
wurde das Kühlbad entfernt und 16 Stunden unter Erwärmung auf Raumtemperatur
nachgerührt.

15 Zur Aufarbeitung wurden 120 ml Natronlauge zugegeben, dreimal mit je 100 ml
Diethylether extrahiert, die Extrakte vereinigt, zweimal mit je 50 ml Wasser
gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. 2,5 g des
erhaltenen Rohprodukts (17,4 g) wurden mit Methanol an Kieselgel
chromatographiert. Es wurden 580 bzw. 600 mg zweier diastereomerer 2-Dimethyl-
20 aminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-methylaminocyclohexanole erhalten, die dem
axialen und dem äquatorialen Produkt entsprechen, und diese in Analogie zur AAV 1
in die korrespondierenden Dihydrochloride überführt.

25 Beispiel 279:

2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-(naphthalin-2-ylmethoxy)cyclo-
hexanol Hydrochlorid:

2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-(naphthalin-2-ylmethoxy)cyclohexanol und das entsprechende Hydrochlorid wurden analog zur AAV 7 aus 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexan-1,4-diol Hydrochlorid und 2-Brommethylnaphthalin hergestellt.

5

Beispiel 350:

[2,5-Bis-(4-fluor-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
Hydrochlorid:

10

Bei der Umsetzung von 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexan-1,4-diol Hydrochlorid mit 4-Fluorbenzylbromid gemäß AAV 7 wurde als Nebenprodukt nach chromatographischer Reinigung an Kieselgel auch [2,5-Bis-(4-fluorbenzyloxy)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexylmethyl]dimethylamin erhalten, das in Analogie zur AAV 1 in das korrespondierende Hydrochlorid überführt wurde.

15

Beispiel 283:

Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester
Hydrochlorid:

20

28,0 g 3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanon wurden unter Stickstoffatmosphäre in 140 ml Isopropanol gelöst, portionsweise 1,72 g Natriumborant zugegeben und eine Stunde nachgerührt. Zur Aufarbeitung wurden zunächst 91 ml 2 M Salzsäure, dann 20 ml 10 M Natronlauge zugegeben, zweimal mit je 100 ml Dichlormethan extrahiert, die vereinigten Extrakte über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingengt. Das erhaltene Rohprodukt (29,8 g) wurde in 500 ml Aceton gelöst und durch Zugabe von 1,82 ml Wasser gefolgt von 12,7 ml

25

Chlortrimethylsilan und Rühren über Nacht in 25,7 g 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,4-diol Hydrochlorid (äquatorialer Alkohol) überführt. Aus der Mutterlauge konnten nach Zugabe von 2 M Natriumcarbonatlösung und zweimaliger Extraktion mit Ethylacetat 5,6 g des angereicherten diastereoisomeren

5 Reduktionsproduktes isoliert werden, das durch Chromatographie an Kieselgel mit Ethylacetat/Methanol (V/V = 1:3) gereinigt wurde. Nach Hydrochloridfällung wurden 4,1 g 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,4-diol Hydrochlorid (axialer Alkohol) erhalten.

205 g 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,4-diol Hydrochlorid

10 (äquatorialer Alkohol) wurden unter Stickstoffatmosphäre in 2050 ml THF p.a. suspendiert, langsam 149 g Kalium-tert.-butylat zugegeben, eine Stunde nachgerührt, 71 ml Butyrylchlorid zugetropft und eine weitere Stunde nachgerührt, bevor nochmals 36 g Kalium-tert.-butylat und 34 ml Butyrylchlorid zugegeben wurden. Zur Aufarbeitung wurden 980 ml Wasser zugegeben, zweimal mit je

15 1000 ml Ethylacetat extrahiert, die vereinigten Extrakte mit wenig 1M Natriumhydrogencarbonatlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das erhaltene Rohprodukt (236 g) wurde mit einer weiteren, analog hergestellten Charge dieses Rohprodukts (232 g) vereinigt, in 2400 ml Aceton und 470 ml trockenem Ethanol gelöst und durch Zugabe von einem halben Moläquivalent

20 Wasser und einem Moläquivalent Chlortrimethylsilan 442 g des Hydrochlorids von Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexylester erhalten.

25 Beispiel 332 und 333:

(+)- und (-)-Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexylester

Die enantiomeren (+)- und (-)-Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexylester wurden durch enzymatische Racematspaltung von

Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexylester und anschließende Isolierung des verbliebenen Butyrats bzw. erneute Veresterung des erhaltenen 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,4-diols wie für das Racemat beschrieben hergestellt (Gais, Hans-Joachim; Griebel, Carsten; Buschmann, Helmut; Tetrahedron: Asymmetry 11 (2000) 917-928).

Beispiel 351: 5-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohex-3-enol Hydrochlorid:

20,0 g 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1,4-diol (äquatorialer Alkohol) wurden in 300 ml konz. Ameisensäure gelöst, 6,75 ml Acetylchlorid zugegeben und zwei Stunden zum Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlung wurde eingeeengt, der Rückstand mit 2 M Natronlauge aufgenommen und mit Ethylacetat extrahiert. Die vereinigten Extrakte wurden über Natriumsulfat getrocknet, filtriert, eingeeengt, das erhaltene Rohprodukt (16,7 g) in 170 ml 2-Butanon gelöst und durch Zugabe von 1,15 ml Wasser und 8,1 ml Chlortrimethylsilan 5-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohex-3-enol Hydrochlorid (17,7 g) ausgefällt.

Beispiel 328 und 329:

2-Dimethylaminomethyl-1,4-bis-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexan-1,4-diol Hydrochlorid (cis- und trans-Diol):

Aus 7,47 g Magnesium und 38,9 ml 3-Bromanisol wurde in 60 ml THF p.a. das korrespondierende Grignardreagenz hergestellt, bei ca. 10 °C eine Lösung von 40 g 1,4-Dioxa-spiro[4.5]decan-8-on in 75 ml THF p.a. zugetropft und eine Stunde nachgerührt. Zur Aufarbeitung wurde im Eisbad 20 massenprozentige Ammoniumchloridlösung zugegeben, mit Ethylacetat extrahiert, die vereinigten Extrakte über

Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeengt. Zum erhaltenen Rohprodukt (61,6 g) wurden im Eisbad 128 ml Wasser, 62 g Eis und eine Lösung von 31,5 ml konz.

Salzsäure in 385 ml Wasser gegeben, die Mischung fünf Stunden bei 5 – 10 °C gerührt, mit Ethylacetat extrahiert, die vereinigten Extrakte über Natriumsulfat

getrocknet, filtriert und eingeengt. Das Rohprodukt wurde mit Diisopropylether verrührt und der verbliebene Feststoff abfiltriert. Es wurden 14,0 g 4-Hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanon erhalten.

Zu 10,0 g 4-Hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanon wurden in 100 ml Acetonitril 4,23 g Dimethylmethylenammoniumchlorid und ein Tropfen Acetylchlorid gegeben

und die Mischung 16 Stunden gerührt. Der ausgefallene Feststoff wurde abfiltriert, mit wenig Acetonitril gewaschen und im Vakuum getrocknet. Es wurden 12,2 g 2-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanon erhalten.

Aus 0,75 g Magnesium und 3,9 ml 3-Bromanisol wurde in 20 ml THF p.a. das korrespondierende Grignardreagenz hergestellt, bei ca. 10 °C eine Lösung von

3,87 g 2-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexanon in 25 ml THF p.a. zugetropft und eine Stunde nachgerührt. Zur Aufarbeitung wurde im Eisbad

20 massenprozentige Ammoniumchloridlösung zugegeben, mit Ethylacetat extrahiert, die vereinigten Extrakte über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeengt. Das erhaltene Rohprodukt (5,44 g) wurde mit Ethylacetat/Methanol

(V/V = 1:1) an Kieselgel chromatographiert. Die erhaltenen diastereomeren 2-Dimethylaminomethyl-1,4-bis-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexan-1,4-diole (cis- und trans-Diol) wurden in Analogie zur AAV 1 mit Chlortrimethylsilan in wäßrigem 2-Butanon in die korrespondierenden Hydrochloride (240 bzw. 777 mg) überführt.

Beispiel 337 und 338:

(E)- und (Z)-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexyliden]essigsäureethylester Hydrochlorid

100 g 1,4-Dioxa-spiro[4.5]decan-8-on wurden in 800 ml Toluol gelöst, 534 ml 32 massenprozentige Natronlauge zugegeben, unter Eiskühlung und intensivem Rühren eine Lösung von 127 ml Triethylphosphonoacetat in 250 ml Toluol zugetropft und eine Stunde nachgerührt. Die organische Phase wurde abgetrennt, die wäßrige

5 Phase mit Toluol extrahiert, die vereinigten organischen Phasen dreimal mit Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das erhaltene Rohprodukt wurde mit Diisopropylether/Hexan (V/V = 1:1) an Kieselgel chromatographiert. Es wurden 92,9 g (1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yliden)essigsäureethylester erhalten.

10 92,8 g (1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yliden)essigsäureethylester wurden in 465 ml Diisopropylether gelöst, 186 ml Wasser und 137 ml konz. Salzsäure zugegeben, eine Stunde gerührt, die Phasen getrennt, die wäßrige Phase zweimal mit Diisopropylether extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das erhaltene Rohprodukt (95,9 g) wurde mit

15 Diisopropylether/Hexan (V/V = 2:1) an Kieselgel chromatographiert. Neben 17,2 g nicht umgesetztem (1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yliden)essigsäureethylester wurden 76,3 g (4-Oxocyclohexyliden)essigsäureethylester erhalten.

Zu 87,6 g (4-Oxocyclohexyliden)essigsäureethylester in 260 ml Acetonitril wurden 7,5 g Dimethylmethylenammoniumchlorid gegeben, eine Stunde auf 60 °C erwärmt,

20 250 ml Diisopropylether zugegeben und über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Der ausgefallene Feststoff wurde abfiltriert, mit wenig Acetonitril gewaschen und im Vakuum getrocknet. Es wurden 30,4 g (E)-(3-Dimethylaminomethyl-4-oxocyclohexyliden)essigsäureethylester erhalten. Die Mutterlauge wurde zur Trockne eingeeengt und der Rückstand (95 g) aus 475 ml 2-Butanon umkristallisiert. Es

25 wurden 62,3 g (Z)-(3-Dimethylaminomethyl-4-oxocyclohexyliden)essigsäureethylester erhalten.

Aus 0,37 g Magnesium und 1,9 ml 3-Bromanisol wurde in 10 ml THF p.a. das korrespondierende Grignardreagenz hergestellt, bei Eiskühlung eine Lösung von 2,40 g (Z)-(3-Dimethylaminomethyl-4-oxocyclohexyliden)essigsäureethylester in

24 ml THF p.a. zugetropft und eine Stunde nachgerührt. Zur Aufarbeitung wurde im Eisbad 5 ml 4 M Ammoniumchloridlösung zugegeben, die organische Phase abgetrennt, die wäßrige Phase zweimal mit Ethylacetat extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingengt. Das

5 erhaltene Rohprodukt (3,20 g) wurde mit Diisopropylether/Methanol (V/V = 1:1) an Kieselgel chromatographiert. Es wurden 1,61 g (Z)-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexyliden]essigsäureethylester erhalten und diese in Analogie zur AAV 1 in das korrespondierende Hydrochlorid überführt.

Analog wurden aus 2,40 g (E)-(3-Dimethylaminomethyl-4-oxocyclohexyliden)essigsäureethylester 1,48 g des Hydrochlorids von (E)-[3-Dimethylaminomethyl-4-

10 hydroxy-4-(3-methoxyphenyl)cyclohexyliden]essigsäureethylester hergestellt.

Beispiel 352:

15 2-Dimethylaminomethyl-1-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexan-1,4-diol
Hydrochlorid

Aus 18,2 g Magnesium und 177 g 2-Brom-6-methoxynaphthalin wurde in 720 ml THF p.a. das korrespondierende Grignardreagenz hergestellt, bei Eiskühlung eine

20 Lösung von 105 g 7-Dimethylaminomethyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]decan-8-on in 315 ml THF p.a. zugetropft und eine Stunde nachgerührt. Zur Aufarbeitung wurde im Eisbad 375 ml 4 M Ammoniumchloridlösung zugegeben, die organische Phase abgetrennt, die wäßrige Phase zweimal mit Ethylacetat extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingengt. Es wurden 229 g 7-Di-

25 methylaminomethyl-8-(6-methoxynaphthalin-2-yl)-1,4-dioxa-spiro[4.5]decan-8-ol erhalten.

229 g 7-Dimethylaminomethyl-8-(6-methoxynaphthalin-2-yl)-1,4-dioxa-spiro[4.5]decan-8-ol wurden in 1150 ml THF gelöst, 164 ml Wasser und 41 ml konz. Salzsäure zugegeben, fünf Stunden gerührt, mit 32 massenprozentiger Natronlauge

neutralisiert, zweimal mit Ethylacetat/THF (V/V = 1:1) extrahiert, die vereinigten organischen Phasen zweimal mit gesättigter Kochsalzlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das erhaltene Rohprodukt (196 g) wurde mit 400 ml Methanol und 600 ml Diisopropylether versetzt, filtriert, das
5 Filtrat eingeeengt, in 1600 ml 2-Butanon gelöst und durch Zugabe von Wasser und Chlortrimethylsilan in Analogie zur AAV 1 das Hydrochlorid gefällt. Es wurden 106 g des Hydrochlorid von 3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexanon erhalten.

4,3 g Natriumborant wurden in 82 ml Ethanol p.a. vorgelegt, 82,2 g 3-Dimethyl-
10 aminomethyl-4-hydroxy-4-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexanon, gelöst in 330 ml Ethanol p.a., unter Eiskühlung zugetropft und eine Stunde nachgerührt. Zur Aufarbeitung wurden unter Eiskühlung zunächst 44 ml konz. Salzsäure, dann 40 ml 32 massenprozentige Natronlauge zugegeben, zweimal mit Dichlormethan extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet,
15 filtriert und eingeeengt. Aus dem erhaltenen Rohprodukt (88,2 g) wurden in Analogie zur AAV 1 77,4 g des Hydrochlorids von 2-Dimethylaminomethyl-1-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexan-1,4-diol erhalten.

20 Beispiel 353:

Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexylester Hydrochlorid:

70,0 g 2-Dimethylaminomethyl-1-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexan-1,4-diol
25 wurden in 560 ml THF p.a. suspendiert, portionsweise 44,0 g Kalium-tert.-butylat zugegeben, zwanzig Minuten gerührt, 21,0 ml Butyrylchlorid zugetropft, weitere zwanzig Minuten gerührt und noch zweimal weitere je 21,0 g Kalium-tert.-butylat und 20,0 ml Butyrylchlorid nach obigem Schema zugegeben. Zur Aufarbeitung wurden unter Eisbadkühlung 290 ml Wasser zugegeben, die Phasen getrennt, einmal mit

Ethylacetat extrahiert, die vereinigten organischen Phasen mit 1 M Natriumhydrogencarbonatlösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Aus dem erhaltenen Rohprodukt (90 g) wurden in Analogie zur AAV 1 47,1 g des Hydrochlorids von Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexylester erhalten.

Beispiel 331:

4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexanol

10 Hydrochlorid:

Aus 0,28 g Magnesium und 2,72 g 2-Brom-6-methoxynaphthalin wurde in 11 ml THF p.a. das korrespondierende Grignardreagenz hergestellt, bei Eiskühlung eine Lösung von 2,00 g 4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethylcyclohexanon in 8 ml THF p.a. zugetropft und eine Stunde nachgerührt. Zur Aufarbeitung wurden im Eisbad 4 ml 4 M Ammoniumchloridlösung zugegeben, die organische Phase abgetrennt, die wäßrige Phase zweimal mit Diethylether extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das erhaltene Rohprodukt (3,20 g) wurde mit Ethylacetat/Methanol/Hexan (V/V/V = 1:1:1) an Kieselgel chromatographiert. Es wurden 1,52 g 4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexanol erhalten und diese in Analogie zur AAV 1 in das korrespondierende Hydrochlorid (1,32 g) überführt.

25 Beispiel 330:

6-(4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-hydroxy-cyclohexyl)-naphthalin-2-ol
Hydrochlorid:

200 g 6-Bromnaphthalin-2-ol, 143 g Imidazol und 151 g tert.-Butylchloridimethylsilan wurden in 1000 ml Dimethylformamid gelöst, zwei Stunden bei Raumtemperatur gerührt, die Lösung weitgehend eingeeengt (506 g), der Rückstand in Ethylacetat und Wasser gelöst, 1500 ml gesättigte Natriumchloridlösung zugegeben, die Phasen getrennt, die wäßrige Phase zweimal mit Ethylacetat extrahiert und die organischen Phasen vereinigt und eingeeengt. Das erhaltene Rohprodukt wurde in siedendem Hexan gelöst und anschließend über Nacht bei 4 °C aufbewahrt. Nach Filtration wurden 158 g (6-Bromnaphthalin-2-yloxy)-tert.-butyldimethylsilan isoliert. Erneutes einengen der Mutterlauge und Umkristallisation aus Methanol erbrachte weitere 54 g (6-Bromnaphthalin-2-yloxy)-tert.-butyldimethylsilan.

3,87 g (6-Bromnaphthalin-2-yloxy)-tert.-butyldimethylsilan wurden in 19 ml THF p.a. gelöst, bei Trockeneiskühlung 6,0 ml 1,6 M Butyllithiumlösung in Hexan zugetropft, kurz nachgerührt, dann eine Lösung von 2,00 g 4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethylcyclohexanon in 20 ml THF p.a. zugetropft und eine Stunde unter langsamer Erwärmung nachgerührt. Zur Aufarbeitung wurden im Eisbad 4 ml Wasser zugegeben, die organische Phase abgetrennt, die wäßrige Phase zweimal mit Diethylether extrahiert, die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet, filtriert und eingeeengt. Das erhaltene Rohprodukt (5,00 g) wurde mit Ethylacetat/Methanol (V/V = 1:1) an Kieselgel chromatographiert. Es wurden 2,20 g 6-(4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-hydroxy-cyclohexyl)-naphthalin-2-ol erhalten und diese in Analogie zur AAV 1 in das korrespondierende Hydrochlorid (1,33 g) überführt.

Allgemeine Ergänzung der Beispiele:

Ergänzend wurden folgende weitere Beispiele nach mindestens einer der vorstehenden (Grund-)Verfahren oder AAV's hergestellt:

Beispiel Nr.: Verbindungsname:


	354	Benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
5	355	2-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	356	3-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	357	4-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
10	358	2-Fluor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	359	3- Fluor -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
15	360	4- Fluor -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	361	2-Methyl-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	362	3- Methyl -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
20	363	4- Methyl -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	364	2-Methoxy-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
25	365	3- Methoxy -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	366	4- Methoxy -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	367	2,6-Dichlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
30	368	2,6-Difluor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	369	2-Chlor-5-fluor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
35	370	Biphenyl-4-carbonsäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexylester; Bishydrochlorid
	371	2-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	372	3-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
40	373	4-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	374	2-Fluor-benzoessäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
45	375	3-Fluor-benzoessäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	376	4-Fluor-benzoessäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	377	2-Methyl-benzoessäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid

	378	3-Methyl-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	379	4-Methyl-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
5	380	2-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	381	3-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	382	4-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
10	383	2,6-Dichlor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	384	2,6-Fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
15	385	2-Chlor-6-fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
	386	Biphenyl-4-carbonsäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester; Bishydrochlorid
20	387	4-(2-Chlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	388	4-(3-Chlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	389	4-(4-Chlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
25	390	4-(2-Fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	391	4-(3-Fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
30	392	4-(4-Fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	393	4-(2-Methyl-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	394	4-(3-Methyl-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
35	395	4-(4-Methyl-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	396	4-(2-Methoxy-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
40	397	4-(3-Methoxy-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	398	4-(4-Methoxy-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	399	4-(2,6-Dichlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
45	400	4-(2,6-Difluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	401	4-(2-Chlor-6-fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol; Bishydrochlorid
50	402	4-(2-Chlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid

	403	4-(3-Chlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	404	4-(4-Chlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
5	405	4-(2-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	406	4-(3-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	407	4-(4-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
10	408	4-(2-Methyl-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	409	4-(3-Methyl-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
15	410	4-(4-Methyl-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	411	4-(2-Methoxy-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	412	4-(3-Methoxy-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
20	413	4-(4-Methoxy-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	414	4-(2,6-Dichlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
25	415	4-(2,6-Difluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	416	4-(2-Chlor-6-fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol; Bishydrochlorid
	417	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol
30	418	4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-cyclohexylester
	419	4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-naphthalin-2-yl-cyclohexylester
35	420	2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-cyclohexanol
	421	6-[2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-hydroxy-cyclohexyl]-naphthalin-2-ol

Patentansprüche

1. Substituierte C-Cyclohexylmethyamin-Derivate der allgemeinen Formel I,



, worin

A ausgewählt ist aus H; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

R¹ ausgewählt ist aus C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl, Heteroaryl, über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem C₃₋₁₀-Cycloalkyl, oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

F, Cl, Br, I, OR¹⁸, SR¹⁸, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Silyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋

$_3$ -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

5 mit R^{18} ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl,
10 gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

R^{19} und R^{20} unabhängig voneinander ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen
15 gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

oder R^{19} und R^{20} zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^{21}CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bilden,


25 mit R^{21} ausgewählt aus H; Phenyl, unsubstituiert oder substituiert; C_{1-10} -Alkyl gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

R^2 und R^3 , unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;


oder die Reste R^2 und R^3 zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^6CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bedeuten,

mit R^6 ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I



ausgewählt ist aus den folgenden Bedeutungen



mit B ausgewählt aus OH, OR⁷, H, F, Cl oder NR⁸R⁹,

5 mit R⁷ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt,
 10 oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

15 R⁸ und R⁹, unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen
 20 gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;


oder die Reste R⁸ und R⁹ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂, CH₂CH₂NR¹⁰CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden

25

mit R^{10} ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,



ausgewählt ist aus



mit R^4 ausgewählt aus H, COR^5 , SO_2R^5 ; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

mit R^5 ausgewählt aus C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-,

oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

mit V ausgewählt aus OR⁴ oder NR⁴R¹¹,

mit W ausgewählt aus R¹¹, OR¹² oder NR¹¹R¹²,

mit R¹¹ und R¹² unabhängig voneinander ausgewählt aus H, C₇₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

gegebenenfalls in Form ihrer Racemate, ihrer reinen Stereoisomeren, insbesondere Enantiomeren oder Diastereomeren, oder in Form von Mischungen der Stereoisomeren, insbesondere der Enantiomeren oder Diastereomeren, in einem beliebigen Mischungsverhältnis; in dargestellter Form oder in Form ihrer Säuren oder ihrer Basen oder in Form ihrer Salze, insbesondere der physiologisch verträglichen Salze, oder in Form ihrer Solvate, insbesondere der Hydrate,

mit Ausnahme von Verbindungen, bei denen

A Wasserstoff ist,


R^1 ein einfach in 3-Position O- oder S-substituierter Phenylring ist, und

R^2 und R^3 beide Methyl sind und

5


X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I

(Teilformel Ia)




die folgende Bedeutung hat

10




, also X



bedeutet, und B für OH steht

und gleichzeitig die Gruppierung $Y \equiv Z$ ausgewählt ist aus



15

mit R^4 ausgewählt aus C_{1-6} -Alkyl, C_{2-6} -Alkenyl, C_{5-7} -Cycloalkylmethyl, substituiertem oder unsubstituiertem Phenyl oder substituiertem oder unsubstituiertem Benzyl

20

oder mit Ausnahme von Verbindungen, bei denen

R^2 , R^3 unabhängig voneinander ausgewählt sind aus

5 H, C_1 - C_{10} -Alkyl, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert, gesättigt oder ungesättigt; C_3 - C_7 -Cycloalkyl, gesättigt oder ungesättigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert, bzw. einem entsprechenden Heterocyclus, bei dem ein C-Atom im Ring durch N, S oder O ersetzt ist; Alkylaryl oder Alkylheteroaryl, gesättigt oder ungesättigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;


oder

15 R^2 und R^3 zusammen einen Ring bilden und $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^6CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bedeuten;


X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I


20

(Teilformel Ia)



die folgende Bedeutung hat





A Wasserstoff ist,

5 R¹ ein unsubstituierter oder ein- oder zweifach substituierter Phenylring ist,

B ausgewählt ist aus

H, F, Cl, OH oder OR⁷, wobei R⁷ ausgewählt ist aus

10 C₁-C₁₀-Alkyl, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach
 substituiert oder unsubstituiert; gesättigt oder ungesättigt; C₃-C₇-
 Cycloalkyl, gesättigt oder ungesättigt, einfach oder mehrfach
 substituiert oder unsubstituiert, bzw. einem entsprechenden
 Heterocyclus, bei dem ein C-Atom im Ring durch N, S oder O ersetzt
 15 ist; Alkylaryl oder Alkylheteroaryl, gesättigt oder ungesättigt, einfach
 oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl,
 jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

und gleichzeitig die Gruppierung $\text{Y} \text{---} \text{Z} \begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array}$ $\text{V} \text{---} \text{CH} \begin{array}{l} \diagup \\ \diagdown \end{array}$ bedeutet

20 mit V ausgewählt aus OR⁴ mit R⁴ ausgewählt aus COR⁵ und mit R⁵ ausgewählt
 aus C₁₋₆-Alkyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert.

2. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß Anspruch 1, dadurch
 25 gekennzeichnet, daß


R¹ kein einfach in 3-Position O- oder S-substituierter Phenylring ist.

3. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß Anspruch 1, dadurch
 30 gekennzeichnet, daß

R^1 ausgewählt ist aus C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Naphtyl, Heteroaryl, über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

F, Cl, Br, I, OR^{18} , SR^{18} , SO_2R^{18} , SO_2OR^{18} , CN, $COOR^{18}$, $NR^{19}R^{20}$; C_{1-10} -Alkyl, C_{1-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Silyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

oder R^1 einer Verbindung gemäß der allgemeinen Formel II entspricht



II

, worin

R¹³, R¹⁵ und R¹⁷ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, OR¹⁸, SR¹⁸, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

R¹⁴ und R¹⁶ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R¹³ und R¹⁴ oder R¹⁴ und R¹⁵ zusammen jeweils die Gruppe OCH₂O, OCH₂CH₂O, CH=CHO, CH=C(CH₃)O oder CH=CHNH bilden und R¹⁵-R¹⁷ oder R¹³, R¹⁶ und R¹⁷ die oben genannte Bedeutung haben,

mit R¹⁸ ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt

oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

R¹⁹ und R²⁰ unabhängig voneinander ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

oder R¹⁹ und R²⁰ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂, CH₂CH₂NR²¹CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden,

mit R²¹ ausgewählt aus H, C₁₋₁₀-Alkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert.


4. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß

R^1 ausgewählt ist aus C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Naphtyl, Heteroaryl, über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

F, Cl, Br, I, OR^{18} , SR^{18} , SO_2R^{18} , SO_2OR^{18} , CN, $COOR^{18}$, $NR^{19}R^{20}$; C_{1-10} -Alkyl, C_{1-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Silyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert.

5. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß

R^1 einer Verbindung gemäß der allgemeinen Formel II entspricht



II

, worin

5

R¹³, R¹⁵ und R¹⁷ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, OR¹⁸, SR¹⁸, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

10

15

R¹⁴ und R¹⁶ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl, vorzugsweise C₃₋₆-Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

20

25

oder die Reste R^{13} und R^{14} oder R^{14} und R^{15} zusammen jeweils die Gruppe OCH_2O , OCH_2CH_2O , $CH=CHO$, $CH=C(CH_3)O$ oder $CH=CHNH$ bilden und R^{15} - R^{17} oder R^{13} , R^{16} und R^{17} die oben genannte Bedeutung haben,

5

mit R^{18} ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

10

15

R^{19} und R^{20} unabhängig voneinander ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl, vorzugsweise C_{3-6} -Cycloalkyl, oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

20

25


oder R^{19} und R^{20} zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^{21}CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bilden,

120


mit R^{21} ausgewählt aus H, C_{1-10} -Alkyl, vorzugsweise C_{1-6} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert,

5

und



ausgewählt ist aus



10

mit R^4 ausgewählt aus H, COR^{5a} , SO_2R^5 ; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

15

20

mit R^5 ausgewählt aus C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder

25

Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

mit R^{5a} ausgewählt aus C₃₋₁₀-Cycloalkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

mit V ausgewählt aus OR⁴ oder NR⁴R¹¹,


mit W ausgewählt aus R¹¹, OR¹² oder NR¹¹R¹²,

mit R¹¹ und R¹² unabhängig voneinander ausgewählt aus H, C₇₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert.


6. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I

(Teilformel Ia)



ausgewählt ist aus den folgenden Bedeutungen



5

mit B ausgewählt aus OR^7 , H, F, Cl oder NR^8R^9 ,

10

mit R^7 ausgewählt aus C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

15

R^8 und R^9 , unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen

20

gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R⁸ und R⁹ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂,
CH₂CH₂NR¹⁰CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden

mit R¹⁰ ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert.

7. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

A ausgewählt ist aus Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert.

8. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß A Wasserstoff ist.

9. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß

R² und R³, unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₆-

Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R^2 und R^3 zusammen $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2$,
5 $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NR}^6\text{CH}_2\text{CH}_2$ oder $(\text{CH}_2)_{3-6}$ bedeuten,

mit R^6 ausgewählt aus H; C_{1-6} -Alkyl, insbesondere CH_3 , oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach
10 oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-6} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

und/oder

15 R^7 ausgewählt aus C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt,
20 oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-6} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

und/oder

25 R^8 und R^9 , unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-6} -

Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R^8 und R^9 zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$,
5 $CH_2CH_2NR^{10}CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bilden

mit R^{10} ausgewählt aus H; C_{1-6} -Alkyl, oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder
10 mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-6} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

und/oder

15 R^4 ausgewählt ist aus H, COR^5 , SO_2R^5 ; C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt
20 oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-6} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

mit R^5 ausgewählt aus C_{1-6} -Alkyl-, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert
25 oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

und/oder

R¹¹ und R¹² unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

und/oder

R¹³, R¹⁵ und R¹⁷ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, OR¹⁸, SR¹⁸, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₆-Alkyl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

und/oder

R¹⁴ und R¹⁶ unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H, F, Cl, Br, I, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₆-Alkyl oder C₃₋₆-Cycloalkyl oder Silyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Aryl, C₃₋₆-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

oder die Reste R^{13} und R^{14} oder R^{14} und R^{15} zusammen jeweils die Gruppe OCH_2O , OCH_2CH_2O , $CH=CHO$, $CH=C(CH_3)O$ oder $CH=CHNH$ bilden und R^{15} - R^{17} oder R^{13} , R^{16} und R^{17} die oben genannte Bedeutung haben,

5 **und/oder**

10 R^{18} ausgewählt ist aus H; C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-6} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

15 **und/oder**

20 R^{19} und R^{20} unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C_{1-6} -Alkyl oder C_{3-6} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-6} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

25 oder R^{19} und R^{20} zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$, $CH_2CH_2NR^{21}CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bilden,

und/oder

R^{21} ausgewählt ist aus H, C_{1-6} -Alkyl gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert.

10. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß

5 A ausgewählt ist aus Wasserstoff oder Phenyl; unsubstituiert oder ein- oder mehrfach substituiert; vorzugsweise Wasserstoff.

11. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß

10

R^2 und R^3 ausgewählt sind aus C_{1-6} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder ein oder mehrfach substituiert, vorzugsweise CH_3 , insbesondere beide CH_3 ,

15

oder die Reste R^2 und R^3 zusammen $CH_2CH_2NR^6CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bedeuten, mit R^6 ausgewählt aus H oder C_{1-6} -Alkyl, gesättigt, verzweigt oder unverzweigt und unsubstituiert; insbesondere H oder CH_3 .

12. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß

20


R^1 ausgewählt ist aus; C_{1-6} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt; C_{3-6} -Cycloalkyl, Naphthyl, Phenyl, Furyl, Thiophenyl, über C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Naphthyl, Phenyl, C_{3-6} -Cycloalkyl oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen oder Ethinyl gebundenem Thiophenyl oder Furyl, die gemäß Anspruch 1 unsubstituiert oder ein- oder mehrfach unsubstituiert sein können.

25


13. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß

30

129




ausgewählt ist aus



5

14. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate der allgemeinen Formel I,



10

I

, worin

15

A ausgewählt ist aus H; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

20

R¹ ausgewählt ist aus Naphthyl oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen oder Ethinyl gebundenem Naphthyl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

F, Cl, Br, I, OR¹⁸, SR¹⁸, SO₂R¹⁸, SO₂OR¹⁸, CN, COOR¹⁸, NR¹⁹R²⁰; C₁₋₁₀-Alkyl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Silyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

mit R¹⁸ ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

R¹⁹ und R²⁰ unabhängig voneinander ausgewählt aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

oder R¹⁹ und R²⁰ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂, CH₂CH₂NR²¹CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden,

mit R^{21} ausgewählt aus H, C_{1-10} -Alkyl gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

5 R^2 und R^3 , unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -
10 Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;


oder die Reste R^2 und R^3 zusammen $CH_2CH_2OCH_2CH_2$,
15 $CH_2CH_2NR^6CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{3-6}$ bedeuten,

mit R^6 ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder
20 über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;


X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I

25

(Teilformel Ia)




ausgewählt ist aus den folgenden Bedeutungen




- 5 mit B ausgewählt aus OH, OR⁷, H, F, Cl oder NR⁸R⁹,
- mit R⁷ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-,
- 10 oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;
- 15 R⁸ und R⁹, unabhängig voneinander ausgewählt sind aus H; C₁₋₁₀-Alkyl oder C₃₋₁₀-Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, einfach
- 20 oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;
- 25 oder die Reste R⁸ und R⁹ zusammen CH₂CH₂OCH₂CH₂, CH₂CH₂NR¹⁰CH₂CH₂ oder (CH₂)₃₋₆ bilden

mit R^{10} ausgewählt aus H; C_{1-10} -Alkyl oder C_{3-10} -Cycloalkyl, jeweils gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C_{1-3} -Alkylen gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,



ausgewählt ist aus



mit V ausgewählt aus OR^4 ,

mit R^4 ausgewählt aus COR^5 ; C_{1-10} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; C_{3-10} -Cycloalkyl, gesättigt oder ungesättigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C_{1-3} -Alkyl gebundenem Aryl, C_{3-10} -Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

mit R⁵ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; C₃₋₁₀-Cycloalkyl, gesättigt oder ungesättigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; Aryl-, oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder über C₁₋₃-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, oder C₁₋₃-Alkylen gebundenem Aryl, C₃₋₁₀-Cycloalkyl oder Heteroaryl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,

gegebenenfalls in Form ihrer Racemate, ihrer reinen Stereoisomeren, insbesondere Enantiomeren oder Diastereomeren, oder in Form von Mischungen der Stereoisomeren, insbesondere der Enantiomeren oder Diastereomeren, in einem beliebigen Mischungsverhältnis; in dargestellter Form oder in Form ihrer Säuren oder ihrer Basen oder in Form ihrer Salze, insbesondere der physiologisch verträglichen Salze, oder in Form ihrer Solvate, insbesondere der Hydrate.

15. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß

A ausgewählt ist aus H oder Phenyl, jeweils einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; vorzugsweise H

und/oder

R¹ ausgewählt ist aus Naphthyl, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert mit Resten unabhängig voneinander ausgewählt aus

F, Cl, Br, I, OR¹⁸; C₁₋₄-Alkyl, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

mit R^{18} ausgewählt aus H; C_{1-4} -Alkyl, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder einfach oder mehrfach substituiert;

5

vorzugsweise R^1 ausgewählt ist aus Naphthyl, unsubstituiert oder substituiert mit OH oder OCH_3 ,

und/oder

10

R_2 und R_3 ausgewählt sind aus C_{1-6} -Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiert oder ein oder mehrfach substituiert, vorzugsweise CH_3 , insbesondere beide CH_3 ,

15


oder die Reste R_2 und R_3 zusammen $CH_2CH_2NR_6CH_2CH_2$ oder $(CH_2)_{4-5}$ bedeuten, insbesondere zusammen $CH_2CH_2NR_6CH_2CH_2$ bedeuten, mit R^6 ausgewählt aus H oder C_{1-6} -Alkyl, gesättigt, verzweigt oder unverzweigt und unsubstituiert; insbesondere H oder CH_3 ;

20

und/oder


X in der Formel I gemäß Teilformel Ia der Formel I


(Teilformel Ia)



25


ausgewählt ist aus den folgenden Bedeutungen




, also X  bedeutet, mit B ausgewählt aus OH, OR⁷, H, F, Cl,
mit R⁷ ausgewählt aus C₁₋₄-Alkyl, verzweigt oder unverzweigt,
einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert;

vorzugsweise mit B ausgewählt aus OH,

und/oder



ausgewählt ist aus



mit V ausgewählt aus OR⁴,

mit R⁴ ausgewählt aus COR⁵; Phenyl oder Benzyl, einfach oder
mehrfach substituiert oder unsubstituiert; , insbesondere COR⁵ oder
Benzyl, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert,;

mit R⁵ ausgewählt aus C₁₋₁₀-Alkyl, insbesondere C₁₋₆-Alkyl, gesättigt oder ungesättigt, verzweigt oder unverzweigt, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert; oder Phenyl, einfach oder mehrfach substituiert oder unsubstituiert.

5

16. Substituierte C-Cyclohexylmethylamin-Derivate gemäß einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß sie ausgewählt sind aus der folgenden Gruppe:

- 10 • 4-Benzyloxy-1-(4-brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3,4-difluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-4-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3,4-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 15 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3,4-dimethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3-chlor-4-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 20 • 4-Benzyloxy-1-(5-chlor-2-methoxy-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(2-brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methylsulfanyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 25 • 4-Benzyloxy-1-(4-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3-brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(4-brom-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(2-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 30 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-pentyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-isopropyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,3-dimethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 35 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol;

- 4-Benzyloxy-1-(3,5-bis-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-ethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-1-(3,5-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 5 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-o-tolyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-phenyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 10 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(3,4-dimethyl-phenyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3,5-dimethyl-phenyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-isopropyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 15 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol;
- 1-(3,4-Difluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-fluor-4-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 20 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 1-(2-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 1-(3-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 25 • 1-(4-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 1-(3,4-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 30 • 1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-2-methoxy-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 35 • 1-(3,5-Bis-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;

- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(2-methylsulfanyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 5 • (5-Benzyloxy-2-thiophen-2-yl-cyclohex-2-enylmethyl)-dimethyl-amin;
- [5-(4-Fluor-benzyloxy)-2-thiophen-2-yl-cyclohex-2-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- 3,4-Dichlor-N-[3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-benzamid;
- Naphthalin-2-carbonsäure [3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-amid;
- 10 • N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-3-phenyl-propionamid;
- N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-4-nitro-benzamid;
- 15 • N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-4-methyl-3-nitro-benzamid;
- N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-3,4,5-trimethoxy-benzamid;
- 2-(4-Chlor-phenoxy)-N-[3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-acetamid;
- 20 • N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-3-nitro-benzamid;
- Furan-2-carbonsäure [3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-amid;
- 25 • N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-2-phenoxy-acetamid;
- N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-4-trifluormethyl-benzamid;
- N-[3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexyl]-4-methoxy-benzamid;
- 30 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-ethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-isopropyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 35 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,4-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2-methylsulfanyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;

- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-phenethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(3-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 5 • 1-(4-Chlor-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-phenethyl-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol;
- 1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3,4-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(3,4-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 10 • 1-(4-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-4-methyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3,5-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Brom-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(3,4-Difluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 15 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,3-dimethyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-naphthalin-1-yl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(3,5-Bis-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 1-(3-Brom-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 20 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-4-phenethyl-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-phenethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyl-1-(3,4-difluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 25 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol;
- 1-(4-Brom-3-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol;
- 30 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol;
- Dimethyl-[2-(5-methyl-thiophen-2-yl)-5-phenethyl-cyclohex-2-enylmethyl]-amin;
- [2-(3,5-Bis-trifluormethyl-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-1-enylmethyl]-dimethyl-
- 35 amin;
- Dimethyl-(5-phenethyl-2-p-tolyl-cyclohex-1-enylmethyl)-amin;
- [2-(3-Chlor-4-fluor-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-1-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- [2-(2,5-Dimethyl-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-1-enylmethyl]-dimethyl-amin;

- Dimethyl-(5-phenethyl-2-p-tolyl-cyclohex-2-enylmethyl)-amin;
- [2-(3,5-Bis-trifluormethyl-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-2-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- [2-(3-Chlor-4-fluor-phenyl)-5-phenethyl-cyclohex-2-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- 5 • [2-(3-Chlor-4-fluor-phenyl)-2-fluor-5-phenethyl-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [2-Fluor-5-(4-fluor-benzyl)-2-p-tolyl-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- Benzyl-2-(dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-vinyl-cyclohexanol
- 10 • 1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-(dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-phenethyl-4-phenyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 15 • 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-(3-methoxy-phenyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-4-phenyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-(4-methoxy-phenyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 2-(Dimethylamino-phenyl-methyl)-1-(2-methoxy-phenyl)-4-phenyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-phenyl-cyclohexanol
- 20 • 1-Benzyl-4-benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-o-tolyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-vinyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-1-cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 25 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-bicyclohexyl-1-ol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol
- 30 • 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 35 • 4-Benzyloxy-1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol

- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 5 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2,3-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 10 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3,5-dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 15 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(2-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 1,4-Bis-(4-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 20 • 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2-chlor-6-fluor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 25 • 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(2,4-dichlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-phenyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(4-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol
- 30 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-o-tolyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-vinyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-bicyclohexyl-1-ol
- 35 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-phenethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol

- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-trimethylsilanylethynyl-cyclohexanol
- 5 • 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 4-(4-Chlor-benzyl)-1-(3-chlor-4-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol
- 10 • 4-(4-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-phenyl-cyclohexanol
- 1-(4-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol
- 15 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-o-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-vinyl-cyclohexanol
- 1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-Cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 20 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-bicyclohexyl-1-ol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(4-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-phenethyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 25 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol
- 1-(2,3-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 30 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(4-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 1-Cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(5-fluor-2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-fluor-phenyl)-cyclohexanol
- 35 • 1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(2-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1,4-bis-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol

- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 5 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(2-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3-chlor-4-fluor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol
- 10 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-1-(3-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(4-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(2-chlor-6-fluor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 15 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(2,4-Dichlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-phenyl-cyclohexanol
- 20 • 1-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-o-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-vinyl-cyclohexanol
- 25 • 1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-Cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-bicyclohexyl-1-ol
- 30 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-phenethyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 35 • 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol
- 1-(2,3-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol

- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 1-Cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(5-fluor-2-methoxy-phenyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3-chlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3,5-Dichlor-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-1-(3-trifluormethyl-phenyl)-cyclohexanol
- 1-(2-chlor-6-fluor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 1-(3-chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-phenyl-cyclohexanol
- 1-Benzyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(4-fluor-3-methyl-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-vinyl-cyclohexanol
- 1-(4-tert-Butyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 1-Cyclopentyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-m-tolyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-bicyclohexyl-1-ol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-phenethyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-phenylethynyl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-thiophen-2-yl-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-p-tolyl-cyclohexanol
- 1-Cyclohexylmethyl-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol

- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(2-methoxy-phenyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-methyl-benzyl)-cyclohexanol
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- 1-(3-Chlor-benzyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol
- [5-Benzyloxy-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [5-(3-Chlor-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [2-(3-Methoxy-phenyl)-5-(naphthalin-2-ylmethoxy)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [5-(3-Methoxy-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [5-(4-Chlor-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- [5-(4-Methoxy-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethyl-amin;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-(naphthalin-2-ylmethoxy)-cyclohexanol;
- [5-(4-Methoxy-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohex-2-enylmethyl]-dimethyl-amin;
- Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Amino-2-dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-(naphthalin-2-ylmethoxy)-cyclohexanol
- 4-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2,2-Dimethyl-propionsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2,2-Dimethyl-propionsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,4-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,4-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Naphthalin-2-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;

- 4-Methyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,4-Dichlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 5 • 4-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 10 • 2-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Trifluormethyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,5-Difluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 15 • 4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 20 • Cyclopentancarbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- (4-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 25 • (3-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester
- Phenyl-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,4,5-Trimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 30 • 3,5-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Naphthalin-1-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 35 • 2-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Naphthalin-2-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2-Hydroxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 40 • 4-Methyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,4-Dichlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 45 • 4-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;

- 2-Chlor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Trifluormethyl-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 5 • 3,5-Difluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 10 • 2-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Cyclopentancarbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 15 • (4-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- (3-Methoxy-phenyl)-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- Phenyl-essigsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 20 • 3,4,5-Trimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 3,5-Dimethoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 25 • Naphthalin-1-carbonsäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2-Methoxy-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- 2-Dimethylaminomethyl-1,4-bis-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexan-1,4-diol;
- 30 • 2-Dimethylaminomethyl-1,4-bis-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexan-1,4-diol;
- 6-(4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-hydroxy-cyclohexyl)-naphthalin-2-ol;
- 4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-cyclohexanol;
- Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester
- 35 • Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-methylamino-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxy-phenyl)-4-methylamino-cyclohexanol;
- 40 • Valeriansäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylester;
- [3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylidene]-essigsäure ethylester;
- [3-Dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylidene]-essigsäure ethylester;
- 45 • 3-[2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-hydroxy-cyclohexyl]-phenol;
- 4-Benzoyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(3-phenyl-propyl)-cyclohexanol;

- 2-Dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol; ,
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(3-fluor-benzyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-p-tolyl-cyclohexanol;
- 5 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 4-Benzyloxy-2-dimethylaminomethyl-1-(2,5-dimethyl-benzyl)-cyclohexanol;
- 1-(4-Chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-cyclohexanol;
- 10 • 4-Benzyloxy-1-(4-chlor-3-trifluormethyl-phenyl)-2-dimethylaminomethyl-cyclohexanol;
- [2,5-Bis-(4-fluor-benzyloxy)-2-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexylmethyl]-dimethylamin;
- 5-Dimethylaminomethyl-4-(3-methoxy-phenyl)-cyclohex-3-enol
- 15 • 2-Dimethylaminomethyl-1-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexan-1,4-diol
- Buttersäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(6-methoxynaphthalin-2-yl)cyclohexylester
- Benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 20 • 2-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 3-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 4-Chlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 25 • 2-Fluor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 3- Fluor -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 30 • 4- Fluor -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 2-Methyl-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 3- Methyl -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 35 • 4- Methyl -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 2-Methoxy-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 40 • 3- Methoxy -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 4- Methoxy -benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 2,6-Dichlor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 45 • 2,6-Difluor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;
- 2-Chlor-5-fluor-benzoessäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexyl ester;

- Biphenyl-4-carbonsäure 4-hydroxy-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-naphthalin-2-yl-cyclohexylester;
- 2-Chlor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 5 • 3-Chlor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 4-Chlor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 10 • 2-Fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 3-Fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 4-Fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 15 • 2-Methyl-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 3-Methyl-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 4-Methyl-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 20 • 2-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 3-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 25 • 4-Methoxy-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 2,6-Dichlor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 2,6-Fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 30 • 2-Chlor-6-fluor-benzoesäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- Biphenyl-4-carbonsäure 4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-3-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexyl ester;
- 35 • 4-(2-Chlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(3-Chlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(4-Chlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 40 • 4-(2-Fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(3-Fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 45 • 4-(4-Fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(2-Methyl-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;

- 4-(3-Methyl-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(4-Methyl-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 5 • 4-(2-Methoxy-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(3-Methoxy-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 10 • 4-(4-Methoxy-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol;
- 4-(2,6-Dichlor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol,
- 4-(2,6-Difluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol,
- 15 • 4-(2-Chlor-6-fluor-benzyloxy)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol,
- 4-(2-Chlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(3-Chlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 20 • 4-(4-Chlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(2-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 25 • 4-(3-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(4-Fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(2-Methyl-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 30 • 4-(3-Methyl-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(4-Methyl-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 35 • 4-(2-Methoxy-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(3-Methoxy-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(4-Methoxy-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 40 • 4-(2,6-Dichlor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 4-(2,6-Difluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 45 • 4-(2-Chlor-6-fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-2-(4-methyl-piperazin-1-ylmethyl)-cyclohexanol;
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-naphthalin-2-yl-cyclohexanol
- 4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-cyclohexylester

- 4-Fluor-benzoesäure 3-dimethylaminomethyl-4-hydroxy-4-naphthalin-2-yl-cyclohexylester
- 2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-(6-methoxy-naphthalin-2-yl)-cyclohexanol
- 5 • 6-[2-Dimethylaminomethyl-4-(4-fluor-benzyloxy)-1-hydroxy-cyclohexyl]-naphthalin-2-ol

gegebenenfalls in Form ihrer Racemate, ihrer reinen Stereoisomeren, insbesondere Enantiomeren oder Diastereomeren, oder in Form von Mischungen der Stereoisomeren, insbesondere der Enantiomeren oder Diastereomeren, in einem beliebigen Mischungsverhältnis; in dargestellter Form oder in Form ihrer Säuren oder ihrer Basen oder in Form ihrer Salze, insbesondere der physiologisch verträglichen Salze, oder in Form ihrer Solvate, insbesondere der Hydrate, insbesondere des Hydrochlorid- oder des Bishydrochloridsalzes.

17. Arzneimittel enthaltend wenigstens ein substituiertes C-Cyclohexylmethylamin-Derivat gemäß einem der Ansprüche 1 bis 16, sowie gegebenenfalls geeignete Zusatz- und/oder Hilfsstoffe und/oder gegebenenfalls weitere Wirkstoffe.

18. Arzneimittel gemäß Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß ein enthaltenes substituiertes C-Cyclohexylmethylamin-Derivat gemäß einem der Ansprüche 1 bis 16, als reines Diastereomer und/oder Enantiomer, als Razemat oder als nicht-äquimolare oder äquimolare Mischung der Diastereomere und/oder Enantiomere vorliegt.

19. Verwendung eines substituierten C-Cyclohexylmethylamin-Derivats gemäß einem der Ansprüche 1 bis 16 zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Schmerz, insbesondere von neuropathischem oder chronischem Schmerz.

20. Verwendung gemäß Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß ein verwendetes substituiertes C-Cyclohexylmethylamin-Derivat gemäß einem der Ansprüche 1 bis 16, als reines Diastereomer und/oder Enantiomer, als Razemat oder als nicht-äquimolare oder äquimolare Mischung der Diastereomere und/oder Enantiomere vorliegt.