

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公表特許公報(A)

(11)公表番号

特表2023-546205

(P2023-546205A)

(43)公表日 令和5年11月1日(2023.11.1)

(51)国際特許分類		F I		テーマコード (参考)	
C 0 7 K	5/083(2006.01)	C 0 7 K	5/083	4 C 0 7 6	
A 6 1 K	39/39 (2006.01)	A 6 1 K	39/39	4 C 0 8 4	
A 6 1 K	31/52 (2006.01)	A 6 1 K	31/52	4 C 0 8 5	
A 6 1 K	38/06 (2006.01)	A 6 1 K	38/06	4 C 0 8 6	
A 6 1 K	47/55 (2017.01)	A 6 1 K	47/55	4 H 0 4 5	
		審査請求	未請求	予備審査請求	未請求 (全96頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2023-524121(P2023-524121)			(71)出願人	512114774
(86)(22)出願日	令和3年10月20日(2021.10.20)				ユニヴェルザ ヴィ リュブリャナ
(85)翻訳文提出日	令和5年6月19日(2023.6.19)				Univerza v Ljubljani
(86)国際出願番号	PCT/EP2021/079141				スロヴェニア共和国 1000 リュブリ
(87)国際公開番号	WO2022/084417				ャナ, コンGRESニ ツルグ 12
(87)国際公開日	令和4年4月28日(2022.4.28)				Kongresni trg 12, 1
(31)優先権主張番号	LU102145				000 Ljubljana, Slov
(32)優先日	令和2年10月21日(2020.10.21)				enia
(33)優先権主張国・地域又は機関	ルクセンブルク(LU)			(74)代理人	100114890
(81)指定国・地域	AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA				弁理士 アインゼル・フェリックス＝ラ
	,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(				インハルト
	AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,A			(74)代理人	100098501
	T,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR				弁理士 森田 拓
	,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,			(74)代理人	100116403
	最終頁に続く				弁理士 前川 純一
					最終頁に続く

(54)【発明の名称】 コンジュゲート T L R 7 および N O D 2 アゴニスト

(57)【要約】


本発明は、T L R 7 および N O D 2 アゴニストの共有コンジュゲート、そのような化合物を調製するための方法、および医学におけるそのような化合物の使用を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

式 I :

【化 1】



10

式I

による構造を有する化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグであって、

式中、

・ R^1 が、H、ハロゲン、OH、SH、 CF_3 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、 $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ-($C_1 \sim C_6$ アルキル)S-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)SO₂NH-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)O-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)OC(=O)-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)NH-、 $R^a R^b N$ -、または $R^a R^b N(C=O)-$ であり、アルキル、アルコキシ、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、

20

・ R^2 が、H、ハロゲン、OH、 CHF_2 、 CF_3 、 CH_2CF_2 、カルボキシ、CN、NO₂、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)-、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)C(=O)-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)S-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)O-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)OC(=O)-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)NH-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)SO₂NH-、 $R^a R^b N$ -、および $R^a R^b N(C=O)-$ から出現ごとに独立的に選択され、アルキル、アルコキシ、アリール、およびシクロアルキルが、任意選択的に置換されていてもよく、

30

・ R^a および R^b が、H、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^a および R^b が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、


・ X^1 が、単結合、-O-、-S-、-NR^c-、-C(=O)-、または-SO₂-であり、

40

- ・ R^c が、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、または $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキルであり、
- ・ L が、連結基であり、
- ・ n が、0、1、2、3、または4であり、かつ
- ・ R^3 が、


50

【化 2】




式II

【化 3】



式III、または

【化 4】



式IV

からなる群から選択されるNOD2アゴニストであり、
式中、

- ・ X^2 が、単結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR^d-$ 、 $-C(=O)-$ 、または $-SO_2-$ であり、
- ・ R^d が、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、または $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキルであり、
- ・ X^3 が、 $-(CH_2)_2-$ 、 $-(CH=CH)-$ 、またはシクロプロピレンであり、
- ・ R^4 が、 H 、ハロゲン、 OH 、 CHF_2 、 CF_3 、 CH_2CF_2 、カルボキシ、 CN 、 NO_2 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})C(=O)-$ 、 $(C_1 \sim C_6 \text{アリール})C(=O)-$ 、 $(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})S-$ 、 $(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})C(=O)O-$ 、 $(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})OC(=O)-$ 、 $(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})C(=O)NH-$ 、 $(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})SO_2NH-$ 、 $R^e R^f N-$ 、および $R^e R^f N(C=O)-$ から出現ごとに独立的に選択され、アルキル、アルコキシ、アリール、およびシクロアルキルが、任意選択的に置換されていてもよく、
- ・ R^e および R^f が、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^e および R^f が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、
- ・ R^5 が、 $C_1 \sim C_6$ アルキルまたはアミノ酸の特定の側鎖であり、
- ・ R^6 が、 OH 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、 $(C_2 \sim C_{18} \text{アルケニル})O-$ 、 $(C_3 \sim C_{10} \text{シクロアルキル})O-$ 、 $(C_6 \sim C_{10} \text{アリール})O-$ 、 $(C_5 \sim C_9 \text{ヘテロシクリル})O-$ 、および $R^g R^h N-$ から出現ごとに独立的に選択され、アルコキシ、アルケニル、シクロアルキル、アリール、またはヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、
- ・ R^g および R^h が、 H 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_3 \sim$

10

20

30

40

50

C₁₀シクロアルキル、C₆～C₁₀アリール、およびC₅～C₉ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、またはR^gおよびR^hが、窒素原子と一緒になってC₅～C₆ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよい、化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグ。

【請求項 2】

n が、1 である、請求項 1 記載の化合物。

【請求項 3】

R¹ が、水素、C₁～C₆アルコキシ、C₁～C₆アルコキシ-C₁～C₆アルコキシ、(C₁～C₆アルキル)S-、またはCF₃である、請求項 1 または 2 記載の化合物。

10

【請求項 4】

R¹ が、C₁～C₆アルコキシまたはC₁～C₆アルコキシ-C₁～C₆アルコキシである、請求項 1 から 3 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【請求項 5】

R¹ が、n-BuO-である、請求項 1 から 4 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【請求項 6】

R² が、水素、ハロゲン、およびC₁～C₆アルキルからいずれの場合も独立的に選択される、請求項 1 から 5 までのいずれか 1 項記載の化合物。

20

【請求項 7】

R² が、いずれの場合も水素である、請求項 6 記載の化合物。

【請求項 8】

X¹ が、-O-、-NH-、または-C(=O)-である、請求項 1 から 7 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【請求項 9】

L が、アミノ酸、ペプチド、非ペプチドポリマーリンカー、および非ポリマー脂肪族リンカーからなる群から選択される、請求項 1 から 8 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【請求項 10】

L が、非ペプチドポリマーリンカーまたは非ポリマー脂肪族リンカーである、請求項 9 記載の化合物。

30

【請求項 11】

L が、2～100個の繰り返しエチレングリコール単位を含むポリエチレングリコール鎖である、請求項 10 記載の化合物。

【請求項 12】

L が、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、または10個の繰り返しエチレングリコール単位を含むポリエチレングリコール鎖である、請求項 11 記載の化合物。

【請求項 13】

L が、非ポリマー脂肪族リンカーである、請求項 10 記載の化合物。

【請求項 14】

X² が、-O-、-NH-、または-C(=O)-である、請求項 1 から 13 までのいずれか 1 項記載の化合物。

40

【請求項 15】

X³ が、-CH=CH-またはシクロプロピレンである、請求項 1 から 14 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【請求項 16】

R⁴ が、水素、ハロゲン、OH、C₁～C₆アルキル、およびC₁～C₆アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、請求項 1 から 15 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【請求項 17】

50

R⁵ が、C₁～C₆アルキルまたは天然アミノ酸の特定の側鎖である、請求項1から16までのいずれか1項記載の化合物。

【請求項18】

R⁵ が、C₁～C₆アルキル、またはバリン、アラニン、フェニルアラニン、ロイシンもしくはイソロイシンの特定の側鎖である、請求項17記載の化合物。

【請求項19】

R⁵ が、バリンの特定の側鎖である、請求項18記載の化合物。

【請求項20】

R⁶ が、OH、NH₂、(C₂～C₁₈アルケニル)O-、(C₃～C₁₀シクロアルキル)O-、およびC₁～C₁₈アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、請求項1から19までのいずれか1項記載の化合物。

10

【請求項21】

R⁶ が、OH、(C₃～C₁₀シクロアルキル)O-、およびC₁～C₁₈アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、請求項20記載の化合物。

【請求項22】

前記化合物が、

ジエチル((E)-3-(4-(6-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)ベンズアミド)ヘキサノイル)-オキシ)-3-メトキシフェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタメート、

エチルN5-(2-(2-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)ベンズアミド)エトキシ)エチル)-N2-((E)-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタミネート、

20

エチル(R)-1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-15-((S)-2-(2-(E)-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

エチル(R)-1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-15-((S)-2-(2-(E)-3-(4-イソプロピルフェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

30

エチル(R)-1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-15-((S)-2-(2-(E)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

エチル(15R)-1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-15-((2S)-2-(2-(2-(3,4-ジフルオロフェニル)シクロプロパン-1-カルボキサミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

40

エチル(R)-1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-13-((S)-2-(2-(E)-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

エチル(R)-1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-13-((S)-2-(2-シンナムアミドアセ

50

トアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート、

エチル (13R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 13 - ((2S) - 2 - (2 - (2 - (3, 4 - ジフルオロフェニル) シクロプロパン - 1 - カルボキサミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート、

ジエチル ((E) - 3 - (4 - (1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 1, 17 - ジオキソ - 6, 9, 12 - トリオキサ - 2, 16 - ジアザイコサン - 20 - アミド) フェニル) アクリロイル) グリシル - L - バリル - D - グルタメート、

10

ジシクロペンチル ((E) - 3 - (4 - ((1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 1, 17 - ジオキソ - 6, 9, 12 - トリオキサ - 2, 16 - ジアザイコサン - 20 - オイル) オキシ) - 3 - メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル - L - バリル - D - グルタメート、

ジエチル ((E) - 3 - (4 - ((1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 1, 17 - ジオキソ - 6, 9, 12 - トリオキサ - 2, 16 - ジアザイコサン - 20 - オイル) オキシ) - 3 - メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル - L - アラニル - D - グルタメート、

20

ジエチル ((E) - 3 - (4 - ((1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 1, 17 - ジオキソ - 6, 9, 12 - トリオキサ - 2, 16 - ジアザイコサン - 20 - オイル) オキシ) - 3 - メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル - L - フェニルアラニル - D - グルタメート、および


1 - ベンジル 5 - エチル ((E) - 3 - (4 - ((1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 1, 17 - ジオキソ - 6, 9, 12 - トリオキサ - 2, 16 - ジアザイコサン - 20 - オイル) オキシ) - 3 - メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル - L - バリル - D - グルタメートからなる群から選択される、請求項 1 から 21 までのいずれか 1 項記載の化合物。

30

【請求項 23】

式 V :

【化 5】




式V

40

の化合物を式 V I :

【化 6】




式VI

の化合物と反応させるか、

または式 V I I :

50

【化 7】




式VII

10

の化合物を式VIII:

【化 8】




式VIII

20

式IX:


【化 9】



式IX

もしくは式X:

【化 10】



式X

30

の化合物と反応させることと、

任意選択的に、その後、以下の手順:

- ・ 任意の保護基を除去すること、
- ・ 医薬的に許容可能な塩を形成すること、
- ・ 式Iの化合物を式Iの別の化合物に変換すること

40

のうちの1つ以上を実施することと

を含む、請求項1から22までのいずれか1項に定義されているような式Iの化合物（ただし、可変基は、請求項1から22までのいずれか1項に定義されている通りである）を調製するための方法。

【請求項24】

医学における使用のための、請求項1から22までのいずれか1項記載の化合物。

【請求項25】

50

T L R 7 および N O D 2 受容体のアゴニズムが有益である状態の処置における使用のための、請求項 1 から 2 2 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【請求項 2 6】

前記状態が、ウイルス感染症、細菌感染症、真菌感染症、原虫感染症、腫瘍、がん、および免疫疾患からなる群から選択される、請求項 2 5 記載の使用のための化合物。

【請求項 2 7】

請求項 1 から 2 2 までのいずれか 1 項記載の化合物と 1 種以上の医薬的に許容可能な賦形剤または担体とを含む、医薬組成物。

【請求項 2 8】

請求項 1 から 2 2 までのいずれか 1 項記載の化合物を含む、ワクチン。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、T L R 7 および N O D 2 アゴニストの共有コンジュゲート、それらを調製するための方法、および治療用途におけるそれらの使用を提供する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

感染症と闘う体の能力の基礎である自然免疫系は、T o l l 様受容体 (T L R)、ヌクレオチド結合オリゴマー化ドメイン (N O D) 様受容体 (N L R)、レチノイン酸誘導性遺伝子 1 様受容体 (R L R)、C 型レクチン受容体 (C L R)、およびインターフェロン遺伝子の刺激因子 (S T I N G) を含む一連のパターン認識受容体 (P R R) を含有する、A P C、特に樹状細胞 (D C) からなる。これらは、病原体関連分子パターン (P A M P) と呼ばれる免疫刺激分子の多様なセットによって活性化され、これらは、炎症性サイトカイン、インターフェロン (I F N)、および共刺激分子を介してより効果的に抗原を取り込んで提示するように D C に関与し、細胞性 (T h 1) または体液性 (T h 2) 応答などの適応応答のタイプ、ならびにその大きさおよび持続性を決定する不可欠な初期シグナルを提供する (Gutjahr et al. 2016)。

20

【0 0 0 3】

N O D 2 は、N L R ファミリーの細胞内 P R R であり、免疫細胞において広く発現しており、ムラミルジペプチド (M D P) に似た細菌性ペプチドグリカンのフラグメントを認識する (Jakopin 2014)。N O D 2 を刺激すると、核因子 κ B (N F - κ B) およびマイトジェン活性化プロテインキナーゼ (M A P K) シグナル伝達経路が活性化され、それによって、炎症誘発性サイトカインの産生、I 型 I F N 分泌、および共刺激分子の発現が生じる。重要なのは、N O D 2 アゴニストが D C の成熟および活性化を引き起こすことである (Asano et al. 2010、Vidal et al. 2001)。N O D 2 アゴニストは、オートファジーを誘導することも示されており (Cooney et al. 2010、Travassos et al. 2010)、これは、D C における効率的な抗原交差提示の誘導および自然サイトカイン産生の促進に重要である (Morris et al. 2011)。したがって、N O D 活性化は、それ自体は最も強力な自然免疫誘導因子ではないが、適応免疫応答を形成するために不可欠である (Kobayashi et al. 2005)。特に、B 細胞における N L R 発現は、最適な体液性応答に必要である。免疫の多くのメカニズムに N O D が関与していることから、N O D はワクチンアジュバントの優れた標的となっている；最近では、がんワクチンにおけるそれらの使用が注目されていた (Nabergoj et al. 2019)。具体的には、N O D 2 の関与は、粘膜ワクチンの抗原特異的粘膜および全身性応答に不可欠であることが証明された (Bumgardner et al. 2018、Jackson et al. 2012)。これまでの研究によって、N O D 2 アゴニストの本質的な構造要件が確立され、他の分子への共有結合に適した低ナノモル N O D 2 アゴニストの発見に至った (Jakopin et al. 2012、Gobec et al. 2016, 2018)。

30

40

【0 0 0 4】

T L R 7 は、細胞内エンドソーム受容体であり、これは、一本鎖 R N A を検出し、続く

50

て、I R F 7 および N F - κ B を介したシグナル伝達経路を誘導する。ヒトでは、T L R 7 は、主に形質細胞様 D C において発現し、その活性化によって、隣接する N K、T 細胞、および D C をプライミングする I F N α および I L - 1 2 の産生が誘導される。I F N - α は、N K 細胞の細胞毒性能を高め、I L - 1 2 は、N K 細胞からの I F N - γ 分泌を増強する。T L R 7 は、D C の成熟および分化にも寄与し、より良好な共刺激能力および高められた抗原提示能力を有する D C を生成する (Kobold et al. 2014)。イミダゾキノリン、プリン、および 3 - デアザプリンを含む、幾つかの低分子 T L R 7 アゴニストが同定されている (Hemmi et al. 2002、Lee et al. 2003、Jones et al. 2011)。イミダゾキノリンクラスのプロトタイプメンバーであるイミキモドは、局所クリームとして塗布される場合、生殖器疣贅、基底細胞がん腫、および光線角化症に対して効果的である。プリンクラスでは、2 - 置換 8 - ヒドロキシアデニンが、強力な T L R 7 アゴニストであり (Kurimoto et al. 2004, 2010)、他の分子への共有コンジュゲートについての適性を有する (Akinbobuyi et al. 2016) ことが見出された。プリン様構造を有する T L R 7 アゴニストおよび医学におけるそれらの使用の追加的な開示は、Tran et al. 2011、Nakamura et al. 2013、Akinbobuyi et al. 2015、国際公開第 2 0 0 6 / 1 1 7 6 7 0 号、国際公開第 2 0 0 7 / 0 2 4 7 0 7 号、国際公開第 2 0 0 8 / 0 0 4 9 4 8 号、国際公開第 2 0 1 0 / 0 9 3 4 3 6 号、国際公開第 2 0 1 0 / 0 1 8 1 3 4 号、国際公開第 2 0 1 1 / 1 3 4 6 6 8 号、国際公開第 2 0 1 2 / 0 3 8 0 5 8 号、国際公開第 2 0 1 9 / 2 0 9 8 1 1 号、国際公開第 2 0 1 9 / 0 3 5 9 6 9 号、国際公開第 2 0 1 9 / 0 3 6 0 2 3 号、国際公開第 2 0 1 9 / 0 3 5 9 7 1 号、国際公開第 2 0 1 9 / 1 9 7 5 9 8 号を含む。

10

20

【0005】

異なる P R R の同時活性化 (交差活性化) によって、シグナル増幅が許容され、刺激の統合が可能になり、微調整が容易になる (応答の分極が指示される) (Thaïss et al. 2016)。複数の P R R 間のクロストークは、個々の各経路の寄与とは量的および質的の両方で異なり得る。効果的な弱毒生ワクチンは、幾つかの独立した P R R の相乗的な刺激を通じて免疫系に関与して、全身性応答を達成する。さらに、共有結合したキメラデュアル / トリプル P R R アゴニストは、それらの非コンジュゲート混合物よりも相乗的な免疫刺激活性を示した (Tom et al. 2019)。

【0006】

多数の調査によって、エステルおよびアミド結合を介した複数の P R R アゴニストのコンジュゲートが、それらの効力、毒性、または薬物動態に影響を与えることが報告されている。T L R アゴニストは、十分に特徴付けられており、多くのワクチンに欠けている強力な T h 1 応答を誘発することができることから、アジュバント開発の最前線にある。T L R 2 / T L R 9 (Mancini et al. 2014)、T L R 4 / 9 (Madan-Lala et al. 2017)、T L R 2 / T L R 7 (Gutjahr et al. 2017) を含むデュアル T L R アゴニストが報告されている。T L R 2 および T L R 7 アゴニストを結合することによって構築されたキメラリガンドは、強力かつバランスのとれた細胞性および体液性応答を誘発した (Gutjahr et al. 2017)。このコンジュゲートは、同量の個々のアゴニストよりもはるかに安全であることも証明された。すなわち、非コンジュゲートアゴニストの混合物からなるアジュバントは、免疫系を通じて容易に拡散することができる。同様に、デュアル N O D 2 / T L R 2 アゴニストは、H I V - 1 サブユニットワクチンの免疫原性を増加させた (Pavot et al. 2014)。

30

40

【0007】

コンジュゲート N L R / T L R アゴニストの大きな治療可能性を考慮して、かつ既に行われた研究にもかかわらず、前述の受容体からの応答を誘発することができる新たな強力な化合物が引き続き必要とされている。したがって、本明細書には、T L R 7 および N O D 2 アゴニストの両方として機能する新規のコンジュゲート化合物、それらを調製するための方法、および医学におけるそれらの使用が開示されている。

発明の概要

50


【 0 0 0 8 】

本発明の目的に従うと、本明細書に具体化および記載されているように、本願には、合成 N O D 2 アゴニストに共有コンジュゲートした合成 T L R 7 アゴニストである新規の化合物が開示されている。さらに、そのような化合物を調製するための方法および医学におけるそのような化合物の使用が提供される。

【 0 0 0 9 】

第 1 の態様では、本発明は、式 I :

【 化 1 】



式I

の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグであって、

式中、

・ R^1 が、H、ハロゲン、OH、SH、 CF_3 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、 $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ-($C_1 \sim C_6$ アルキル)S-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)SO₂NH-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)O-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)OC(=O)-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)NH-、 $R^a R^b N$ -、または $R^a R^b N(C=O)-$ であり、アルキル、アルコキシ、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、

・ R^2 が、H、ハロゲン、OH、 CHF_2 、 CF_3 、 CH_2CF_2 、カルボキシ、CN、NO₂、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)-、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)C(=O)-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)S-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)O-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)OC(=O)-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)NH-、($C_1 \sim C_6$ アルキル)SO₂NH-、 $R^a R^b N$ -、および $R^a R^b N(C=O)-$ から出現ごとに独立的に選択され、アルキル、アルコキシ、アリール、およびシクロアルキルが、任意選択的に置換されていてもよく、


・ R^a および R^b が、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^a および R^b が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、好ましくは、 R^a および R^b が、H、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^a および R^b が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、

・ X^1 が、単結合、-O-、-S-、-NR^c-、-C(=O)-、または-SO₂-であり、

・ R^c が、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、または $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキルであり、

- ・ L が、連結基であり、
- ・ n が、0、1、2、3、または4であり、かつ
- ・ R³ が、


【化2】



式II


10

【化3】



式III、または

【化4】



式IV

20

からなる群から選択されるNOD2アゴニストであり、

式中、

- ・ X² が、単結合、-O-、-S-、-NR^d-、-C(=O)-、または-SO₂-であり、

30

- ・ R^d が、H、C₁~C₆アルキル、またはC₃~C₁₀シクロアルキルであり、

- ・ X³ が、-(CH₂)₂-、-(CH=CH)-、またはシクロプロピレンであり、

- ・ R⁴ が、H、ハロゲン、OH、CHF₂、CF₃、CH₂CF₂、カルボキシ、CN、NO₂、C₁~C₆アルキル、C₁~C₆アルコキシ、C₃~C₁₀シクロアルキル、(C₁~C₆アルキル)C(=O)-、(C₁~C₆アリール)C(=O)-、(C₁~C₆アルキル)S-、(C₁~C₆アルキル)C(=O)O-、(C₁~C₆アルキル)OC(=O)-、(C₁~C₆アルキル)C(=O)NH-、(C₁~C₆アルキル)SO₂NH-、R^eR^fN-、およびR^eR^fN(C=O)-から出現ごとに独立に選択され、アルキル、アルコキシ、アリール、およびシクロアルキルが、任意選択的に置換されていてもよく、

40

- ・ R^eおよびR^fが、H、C₁~C₆アルキル、C₃~C₁₀シクロアルキル、C₆~C₁₀アリール、およびC₅~C₉ヘテロシクリルから互いに独立に選択されるか、またはR^eおよびR^fが、窒素原子と一緒になってC₅~C₆ヘテロ環を形成していてもよく、

- ・ R⁵ が、C₁~C₆アルキルまたはアミノ酸の特定の側鎖であり、

- ・ R⁶ が、OH、C₁~C₁₈アルコキシ、(C₂~C₁₈アルケニル)O-、(C₃~C₁₀シクロアルキル)O-、(C₆~C₁₀アリール)O-、(C₅~C₉ヘテロシクリル)O-、およびR^gR^hN-から出現ごとに独立に選択され、アルコキシ、アル

50

ケニル、シクロアルキル、アリール、またはヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、

・ R^g および R^h が、 H 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^g および R^h が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよい、

化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグを提供する。

【0010】

更なる態様では、本発明は、式 I の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグを調製するための方法および中間体を提供する。

【0011】

更なる態様では、本発明は、治療における使用のための、式 I の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグを提供する。

【0012】

更なる態様では、本発明は、治療有効量の式 I の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグと、医薬的に許容可能な賦形剤または担体とを含む、医薬組成物を提供する。

【0013】

更なる態様では、本発明は、TLR7 および NOD2 受容体のアゴニズムが有益である状態の処置における、式 I の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグの使用を提供する。

【0014】

更なる態様では、本発明は、医薬品の製造における、式 I の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグの使用を提供する。

【0015】

更なる態様では、本発明は、それを必要とする対象を処置するための方法であって、この対象に、治療有効量の式 I の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグ、あるいは本発明の医薬組成物を投与することを含む、方法を提供する。

【0016】

更なる態様では、本発明は、式 I の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグを含む、ワクチンを提供する。

【0017】

本発明は、以下の項目によってさらに要約することができる。

【0018】

1. 式 I :

10


20

30

40

50

【化 5】



式I

10

による構造を有する化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグであって、

式中、

・ R^1 が、H、ハロゲン、OH、SH、 CF_3 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、 $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $(C_1 \sim C_6$ アルキル)S-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)SO₂NH-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)O-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)OC(=O)-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)NH-、 $R^a R^b N$ -、または $R^a R^b N(C=O)-$ であり、アルキル、アルコキシ、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、

20

・ R^2 が、H、ハロゲン、OH、 CHF_2 、 CF_3 、 CH_2CF_2 、カルボキシ、CN、NO₂、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)-、 $(C_6 \sim C_{10}$ アリール)C(=O)-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)S-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)O-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)OC(=O)-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)C(=O)NH-、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル)SO₂NH-、 $R^a R^b N$ -、および $R^a R^b N(C=O)-$ から出現ごとに独立的に選択され、アルキル、アルコキシ、アリール、およびシクロアルキルが、任意選択的に置換されていてもよく、

30

・ R^a および R^b が、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^a および R^b が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、好ましくは、 R^a および R^b が、H、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^a および R^b が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、

40

・ X^1 が、単結合、-O-、-S-、-NR^c-、-C(=O)-、または-SO₂-であり、

・ R^c が、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、または $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキルであり、


・ L が、連結基であり、

・ n が、0、1、2、3、または4であり、かつ

・ R^3 が、


50

【化 6】




式II

【化 7】



式III、または

【化 8】



式IV

からなる群から選択されるNOD2アゴニストであり、
式中、

- ・ X^2 が、単結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR^d-$ 、 $-C(=O)-$ 、または $-SO_2-$ であり、
- ・ R^d が、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、または $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキルであり、
- ・ X^3 が、 $-(CH_2)_2-$ 、 $-(CH=CH)-$ 、またはシクロプロピレンであり、
- ・ R^4 が、H、ハロゲン、OH、 CHF_2 、 CF_3 、 CH_2CF_2 、カルボキシ、CN、 NO_2 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)-$ 、 $(C_1 \sim C_6$ アリール) $C(=O)-$ 、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル) $S-$ 、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)O-$ 、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル) $OC(=O)-$ 、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)NH-$ 、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル) SO_2NH- 、 $R^e R^f N-$ 、および $R^e R^f N(C=O)-$ から出現ごとに独立的に選択され、アルキル、アルコキシ、アリール、およびシクロアルキルが、任意選択的に置換されていてもよく、
- ・ R^e および R^f が、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^e および R^f が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、
- ・ R^5 が、 $C_1 \sim C_6$ アルキルまたはアミノ酸の特定の側鎖であり、
- ・ R^6 が、OH、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、 $(C_2 \sim C_{18}$ アルケニル) $O-$ 、 $(C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル) $O-$ 、 $(C_6 \sim C_{10}$ アリール) $O-$ 、 $(C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル) $O-$ 、および $R^g R^h N-$ から出現ごとに独立的に選択され、アルコキシ、アルケニル、シクロアルキル、アリール、またはヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、
- ・ R^g および R^h が、H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルキル、 $C_2 \sim C_{18}$ アルケニル、 $C_3 \sim$

10

20

30

40

50

C₁₀シクロアルキル、C₆～C₁₀アリール、およびC₅～C₉ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、またはR^gおよびR^hが、窒素原子と一緒になってC₅～C₆ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよい、化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグ。

【0019】

2. nが、1である、項目1記載の化合物。

【0020】

3. R¹が、水素、C₁～C₆アルコキシ、C₁～C₆アルコキシ-C₁～C₆アルコキシ、(C₁～C₆アルキル)NH、C₁～C₆アルコキシ-(C₁～C₆アルキル)NH、(C₁～C₆アルキル)S-、またはCF₃であり、好ましくは、R¹が、水素、C₁～C₆アルコキシ、C₁～C₆アルコキシ-C₁～C₆アルコキシ、(C₁～C₆アルキル)S-、またはCF₃である、項目1または2記載の化合物。

10

【0021】

4. R¹が、C₁～C₆アルコキシまたはC₁～C₆アルコキシ-C₁～C₆アルコキシである、項目1から3までのいずれか1項記載の化合物。

【0022】

5. R¹が、C₁～C₆アルコキシである、項目1から3までのいずれか1項記載の化合物。

20

【0023】

6. R¹が、C₁～C₆アルコキシ-C₁～C₆アルコキシである、項目1から3までのいずれか1項記載の化合物。

【0024】

7. R¹が、n-BuO-である、項目1から3までのいずれか1項記載の化合物。

【0025】

8. R²が、水素、ハロゲン、およびC₁～C₆アルキルからいずれの場合も独立的に選択される、項目1から7までのいずれか1項記載の化合物。

【0026】

9. R²が、いずれの場合も水素である、項目8記載の化合物。

30

【0027】

10. X¹が、-O-、-NH-、または-C(=O)-である、項目1から9までのいずれか1項記載の化合物。

【0028】

11. X¹が、-C(=O)-である、項目1から9までのいずれか1項記載の化合物。

【0029】

12. X¹が、(CH₂)_n基に対してパラ位にある、項目1から11までのいずれか1項記載の化合物。

【0030】

13. Lが、アミノ酸、ペプチド、非ペプチドポリマーリンカー、および非ポリマー脂肪族リンカーからなる群から選択される、項目1から12までのいずれか1項記載の化合物。

40

【0031】

14. Lが、非ペプチドポリマーリンカーまたは非ポリマー脂肪族リンカーである、項目13記載の化合物。

【0032】

15. Lが、2～100個の繰り返しエチレングリコール単位を含むポリエチレングリコール鎖である、項目14記載の化合物。

【0033】

50

16. Lが、2～50個の繰り返しエチレングリコール単位を含むポリエチレングリコール鎖である、項目14記載の化合物。

【0034】

17. Lが、2～20個の繰り返しエチレングリコール単位を含むポリエチレングリコール鎖である、項目14記載の化合物。

【0035】

18. Lが、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、または10個の繰り返しエチレングリコール単位を含むポリエチレングリコール鎖である、項目14記載の化合物。

【0036】


10

19. Lが、非ポリマー脂肪族リンカーである、項目13記載の化合物。

【0037】

20. R³が、

【化9】



式II

20

である、項目1から19までのいずれか1項記載の化合物。

【0038】

21. X²が、-O-である、項目1から20までのいずれか1項記載の化合物。

【0039】


22. X²が、X³基に対してパラ位にある、項目1から21までのいずれか1項記載の化合物。

【0040】

23. R³が、

【化10】

30



式III


である、項目1から19までのいずれか1項記載の化合物。

【0041】

24. R³が、

【化11】

40



式IV

である、項目1から19までのいずれか1項記載の化合物。

【0042】

50

25. X^3 が、 $-CH=CH-$ またはシクロプロピレンである、項目 1 から 24 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0043】

26. R^4 が、水素、ハロゲン、OH、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、および $C_1 \sim C_6$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 25 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0044】

27. R^4 が、水素、ハロゲン、OH、および $C_1 \sim C_6$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 26 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0045】

28. R^4 が、 X^3 基に対してメタ位の $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 X^3 基に対してパラ位の OH、および他の場合には H である、項目 1 から 27 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0046】

29. R^4 が、 X^3 基に対してメタ位のメトキシ、 X^3 基に対してパラ位の OH、および他の場合には H である、項目 1 から 28 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0047】

30. R^4 が、 X^3 基に対してメタ位のフルオロ、 X^3 基に対してパラ位のフルオロ、および他の場合には H である、項目 1 から 27 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0048】

31. R^5 が、 $C_1 \sim C_6$ アルキルまたは天然アミノ酸の特定の側鎖である、項目 1 から 30 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0049】

32. R^5 が、天然アミノ酸の特定の側鎖である、項目 1 から 31 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0050】

33. R^5 が、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、またはバリン、アラニン、フェニルアラニン、ロイシンもしくはイソロイシンの特定の側鎖である、項目 1 から 31 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0051】

34. R^5 が、バリンの特定の側鎖である、項目 1 から 33 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0052】

35. R^6 が、OH、 NH_2 、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 34 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0053】

36. R^6 が、OH、 NH_2 、($C_2 \sim C_{10}$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 35 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0054】

37. R^6 が、OH、 NH_2 、($C_2 \sim C_6$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_6$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 36 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0055】

38. R^6 が、OH、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 35 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0056】

39. R^6 が、OH、($C_3 \sim C_5$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_6$ アルコ

10

20

30

40

50

キシからいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 38 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0057】

40. R⁶ が、OH および C₁ ~ C₆ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 38 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0058】

41. R⁶ が、(C₃ ~ C₅ シクロアルキル) O- および C₁ ~ C₆ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 38 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0059】

42. R⁶ が、OH および (C₃ ~ C₅ シクロアルキル) O- からいずれの場合も独立的に選択される、項目 1 から 38 までのいずれか 1 項記載の化合物。

10

【0060】

43. R⁶ が、いずれの場合も OH である、項目 1 から 39 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0061】

44. R⁶ が、いずれの場合も C₁ ~ C₆ アルコキシである、項目 1 から 39 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0062】

45. R⁶ が、いずれの場合もエトキシである、項目 1 から 39 までのいずれか 1 項記載の化合物。

20

【0063】

46. R⁶ が、いずれの場合も (C₃ ~ C₁₀ シクロアルキル) O- である、項目 1 から 39 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0064】

47. R⁶ が、いずれの場合も (C₃ ~ C₅ シクロアルキル) O- である、項目 1 から 39 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0065】

48. R⁶ が、いずれの場合も (C₅ シクロアルキル) O- である、項目 1 から 39 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0066】

30

49. 前記化合物が、

ジエチル ((E) - 3 - (4 - ((6 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) ベンズアミド) ヘキサノイル) - オキシ) - 3 - メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル - L - バリル - D - グルタメート、

エチル N 5 - (2 - (2 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) ベンズアミド) エトキシ) エチル) - N 2 - ((E) - 3 - (4 - ヒドロキシ - 3 - メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル - L - バリル - D - グルタミネート、

エチル (R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 15 - ((S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (4 - ヒドロキシ - 3 - メトキシフェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート、

40

エチル (R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 15 - ((S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (4 - イソプロピルフェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート、

エチル (R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 15 - ((S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (3

50

， 4-ジフルオロフェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3-メチルブタンアミド) - 1, 12-ジオキソ-5, 8-ジオキサ-2, 11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

エチル (15R) - 1 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) フェニル) - 15 - ((2S) - 2 - (2 - (2 - (3, 4-ジフルオロフェニル) シクロプロパン-1-カルボキサミド) アセトアミド) - 3-メチルブタンアミド) - 1, 12-ジオキソ-5, 8-ジオキサ-2, 11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

エチル (R) - 1 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) フェニル) - 13 - ((S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3-メチルブタンアミド) - 1, 12-ジオキソ-5, 8-ジオキサ-2, 11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

10

エチル (R) - 1 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) フェニル) - 13 - ((S) - 2 - (2 - シンナムアミドアセトアミド) - 3-メチルブタンアミド) - 1, 12-ジオキソ-5, 8-ジオキサ-2, 11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

エチル (13R) - 1 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) フェニル) - 13 - ((2S) - 2 - (2 - (2 - (3, 4-ジフルオロフェニル) シクロプロパン-1-カルボキサミド) アセトアミド) - 3-メチルブタンアミド) - 1, 12-ジオキソ-5, 8-ジオキサ-2, 11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

20

ジエチル ((E) - 3 - (4 - (1 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) フェニル) - 1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-アミド) フェニル) アクリロイル) グリシル-L-バリル-D-グルタメート、

ジシクロペンチル ((E) - 3 - (4 - (1 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) フェニル) - 1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-オイル) オキシ) - 3-メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル-L-バリル-D-グルタメート、

30

ジエチル ((E) - 3 - (4 - (1 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) フェニル) - 1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-オイル) オキシ) - 3-メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル-L-アラニル-D-グルタメート、

ジエチル ((E) - 3 - (4 - (1 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) フェニル) - 1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-オイル) オキシ) - 3-メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル-L-フェニルアラニル-D-グルタメート、および

1-ベンジル5-エチル ((E) - 3 - (4 - (1 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) フェニル) - 1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-オイル) オキシ) - 3-メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル-L-バリル-D-グルタメートからなる群から選択される、項目1から48までのいずれか1項記載の化合物。

40

【0067】

50. 前記化合物が、

ジエチル ((E) - 3 - (4 - ((6 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) ベンズアミド) ヘキサノイル) - オキシ) - 3-メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル-L-バリル-D-グルタメート、

エチル N5 - (2 - (2 - (4 - ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9

50

H-プリン-9-イル)メチル)ベンズアミド)エトキシ)エチル)-N2-((E)-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタミネート、および

エチル(R)-1-(4-((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-15-((S)-2-(2-((E)-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート


からなる群から選択される、項目1から48までのいずれか1項記載の化合物。

【0068】

10

51. 式V:

【化12】




式V

20

の化合物を式VI:

【化13】




式VI

の化合物と反応させるか、

または式VII:

【化14】

30




式VII

40

の化合物を式VIII:


【化15】



式VIII


50

式 I X :
【化 1 6】



式IX

もしくは式 X :
【化 1 7】



式X

の化合物と反応させることと、

任意選択的に、その後、以下の手順：

- ・ 任意の保護基を除去すること、
- ・ 医薬的に許容可能な塩を形成すること、
- ・ 式 I の化合物を式 I の別の化合物に変換すること

のうちの 1 つ以上を実施することと

を含む、項目 1 から 50 までのいずれか 1 項に定義されているような式 I の化合物（ただし、可変基は、項目 1 から 50 までのいずれか 1 項に定義されている通りである）を調製するための方法。

【0069】

52. 医学における使用のための、項目 1 から 50 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0070】

53. TLR7 および NOD2 受容体のアゴニズムが有益である状態の処置における使用のための、項目 1 から 50 までのいずれか 1 項記載の化合物。

【0071】

54. 状態が、ウイルス感染症、細菌感染症、真菌感染症、原虫感染症、腫瘍、がん、および免疫疾患からなる群から選択される、項目 53 記載の使用のための化合物。

【0072】

55. 項目 1 から 50 までのいずれか 1 項記載の化合物と 1 種以上の医薬的に許容可能な賦形剤または担体とを含む、医薬組成物。

【0073】

56. 項目 1 から 50 までのいずれか 1 項記載の化合物を含む、ワクチン。

【図面の簡単な説明】

【0074】

【図 1】MEC-1 がん細胞株に対する PBMC の細胞毒性活性を活性化する本発明の化合物（SG48、SG144、RH32）の能力を示す。試験した化合物の濃度は、1 μM であった。結果は、対照（培地）に対する比率として表される。中間化合物 SG8、SG43 およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2 アゴニスト、TLR7 アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

【図 2】K562 がん細胞株に対する PBMC の細胞毒性活性を活性化する本発明の化合物（SG48、SG144、RH32）の能力を示す。試験した化合物の濃度は、1 μM

10

20

30

40

50

であった。結果は、対照（培地）に対する比率として表される。中間化合物SG8，SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

【図3】CD4陽性Tリンパ球へのBMDC抗原提示を促進する本発明の化合物（SG8、SG144、RH32）の能力を示す。試験した化合物の濃度は、100nMであった。結果は、低いCFSE蛍光を有するCD25陽性Tリンパ球の比率として表される。培地を陰性対照として使用した。LPS（1μg/mL）を陽性対照として使用した。中間化合物SG8，SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

10

【図4】CD8陽性Tリンパ球へのBMDC抗原提示を促進する本発明の化合物（SG8、SG144、RH32）の能力を示す。試験した化合物の濃度は、100nMであった。結果は、低いCFSE蛍光を有するCD25陽性Tリンパ球の比率として表される。培地を陰性対照として使用した。LPS（1μg/mL）を陽性対照として使用した。中間化合物SG8，SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

【図5】CD4陽性Tリンパ球へのBMDC抗原提示を促進する本発明の化合物（SG8、SG144）の用量依存的能力を示す。結果は、低いCFSE蛍光を有するCD25陽性Tリンパ球の比率として表される。

20

【図6】CD8陽性Tリンパ球へのBMDC抗原提示を促進する本発明の化合物（SG8、SG144）の用量依存的能力を示す。結果は、低いCFSE蛍光を有するCD25陽性Tリンパ球の比率として表される。

【図7A】本発明の化合物（SG144）で前処置されたBMDCによるオボアルブミン提示に応答したIL-2（図7A）のCD4+およびCD8+Tリンパ球分泌を示す。培地を陰性対照として使用した。LPS（1μg/mL）を陽性対照として使用した。中間化合物SG8，SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

30

【図7B】本発明の化合物（SG144）で前処置されたBMDCによるオボアルブミン提示に応答したIL-4（図7B）のCD4+およびCD8+Tリンパ球分泌を示す。培地を陰性対照として使用した。LPS（1μg/mL）を陽性対照として使用した。中間化合物SG8，SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

【図7C】本発明の化合物（SG144）で前処置されたBMDCによるオボアルブミン提示に応答したIL-6（図7C）のCD4+およびCD8+Tリンパ球分泌を示す。培地を陰性対照として使用した。LPS（1μg/mL）を陽性対照として使用した。中間化合物SG8，SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

40

【図7D】本発明の化合物（SG144）で前処置されたBMDCによるオボアルブミン提示に応答したIL-10（図7D）のCD4+およびCD8+Tリンパ球分泌を示す。培地を陰性対照として使用した。LPS（1μg/mL）を陽性対照として使用した。中間化合物SG8，SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

【図7E】本発明の化合物（SG144）で前処置されたBMDCによるオボアルブミン提示に応答したIL-17A（図7E）のCD4+およびCD8+Tリンパ球分泌を示す

50

。培地を陰性対照として使用した。LPS (1 μ g/mL) を陽性対照として使用した。中間化合物SG8, SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

【図7F】本発明の化合物(SG144)で前処置されたBMDcによるオボアルブミン提示に応答したIFN- γ (図7F)のCD4+およびCD8+Tリンパ球分泌を示す。培地を陰性対照として使用した。LPS (1 μ g/mL) を陽性対照として使用した。中間化合物SG8, SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

10

【図7G】本発明の化合物(SG144)で前処置されたBMDcによるオボアルブミン提示に応答したTNF (図7G)のCD4+およびCD8+Tリンパ球分泌を示す。培地を陰性対照として使用した。LPS (1 μ g/mL) を陽性対照として使用した。中間化合物SG8, SG43およびそれらの非コンジュゲート混合物を用いて、本発明の化合物と、NOD2アゴニスト、TLR7アゴニスト、およびそれらの非コンジュゲート混合物とをそれぞれ比較した。

【0075】

発明の詳細な説明

定義

本明細書および添付の特許請求の範囲全体を通して、「含む(comprise)」という用語、ならびに「含む(comprises)」および「含む(comprising)」などの変形形態は、包括的に解釈されるべきである。すなわち、これらの単語は、文脈から問題なければ、具体的に列挙されていない他の要素または整数を含み得ることを伝えることが意図されている。

20

【0076】

「C_i~C_jアルキル」は、i~j個の炭素原子を含む線状または分岐状アルキル基を意味する。アルキル基の非限定的な例は、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、イソブチル、ペンチル、およびヘキシルを含む。

【0077】

「C_i~C_jアルコキシ」は、酸素原子に結合した先に定義されているようなC_i~C_jアルキル基を意味する。アルコキシ基の非限定的な例は、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、tert-ブトキシ、ペントキシ、およびヘキソキシを含む。

30

【0078】

「C_i~C_jアルケニル」は、少なくとも1つの炭素-炭素二重結合を含むi~j個の炭素原子を含む線状または分岐状炭化水素基を意味する。非対称構造は、すべての位置異性体および幾何異性体を含むことが意図されている。アルケニル基の非限定的な例は、ビニル、プロペニル、アリル、ブター-2-エニル、およびブター-3-エニルを含む。

【0079】

「C_i~C_jアルキニル」は、少なくとも1つの炭素-炭素三重結合を含むi~j個の炭素原子を含む線状または分岐状炭化水素基を意味する。アルキニル基の非限定的な例は、エチニル、プロパー-2-イニル、およびブター-2-イニルを含む。

40

【0080】

「C_i~C_jアリール」は、i~j個の炭素原子を含む単環式または二環式の芳香族炭素系基を意味する。アリール基の非限定的な例は、フェニルおよびナフチルを含む。

【0081】

「C_i~C_jシクロアルキル」は、完全に飽和または部分的に不飽和である、i~j個の炭素原子を含む単環式、二環式または三環式の非芳香族炭素系基を意味する。シクロアルキル基の非限定的な例は、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、およびシクロヘキシルを含む。

50

【0082】

「 $C_i \sim C_j$ ヘテロ環」は、1個以上の環原子が、窒素、酸素、または硫黄から選択され、環硫黄原子が、S酸化物を形成するように任意選択的に酸化されていてもよく、環窒素が、N酸化物を形成するように任意選択的に酸化されていてもよく、環窒素が、任意選択的に4級化されていてもよく、かつ $-CH_2-$ 基が、 $-C(=O)-$ によって任意選択的に置換されていてもよい、 $i \sim j$ 個の原子を含む1個または複数個の環からなる、飽和、部分飽和、または不飽和の環を意味する。ヘテロ環の非限定的な例は、ピロリジン、ピロール、フラン、チオフェン、ピペリジン、ピリジン、ピリジン-N-酸化物、ピラン、モルホリン、ペラジン、ピリミジン、ピラゾール、イミダゾール、オキサゾール、イソオキサゾール、オキソジアゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾオキサゾール、インドール、イソインドール、インドリン、ベンゾトリアゾール、およびキノリンを含む。

10

【0083】

「 $C_i \sim C_j$ ヘテロシクリル」は、1個以上の環原子が、窒素、酸素、または硫黄から選択され、環硫黄原子が、S酸化物を形成するように任意選択的に酸化されていてもよく、環窒素が、N酸化物を形成するように任意選択的に酸化されていてもよく、環窒素が、任意選択的に4級化されていてもよく、かつ $-CH_2-$ 基が、 $-C(=O)-$ によって任意選択的に置換されていてもよい、 $i \sim j$ 個の原子を含む1個または複数個の環からなる、飽和、部分飽和、または不飽和の環状基を意味する。ヘテロシクリル基の非限定的な例は、ピロリジニル、ピロリル、フラニル、チオフェニル、ピペリジニル、ピリジニル、ピラニル、モルホリニル、ペラジニル、ピリミジイル、ピラゾリル、イミダゾリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、オキソジアゾリル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾオキサゾリル、インドリル、イソインドリル、インドリニル、ベンゾトリアゾリル、およびキノリニルを含む。

20

【0084】

「ハロゲン」または「ハロ」は、フッ素、塩素、臭素、またはヨウ素を意味する。

【0085】

本明細書で使用される場合、「カルボキシ」または「カルボキシル」という用語は、 $-COOH$ 基を指す。

【0086】

「アミノ酸の特定の側鎖」は、一般式 $H_2NCH(R)COOH$ を有するアミノ酸のR基を意味する。これは、天然アミノ酸であるアルギニン、ヒスチジン、リシン、アスパラギン酸、グルタミン酸、セリン、スレオニン、アスパラギン、グルタミン、システイン、グリシン、プロリン、アラニン、バリン、イソロイシン、ロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、チロシンまたはトリプトファン、ならびにホモセリン、オルニチン、シトルリン、ホスホセリン、ホスホスレオニン、ホスホチロシン、イソバリン、イソセリン、アロスレオニン、またはヒドロキシプロリンなどの非天然アミノ酸のLおよびD異性体を含むが、これらに限定されることはない。

30

【0087】

本明細書で使用される場合、「ペプチド」という用語は、各アミノ酸がペプチド結合とも呼ばれるアミド結合 $-C(=O)NH-$ によってその隣接物に結合しているアミノ酸ポリマーを指す。

40

【0088】

本明細書で使用される場合、「医薬的に許容可能な」という用語は、健全な医学的判断の範囲で、合理的な利益／リスク比率に見合った、過度の毒性、刺激、アレルギー反応、または他の問題もしくは合併症のない、ヒトおよび動物の組織と接触する使用に好適な化合物、材料、組成物、および／または剤形を指す。

【0089】

「医薬的に許容可能な塩」は、生物学的またはそれ以外の場合に不所望ではない、生物学的有効性を無効にせず、かつ遊離塩基または遊離酸の特性を保持する、開示されている化合物の塩を意味する。化合物が1種以上の塩基性基を有する場合、酸付加塩は、そのよ

50

うな化合物の中性形態をニートまたは好適な不活性溶媒のうちのいずれかにおいて十分な量の所望の酸と接触させることによって得ることができる。塩は、無機酸、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸など、または有機酸、例えば、酢酸、酒石酸、プロピオン酸、グリコール酸、ピルビン酸、シュウ酸、安息香酸、ケイ皮酸、メタンスルホン酸、乳酸、マレイン酸、フマル酸、コハク酸などで形成することができる。化合物が1種以上の酸性基を有する場合、塩は、有機または無機塩基の添加で形成することができる。無機塩基に由来する塩は、ナトリウム、カリウム、リチウム、アンモニウム、カルシウム、マグネシウム、および亜鉛の塩を含むが、これらに限定されることはない。有機塩基に由来する塩は、第1級、第2級および第3級アミン、置換アミン、環状アミン、天然に存在するアミンなど、例えば、イソプロピルアミン、トリメチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、エタノールアミン、リシン、アルギニン、ピペリジン、ピペラジン、コリン、ベタイン、カフェイン、コリンなどを含むが、これらに限定されることはない。本発明のある特定の化合物は、化合物を塩基または酸付加塩のうちのいずれかに変換することを可能にする塩基性官能基および酸性官能基の両方を含有する。好ましい医薬的に許容可能な塩は、ナトリウム塩である。

10

【0090】

医薬的に許容可能であるとは考慮されない他の塩は、式Iの化合物の調製に有用であり得、アンモニアおよびトリフルオロ酢酸で形成されたものなど、本発明の範囲に含まれる。

【0091】

「医薬的に許容可能なエステル」は、式Iの化合物をカルボキシル基またはヒドロキシ基で誘導体化して、インビボで親化合物に逆変換することができる誘導体を提供することができることを意味する。そのような化合物の例は、生理学的に許容可能かつ代謝的に不安定なエステル誘導体、例えば、メトキシメチルエステル、メチルチオメチルエステル、およびピバロイルオキシメチルエステルを含む。さらに、インビボで式Iの親化合物を生成することができる、代謝的に不安定なエステルと同様の、式Iの化合物の任意の生理学的に許容可能な等価物が本発明の範囲内にある。

20

【0092】

本明細書で使用される場合、「任意選択的に置換された」という用語は、1個以上の基（好ましくは、1個、2個、3個、または4個の基、より好ましくは、1個または2個の基）でさらに置換されていてもいなくてもよい基を指す。許容可能な置換基は、OR、SR、NR₂、CN、NO₂、ハロゲン、オキソ、カルボキシル、CF₃、CH₂CF₃、CHF₂、OCF₃、OCHF₂、=NR、=N、=NOR、=N-CN、-C(=O)NR₂、-NRC(=O)R、-C(=O)R、-OC(=O)R、-C(=O)OR、-NRC(=O)OR、-SO₂R、-SO₂NR₂、-NRSO₂R、C₁~C₆アルキル、C₂~C₆アルケニル、C₂~C₆アルキニル、C₁~C₆アルコキシ、C₃~C₁₀シクロアルキル、C₆~C₁₀アリール、およびC₅~C₉ヘテロシクリルを含むが、これらに限定されることはなく、式中、各Rは、H、C₁~C₆アルキル、C₂~C₆アルケニル、C₂~C₆アルキニル、C₃~C₁₀シクロアルキル、C₆~C₁₀アリール、またはC₅~C₉ヘテロシクリルであり、式中、各アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリル、ならびにこれらを含む基は、例えば、OR、SR、NR₂、CN、NO₂、ハロゲン、オキソ、カルボキシル、CF₃、CH₂CF₃、CHF₂、OCF₃、OCHF₂、=NR、=N、=NOR、=N-CN、-C(=O)NR₂、-NRC(=O)R、-C(=O)R、-OC(=O)R、-C(=O)OR、-NRC(=O)OR、-SO₂R、-SO₂NR₂、および-NRSO₂Rから選択される1個以上の基（好ましくは、1個、2個、3個、または4個の基、より好ましくは、1個または2個の基）でさらに任意選択的に置換されていてもよい。

30

40

【0093】

本明細書で使用される場合、「投与する」という用語は、非経口、静脈内、腹腔内、筋肉内、腫瘍間、病巣内、鼻腔内、皮下、または経口投与、坐薬としての投与、局所接触、

50

髄腔内投与、または対象へのミニ浸透圧ポンプなどの徐放デバイスの埋め込みを指す。

【0094】

本明細書で使用される場合、「対象」という用語は、動物または人体を指す。

【0095】

本明細書で使用される「アゴニスト」という用語は、受容体の天然リガンド、その類似体、もしくは受容体を同様に「活性化」する他のリガンド、および／または受容体の正の調節因子を指す。

【0096】

NOD2アゴニストは、NOD2受容体を活性化するように機能する任意の化合物である。

【0097】

TLR7アゴニストは、TLR7受容体を活性化するように機能する任意の化合物である。

【0098】

本明細書で使用される場合、「治療有効量」という用語は、動物または人体において所望の生物学的応答を誘発する、式Iの化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグの量を指す。

【0099】

本明細書で使用される場合、「処置」または「処置する」という用語は、(i) 病的状態の発生を防止すること、(ii) 病的状態を阻害するか、またはその進行を阻止すること、(iii) 病的状態を緩和し、および／または病的状態に関連する症状を軽減することを含む。

【0100】

「医薬組成物」は、1種以上の活性成分、および1種以上の不活性成分、ならびに任意の2種以上の成分の組み合わせ、複合化、もしくは凝集から、または1種以上の成分の解離から、または1種以上の成分の他のタイプの反応もしくは相互作用から直接的または間接的に生じる任意の生成物を意味する。したがって、本発明の医薬組成物は、本発明の化合物と医薬的に許容可能な賦形剤（医薬的に許容可能な担体）とを混合することによって作製された任意の組成物を包含する。

【0101】

「賦形剤」は、治療剤、例えば、緩衝剤、等張性調整剤、保存剤、安定剤、吸着防止剤、または他の補助剤と一緒に投与される化合物を指す。しかしながら、幾つかの場合では、1種の賦形剤が二重または三重の機能を有することがある。

【0102】

本明細書に記載されているある特定の化合物が1個以上のキラル中心を含むことが当業者に理解されるであろう。したがって、これらの化合物は、光学活性形態およびラセミ形態で存在し、単離され得る。幾つかの化合物は、多形を呈し得る。本明細書で言及される多形は、結晶形態および非晶質形態の両方を含む。本発明は、本明細書に記載されている有用な特性を有する本発明の化合物の任意のラセミ形態、光学活性形態、多形形態もしくは立体異性形態、またはそれらの混合物を包含すると理解されるべきであり、当技術分野では、光学活性形態をどのように調製するかが公知である（例えば、再結晶技術によるラセミ形態の分割、光学活性出発物質からの合成、立体選択的合成、酵素分割、生体内変換、またはキラル固定相を使用したクロマトグラフィー分離による）。

【0103】

塩形態に加えて、本発明は、プロドラッグ形態にある化合物を提供する。本明細書に記載されている化合物のプロドラッグは、生理学的条件下で化学変化をすぐに受けて本発明の化合物を提供する化合物である。プロドラッグは、例えば、ヒドロキシ、アミン、またはカルボキシ基が任意の基に結合している本発明の化合物を含み、これは、対象に投与されると開裂して、ヒドロキシ、アミン、またはカルボキシ基を形成する。さらに、エクスピボ環境での化学的または生化学的な方法によって、プロドラッグを本発明の化合物に変

10

20

30

40

50

換することができる。例えば、プロドラッグは、好適な酵素または化学試薬と共に経皮パッチリザーバに入れられると、ゆっくりと本発明の化合物に変換され得る。プロドラッグは、親薬物の物理的特性を改善し得、および／またはプロドラッグはまた、薬物の吸収、血中濃度、代謝分布、および細胞取り込みを制御することによって薬物の毒性および不要な効果を低減することなどによって、全体的な薬効を改善し得る。

【0104】

本発明では、式Ⅰの化合物またはその塩が互変異性の現象を呈し得、本明細書の式の図が可能な互変異性形態のうちの1つのみを表し得ると理解されるべきである。本発明は、本明細書に記載されている有用な特性を有する任意の互変異性形態を包含し、式の図で利用される任意の1つの互変異性形態のみに限定されることはないと理解されるべきである。本明細書の式の図は、可能な互変異性形態のうちの1つのみを表し得、本明細書の式の図は、本明細書で図式的に示すことが可能であった形態のみならず、描かれた化合物のすべての可能な互変異性形態を包含すると理解されるべきである。


10

【0105】

特に、式Ⅰaの化合物は、式Ⅰbの化合物の互変異性体である。

【0106】

【化18】



20

【0107】

一般に、互変異性構造は、一貫性および便宜性から、本明細書では、エノール形態で表されている。

【0108】


式Ⅰのある特定の化合物およびその塩は、溶媒和形態および非溶媒和形態、例えば水和形態などで存在し得るとも理解されるべきである。本発明は、本明細書に記載されている有用な特性を有するそのような溶媒和形態をすべて包含すると理解されるべきである。

30

【0109】

本明細書の式の図において、2個の炭素原子間の芳香環を横切る結合は、結合した基が、芳香環上の任意の位置に位置しており、暗黙的にそこにある水素原子の除去によって利用可能になり得ることを意味する。例示的に、式：


【化19】



40

は、

【化20】




を表す。

50

【 0 1 1 0 】

別の例示では、式：

【化 2 1】



は、

【化 2 2】



10

を表す。


【 0 1 1 1 】

NOD 2 および TLR 7 アゴニストのコンジュゲート

本発明の第 1 の態様は、式 I：

20

【化 2 3】



式I

30

のコンジュゲート化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグであって、

式中、

・ R^1 が、H、ハロゲン、OH、SH、 CF_3 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、 $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- ($C_1 \sim C_6$ アルキル) S-、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) SO_2NH -、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)O$ -、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) $OC(=O)$ -、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)$ -、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)NH$ -、 $R^a R^b N$ -、または $R^a R^b N(C=O)$ -であり、アルキル、アルコキシ、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、

40

・ R^2 が、H、ハロゲン、OH、 CHF_2 、 CF_3 、 CH_2CF_2 、カルボキシ、CN、 NO_2 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)$ -、 ($C_6 \sim C_{10}$ アリール) $C(=O)$ -、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) S-、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)O$ -、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) $OC(=O)$ -、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)NH$ -、 ($C_1 \sim C_6$ アルキル) SO_2NH -、 $R^a R^b N$ -、および $R^a R^b N(C=O)$ -から出現ごとに独立的に選択され、アルキル、アルコキシ、アリール、およびシクロアルキルが、任意選択的に置換

50

されていてもよく、

・ R^a および R^b が、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^a および R^b が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、好ましくは、 R^a および R^b が、 H 、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_6 \sim C_{10}$ アリール、および $C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、または R^a および R^b が、窒素原子と一緒になって $C_5 \sim C_6$ ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、

10

・ X^1 が、単結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR^c-$ 、 $-C(=O)-$ 、または $-SO_2-$ であり、


・ R^c が、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、または $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキルであり、

・ L が、連結基であり、

・ n が、0、1、2、3、または 4 であり、かつ

・ R^3 が、


【化 2 4】



20

式II


【化 2 5】



式III、または

30

【化 2 6】



式IV

40

からなる群から選択される $NOD2$ アゴニストであり、

式中、

・ X^2 が、単結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR^d-$ 、 $-C(=O)-$ 、または $-SO_2-$ であり、

・ R^d が、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、または $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキルであり、

・ X^3 が、 $-(CH_2)_2-$ 、 $-(CH=CH)-$ 、またはシクロプロピレンであり、

・ R^4 が、 H 、ハロゲン、 OH 、 CHF_2 、 CF_3 、 CH_2CF_2 、カルボキシ、 CN 、 NO_2 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $(C_1 \sim C_6$ アルキル) $C(=O)-$ 、 $(C_1 \sim C_6$ アリール) $C(=O)-$ 、 $(C_1$

50

～C₆アルキル)S-、(C₁～C₆アルキル)C(=O)O-、(C₁～C₆アルキル)OC(=O)-、(C₁～C₆アルキル)C(=O)NH-、(C₁～C₆アルキル)SO₂NH-、R^eR^fN-、およびR^eR^fN(C=O)-から出現ごとに独立的に選択され、アルキル、アルコキシ、アリール、およびシクロアルキルが、任意選択的に置換されていてもよく、

- ・ R^eおよびR^fが、H、C₁～C₆アルキル、C₃～C₁₀シクロアルキル、C₆～C₁₀アリール、およびC₅～C₉ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、またはR^eおよびR^fが、窒素原子と一緒になってC₅～C₆ヘテロ環を形成していてもよく、

- ・ R⁵が、C₁～C₆アルキルまたはアミノ酸の特定の側鎖であり、

- ・ R⁶が、OH、C₁～C₁₈アルコキシ、(C₂～C₁₈アルケニル)O-、(C₃～C₁₀シクロアルキル)O-、(C₆～C₁₀アリール)O-、(C₅～C₉ヘテロシクリル)O-、およびR^gR^hN-から出現ごとに独立的に選択され、アルコキシ、アルケニル、シクロアルキル、アリール、またはヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよく、


- ・ R^gおよびR^hが、H、C₁～C₁₈アルキル、C₂～C₁₈アルケニル、C₃～C₁₀シクロアルキル、C₆～C₁₀アリール、およびC₅～C₉ヘテロシクリルから互いに独立的に選択されるか、またはR^gおよびR^hが、窒素原子と一緒になってC₅～C₆ヘテロ環を形成していてもよく、アルキル、アルケニル、シクロアルキル、アリール、およびヘテロシクリルが、任意選択的に置換されていてもよい、

コンジュゲート化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグである。

【0112】

一実施形態では、本発明は、式Iの化合物のサブセットである式Ic：

【化27】



式Ic

の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグであって、

式中、R¹、R²、R⁴、R⁵、R⁶、X¹、X²、X³、L、およびnが、先に定義した通りである、

化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグを提供する。

【0113】

別の実施形態では、本発明は、式Iの化合物のサブセットである式Id：

10


20

30

40

50

【化 2 8】



式Id

10

の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグであって、

式中、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 X^1 、 X^3 、 L 、および n が、先に定義した通りである、


化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグを提供する。

【0114】

別の実施形態では、本発明は、式 I の化合物のサブセットである式 I e :

【化 2 9】

20



式Ie

30

の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグであって、

式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 X^1 、 X^3 、 L 、および n が、先に定義した通りである、

化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグを提供する。

【0115】

ある特定の実施形態によれば、 n は、1 または 2 である。

【0116】

ある特定の実施形態によれば、 n は、1 である。

40

【0117】

ある特定の実施形態によれば、 R^1 は、水素、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、($C_1 \sim C_6$ アルキル) NH、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ-($C_1 \sim C_6$ アルキル) NH、($C_1 \sim C_6$ アルキル) S-、または CF_3 である。

【0118】

ある特定の実施形態によれば、 R^1 は、水素、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、($C_1 \sim C_6$ アルキル) S-、または CF_3 である。

【0119】

ある特定の実施形態によれば、 R^1 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

50

【0120】

ある特定の実施形態によれば、 R^1 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

【0121】

ある特定の実施形態によれば、 R^1 は、 n -ブトキシである。

【0122】

ある特定の実施形態によれば、 R^1 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

【0123】

ある特定の実施形態によれば、 R^1 は、 $CH_2O(CH_2)_2O-$ である。

【0124】

ある特定の実施形態によれば、 R^2 は、H、ハロゲン、または $C_1 \sim C_6$ アルキルから出現ごとに独立的に選択される。

【0125】

ある特定の実施形態によれば、 R^2 は、いずれの場合もHである。

【0126】

ある特定の実施形態によれば、 X^1 は、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、または $-C(=O)-$ である。

【0127】

ある特定の実施形態によれば、 X^1 は、 $-C(=O)-$ である。

【0128】

ある特定の実施形態によれば、 X^1 は、 $(CH_2)_n$ 基に対してパラ位にある。

【0129】

ある特定の実施形態によれば、 X^2 は、 $-O-$ 、 $-NH-$ 、または $-C(=O)-$ である。

【0130】

ある特定の実施形態によれば、 X^2 は、 $-O-$ である。

【0131】

ある特定の実施形態によれば、 X^2 は、 X^3 基に対してパラ位にある。

【0132】

ある特定の実施形態によれば、 X^3 は、 $-CH=CH-$ またはシクロプロピレンである。

【0133】

ある特定の実施形態によれば、 X^3 は、 $-CH=CH-$ である。

【0134】

ある特定の実施形態によれば、 X^3 は、シクロプロピレンである。

【0135】

ある特定の実施形態によれば、 R^4 は、水素、ハロゲン、OH、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、および $C_1 \sim C_6$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

【0136】

ある特定の実施形態によれば、 R^4 は、水素、OH、および $C_1 \sim C_6$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

【0137】

ある特定の実施形態によれば、 R^4 は、 X^3 基に対してメタ位の $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 X^3 基に対してパラ位のOH、および他の場合にはHである。

【0138】

ある特定の実施形態によれば、 R^4 は、 X^3 基に対してメタ位のメトキシ、 X^3 基に対してパラ位のOH、および他の場合にはHである。

【0139】

ある特定の実施形態によれば、 R^4 は、 X^3 基に対してパラ位のイソプロピルおよび他の場合にはHである。

10

20

30

40

50

【0140】

ある特定の実施形態によれば、 R^4 は、いずれの場合もHである。

【0141】

ある特定の実施形態によれば、 R^4 は、 X^3 基に対してメタ位のフルオロ、 X^3 基に対してパラ位のフルオロ、および他の場合にはHである。

【0142】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、 $C_1 \sim C_6$ アルキルまたは天然アミノ酸の特定の側鎖である。

【0143】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、またはバリン、アラニン、フェニルアラニン、ロイシンもしくはイソロイシンの特定の側鎖である。

10

【0144】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、またはバリン、アラニン、ロイシンもしくはイソロイシンの特定の側鎖である。

【0145】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、 $C_1 \sim C_6$ アルキルである。

【0146】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、天然アミノ酸の特定の側鎖である。

【0147】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、バリン、アラニン、フェニルアラニン、ロイシン、またはイソロイシンの特定の側鎖である。

20

【0148】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、バリン、アラニン、ロイシン、またはイソロイシンの特定の側鎖である。

【0149】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、バリンの特定の側鎖である。

【0150】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、フェニルアラニンの特定の側鎖である。

【0151】

ある特定の実施形態によれば、 R^5 は、アラニンの特定の側鎖である。

30

【0152】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、OH、 NH_2 、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

【0153】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、OH、 NH_2 、($C_2 \sim C_{10}$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

【0154】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、OH、 NH_2 、($C_2 \sim C_6$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_6$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

40

【0155】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、OH、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

【0156】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、OH、($C_3 \sim C_5$ シクロアルキル)O-、および $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

【0157】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、OHおよび $C_1 \sim C_6$ アルコキシからいずれの

50

場合も独立的に選択される。

【0158】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、($C_3 \sim C_5$ シクロアルキル) $O-$ および $C_1 \sim C_6$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

【0159】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、 OH および ($C_3 \sim C_5$ シクロアルキル) $O-$ からいずれの場合も独立的に選択される。

【0160】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、 OH および $C_1 \sim C_{10}$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

10

【0161】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、 OH および $C_1 \sim C_6$ アルコキシからいずれの場合も独立的に選択される。

【0162】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、いずれの場合も OH である。

【0163】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、いずれの場合も $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

【0164】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、いずれの場合もエトキシである。

【0165】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、いずれの場合も ($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル) $O-$ である。

20

【0166】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、いずれの場合も ($C_3 \sim C_5$ シクロアルキル) $O-$ である。

【0167】

ある特定の実施形態によれば、 R^6 は、いずれの場合も (C_5 シクロアルキル) $O-$ である。

【0168】

式Iの幾つかの好ましい実施形態では、

30

式中、

- ・ R^1 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシ- $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、好ましくは n -ブトキシまたは $CH_2O(CH_2)_2O-$ であり、
- ・ R^2 は、いずれの場合も H であり、
- ・ n は、1であり、
- ・ X^1 は、 $-C(=O)-$ 、好ましくは、(CH_2) $_n$ 基に対してパラ位の $-C(=O)-$ であり、
- ・ L は、連結基であり、
- ・ R^3 は、本明細書で定義されている通りである。

【0169】

40

幾つかの好ましい実施形態では、 R^3 は、式IIのNOD2アゴニストであり、

式中、

- ・ X^2 は、 X^3 基に対してパラ位の $-O-$ 、 $-NH-$ 、または $-C(=O)-$ であり、好ましくは、 X^3 基に対してパラ位の $-O-$ であり、
- ・ R^4 は、 X^3 基に対してメタ位のメトキシおよび他の場合には H であり、
- ・ R^5 は、 L -バリン、 L -アラニン、または L -フェニルアラニン、好ましくは L -バリンの側鎖であり、
- ・ R^6 は、 OH 、 NH_2 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル) $O-$ 、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル) $O-$ 、($C_6 \sim C_{10}$ アリール) $O-$ 、および ($C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル) $O-$ から出現ごとに独立的に選択され、好ましくは、 R^6 は、 O

50

H、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、または($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)Oーであり、より好ましくは、 R^6 は、OH、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、または($C_3 \sim C_5$ シクロアルキル)Oーであり、さらにより好ましくは、 R^6 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシまたは(C_5 シクロアルキル)Oーである。

【0170】

他の好ましい実施形態では、 R^3 は、式IIIのNOD2アゴニストであり、式中、

- ・ R^4 は、 X^3 基に対してメタ位のメトキシ、 X^3 基に対してパラ位のOH、および他の場合にはHであり、

- ・ R^5 は、Lーバリン、Lーアラニン、またはLーフェニルアラニン、好ましくはLーバリンの側鎖であり、

- ・ R^6 は、OH、 NH_2 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)Oー、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)Oー、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)Oー、および($C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル)Oーであり、好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、より好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシであり、さらにより好ましくは、 R^6 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

10

【0171】

他の好ましい実施形態では、 R^3 は、式IIIのNOD2アゴニストであり、式中、

- ・ R^4 は、 X^3 基に対してメタ位のフルオロ、 X^3 基に対してパラ位のフルオロ、および他の場合にはHであり、

- ・ R^5 は、Lーバリン、Lーアラニン、またはLーフェニルアラニン、好ましくはLーバリンの側鎖であり、

- ・ R^6 は、OH、 NH_2 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)Oー、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)Oー、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)Oー、および($C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル)Oーであり、好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、より好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシであり、さらにより好ましくは、 R^6 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

20

【0172】

他の好ましい実施形態では、 R^3 は、式IIIのNOD2アゴニストであり、式中、

- ・ R^4 は、 X^3 基に対してパラ位のイソプロピルおよび他の場合にはHであり、

- ・ R^5 は、Lーバリン、Lーアラニン、またはLーフェニルアラニン、好ましくはLーバリンの側鎖であり、

- ・ R^6 は、OH、 NH_2 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)Oー、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)Oー、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)Oー、および($C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル)Oーであり、好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、より好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシであり、さらにより好ましくは、 R^6 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

30

【0173】

他の好ましい実施形態では、 R^3 は、式IIIのNOD2アゴニストであり、式中、

- ・ R^4 は、いずれの場合もHであり、

- ・ R^5 は、Lーバリン、Lーアラニン、またはLーフェニルアラニン、好ましくはLーバリンの側鎖であり、

- ・ R^6 は、OH、 NH_2 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)Oー、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)Oー、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)Oー、および($C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル)Oーであり、好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、より好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシであり、さらにより好ましくは、 R^6 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

40

50

【0174】

他の好ましい実施形態では、 R^3 は、式IVのNOD2アゴニストであり、式中、

- R^4 は、 X^3 基に対してメタ位のメトキシ、 X^3 基に対してパラ位のOH、および他の場合にはHであり、
- R^5 は、L-バリン、L-アラニン、またはL-フェニルアラニン、好ましくはL-バリンの側鎖であり、
- R^6 は、OH、 NH_2 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)O-、および($C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル)O-であり、好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、より好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシであり、さらにより好ましくは、 R^6 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

10

【0175】

他の好ましい実施形態では、 R^3 は、式IVのNOD2アゴニストであり、式中、

- R^4 は、 X^3 基に対してメタ位のフルオロ、 X^3 基に対してパラ位のフルオロ、および他の場合にはHであり、
- R^5 は、L-バリン、L-アラニン、またはL-フェニルアラニン、好ましくはL-バリンの側鎖であり、
- R^6 は、OH、 NH_2 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)O-、および($C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル)O-であり、好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、より好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシであり、さらにより好ましくは、 R^6 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

20

【0176】

他の好ましい実施形態では、 R^3 は、式IVのNOD2アゴニストであり、式中、

- R^4 は、 X^3 基に対してパラ位のイソプロピルおよび他の場合にはHであり、
- R^5 は、L-バリン、L-アラニン、またはL-フェニルアラニン、好ましくはL-バリンの側鎖であり、
- R^6 は、OH、 NH_2 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)O-、および($C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル)O-であり、好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、より好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシであり、さらにより好ましくは、 R^6 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。

30

【0177】

他の好ましい実施形態では、 R^3 は、式IVのNOD2アゴニストであり、式中、

- R^4 は、いずれの場合もHであり、
- R^5 は、L-バリン、L-アラニン、またはL-フェニルアラニン、好ましくはL-バリンの側鎖であり、
- R^6 は、OH、 NH_2 、 $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシ、($C_2 \sim C_{18}$ アルケニル)O-、($C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル)O-、($C_6 \sim C_{10}$ アリール)O-、および($C_5 \sim C_9$ ヘテロシクリル)O-であり、好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_{18}$ アルコキシであり、より好ましくは、 R^6 は、OHまたは $C_1 \sim C_6$ アルコキシであり、さらにより好ましくは、 R^6 は、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシである。


40

【0178】

式Iの好ましい化合物は、


50

【化 3 0】




10

ジエチル（（E）-3-（4-（（6-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）ベンズアミド）ヘキサノイル）-オキシ）-3-メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル-L-バリル-D-グルタメート、
【化 3 1】



20


エチル N 5 - （ 2 - （ 2 - （ 4 - （ （ 6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル ） メチル ） ベンズアミド ） エトキシ ） エチル ） - N 2 - （ （ E ） - 3 - （ 4 - ヒドロキシ - 3 - メトキシフェニル ） アクリロイル ） グリシル - L - バリル - D - グルタミネート、
【化 3 2】



30

エチル（R）-1-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）フェニル）-15-（（S）-2-（2-（（E）-3-（4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル）アクリルアミド）アセトアミド）-3-メチルブタンアミド）-1, 12-ジオキソ-5, 8-ジオキサ-2, 11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、
【化 3 3】


40



エチル（R）-1-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）フェニル）-15-（（S）-2-（2-（（E）-3-（4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル）アクリルアミド）アセトアミド）-3-メチルブタンアミド）-1, 12-ジオキソ-5, 8-ジオキサ-2, 11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、


50

リン-9-イル)メチル)フェニル)-15-((S)-2-(2-((E)-3-(4-イソプロピルフェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、
【化34】



10


エチル(R)-1-(4-((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-15-((S)-2-(2-((E)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、
【化35】



20

エチル(15R)-1-(4-((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-15-((2S)-2-(2-(2-(3,4-ジフルオロフェニル)シクロプロパン-1-カルボキサミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、
【化36】

30




40

エチル(R)-1-(4-((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-13-((S)-2-(2-((E)-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オエート、

50


【化 3 7】



10

エチル (R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 13 - ((S) - 2 - (2 - シンナムアミドアセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート、

【化 3 8】




20

エチル (13 R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 13 - ((2 S) - 2 - (2 - (2 - (3, 4 - ジフルオロフェニル) シクロプロパン - 1 - カルボキサミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート、

【化 3 9】

30




ジエチル ((E) - 3 - (4 - (1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 1, 17 - ジオキソ - 6, 9, 12 - トリオキサ - 2, 16 - ジアザイコサン - 20 - アミド) フェニル) アクリロイル) グリシル - L - バリル - D - グルタメート、

40


50

【化 4 0】




10

ジシクロペンチル（（E）-3-（4-（（1-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）フェニル）-1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-オイル）オキシ）-3-メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル-L-バリル-D-グルタメート、
【化 4 1】



20


ジエチル（（E）-3-（4-（（1-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）フェニル）-1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-オイル）オキシ）-3-メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル-L-アラニル-D-グルタメート、
【化 4 2】



30

ジエチル（（E）-3-（4-（（1-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）フェニル）-1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-オイル）オキシ）-3-メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル-L-フェニルアラニル-D-グルタメート、および
【化 4 3】

40



50


1-ベンジル5-エチル((E)-3-(4-(1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-1,17-ジオキソ-6,9,12-トリオキサ-2,16-ジアザイコサン-20-オイル)オキシ)-3-メトキシフェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタメートの群から選択される。

【0179】

連結基

本発明の特定の実施形態では、Lは、式：


【化44】




10

のTLR7アゴニストを、


【化45】



20



または



30

【式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、X¹、X²、X³、およびnは、先に定義した通りである】

の群から選択されるNOD2アゴニストに共有結合するように機能する連結基である。

【0180】

連結基Lの特定の組成は、得られるコンジュゲートが本明細書に記載されている有用な生物学的特性を保持する限り、決定的なものではない。リンカーのタイプおよび長さは、例17に記載されているアッセイを使用することによって、コンジュゲート化合物の他の置換基との関連で容易に最適化することができる。リンカー成分の選択は、生体適合性と水性および有機培地への溶解性についてのその文書化された特性に基づいている。

40

【0181】

ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、非ペプチドポリマーリンカーである。好適な非ペプチドポリマーリンカーの非限定的な例は、ポリアルキレンオキシド（例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールなど）、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドンなど、ならびにそれらの誘導体およびコポリマーを含む。

【0182】

50

ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、ポリエチレングリコール（PEG）鎖を含む。ある特定の実施形態によれば、ポリエチレングリコール鎖は、2～100個、例えば2～50個の繰り返しエチレングリコール単位を含む。ある特定の実施形態によれば、ポリエチレングリコール鎖は、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、または10個の繰り返しエチレングリコール単位を含む。ある特定の実施形態によれば、ポリエチレングリコール鎖上の一方または両方の末端ヒドロキシ基は、アミン、チオール、アジド、カルボキシ、ヒドロキシル、N-ヒドロキシスクシンイミド、およびマレイミドから選択される基で置換されている。10

【0183】

ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、2～100個の炭素原子を有する二価の線状または分岐状、直鎖状または環状、飽和または不飽和の炭化水素鎖を含む非ポリマー脂肪族リンカーであり、炭素原子は、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NH-$ 、 $-C(=O)-$ 、 $-OC(=O)-$ 、 $-N(C_1\sim C_6\text{アルキル})-$ 、 $-NHC(=O)-$ 、 $-N(C_1\sim C_6\text{アルキル})C(=O)-$ 、 $-S(=O)-$ 、または $-S(=O)_2-$ から選択される基によって任意選択的に置換されており、鎖は、炭素において1個以上（例えば、1個、2個、3個、または4個）の置換基で任意選択的に置換されている。非ポリマー脂肪族リンカーは、典型的には、TLR7およびNOD2アゴニスト部分における官能基（例えば、カルボキシ、 NH_2 、 OH など）と反応することができる、少なくとも2個の官能基を有する脂肪族化合物に由来する。20

【0184】

ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、アミノ酸から形成された二価基である。ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、天然アミノ酸およびその立体異性体から形成された二価基である。20

【0185】

ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、ペプチドから形成された二価基である。ある特定の実施形態によれば、ペプチドは、天然に存在するアミノ酸およびその立体異性体を含む。ある特定の実施形態によれば、ペプチドは、天然に存在するアミノ酸およびその立体異性体のみから形成されている。ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、ポリプロリンリンカーである。ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、ポリグリシンリンカーである。30

【0186】

ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、 $-NH-(CH_2)_5-C(=O)-$ である。

【0187】

ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、 $-NH-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-NH-$ である。

【0188】

ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、 $-NH-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-NH-$ である。

【0189】

ある特定の実施形態によれば、リンカーLは、 $-NH-(CH_2)_3-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_2-O-(CH_2)_3-NH-C(=O)-(CH_2)_2-C(=O)-$ である。

【0190】

治療的用途

本発明のコンジュゲート化合物は、TLR7およびNOD2アゴニストである。したがって、式Iの化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグは、TLR7およびNOD2のアゴニズムが有益である状態の処置に有用である。

【0191】

10

20

30

40

50

T L R 7 および N O D 2 の両方の同時活性化によって生成される免疫応答は、炎症誘発性サイトカインの産生および活性化をもたらす。したがって、一態様では、本発明のコンジュゲート化合物は、ウイルス感染症、細菌感染症、真菌感染症および原虫感染症、腫瘍またはがん、ならびに免疫疾患の処置に有用である。

【0192】

ある特定の実施形態によれば、本発明の化合物は、ウイルス感染症、細菌感染症、真菌感染症、または原虫感染症の処置に有用である。ある特定の実施形態によれば、本発明の化合物は、ウイルス感染症の処置に有用である。ある特定の実施形態によれば、本発明の化合物は、細菌感染症の処置に有用である。ある特定の実施形態によれば、本発明の化合物は、真菌感染症の処置に有用である。ある特定の実施形態によれば、本発明の化合物は、原虫感染症の処置に有用である。

10

【0193】

ある特定の実施形態によれば、本発明の化合物は、がんの処置に有用である。

【0194】

ある特定の実施形態によれば、本発明の化合物は、免疫疾患の処置に有用である。

【0195】

別の態様では、本発明のコンジュゲート化合物は、ワクチンアジュバントとして有用である。したがって、本明細書には、疾患の処置のための免疫修飾のための、医学における使用のための式 I の化合物またはその医薬的に許容可能な塩、ラセミ体、ジアステレオマー、エナンチオマー、エステルもしくはプロドラッグが開示されている。

20

【0196】

本発明の化合物は、医薬組成物として製剤化することができ、選択された投与経路に適した様々な形態で、すなわち、経口的または非経口的に、静脈内経路、筋肉内経路、局所経路、または皮下経路によって、ヒトの患者などの対象に投与することができる。式 I の化合物を含む医薬組成物は、当業者に公知の技術および方法を使用して調製され得る。当技術分野で一般に使用されている方法のうちの幾つかは、RemingtonのThe Science and Practice of Pharmacyに記載されている。

【0197】

したがって、本発明の一態様は、式 I の化合物と 1 種以上の医薬的に許容可能な賦形剤とを含む、医薬組成物を対象とする。例えば、本発明のコンジュゲート化合物は、静脈内投与または体腔もしくは器官の内腔への投与などの非経口投与のために製剤化することができる。注射のための製剤は、一般に、医薬的に許容可能な担体中に溶解した本発明のコンジュゲート化合物の溶液を含む。用いることができる許容可能なビヒクルおよび溶媒には、水およびリンゲル溶液がある。さらに、無菌固定油は、従来的には、溶媒または懸濁培地として用いることができる。この目的のために、合成モノグリセリドまたはジグリセリドを含む任意の無刺激性固定油を用いることができる。さらに、オレイン酸などの脂肪酸も同様に注射剤の調製に使用することができる。これらの溶液は、無菌であり、一般に、不所望な物質を含まない。これらの製剤は、従来的な周知の滅菌技術によって滅菌することができる。製剤は、pH 調整剤および緩衝剤、毒性調整剤、例えば、酢酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、乳酸ナトリウムなどの、生理学的条件に近づけるために必要な医薬的に許容可能な補助物質を含有し得る。

30

40

【0198】

これらの組成物は、ワクチンアジュバントとしても使用することができる。したがって、本発明の別の態様は、本発明のコンジュゲート化合物を含む、ワクチンである。

【0199】

ワクチンアジュバントとして使用される場合、式 I の化合物およびその医薬組成物は、細胞免疫反応 (I V 型過敏症) または免疫のある被験者における循環抗体もしくは局所抗体の産生を増加させることが所望される抗原 (ウイルス抗原、細菌抗原、寄生虫抗原など) と同時に、かつ同じ方法で投与することができる。

【0200】

50

本発明の化合物は、リポソームの形態でも投与され得る。当技術分野で公知であるように、リポソームは、一般に、リン脂質または他の脂質物質に由来する。リポソームは、水性培地中に分散した単一膜または多重膜の水和液晶によって形成される。リポソームを形成することができる、非毒性であり、生理学的に許容可能であり、かつ代謝可能な任意の脂質を使用することができる。脂質形態の本組成物は、本発明の化合物に加えて、安定剤、保存剤、賦形剤などを含有し得る。典型的な脂質は、天然および合成のリン脂質およびホスファチジルコリンである。リポソームを形成する方法は、当技術分野で公知であり、参照によって本明細書に組み込まれるPrescott's Methods in Cell Biologyに記載されている。

【0201】

方法

本発明の別の態様は、式Iの化合物またはその医薬的に許容可能な塩を製造するための方法である。

【0202】

市販されていない場合、下記のもののような手順に必要な出発物質は、標準的な有機化学技術、既知の構造的に同様の化合物の合成に類似した技術、または例に記載されている手順に類似した技術から選択される手順によって作製され得る。

【0203】

本明細書で述べられている反応のうちの幾つかでは、化合物の任意の敏感な基を保護することが必要／所望であり得るとも理解されるであろう。保護が必要または所望である例は、そのような保護のための好適な方法と同様に、当業者に公知である。

【0204】

ヒドロキシ基のための好適な保護基の例は、例えば、アシル基、例えばアセチルなどのアルカノイル基、アロイル基、例えばベンゾイル、トリメチルシリルなどのシリル基、またはアリアルメチル基、例えばベンジルである。先の保護基についての脱保護条件は、保護基の選択によって必然的に変わるであろう。したがって、例えば、アルカノールなどのアシル基またはアロイル基は、例えば、アルカリ金属水酸化物、例えば水酸化リチウムまたは水酸化ナトリウムなどの好適な塩基による加水分解によって除去され得る。あるいは、トリメチルシリルなどのシリル基は、例えばフッ化物または水性酸によって除去されるか、またはベンジル基などのアリアルメチル基は、例えば、パラジウムオンカーボンなどの触媒の存在下での水素化によって除去され得る。

【0205】

アミノ基の好適な保護基は、例えば、任意のアシル基、例えばアセチルなどのアルカノイル基、アルコキシカルボニル基、例えば、メトキシカルボニル、エトキシカルボニルもしくはセーブトキシカルボニル基、アリアルメトキシカルボニル基、例えばベンジルオキシカルボニル、またはアロイル基、例えばベンゾイルである。先の保護基についての脱保護条件は、保護基の選択によって必然的に変わる。したがって、例えば、アルカノイルもしくはアルコキシカルボニル基などのアシル基またはアロイル基は、例えば、アルカリ金属水酸化物、例えば水酸化リチウムまたは水酸化ナトリウムなどの好適な塩基による加水分解によって除去され得る。あるいは、セーブトキシカルボニル基などのアシル基は、例えば、塩酸、硫酸、リン酸、またはトリフルオロ酢酸などの好適な酸での処置によって除去され得、ベンジルオキシカルボニル基などのアリアルメトキシカルボニル基は、例えば、パラジウムオンカーボンなどの触媒上での水素化によって、またはルイス酸、例えばボロントリス（トリフルオロアセテート）での処置によって除去され得る。第1級アミノ基の好適な代替保護基は、例えば、アルキルアミン、例えばジメチルアミノプロピルアミンもしくは2-ヒドロキシエチルアミン、またはヒドラジンでの処置によって除去され得るフタロゲニル基である。

【0206】

カルボキシ基のための好適な保護基の例は、例えば、アルキル基、例えば、メチル、エチルもしくはセーブチル基、またはアリアル基、例えばベンジル基である。先の保護基に

10

20

30

40

50

ついで脱保護条件は、保護基の選択によって必然的に変わる。したがって、例えば、メチルまたはエチル基などのアルキル基は、例えば、アルカリ金属水酸化物、例えば水酸化リチウムまたは水酸化ナトリウムなどの好適な塩基による加水分解によって除去され得る。あるいは、テーパーチル基などのアルキル基は、例えば、塩酸、硫酸、リン酸、またはトリフルオロ酢酸などの好適な酸での処置によって除去され得る。ベンジル基などのアリール基は、例えば、パラジウムオンカーボンなどの触媒上での水素化によって除去され得る。

【0207】

当業者に周知の他の好適な保護基は、参照により本明細書に組み込まれる Greene および Wuts による “Protective Groups in Organic Synthesis”, 4th Ed. (John Wiley and Sons, 1999) に見られる。

10


【0208】

保護基は、化学分野で周知の従来的な技術を使用して合成の任意の都合の良い段階で除去され得るか、またはこれらは、後の反応ステップまたは後処理の最中に除去され得る。

【0209】

したがって、本発明はまた、式 I の化合物およびその医薬的に許容可能な塩が、式 V :

【化 4 6】




20

式V

【式中、R¹、R²、X¹、および n は、先に定義した通りである】
の化合物を式 V I :

【化 4 7】




30

式VI

【式中、R³ および L は、先に定義した通りである】
の化合物と反応させるか、
または式 V I I :

【化 4 8】




40

式VII

【式中、R¹、R²、X¹、L、および n は、先に定義した通りである】
の化合物を式 V I I I :

50

【化 4 9】




式VIII

式IX:

【化 5 0】

10




式IX

もしくは式X:

【化 5 1】

20



式X

[式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 X^2 、および X^3 は、先に定義した通りである]
 の化合物と反応させることと、

任意選択的に、その後、以下の手順:

- ・ 任意の保護基を除去すること、
- ・ 医薬的に許容可能な塩を形成すること、
- ・ 式Iの化合物を式Iの別の化合物に変換すること

30


のうちの1つ以上を実施することと

を含む、方法によって調製可能であることも実現する。

【0210】

これらの方法によって、式XI:

【化 5 2】




式XI

40

式XII:

50

【化 5 3】




式XII

10

または式XIII：

【化 5 4】



式XIII

20

〔式中、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 X^1 、 X^2 、 X^3 、 L 、および n は、先に定義した通りである〕

のコンジュゲート化合物およびその医薬的に許容可能な塩が提供される。

【0211】

実施例

合成方法

本発明は、式Iの化合物の調製を説明する以下の例によってさらに例示されるが、これらによって限定されることはない。本明細書中の任意の箇所におけるこれらおよび他の例の使用は、単に説明目的であり、決して本発明または任意の例示された形態の範囲および意味を限定するものではない。同様に、本発明は、本明細書に記載されているいずれかの特定の好ましい実施形態に限定されることはない。実際に、本明細書を読むことで、当業者には本発明の多くの修正および変形が明らかとなり得、これらを本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく行うことができる。したがって、本発明は、特許請求の範囲の権利が付与される等価物の全範囲と共に、添付の特許請求の範囲の条件によってのみ限定されるべきである。

30

【0212】

特に明記しない限り、

40

- ・ 蒸発は、真空において回転蒸発によって実施し、後処理手順は、濾過後に残留固形物を除去した後に実施した。

- ・ 操作は、一般に、典型的には $18 \sim 26^\circ\text{C}$ の周囲温度で、特に明記しない限り空気を排除せずに実施したか、または当業者であれば、不活性雰囲気下で作業するであろう。

- ・ 特に明記しない限り、フラッシュカラムクロマトグラフィーは、化合物を精製するために使用し、Merck Silica Gel 60において実施した。

- ・ 収率は、単に説明目的で示しており、必ずしも達成可能な最大値ではない。

- ・ 最終生成物の構造は、一般にNMRおよび質量スペクトル技術によって確認した。プロトンNMRスペクトルを引用し、 400 MHz の磁場強度で動作するBruker Avance III 400 MHz 分光計を使用して決定した。化学シフトは、内部標準としてのテトラ

50

メチルシランからのパーツ・パー・ミリオンの低磁場で報告し、ピークの多重度は、以下のように示す；s，シングレット、br s，広いシングレット、d，ダブレット、t，トリプレット、q，カルテット、m，マルチプレット。

・ 質量スペクトルは、Q TOF Premier質量分析計（Micromass、Waters、マンチェスター、UK）およびExactive Plus Orbitrap質量分析計（Thermo Fisher Scientific、ウォルサム、マサチューセッツ、米国）を使用して得た。

・ 各中間体は、一般に、次の段階に必要な標準まで精製され、割り当てられた構造が正しいことを確認するのに十分な詳細を特徴としており、純度は、高圧液体クロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、またはNMRによって評価し、同一性は、必要に応じて質量分析およびNMR分光法によって決定した。

10

【0213】

略語

本明細書で使用される場合、記号および規定は、現代の科学文献で使用されているものと一致している。具体的には、以下の略語が本文書で使用される：

Boc₂Oはジ-tert-ブチルジカーボネート、CDCl₃は重水素化クロロホルム、COMUは（1-シアノ-2-エトキシ-2-オキソエチリデンアミノオキシ）ジメチルアミノ-モルホリノ-カルベニウムヘキサフルオロホスフェート、DCCはN，N'-ジシクロヘキシルカルボジイミド；DCMはジクロロメタン；DIPEAはN，N'-ジイソプロピルエチルアミン、DMAPは4-ジメチルアミノピリジン；DMFはジメチルホルムアミド；DMSOはジメチルスルホキシド、DMSO-d₆は重水素化ジメチルスルホキシド、EDCはN-（3-ジメチルアミノプロピル）-N'-エチルカルボジイミド塩酸塩、eqは当量、gはグラム、HATUは1-〔ビス（ジメチルアミノ）メチレン〕-1H-1，2，3-トリアゾロ〔4，5-b〕ピリジニウム3-オキシドヘキサフルオロホスフェート、HClは塩酸、HOBtはヒドロキシベンゾトリアゾール、K₂CO₃は炭酸カリウム、LPSはリポ多糖類、mLはミリリットル、mmolはミリモル、NaHCO₃は炭酸水素ナトリウム、NaOHは水酸化ナトリウム、Na₂SO₄は硫酸ナトリウム、Na₂S₂O₃はチオ硫酸ナトリウム、NH₄Clは塩化アンモニウム、NMRは核磁気共鳴、PBSはリン酸緩衝生理食塩水、RPMは1分あたりの回転数、rtは室温、TEAはトリエチルアミン、TFAはトリフルオロ酢酸。


20

【0214】

例1：化合物SG8

中間体1

【化55】



（tert-ブトキシカルボニル）-L-バリン：L-バリン（3.515 g、30 mmol、1eq）を水（10 mL）および1 Mの水性NaOH（36 mL）中に溶解させた。Boc₂O（8.512 g、39 mmol、1.3eq）をジオキサン（30 mL）中に溶解させ、L-バリンの氷冷攪拌溶液に滴加した。得られた混合物をrtで20時間攪拌した。ジオキサンを真空において蒸発させた後に、混合物をジエチルエーテルで洗浄した。混合物を1 MのHCl溶液で酸性化した後に、これを酢酸エチル（50 mL）で3回抽出した。合した有機相をNa₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、無色の油としての対象化合物（6.518 g、収率100%）を得た。¹H NMR（400 MHz，DMSO-d₆）δ 12.46（s，1H），6.94（d，1H），3.82 - 3.75（m，1H），2.06 - 1.94（m，1H），1.39（s，9H），0.87（t，6H）。


40

【0215】

中間体2

50

【化 5 6】




(tert-ブトキシカルボニル)グリシン：グリシン (2.252 g、30 mmol、1 eq) を水 (10 mL) および 1 M の水性 NaOH (36 mL) 中に溶解させた。Boc₂O (8.512 g、39 mmol、1.3 eq) をジオキサン (30 mL) 中に溶解させ、グリシンの氷冷攪拌溶液に滴加した。得られた混合物を rt で 20 時間攪拌した。ジオキサンを真空において蒸発させた後に、混合物をジエチルエーテルで洗浄した。混合物を 1 M の HCl 溶液で酸性化した後に、これを酢酸エチル (50 mL) で 3 回抽出した。合した有機相を Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、無色の油としての対象化合物 (5.255 g、収率 100%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.46 (s, 1H), 7.08 (t, 1H), 3.59 - 3.56 (m, 2H), 1.38 (s, 9H).

10

【0216】

中間体 3

【化 5 7】




20

ジエチル D-グルタメート：無水エタノール (40 mL) 中の D-グルタミン酸 (2.943 g、20 mmol、1 eq) の氷冷攪拌懸濁液に、塩化チオニル (3.20 mL、44 mmol、2.2 eq) を添加した。得られた混合物を攪拌しながら 20 時間還流した。混合物を真空において濃縮した後に、残留物をジエチルエーテル中で沈殿させた。ジエチルエーテルを真空において蒸発させて、白色の結晶性粉末としての対象化合物 (4.794 g、収率 100%) を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップで利用した。

【0217】

中間体 4

【化 5 8】



ジエチル (tert-ブトキシカルボニル) - L-バリル - D-グルタメート：酢酸エチル (50 mL) 中の中間体 1 (1.673 g、7.7 mmol、1.1 eq) の氷冷攪拌溶液に、HOBt (1.040 g、7.7 mmol、1.1 eq) および DCC (1.589 g、7.7 mmol、1.1 eq) を添加した。30 分間攪拌した後に、中間体 3 (1.678 g、7 mmol、1 eq)、TEA (2.44 mL、17.5 mmol、2.5 eq)、および DMAP (触媒量) を添加し、得られた混合物を rt で 22 時間攪拌し、その後、ヘキサン (20 mL) を添加した。混合物を濾過し、1 M の HCl 溶液 (2 × 50 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 50 mL)、およびブライン (50 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの結晶性固形物としての対象化合物 (2.457 g、収率：87%) を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップで利用した。


40

【0218】

中間体 5

50

【化59】



ジエチル（*tert*-ブトキシカルボニル）グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体4（2.424 g、6.02 mmol）をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物（1/5、24 mL）に添加し、混合物を室温に温めた。3時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで3回共蒸発させた。同時に、HOBt（0.894 g、6.62 mmol、1.1 eq）、DCC（1.366 g、6.62 mmol、1.1 eq）、およびDMAP（触媒量）を、酢酸エチル（30 mL）中の中間体2（1.16 g、6.62 mmol、1.1 eq）の氷冷攪拌溶液に添加した。30分後に、酢酸エチル（20 mL）およびTEA（4.3 mL、30.1 mmol、5 eq）中の脱保護された中間体4の溶液を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌した。ヘキサン（20 mL）を添加し、その後、混合物を濾過し、1 MのHCl溶液（2×50 mL）、飽和NaHCO₃溶液（2×50 mL）、およびブライン（50 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの結晶性固形物としての対象化合物（2.06 g、収率：75%）を得た。¹H NMR（400 MHz, DM

10


20

【0219】

化合物6

SG8

【化60】



30

ジエチル（（*E*）-3-（4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体5（0.919 g、2 mmol、1 eq）をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物（1/5、12 mL）に添加し、混合物を室温に温めた。3時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで3回共蒸発させ、DMF（6 mL）中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、TEA（1.4 mL、10 mmol、5 eq）、*trans*-フェルラ酸（0.427 g、2.2 mmol、1.1 eq）、HOBt（0.297 g、2.2 mmol、1.1 eq）、DMAP（触媒量）、およびEDC（0.422 g、2.2 mmol、1.1 eq）を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル（60 mL）で希釈し、1 MのHCl溶液（2×30 mL）、飽和NaHCO₃溶液（2×30 mL）、およびブライン（30 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、橙色の固形物としての対象化合物（0.804 g、収率：75%）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆）δ 9.46（s, 1H），8.39（d, 1H），8.20（t, 1H），7.90（d, 1H），7.33（d, 1H），7.14（s, 1H），7.00（d, 1H），6.79（d, 1H），6.56（d, 1H），4.28 - 4.22（m, 2H），4.10 - 3.99（m, 4H），3.88（d, 2H），3.81（s, 3H），2.35（t, 2H），2.04 - 1.92（m, 2H），1.88 - 1.79（m, 1H），1.19 - 1.13（m, 6H），0.85（t, 6H）。

40


【0220】

50

例 2 : 化合物 S G 4 3

中間体 7

【化 6 1】




4 - ((6 - アミノ - 2 - クロロ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) ベンゾニトリル : 2 - クロロアデニン (1 . 0 1 7 g 、 6 m m o l 、 1 . 0 e q) 、 炭酸カリウム (2 . 5 7 9 g 、 1 8 . 6 6 m m o l 、 3 . 1 1 e q) 、 および 4 - (ブロモメチル) ベンゾニトリル (1 . 6 2 5 g 、 8 . 2 9 m m o l 、 1 . 3 8 e q) を D M S O (2 2 m L) 中に懸濁し、r t で 2 0 時間撹拌した。反応混合物を酢酸エチル (1 3 0 m L) および水 (9 0 m L) に注いだ。十分に混合した後に、混合物を真空において濃縮した。濃縮した混合物を氷で冷却し、形成された沈殿物を濾過し、冷水で洗浄し、乾燥させて、対象化合物 (1 . 7 3 7 g 、 収率 : 8 9 %) を得た。¹H NMR (4 0 0 M H z , D M S O - d ₆) δ 8.28 (s , 1 H) , 7.85-7.83 (m , 4 H) , 7.42 (d , 2 H) , 5.45 (s , 2 H) .

【 0 2 2 1 】

中間体 8

【化 6 2】




4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) 安息香酸 : 中間体 7 (1 . 7 3 7 g 、 6 . 1 0 m m o l 、 1 e q) を無水 n - ブタノール (6 0 m L) 中に懸濁した。n - ブタノール中のナトリウム n - ブトキシドの 2 0 % の溶液 (3 3 . 6 m L 、 6 1 . 0 1 m m o l 、 1 0 e q) を添加し、得られた混合物を撹拌しながら 2 0 時間還流した。還流を停止して、混合物を冷却した。水 (2 0 m L) を添加し、還流をさらに 2 0 時間続けた。反応混合物を 8 0 m L の水で 3 回抽出した。合した水層を濃 H C l で p H 3 に酸性化し、一晚冷却した。得られた白色の沈殿物を濾過し、乾燥させて、対象化合物 (1 . 6 0 5 g 、 収率 : 7 7 %) を得た。¹H NMR (4 0 0 M H z , D M S O - d ₆) δ 1 2.69 (b r s , 1 H) , 8.07 (s , 1 H) , 7.91 (d , 2 H) , 7.39 (d , 2 H) , 7.25 (s , 2 H) , 5 . 3 5 (s , 2 H) , 4.20-4.18 (m , 2 H) , 1.64-1.61 (m , 2 H) , 1.39-1.35 (m , 2 H) , 0 . 9 0 (t , 3 H) .

【 0 2 2 2 】

中間体 9

【化 6 3】



4 - ((6 - アミノ - 8 - ブロモ - 2 - ブトキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル)


安息香酸：中間体 8 (1.605 g、4.701 mmol、1 eq) を酢酸 (60 mL) 中に懸濁した。酢酸ナトリウム (1.928 g、23.51 mmol、5 eq) および臭素 (1.22 mL、23.74 mmol、5.05 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 2 時間攪拌した。水性 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ を反応混合物に添加した。得られた沈殿物を濾過し、冷水およびジエチルエーテルで洗浄して、黄色の粉末としての対象化合物 (1.976 g、収率 100%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 7.92 (d, 2H), 7.44 (brs, 2H), 7.30 (d, 2H), 5.33 (s, 2H), 4.19 (t, 2H), 1.66-1.59 (m, 2H), 1.40-1.35 (m, 2H), 0.91 (t, 3H).

【0223】

化合物 10

SG43

【化64】




4-((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)安息香酸：メタノール (35 mL) 中の中間体 9 (1.976 g、4.701 mmol) に、10 M の水性 NaOH (35 mL) を添加した。混合物を攪拌しながら 24 時間還流した。溶液を室温に冷却し、6 M の HCl 溶液で酸性化した。混合物を真空において濃縮した後に、得られたオフホワイトの沈殿物を濾過し、水およびジエチルエーテルで洗浄して、対象化合物 (1.523 g、収率 91%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 10.25 (s, 1H), 7.89 (d, 2H), 7.38 (d, 2H), 6.63 (brs, 2H), 4.93 (s, 2H), 4.13 (t, 2H), 1.62-1.58 (m, 2H), 1.38-1.33 (m, 2H), 0.89 (t, 3H).

【0224】

例 3：化合物 SG48

中間体 11

【化65】



6-エトキシ-6-オキソヘキサン-1-アミニウムクロリド：エタノール (5 mL) 中の 6-アミノヘキサン酸 (656 mg、5 mmol、1 eq) に、塩化チオニル (0.55 mL、7.5 mmol、1.5 eq) を添加し、攪拌しながら 3 時間還流した。反応混合物を真空において濃縮し、ジエチルエーテルで共蒸発させて、白色の固形物としての対象化合物 (0.976 g、収率 100%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 8.00 (s, 3H), 4.05 (q, 2H), 2.74 (t, 2H), 2.29 (t, 2H), 1.59-1.49 (m, 4H), 1.34-1.29 (m, 2H), 1.18 (t, 3H).

【0225】

中間体 12

10


20

30

40

50

【化 6 6】




エチル 6 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) ベンズアミド) ヘキサノエート : 化合物 10 (185 mg、0.518 mmol、1 eq) を DMSO (7 mL) 中に溶解させた。中間体 11 (304 mg、1.553 mmol、3 eq) および TEA (0.576 mL、4.141 mmol、8 eq) を DCM (2 mL) 中に溶解させ、DMSO 中の化合物 10 の攪拌溶液に添加した。反応混合物を氷で冷却した後に、COMU (554 mg、1.295 mmol、2.5 eq) を添加し、混合物を rt で 20 時間攪拌した。酢酸エチル (60 mL) および 1 M の NaHCO₃ 溶液 (40 mL) を添加した。混合物を真空において濃縮した後に、混合物を氷で 1 時間冷却した。沈殿物を濾過し、水およびジエチルエーテルで洗浄して、対象化合物 (119 mg、収率 : 46%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 9.99 (s, 1H), 8.40 (t, 1H), 7.76 (d, 2H), 7.34 (d, 2H), 6.48 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.21 - 4.09 (m, 2H), 4.02 (q, 2H), 3.22 (q, 2H), 2.27 (t, 2H), 1.66 - 1.56 (m, 2H), 1.55 - 1.45 (m, 4H), 1.41 - 1.21 (m, 4H), 1.15 (t, 3H), 0.90 (t, 3H).

【 0 2 2 6 】

中間体 13

【化 6 7】




6 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) ベンズアミド) ヘキサノ酸 : メタノール (15 mL) 中の中間体 12 (95 mg、0.191 mmol) の攪拌溶液に、1 M の水性 NaOH (3 mL) を添加した。混合物を rt で 20 時間攪拌した。水 (12 mL) を添加し、1 M の HCl 溶液を使用して混合物を酸性化した。メタノールを真空において蒸発させ、得られた懸濁液を氷で 1 時間冷却した。得られた沈殿物を濾過し、水およびジエチルエーテルで洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (59 mg、収率 66%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.02 (brs, 1H), 10.12 (s, 1H), 8.40 (t, 1H), 7.77 (d, 2H), 7.34 (d, 2H), 6.54 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.18 - 4.11 (m, 2H), 3.22 (q, 2H), 2.20 (t, 2H), 1.64 - 1.57 (m, 2H), 1.55 - 1.47 (m, 4H), 1.41 - 1.23 (m, 4H), 0.90 (t, 3H).

【 0 2 2 7 】

化合物 14

SG 48

【化 6 8】




ジエチル（（E）-3-（4-（（6-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）ベンズアミド）ヘキサノイル）-オキシ）-3-メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル-L-バリル-D-グルタメート：D M F（2 mL）中の中間体 13（55 mg、0.117 mmol、1 eq）の氷冷攪拌溶液に、D I P E A（61 μ L、0.351 mmol、3 eq）、化合物 6（63 mg、0.117 mmol、1 eq）、および C O M U（55 mg、0.129 mmol、1.1 eq）を添加した。得られた混合物を r t で 4 時間攪拌し、その後、これを酢酸エチル（30 mL）で希釈し、1 M の H C l 溶液（2 $\times$ 15 mL）、飽和 N a H C O ₃ 溶液（2 $\times$ 15 mL）、およびブライン（15 mL）で洗浄した。有機層を無水 N a ₂ S O ₄ で乾燥させ、真空において濃縮した。シリカゲルクロマトグラフィー（7%の M e O H / D C M）を使用して粗化合物を精製して、橙色の固形物としての対象化合物（14 mg、収率：12%）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆） δ 10.00 (s, 1H), 8.46 - 8.37 (m, 2H), 8.36 - 8.29 (m, 1H), 7.96 (d, 1H), 7.79 (d, 2H), 7.43 (d, 1H), 7.38 - 7.30 (m, 3H), 7.16 (d, 1H), 7.10 (d, 1H), 6.77 (d, 1H), 6.48 (s, 2H), 4.91 (s, 2H), 4.31 - 4.23 (m, 2H), 4.17 - 3.98 (m, 6H), 3.92 (d, 2H), 3.79 (s, 3H), 3.30 - 3.22 (m, 2H), 2.40 - 2.31 (m, 2H), 2.04 - 1.95 (m, 4H), 1.92 - 1.79 (m, 1H), 1.69 - 1.50 (m, 6H), 1.41 - 1.31 (m, 4H), 1.22 - 1.11 (m, 6H), 0.94 - 0.82 (m, 9H). C₄₉H₆₆O₁₃N₉ について計算した H R M S m/z : 988.4775 (M+H)⁺、実測値 988.4779。

【0228】

例 4：化合物 S G 1 4 4

中間体 1 5

【化 6 9】



5-ベンジル 1-エチル（t e r t-ブトキシカルボニル）-D-グルタメート：D C M（20 mL）中の b o c-D-グルタミン酸 5-ベンジルエステル（1.687 g、5 mmol、1 eq）の氷冷溶液に、D M A P（182 mg、1.5 mmol、0.3 eq）、無水エタノール（5 mL）、および D C C（1.547 g、7.5 mmol、1.5 eq）を添加した。得られた混合物を r t で 19 時間攪拌した。溶媒を真空において蒸発させ、ジエチルエーテルで 2 回洗浄して、粘性の無色の油としての対象化合物（1.827 g、収率：100%）を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップで使用した。

【0229】

中間体 1 6

10


20

30

40

50

【化 7 0】




5-ベンジル 1-エチル (tert-ブトキシカルボニル) -L-バリル-D-グルタメート：中間体 15 (1.827 g、5 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/3、25 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 3 回共蒸発させた。同時に、HOBt (0.743 g、5.5 mmol、1.1 eq)、DCC (1.135 g、5.5 mmol、1.1 eq)、および DMAP (触媒量) を、酢酸エチル (25 mL) 中の中間体 1 (1.194 g、5.5 mmol、1.1 eq) の氷冷攪拌溶液に添加した。30 分後に、酢酸エチル (15 mL) および TEA (3.5 mL、25 mmol、5 eq) 中の脱保護された中間体 15 の溶液を添加し、得られた混合物を rt で 17 時間攪拌した。ヘキサン (10 mL) を添加し、その後、混合物を濾過し、1 M の HCl 溶液 (2 × 40 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 40 mL)、およびブライン (40 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、粘性の黄色の油としての対象化合物 (2.1 g、収率：90%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.22 (d, 1H), 7.42 - 7.28 (m, 5H), 6.61 (d, 1H), 5.08 (s, 2H), 4.28 - 4.18 (m, 1H), 4.13 - 4.00 (m, 2H), 3.79 (t, 1H), 2.43 (t, 2H), 2.09 - 1.96 (m, 1H), 1.93 - 1.81 (m, 1H), 1.79 - 1.63 (m, 1H), 1.36 (s, 9H), 1.16 (t, 3H), 0.83 (t, 6H).

【0230】

中間体 17

【化 7 1】



5-ベンジル 1-エチル (tert-ブトキシカルボニル) グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体 16 (2.05 g、4.4 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/3、25 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 3 回共蒸発させた。同時に、HOBt (0.653 g、4.84 mmol、1.1 eq)、DCC (0.999 g、4.84 mmol、1.1 eq)、および DMAP (触媒量) を、酢酸エチル (25 mL) 中の中間体 2 (0.848 g、4.84 mmol、1.1 eq) の氷冷攪拌溶液に添加した。30 分後に、酢酸エチル (15 mL) および TEA (3.3 mL、24 mmol、5 eq) 中の脱保護された中間体 16 の溶液を添加し、得られた混合物を rt で 17 時間攪拌した。ヘキサン (10 mL) を添加し、その後、混合物を濾過し、1 M の HCl 溶液 (2 × 40 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 40 mL)、およびブライン (40 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の結晶性固形物としての対象化合物 (1.95 g、収率：85%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.45 (d, 1H), 7.60 (d, 1H), 7.36 (s, 5H), 7.05 (t, 1H), 5.09 (s, 2H), 4.31 - 4.22 (m, 2H), 4.11 - 4.03 (m, 2H), 3.58 (d, 2H), 2.45 (t, 2H), 2.09 - 1.90 (m, 1H), 1.89 - 1.80 (m, 1H), 1.79 - 1.62 (m, 1H), 1.38 (s, 9H), 1.17 (t, 3H), 0.82 (t, 6H).

【0231】

中間体 18

10


20

30

40

50

【化 7 2】




エチル (E) - 3 - (4 - ヒドロキシ - 3 - メトキシフェニル) アクリレート : 無水エタノール (20 mL) 中の *trans* - フェルラ酸 (1.942 g、10 mmol、1 eq) の氷冷懸濁液に、塩化チオニル (0.87 mL、12 mmol、1.2 eq) を添加した。得られた混合物を攪拌しながら 20 時間還流した。溶液を真空において濃縮し、酢酸エチル (30 mL) 中に溶解させ、1 M の HCl 溶液 (15 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (15 mL)、およびブライン (15 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、橙色の油としての対象化合物 (2.185 g、収率 : 98 %) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆) δ 9.61 (s, 1H), 7.54 (d, 1H), 7.33 (d, 1H), 7.12 (dd, 1H), 6.79 (d, 1H), 6.48 (d, 1H), 4.16 (q, 2H), 3.81 (s, 3H), 1.25 (t, 3H).

10

【 0 2 3 2 】

中間体 19

【化 7 3】



20


エチル (E) - 3 - (3 - メトキシ - 4 - ((テトラヒドロ - 2 H - ピラン - 2 - イル) オキシ) フェニル) アクリレート : 3, 4 - ジヒドロピラン (20 mL) 中の中間体 18 (2.185 g、9.8 mmol、1 eq) の溶液に、p - トルエンスルホン酸ピリジニウム (198 mg、0.79 mmol、0.08 eq) を添加した。得られた混合物を攪拌しながら 2 時間還流した。溶液を真空において濃縮し、酢酸エチル (35 mL) 中に溶解させ、1 M の水性 NaOH (4 × 7 mL)、および水 (2 × 10 mL) で洗浄した。溶媒を真空において蒸発させて、黄色の油としての対象化合物 (2.8 g、収率 : 93 %) を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップで使用した。

30

【 0 2 3 3 】

中間体 20

【化 7 4】



40

(E) - 3 - (3 - メトキシ - 4 - ((テトラヒドロ - 2 H - ピラン - 2 - イル) オキシ) フェニル) アクリル酸 : メタノール (20 mL) 中の中間体 19 (2.8 g、9.1 mmol) の溶液に、1 M の水性 NaOH (10 mL) を添加した。得られた混合物を *rt* で 20 時間攪拌した。溶媒を真空において蒸発させ、残留物を水 (10 mL) 中に溶解させ、酢酸エチル (20 mL) で抽出した。混合物を 1 M の HCl 溶液で酸性化した後に、これを酢酸エチル (2 × 30 mL) で抽出した。合した有機相を水 (2 × 30 mL) お


50

よびブライン (30 mL) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮して、黄色の油としての対象化合物 (1.75 g、収率：69%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.73 (d, 1H), 7.16 - 7.08 (m, 3H), 6.33 (d, 1H), 5.48 (t, 1H), 3.97 - 3.86 (m, 4H), 3.67 - 3.56 (m, 1H), 2.02 - 1.82 (m, 2H), 1.76 - 1.58 (m, 4H).

【0234】

中間体 21

【化75】




5-ベンジル 1-エチル ((E)-3-(3-メトキシ-4-((テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル)オキシ)フェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体 17 (1.50 g、2.88 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/5、6 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。4 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 5 回共蒸発させ、DMF (6 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (2.5 mL、14.4 mmol、5 eq)、中間体 20 (0.80 g、2.88 mmol、1 eq)、HOBt (0.388 g、2.88 mmol、1 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (0.551 g、2.88 mmol、1 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (100 mL) で希釈し、飽和 NH_4Cl 溶液 (2×50 mL)、飽和 NaHCO_3 溶液 (2×50 mL)、およびブライン (50 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (0.753 g、収率：38%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 8.39 (d, 1H), 8.24 (t, 1H), 7.90 (d, 1H), 7.42 - 7.27 (m, 6H), 7.21 (d, 1H), 7.09 (d, 2H), 6.65 (d, 1H), 5.45 (t, 1H), 5.06 (s, 2H), 4.33 - 4.21 (m, 2H), 4.13 - 4.02 (m, 2H), 3.89 (d, 2H), 3.83 - 3.75 (m, 4H), 3.58 - 3.49 (m, 1H), 2.44 (t, 2H), 2.07 - 1.76 (m, 6H), 1.64 - 1.52 (m, 3H), 1.17 (t, 3H), 0.84 (t, 6H).

【0235】

中間体 22

【化76】




((4R)-5-エトキシ-4-((2S)-2-(2-((E)-3-(3-メトキシ-4-((テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル)オキシ)フェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-5-オキソペンタン酸：無水 DCM (7 mL) 中の酢酸パラジウム (II) (12 mg、0.055 mmol、0.05 eq) の溶液に、TEA (297 μL 、2.13 mmol、1.95 eq) およびトリエチルシラン (350 μL 、2.19 mmol、2 eq) を添加した。得られた黒色の溶液を 15 分間攪拌し、その後、無水 DCM (13 mL) 中の中間体 21 (746 mg、1.09 mmol、1 eq) の溶液を添加した。得られた混合物をアルゴン雰囲気下で 18 時間攪拌し、DCM (30 mL) で希釈し、水 (3×30 mL) で抽出した。合した水相を 1 M の H

Cl 溶液で酸性化し、DCM (2×50 mL) で抽出した。合した有機相を水 (2×50 mL) およびブライン (50 mL) で洗浄し、無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (355 mg、収率：55%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.17 (s, 1H), 8.49 (s, 1H), 8.36 (s, 1H), 7.88 (d, 1H), 7.37 (d, 1H), 7.22 (s, 1H), 7.10 (d, 2H), 6.68 (d, 1H), 5.45 (t, 1H), 4.30 - 4.19 (m, 2H), 4.16 - 4.00 (m, 2H), 3.90 (d, 2H), 3.84 - 3.74 (m, 4H), 3.58 - 3.49 (m, 1H), 2.27 (t, 2H), 2.02 - 1.75 (m, 6H), 1.64 - 1.52 (m, 3H), 1.18 (t, 3H), 0.85 (t, 6H).

【0236】

中間体 23

【化77】




tert-ブチル (2- (2-アミノエトキシ) エチル) カルバメート：DCM (15 mL) 中のBoc₂O (654 mg、3 mmol、1 eq) の溶液を、0℃のDCM (15 mL) 中の2-アミノエチルエーテル二塩酸塩 (2.66 g、15 mmol、5 eq) の攪拌溶液に滴加した。得られた混合物をrtで18時間攪拌した。続いて、溶液を水 (3×20 mL) およびブライン (20 mL) で洗浄し、無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、無色の油としての対象化合物 (490 mg、収率：80%) を得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 4.95 (brs, 1H), 3.50 (t, 2H), 3.46 (t, 2H), 3.31 (q, 2H), 2.85 (t, 2H), 1.43 (s, 9H), 1.42 (brs, 2H).

【0237】

中間体 24

【化78】



tert-ブチル (2- (2- (4- ((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル) メチル) ベンズアミド) エトキシ) エチル) カルバメート：化合物10 (200 mg、0.560 mmol、1 eq) をDMSO (7 mL) 中に溶解させた。中間体23 (380 mg、1.86 mmol、3.3 eq) およびDIPEA (0.523 mL、2.99 mmol、5.3 eq) をDCM (1 mL) 中に溶解させ、DMSO中の化合物10の攪拌溶液に添加した。反応混合物を氷で冷却した後に、COMU (640 mg、1.49 mmol、2.7 eq) を添加し、混合物をrtで3時間攪拌した。酢酸エチル (40 mL) および1 MのNaHCO₃溶液 (30 mL) を添加した。混合物を真空において濃縮した後に、混合物を氷で1時間冷却した。沈殿物を濾過し、水およびジエチルエーテルで洗浄して、対象化合物を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップに使用した。

【0238】

中間体 25

10


20

30

40

50

【化 7 9】




4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) - N - (2 - (2 - アミノエトキシ) エチル) ベンズアミド : 中間体 2 4 (1 6 0 m g 、 0 . 2 9 4 m m o l) を T F A と D C M との氷冷攪拌混合物 (1 / 5 、 6 m L) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテル中で沈殿させ、濾過し、ジエチルエーテルで洗浄して、茶色の固形物としての対象化合物 (1 5 6 m g 、 収率 : 9 7 %) を得た。¹H NMR (4 0 0 M H z , D M S O - d ₆) δ 10.03 (s , 1 H) , 8.41 (t , 1 H) , 7.78 (d , 2 H) , 7.74 (s , 2 H) , 7.36 (d , 2 H) , 6.50 (s , 2 H) , 4.91 (s , 2 H) , 4.14 (t , 2 H) , 3.63 - 3.52 (m , 4 H) , 3.50 - 3.41 (m , 2 H) , 3.03 - 2.94 (m , 2 H) , 1.67 - 1.56 (m , 2 H) , 1.42 - 1.30 (m , 2 H) , 0.90 (t , 3 H) .

【 0 2 3 9 】

化合物 2 6

S G 1 4 4

【化 8 0】




エチル N 5 - (2 - (2 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) ベンズアミド) エトキシ) エチル) - N 2 - ((E) - 3 - (4 - ヒドロキシ - 3 - メトキシフェニル) アクリロイル) グリシル - L - バリル - D - グルタミネート : D M F (3 m L) 中の中間体 2 2 (7 1 m g 、 0 . 1 2 0 m m o l 、 1 e q) の氷冷攪拌溶液に、D I P E A (8 4 μ L 、 0 . 4 8 m m o l 、 4 e q) 、 中間体 2 5 (1 1 5 m g 、 0 . 2 0 6 m m o l 、 1 . 7 e q) 、 および H A T U (6 4 m g 、 0 . 1 6 8 m m o l 、 1 . 4 e q) を添加した。得られた混合物を r t で 2 0 時間攪拌した。続いて、1 M の H C l 溶液 (2 0 m L) を添加し、混合物を r t で 1 5 分間攪拌し、その後、これを D C M と イソプロパノールとの混合物 (3 / 1 、 3 × 2 0 m L) で抽出した。合した有機相を飽和 N a H C O ₃ 溶液 (2 × 5 0 m L) およびブライン (5 0 m L) で洗浄し、無水 N a ₂ S O ₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、橙色の固形物としての対象化合物 (4 8 m g 、 収率 : 3 9 %) を得た。¹H NMR (4 0 0 M H z , D M S O - d ₆) δ 9.99 (s , 1 H) , 9.43 (s , 1 H) , 8.44 (t , 1 H) , 8.38 (d , 1 H) , 8.19 (t , 1 H) , 7.89 - 7.82 (m , 2 H) , 7.78 (d , 2 H) , 7.39 - 7.29 (m , 3 H) , 7.15 (s , 1 H) , 7.00 (d , 1 H) , 6.79 (d , 1 H) , 6.56 (d , 1 H) , 6.46 (s , 2 H) , 4.89 (s , 2 H) , 4.30 - 4.22 (m , 2 H) , 4.22 - 4.00 (m , 4 H) , 3.89 (d , 2 H) , 3.80 (s , 3 H) , 3.49 (t , 2 H) , 3.44 - 3.36 (m , 4 H) , 3.21 - 3.15 (m , 2 H) , 2.14 (t , 2 H) , 2.02 - 1.90 (m , 2 H) , 1.84 - 1.76 (m , 1 H) , 1.65 - 1.55 (m , 2 H) , 1.41 - 1.31 (m , 2 H) , 1.16 (t , 3 H) , 0.89 (t , 3 H) , 0.84 (t , 6 H) . C ₄₅ H ₆₁ O ₁₂ N ₁₀ について計算した H R M S m / z : 9 3 3 . 4 4 6 5 (M + H) ⁺ 、 実測値 9 3 3 . 4 4 5 8 .

【0240】

例5：化合物RH32

中間体27

【化81】




tert-ブチル（2-（2-（2-アミノエトキシ）エトキシ）エチル）カルバメート：DCM（40mL）中のBoc₂O（4.365g、20mmol、1eq）の溶液を、0℃のDCM（100mL）中の1,2-ビス（2-アミノエトキシ）エタン（14.821g、100mmol、5eq）の攪拌溶液に滴加した。得られた混合物をrtで20時間攪拌した。続いて、溶液を水（3×100mL）およびブライン（100mL）で洗浄し、無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物（4.370g、収率：88%）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆）δ 6.72 (brs, 1H), 3.53 - 3.44 (m, 4H), 3.41 - 3.30 (m, 4H), 3.05 (q, 2H), 2.64 (t, 2H), 1.36 (s, 9H).

10

【0241】

中間体28

【化82】



20


tert-ブチル（2-（2-（2-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）ベンズアミド）エトキシ）エトキシ）エチル）カルバメート：化合物10（500mg、1.40mmol、1eq）をDMSO（20mL）中に溶解させた。中間体27（1.157g、4.66mmol、3.3eq）およびDIPEA（1.299mL、7.46mmol、5.3eq）をDCM（1mL）中に溶解させ、DMSO中の化合物10の攪拌溶液に添加した。反応混合物を氷で冷却した後に、COMU（1.593g、3.72mmol、2.7eq）を添加し、混合物をrtで19時間攪拌した。酢酸エチル（100mL）および1MのNaHCO₃溶液（75mL）を添加した。混合物を真空において濃縮した後に、混合物を氷で1時間冷却した。沈殿物を濾過し、水およびジエチルエーテルで洗浄して、対象化合物を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップに使用した。

30

【0242】

中間体29

【化83】



40

4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）-N-（2-（2-（2-アミノエトキシ）エトキシ）エチル）ベンズアミド：中間

50


体 28 (491 mg、0.84 mmol) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1 / 5、12 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテル中で沈殿させ、濾過し、ジエチルエーテルで洗浄して、茶色の固形物としての対象化合物 (492 mg、収率：98%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 10.07 (s, 1H), 8.48 (t, 1H), 7.82 - 7.75 (m, 4H), 7.35 (d, 2H), 6.52 (brs, 2H), 4.91 (s, 2H), 4.13 (t, 2H), 3.63 - 3.49 (m, 8H), 3.46 - 3.33 (m, 2H), 3.03 - 2.88 (m, 2H), 1.67 - 1.56 (m, 2H), 1.43 - 1.30 (m, 2H), 0.90 (t, 3H).

【0243】

化合物 30

RH 32

【化 84】



エチル (R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 15 - ((S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (4 - ヒドロキシ - 3 - メトキシフェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート：DMF (4 mL) 中の中間体 22 (72 mg、0.122 mmol、1 eq) の氷冷攪拌溶液に、DIPEA (85 μL、0.49 mmol、4 eq)、中間体 29 (132 mg、0.22 mmol、1.8 eq)、および COMU (73 mg、0.17 mmol、1.4 eq) を添加した。得られた混合物を rt で 20 時間攪拌した。続いて、1 M の HCl 溶液 (20 mL) を添加し、混合物を rt で 15 分間攪拌し、その後、これを DCM と イソプロパノール との混合物 (3 / 1、3 × 20 mL) で抽出した。合した有機相を飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 50 mL) およびブライン (50 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮した。分取薄層シリカゲルクロマトグラフィー (10% の MeOH / DCM) を使用して粗化合物を精製して、橙色の固形物としての対象化合物 (29 mg、収率：24%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 9.98 (s, 1H), 9.43 (s, 1H), 8.47 (t, 1H), 8.38 (d, 1H), 8.18 (t, 1H), 7.89 - 7.82 (m, 2H), 7.78 (d, 2H), 7.38 - 7.29 (m, 3H), 7.15 (s, 1H), 7.00 (d, 1H), 6.79 (d, 1H), 6.57 (d, 1H), 6.46 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.30 - 4.01 (m, 6H), 3.89 (d, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.56 - 3.44 (m, 10H), 3.19 - 3.13 (m, 2H), 2.13 (t, 2H), 2.02 - 1.88 (m, 2H), 1.86 - 1.75 (m, 1H), 1.65 - 1.57 (m, 2H), 1.41 - 1.31 (m, 2H), 1.17 (t, 3H), 0.93 - 0.80 (m, 9H). C₄₇H₆₃O₁₃N₁₀ について計算した HRMS m/z : 975.4582 (M-H)⁻、実測値 975.4589。

【0244】

例 6：化合物 SG176

中間体 31

10


20

30

40

50

【化 8 5】




5-ベンジル 1-エチル ((E)-3-(4-イソプロピルフェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体 17 (0.500 g、0.96 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/4、5 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 4 回共蒸発させ、DMF (5 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIEPFA (0.84 mL、4.79 mmol、5 eq)、(E)-3-(4-イソプロピルフェニル)アクリル酸 (0.22 g、1.15 mmol、1.2 eq)、HOBt (0.155 g、1.15 mmol、1.2 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (0.220 g、1.15 mmol、1.2 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (60 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2×30 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2×30 mL)、およびブライン (30 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (0.392 g、収率：69%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.39 (d, 1H), 8.35 (t, 1H), 7.94 (d, 1H), 7.49 (d, 2H), 7.44 - 7.25 (m, 8H), 6.69 (d, 1H), 5.06 (s, 2H), 4.32 - 4.19 (m, 2H), 4.13 - 4.00 (m, 2H), 3.90 (d, 2H), 2.90 (p, 1H), 2.43 (t, 2H), 2.08 - 1.93 (m, 2H), 1.93 - 1.80 (m, 1H), 1.23 - 1.14 (m, 9H), 0.84 (t, 6H).

【0245】

中間体 32

【化 8 6】



(R)-5-エトキシ-4-((S)-2-(2-((E)-3-(4-イソプロピルフェニル)アクリルアミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-5-オキソペンタン酸：無水 DCM (5 mL) 中の酢酸パラジウム (II) (7 mg、0.031 mmol、0.05 eq) の溶液に、TEA (167 μL、1.20 mmol、1.95 eq) およびトリエチルシラン (197 μL、1.23 mmol、2 eq) を添加した。得られた黒色の溶液を 15 分間攪拌し、その後、無水 DCM (10 mL) 中の中間体 31 (366 mg、0.616 mmol、1 eq) の溶液を添加した。得られた混合物をアルゴン雰囲気下で 18 時間攪拌し、DCM (25 mL) で希釈し、水 (4×30 mL) で抽出した。合した水相を 1 M の HCl 溶液で酸性化し、DCM (2×30 mL) で抽出した。合した有機相を水 (30 mL) およびブライン (30 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (133 mg、収率：43%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.18 (s, 1H), 8.43 - 8.31 (m, 2H), 7.93 (d, 1H), 7.49 (d, 2H), 7.40 (d, 1H), 7.29 (d, 2H), 6.69 (d, 1H), 4.31 - 4.21 (m, 2H), 4.14 - 4.01 (m, 2H), 3.90 (d, 2H), 2.95 - 2.85 (m, 1H), 2.28 (t, 2H), 2.03 - 1.91 (m, 2H), 1.88 - 1.74 (m, 1H), 1.23 - 1.13 (m, 9H), 0.87 - 0.81 (m, 6H).

【0246】

10


20

30

40

50

化合物 33
SG176
【化87】



10

エチル (R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 15 - ((S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (4 - イソプロピルフェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート : DMF (3 mL) 中の中間体 32 (130 mg、0.26 mmol、1 eq) の氷冷攪拌溶液に、DIPEA (135 μ L、0.774 mmol、3 eq)、中間体 29 (171 mg、0.28 mmol、1.1 eq)、および COMU (133 mg、0.31 mmol、1.2 eq) を添加した。得られた混合物を rt で 20 時間攪拌した。続いて、1 M の HCl 溶液 (40 mL) を添加し、その後、混合物を DCM とイソプロパノールとの混合物 (3 / 1、3 $\times$ 30 mL) で抽出した。合した有機相を飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 $\times$ 40 mL) およびブライン (40 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (73 mg、収率 : 29%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DM SO - d₆) δ 10.03 (s, 1H), 8.48 (t, 1H), 8.41 - 8.30 (m, 2H), 7.91 (d, 1H), 7.90 - 7.85 (m, 1H), 7.79 (d, 2H), 7.49 (d, 2H), 7.40 (d, 1H), 7.34 (d, 2H), 7.31 - 7.25 (m, 2H), 6.70 (d, 1H), 6.49 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.32 - 4.02 (m, 6H), 3.92 (d, 2H), 3.56 - 3.45 (m, 6H), 3.41 - 3.35 (m, 4H), 3.21 - 3.12 (m, 2H), 2.93 - 2.85 (m, 1H), 2.14 (t, 2H), 2.05 - 1.89 (m, 2H), 1.87 - 1.73 (m, 1H), 1.66 - 1.56 (m, 2H), 1.41 - 1.31 (m, 2H), 1.22 - 1.13 (m, 9H), 0.92 - 0.79 (m, 9H). C₄₉H₆₉O₁₁N₁₀ について計算した HRMS m/z : 973.5142 (M + H)⁺、実測値 973.5112。

20


30

【0247】

例 7 : 化合物 SG177

中間体 34

【化88】



40

5 - ベンジル 1 - エチル ((E) - 3 - (3, 4 - ジフルオロフェニル) アクリロイル) グリシル - L - バリル - D - グルタメート : 中間体 17 (0.500 g、0.96 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1 / 4、5 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 4 回共蒸発させ、DMF (5 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (0.84 mL、4.79 mmol、5 eq)、(E) - 3 - (3, 4 - ジフルオロフェニル) アクリル酸 (0.21 g、1.15 mmol、1.2 eq)、HOBt (0.155 g、1.15 mmol、1.2 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (0.220 g、1.15 mmol、1.2 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18


50

時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル（60 mL）で希釈し、1 MのHCl溶液（2 × 30 mL）、飽和NaHCO₃溶液（2 × 30 mL）、およびブライン（30 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの固形物としての対象化合物（0.364 g、収率：65%）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆）δ 8.41 (d, 1H), 8.35 (t, 1H), 7.96 (d, 1H), 7.74 - 7.63 (m, 1H), 7.53 - 7.27 (m, 8H), 6.74 (d, 1H), 5.07 (s, 2H), 4.33 - 4.20 (m, 2H), 4.13 - 4.03 (m, 2H), 3.91 (d, 2H), 2.44 (t, 2H), 2.10 - 1.92 (m, 2H), 1.91 - 1.79 (m, 1H), 1.17 (t, 3H), 0.84 (t, 6H).

【0248】

中間体35

【化89】




(R) - 4 - ((S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (3, 4 - ジフルオロフェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 5 - エトキシ - 5 - オキソペンタン酸：無水DCM（5 mL）中の酢酸パラジウム（II）（6 mg、0.027 mmol、0.05 eq）の溶液に、TEA（145 μL、1.04 mmol、1.95 eq）およびトリエチルシラン（171 μL、1.07 mmol、2 eq）を添加した。得られた黒色の溶液を15分間攪拌し、その後、無水DCM（10 mL）中の中間体34（314 mg、0.534 mmol、1 eq）の溶液を添加した。得られた混合物をアルゴン雰囲気下で18時間攪拌し、DCM（25 mL）で希釈し、水（4 × 30 mL）で抽出した。合した水相を1 MのHCl溶液で酸性化し、DCM（2 × 30 mL）で抽出した。合した有機相を水（30 mL）およびブライン（30 mL）で洗浄し、無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物（64 mg、収率：24%）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆）δ 12.18 (s, 1H), 8.43 - 8.32 (m, 2H), 7.95 (d, 1H), 7.75 - 7.64 (m, 1H), 7.52 - 7.38 (m, 2H), 7.36 - 7.24 (m, 1H), 6.74 (d, 1H), 4.30 - 4.21 (m, 2H), 4.13 - 4.02 (m, 2H), 3.91 (d, 2H), 2.28 (t, 2H), 2.02 - 1.89 (m, 2H), 1.85 - 1.73 (m, 1H), 1.17 (t, 3H), 0.87 - 0.79 (m, 6H).

【0249】

化合物36

SG177

【化90】



エチル (R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 15 - ((S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (3, 4 - ジフルオロフェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート：DMF（3 mL）中の中間体35（64 mg、0.13 mmol、1 eq）の氷冷攪拌溶液に、DIPEA（67 μL、0.39 mmol、3 eq）、中間体29（93

mg、0.15 mmol、1.2 eq)、およびCOMU (66 mg、0.15 mmol、1.2 eq) を添加した。得られた混合物をrtで20時間攪拌した。続いて、1 MのHCl溶液 (40 mL) を添加し、その後、混合物をDCMとイソプロパノールとの混合物 (3/1、3×15 mL) で抽出した。合した有機相を飽和NaHCO₃溶液 (3×40 mL) およびブライン (40 mL) で洗浄し、無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (42 mg、収率：34%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 9.98 (s, 1H), 8.48 (t, 1H), 8.42 - 8.31 (m, 2H), 7.94 (d, 1H), 7.87 (t, 1H), 7.78 (d, 2H), 7.73 - 7.62 (m, 1H), 7.53 - 7.22 (m, 5H), 6.74 (d, 1H), 6.47 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.34 - 4.02 (m, 6H), 3.92 (d, 2H), 3.58 - 3.45 (m, 6H), 3.42 - 3.35 (m, 4H), 3.22 - 3.09 (m, 2H), 2.14 (t, 2H), 2.03 - 1.89 (m, 2H), 1.87 - 1.73 (m, 1H), 1.67 - 1.55 (m, 2H), 1.41 - 1.31 (m, 2H), 1.21 - 1.13 (m, 3H), 0.94 - 0.76 (m, 9H). C₄₆H₆₁O₁₁N₁₀F₂ について計算したHRMS m/z : 967.4484 (M+H)⁺、実測値967.4455。


10

【0250】

例8：化合物SG187

中間体37

【化91】



20

5-ベンジル1-エチル (2- (3, 4-ジフルオロフェニル) シクロプロパン-1-カルボニル) グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体17 (0.500 g、0.96 mmol、1 eq) をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物 (1/4、4 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで4回共蒸発させ、DMF (5 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (0.84 mL、4.79 mmol、5 eq)、2- (3, 4-ジフルオロフェニル) シクロプロパン-1-カルボン酸 (0.209 g、1.05 mmol、1.1 eq)、HOBt (0.142 g、1.05 mmol、1.1 eq)、DMAP (触媒量)、およびEDC (0.202 g、1.05 mmol、1.1 eq) を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (60 mL) で希釈し、1 MのHCl溶液 (2×30 mL)、飽和NaHCO₃溶液 (2×30 mL)、およびブライン (30 mL) で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (0.478 g、収率：81%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.45 - 8.36 (m, 2H), 7.84 (dd, 1H), 7.42 - 7.27 (m, 6H), 7.27 - 7.17 (m, 1H), 7.05 - 6.96 (m, 1H), 5.08 (d, 2H), 4.31 - 4.20 (m, 2H), 4.14 - 3.99 (m, 2H), 3.81 (d, 2H), 2.44 (t, 2H), 2.31 - 2.22 (m, 1H), 2.07 - 1.91 (m, 3H), 1.90 - 1.78 (m, 1H), 1.37 - 1.30 (m, 1H), 1.29 - 1.20 (m, 1H), 1.16 (t, 3H), 0.82 (t, 6H)。


30

40

【0251】

中間体38

【化92】



50

(4R)-4-((2S)-2-(2-(2-(3,4-ジフルオロフェニル)シクロプロパン-1-カルボキサミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-5-エトキシ-5-オキソペンタン酸: 無水DCM (5 mL) 中の酢酸パラジウム (II) (34 mg、0.15 mmol、0.2 eq) の溶液に、TEA (208 μ L、1.50 mmol、2 eq) と、無水DCM (10 mL) 中の中間体 37 (461 mg、0.75 mmol、1 eq) の溶液とを添加した。5 分間攪拌した後に、トリエチルシラン (359 μ L、2.25 mmol、3 eq) を滴加し、得られた混合物をアルゴン雰囲気下で 18 時間攪拌した。水 (30 mL) の添加によってクエンチした後に、混合物を濾過し、1 M の HCl 溶液で酸性化し、DCM (3 $\times$ 30 mL) で抽出した。合した有機相を水 (50 mL) およびブライン (50 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、赤色の固形物としての対象化合物 (214 mg、収率: 56%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.19 (s, 1H), 8.53 - 8.34 (m, 2H), 7.83 (dd, 1H), 7.37 - 7.28 (m, 1H), 7.28 - 7.19 (m, 1H), 7.07 - 6.95 (m, 1H), 4.29 - 4.19 (m, 2H), 4.14 - 4.01 (m, 2H), 3.82 (d, 2H), 2.31 - 2.24 (m, 3H), 2.04 - 1.90 (m, 3H), 1.85 - 1.73 (m, 1H), 1.37 - 1.30 (m, 1H), 1.29 - 1.23 (m, 1H), 1.18 (t, 3H), 0.84 (t, 6H).

10


【0252】

化合物 39

SG187

【化93】

20



エチル (15R)-1-(4-((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-15-((2S)-2-(2-(2-(3,4-ジフルオロフェニル)シクロプロパン-1-カルボキサミド)アセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-1,12-ジオキソ-5,8-ジオキサ-2,11-ジアザヘキサデカン-16-オート: DMF (3 mL) 中の中間体 38 (70 mg、0.14 mmol、1 eq) の氷冷攪拌溶液に、DIPEA (71 μ L、0.41 mmol、3 eq)、中間体 29 (82 mg、0.14 mmol、1 eq)、および COMU (64 mg、0.15 mmol、1.1 eq) を添加した。得られた混合物を rt で 20 時間攪拌した。続いて、1 M の HCl 溶液 (40 mL) を添加し、その後、混合物を DCM とイソプロパノールとの混合物 (3/1、2 $\times$ 40 mL) で抽出した。合した有機相を飽和 NaHCO₃ 溶液 (3 $\times$ 40 mL) およびブライン (40 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (62 mg、収率: 47%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 10.00 (s, 1H), 8.49 (q, 1H), 8.40 (t, 2H), 7.92 - 7.74 (m, 4H), 7.43 - 7.27 (m, 3H), 7.27 - 7.17 (m, 1H), 7.05 - 6.95 (m, 1H), 6.48 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.30 - 4.00 (m, 6H), 3.81 (d, 2H), 3.55 - 3.45 (m, 6H), 3.44 - 3.35 (m, 4H), 3.21 - 3.12 (m, 2H), 2.31 - 2.22 (m, 1H), 2.13 (t, 2H), 2.04 - 1.87 (m, 3H), 1.86 - 1.72 (m, 1H), 1.66 - 1.55 (m, 2H), 1.41 - 1.29 (m, 3H), 1.29 - 1.21 (m, 1H), 1.16 (t, 3H), 0.89 (t, 3H), 0.83 (t, 6H). C₄₇H₆₃O₁₁N₁₀F₂ について計算した HRMS m/z: 981.4640 (M+H)⁺、実測値 981.4605.

30

40


【0253】

50

例 9 : 化合物 S G 1 8 8

中間体 4 0

【化 9 4】




1-ベンジル5-エチル (tert-ブトキシカルボニル) -D-グルタメート: DCM (50 mL) 中の boc-D-グルタミン酸 1-ベンジルエステル (3.374 g、10 mmol、1 eq) の溶液に、DMAP (0.122 g、1 mmol、0.1 eq)、無水エタノール (5 mL)、HOBt (2.027 g、15 mmol、1.5 eq)、および EDC (2.876 g、15 mmol、1.5 eq) を添加した。得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を DCM (50 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2 × 50 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 50 mL)、およびブライン (50 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、黄色の油としての対象化合物 (3.605 g、収率: 99%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 7.42 - 7.29 (m, 6H), 5.12 (q, 2H), 4.10 - 3.99 (m, 3H), 2.40 - 2.32 (m, 2H), 2.01 - 1.91 (m, 1H), 1.88 - 1.74 (m, 1H), 1.37 (s, 9H), 1.16 (t, 3H).

【0254】

中間体 4 1

【化 9 5】



1-ベンジル5-エチル (tert-ブトキシカルボニル) -L-バリル-D-グルタメート: 中間体 40 (3.515 g、9.62 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/4、25 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 4 回共蒸発させ、DCM (30 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (8.38 mL、48.1 mmol、5 eq)、中間体 1 (2.507 g、11.54 mmol、1.2 eq)、HOBt (1.559 g、11.54 mmol、1.2 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (2.212 g、11.54 mmol、1.2 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を DCM (30 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2 × 50 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 50 mL)、およびブライン (50 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、黄色の油としての対象化合物 (4.370 g、収率: 98%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.30 (d, 1H), 7.42 - 7.31 (m, 5H), 6.64 (d, 1H), 5.12 (d, 2H), 4.37 - 4.26 (m, 1H), 4.03 (q, 2H), 3.86 - 3.77 (m, 1H), 2.36 (t, 2H), 2.09 - 1.97 (m, 1H), 1.94 - 1.79 (m, 2H), 1.38 (s, 9H), 1.16 (t, 3H), 0.86 - 0.78 (m, 6H).

【0255】

中間体 4 2

10


20

30

40

50

【化 9 6】




1-ベンジル5-エチル(tert-ブトキシカルボニル)グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体41(4.238g、9.12mmol、1eq)をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物(1/4、25mL)に添加し、混合物を室温に温めた。3時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで4回共蒸発させ、DCM(30mL)中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA(7.94mL、45.6mmol、5eq)、中間体2(1.918g、10.95mmol、1.2eq)、HOBt(1.479g、10.95mmol、1.2eq)、DMAP(触媒量)、およびEDC(2.099g、10.95mmol、1.2eq)を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌した。反応混合物をDCM(30mL)で希釈し、1MのHCl溶液(2×50mL)、飽和NaHCO₃溶液(2×50mL)、およびブライン(50mL)で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの固形物としての対象化合物(3.672g、収率：77%)を得た。¹H NMR(400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.49(d, 1H), 7.62(d, 1H), 7.43 - 7.27(m, 5H), 7.04(t, 1H), 5.12(d, 2H), 4.40 - 4.21(m, 2H), 4.03(q, 2H), 3.58(d, 2H), 2.35(t, 2H), 2.08 - 1.97(m, 1H), 1.97 - 1.88(m, 1H), 1.88 - 1.76(m, 1H), 1.38(s, 9H), 1.15(t, 3H), 0.89 - 0.72(m, 6H).

【0256】

中間体43

【化 9 7】




1-ベンジル5-エチル((E)-3-(3-メトキシ-4-((テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル)オキシ)フェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体42(500mg、0.96mmol、1eq)をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物(1/5、5mL)に添加し、混合物を室温に温めた。2時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで4回共蒸発させ、DMF(5mL)中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA(0.835mL、4.80mmol、5eq)、中間体20(294mg、1.06mmol、1.1eq)、HOBt(143mg、1.06mmol、1.1eq)、DMAP(触媒量)、およびEDC(202mg、1.06mmol、1.1eq)を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル(60mL)で希釈し、飽和NH₄Cl溶液(2×30mL)、飽和NaHCO₃溶液(2×30mL)、およびブライン(30mL)で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮した。シリカゲルクロマトグラフィー(4%のMeOH/DCM)を使用して粗化合物を精製して、白色の固形物としての対象化合物(251mg、収率：38%)を得た。¹H NMR(400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.45(d, 1H), 8.25(t, 1H), 7.94(d, 1H), 7.41 - 7.29(m, 6H), 7.21(s, 1H), 7.10(s, 2H), 6.66(d, 1H), 5.46(t, 1H), 5.13(d, 2H), 4.39 - 4.31(m, 1H), 4.30 - 4.23(m, 1H), 4.01(q, 2H), 3.90(d, 2H), 3.

86 - 3.76 (m, 4H), 3.59 - 3.49 (m, 1H), 2.36 (t, 2H), 2.09 - 1.93 (m, 2H), 1.92 - 1.73 (m, 4H), 1.67 - 1.48 (m, 3H), 1.14 (t, 3H), 0.83 (t, 6H).

【0257】

中間体44

【化98】



10

(2R) - 5 - エトキシ - 2 - ((2S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (3 - メトキシ - 4 - ((テトラヒドロ - 2H - ピラン - 2 - イル) オキシ) フェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 5 - オキソペンタン酸: 無水DCM (5 mL) 中の酢酸パラジウム(II) (4 mg, 0.016 mmol, 0.05 eq) の溶液に、TEA (87 μ L, 0.62 mmol, 1.95 eq) およびトリエチルシラン (102 μ L, 0.64 mmol, 2 eq) を添加した。得られた黒色の溶液を15分間攪拌し、その後、無水DCM (7 mL) 中の中間体43 (218 mg, 0.32 mmol, 1 eq) の溶液を添加した。得られた混合物をアルゴン雰囲気下で18時間攪拌し、DCM (20 mL) で希釈し、水 (3 $\times$ 30 mL) で抽出した。合した水相を1MのHCl溶液で酸性化し、DCM (3 $\times$ 30 mL) で抽出した。合した有機相を水 (50 mL) およびブライン (50 mL) で洗浄し、無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (141 mg, 収率: 75%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.68 (s, 1H), 8.29 (d, 1H), 8.24 (t, 1H), 7.90 (d, 1H), 7.37 (d, 1H), 7.21 (s, 1H), 7.10 (s, 2H), 6.65 (d, 1H), 5.46 (t, 1H), 4.30 - 4.19 (m, 2H), 4.02 (q, 2H), 3.89 (d, 2H), 3.82 (s, 3H), 3.80 - 3.74 (m, 1H), 3.57 - 3.49 (m, 1H), 2.33 (t, 2H), 2.06 - 1.93 (m, 2H), 1.92 - 1.71 (m, 4H), 1.69 - 1.48 (m, 3H), 1.15 (t, 3H), 0.84 (t, 6H).


20

【0258】

化合物45

SG188

【化99】



40

エチル(R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 13 - ((S) - 2 - (2 - ((E) - 3 - (4 - ヒドロキシ - 3 - メトキシフェニル) アクリルアミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート: DMF (3 mL) 中の中間体44 (80 mg, 0.14 mmol, 1 eq) の氷冷攪拌溶液に、DIPEA (71 μ L, 0.41 mmol, 3 eq)、中間体29 (82 mg, 0.14 mmol, 1 eq)、およびCOMU (64 mg, 0.15 mmol, 1.1 eq) を添加した。得られた混合物をrtで20時間攪拌した。続いて、1MのHCl溶液 (40 mL) を添加し、混合物をrtで15分間攪拌し、その後、これ


50

をDCMとイソプロパノールとの混合物（3／1、3×30mL）で抽出した。合した有機相を飽和NaHCO₃溶液（3×40mL）およびブライン（40mL）で洗浄し、無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮した。シリカゲルクロマトグラフィー（10％のMeOH／DCM）を使用して粗化合物を精製して、白色の固形物としての対象化合物（72mg、収率：54％）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆）δ 9.98 (s, 1H), 9.44 (s, 1H), 8.48 (t, 1H), 8.28 (d, 1H), 8.20 - 8.12 (m, 1H), 7.97 (d, 1H), 7.91 (t, 1H), 7.78 (d, 2H), 7.37 - 7.28 (m, 3H), 7.14 (d, 1H), 7.00 (dd, 1H), 6.79 (d, 1H), 6.55 (d, 1H), 6.47 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.27 - 4.10 (m, 4H), 4.01 (q, 2H), 3.88 (d, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.53 - 3.44 (m, 6H), 3.42 - 3.35 (m, 4H), 3.27 - 3.08 (m, 2H), 2.31 - 2.23 (m, 2H), 2.00 - 1.87 (m, 2H), 1.81 - 1.68 (m, 1H), 1.65 - 1.55 (m, 2H), 1.42 - 1.30 (m, 2H), 1.14 (t, 3H), 0.93 - 0.81 (m, 9H). C₄₇H₆₅O₁₃N₁₀について計算したHRMS m/z: 977.4727 (M+H)⁺、実測値977.4691。【0259】

例10：化合物SG189

中間体46


【化100】



1-ベンジル5-エチルシンナモイルグリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体42（500mg、0.96mmol、1eq）をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物（1／5、5mL）に添加し、混合物を室温に温めた。2時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで4回共蒸発させ、DMF（5mL）中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA（0.835mL、4.80mmol、5eq）、trans-ケイ皮酸（170mg、1.15mmol、1.2eq）、HOBt（155mg、1.15mmol、1.2eq）、DMAP（触媒量）、およびEDC（220mg、1.15mmol、1.2eq）を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル（60mL）で希釈し、1MのHCl溶液（2×30mL）、飽和NaHCO₃溶液（2×30mL）、およびブライン（30mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物（313mg、収率：59％）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆）δ 8.45 (d, 1H), 8.38 (t, 1H), 7.97 (d, 1H), 7.60 - 7.54 (m, 2H), 7.48 - 7.28 (m, 9H), 6.76 (d, 1H), 5.14 (d, 2H), 4.39 - 4.31 (m, 1H), 4.31 - 4.24 (m, 1H), 4.01 (q, 2H), 3.91 (d, 2H), 2.35 (t, 2H), 2.08 - 1.93 (m, 2H), 1.92 - 1.78 (m, 1H), 1.13 (t, 3H), 0.84 (t, 6H). 【0260】

中間体47

【化101】



(R)-2-((S)-2-(2-シンナムアミドアセトアミド)-3-メチルブタンアミド)-5-エトキシ-5-オキソペンタン酸：無水DCM（5mL）中の酢酸パラジウム(II)（6mg、0.028mmol、0.05eq）の溶液に、TEA（150

μL 、 1.08 mmol 、 1.95 eq) およびトリエチルシラン ($177\text{ }\mu\text{L}$ 、 1.11 mmol 、 2 eq) を添加した。得られた黒色の溶液を15分間攪拌し、その後、無水DCM (7 mL) 中の中間体46 (306 mg 、 0.555 mmol 、 1 eq) の溶液を添加した。得られた混合物をアルゴン雰囲気下で18時間攪拌し、DCM (20 mL) で希釈し、水 ($3\times 30\text{ mL}$) で抽出した。合した水相を1MのHCl溶液で酸性化し、DCM ($2\times 30\text{ mL}$) で抽出した。合した有機相を水 (30 mL) およびブライン (30 mL) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (99 mg 、収率： 39%) を得た。 $^1\text{H NMR}$ (400 MHz , $\text{DMSO}-d_6$) δ 12.67 (s, 1H), 8.37 (d, 1H), 8.28 (t, 1H), 7.93 (d, 1H), 7.57 (d, 2H), 7.47 - 7.33 (m, 4H), 6.75 (d, 1H), 4.32 - 4.17 (m, 2H), 4.08 - 3.97 (m, 2H), 3.91 (d, 2H), 2.33 (t, 2H), 2.06 - 1.90 (m, 2H), 1.88 - 1.74 (m, 1H), 1.15 (t, 3H), 0.88 - 0.79 (m, 6H).


10

【0261】

化合物48

SG189

【化102】



20

エチル (R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 13 - ((S) - 2 - (2 - シンナムアミドアセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート: DMF (3 mL) 中の中間体47 (63 mg 、 0.14 mmol 、 1 eq) の氷冷攪拌溶液に、DIPEA ($71\text{ }\mu\text{L}$ 、 0.41 mmol 、 3 eq)、中間体29 (82 mg 、 0.14 mmol 、 1 eq)、およびCOMU (64 mg 、 0.15 mmol 、 1.1 eq) を添加した。得られた混合物をrtで20時間攪拌した。続いて、1MのHCl溶液 (40 mL) を添加し、その後、混合物をDCMとイソプロパノールとの混合物 ($3/1$ 、 $2\times 20\text{ mL}$) で抽出した。合した有機相を飽和 NaHCO_3 溶液 ($2\times 40\text{ mL}$) およびブライン (40 mL) で洗浄し、無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (44 mg 、収率： 32%) を得た。 $^1\text{H NMR}$ (400 MHz , $\text{DMSO}-d_6$) δ 10.00 (s, 1H), 8.53 - 8.42 (m, 1H), 8.38 - 8.24 (m, 2H), 7.96 - 7.86 (m, 2H), 7.78 (d, 2H), 7.60 - 7.53 (m, 2H), 7.46 - 7.36 (m, 4H), 7.34 (d, 2H), 6.73 (d, 1H), 6.48 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.28 - 4.19 (m, 1H), 4.17 - 4.09 (m, 3H), 4.07 - 3.97 (m, 2H), 3.91 (d, 2H), 3.54 - 3.44 (m, 6H), 3.42 - 3.35 (m, 4H), 3.28 - 3.10 (m, 2H), 2.32 - 2.24 (m, 2H), 2.01 - 1.87 (m, 2H), 1.81 - 1.67 (m, 1H), 1.66 - 1.54 (m, 2H), 1.42 - 1.29 (m, 2H), 1.15 (t, 3H), 0.94 - 0.79 (m, 9H). $\text{C}_{46}\text{H}_{63}\text{O}_{11}\text{N}_{10}$ について計算したHRMS m/z : 931.4683 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$ 、実測値 931.4700 。

30

40


【0262】

例11: 化合物SG190

中間体49

50

【化 1 0 3】




1-ベンジル 5-エチル (2- (3, 4-ジフルオロフェニル) シクロプロパン-1-カルボニル) グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体 42 (500 mg、0.96 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/4、4 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。2 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 4 回共蒸発させ、DMF (5 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (0.84 mL、4.79 mmol、5 eq)、2- (3, 4-ジフルオロフェニル) シクロプロパン-1-カルボン酸 (209 mg、1.05 mmol、1.1 eq)、HOBt (142 mg、1.05 mmol、1.1 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (202 mg、1.05 mmol、1.1 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (60 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2×30 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2×30 mL)、およびブライン (30 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (432 mg、収率：75%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.48 - 8.43 (m, 1H), 8.40 (t, 1H), 7.91 - 7.81 (m, 1H), 7.42 - 7.29 (m, 6H), 7.27 - 7.18 (m, 1H), 7.04 - 6.96 (m, 1H), 5.11 (d, 2H), 4.39 - 4.31 (m, 1H), 4.30 - 4.22 (m, 1H), 4.08 - 3.99 (m, 2H), 3.82 (d, 2H), 2.36 (t, 2H), 2.31 - 2.25 (m, 1H), 2.07 - 1.92 (m, 3H), 1.90 - 1.78 (m, 1H), 1.39 - 1.31 (m, 1H), 1.30 - 1.22 (m, 1H), 1.19 - 1.12 (m, 3H), 0.88 - 0.76 (m, 6H).

【0 2 6 3】

中間体 50

【化 1 0 4】




(2R)-2- ((2S)-2- (2- (2- (3, 4-ジフルオロフェニル) シクロプロパン-1-カルボキサミド) アセトアミド) -3-メチルブタンアミド) -5-エトキシ-5-オキソペンタン酸：無水 DCM (5 mL) 中の酢酸パラジウム (II) (30 mg、0.13 mmol、0.2 eq) の溶液に、TEA (186 μL、1.34 mmol、2 eq) と、無水 DCM (10 mL) 中の中間体 49 (411 mg、0.67 mmol、1 eq) の溶液とを添加した。5 分間攪拌した後に、トリエチルシラン (320 μL、2.00 mmol、3 eq) を滴加し、得られた混合物をアルゴン雰囲気下で 18 時間攪拌した。水 (30 mL) の添加によってクエンチした後に、混合物を濾過し、1 M の HCl 溶液で酸性化し、DCM (3×30 mL) で抽出した。合した有機相を水 (50 mL) およびブライン (50 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、茶色の固形物としての対象化合物 (209 mg、収率：61%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 8.49 - 8.38 (m, 1H), 8.20 (t, 1H), 7.90 - 7.81 (m, 1H), 7.38 - 7.28 (m, 1H), 7.28 - 7.18 (m, 1H), 7.05 - 6.97 (m, 1H), 4.31 - 4.22 (m, 1H), 4.22 - 4.13 (m, 1H), 4.09 - 3.97 (m, 2H), 3.81 (d, 2H), 2.38 - 2.24 (m, 3H), 2.06 - 1.91 (m, 3H), 1.88 - 1.72 (m, 1H), 1.38 - 1.31 (m, 1H), 1.29 - 1.21 (m, 1H), 1.20 - 1.13 (m, 3H), 0.83 (t, 6H).

【 0 2 6 4 】

化合物 5 1

S G 1 9 0

【 化 1 0 5 】



10

エチル (13R) - 1 - (4 - ((6 - アミノ - 2 - ブトキシ - 8 - ヒドロキシ - 9 H - プリン - 9 - イル) メチル) フェニル) - 13 - ((2S) - 2 - (2 - (2 - (3, 4 - ジフルオロフェニル) シクロプロパン - 1 - カルボキサミド) アセトアミド) - 3 - メチルブタンアミド) - 1, 12 - ジオキソ - 5, 8 - ジオキサ - 2, 11 - ジアザヘキサデカン - 16 - オエート : DMF (3 mL) 中の中間体 50 (70 mg、0.14 mmol、1 eq) の氷冷攪拌溶液に、DIPEA (71 μ L、0.41 mmol、3 eq)、中間体 29 (82 mg、0.14 mmol、1 eq)、および COMU (64 mg、0.15 mmol、1.1 eq) を添加した。得られた混合物を rt で 20 時間攪拌した。続いて、1 M の HCl 溶液 (40 mL) を添加し、その後、混合物を DCM とイソプロパノールとの混合物 (3 / 1、2 $\times$ 30 mL) で抽出した。合した有機相を飽和 NaHCO₃ 溶液 (3 $\times$ 30 mL) およびブライン (30 mL) で洗浄し、無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (22 mg、収率 : 16%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 10.07 (s, 1H), 8.49 (t, 1H), 8.44 - 8.34 (m, 2H), 7.99 - 7.87 (m, 2H), 7.78 (d, 2H), 7.38 - 7.28 (m, 3H), 7.28 - 7.17 (m, 1H), 7.07 - 6.93 (m, 1H), 6.51 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.31 - 4.20 (m, 2H), 4.20 - 4.08 (m, 2H), 4.08 - 3.95 (m, 2H), 3.81 (d, 2H), 3.55 - 3.44 (m, 6H), 3.43 - 3.36 (m, 4H), 3.25 - 3.10 (m, 2H), 2.32 - 2.21 (m, 3H), 2.06 - 1.86 (m, 3H), 1.85 - 1.70 (m, 1H), 1.65 - 1.55 (m, 2H), 1.41 - 1.30 (m, 3H), 1.30 - 1.21 (m, 1H), 1.21 - 1.09 (m, 3H), 0.93 - 0.74 (m, 9H). C₄₇H₆₃O₁₁N₁₀F₂ について計算した HRMS m/z : 981.4640 (M+H)⁺、実測値 981.4608。

20


30

【 0 2 6 5 】

例 12 : 化合物 S G 1 9 6

中間体 5 2

【 化 1 0 6 】



40

(E) - 3 - (4 - ((tert - ブトキシカルボニル) アミノ) フェニル) アクリル酸 : 水 (4 mL) および 1 M の NaOH (6.5 mL) 中の 4 - アミノケイ皮酸 (998 mg、5.0 mmol) の氷冷攪拌溶液に、ジオキサン (20 mL) 中のジ - tert - ブチルジカーボネート (1.419 g、6.5 mmol) の溶液を添加した。混合物を室温に温め、攪拌を一晩続けた。ジオキサンを真空において蒸発させ、その後、混合物をジエチルエーテル (10 mL) で洗浄した。水相を 1 M の HCl 溶液で pH = 1 に酸性化し、EtOAc (3 $\times$ 20 mL) で抽出した。合した有機相を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ


50

、真空において濃縮して、橙色の固形物としての対象化合物（1.062 g、81%）を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.17 (s, 1H), 9.59 (s, 1H), 7.62 - 7.55 (m, 2H), 7.53 - 7.46 (m, 3H), 6.38 (d, 1H), 1.48 (s, 9H).

【0266】

中間体53

【化107】



10


ジエチル（（E）-3-（4-（tert-ブトキシカルボニル）アミノ）フェニル）アクリロイル）グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体5（276 mg、0.60 mmol、1 eq）をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物（1/5、4 mL）に添加し、混合物を室温に温めた。3時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで3回共蒸発させ、DMF（3 mL）中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA（0.52 mL、3.0 mmol、5 eq）、中間体52（174 mg、0.66 mmol、1.1 eq）、HOBt（89 mg、0.66 mmol、1.1 eq）、DMAP（触媒量）、およびEDC（127 mg、0.66 mmol、1.1 eq）を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル（40 mL）で希釈し、1 MのHCl溶液（2×20 mL）、飽和NaHCO₃溶液（2×20 mL）、およびブライン（20 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、橙色の固形物としての対象化合物（179 mg、収率：49%）を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップで使用した。

20

【0267】

中間体54

【化108】



30


ジエチル（（E）-3-（4-アミノフェニル）アクリロイル）グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体53（179 mg、0.30 mmol）をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物（1/5、4 mL）に添加し、混合物を室温に温めた。3時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をEtOAc（50 mL）中に溶解させ、飽和NaHCO₃溶液（3×30 mL）およびブライン（30 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、橙色の固形物としての対象化合物（135 mg、91%）を得た。¹H NMR (400 MHz, MeOD) δ 7.46 (d, 1H), 7.34 (d, 2H), 6.70 (d, 2H), 6.42 (d, 1H), 4.48 - 4.42 (m, 1H), 4.31 (d, 1H), 4.23 - 4.14 (m, 2H), 4.14 - 3.92 (m, 4H), 2.43 (t, 2H), 2.27 - 2.13 (m, 2H), 2.08 - 1.95 (m, 1H), 1.28 (t, 3H), 1.22 (t, 3H), 0.99 (t, 6H).

40

【0268】

中間体55

【化109】



50

10

中間体 5 6

CCOC(=O)CCC(=O)O

20

中間体 57

CCOC(=O)CC(=O)NCCOCCOCCOCCOCC(=O)NCC(=O)OC(C)(C)C

30

40

中間体 58


NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCC(=O)OCC

エチル 1-アミノ-15-オキソ-4, 7, 10-トリオキサ-14-アザオクタデカン-18-オエート：中間体 57 (4.41 g、9.83 mmol) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1 / 5、25 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。4 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 3 回共蒸発させて、黄色の油としての対象化合物 (4.55 g、収率：100%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 7.86 (t, 1H), 7.70 (s, 2H), 4.03 (q, 2H), 3.55 - 3.43 (m, 10H), 3.38 (t, 2H), 3.07 (q, 2H), 2.91 - 2.80 (m, 2H), 2.55 - 2.45 (m, 2H), 2.37 - 2.28 (m, 2H), 1.77 (p, 2H), 1.60 (p, 2H), 1.17 (t, 3H).

【0272】

中間体 59

【化113】




エチル 1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-オエート：化合物 10 (0.427 g、1.20 mmol、1 eq) を DMSO (20 mL) 中に溶解させた。中間体 58 (1.658 g、3.59 mmol、3 eq) および DIPEA (2.08 mL、11.95 mmol、10 eq) を DCM (1 mL) 中に溶解させ、DMSO 中の化合物 10 の攪拌溶液に添加した。反応混合物を氷で冷却した後に、COMU (1.279 g、2.99 mmol、2.5 eq) を添加し、混合物を rt で 20 時間攪拌した。酢酸エチル (100 mL) および 1 M の NaHCO₃ 溶液 (75 mL) を添加した。混合物を真空において濃縮した後に、これを氷で 1 時間冷却した。沈殿物を濾過し、水およびジエチルエーテルで洗浄して、対象化合物 (271 mg、収率：33%) を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップで利用した。

【0273】

中間体 60

【化114】



1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアザイコサン-20-オイック酸：メタノール (20 mL) 中の中間体 59 (271 mg、0.39 mmol) の攪拌溶液に、1 M の水性 NaOH (4 mL) を添加した。混合物を rt で 3 時間攪拌した。水 (6 mL) を添加し、1 M の HCl 溶液を使用して混合物を酸性化した。メタノールを真空において蒸発させ、得られた懸濁液を氷で 1 時間冷却した。得られた沈殿物を濾過し、水およびジエチルエーテルで洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (207 mg、収率 80%) を得た。¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ 12.04 (s, 1H), 9.99 (s, 1H), 8.39 (t, 1H), 7.84 - 7.71 (m, 3H), 7.34 (d, 2H), 6.47 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.13 (t, 2H), 3.55 - 3.40 (m, 1


0H), 3.39 - 3.25 (m, 4H), 3.06 (q, 2H), 2.40 (t, 2H), 2.28 (t, 2H), 1.80 - 1.68 (m, 2H), 1.66 - 1.53 (m, 4H), 1.43 - 1.28 (m, 2H), 0.89 (t, 3H).

【0274】

化合物61

SG196

【化115】



10

ジエチル ((E)-3-(4-(1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-1,17-ジオキソ-6,9,12-トリオキサ-2,16-ジアサイコサン-20-アミド)フェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタメート:DMF(2mL)中の中間体60(33mg、0.05mmol、1eq)の氷冷攪拌溶液に、DIPEA(26μL、0.15mmol、3eq)、中間体54(28mg、0.055mmol、1.1eq)およびCOMU(24mg、0.055mmol、1.1eq)を添加した。得られた混合物をrtで40時間攪拌し、その後、これをDCMとイソプロパノールとの混合物(3/1、30mL)で希釈し、1MのHCl溶液(2×15mL)、飽和NaHCO₃溶液(2×15mL)、およびブライン(15mL)で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで2回洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物(25mg、収率:44%)を得た。¹H NMR(400 MHz, DMSO-d₆) δ 9.99 (s, 1H), 8.45 - 8.37 (m, 2H), 8.33 (t, 1H), 7.92 (d, 1H), 7.87 (t, 1H), 7.82 - 7.73 (m, 3H), 7.63 (d, 2H), 7.50 (d, 2H), 7.39 - 7.31 (m, 3H), 6.62 (d, 1H), 6.48 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.30 - 4.21 (m, 2H), 4.13 (t, 2H), 4.10 - 3.98 (m, 4H), 3.89 (d, 2H), 3.54 - 3.25 (m, 14H), 3.07 (t, 2H), 2.43 - 2.29 (m, 6H), 2.04 - 1.93 (m, 2H), 1.88 - 1.79 (m, 1H), 1.79 - 1.68 (m, 2H), 1.66 - 1.55 (m, 4H), 1.43 - 1.29 (m, 2H), 1.21 - 1.12 (m, 6H), 0.93 - 0.80 (m, 9H).

20


30

【0275】

例13:化合物SG197

中間体62

【化116】



40

ジシクロペンチル (tert-ブトキシカルボニル)-D-グルタメート:DCM(15mL)中のN-Boc-D-グルタミン酸(495mg、2.0mmol、1eq)の氷冷攪拌溶液に、シクロペンタノール(0.727mL、8mmol、8eq)、EDC(844mg、4.4mmol、4.4eq)、およびDMAP(65mg、0.53mmol、0.53eq)を添加した。混合物を室温に温め、攪拌を一晩続けた。溶媒を真空において蒸発させた。残留物をEtOAc(25mL)中に溶解させ、1MのHCl溶液(2×25mL)、飽和NaHCO₃溶液(2×25mL)、およびブライン(25m


50

L) で洗浄した。有機層を無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮して、無色の油としての対象化合物 (625 mg、82%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 5.25 - 5.13 (m, 2H), 5.09 (d, 1H), 4.29 - 4.20 (m, 1H), 2.44 - 2.25 (m, 2H), 2.20 - 2.06 (m, 1H), 1.95 - 1.82 (m, 5H), 1.79 - 1.64 (m, 8H), 1.64 - 1.53 (m, 4H), 1.44 (s, 9H).

【0276】

中間体 63

【化117】



10

ジシクロペンチル (tert-ブトキシカルボニル) - L-バリル - D-グルタメート : 中間体 62 (591 mg、1.54 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/3、5 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 4 回共蒸発させ、DMF (4 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (1.34 mL、7.7 mmol、5 eq)、中間体 1 (368 mg、1.70 mmol、1.1 eq)、HOBt (230 mg、1.70 mmol、1.1 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (326 mg、1.70 mmol、1.1 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (60 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2 × 30 mL)、飽和 NaHCO_3 溶液 (2 × 30 mL)、およびブライン (30 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮して、黄色の油としての対象化合物 (494 mg、収率: 67%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 6.69 (d, 1H), 5.25 - 5.11 (m, 2H), 5.00 (s, 1H), 4.58 - 4.49 (m, 1H), 3.99 (s, 1H), 2.43 - 2.25 (m, 2H), 2.23 - 2.10 (m, 2H), 2.02 - 1.89 (m, 1H), 1.88 - 1.78 (m, 4H), 1.75 - 1.64 (m, 8H), 1.63 - 1.54 (m, 4H), 1.45 (s, 9H), 0.97 (d, 3H), 0.91 (d, 3H).


20

30

【0277】

中間体 64

【化118】



40

ジシクロペンチル (tert-ブトキシカルボニル) グリシル - L-バリル - D-グルタメート : 中間体 63 (462 mg、0.96 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/3、5 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 4 回共蒸発させ、DMF (4 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (0.84 mL、4.8 mmol、5 eq)、中間体 2 (184 mg、1.05 mmol、1.1 eq)、HOBt (142 mg、1.05 mmol、1.1 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (201 mg、1.05 mmol、1.1 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (50 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2 × 25 mL)、飽和 NaHCO_3 溶液 (2 × 25 mL)、およびブライン (25 mL) で洗浄し


50

た。有機層を無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (330 mg、収率：64%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 6.99 (d, 1H), 6.61 (d, 1H), 5.27 - 5.09 (m, 3H), 4.46 (td, 1H), 4.36 (dd, 1H), 3.90 (dd, 1H), 3.79 (dd, 1H), 2.35 (q 2H), 2.31 - 2.22 (m, 1H), 2.20 - 2.07 (m, 1H), 2.06 - 1.92 (m, 1H), 1.90 - 1.79 (m, 4H), 1.77 - 1.54 (m, 12H), 1.46 (s, 9H), 0.97 (d, 3H), 0.93 (d, 3H).

【0278】

中間体 65

【化119】




ジシクロペンチル ((E)-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体 64 (108 mg、0.20 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/3、4 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 4 回共蒸発させ、DMF (3 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (0.174 mL、1.0 mmol、5 eq)、trans-フェルラ酸 (43 mg、0.22 mmol、1.1 eq)、HOBt (30 mg、0.22 mmol、1.1 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (42 mg、0.22 mmol、1.1 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (30 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2 × 15 mL)、飽和 NaHCO_3 溶液 (2 × 15 mL)、およびブライン (15 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (93 mg、収率：76%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.56 (d, 1H), 7.24 (d, 1H), 7.09 - 6.97 (m, 3H), 6.92 - 6.81 (m, 2H), 6.37 (d, 1H), 6.00 (s, 1H), 5.21 - 5.07 (m, 2H), 4.55 - 4.47 (m, 1H), 4.46 - 4.40 (m, 1H), 4.23 - 4.06 (m, 2H), 3.91 (s, 3H), 2.41 - 2.29 (m, 2H), 2.26 - 2.08 (m, 2H), 2.06 - 1.93 (m, 1H), 1.87 - 1.76 (m, 4H), 1.74 - 1.51 (m, 12H), 1.00 - 0.88 (m, 6H).

【0279】

化合物 66

SG197

【化120】



ジシクロペンチル ((E)-3-(4-((1-(4-(6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-1,17-ジオキソ

－6，9，12－トリオキサ－2，16－ジアザイコサン－20－オイル）オキシ）－3－メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル－L－バリル－D－グルタメート：DMF（2 mL）中の中間体60（19 mg、0.029 mmol、1.2 eq）の氷冷攪拌溶液に、DIPEA（13 μ L、0.073 mmol、3 eq）、中間体65（15 mg、0.024 mmol、1 eq）、およびCOMU（13 mg、0.029 mmol、1.2 eq）を添加した。得られた混合物をrtで18時間攪拌し、その後、これをDCMとイソプロパノールとの混合物（3／1、30 mL）で希釈し、1 MのHCl溶液（2×15 mL）、飽和NaHCO₃溶液（2×15 mL）、およびブライン（15 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで2回洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物（9 mg、収率：29％）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆） δ 9.98 (s, 1H), 8.42 - 8.36 (m, 1H), 8.31 (t, 1H), 7.96 (d, 1H), 7.86 (t, 1H), 7.81 - 7.73 (m, 3H), 7.51 (d, 1H), 7.48 - 7.38 (m, 3H), 7.34 (d, 2H), 6.84 (d, 1H), 6.47 (s, 2H), 5.10 - 5.00 (m, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.30 - 4.16 (m, 2H), 4.13 (t, 2H), 3.96 (s, 3H), 3.92 (d, 2H), 3.52 - 3.37 (m, 10H), 3.32 - 3.22 (m, 4H), 3.15 - 3.03 (m, 2H), 2.48 - 2.39 (m, 2H), 2.39 - 2.25 (m, 4H), 2.01 - 1.88 (m, 2H), 1.86 - 1.68 (m, 7H), 1.66 - 1.48 (m, 16H), 1.45 - 1.30 (m, 2H), 0.93 - 0.82 (m, 9H).

10


【0280】

例14：化合物SG198

20

中間体67

【化121】



ジエチル（tert-ブトキシカルボニル）－L－アラニル－D－グルタメート：酢酸エチル（50 mL）中のBoc-L-アラニン（1.457 g、7.7 mmol、1.1 eq）の氷冷攪拌溶液に、HOBt（1.040 g、7.7 mmol、1.1 eq）およびDCC（1.589 g、7.7 mmol、1.1 eq）を添加した。30分間攪拌した後に、中間体3（1.678 g、7 mmol、1 eq）、DIPEA（3.05 mL、17.5 mmol、2.5 eq）、およびDMAP（触媒量）を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌し、その後、ヘキサン（20 mL）を添加した。混合物を濾過し、1 MのHCl溶液（2×50 mL）、飽和NaHCO₃溶液（2×50 mL）、およびブライン（50 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの結晶性固形物としての対象化合物（2.149 g、収率：82％）を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップで使用した。


30

【0281】

中間体68

40

【化122】



ジエチル（tert-ブトキシカルボニル）グリシル－L－アラニル－D－グルタメート：中間体67（1.872 g、5.0 mmol）をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物（1／5、20 mL）に添加し、混合物を室温に温めた。3時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで3回共蒸発させた。同時に、HOBt（0.743 g、5.5 mmol、1.1 eq）、DCC（1.135 g、5.5 mmol、1

50


． 1 e q)、および DMAP (触媒量) を、酢酸エチル (30 mL) 中の中間体 2 (0.963 g、5.5 mmol、1.1 eq) の氷冷攪拌溶液に添加した。30 分後に、酢酸エチル (20 mL) および DIPEA (4.35 mL、25.0 mmol、5 eq) 中の脱保護された中間体 67 の溶液を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。ヘキサン (20 mL) を添加し、その後、混合物を濾過し、1 M の HCl 溶液 (2 × 50 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 50 mL)、およびブライン (50 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの結晶性固形物としての対象化合物 (1.93 g、収率：90%) を得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.16 (d, 1H), 6.73 (d, 1H), 5.29 (s, 1H), 4.60 - 4.49 (m, 2H), 4.21 - 4.10 (m, 4H), 3.90 - 3.74 (m, 2H), 2.46 - 2.33 (m, 2H), 2.23 - 2.15 (m, 1H), 2.06 - 1.96 (m, 1H), 1.45 (s, 9H), 1.40 (d, 3H), 1.28 - 1.23 (m, 6H).

10

【0282】

中間体 69

【化123】



20

ジエチル ((E)-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリロイル)-グリシル-L-アラニル-D-グルタメート：中間体 68 (129 mg、0.3 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/5、4 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 3 回共蒸発させ、DMF (3 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (0.261 mL、1.5 mmol、5 eq)、trans-フェルラ酸 (64 mg、0.33 mmol、1.1 eq)、HOBT (45 mg、0.33 mmol、1.1 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (63 mg、0.33 mmol、1.1 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (30 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2 × 15 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 15 mL)、およびブライン (15 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (66 mg、収率：43%) を得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.54 (d, 1H), 7.18 (d, 1H), 7.06 (dd, 1H), 7.01 (d, 1H), 6.92 - 6.88 (m, 2H), 6.61 (t, 1H), 6.33 (d, 1H), 5.91 (s, 1H), 4.62 - 4.51 (m, 1H), 4.22 - 4.00 (m, 6H), 3.91 (s, 3H), 2.45 - 2.33 (m, 2H), 2.25 - 2.17 (m, 1H), 2.08 - 1.99 (m, 1H), 1.42 (d, 3H), 1.28 - 1.21 (m, 6H).


30

【0283】

化合物 70

SG198

【化124】



50

ジエチル（（E）-3-（4-（（1-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）フェニル）-1,17-ジオキソ-6,9,12-トリオキサ-2,16-ジアザイコサン-20-オイル）オキシ）-3-メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル-L-アラニル-D-グルタメート：DMF（2 mL）中の中間体60（42 mg、0.064 mmol、1.2 eq）の氷冷攪拌溶液に、DIPEA（28 μ L、0.16 mmol、3 eq）、中間体69（27 mg、0.053 mmol、1 eq）、およびCOMU（27 mg、0.064 mmol、1.2 eq）を添加した。得られた混合物をrtで18時間攪拌し、その後、これをDCMとイソプロパノールとの混合物（3/1、30 mL）で希釈し、1 MのHCl溶液（2×15 mL）、飽和NaHCO₃溶液（2×15 mL）、およびブライン（15 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで2回洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物（32 mg、収率：52%）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆） δ 10.01 (s, 1H), 8.46 - 8.31 (m, 2H), 8.28 - 8.19 (m, 1H), 7.96 - 7.87 (m, 1H), 7.80 - 7.73 (m, 3H), 7.47 - 7.39 (m, 2H), 7.34 (d, 2H), 7.17 (dd, 1H), 7.09 (d, 1H), 6.75 (d, 1H), 6.48 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.39 - 4.29 (m, 1H), 4.29 - 4.22 (m, 1H), 4.16 - 3.97 (m, 6H), 3.85 (d, 2H), 3.81 (s, 3H), 3.55 - 3.40 (m, 10H), 3.32 - 3.23 (m, 4H), 3.15 - 3.03 (m, 2H), 2.48 - 2.41 (m, 2H), 2.37 - 2.30 (m, 4H), 2.07 - 1.97 (m, 1H), 1.94 - 1.81 (m, 1H), 1.77 - 1.69 (m, 2H), 1.66 - 1.57 (m, 4H), 1.42 - 1.30 (m, 2H), 1.24 (d, 3H), 1.21 - 1.11 (m, 6H), 0.95 - 0.84 (m, 3H).

10


20

【0284】

例15：化合物SG199

中間体71

【化125】



30

ジエチル（tert-ブトキシカルボニル）-L-フェニルアラニル-D-グルタメート：酢酸エチル（50 mL）中のBoc-L-フェニルアラニン（2.043 g、7.7 mmol、1.1 eq）の氷冷攪拌溶液に、HOBT（1.040 g、7.7 mmol、1.1 eq）およびDCC（1.589 g、7.7 mmol、1.1 eq）を添加した。30分間攪拌した後に、中間体3（1.678 g、7 mmol、1 eq）、DIPEA（3.05 mL、17.5 mmol、2.5 eq）、およびDMAP（触媒量）を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌し、その後、ヘキサン（20 mL）を添加した。混合物を濾過し、1 MのHCl溶液（2×50 mL）、飽和NaHCO₃溶液（2×50 mL）、およびブライン（50 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの結晶性固形物としての対象化合物（2.397 g、収率：76%）を得て、これを任意の更なる精製なしで次のステップで使用した。


40

【0285】

中間体72

50

【化 1 2 6】




ジエチル (tert-ブトキシカルボニル) グリシル-L-フェニルアラニル-D-グルタメート：中間体 71 (2.253 g、5.0 mmol) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/5、20 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 3 回共蒸発させた。同時に、HOBt (0.743 g、5.5 mmol、1.1 eq)、DCC (1.135 g、5.5 mmol、1.1 eq)、および DMAP (触媒量) を、酢酸エチル (30 mL) 中の中間体 2 (0.963 g、5.5 mmol、1.1 eq) の氷冷攪拌溶液に添加した。30 分後に、酢酸エチル (20 mL) および DIPEA (4.35 mL、25.0 mmol、5 eq) 中の脱保護された中間体 71 の溶液を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。ヘキサン (20 mL) を添加し、その後、混合物を濾過し、1 M の HCl 溶液 (2 × 50 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 50 mL)、およびブライン (50 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (1.93 g、収率：76%) を得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.31 - 7.20 (m, 5H), 6.76 (d, 1H), 6.61 (d, 1H), 5.14 (s, 1H), 4.76 - 4.70 (m, 1H), 4.48 - 4.43 (m, 1H), 4.19 - 4.08 (m, 4H), 3.85 - 3.73 (m, 2H), 3.16 - 3.02 (m, 2H), 2.20 - 2.16 (m, 2H), 2.07 - 1.99 (m, 1H), 1.91 - 1.82 (m, 1H), 1.43 (s, 9H), 1.28 - 1.23 (m, 6H).

【0 2 8 6】

中間体 73

【化 1 2 7】



ジエチル ((E)-3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)アクリロイル)-グリシル-L-フェニルアラニル-D-グルタメート：中間体 72 (152 mg、0.3 mmol、1 eq) を TFA と DCM との氷冷攪拌混合物 (1/5、4 mL) に添加し、混合物を室温に温めた。3 時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで 3 回共蒸発させ、DMF (3 mL) 中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後に、DIPEA (0.261 mL、1.5 mmol、5 eq)、trans-フェルラ酸 (64 mg、0.33 mmol、1.1 eq)、HOBt (45 mg、0.33 mmol、1.1 eq)、DMAP (触媒量)、および EDC (63 mg、0.33 mmol、1.1 eq) を添加し、得られた混合物を rt で 18 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (30 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2 × 15 mL)、飽和 NaHCO₃ 溶液 (2 × 15 mL)、およびブライン (15 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na₂SO₄ で乾燥させ、真空において濃縮して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (84 mg、収率：48%) を得た。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.66 - 7.46 (m, 3H), 7.23 - 6.92 (m, 8H), 6.85 (d, 1H), 6.36 (d, 1H), 4.92 - 4.86 (m, 1H), 4.52 - 4.47 (m, 1H), 4.13 - 4.03 (m, 6H), 3.83 (s, 3H), 3.14 - 3.02 (m, 2H), 2.14 - 2.09 (m, 2H), 2.06 - 1.98 (m, 1H), 1.93 - 1.83 (m, 1H), 1.22 - 1.18 (m, 6H).

【0 2 8 7】

10


20

30

40

50

化合物 74
SG199
【化128】



10

ジエチル（（E）-3-（4-（（1-（4-（（6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル）メチル）フェニル）-1, 17-ジオキソ-6, 9, 12-トリオキサ-2, 16-ジアサイコサン-20-オイル）オキシ）-3-メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル-L-フェニルアラニル-D-グルタメート：DMF（2 mL）中の中間体60（41 mg、0.062 mmol、1.2 eq）の氷冷攪拌溶液に、DIPEA（27 μ L、0.15 mmol、3 eq）、中間体73（30 mg、0.051 mmol、1 eq）、およびCOMU（26 mg、0.062 mmol、1.2 eq）を添加した。得られた混合物をrtで18時間攪拌し、その後、これをDCMとイソプロパノールとの混合物（3/1、30 mL）で希釈し、1 MのHCl溶液（2 $\times$ 15 mL）、飽和NaHCO₃溶液（2 $\times$ 15 mL）、およびブライン（15 mL）で洗浄した。有機層を無水Na₂SO₄で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで2回洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物（14 mg、収率：22%）を得た。¹H NMR（400 MHz, DMSO-d₆） δ 10.07 (s, 1H), 8.51 - 8.36 (m, 2H), 8.33 - 8.24 (m, 1H), 7.81 - 7.74 (m, 4H), 7.54 - 7.30 (m, 5H), 7.29 - 7.07 (m, 6H), 6.81 (d, 1H), 6.51 (s, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.30 - 4.01 (m, 8H), 3.96 (s, 3H), 3.87 (d, 2H), 3.57 - 3.37 (m, 10H), 3.33 - 3.19 (m, 4H), 3.15 - 3.03 (m, 4H), 2.48 - 2.40 (m, 4H), 2.23 (t, 2H), 2.00 - 1.89 (m, 1H), 1.85 - 1.68 (m, 3H), 1.68 - 1.56 (m, 4H), 1.44 - 1.31 (m, 2H), 1.23 - 1.15 (m, 6H), 0.96 - 0.85 (m, 3H).

20


30

【0288】

例16：化合物SG200

中間体75

【化129】



40

1-ベンジル5-エチル（（E）-3-（4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル）アクリロイル）グリシル-L-バリル-D-グルタメート：中間体42（156 mg、0.3 mmol、1 eq）をTFAとDCMとの氷冷攪拌混合物（1/5、4 mL）に添加し、混合物を室温に温めた。3時間後に、溶媒を真空において蒸発させた。残留物をジエチルエーテルで4回共蒸発させ、DMF（3 mL）中に溶解させた。溶液を氷で冷却した後、DIPEA（0.261 mL、1.5 mmol、5 eq）、trans-フェルラ酸（64 mg、0.33 mmol、1.1 eq）、HOBt（45 mg、0.33 mmol、1.1 eq）、DMAP（触媒量）、およびEDC（63 mg、0.33 mmol、1.1 eq）を添加し、得られた混合物をrtで18時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチ

50


ル (30 mL) で希釈し、飽和 NH_4Cl 溶液 (2 × 15 mL)、飽和 NaHCO_3 溶液 (2 × 15 mL)、およびブライン (15 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮して、白色の固形物としての対象化合物 (89 mg、収率 : 50%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 9.45 (s, 1H), 8.45 (d, 1H), 8.19 (t, 1H), 7.91 (d, 1H), 7.41 - 7.28 (m, 6H), 7.14 (d, 1H), 7.00 (dd, 1H), 6.79 (d, 1H), 6.57 (d, 1H), 5.11 (d, 2H), 4.39 - 4.31 (m, 1H), 4.30 - 4.23 (m, 1H), 4.01 (q, 2H), 3.88 (d, 2H), 3.81 (s, 3H), 2.35 (t, 2H), 2.09 - 1.92 (m, 2H), 1.92 - 1.79 (m, 1H), 1.14 (t, 3H), 0.83 (t, 6H).

【0289】

化合物 76

SG200

【化130】



1-ベンジル5-エチル((E)-3-(4-((1-(4-((6-アミノ-2-ブトキシ-8-ヒドロキシ-9H-プリン-9-イル)メチル)フェニル)-1,17-ジオキソ-6,9,12-トリオキサ-2,16-ジアザイコサン-20-オイル)オキシ)-3-メトキシフェニル)アクリロイル)グリシル-L-バリル-D-グルタメート : DMF (2 mL) 中の中間体 60 (58 mg、0.088 mmol、1 eq) の氷冷攪拌溶液に、DIPEA (47 μL 、0.27 mmol、3 eq)、中間体 75 (52 mg、0.088 mmol、1 eq)、および COMU (42 mg、0.098 mmol、1.1 eq) を添加した。得られた混合物を rt で 18 時間攪拌し、その後、これを DCM と イソプロパノールとの混合物 (3/1、30 mL) で希釈し、1 M の HCl 溶液 (2 × 15 mL)、飽和 NaHCO_3 溶液 (2 × 15 mL)、およびブライン (15 mL) で洗浄した。有機層を無水 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空において濃縮した。固体残留物をジエチルエーテルで 2 回洗浄して、オフホワイトの固形物としての対象化合物 (31 mg、収率 : 28%) を得た。 ^1H NMR (400 MHz, $\text{DMSO}-d_6$) δ 9.99 (s, 1H), 8.46 (d, 1H), 8.39 (t, 1H), 8.32 (t, 1H), 7.97 (d, 1H), 7.91 (t, 1H), 7.83 - 7.74 (m, 2H), 7.47 - 7.29 (m, 9H), 7.17 (dd, 1H), 7.09 (d, 1H), 6.77 (d, 1H), 6.47 (s, 2H), 5.13 (d, 2H), 4.90 (s, 2H), 4.40 - 4.24 (m, 2H), 4.12 (t, 2H), 4.01 (q, 2H), 3.91 (d, 2H), 3.80 (s, 3H), 3.54 - 3.23 (m, 14H), 3.15 - 3.03 (m, 2H), 2.48 - 2.41 (m, 4H), 2.38 - 2.32 (m, 2H), 2.06 - 1.94 (m, 2H), 1.93 - 1.81 (m, 1H), 1.78 - 1.67 (m, 2H), 1.67 - 1.56 (m, 4H), 1.42 - 1.30 (m, 2H), 1.14 (t, 3H), 0.93 - 0.80 (m, 9H).

【0290】

例 17 : コンジュゲート化合物のインビトロ評価

PBMC 細胞毒性アッセイ

本発明の TLR7 および NOD2 コンジュゲート化合物を、がん細胞株に対する末梢血単核細胞 (PBMC) の細胞毒性活性を活性化するそれらの能力について試験した。このアッセイにおける PBMC の主なエフェクター分画は、ナチュラルキラー (NK) 細胞であり、これは、異常細胞、特に腫瘍細胞およびウイルス感染細胞に対するそれらの直接的な細胞毒性活性を通じて、自然免疫系において重要な役割を果たす。以下に記載するフローサイトメトリーに基づく方法は、PBMC およびがん細胞を共インキュベーションして

、これらをカルボキシフルオレセインスクシンイミジルエステル（CFSE）によって前標識して、これらをエフェクター細胞と区別することによって、標的がん細胞株に対するPBM C細胞毒性活性を測定する。試験される化合物によるエフェクター細胞の活性化が成功すると、標的細胞集団における細胞死の程度が高くなる。

【0291】

慢性骨髄性白血病K562および慢性B細胞白血病MEC-1細胞株をアッセイにおける標的細胞として使用した。アッセイを実施する前に、両方の細胞株を少なくとも10日間前培養した。標的細胞をPBM Cに添加する直前に、標的細胞を、暗所にて37℃で15分間、2μMのCFSEで染色した。次いで、細胞を培地で洗浄し、200,000個の細胞/mLで再懸濁した。

10

【0292】

PBM Cは、Ficoll-Paque密度勾配溶液を用いた遠心分離によって全血から単離した。遠心分離後に、PBM CをPBSで2回洗浄し、4,000,000個の細胞/mLで培地に再懸濁した。アッセイを実施するために、PBM Cを96ウェルマイクロタイタープレートにウェル1個あたり400,000個の細胞で播種し、化合物の存在下において37℃で20時間、二重に培養した。

【0293】

化合物は、以下のように調製した：まず、コンジュゲート化合物のストック溶液を1mMの濃度でDMSOにおいて調製した。次いで、培地中のコンジュゲート化合物の作業希釈液（The working dilutions）をPBM Cに直接添加して、1μMの最終的な濃度を確実にした。

20

【0294】

化合物の存在下でPBM Cをインキュベーションした後に、エフェクター細胞対標的細胞の最終的な比を40:1にするために、10,000個のCFSE染色標的細胞を各ウェルに添加した。4時間の共インキュベーション後に、細胞をSYTOX（商標）Blue（Invitrogen）核酸染色液で染色し、フローサイトメトリーで分析した。死（SYTOX（商標）Blue染色陽性）標的細胞をCFSE陽性集団から除外し、標的細胞集団内の死細胞の比率を得た。

【0295】

MEC-1およびK562標的細胞に対するPBM Cの細胞毒性活性を活性化するコンジュゲート化合物の能力は、図1および図2に示されている。SG48、SG144、およびRH32は、本発明の試験されるコンジュゲート化合物であった。培地を対照として使用し、結果を対照に対する比率として示す。中間化合物SG8をデスマラムイルペプチド型の既知のNOD2アゴニストとして用いた（Gobec et al. 2018）。中間化合物SG43をプリン型の既知のTLR7アゴニストとして用いた（Akinbobuyi et al. 2016）。SG8およびSG43の組み合わせを用いて、NOD2およびTLR7アゴニストの非コンジュゲート混合物に対してコンジュゲート化合物の活性を比較した。

30

【0296】

CD4+およびCD8+Tリンパ球に対するBMDCの抗原提示

Tリンパ球へのマウス骨髄由来樹状細胞（BMDC）の抗原提示に対する本発明のコンジュゲート化合物の効果を調べた。選択した化合物およびオボアルブミンでBMDCを前処置した後に、影響を受けたTリンパ球の活性化および増殖の程度を検出することによって、CD4+またはCD8+Tリンパ球のうちのいずれかへのオボアルブミンの抗原提示をフローサイトメトリーで観察した。

40

【0297】

BMDCは、マウスの後肢から骨髄を採取することによって得た。次いで、採取した細胞を顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）の存在下で10日間培養して、樹状細胞への分化を確実にした。BMDCを96ウェルマイクロタイタープレートにウェル1個あたり10,000個の細胞で播種し、コンジュゲート化合物およびオボアルブミン（50μg/mL）を用いて37℃で20時間、二重に刺激した。この期間の後に

50

、上清を除去し、CD4+Tリンパ球またはCD8+Tリンパ球のうちのいずれかを添加した。

【0298】

化合物は、以下のように調製した：まず、コンジュゲート化合物のストック溶液を1mMの濃度でDMSOにおいて調製した。次いで、培地中のコンジュゲート化合物の作業希釈物をBMDcに直接添加して、1nM～1μMの範囲の最終的な濃度を確実にした。

【0299】

CD4+およびCD8+Tリンパ球は、それぞれOT-IおよびOT-Iトランスジェニックマウスの脾臓の単細胞懸濁液から得た。これらは、CD4またはCD8共受容体と対になり、かつオボアルブミン抗原に特異的である、T細胞受容体を発現する。脾臓を採取した後に、CD4+またはCD8+細胞画分をMACS分離技術（それぞれMiltenyi Biotec CD4+ T Cell Isolation KitまたはCD8+ T Cell Isolation Kit）で濃縮した。次いで、Tリンパ球をCFSEで染色し、ウェル1個あたり50,000個の細胞でBMDcに添加した。

【0300】

BMDcおよびTリンパ球を37℃で72時間共培養した後に、活性化されたTリンパ球に特徴的なCD25の発現を測定することによって、Tリンパ球の活性化をフローサイトメトリーで評価した。同時に、CFSE蛍光の強度を測定して、Tリンパ球の増殖を評価した。図3および図4は、低いCFSE蛍光強度を有するCD25陽性Tリンパ球の比率を示しており、共培養期間に分裂した活性化されたTリンパ球を表している。SG48、SG144、およびRH32は、本発明の試験されるコンジュゲート化合物であった。培地を陰性対照として使用した。LPS（1μg/mL）を陽性対照として使用した。中間化合物SG8をデスマイルペプチド型の既知のNOD2アゴニストとして用いた（Gobec et al. 2018）。中間化合物SG43をプリン型の既知のTLR7アゴニストとして用いた（Akinbobuyi et al. 2016）。SG8およびSG43の組み合わせを用いて、NOD2およびTLR7アゴニストの非コンジュゲート混合物に対してコンジュゲート化合物の活性を比較した。

【0301】

図5および図6は、化合物SG48およびSG144を用いた実験についてのCD25陽性Tリンパ球およびCFSE低Tリンパ球の用量依存的比率を示す。

【0302】

さらに、Th1/Th2/Th17サイトカインサイトメトリックビーズアレイ（BD Biosciences）を用いて、選択したサイトカインの濃度を細胞上清において測定した。図7A～図7Gは、本発明の化合物（SG144）で前処置されたBMDcによるオボアルブミン提示に応答したIL-2（図7A）、IL-4（図7B）、IL-6（図7C）、IL-10（図7D）、IL-17A（図7E）、IFN-γ（図7F）、およびTNF（図7G）のCD4+およびCD8+Tリンパ球分泌を示す。培地を陰性対照として使用した。LPS（1μg/mL）を陽性対照として使用した。中間化合物SG8をデスマイルペプチド型の既知のNOD2アゴニストとして用いた（Gobec et al. 2018）。中間化合物SG43をプリン型の既知のTLR7アゴニストとして用いた（Akinbobuyi et al. 2016）。SG8およびSG43の組み合わせを用いて、NOD2およびTLR7アゴニストの非コンジュゲート混合物に対してコンジュゲート化合物の活性を比較した。

【0303】

本明細書で引用した参考文献

本明細書で引用した特許文書

国際公開第2006/117670号、Jones

国際公開第2007/024707号、Carson

国際公開第2008/004948号、Cook

国際公開第2010/093436号、Carson

10

20

30

40

50

国際公開第2010/018134号、Bazin-Lee

国際公開第2011/134668号、Maj

国際公開第2012/038058号、Holldack

国際公開第2019/209811号、Purandare

国際公開第2019/035969号、Young

国際公開第2019/036023号、Poudel

国際公開第2019/035971号、He

国際公開第2019/197598号、Bazin-Lee

本明細書で引用した非特許文献

AKINBOBUYI, B. et al. Facile syntheses of functionalized toll-like receptor 7 agonists. *Tetrahedron Lett.* 2015. vol. 56, 458-460 10

AKINBOBUYI, B. et al. Synthesis and immunostimulatory activity of substituted TLR7 agonists. *Bioorganic Med. Chem. Lett.* 2016. vol. 26, 4246-4249

ASANO, J. et al. Nucleotide Oligomerization Binding Domain-Like Receptor Signaling Enhances Dendritic Cell-Mediated Cross-Priming In Vivo. *J. Immunol.* 2010. vol. 184, 736-745

BUMGARDNER, S.A. et al. Nod2 is required for antigen-specific humoral responses against antigens orally delivered using a recombinant *Lactobacillus* vaccine platform. *PLoS One* 2018. vol. 13, 1-23 20

COONEY, R. et al. NOD2 stimulation induces autophagy in dendritic cells influencing bacterial handling and antigen presentation. *Nat. Med.* 2010. vol. 16, 90-97

GOBEC, M. et al. Structural requirements of acylated Gly-l-Ala-d-Glu analogs for activation of the innate immune Receptor NOD2. *Eur. J. Med. Chem.* 2016. vol. 116, 1-12

GOBEC, M. et al. Discovery of nanomolar desmuramylpeptide agonists of the innate immune receptor nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 2 (NOD2) possessing immunostimulatory properties. *J. Med. Chem.* 2018. vol. 61, 2707-2724 30

GUTJAHR, A. et al. Cutting Edge: A Dual TLR2 and TLR7 Ligand Induces Highly Potent Humoral and Cell-Mediated Immune Responses. *J. Immunol.* 2017. vol. 198, 4205-4209

GUTJAHR, A. et al. Triggering Intracellular Receptors for Vaccine Adjuvantation. *Trends Immunol.* 2016. vol. 37, 573-587

HEMMI, H. et al. Small-antiviral compounds activate immune cells via the TLR7 MyD88-dependent signaling pathway. *Nat. Immunol.* 2002. vol. 3, 196-200

JACKSON, E.M. et al. Intranasal vaccination with murabutide enhances humoral and mucosal immune responses to a virus-like particle vaccine. *PLoS One* 2012. vol. 7 40

JAKOPIN, Z. Nucleotide-binding oligomerization domain (NOD) inhibitors: A rational approach toward inhibition of NOD signaling pathway. *J. Med. Chem.* 2014. vol. 57, 6897-6918

JAKOPIN, Z. et al. Immunomodulatory properties of novel nucleotide oligomerization domain 2 (Nod2) agonistic desmuramyldipeptides. *J. Med. Chem.* 2012. vol. 55, 6478-6488

JONES, P. et al. Discovery of a highly potent series of TLR7 agonists. *Bioorganic Med. Chem. Lett.* 2011. vol. 21, 5939-5943

KOBAYASHI, K.S. et al. Nod2-dependent regulation of innate and adap 50

tive immunity in the intestinal tract. *Science* (80-.). 2005. vol. 307, 731-734

KOBOLD, S. et al. Modes of action of TLR7 agonists in cancer therapy. *Immunotherapy* 2014. vol. 6, 1085-1095

KURIMOTO, A. et al. Synthesis and biological evaluation of 8-oxoadenine derivatives as toll-like receptor 7 agonists introducing the antedrug concept. *J. Med. Chem.* 2010. vol. 53, 2964-2972

KURIMOTO, A. et al. Synthesis and evaluation of 2-substituted 8-hydroxyadenines as potent interferon inducers with improved oral bioavailabilities. *Bioorganic Med. Chem.* 2004. vol. 12, 1091-1099

LEE, J. et al. Molecular basis for the immunostimulatory activity of guanine nucleoside analogs: Activation of toll-like receptor 7. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 2003. vol. 100, 6646-6651

MADAN-LALA, R. et al. Combinatorial Delivery of Dual and Triple TLR Agonists via Polymeric Pathogen-like Particles Synergistically Enhances Innate and Adaptive Immune Responses. *Sci. Rep.* 2017. vol. 7, 14-16

MANCINI, R.J. et al. Covalently Coupled Immunostimulant Heterodimers. *Angew. Chemie - Int. Ed.* 2014. vol. 53, 189-192

MORRIS, S. et al. Autophagy-Mediated Dendritic Cell Activation Is Essential for Innate Cytokine Production and APC Function with Respiratory Syncytial Virus Responses. *J. Immunol.* 2011. vol. 187, 3953-3961

NABERGOJ, S. et al. Harnessing the untapped potential of nucleotide-binding oligomerization domain ligands for cancer immunotherapy. *Med. Res. Rev.* 2019. vol. 39, 1447-1484

NAKAMURA, T. et al. Synthesis and evaluation of 8-oxoadenine derivatives as potent Toll-like receptor 7 agonists with high water solubility. *Bioorganic Med. Chem. Lett.* 2013. vol. 23, 669-672

PAVOT, V. et al. Cutting Edge: New Chimeric NOD2/TLR2 Adjuvant Dramatically Increases Vaccine Immunogenicity. *J. Immunol.* 2014. vol. 193, 5781-5785

THAISS, C.A. et al. Integration of Innate Immune Signaling. *Trends Immunol.* 2016. vol. 37, 84-101

TOM, J.K. et al. Applications of Immunomodulatory Immune Synergies to Adjuvant Discovery and Vaccine Development. *Trends Biotechnol.* 2019. vol. 37, 373-388

TRAN, T.D. et al. Design and optimisation of orally active TLR7 agonists for the treatment of hepatitis C virus infection. *Bioorganic Med. Chem. Lett.* 2011. vol. 21, 2389-2393

TRAVASSOS, L.H. et al. Nod1 and Nod2 direct autophagy by recruiting ATG16L1 to the plasma membrane at the site of bacterial entry. *Nat. Immunol.* 2010. vol. 11, 55-62

VIDAL, V. et al. Enhanced maturation and functional capacity of monocyte-derived immature dendritic cells by the synthetic immunomodulator Murabutide. *Immunology* 2001. vol. 103, 479-48

10

20


30

40


50

【図面】


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】



【図 6】



10

20

30

40

50

【 図 7 A 】




Figure 7A

【 図 7 B 】




Figure 7B

【 図 7 C 】




Figure 7C

【 図 7 D 】




Figure 7D

10

20

30

40

50

【 図 7 E 】




Figure 7E

【 図 7 F 】




Figure 7F

【 図 7 G 】




Figure 7G

10

20

30

40

50

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2021/079141

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. A61K47/55 A61P37/04

ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61K A61P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, BIOSIS, EMBASE, CHEM ABS Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>GUTJAHR ALICE ET AL: "New chimeric TLR7/NOD2 agonist is a potent adjuvant to induce mucosal immune responses", EBIOMEDICINE, vol. 58, 30 July 2020 (2020-07-30), pages 102922-1-102922-9, XP055819078, ISSN: 2352-3964, DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.102922 abstract page 2, left-hand column page 3; figure 1 page 4, right-hand column - page 7, left-hand column</p> <p>----- -/--</p>	1-28

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 January 2022

Date of mailing of the international search report

01/02/2022

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Dullaart, Anwyn

1

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2021/079141

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>Naorem Naorem Nihesh ET AL: "Spatially organized pattern recognition receptor tri- agonists: NOD2 agonist in combination with two TLR agonists Submission", Abstracts of Papers, 257th ACS National Meeting & Exposition, Orlando, FL, United States, Mar. 31-Apr. 4, 2019, 2019, pages BIOL-0150, XP055819885, Retrieved from the Internet: URL:https://www.morressier.com/article/spatially-organized-pattern-recognition-receptor-triagonists-nod2-agonist-combination-two-tlr-agonists/5fc645232d78d1fec467602a [retrieved on 2021-06-30] abstract</p> <p>-----</p>	1-28
X	<p>PASSLICK DAVID ET AL: "Delivering all in one: Antigen-nanocapsule loaded with dual adjuvant yields superadditive effects by DC-directed T cell stimulation", JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, vol. 289, 10 November 2018 (2018-11-10), pages 23-34, XP055819099, ISSN: 0168-3659, DOI: 10.1016/j.jconrel.2018.09.008 abstract figure 1 page 29, paragraph Conclusion</p> <p>-----</p>	1-28
X	<p>UEHARA A. ET AL: "Muramyldipeptide and diaminopimelic acid-containing desmuramylpeptides in combination with chemically synthesized Toll-like receptor agonists synergistically induced production of interleukin-8 in a NOD2- and NOD1-dependent manner, respectively, in human monocytic cells in culture", CELLULAR MICROBIOLOGY, vol. 7, no. 1, 2005, pages 53-61, XP055818641, ISSN: 1462-5814, DOI: 10.1111/j.1462-5822.2004.00433.x abstract page 54 - page 56</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">-/--</p>	1-28

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2021/079141

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>SCHWARZ HARALD ET AL: "TLR8 and NOD signaling synergistically induce the production of IL-1[beta] and IL-23 in monocyte-derived DCs and enhance the expression of the feedback inhibitor SOCS2", IMMUNOBIOLOGY, vol. 218, no. 4, 26 June 2012 (2012-06-26) , pages 533-542, XP028991255, ISSN: 0171-2985, DOI: 10.1016/J.IMBIO.2012.06.007 abstract figures page 540 - page 541 -----</p>	1-28
X	<p>LYUDMILA LYAKH ET AL: "Regulation of interleukin-12/ interleukin-23 production and the T-helper 17 response in humans", IMMUNOLOGICAL REVIEWS, vol. 226, 2008, pages 112-131, XP007915672, ISSN: 0105-2896 abstract page 120, right-hand column - page 122, left-hand column figures -----</p>	1-28

フロントページの続き

(51)国際特許分類

F I

テーマコード (参考)

A 6 1 P	31/12	(2006.01)	A 6 1 P	31/12	
A 6 1 P	31/10	(2006.01)	A 6 1 P	31/10	
A 6 1 P	31/04	(2006.01)	A 6 1 P	31/04	
A 6 1 P	33/02	(2006.01)	A 6 1 P	33/02	
A 6 1 P	35/00	(2006.01)	A 6 1 P	35/00	
A 6 1 P	37/04	(2006.01)	A 6 1 P	37/04	
A 6 1 P	43/00	(2006.01)	A 6 1 P	43/00	1 1 1

MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,N
E,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,
CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,IT,JO,JP,K
E,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,N
G,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,WS,ZA,ZM,ZW

(74)代理人 100134315

弁理士 永島 秀郎

(74)代理人 100162880

弁理士 上島 類

(72)発明者 ジーガ ジャコピン

スロヴェニア共和国 1 0 0 0 リュブリャナ, コンGRESニ ツルグ 1 2 ケア・オブ ユニヴェ
ルザ ヴィ リュブリャナ

(72)発明者 サモ グゼリ

スロヴェニア共和国 1 0 0 0 リュブリャナ, コンGRESニ ツルグ 1 2 ケア・オブ ユニヴェ
ルザ ヴィ リュブリャナ

F ターム (参考)

4C076 CC06 CC07 CC27 CC32 CC34 CC35 DD39 EE23 EE59

4C084 AA01 AA02 AA07 BA01 BA08 BA15 BA23 CA59 NA05 NA14

ZB091 ZB092 ZB261 ZB262 ZB331 ZB332 ZB351 ZB352 ZB381 ZB382 ZC411
ZC412

4C085 AA38 EE06 FF13 FF17

4C086 AA01 AA02 AA03 CB07 MA01 NA05 NA14 ZB09 ZB26 ZB33

ZB35 ZB38 ZC41

4H045 AA10 AA30 BA12 EA20 FA74