



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103536817 A

(43) 申请公布日 2014. 01. 29

(21) 申请号 201310536695. 0

(22) 申请日 2013. 11. 04

(71) 申请人 张泉林

地址 250400 山东省济南市平阴县城府前街  
35 号

(72) 发明人 张泉林

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994 (2006. 01)

A61P 31/04 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

### (54) 发明名称

一种治疗丹毒的药物及其制备方法

### (57) 摘要

本发明公开了一种治疗丹毒的药物及其制备方法,属于一种中药制剂及制备方法,特别是治疗丹毒的药物及其制备方法。该药物是由下述重量份数比的原料制成的药物:金银花 12-30、连翘 6-10、栀子 10-15、蒲公英 10-25、菊花 10-15、大青叶 20-30、赤芍 5-10、生地 10-30、牡丹皮 6-12、薏苡仁 15-30。本发明的有益效果是组方合理调制简单,使用方便,价格低廉,治疗效果明显,总有效率 100%,治愈率 98%,本药物起效快,一般一个疗程症状消失,安全可靠,是治疗丹毒的一种新型药物。

1. 一种治疗丹毒的药物,其特征在于:是由下述重量份数比的原料制成的药物:金银花 12-30、连翘 6-10、栀子 10-15、蒲公英 10-25、菊花 10-15、大青叶 20-30、赤芍 5-10、生地 10-30、牡丹皮 6-12、薏苡仁 15-30。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗丹毒的药物,其特征在于:为煎剂。

3. 权利要求 2 所述的一种治疗丹毒的药物的制备方法,其特征在于:包括下述步骤:

A、以克为单位按照下述重量份数比取各原料:金银花 12-30、连翘 6-10、栀子 10-15、蒲公英 10-25、菊花 10-15、大青叶 20-30、赤芍 5-10、生地 10-30、牡丹皮 6-12、薏苡仁 15-30,放入砂锅或搪瓷器皿中,加干净冷水 1200-1500ml 浸泡 1-2 小时,使药物完全被水渗透;

B、将步骤 A 浸泡的中药及浸泡液用砂锅急火煎药沸腾后文火煎药 30 分钟,至药汤 200-300ml,滤去药渣,装瓶存放;

C、将步骤 B 中的药渣在砂锅内加入沸水 500-700ml 急火煎药沸腾后文火煎药 25 分钟,至药汤 200-300ml,滤去药渣,和步骤 B 装瓶存放的药物均匀混合备用。

## 一种治疗丹毒的药物及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明属于一种中药制剂及制备方法,特别是治疗丹毒的药物及其制备方法。

### 背景技术

[0002] 丹毒是皮肤及其网状淋巴管的急性炎症。好发于下肢和面部。其临床表现为起病急,局部出现界限清楚之片状红疹,颜色鲜红,并稍隆起,压之褪色。皮肤表面紧张炽热,迅速向四周蔓延,有烧灼样痛。伴高热畏寒及头痛等。丹毒虽以“毒”命名,却并不是病毒感染引起的,而是由细菌感染引起的急性化脓性真皮炎症。其病原菌是A族乙型溶血性链球菌,多由皮肤或粘膜破伤而侵入,但亦可由血行感染。中医认为,丹毒的病因以火毒为主,可由风湿诸邪化火而致,以患部突然皮肤鲜红成片、色如涂丹,灼热肿胀,迅速蔓延为主要表现的皮肤疾病。丹毒的治疗通常以清热利湿、凉血解毒方法治疗。近年来丹毒发病率有逐年上升的趋势,治疗丹毒的药物很多,但多为仅对症治疗,多见疗程长、见效慢、费用高。

### 发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种治疗丹毒的药物,本发明的另一个目的是提供该药物的制备方法。

[0004] 本发明的解决方案是基于祖国医学对丹毒的认识和治疗原则,以清热解毒、凉血通腑的治法。本发明药物为纯中药制剂,它由金银花、连翘、栀子、蒲公英、菊花、大青叶、赤芍、生地、牡丹皮、薏苡仁等组成,具有凉血解毒、利湿清热的功效。其方中金银花、连翘、栀子、蒲公英、菊花、大青叶有清热解毒的功效。赤芍、生地、牡丹皮有凉血的功效。薏苡仁偏寒凉,有利水渗湿的功效。

[0005] 本发明的技术方案为,一种治疗丹毒的药物,其特征在于:由下述原料重量份数比制成的药物:

金银花 12-30、连翘 6-10、栀子 10-15、蒲公英 10-25、菊花 10-15、大青叶 20-30、赤芍 5-10、生地 10-30、牡丹皮 6-12、薏苡仁 15-30。

[0006] 一种治疗丹毒的药物的制备方法,其特征在于:主要包括下述步骤:

A、以克为单位按照下述重量份数比取各原料:金银花 12-30、连翘 6-10、栀子 10-15、蒲公英 10-25、菊花 10-15、大青叶 20-30、赤芍 5-10、生地 10-30、牡丹皮 6-12、薏苡仁 15-30,放入砂锅或搪瓷器皿中,加干净冷水 1200-1500ml 浸泡 1-2 小时,使药物完全被水渗透;

B、将步骤 A 浸泡的中药及浸泡液用砂锅急火煎药沸腾后文火煎药 30 分钟,至药汤 200-300ml,滤去药渣,装瓶存放;

C、将步骤 B 中的药渣在砂锅内加入沸水 500-700ml 急火煎药沸腾后文火煎药 25 分钟,至药汤 200-300ml,滤去药渣,和步骤 B 装瓶存放的药物均匀混合备用。

[0007] 服用方法:本药物为直接口服使用,服用前需加温后口服,一次 200-300ml,一天两次,6 天为一疗程。

[0008] 由本发明取得的药液孕妇患者慎用。

[0009] 病例一：王某，男，18岁，2013年3月17日初诊，患者自初诊前天晚上开始，右脚面外侧部感觉疼痛，一天后开始突然发冷发热，体温38℃以上，局部红肿，痛疼，伴头痛，食纳不佳，大便不干，尿黄。检查体温38.7℃，右足背靠外踝处有8×6厘米大小区域皮肤为鲜红色，边界清楚，中央有少量水疱，明显触痛。白细胞计数 $10.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞84%，淋巴细胞16%。脉弦数，舌苔薄白。中医检查诊断为足背部丹毒。此乃为湿热下注。治宜凉血解毒，利湿清热。服用本发明药物3剂，局部红肿消退，疼痛已止，局部皮色已转黯，压痛减轻。继续服3剂后诸症皆除，病获痊愈。

[0010] 病例二：李某，女，54岁，2012年9月初诊，患者主诉：右下肢红肿10天，经过治疗未愈。询问病史得知，病人1周前，因足背作痒，用手搔之，当日无事，次日发现足背红肿，继而蔓延至小腿伸侧，遂到医院就诊，诊断为“丹毒”，用抗生素（头孢类）治疗之后，非但红肿不减，反而起“大疱”，局部发生脱皮、发黑，继续加大抗生素用量仍未果，故来我处求治，检查见病人患肢自膝关节以下6cm至踝关节，均有大水疱，有2块约有6cm×6cm大小范围，皮肤发黑，局部脱皮，疼痛难忍。测体温38℃，白细胞总数 $9.8 \times 10^9/L$ ，中性62%，淋巴37%，精神萎靡，痛苦面容，小便色黄如浓茶，大便干燥难解，脉滑数，舌边尖红，舌中黄腻苔，为湿毒蕴结之证，属湿重于热型，即坏疽性丹毒（大疱型丹毒）。遂给予清热解毒，凉血渗湿治疗，先服本发明药物2剂，以观药效。2天后复诊，患处水疱已逐渐干瘪，黑色处已结痂。经过1周治疗，病获痊愈。

[0011] 本发明有益效果是：组方合理，调制简单，使用方便，价格低廉，治疗效果明显，总有效率100%，治愈率98%，本药物起效快，一般一个疗程症状消失，安全可靠，是治疗丹毒的一种新型药物。

## 具体实施方式

[0012] 本发明具体实施方式是：

实施例1：A、取金银花15、连翘9、栀子12、蒲公英20、菊花12、大青叶25、赤芍9、生地15、牡丹皮9、薏苡仁25；

B、将上述步骤A已配好的中药放入砂锅或搪瓷器皿中，加干净冷水1200-1500ml浸泡1-2小时，使药物完全被水渗透；

C、将步骤B浸泡的中药及浸泡液用砂锅急火煎药沸腾后文火煎药30分钟，至药汤200-300ml，滤去药渣，装瓶存放；

D、将步骤C中的药渣在砂锅内加入沸水500-700ml急火煎药沸腾后文火煎药25分钟，至药汤200-300ml，滤去药渣，和步骤C装瓶存放的药物均匀混合备用。

[0013] 服用方法：本药物为直接口服使用，服用前需加温后口服，一次200-300ml，一天两次，6天为一疗程。

[0014] 实施例2：A、取金银花30、连翘10、栀子15、蒲公英25、菊花15、大青叶30、赤芍9、生地15、牡丹皮10、薏苡仁30；

B、将步骤A已配好的中药放入砂锅或搪瓷器皿中，加干净冷水1200-1500ml浸泡1-2小时，使药物完全被水渗透；

C、将步骤B浸泡的中药及浸泡液用砂锅急火煎药沸腾后文火煎药30分钟，至药汤

200-300ml, 滤去药渣, 装瓶存放;

D、将步骤 C 中的药渣在砂锅内加入沸水 500-700ml 急火煎药沸腾后文火煎药 25 分钟, 至药汤 200-300ml, 滤去药渣, 和步骤 C 装瓶存放的药物均匀混合备用。

[0015] 服用方法: 本药物为直接口服使用, 服用前需加温后口服, 一次 200-300ml, 一天两次, 6 天为一疗程。