



HU000032075T2

(19) **HU**(11) Lajstromszám: **E 032 075**(13) **T2****MAGYARORSZÁG****Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala**

EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(21) Magyar ügyszám: **E 12 770951**(22) A bejelentés napja: **2012. 04. 12.**

(96) Az európai bejelentés bejelentési száma:

EP 20120770951

(97) Az európai bejelentés közzétételi adatai:

EP 2697207 A2 **2012. 10. 18.**

(97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai:

EP 2697207 B1 **2016. 12. 14.**(51) Int. Cl.: **C07D413/08** (2006.01)**A61P 3/06** (2006.01)**C07D263/22** (2006.01)**A61K 31/421** (2006.01)**A61P 9/10** (2006.01)

(86) A nemzetközi (PCT) bejelentési szám:

PCT/KR 12/002739

(87) A nemzetközi közzétételi szám:

WO 12141487

(30) Elsőbbségi adatok:

20110033943**2011. 04. 12.****KR**

(72) Feltaláló(k):

LEE, Seohee, Yongin-si Gyeonggi-do 446-916 (KR)**OH, Jungtaek, Yongin-si Gyeonggi-do 446-916 (KR)****LEE, Jaekwang, Yongin-si Gyeonggi-do 446-916 (KR)****LEE, Jaewon, Yongin-si Gyeonggi-do 446-916 (KR)****BAE, Suyeal, Yongin-si Gyeonggi-do 446-916 (KR)****HA, Nina, Yongin-si Gyeonggi-do 446-916 (KR)****LEE, Sera, Yongin-si Gyeonggi-do 446-916 (KR)**

(73) Jogosult(ak):

**Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp., Seoul
120-756 (KR)**

(74) Képviselő:

**Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest**

(54) **3-(2-Aril-cikloalkenilmetil)-oxazolidin-2-on-származékok mint koleszterinésztertranszfer protein (CETP) inhibitorok**

Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk(1))

A fordítást a szabadalmas az 1995. évi XXXIII. törvény 84/H. §-a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.



(11)

EP 2 697 207 B1

(12)

EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
14.12.2016 Bulletin 2016/50

(51) Int Cl.:
C07D 413/08 ^(2006.01) **C07D 263/22** ^(2006.01)
A61K 31/421 ^(2006.01) **A61P 3/06** ^(2006.01)
A61P 9/10 ^(2006.01)

(21) Application number: **12770951.7**

(86) International application number:
PCT/KR2012/002739

(22) Date of filing: **12.04.2012**

(87) International publication number:
WO 2012/141487 (18.10.2012 Gazette 2012/42)

(54) **3-(2-ARYL-CYCLOALKENYLMETHYL)-OXAZOLIDIN-2-ONE DERIVATIVES AS CHOLESTEROL ESTER TRANSFER PROTEIN (CETP) INHIBITORS**

3-(2-ARYL-CYCLOALKENYLMETHYL)-OXAZOLIDIN-2-ON-VERBINDUNGEN ALS
CHOLESTERINESTERTRANSFERPROTEIN (CETP) HEMMER

DÉRIVÉS DE 3-(2-ARYL-CYCLOALCÉNYLMÉTHYL)-OXAZOLIDIN-2-ONE COMME INHIBITEURS
DE LA PROTÉINE DE TRANSFERT DU CHOLESTÉROL ESTÉRIFIÉ (CETP)

(84) Designated Contracting States:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(30) Priority: **12.04.2011 KR 20110033943**

(43) Date of publication of application:
19.02.2014 Bulletin 2014/08

(73) Proprietor: **Chong Kun Dang Pharmaceutical
Corp.
Seoul 120-756 (KR)**

(72) Inventors:
• **LEE, Seohee
Yongin-si
Gyeonggi-do 446-916 (KR)**
• **OH, Jungtaek
Yongin-si
Gyeonggi-do 446-916 (KR)**
• **LEE, Jaekwang
Yongin-si
Gyeonggi-do 446-916 (KR)**
• **LEE, Jaewon
Yongin-si
Gyeonggi-do 446-916 (KR)**
• **BAE, Suyeal
Yongin-si
Gyeonggi-do 446-916 (KR)**

• **HA, Nina
Yongin-si
Gyeonggi-do 446-916 (KR)**
• **LEE, Sera
Yongin-si
Gyeonggi-do 446-916 (KR)**

(74) Representative: **Held, Stephan et al
Meissner Bolte Patentanwälte
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Widenmayerstraße 47
80538 München (DE)**

(56) References cited:
**WO-A1-2010/039474 WO-A2-2007/081569
US-A1- 2008 242 711**

• **JULIANNE HUNT ET AL: "Cholesteryl Ester
Transfer Protein (CETP) Inhibitors", CURRENT
TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 9, no. 5,
1 April 2009 (2009-04-01), pages 419-427,
XP055143193, ISSN: 1568-0266, DOI:
10.2174/156802609788340823**
• **RAJESH KRISHNA ET AL.: 'Single-dose
pharmacokinetics and pharmacodynamics of
anacetrapib, a potent cholesteryl ester transfer
protein (CETP) inhibitor, in healthy subjects'
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL
PHARMACOLOGY vol. 68, no. 4, 2009, pages 535
- 545, XP055126351**

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

- DANIEL BLOOMFIELD ET AL.: 'Efficacy and safety of the cholesteryl ester transfer protein inhibitor anacetrapib as monotherapy and coadministered with atorvastatin in dyslipidemic patients' AMERICAN HEART JOURNAL vol. 157, no. 2, 2009, pages 352 - 360, 360/EL-360/E2, XP025997680

Remarks:

The file contains technical information submitted after the application was filed and not included in this specification

Description**Technical Field**

[0001] The present invention relates to novel cycloalkenyl aryl derivatives, and more particularly to cycloalkenyl aryl derivatives having CETP inhibitory activity, isomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof, or solvates thereof, the use thereof for preparing pharmaceutical compositions, pharmaceutical compositions containing the same, these compositions for use in methods of treating disease, and methods for preparing novel cycloalkenyl aryl derivatives.

Background Art


[0002] Hyperlipidemia refers to high blood cholesterol levels and is asymptomatic. However, hyperlipidemia is a very significant condition, because it causes angina pectoris, myocardial infarction and arteriosclerosis. Statins, drugs that are commonly used to treat hyperlipidemia, exhibit therapeutic effects mainly by lowering LDL-C, but their effects on the prevention of cardiovascular diseases are still very insufficient. A recent study reported that elevated concentration of high-density lipoprotein (HDL-C) is very effective in preventing cardiovascular diseases as effective as lower low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) (Goldbourt et al, Arterioscler Thromb Vase Biol, 1997, 17, 107-113). Among drugs that are used to increase HDL-C, the most effective drug is Niacin. However, this drug needs to be taken in relatively large doses and causes side effects such as facial flushing (Taylor et al, Circulation, 2004, 110, 3512-3517).

[0003] Meanwhile, cholesterol ester transfer protein (CETP) is a protein that participates in reverse cholesterol transport (the reverse transport of cholesterol from peripheral tissue to the liver). When CETP is inhibited, HDL-C can be effectively increased, thus preventing cardiovascular diseases. Accordingly, the development of compounds capable of inhibiting CETP activity is very important (Barter et al., Arterioscler Thromb Vase Biol. 2003, 23, 160-167).

[0004] CETP inhibitors known to date can be divided according to structure into Torcetrapib (WO 02/088085) and Anacetrapib (WO 2006/014357), which are 3,5-bis-trifluoromethylbenzene derivatives, and Dalcetrapib (WO 98/35937) which is a benzenethiol derivative.

[0005] However, among these CETP inhibitors, Torcetrapib causes an increase in blood pressure and an increase in mortality, and thus clinical trials thereof were terminated. It was reported that such side effects occur because Torcetrapib increases the levels of hormones, such as aldosterone and cortisol, associated with a significant elevation in blood pressure, and increases the thickness of the vascular wall to cause inflammation, thus increasing mortality (Ferrest et al. British Journal of Pharmacology, (2008) 154, 1465-1473). The other CETP inhibitor Dalcetrapib has not been reported to cause such side effects, but is known to have insufficient rise in HDL-C (Hisashi Shinkai. Expert Opinion on Therapeutic Patents, 2009, 19(9), 1229-1237). Among such CETP inhibitors, Anacetrapib and Dalcetrapib are in clinical trials for the purpose of treating hyperlipidemia and cardiovascular diseases by increasing HDL-C and decreasing LDL-C (Niesor et al, Journal of lipid Research, 2010, 51, 3443-3453).

[0006] WO 2007/081569 A2 relates to compounds having the structure of general formula



which are considered CETP inhibitors and useful for raising HDL-cholesterol, reducing LDL-cholesterol, and for treating or preventing atherosclerosis, wherein substituent B is a cyclic group other than phenyl and has a cyclic substituent at a position that is ortho to the position at which B is connected to the remainder of the structure, and the 5-membered ring of the structure has a second cyclic substituent in addition to B.

Disclosure**Technical Problem**

[0007] It is an object of the present invention to provide novel cycloalkenyl aryl derivatives, isomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, thereof, or solvates thereof and preparation Methods thereof.

[0008] Another object of the present invention is to provide novel cycloalkenyl aryl derivatives, which have less side


effects and can effectively inhibit CETP. isomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof, or solvates thereof, and preparation methods thereof.

[0009] Still another object of the present invention is to provide methods for preparing novel cycloalkenyl aryl derivatives.

Technical Solution

[0010] To achieve the above objects, the present invention provides cycloalkenyl aryl derivatives of the following formula 1, racemates, racemic mixtures, enantiomers, diastomeric mixtures, diastomers, atropisomers and mixtures of atropisomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof hydrates thereof, or solvates thereof, and preparation methods thereof:


[Formula 1]



wherein

B¹ and B² are each independently N or C, with the proviso that both B¹ and B² cannot be N at the same time, and if one of B¹ and B² is N, R² or R⁵ is absent;

R¹ and R² are each independently H, -F, -OH, -NH₂, -C(=O)H, -CH₂OH, -OC₁-C₆ alkyl, -SC₁-C₆ alkyl, -CH₂OC₁-C₆ alkyl, -NH(C₁-C₆ alkyl), -NH(C=O)(C₁-C₆ alkyl), -N(C₁-C₆alkyl)₂, or




or



R¹ and R² together with the carbon atoms to which they are bonded may form a 5- or 6-membered heterocyclic aromatic or non-aromatic ring compound having 1 to 3 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, and C(=O), wherein the heterocyclic aromatic or non-aromatic ring compound may optionally be substituted with R⁸;

R³ is -H, -F, -OH, -C₁-C₆ alkyl, or -OC₁-C₆ alkyl;




R⁴ is -H, halogen, -CN, -NO₂, -C₁-C₆ alkyl, -C₂-C₆ alkenyl, -C₃-C₆ cycloalkyl,



-OR⁷, -CH₂OR⁷, -CH₂NR⁷R⁸, -SR⁷, -C(=O)R⁷, -CO₂R⁷, -CHR⁷CO₂R⁸, -C(=O)NR⁷R⁸,



-NR⁷R⁸, -NR⁷C(=O)R⁸, -NR⁷CO₂R⁸,



-NR⁷C(=O)NR⁸R⁹, -NR⁷C(=S)NR⁸R⁹,



Ar or Het; or

R³ and R⁴ together with the carbon atoms to which they are bonded may form a 5- or 6-membered cycloalkyl or heterocyclic ring compound having 0 to 3 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, and C(=O), wherein the cycloalkyl or heterocyclic ring compound may optionally be substituted with R⁸; Ar is a C₆ monocyclic aromatic compound, which is unsubstituted or optionally substituted with one or more selected from the group consisting of halogen, -OH, -NH₂, -C₁-C₆ alkyl and -OC₁-C₆ alkyl;


Het is a 5- or 6-membered heterocyclic ring compound containing 0 to 2 double bonds and having 1 to 4 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, C(=O) and C(=S), and may be unsubstituted or may optionally be substituted with R⁸; R⁵ is -H, -F, -OH, -CF₃, -C₁-C₆ alkyl, or -OC₁-C₆ alkyl;

R⁶ is -H or -C₁-C₆ alkyl;

R⁷ is -H, halogen, -C(O)(C₁-C₃ alkyl), -C₁-C₆ alkyl, -OC₁-C₆ alkyl, -C₃-C₆ cycloalkyl, or -OC(=O)(C₁-C₃ alkyl);
 R⁸ is -H, halogen, -OH, -CN, -NH₂, -NH(C₁-C₃ alkyl), -C(=O)NH₂, -CO₂H,



-C₃-C₆ cycloalkyl, -Ph or



R⁹ is -H, -CN, -C₁-C₆ alkyl, -OC₁-C₆ alkyl, or -C(=O)(C₁-C₃ alkyl); R¹⁰ is -NH(C₁-C₃ alkyl), -N(C₁-C₃ alkyl)₂, or -S(C₁-C₃ alkyl);

Z is -CH₂-



R^a is -H, -Cl or -CF₃;

p is an integer ranging from 0 to 2;

A¹ and A² are each independently -(CR¹¹R¹²)-, wherein R¹¹ and R¹² are each independently -H, -F, or -C₁-C₆ alkyl, or R¹¹ and R¹² together form a 3- or 4-membered spirocyclic non-aromatic ring compound;

A³ is -(CH₃)_n;

X is S or O;

m is an integer ranging from 0 to 3;

n is an integer ranging from 0 to 2;

q is an integer ranging from 1 to 3;


wherein said -C₁-C₃ alkyl, -C₃-C₆ cycloalkyl, -C₁-C₆ alkyl or -C₂-C₆ alkenyl is unsubstituted or substituted with one or more selected from the group consisting of halogen, -OH, -CF₃, -CN, -CO₂H, -C(=O)CH₃, -OC(=O)CH₃, -C₁-C₃alkyl, -OC₁-C₃alkyl, and -Ph.

[0011] Preferably, the present invention provides cycloalkenyl aryl derivatives according to the above definition, racemates, racemic mixtures, enantiomers, diastomeric mixtures, diastomers, atropisomers and mixtures of atropisomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof, or solvates thereof:


wherein

B¹ and B² are each independently N or C, with the proviso that both B¹ and B² cannot be N at the same time, and if any one of B¹ and B² is N, R² or R⁵ is absent;

R¹ is -F, -OH, -NH₂, -C(-O)H, -CH₂OH, -OCH₃, -OCF₃, -SCH₃, -CH₂OCH₃, -NHCH₃,



-N(CH₃)₂, or




R² is -H; or



R¹ and R³ together with the carbon atoms to which they are bonded may form a 5- or 6-membered heterocyclic aromatic or non-aromatic ring compound having 1 to 3 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, and C(=O), wherein the heterocyclic aromatic or non-aromatic ring compound may optionally be substituted with R⁸;

R³ is -H, -F, -OH, -CH₃, -CF₃, -CH₂CH₃, or -OCH₃;


R⁴ is -H, -F, -Cl, -CN, -NO₂, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CF₃, -CH(CF₃)₂, -CH(CH₃)(CF₃), -C(OCH₃)(CF₃)₂, -CH(OH)CH₃, -C(OH)(CH₃)₂, -C(OH)(CF₃)₂, -C(=CF₂)CF₃, -cyclopropyl,





-OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCF₃, -OCH₂CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂NR⁷R⁸, -SCH₃, -C(=O)R⁷, -CO₂R⁷, -CHR⁷CO₂R⁸, -C(=O)NR⁷R⁸,



-NR⁷R⁸, -NR⁷C(=O)R⁸,









$-\text{NR}^7\text{C}(=\text{O})\text{NR}^8\text{R}^9$, $-\text{NR}^7\text{C}(=\text{S})\text{NR}^8\text{R}^9$,

Ar or Het; or

R^3 and R^4 together with the carbon atoms to which they are bonded may form a 5- or 6-membered cycloalkyl or heterocyclic ring compound having 0 to 3 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, and C(=O), wherein the cycloalkyl or heterocyclic ring compound may optionally be substituted with R^8 ;

Ar is a C₆ monocyclic aromatic compound, which is unsubstituted or optionally substituted with one or more selected from the group consisting of -F, -Cl, -OH, -NH₂, -CH₃ and -OCH₃; Het is selected from





R^5 is -H;

R^6 is -H or -CH₃;


R^7 is -H, halogen, -C(=O)(C₁-C₃ alkyl), -C₁-C₆ alkyl, -OC₁-C₆ alkyl, -C₃-C₆ cycloalkyl, or -OC(=O)(C₁-C₃ alkyl);

R^8 is -H, halogen, -OH, -CN, -NH₂, -NH(C₁-C₃ alkyl), -C(=O)NH₂, -CO₂H,





-C₁-C₆ alkyl, -OC₁-C₆ alkyl, -C₃-C₆ cycloalkyl, -Ph or



R⁹ is -H, -CN, -C₁-C₆ alkyl, -OC₁-C₆ alkyl, or -C(=O)(C₁-C₃ alkyl);

R¹⁰ is -NH(C₁-C₃ alkyl), -N(C₁-C₃ alkyl)₂, or -S(C₁-C₃ alkyl);

Z is -CH₂-



R^a is -H, -Cl or -CF₃;

p is 2;

A¹ is -CH₂- or -C(CH₃)₂-;

A² is -(CR¹¹R¹²)-, wherein R¹¹ and R¹² are each independently -H, -F, -CH₃, -CF₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, or or R¹¹ and R¹² together form a 3- or 4-membered spirocyclic non-aromatic ring compounds:

A³ is -(CH₂)_n-;

X is S or O;

m is an integer ranging from 0 to 3;

n is an integer ranging from 0 to 2;

q is an integer ranging from 1 to 3;

wherein said -C₁-C₃ alkyl, -C₃-C₆ cycloalkyl, -C₁-C₆ alkyl or -C₂-C₆ alkenyl is unsubstituted or substituted with one or more selected from the group consisting of -F, -Cl, -Br, -OH, CF₃, -CN, -CO₂H, -C(=O)CH₃, -OC(=O)CH₃, -C₁-C₃ alkyl, -OC₁-C₃ alkyl, and -Ph.

[0012] Specific examples of preferred compounds of formula 1 according to the present invention include:

15	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione
16	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione
17	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione
18	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
19	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
25	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
26	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione

EP 2 697 207 B1

(continued)

5	27	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	28	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione
10	29	(4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohept-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	31	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclopent-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	32	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclopent-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
15	34	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoic acid
	36	methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoate
20	37	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoic acid
	41	methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoate
25	42	(4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohept-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	43	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5-ethyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
30	44	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	46	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	47	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-methoxymethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	48	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyl-4-methyloxazolidin-2-one
40	49	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(3'-chloro-4,6'-dimethoxybiphenyl-3-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	50	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-chloro-2-methoxyphenyl)(cyclohex-1-enyl)(methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
45	51	(4S,5R)-3-((2-(1H-indol-4-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)(methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	52	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
50	56	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(dimethylamino)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	57	2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-5-methoxybenzaldehyde
55	58	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-(hydroxymethyl)-4-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	59	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-methoxy-2-methoxymethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

EP 2 697 207 B1

(continued)

5	60	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(quinolin-8-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-one
	61	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(trimethyl-1H-indazol-4-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-one
10	62	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	63	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	64	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
15	65	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-(isopropylphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	66	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-morpholinophenyl)cyclohex-1-enyl)-4-methyloxazolidin-2-one
20	67	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamide
	68	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl(cyclohex-1-enyl)-N-ethyl-4-methoxybenzamide
25	69	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide
	70	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-isopropyl-4-methoxybenzamide
30	71	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide
	72	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl(cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)isobutyramide
35		(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	79	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzaldehyde
40	80	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	81	(4S,5R)-3-((2-(5-acetyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
45	82	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	83	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(2-(trifluoromethoxy)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-one
50	84	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	85	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)ethyl acetate
55	86	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramide
	87	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-isopropyl-4-methoxy-N-methylbenzamide

EP 2 697 207 B1

(continued)

5	96	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	97	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
10	101	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5-tert-butyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	103	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	104	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
15	107	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	108	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
20	109	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	110	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide
25	111	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)isobutyramide
	112	N-(3-(2-(((4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide
30	113	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramide
	114	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-(methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	115	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	116	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
40	117	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	118	N-acetyl-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide
45	120	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
	121	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
50	122	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxopipendin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	123	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5,5-difluoro-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
55	124	methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(methyl)carbamate
	128	N-(3-(2-(((4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylmethanesulfonamide

(continued)

5	130	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-N-methylpropanamide
	132	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
10	133	methyl 2-(3-(2-(((4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetate
	134	2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetic acid
	136	N-(3-(2-(((4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanesulfonamide
15	137	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluoromethanesulfonamide
	138	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylcyclopropanesulfonamide
20	140	1-(3-(2-(((4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylthiourea
	141	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide
25	142	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	143	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
30	144	(4S,5R)-3-((2-(2-amino-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	145	N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-isopropylphenyl)-N-methylacetamide
35	146	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea
	147	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methylthio)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
40	148	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5,5-dimethyl-2-(2-(methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	149	(Z)-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-1,1-dimethylguanidine
45	151	(E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-3-methylguanidine
	153	(E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-1,3,3-trimethylguanidine
50	156	(Z)-methyl N-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl-N'-methylcarbamimidothioate
	157	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,3,3-trimethylurea
55	159	methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoate
	160	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-ylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

(continued)

5	161	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)amino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	162	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
	163	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-bromoacetamide
10	166	N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-isopropylphenyl)acetamide
	167	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-(methylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
15	168	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-(dimethylamino)-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	170	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
20	171	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(perfluoroprop-1-en-2-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	172	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
25	173	tert-butyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(isopropyl)carbamate
	174	tert-butyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(ethyl)carbamate
30	177	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-ethylacetamide
	178	(4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoro-1-(methoxyimino)ethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	179	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)acetamide
	180	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3,3-difluoroazetidine-1-carbonyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
40	181	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	182	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
45	183	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-((2-hydroxy-2-methylpropyl)(methyl)amino)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	184	(4S,5R)-3-((2-(5-acetyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
50	185	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	187	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-hydroxyazetidine-1-carbonyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
55	188	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-((R)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	189	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile

(continued)

5	190	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
	191	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	192	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(cyclopropanecarbonyl)-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
10	193	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	194	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
15	195	(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	196	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide
20	197	methyl 5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxybenzoate
	204	5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxybenzoic acid
25	206	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	207	(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
30	209	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide
	210	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylacetamide
35	212	(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)amino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	213	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(4-(trifluoromethyl)thiazol-2-ylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
40	215	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-methylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide
	216	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)acetamide
45	217	(4S,5R)-3-((2-(5-amino-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	218	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
50	222	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	223	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(6-methoxybenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
55	224	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylisobutyramide
	225	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylpropionamide

(continued)

5	226	N-(5-(2-((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylmethanesulfonamide
	227	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
10	228	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)trifluoromethanesulfonamide
	229	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2,4-dimethoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	230	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2,4-dimethoxyphenyl)-N-methylacetamide
15	232	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-hydroxy-2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	233	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-methoxy-5-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
20	234	N-(5-(2-(((4S,5R)-3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-ethyl-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide
	235	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-((2-hydroxy-2-methylpropyl)(methyl)amino)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
25	237	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	240	1-((5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)(methyl)amino)-2'-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate
30	241	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropoxy-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	243	1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)(methyl)amino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate
35	244	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-hydroxy-N,2-dimethylpropanamide
	246	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-4-methyl-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
40	247	(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxy-4-methylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	248	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)acetamide
45	249	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)-N-methylacetamide
	250	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoromethanesulfonamide
50	251	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide
	259	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylethanethioamide
55	271	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-thioxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide

(continued)

5	272	methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoate
	273	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoic acid
10	274	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	275	tert-butyl 6-(2-((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-5-methoxyindoline-1-carboxylate
	276	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxyindolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
15	277	(4S,5R)-3-((2-(1-acetyl-5-methoxyindolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	278	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxy-1-(2,2,2-trifluoromethyl)indolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
20	280	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxy-1-(methylsulfonyl)indolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	285	methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoate
25	286	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid
	291	(R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide
30	292	(S)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide
	293	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	294	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(2-methoxy-5-nitrophenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	295	(4S,5R)-3-((6-(5-amino-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
40	296	(R)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)spiro[2.5]oct-5-en-6-yl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide
	297	(S)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)spiro[2.5]oct-5-en-6-yl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide
45	298	(R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-N-methyl-2-phenylpropanamide
	299	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanamide
50	300	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanenitrile
	301	(4S,5R)-3-((2-(5-(2-(2H-tetrazol-5-yl)ethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
55	302	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	303	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

(continued)

5	304	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(3',5'-difluoro-4-methoxy-4'-(methoxymethoxy)biphenyl-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	305	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(3',5'-difluoro-4-methoxy-4'-methoxybiphenyl-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	306	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide
10	307	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile
	308	methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate
15	309	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoic acid
	310	methyl 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylbutanoate
20	311	4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylbutanoic acid
	312	ethyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylate
25	313	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylic acid
	314	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxamide
30	315	methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoate
	316	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	317	methyl 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetate
	318	2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetic acid
40	319	2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-methylacetamide
	320	2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
45	321	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N,2,2-trimethylpropanamide
	323	methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylate
50	324	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylic acid
	325	3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid
55	326	methyl 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
	327	7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid

(continued)

5	328	methyl 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoate
	329	3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide
10	330	ethyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenethyl)cyclobutanecarboxylate
	331	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenethyl)cyclobutanecarboxylic acid
	332	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzonitrile
15	333	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	334	(4R,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
20	335	(4S,5S)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	336	(4R,5S)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
25	337	7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxamide
	338	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
30	339	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	340	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	341	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	342	tert-butyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)acetate
40	343	tert-butyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)acetate
	344	(R)-methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)-3-methylbutanoate
45	345	(R)-methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)-3-methylbutanoate
	346	(R)-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)-3-methylbutanoic acid
50	347	methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylite
	348	2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)acetic acid
55	349	methyl 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropanoate
	350	3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid

(continued)

5	353	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	354	tert-butyl 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
	355	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
10	356	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	357	methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
15	358	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	359	methyl 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
20	360	(S)-methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)pyrrolidine-2-carboxylate
	361	(R)-methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzylamino)-3-methylbutanoate
25	362	4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclohex-3-enecarboxylic acid
	363	(R)-methyl 2-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)(methyl)amino)-3-methylbutanoate
30	364	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(((R)-2-(trifluoromethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	366	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(6-isopropyl-3-methoxypyridin-2-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	367	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(((S)-3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0013] Specific examples of more preferred compounds of formula 1 according to the present invention include:

40	15	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione
	17	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione
45	18	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	19	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
50	25	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	26	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione
55	27	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

(continued)

5	28	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione
	36	methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoate
10	44	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	48	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	79	3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzaldehyde
15	80	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	82	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
20	86	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramide
	97	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
25	101	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5-tert-butyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	103	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
30	104	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	107	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	108	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	109	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
40	110	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide
	112	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide
45	115	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	117	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
50	123	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5,5-difluoro-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	124	methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(methyl)carbamate
55	128	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylmethanesulfonamide
	130	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-N-methylpropanamide

(continued)

5	132	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	137	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluoromethanesulfonamide
10	181	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	182	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	184	(4S,5R)-3-((2-(5-acetyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
15	185	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	188	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-((R)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
20	189	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
	190	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
25	191	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	192	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(cyclopropanecarbonyl)-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
30	193	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	194	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	195	(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	196	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide
40	209	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide
	210	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylacetamide
45	212	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)amino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-ethyloxazolidin-2-one
	215	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide
50	222	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	223	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3(2-(6-methoxybenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
55	227	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
	234	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-ethyl-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide

(continued)

5	237	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	241	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropoxy-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
10	243	1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)(methyl)amino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate
	244	N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-hydroxy-N,2-dimethylpropanamide
	249	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4A-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)-N-methylacetamide
15	251	N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide
	272	methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoate
20	273	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoic acid
	274	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
25	285	methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoate
	286	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid
30	300	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanenitrile
	302	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
35	303	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
	308	methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate
40	313	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylic acid
	316	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
45	317	methyl 2(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetate
	321	3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N,2,2-trimethylpropanamide
50	323	methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylate
	324	1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylic
55		acid
	329	3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide


(continued)

338	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
340	(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
341	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
350	3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid
353	(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
366	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(6-isopropyl-3-methoxypyridin-2-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
367	(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(((S)-3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one


Preparation of compoundsMethods for preparing compounds

[0014] The compounds of formula I according to the present invention can be prepared according to the methods described in various literatures (WO 2006/014357 A1). Methods for preparing the compounds of formula I will now be described in detail with reference to reaction schemes.

[Reaction Scheme 1]



wherein A^1 , A^2 , A^3 , B^1 , B^2 , R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^a , p and X are as defined above; Y is a leaving group, preferably a halide group (e.g., chloride or bromide); and Q may represent $-B(OH)_2$ or



[0015] As shown in reaction scheme 1 above, the starting material compound II is allowed to react with phosphorus tribromide (PBr_3) or phosphorus oxychloride ($POCl_3$) in dimethylformamide (DMF), which is a Vilsmeier reaction, so as to introduce halogen into compound II.

[0016] In the reaction for preparing compound II, methylene chloride may be used as a solvent, and the reaction temperature is $0\sim 70^\circ C$, and preferably $0\sim 45^\circ C$.

[0017] Compound V can be prepared by subjecting compound III and compound IV to a Suzuki reaction (Morris, G. A., et al., Tetrahedron Lett., 2001, 42, 2093) or an Ullmann reaction (Martin G. Banwell et al. Org. Lett. 2004, 6, 2741).


In addition, compound IV used in the synthesis process can be prepared according to the method described in the literature (WO 2006/014357 A1, Erin F. DiMauro et al., J. Med. Chem. 2006, 49, 5671).

[0018] In the reaction for preparing compound V, dimethoxyethane (DME), dimethylsulfoxide (DMSO), water or the like is used as a solvent, and the reaction temperature is 80~150 °C, and preferably 80~100 °C. The resulting compounds V and III may be subjected to reductive amination with amino alcohol compound VI, prepared according to the method described in the literature (WO 2006/014357 A1, Jingjun Yin et al., J. Org. Chem. 2006, 840), thereby synthesizing compounds VII and VIII, respectively.

[0019] The resulting compounds VII and VIII can be converted to the desired compounds I and IX, respectively, by reaction with thiophosgene or triphosgene. In addition, the resulting compound IX may also be converted to the desired compound I by a Suzuki reaction with the compound IV.

[0020] As described above, the compounds of formula I are generally prepared according to the method shown in reaction scheme 1. In addition, compounds of examples of the present invention may also be prepared according to the following reaction schemes 2, 3, 4 and 5.

[Reaction Scheme 2]



Compound 15. $\text{X} = \text{S}$, $\text{R}_2 = 2\text{-methoxy-5-isopropylbenzene}$

Compound 16. $\text{X} = \text{S}$, $\text{R}_2 = 2\text{-methoxybenzene}$

Compound 17. $\text{X} = \text{S}$, $\text{R}_2 = 2\text{-methoxy-4-fluoro-5-isopropylbenzene}$

Compound 18. $\text{X} = \text{O}$, $\text{R}_2 = 2\text{-methoxybenzene}$

Compound 36. $\text{X} = \text{O}$, $\text{R}_2 = 2\text{-methoxy-5-methylbenzoate}$

Compound 41. $\text{X} = \text{O}$, $\text{R}_2 = 2\text{-methoxy-4-fluoro-5-methylbenzoate}$

Compound 51. $\text{X} = \text{O}$, $\text{R}_2 = 4\text{-indole}$

Compound 56. $\text{X} = \text{O}$, $\text{R}_2 = 2\text{-methoxy-5-dimethylbenzenamine}$

Compound 97. $\text{X} = \text{O}$, $\text{R}_2 = 2\text{-fluoro-5-trifluoromethylbenzene}$


Compound 115. $\text{X} = \text{O}$, $\text{R}_2 = 2\text{-methoxy-5-t-butylbenzene}$

Compound 117. $\text{X} = \text{O}$, $\text{R}_2 = 2\text{-methoxy-5-trifluoromethoxybenzene}$

[0021] Reaction scheme 2 above shows a general process for preparing compounds 15, 16, 17, 18, 36, 41, 51, 56, 97, 115 and 117 of the present invention, and other compounds of the present invention can also be prepared according to reaction scheme 2. As shown in reaction scheme 2, dimethylformamide (DMF) and phosphorus tribromide (PBr_3) are added dropwise to the starting material dimethylcyclohexanone to obtain compound 2 which is then subjected to a Suzuki reaction with commercially available boronic acid derivatives in the presence of a palladium catalyst, thus synthesizing


compound 3. The obtained compound 3 is converted to compound 5 by reaction with compound 4, prepared according to the method described in the literature (2006/014357 A1, Jingjun Yin et al., J. Org. Chem. 2006, 840). The obtained compound 5 can be converted into the desired compound 6 by reaction with thiophosgen or triphosgen.

[Reaction Scheme 3]




[0022] Reaction scheme 3 above shows a general process for synthesizing compounds 57, 60, 61 and 79 of the present invention, and other compounds of the present invention can also be prepared according to reaction scheme 3 above. The starting material compound 7 is allowed to react with compound 4, acetic acid and sodium cyanoborohydride to synthesize compound 8 which is then allowed to react with triphosgen, thereby preparing compound 9. The obtained compound 9 can be subjected to a Suzuki reaction (Morris, G. A., et al., Tetrahedron Lett., 2001, 42, 2093) with various boronic acids, thereby preparing desired compounds.

[Reaction Scheme 4]



[0023] Reaction scheme 4 above shows a general process for synthesizing compounds 133 and 134 of the present invention, and other compounds of the present invention can also be prepared according to reaction scheme 4 above. As shown in reaction scheme 4, the starting material compound 10 is allowed to react with iodine (I_2) and silver sulfate to synthesize compound 11 which is then allowed to react with bis(pinacolato)diboron in the presence of a palladium catalyst, thus preparing compound 12. Compound 9 and boronic acid may be added dropwise to the obtained compound 12, and then subjected to a Suzuki reaction (Morris, G. A., et al., Tetrahedron Lett., 2001, 42, 2093), thereby preparing compound 133. The obtained compound 133 can be converted into compound 134 by hydrolysis with lithium hydroxide ($LiOH$).

[Reaction Scheme 5]



[0024] Reaction scheme 5 above shows a general process for synthesizing compounds 110, 112, 128, 136, 137, 138, 141, 163 and 177 of the present invention, and other compounds of the present invention can also be prepared according

to reaction scheme 5 above. As shown in reaction scheme 5 above, the starting material boronic acid compound 13 is subjected to a Suzuki reaction (Morris, G. A., et al., Tetrahedron Lett., 2001, 42, 2093) with compound 2 to prepare compound 14 which is then nitrated with nitric acid, thus synthesizing compound 15. The obtained compound 15 may be subjected to the reactions shown in reaction scheme 2, thus synthesizing compound 16 and compound 52. The obtained compound 52 may be treated with a nickel metal to reduce the nitro group thereof, and then allowed to react with various acyl chloride or sulfonyl chloride compounds, thus preparing various compounds. The resulting compounds 110, 136 and 137 may be allowed to react with iodomethane, thus obtaining compounds 112, 128, 138, 141 and 177.

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55

[Reaction Scheme 6]



[0025] Reaction scheme 6 above shows a general process for synthesizing compounds 286 and 311 of the present

invention, and other compounds of the present invention can also be prepared according to reaction scheme 6 above. As shown in reaction scheme 6, the starting material 4-methoxyphenethyl bromide or 4-methoxybenzyl chloride is subjected to the reaction described in the paper (Akio Baba et al., Tetrahedron 2009, 65, 5462), thus synthesizing compound 19. The obtained compound 19 is allowed to react with iodine (I_2) and silver sulfate to synthesize compound 20 which is then allowed to react with bis(pinacolato)diboron in the presence of a palladium catalyst, thus preparing compound 21. Compound 2 is added dropwise to the obtained compound 21, and then subjected to a Suzuki reaction (Morris, G. A., et al., Tetrahedron Lett., 2001, 42, 2093), thus synthesizing compound 22. The obtained compound 22 is subjected to the reactions shown in reaction scheme 2 (reductive amination and cyclization) to synthesize compounds 285 and 310 which are then hydrolyzed with lithium hydroxide (LiOH), thus preparing the desired compounds 286 and 311.

Oc1cc(C(=O)O)ncn1 $\xrightarrow{\text{Br}_2, \text{H}_2\text{O}, \text{rt}}$ Oc1cc(C(=O)O)c(Br)cn1 **24** $\xrightarrow[\text{reflux, 2 days}]{\text{HCl/MeOH}}$ COC(=O)c1cc(Br)c(O)cn1 **25**
COC(=O)c1cc(Br)c(O)cn1 $\xrightarrow{\text{Meerwein's salt}}$ COC(=O)c1cc(Br)c(OC)cn1 **26** $\xrightarrow[\text{CH}_2\text{Cl}_2, -20^\circ\text{C}]{\text{DIBAL-H}}$ COC(=O)Cc1cc(Br)c(OC)cn1 **27** $\xrightarrow{\text{TiCl}_4, \text{CH}_2\text{Cl}_2}$ ClCc1cc(Br)c(OC)cn1 **28**
ClCc1cc(Br)c(OC)cn1 $\xrightarrow[\text{InBr}_3, \text{DCM}]{\text{OTMS}}$ COC(=O)C(C)(C)Cc1cc(Br)c(OC)cn1 **29** $\xrightarrow[\text{Pd(dppf)Cl}_2, \text{KOAc}]{\text{Bis(pinacolato)diboron}}$ COC(=O)C(C)(C)Cc1cc(Br)c(OC)cn1 **30**
COC(=O)C(C)(C)Cc1cc(Br)c(OC)cn1 $\xrightarrow[\text{DME/H}_2\text{O}, \text{MW}]{\text{2, Pd, Na}_2\text{CO}_3}$ COC(=O)C(C)(C)Cc1cc(OC)cn1 **31** $\xrightarrow[\text{CH}_2\text{Cl}_2, \text{rt}]{\text{4, NaBH}_3\text{CN, AcOH}}$ COC(=O)C(C)(C)Cc1cc(OC)cn1 **32**
COC(=O)C(C)(C)Cc1cc(OC)cn1 $\xrightarrow[\text{CH}_2\text{Cl}_2, \text{rt}]{\text{Triphosgene, DIPEA}}$ COC(=O)C(C)(C)Cc1cc(OC)cn1 **Compound 349** $\xrightarrow{\text{LiOH}}$ OC(=O)C(C)(C)Cc1cc(OC)cn1 **Compound 350**

33

to the literature (US 2010/0081673 A1). The starting material 6-hydroxynicotinic acid is allowed to react with bromine (Br₂) to obtain compound 24 which is then esterified, thus synthesizing compound 25. The obtained compound 25 is allowed to be reacted with Meerwein's salt (US 5929094 A1) to synthesize compound 26. The obtained compound 26 is reduced with diisobutylaluminum hydride (DIBAL-H) to obtain compound 27 which is then chlorinated with titanium chloride (TiCl₄), thus synthesizing compound 28. The resulting compound 28 is reacted with the reagents described in the paper (Akio Baba et al., Tetrahedron 2009, 65, 5462), thus synthesizing key intermediate compound 29. Then, compound 29 are subjected to the reactions shown in reaction schemes 4 and 6, thereby preparing the desired compounds 349 and 350.

10

15

20

25

30

35


40

45

50

55

[Reaction Scheme 8]



[0027] Reaction scheme 8 above shows a general process for synthesizing compound 366 of the present invention,

and other compounds of the present invention can also be synthesized according to reaction scheme 8 above. As shown in reaction scheme 8, the starting material 2-bromo-3-pyridinol is reacted with iodine (I₂) to synthesize compound 33 which is then methylated, thus synthesizing compound 34. The resulting compound 34 is subjected to a Suzuki reaction (Morris, G. A., et al., Tetrahedron Lett., 2001, 42, 2093) to synthesize compound 35 which is then reacted with intermediate compound 36, thus synthesizing compound 37. Then, various reactions (hydroxylation, oxidation (N-oxide)/reduction (DIBAL-H), and oxidation (Dess-Martin)) are carried out to obtain intermediate compound 41. Then, the reactions shown in reaction scheme 6 are carried out to obtain compound 43. Indium (In) and a saturated ammonium chloride aqueous solution are added dropwise to and reacted with compound 43, thus preparing compound 366.

[0028] The cycloalkenyl aryl derivatives of formula I may contain one or more asymmetric carbon atoms, and may thus occur as racemates, racemic mixtures, single enantiomers, diastereomeric mixtures, and individual diastereomers. Such isomers can be resolved using the methods of prior arts. For example, isomers of the cycloalkenyl aryl derivatives of formula I can be resolved by column chromatography or HPLC. Alternatively, any enantiomer of a compound of formula I can be obtained by stereospecific synthesis using optically pure starting materials or reagents of known configuration.

[0029] Some of the compounds of the present invention are observed as mixtures of atropisomers (rotamers) in the NMR spectra. The individual atropisomers as well as mixtures thereof are encompassed with the compounds of the present invention.

[0030] The compounds of formula I according to the present invention can be in the form of pharmaceutically acceptable salts derived from inorganic or organic acids. Preferred examples of acids which can be used to form pharmaceutically acceptable acid addition salts include hydrochloric acid, hydrobromic acid, sulfuric acid, phosphoric acid, nitric acid, acetic acid, glycolic acid, lactic acid, pyruvic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid, fumaric acid, malic acid, mandelic acid, tartaric acid, citric acid, ascorbic acid, palmitic acid, maleic acid, hydroxymaleic acid, benzoic acid, hydroxybenzoic acid, phenylacetic acid, cinnamic acid, salicylic acid, methanesulfonic acid, benzenesulfonic acid and toluenesulfonic acid.

[0031] Hereinafter, the present invention will be described in further detail with reference to examples, preparation examples and experimental examples. It is to be understood, however, that these examples are for illustrative purposes only and are not intended to limit the scope of the present invention.

Advantageous Effects

[0032] The present invention can provide novel cycloalkenyl aryl derivatives, racemates, racemic mixtures, enantiomers, diastereomeric mixtures, diastereomers, atropisomers and mixtures of atropisomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof, or solvates thereof, and preparation methods thereof.

[0033] In addition, the present invention can provide novel cycloalkenyl aryl derivatives, which have less side effects and can effectively inhibit CETP, racemates, racemic mixtures, enantiomers, diastereomeric mixtures, diastereomers, atropisomers and mixtures of atropisomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof, or solvates thereof and preparation methods thereof.

Best Mode

[Examples]

[0034] Hereinafter, the present invention will be described in further detail with reference to examples. It is to be understood, however, that these examples are illustrative purposes only and are not construed to limit the scope of the present invention.

Compound 15

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione

[0035] As shown in reaction scheme 2, intermediate 5 was synthesized. Thiophosgene (5 mL) and triethylamine (66 μ l, 0.44 mmol) was added dropwise to the obtained intermediate 5 (53 mg, 0.095 mmol), and then the reaction mixture was refluxed with stirring overnight at 100°C. After the completion, of the reaction, the reaction mixture was diluted with methylene chloride (CH₂Cl₂), washed with saturated sodium hydrogen carbonate solution and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (SiO₂, 5% Hex/EA), thus obtaining Compound 15 (10 mg, 18%).

[0036] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): 1:1.5 atropisomer mixture; δ 7.77 (s, 1H), 7.65 (s, 2H), 6.98-6.95 (m, 1H), 6.72-6.62

(m, 2H), 5.63-5.60 (m, 1H), 4.50 (bd, 1H), 4.14-4.11 (m, 0.6H), 4.01-3.97 (m, 0.4H), 3.66 (s, 1H), 3.61 (s, 2H), 2.75-2.67 (m, 1H), 2.46-2.42 (bm, 1H), 2.18-2.16 (bm, 1H), 2.01-1.77 (m, 3H), 1.45-1.36 (m, 2H), 1.11-1.04 (m, 6H), 0.94-0.92 (m, 6H), 0.31 (d, 1.2H, $J = 6.6$), 0.19 (d, 1.8H, $J = 6.6$). MS (ESI) m/z 600 ($M^+ + H$).

5 Compound 16

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione

10 **[0037]** Compound 16 (21 mg, 39%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 15.

[0038] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1.7 atropisomer mixture; δ 7.77 (s, 1H), 7.65 (s, 2H), 7.15 (m, 1H), 6.89-6.71 (m, 3H), 5.62 (d, 1H, $J = 8.3$), 4.52 (s, 0.5H), 4.48 (s, 0.5H), 4.16-3.97 (m, 1H), 3.70 (bd, 0.7H), 3.69-3.64 (bd, 3H), 3.58 (bd, 0.4H), 2.19-2.14 (bm, 1H), 2.01-1.76 (m, 3H), 1.42-1.34 (m, 2H), 0.93 (m, 6H), 0.34 (d, 1.1H, $J = 6.6$), 0.21 (d, 1.9H, $J = 6.6$).

15 Compound 17

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3(2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione

20 **[0039]** Compound 17 (38 mg, 70%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 15.

[0040] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1.5 atropisomer mixture; δ 7.78 (s, 1H), 7.65 (s, 2H), 6.89-6.67 (m, 1H), 6.43 (m, 1H), 5.63 (d, 1H, $J = 8.4$), 4.52-4.46 (m, 1H), 4.11-4.07 (m, 0.5H), 4.01-3.97 (m, 0.4H), 3.66 (bd, 0.6H), 3.65 (s, 1H), 3.59 (s, 2H), 3.56 (bd, 0.4H), 3.05-2.99 (m, 1H), 2.20-2.00 (bm, 1H), 1.91-1.77 (m, 2H), 1.42-1.37 (m, 2H), 1.12 (d, 3H, $J = 6.9$), 1.08 (d, 1.5H, $J = 6.9$), 1.02 (d, 1.3H, $J = 6.9$), 0.93 (m, 6H), 0.34 (d, 1.2H, $J = 6.6$), 0.24 (d, 1.8H, $J = 6.6$). MS (ESI) m/z 618 ($M^+ + H$).

30 Compound 18

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

35 **[0041]** As shown in reaction scheme 2, intermediate 5 was synthesized. The obtained intermediate 5 (43 mg, 0.083 mmol) was dissolved in methylene chloride (3 mL). Triphosgene (13 mg, 0.04 mmol) and diisopropylethylamine (0.09 mL, 0.49 mmol) were added dropwise to the obtained reaction mixture, and then stirred at room temperature for 1 hour. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography, thus obtaining Compound 18 (36 mg, 80%) as colorless oil.

40 **[0042]** ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1.5 atropisomer mixture; δ 7.74 (s, 1H), 7.62 (s, 2H), 7.14-7.09 (m, 1H), 6.89-6.71 (m, 3H), 5.50-5.46 (m, 1H), 3.92-3.79 (m, 2H), 3.66 (s, 1.3H), 3.63 (s, 1.8H), 3.48 (bd, 0.6H), 3.33 (bd, 0.4H), 2.20-2.00 (m, 1H), 2.00-1.81 (m, 3H), 1.41-1.35 (m, 2H), 0.94 (d, 3H, $J = 6$), 0.91 (s, 3H), 0.31 (d, 1.2H, $J = 6.6$), 0.19 (d, 1.8H, $J = 6.5$). MS (ESI) m/z 542 ($M^+ + H$).

45 Compound 19

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3(2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

50 **[0043]** Compound 19 (37 mg, 100%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0044] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1.2 atropisomer mixture; δ 7.75 (s, 1H), 7.62 (s, 2H), 6.68 (dd, 1H, $J = 8.7, 10.9$), 6.42 (dd, 1H, $J = 12, 17$), 5.50 (t, 1H, $J = 6.8$), 3.91-3.77 (m, 2H), 3.62 (s, 1.4H), 3.59 (s, 1.7H), 3.44 (bd, 0.6H), 3.31 (bd, 0.4H), 3.09-2.97 (m, 1H), 2.39-2.34 (bm, 0.5H), 2.12-2.01 (bm, 1H), 1.95-1.90 (bm, 0.6H), 1.82-1.80 (m, 2H), 1.43-1.32 (m, 2H), 1.11-1.01 (m, 6H), 0.94 (s, 3H), 0.90 (d, 3H, $J = 6.6$), 0.31 (d, 1.4H, $J = 6.5$), 0.22 (d, 1.6H, $J = 6.5$). MS (ESI) m/z 602.0 ($M^+ + H$).

Compound 25

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0045] Compound 25 (33 mg, 87%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0046] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.83 (s, 1H), 7.71 (s, 2H), 6.79-6.73 (m, 1H), 6.55-6.47 (m, 1H), 5.62-5.56 (m, 1H), 3.98-3.85 (m, 2H), 3.70 (s, 1.4H), 3.67 (d, 1.6H, *J* = 3.9), 3.59-3.35 (m, 1H), 3.13-3.07 (m, 1H), 2.25-2.02 (m, 2H), 1.82-1.71 (m, 3H), 1.35-1.28 (m, 1H), 1.19-1.09 (m, 6H), 1.04-1.02 (m, 3H), 0.39 (dd, 1.38H, *J* = 1.7, 6.5), 0.34 (d, 0.79H, *J* = 6.5), 0.30 (d, 0.82H, *J* = 6.5).

Compound 26

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione

[0047] Compound 26 (22 mg, 73%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 15.

[0048] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.88 (s, 1H), 7.76 (s, 2H), 6.82-6.78 (m, 1H), 6.59-6.49 (m, 1H), 5.78-5.73 (m, 1H), 4.75-4.25 (m, 1H), 4.40-4.07 (m, 1H), 3.82 (d, 0.3H), 3.75 (s, 1.5H), 3.71-3.58 (m, 0.7H), 3.69 (d, 1.5H, *J* = 4.1), 3.15-3.10 (m, 1H), 2.60-2.05 (bm, 3H), 1.85-1.77 (bm, 3H), 1.43-1.33 (m, 1H), 1.19-1.08 (m, 6H), 1.06 (d, 3H, *J* = 4.4), 0.46 (m, 1.1H), 0.40 (d, 0.7H, *J* = 6.6), 0.34 (d, 0.8H, *J* = 6.6).

Compound 27

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0049] Compound 27 (91 mg, 93%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0050] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.1 atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.80 (dd, 1H, *J* = 11.6, 8.7), 6.54 (dd, 1H, *J* = 16.9, 12.2), 5.61 (d, 1H, *J* = 8.1), 4.01-3.87 (m, 2H), 3.73 (s, 1.4H), 3.70 (s, 1.6H), 3.54 (d, 0.6H, *J* = 14.5), 3.43 (d, 0.4H, *J* = 14.9), 3.17-3.08 (m, 1H), 2.43-1.99 (bm, 4H), 1.81-1.73 (bm, 4H), 1.24-1.18 (m, 5H), 1.14 (d, 1H, *J* = 6.9), 0.42 (d, 1.4H, *J* = 6.5), 0.35 (d, 1.6H, *J* = 6.5). MS (ESI) *m/z* 574 (*M*⁺ + H).

Compound 28

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione

[0051] Compound 28 (75 mg, 82%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 15.

[0052] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.3 atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.76 (s, 2H), 6.81-6.54 (t, 1H, *J* = 8.8), 6.54 (dd, 1H, *J* = 12.2, 21.1), 5.77 (t, 1H, *J* = 8.7), 4.64-4.56 (bm, 1H), 4.22-4.08 (m, 1H), 3.78-3.68 (m, 1H), 3.75 (s, 1.23H), 3.69 (s, 1.64H), 3.7-3.09 (m, 1H), 2.44-2.00 (bm, 4H), 1.79-1.71 (bm, 4H), 1.31-1.12 (m, 6H), 0.46 (d, 1.3H, *J* = 6.6), 0.38 (d, 1.7H, *J* = 6.6). MS (ESI) *m/z* 590 (*M*⁺ + H).

Compound 29

(4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohept-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0053] Compound 29 (99 mg, 62%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0054] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.7 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 6.75 (2d, 1H, *J* = 8.6), 6.52 (2d, 1H, *J* = 12.2), 5.60 (dd, 1H, *J* = 8.1, 12.5), 4.04-3.87 (m, 2H), 3.72 (s, 1H), 3.69 (s, 2H), 3.47 (dd, 1H, *J* = 14.6), 3.15-3.05 (m, 1H), 2.47-2.24 (m, 4H), 1.84-1.80 (m, 2H), 1.72-1.48 (m, 4H), 1.21-1.11 (m, 6H), 0.40 (d, 1.1H, *J* = 6.5),

0.27 (d, 1.9H, $J = 6.5$), MS (ESI) m/z 588 ($M^+ + H$).

Compound 31

5 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclopent-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0055] Compound 31 (0.13 g, 81 %) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

10 **[0056]** ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.71 (s, 2H), 6.88 (d, $J = 8.7$, 1H), 6.57 (d, $J = 12.2$, 1H), 5.46 (d, $J = 8.0$, 1H), 4.20 (d, $J = 15.0$, 1H), 3.76-3.95 (m, 1H), 3.65 (s, 3H), 3.11-3.17 (m, 1H), 2.53-2.80 (m, 4H), 1.21-1.28 (m, 6H), 0.40 (m, 3H). MS (ESI) m/z 604 ($M^+ + 45$).

Compound 32

15 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclopent-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

20 **[0057]** Compound 32 (0.22 g, 89%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0058] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.85 (s, 1H), 7.69 (s, 2H), 7.08-7.10 (m, 1H), 6.90-6.91 (m, 1H), 6.81 (d, $J = 8.4$, 1H), 5.36 (d, $J = 8.1$, 1H), 4.23 (d, $J = 14.8$, 1H), 3.87-3.94 (m, 1H), 3.68 (m, 3H), 2.54-2.87 (m, 5H), 1.97-2.05 (m, 2H), 1.20-1.22 (m, 6H), 0.40 (m, 3H). MS (ESI) m/z 587 ($M^+ + H$).

Compound 34

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoic acid

30 **[0059]** Compound 36 (20 mg, 0.035 mmol) was dissolved in tetrahydropuran/water (3 mL, volume/volume 1:1). Lithium hydroxide (an excess amount) was added dropwise to the obtained solution, and then the reaction mixture was refluxed with stirring at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure, thus obtaining Compound 34 (16 mg, 60%) as white solid.

35 **[0060]** ^1H NMR (400 MHz, benzene- d_6); 1:1 atropisomer mixture; δ 8.19-8.14 (m, 1H), 8.03-8.01 (m, 1H), 7.63 (s, 1H), 7.41-7.15 (m, 2H), 6.39-6.3 (m, 1H), 4.78-4.76 (d, $J = 8.0$, 0.5H), 4.72-4.70 (d, $J = 8.0$, 0.5H), 4.19-4.16 (d, $J = 13.6$, 0.5H), 4.04-4.00 (d, $J = 13.6$, 0.5H), 3.49-3.31 (m, 2H), 3.14 (s, 1.5H), 3.11 (s, 1.5H), 2.38-1.98 (m, 4H), 1.67-1.56 (m, 5H), (-)0.09-(-)0.11 (d, $J = 6.5$, 1.5H), (-)0.15-(-)0.17 (d, $J = 6.5$, 1.5H). MS (ESI) m/z 558 ($M^+ + H$).

Compound 36

methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoate

45 **[0061]** Compound 36 (40 mg, 63%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

50 **[0062]** ^1H NMR (400 MHz, benzene- d_6); 1:1 atropisomer mixture; δ 8.11-8.05 (m, 1H), 7.96-7.91 (d, $J = 2.2$, 0.5H), 7.95-7.94 (d, $J = 2.2$, 0.5H), 7.62 (s, 1H), 7.38-7.36 (d, $J = 6.4$, 1H), 6.41-6.35 (dd, $J = 8.6$, 8.6, 1H), 4.76-4.74 (d, $J = 8.0$, 0.5H), 4.70-4.68 (d, $J = 8.0$, 0.5H), 4.20-4.16 (d, $J = 15.6$, 0.5H), 4.01-3.98 (d, $J = 15.6$, 0.5H), 3.58 (s, 1.5H), 3.52 (s, 1.5H), 3.43-3.30 (m, 3H), 3.16 (s, 1.5H), 3.12 (s, 1.5H), 2.16-2.07 (m, 3H), 1.67-1.55 (m, 4H), (-)0.12-(-)0.13 (d, $J = 6.5$, 1.5H), (-)0.17-(-)0.19 (d, $J = 6.5$, 1.5H). MS (ESI) m/z 573 ($M^+ + H$).

Compound 37

55 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoic acid

[0063] Compound 37 (19 mg, 80%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of

compound 34.

[0064] ¹H NMR (400 MHz, benzene-*d*₆); 1:1 atropisomer mixture; δ 8.19-8.14 (m, 1H), 8.03-8.01 (m, 1H), 7.63 (s, 1H), 7.41-7.15 (d, 2H), 6.39-6.35 (m, 1H), 4.83-4.81 (d, *J* = 8.4, 0.5H), 4.77-4.75 (d, *J* = 8.4, 0.5H), 4.17-4.13 (d, *J* = 15.2, 0.5H), 4.00-3.96 (d, *J* = 15.2, 0.5H), 3.49-3.31 (m, 2H), 3.14 (s, 1.5H), 3.11 (s, 1.5H), 2.42-1.90 (m, 3H), 1.46-1.23 (m, 4H), 1.06-0.83 (m, 6H), (-)0.06-(-)0.08 (d, *J* = 6.5, 1.5H), (-)0.13-(-)0.15 (d, *J* = 6.5, 1.5H). MS (ESI) *m/z* 586 (*M*⁺ + H).

Compound 41

methyl 3-(2-(((4*S*,5*R*)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoate

[0065] Compound 41 (45 mg, 70%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0066] ¹H NMR (400 MHz, benzene-*d*₆); 1:1 atropisomer mixture; δ 8.11-8.05 (m, 1H), 7.96-7.91 (d, 0.5H), 7.95-7.94 (d, 0.5H), 7.62 (s, 1H), 7.38-7.36 (d, 1H), 6.41-6.35 (dd, *J* = 8.6, 8.6, 1H), 4.80-4.78 (d, *J* = 8.0, 0.5H), 4.76-4.74 (d, *J* = 8.0, 0.5H), 4.16-4.13 (d, *J* = 15.0, 0.5H), 3.98-3.94 (d, *J* = 15.0, 0.5H), 3.58 (s, 1.5H), 3.52 (s, 1.5H), 3.43-3.30 (m, 2H), 3.16 (s, 1.5H), 3.12 (s, 1.5H), 2.04-1.93 (m, 3H), 1.42-1.22 (m, 4H), 1.02-0.86 (m, 6H), (-)0.09-(-)0.10 (d, *J* = 6.5, 1.5H), (-)0.16-(-)0.18 (d, *J* = 6.5, 1.5H). MS (ESI) *m/z* 600 (*M*⁺ + H).

Compound 42

(4*S*,5*R*,*Z*)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohept-1-enyl)methyl)-4-methyl-oxazolidin-2-one

[0067] Compound 42 (0.11 g, 75%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0068] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.9 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 7.04 (dd, 1H, *J* = 8.3, 2.0), 6.81-6.71 (m, 2H), 5.58 (2d, 1H, *J* = 8.0), 4.05-3.90 (m, 2H), 3.73 (d, 3H, *J* = 11.3), 3.51 (2d, 1H, *J* = 14.2), 2.85-2.76 (m, 1H), 2.52-2.27 (m, 4H), 1.85-1.82 (m, 2H), 1.71-1.51 (m, 4H), 1.20-1.14 (m, 6H), 0.38 (d, 1H, *J* = 6.5), 0.23 (d, 1.9H, *J* = 6.5). MS (ESI) *m/z* 574 (*M*⁺ + H).

Compound 43

(4*S*,5*R*)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5-ethyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0069] Compound 43 (0.12 g, 80%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0070] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.74 (s, 2H), 6.76-6.81 (m, 1H), 6.49-6.58 (m, 1H), 3.92-4.14 (m, 2H), 3.69-3.75 (m, 3H), 3.37-3.59 (m, 1H), 3.10-3.15 (m, 1H), 1.82-2.22 (m, 4H), 1.40-1.43 (m, 2H), 0.87-1.00 (m, 6H), 0.40 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 647 (*M*⁺ + H).

Compound 44

(4*S*,5*R*)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0071] Compound 44 (2 mg, 4%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0072] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.3 atropisomer mixture; δ 7.81 (s, 1H), 7.68 (s, 2H), 7.03-7.00 (m, 1H), 6.76-6.69 (m, 2H), 5.56 (d, 1H, *J* = 8.2), 3.96-3.83 (m, 2H), 3.69 (d, 3H, *J* = 11.1), 3.51 (2d, 1H, *J* = 14.6, 14.7), 2.61-2.74 (m, 1H), 2.18-2.12 (m, 2H), 1.98-1.82 (m, 2H), 1.50-1.45 (m, 5H), 1.18-1.11 (m, 6H), 0.99-0.94 (m, 6H), 0.37 (d, 1.3H, *J* = 6.6), 0.28 (d, 1.7H, *J* = 6.5). MS (ESI) *m/z* 584 (*M*⁺ + H).

Compound 46

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0073] Compound 36 (30 mg, 0.052 mmol) was dissolved in anhydrous tetrahydropuran (5 mL). Lithium hydroxide (5 mg, 0.08 mmol) was added dropwise to the obtained solution at -78°C, and then stirred at room temperature for 5 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with 1M HCl (hydrochloride) solution. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure, thus obtaining Compound 46 (20 mg, 60%) as white solid.

[0074] ¹H NMR (400 MHz, benzene-*d*₆); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.62 (s, 1H), 7.40-7.38 (d, *J* = 10.7, 2H), 7.10-6.96 (m, 2H), 6.51-6.45 (m, 1H), 4.73-4.71 (d, *J* = 7.9, 1H), 4.40-4.36 (m, 2H), 4.21-4.15 (m, 1H), 3.49-3.41 (m, 2H), 2.54-2.39 (m, 1H), 2.18-2.05 (m, 3H), 1.73-1.52 (m, 5H), -0.07-(-)0.08 (d, *J* = 6.5, 1.5H), (-)0.16-(-)0.18 (d, *J* = 6.5, 1.5H). MS (ESI) *m/z* 544 (*M*⁺ + H).

Compound 47

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methoxymethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0075] Compound 46 (6.8 mg, 0.013 mmol) was dissolved in anhydrous tetrahydropuran (2 mL). Sodium hydride (1 mg, 0.03 mmol) was added dropwise to the obtained solution at 0°C, and then stirred at room temperature for 30 minutes. Iodomethane (an excess amount) was added dropwise slowly to the reaction mixture at 0°C, and then stirred at room temperature for 3 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography, thus obtaining Compound 47 (5 mg, 97%) as white solid.

[0076] ¹H NMR (400 MHz, benzene-*d*₆); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.61 (s, 1H), 7.39-7.38 (m, 2H), 7.13-7.10 (m, 0.5H), 7.06-7.04 (m, 1H), 6.99-6.98 (m, 0.5H), 6.51-6.44 (m, 1H), 4.75-4.68 (dd, *J* = 7.9, 7.9, 1H), 4.22-4.13 (m, 3H), 3.53-3.44 (m, 2H), 3.25 (s, 1.5H), 3.23 (s, 1.5H), 3.19 (s, 1.5H), 3.10 (s, 1.5H), 2.51-2.47 (m, 1H), 2.22-2.09 (m, 3H), 1.71-1.61 (m, 4H), (-)0.07-(-)0.09 (d, *J* = 6.5, 1.5H), (-)0.18-(-)0.20 (d, *J* = 6.5, 1.5H). MS (ESI) *m/z* 558 (*M*⁺ + H).

Compound 48

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0077] Compound 48 (0.2 g, 79.5%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0078] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.76 (s, 1H), 7.63-7.61 (m, 2H), 7.15-6.64 (m, 1H), 6.49-6.40 (m, 1H), 5.57-5.47 (m, 1H), 3.91-3.77 (m, 2H), 3.63-3.59 (m, 3H), 3.56-3.29 (m, 1H), 3.05-3.00 (m, 1H), 2.35-1.97 (m, 6H), 1.80-1.50 (m, 1H), 1.15-1.00 (m, 6H), 0.34-0.21 (ddd, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 642 (*M*⁺ + H).

Compound 49

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(3'-chloro-4,6'-dimethoxybiphenyl-3-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0079] Compound 49 (2 mg, 33%) as a colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0080] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.5 atropisomer mixture; δ 7.82 (s, 1H), 7.70 (s, 2H), 7.37-7.32 (m, 1H), 7.22-7.11 (m, 3H), 6.90-6.81 (m, 2H), 4.01-3.87 (m, 2H), 3.78-3.70 (m, 6H), 3.68-3.50 (m, 1H), 2.28-2.02 (m, 4H), 1.79-1.72 (m, 4H), 0.41 (d, 1.2H, *J* = 6.5), 0.34 (d, 1.8H, *J* = 6.5). MS (ESI) *m/z* 654 (*M*⁺ + H).

Compound 50

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-chloro-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0081] Compound 50 (84 mg, 94%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0082] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.1 atropisomer mixture; δ 7.83 (s, 1H), 7.73 (d, 2H, *J* = 4.9), 7.17-7.13 (m, 1H), 6.95 (t, 1H, *J* = 2.4), 6.76 (dd, 1H, *J* = 8.8, 16.3), 5.59 (2d, 1H, *J* = 8.0), 3.98-3.88 (m, 2H), 3.73 (d, 3H, *J* = 11.8), 3.47 (2d, 1H, *J* = 14.7), 2.38-2.02 (m, 4H), 1.77-1.67 (m, 4H), 0.45 (d, 1.4H, *J* = 6.5), 0.36 (d, 1.6H, *J* = 6.5), MS (ESI) *m/z* 548(M⁺ + H).

Compound 51

(4S,5R)-3-((2-(1H-indol-4-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0083] Compound 51 (95 mg, 38%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0084] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture: δ 8.29 (bs, 1H), 7.80 (d, 1H, *J* = 7.4, 7.65 (d, 2H, *J* = 17), 7.26 (d, 1H, *J* = 8), 7.18-7.07 (m, 2H), 6.84 (dd, 1H, *J* = 17.7), 6.36-6.29 (bm, 1H), 5.48 (t, 1H, *J* = 8.0), 4.00-3.43 (m, 3H), 2.65-2.24 (m, 2H), 2.02-1.94 (m, 2H), 1.07 (t, 6H, *J* = 13), 0.25 (2d, 3H, *J* = 6.5).

Compound 52

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0085] As shown in reaction scheme 5, intermediate 16 was reacted with triphosgene, thus obtaining Compound 52 (0.13 g, 62%) as yellow oil.

[0086] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 8.16-8.20 (m, 1H), 7.90-7.92 (m, 1H), 7.87 (s, 1H), 7.74 (d, *J* = 8.0, 1H), 6.95 (t, *J* = 9.2, 1H), 5.67 (d, *J* = 8.3, 0.51H), 5.58 (d, *J* = 8.1, 0.43H), 3.91-4.04 (m, 2H), 3.54 (d, *J* = 1.3.9, 0.45H), 3.32 (d, *J* = 15.0, 0.54H), 2.10-2.27 (m, 2H), 1.89-2.00 (m, 2H), 1.49-1.54 (m, 2H), 1.03-1.10 (m, 6H), 0.42-0.48 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 633 (M+45).

Compound 56

-(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-dimethylamino)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0087] Compound 56 (50 mg, 62%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0088] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:2 atropisomer mixture: δ 7.85 (s, 1H), 7.73 (m, 2H), 6.81 (d, *J* = 8.9, 0.35H), 6.74 (d, *J* = 8.9, 0.65H), 6.60-6.66 (m, 1H), 6.44 (d, *J* = 3.0, 0.35H), 6.41 (d, *J* = 3.1, 0.65H), 5.57-5.59 (m, 1H), 3.89-4.08 (m, 2H), 3.67-3.70 (m, 3H), 3.51-3.67 (m, 1H), 2.81-2.86 (m, 6H), 2.06-2.51 (m, 2H) 1.93 (s, 2H), 1.43-1.55 (m, 2H), 1.01-1.05 (m, 6H), 0.47 (d, *J* = 0.6, 1H), 0.32 (d, *J* = 6.5, 2H), MS (ESI) *m/z* 630 (M+45).

Compound 57

2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-5-methoxybenzaldehyde

[0089] As shown in reaction scheme 3, intermediate 9 was synthesized. The obtained intermediate 9 (0.13 g, 0.20 mmol) was subjected to a Suzuki reaction with boronic acid (58 mg, 0.33 mmol), thus obtaining Compound 57 (0.11 g, 75%) as brown oil.

[0090] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture: δ 10.05 (s, 0.49H), 10.00 (s, 0.47H), 7.86 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 7.37-7.42 (m, 1H), 7.70-7.17 (m, 2H), 5.62-5.64 (m, 1H), 3.83-4.03 (m, 2H), 3.86 (d, *J* = 3.0, 3H), 2.15-2.39 (m, 4H), 1.72-1.88 (m, 4H), 3.82 (d, *J* = 3.4, 3H), 2.03-2.38 (m, 4H), 1.75 (d, *J* = 3.8, 4H), 0.37-0.42 (m, 3H), MS (ESI) *m/z*

542 ($M^+ + H$).

Compound 58

5 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-hydroxymethyl)-4-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl-4-methyloxazolidin-2-one

10 **[0091]** Compound 57 (94 mg, 0.17 mmol) was dissolved in methanol (2 mL). Sodium borohydride (10 mg, 0.19 mmol) was added dropwise slowly to the obtained solution at room temperature, and then stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with saturated ammonium solution. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with sodium sulfate anhydrous, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography, thus obtaining Compound 58 (85 mg, 90%) as colorless oil.

15 **[0092]** ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.74 (d, $J = 12.0$, 2H), 6.75-7.08 (m, 3H), 5.47-5.68 (m, 1H), 4.53-4.57 (m, 2H), 3.87-4.03 (m, 2H), 3.82 (d, $J = 5.4$, 3H), 3.62 (d, $J = 15.1$, 0.37H), 3.31 (d, $J = 14.7$, 0.61H), 2.09-2.21 (m, 4H), 1.73-1.77 (m, 4H), 0.46-0.57 (m, 3H). MS (ESI) m/z 544 ($M^+ + H$).

Compound 59

20 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-methoxy-2-(methoxymethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl-4-methyloxazolidin-2-one

[0093] Compound 59 (85 mg, 90%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 47.

25 **[0094]** ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$); 1:1.9 atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.75 (d, $J = 5.9$, 2H), 6.75-7.00 (m, 3H), 5.65 (d, $J = 8.0$, 0.63H), 5.58 (d, $J = 8.0$, 0.31H), 4.28 (d, $J = 5.6$, 0.67H), 4.25 (d, $J = 3.9$, 1.15H), 3.83-4.00 (m, 2H), 3.80-3.81 (m, 3H), 3.78 (d, $J = 12.7$, 0.32H), 3.40-3.42 (m, 3H), 3.34 (d, $J = 14.7$, 4H), 2.05-2.25 (m, 4H), 1.70-1.76 (m, 4H), 0.54 (d, $J = 6.5$, 0.95H), 0.40 (d, $J = 6.5$, 1.9H). MS (ESI) m/z 558 ($M^+ + H$).

Compound 60

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(quinolin-8-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-one

35 **[0095]** Compound 60 (8 mg, 22%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 57.

[0096] ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$); 1:2 atropisomer mixture; δ 8.94-8.86 (m, 1H), 8.17-8.10 (m, 1H), 7.90 (bd, 1H, $J = 14$), 7.75-7.72 (m, 1H), 7.67-7.62 (bm, 2H), 7.44-7.31 (m, 3H), 3.52-3.34 (m, 1H), 4.13-3.98 (m, 2H), 3.52-3.34 (m, 1H), 2.85-2.60 (m, 1H), 2.40-2.15 (m, 3H), 1.85-1.62 (m, 4H), 0.46 (d, 1H, $J = 6.6$), (-)0.34 (d, 2H, $J = 6.4$). MS (ESI) m/z 535 ($M^+ + H$).

40

Compound 61

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(1-methyl-1H-indazol-4-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-one

45

[0097] Compound 61 (16 mg, 46%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 57.

50 **[0098]** ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$); atropisomer mixture; δ 7.80 (d, 2H, $J = 11$), 7.66 (s, 2H), 7.34-7.25 (m, 2H), 6.82 (d, 1H, $J = 6.7$), 5.53 (d, 1H, $J = 15$), 3.86 (bs, 1H), 3.8-3.4 (bm, 1H), 2.6-2.18 (brm, 2H), 2.15 (s, 2H), 1.76 (bs, 4H), 0.38-0.11 (brm, 3H).

Compound 62

55 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0099] Hydroxyisobutylamidine (9 mg, 0.08 mol) was dissolved in tetrahydrofuran (0.5 mL). Sodium hydride (8 mg, 0.17 mmol) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at 50°C for 2 hours. Compound

36 (25 mg, 0.044 mmol) was added dropwise to the solution, and was refluxed with stirring at 90°C overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography, thus obtaining Compound 62 (17 mg, 63%) as white solid.

[0100] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.03-8.00 (m, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.78-7.73 (m, 3H), 6.98 (dd, 1H, *J* = 11.9, 8.7), 5.63 (m, 1H), 4.05-3.97 (m, 2H), 3.87 (d, 3H, *J* = 12.4), 3.48 (m, 1H), 3.17-3.05 (m, 1H), 2.25-2.05 (bm, 4H), 1.83-1.75 (bm, 4H), 1.40-1.25 (m, 6H), 0.44-0.39 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 624 (*M*⁺ + *H*).

Compound 63

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0101] Compound 19 (21 mg, 0.035 mmol) was dissolved in methylene chloride (1 mL). Boron tribromide (0.07 mL, 0.07 mmol) was added dropwise slowly to the obtained solution at -78°C, and stirred at room temperature for 3 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with saturated sodium carbonate solution. The reaction mixture was extracted with methylene chloride, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography, thus obtaining Compound 63 (5 mg, 25%) as colorless oil.

[0102] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.6 atropisomer mixture; δ 7.89 (d, *J* = 7.4, 1H), 7.74 (s, 2H), 6.72-6.75 (m, 1H), 6.57-6.64 (m, 1H), 6.04-6.06 (m, 1H), 5.72 (d, *J* = 8.0, 0.61H), 5.62 (d, *J* = 8.3, 0.37H), 3.98-4.06 (m, 1.65H), 3.75 (d, *J* = 14.7, 0.39H), 3.60 (s, 0.38H), 3.37 (d, *J* = 14.8, 0.61H), 3.10-3.15 (m, 1H), 1.48-2.26 (m, 6H), 0.67 (d, *J* = 6.5, 1.18H), 0.50 (d, *J* = 6.6, 1.94H). MS (ESI) *m/z* 588 (*M*⁺ + *H*).

Compound 64

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0103] Compound 64 (24 mg, 52%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 63.

[0104] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.89 (d, *J* = 5.4, 1H), 7.74 (s, 2H), 6.72-6.78 (m, 1H), 6.56-6.64 (m, 1H), 5.65-5.75 (m, 0.8H), 3.94-4.06 (m, 1.46H), 3.69 (m, 0.73H), 3.37 (d, *J* = 14.8, 0.5H), 3.10-3.13 (m, 1H), 1.29-2.28 (m, 7H), 1.04-1.28 (m, 6H), 0.89 (t, *J* = 6.7, 1H), 0.67 (t, *J* = 6.7, 0.99H), 0.47-0.52 (m, 1.5H). MS (ESI) *m/z* 574 (*M*⁺ + *H*).

Compound 65

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0105] Compound 65 (15 mg, 60%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 63.

[0106] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.89 (s, 1H), 7.75 (d, *J* = 9.3, 2H), 6.57-6.78 (m, 3H), 5.66-5.86 (m, 1H), 3.96-4.10 (m, 2H), 3.41-3.73 (m, 1H), 2.10-2.48 (m, 6H), 1.75 (m, 1H), 1.15-1.20 (m, 1H), 0.55-0.69 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 628 (*M*⁺ + *H*).

Compound 66

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-morpholinophenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0107] Compound 50 (40.0 mg, 0.073 mmol), palladium acetate (0.8 mg, 0.0037 mmol), biphenyl ligand (2.2 mg, 0.007 mmol), sodium tert-butoxide (10.5 mg, 0.11 mmol) and morpholine (10.9 mg, 0.13 mmol) were dissolved in toluene (1.0 mL). The obtained solution was refluxed in microwave-reactor with stirring at 100°C for 20 minutes. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (4 g silica, 4:1 = hexane : EtOAc), thus obtaining Compound 66 (12.8 mg, 29%) as brown solid.

[0108] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.87-7.73 (m, 3H), 6.84-6.60 (m, 3H), 5.62, 5.57 (2d, 1H, $J = 8.0$), 4.05-3.81 (m, 7H), 3.74, 3.70 (2s, 3H), 3.07-2.99 (m, 4H), 2.25-2.03 (m, 4H), 1.84-1.74 (m, 4H), 0.48, 0.34 (2s, 3H). MS(ESI): 599 (M^+).

5 Compound 67

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamide

[0109] Compound 34 (20 mg, 0.036 mmol), methylamine (13.5 μl , 0.02 mmol) and 1-hydroxybenzotriazole (5.6 mg, 0.04 mmol) were dissolved in methylene chloride (0.5 mL). 1-Ethyl-3-(3-dimethylpropyl)carbodiimide (7.9 mg, 0.04 mmol) was added dropwise to the obtained solution at 0°C , and stirred at room temperature overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was neutralized with saturated sodium hydrogen carbonate solution. The reaction mixture was extracted with methylene chloride, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (silica, 1% ~ 3% DCM/MeOH, thus obtaining Compound 67 (3 mg, 15%) as colorless oil.

[0110] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.86 (d, 1H, $J = 5.0$), 7.75-7.57 (m, 3H), 7.54-7.48 (m, 1H), 6.89 (dd, 1H, $J = 8.6, 6.5$), 6.30-6.16 (m, 1H), 5.54 (m, 1H), 4.07-3.93 (m, 2H), 3.85 (d, 3H, $J = 16.0$), 3.48-3.36 (m, 1H), 2.99 (dd, 3H, $J = 15.5, 4.8$), 2.40-2.01 (bm, 4H), 1.84-1.75 (bm, 4H), 0.45 (t, 3H, $J = 6.9$).

20 Compound 68

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-ethyl-4-methoxybenzamide

[0111] Compound 68 (11 mg, 61%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 67.

[0112] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.86 (d, 1H, $J = 4.8$), 7.75-7.58 (m, 3H), 7.51 (m, 1H), 6.89 (dd, 1H, $J = 8.5, 6.4$), 6.27-6.12 (m, 1H), 5.54 (m, 1H), 4.07-4.02 (m, 2H), 3.83 (d, 3H, $J = 15.6$), 3.52-3.37 (m, 3H), 2.17-2.05 (bm, 4H), 1.82-1.62 (bm, 4H), 1.28-1.20 (m, 2H), 0.47-0.43 (m, 3H).

30 Compound 69

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide

[0113] Compound 69 (23 mg, 100%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 67.

[0114] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.87 (d, 1H, $J = 6.8$), 7.73 (d, 2H, $J = 18.8$), 7.67 (dd, 1H, $J = 8.5, 2.4$), 7.58 (dd, 1H, $J = 8.3, 2.4$), 6.93 (t, 1H, $J = 8.8$), 6.88-6.55 (m, 1H), 5.65-5.42 (m, 1H), 4.24-3.94 (m, 4H), 3.85 (d, 3H, $J = 18.3$), 3.39 (dd, 1H, $J = 18.0, 15.3$), 2.42-2.05 (bm, 4H), 1.83-1.76 (bm, 4H), 0.51-0.46 (m, 3H). MS (ESI) m/z 639 ($\text{M}^+ + \text{H}$).

45 Compound 70

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-isopropyl-4-methoxybenzamide

[0115] Compound 70 (24 mg, 100%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 67.

[0116] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.86 (d, 1H, $J = 4.0$), 7.74 (d, 2H, $J = 9.4$), 7.71-7.56 (m, 1H), 7.48 (m, 1H), 6.88 (m, 1H), 6.00 (m, 1H), 5.55 (m, 1H), 4.30-4.20 (m, 1H), 4.07-3.93 (m, 2H), 3.83 (d, 3H, $J = 15.6$), 3.43 (q, 1H, $J = 15.0$), 2.30-2.04 (bm, 4H), 1.82-1.74 (bm, 4H), 1.28-1.22 (m, 6H), 0.45 (dd, 3H, $J = 12.9, 6.5$). MS (ESI) m/z 599 ($\text{M}^+ + \text{H}$).

Compound 71

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide

[0117] As shown in reaction scheme 5, (4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-oxooxazolidin-2-one (29 mg, 0.05 mmol) and diisopropylamine (0.01 mL, 0.08 mmol) were dissolved in tetrahydropuran (1 mL). Acetyl chloride (5 μ L, 0.08 mmol) was added dropwise slowly to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with saturated ammonium solution. The reaction mixture was extracted with ethyl acetate, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 2:1 = Hexane : EtOAc), thus obtaining Compound 71 (21 mg, 68%) as colorless oil.

[0118] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.84 (d, J = 9.8, 2H), 7.79 (s, 1H), 6.77-7.33 (m, 3H), 5.62 (d, J = 7.9, 0.5H), 5.52 (d, J = 8.0, 0.5H) 4.06-4.16 (m, 2H), 3.98 (t, J = 15.0, 1H), 3.76 (d, J = 7.8, 3H), 3.58 (d, J = 14.9, 0.5H), 3.38 (d, J = 14.8, 0.5H), 1.71-2.39 (m, 8H), 2.14 (d, J = 15.9, 3H), 0.44 (d, J = 6.5, 1.5H), 0.32 (d, J = 6.4, 1.5H). MS (ESI) m/z 571 (M^+ + H).

Compound 72

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)isobutyramide

[0119] Compound 72 (24 mg, 79%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 71.

[0120] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1.1 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.78 (s, 2H), 7.58 (d, J = 2.6, 0.5H), 7.25 - 7.27 (m, 0.5H), 7.22 (s, 0.5H), 7.13 (s, 0.5H), 7.03 (dd, J = 8.6, 2.7, 0.5H), 6.80 (t, J = 8.3, 1H), 5.63 (d, J = 8.0, 0.44H), 5.51 (d, J = 8.0, 0.54H), 4.04 - 4.15 (m, 2H), 3.76 (d, J = 4.1, 3H), 3.54 (d, J = 14.8, 0.6H), 3.41 (d, J = 14.8, 0.4H), 2.44 - 2.53 (m, 1H), 1.71 - 2.34 (m, 4H), 1.15 - 1.30 (m, 6H), 0.44 (d, J = 6.5, 1.6H), 0.36 (d, J = 6.4, 1.4H). (ESI) m/z 599 (M^+ + H).

Compound 76

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methylxazolidin-2-one

[0121] Compound 76 (14 mg, 52%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 62.

[0122] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.99-7.96 (m, 1H), 7.86 (s, 1H), 7.75-7.72 (m, 3H), 6.97 (dd, 1H, J = 8.7, 11.7), 5.62 (2d, 1H, J = 8.0, 8.0), 4.04-3.97 (m, 2H), 3.86 (d, 3H, J = 12.3), 3.47 (2d, 1H, J = 14.8, 14.9), 2.24-2.05 (m, 5H), 1.76-1.75 (m, 4H), 1.60-1.58 (m, 2H), 1.16-0.97 (m, 2H), 0.42-0.39 (m, 3H).

Compound 79

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzaldehyde

[0123] As shown in reaction scheme 4, a pinacolato compound was synthesized, and then subjected to a Suzuki reaction with Compound 9, thus obtaining Compound 79 (65 mg, 35%) as colorless oil.

[0124] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 9.86 (s, 1H), 9.81 (s, 1H), 7.83 (s, 1H), 7.82-7.71 (m, 3H), 7.56-7.53 (dd, 1H), 7.00-6.95 (dd, 1H), 5.64-5.54 (dd, 1H), 4.00-3.92 (m, 1H), 3.87 (s, 1.5H), 3.84 (s, 1.5H), 3.52-3.49 (d, 0.5H), 3.35-3.31 (d, 0.5H), 2.20-2.19 (m, 1H), 1.80-1.72 (m, 5H), 0.40-0.37 (m, 3H). MS (ESI) m/z 406 (M^+ + H).

Compound 80

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methylxazolidin-2-one

[0125] Compound 79 (65 mg, 0.117 mmol) was dissolved in tetrahydropuran (3 mL). Methylmagnesium chloride (56 μ L, 0.17 mmol) was added dropwise to the obtained solution at 0°C, and stirred at room temperature for 2 hours. After

the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with methylene chloride, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography (silica gel; Hexane/EtOAc = 6:1 ~ 3:1), thus obtaining Compound 80 (88 mg, 98%) as colorless oil.

5 **[0126]** ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.83 (s, 1H), 7.73-7.69 (m, 2H), 7.21-7.17 (m, 1H), 7.07 (m, 0.5H), 7.00-6.97 (m, 0.5H), 6.85-6.78 (dd, 1H), 5.59-5.56 (m, 0.5H), 5.50-5.44 (dd, 0.5H), 4.83-4.79 (m, 1H), 4.11-3.94 (m, 2H), 3.78-3.77 (d, 1.5H), 3.72 (s, 1.5H), 3.55-3.39 (m, 1H), 2.17-2.20 (m, 4H), 1.71 (brs, 4H), 1.46-1.39 (m, 3H), 0.43-0.33 (m, 3H). MS (ESI) m/z 557 (M⁺ + H).

10 Compound 81

(4S,5R)-3-((2-(5-acetyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

15 **[0127]** Compound 80 (88 mg, 0.158 mmol) was dissolved in methylene chloride (2 mL). Dess-Martin periodinane (0.17 mg, 0.35 mmol) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 1 hour. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography (silica gel; hexane/EtOAc = 5:1 ~ 3:1), thus obtaining Compound 81 (45 mg, 90%) as colorless oil.

20 **[0128]** ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (m, 0.5H), 7.78 (m, 0.5H), 7.75-7.72 (m, 0.5H), 7.64-7.58 (m, 1.5H), 7.43-7.41 (m, 2H), 6.42-6.39 (m, 1H), 4.83-4.17 (m, 1H), 4.17-4.02 (dd, 1H), 3.45-3.24 (m, 2H), 3.23 (s, 1.5H), 3.19 (s, 1.5H), 2.41-1.99 (m, 4H), 2.27 (s, 1.5H), 2.23 (s, 1.5H), 1.69-1.57 (m, 4H), (-)0.07-(-)0.12 (m, 3H). MS (ESI) m/z 556 (M⁺ + H).

25 Compound 82

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

30 **[0129]** Compound 82 (8.2 mg, 36%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 80.

[0130] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.62-7.61 (m, 1H), 7.40-7.29 (m, 3H), 7.291-7.18 (m, 1H), 6.53-6.49 (m, 1H), 4.74-4.69 (m, 1H), 4.28-4.19 (m, 1H), 3.56-3.33 (m, 2H), 3.30 (s, 1.5H), 3.26 (s, 1.5H), 2.54-2.10 (m, 4H), 1.74-1.65 (m, 4H), 1.42-1.37 (m, 6H), (-)0.07-(-) 0.16 (m, 3H). MS (ESI) m/z 572 (M⁺ + H).

35 Compound 83

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(2-(trifluoromethoxy)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-one

40 **[0131]** Compound 83 (96 mg, 95%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0132] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.75 (s, 2H), 7.33-7.22 (m, 3H), 7.17-7.14 (m, 1H), 5.64 (dd, J = 4.4, 8.0, 1H), 4.04-3.88 (m, 2H), 3.54, 3.42 (2d, J = 15.0, 1H), 2.36-2.04 (m, 4H), 1.81-1.73 (m, 4H), 0.49, 0.43 (2d, J = 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 568 (M⁺ + H).

Compound 84

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyl-oxazolidin-2-one

50 **[0133]** Compound 84 (0.14 g, 79%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0134] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.75 (s, 2H), 7.55-7.54 (m, 1H), 7.40-7.38 (m, 1H), 7.21-7.14 (m, 1H), 5.64 (d, J = 7.9, 1H), 4.15-3.92 (m, 2H), 3.51-3.47 (m, 1H), 2.39-2.20 (m, 4H), 1.78 (bs, 4H), 0.46 (d, J = 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 570 (M⁺ + H).

Compound 85

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)ethyl acetate

[0135] Compound 80 (65.0 mg, 0.117 mmol) was dissolved in tetrahydropuran (2 mL). Methylmagnesium chloride (56 μ L, 0.16 mmol) was added dropwise to the obtained solution at 0°C, and stirred at room temperature for 5 hours. After the completion of the reaction, ethyl acetate was added dropwise to the reaction mixture. And then, the reaction mixture was washed with water and brine, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (15% Hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 85 (30 mg, 70%) as white foam.

[0136] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.82 (s, 1H), 7.73 (d, J = 7.3, 1H), 7.25-7.17 (m, 1H), 6.99-6.93 (m, 1H), 6.84-6.77 (m, 1H), 5.82-5.71 (m, 1H), 5.60-5.55 (m, 1H), 3.99-3.87 (m, 2H), 3.75 (s, 1.5H), 3.72 (d, J = 9.4, 1.5H), 3.58-3.39 (m, 1H), 2.41-1.63 (m, 11H), 1.49-1.42 (m, 3H), 0.40-0.31 (m, 3H). MS (ESI) m/z 540.0 (M^+ +H-OAc).

Compound 86

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramide

[0137] Compound 86 (5 mg, 35%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 47.

[0138] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1.1 atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.75 (d, J = 7.2, 2H), 7.06-6.84 (m, 3H), 5.65-5.60 (m, 1H), 4.06-3.89 (m, 2H), 3.80 (d, J = 13.7, 3H), 3.54-3.44 (m, 1H), 3.18 (d, J = 24.4, 3H), 2.50-2.42 (m, 1H), 2.27-1.75 (m, 4H), 1.03-0.83 (m, 6H), 0.48 (d, J = 6.5, 1.4H), 0.39 (d, J = 6.4, 1.6H). MS (ESI) m/z 613 (M^+ + H).

Compound 87

3-(2-5(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-isopropyl-4-methoxy-N-methylbenzamide

[0139] Compound 87 (11 mg, 79%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 47.

[0140] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.77 (d, J = 6.7, 2H), 7.29-7.25 (m, 1H), 7.12, 7.07 (2d, J = 2.0, 1H), 6.86 (dd, J = 7.1, 8.4, 1H), 5.63-5.49 (m, 1H), 4.04-3.92 (m, 2H), 3.81 (d, J = 9.4, 3H), 3.53, 3.41 (2d, J = 15.0, 1H), 2.88-2.85 (m, 3H), 2.25-2.05 (m, 4H), 1.74 (bs, 4H), 1.20-1.15 (m, 6H), 0.44 (dd, J = 6.5, 15.2, 3H). MS (ESI) m/z 613 (M^+ + H).

Compound 96

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0141] Compound 96 (57 mg, 69%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0142] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.75-7.73 (m, 2H), 7.52-7.49 (m, 1H), 7.25-7.23 (m, 1H), 6.96-6.90 (m, 1H), 5.67, 5.65, 5.61, 5.49 (4d, J = 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 1H), 4.05-3.89 (m, 2H), 4.05-3.89 (m, 2H), 3.84, 3.82, 3.80 (3s, 3H), 3.55, 3.47, 3.38, 3.32 (4d, J = 15.0, 14.8, 14.9, 14.9, 1H), 2.29-2.19 (m, 3H), 1.87-1.71 (m, 3H), 1.45-1.26 (m, 1H), 1.08-1.06 (m, 3H), 0.42-0.37 (m, 3H). MS (ESI) m/z 596 (M^+ + H).

Compound 97

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0143] Compound 97 (77.8 mg, 75%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0144] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.75, 7.73 (2s, 2H), 7.51 (dm, 1H), 7.23

(d, 1H), 6.94 (d, $J = 8.7$, 0.5H), 6.91 (d, $J = 8.7$, 0.5H), 5.65 (d, $J = 8.1$, 0.5H), 5.55 (d, $J = 8.2$, 0.5H), 3.99-3.89 (m, 2H), 3.50 (d, $J = 14.9$, 0.5H), 3.33 (d, $J = 15.0$, 0.5H), 3.84 (s, 1.5H), 3.81 (s, 1.5H), 2.49-2.15 (m, 2H), 1.99-1.88 (m, 2H), 1.55-1.43 (m, 2H), 1.06, 1.02 (2s, 6H₃), 0.40 (d, $J = 6.6$, 1.5H), 0.37 (d, $J = 6.5$, 1.5H). MS (ESI) m/z 610 ($M^+ + H$).

5 Compound 101

(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5-tert-butyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

10 **[0145]** Compound 101 (0.31 g, 89%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0146] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.90-7.73 (m, 3H), 6.81-6.75 (m, 1H), 6.58-6.49 (m, 1H), 5.65-5.55 (m, 1H), 4.14-3.91 (m, 2H), 3.74-3.69 (m, 3H), 3.65-3.40 (m, 1H), 3.20-3.10 (m, 1H), 2.58-2.12 (m, 4H), 1.91-1.87 (m, 3H), 1.22-1.18 (m, 6H), 0.95 (d, $J = 2.6$, 9H), 0.41-0.28 (m, 3H). MS (ESI) m/z 630 ($M^+ + H$).

15 Compound 103

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

20 **[0147]** Compound 103 (65 mg, 73%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 80.

[0148] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.71 (m, 2H), 7.21-7.06 (m, 1H), 7.05-6.98 (m, 0.5H), 6.97-6.85 (m, 0.5H), 6.83-6.78 (m, 1H), 5.59-5.30 (m, 1H), 4.85-4.78 (m, 1H), 4.04-3.92 (m, 2H), 3.78-3.72 (m, 3H), 3.55-3.49 (m, 1H), 3.41-3.33 (m, 1H), 2.43-1.90 (m, 6H), 1.47-1.41 (m, 6H), 1.04-1.01 (m, 3H), 0.42-0.30 (m, 3H). MS (ESI) m/z 568.0 (M -OH).

Compound 104

30 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0149] Compound 104 (6 mg, 53%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 80.

35 **[0150]** ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.71 (d, $J = 8.3$, 2H), 7.33-7.30 (m, 1H), 7.18-7.17 (m, 0.5H), 7.078-7.072 (m, 0.5H), 6.82 (d, $J = 8.5$, 0.5H), 6.77 (d, $J = 8.5$, 0.5H), 5.57 (d, $J = 8.1$, 0.5H), 5.48 (d, $J = 8.1$, 0.5H), 4.05-3.90 (m, 2H), 3.77 (s, 1.5H), 3.72 (s, 1.5H), 3.53 (d, $J = 14.5$, 0.5H), 3.38 (d, $J = 14.5$, 0.5H), 2.60-1.70 (m, 6H), 1.55-1.151 (m, 6H), 1.04-1.00 (m, 6H), 0.40 (d, $J = 6.6$, 1.5H), 0.30 (d, $J = 6.6$, 1.5H). MS (ESI) m/z 583 (M^+ -OH).

40 Compound 107

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

45 **[0151]** Compound 107 (34 mg, 48%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0152] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.72 (s; 2H), 7.06 (dd, $J = 8.4$, 2.2, 1H), 6.82-6.72 (m, 2H), 5.60-5.57 (m, 1H), 4.01-3.89 (m, 2H), 3.73, 3.70 (2s, 3H), 3.58, 3.44 (2d, $J = 14.6$, 1H), 2.86-2.75 (m, 1H), 2.53-1.86 (m, 4H), 1.54-1.42 (m, 2H), 1.20-1.14 (m, 6H), 1.06-1.01 (m, 6H), 0.38, 0.28 (2d, $J = 6.5$, 3H). MS (ESI) m/z 584 ($M^+ + H$).

Compound 108

55 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0153] Compound 108 (80 mg, 55%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of

compound 18.

[0154] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.63 (m, 1H), 7.43-7.32 (m, 2H), 7.04-6.95 (m, 1H), 6.85-6.78 (m, 1H), 6.57-6.45 (m, 1H), 4.77-4.72 (m, 1H), 4.24-4.15 (m, 0.5H), 4.03-3.93 (m, 0.5H), 3.68-3.62 (m, 0.5H), 3.51-3.43 (m, 1.5H), 3.35-3.28 (m, 1.5H), 3.27-3.19 (m, 1.5H), 2.84-2.63 (m, 1H), 2.54-2.38 (m, 2H), 2.33-2.10 (m, 2H), 1.99-1.65 (m, 2H), 1.53-1.39 (m, 1H), 1.24-1.11 (m, 6H), (-)0.01-(-)0.27 (m, 3H). MS (ESI) m/z 625 (M⁺ + H).

Compound 109

(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0155] Compound 109 (87 mg, 93%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0156] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 6.76 (dd, *J* = 8.7, 3.6, 1H), 6.54, 6.50 (2d, *J* = 12.2, 1H), 5.61 (d, *J* = 8.1, 1H), 3.98-3.87 (m, 2H), 3.70 (d, *J* = 11.7, 3H), 3.55, 3.46 (2d, *J* = 14.7, 1H), 3.15-3.07 (m, 1H), 2.21-2.11 (m, 2H), 1.95-1.81 (m, 2H), 1.53-1.46 (m, 2H), 1.20-1.12 (m, 6H), 1.00-0.86 (m, 6H), 0.42, 0.35 (2d, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 602 (M⁺ + H).

Compound 110

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide

[0157] As shown in reaction scheme 5, intermediate 17 was synthesized. Intermediate 17 (48.0 mg, 0.078 mmol) and diisopropylamine (30.0 μl, 0.17 mmol) were dissolved in methylene chloride (1.5 mL). Acetyl chloride (12.3 μl, 0.17 mmol) was added dropwise slowly to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with saturated ammonium solution. The reaction mixture was extracted with ethyl acetate, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (4 g silica, 4:1 = hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 110 (21.6 mg, 42%) as white solid foam.

[0158] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.85, 7.84 (2s, 1H), 7.82, 7.77 (2s, 2H), 7.49 (d, *J* = 2.7, 0.5H), 7.35 (dd, *J* = 8.8, 2.7, 0.5H), 7.13 (d, *J* = 2.7, 0.5H), 7.12, 7.06 (2brs, 1H), 7.02 (dd, *J* = 8.8, 2.7, 1H), 6.82-6.78 (m, 1H), 5.61, 5.52 (2d, *J* = 8.0, 1H), 4.14-3.92 (m, 2H), 3.76, 3.74 (2s, 3H), 3.57, 3.39 (2d, *J* = 14.8, 1H), 2.49-2.21 (m, 2H), 2.16-2.12 (2s, 3H₃), 1.96-1.92 (brm, 2H), 1.54-1.41 (m, 2H), 1.04, 1.03, 1.02, 1.00 (4s, 0.41, 0.40, 0.35, 0.33 (4s, 3H, CH₃, 6H). MS (ESI) m/z 600 (M⁺ + H).

Compound 111

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)isobutyramide

[0159] Compound 111 (38.8 mg, 72%) as yellow solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0160] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.79, 7.77 (2s, 2H), 7.56 (d, *J* = 2.7, 0.5H), 7.32 (dd, *J* = 8.8, 2.7, 0.5H), 7.22 (d, *J* = 2.7, 0.5H), 7.08 (brs, 0.5H), 7.04 (dd, *J* = 8.8, 2.7, 0.5H), 7.02 (brs, 0.5H), 6.82-6.78 (m, 1H), 5.62, 5.51 (2s, 3H), 3.54, 3.41 (2d, *J* = 14.8, 1H), 2.52-2.08 (m, 3H), 1.94-1.92 (br m, 2H), 1.54-1.41 (m, 2H), 1.24-1.18 (m, 6H), 1.04, 1.03, 1.02, 1.00 (4s, 6H), 0.41, 0.40, 0.38, 0.37 (4s, 3H). MS (ESI) m/z 627 (M⁺ + H).

Compound 112

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide

[0161] Compound 110 (18 mg, 0.03 mmol) was dissolved in anhydrous tetrahydropuran (1 mL). Sodium hydride (4 mg, 0.09 mmol) was added dropwise to the obtained solution at 0°C, and stirred at room temperature for 30 minutes. Iodomethane (9.4 μl, 0.15 mmol) was added dropwise slowly to the reaction mixture at 0°C, and then stirred at room temperature for 3 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue

was separated by column chromatography, thus obtaining Compound 112 (14 mg, 76%) as white solid foam.

[0162] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.88 (s, 1H), 7.74 (s, 2H), 7.08-7.05 (m, 1H), 6.90-6.82 (m, 2H), 5.64 (d, *J* = 7.9, 1H), 4.05-3.91 (m, 2H), 3.81, 3.78 (2s, 3H), 3.53, 3.43 (2d, *J* = 14.8, 1H), 3.23, 3.17 (2s, 3H), 2.54-2.19 (m, 2H), 1.85, 1.82 (2s, 3H), 1.57-1.43 (m, 2H), 1.07, 1.05, 1.03, 1.02 (4s, 6H), 0.48, 0.46, 0.36, 0.35 (4s, 3H). MS (ESI) *m/z* 613 (M⁺ + H).

Compound 113

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramide

[0163] Compound 113 (28 mg, 86%) as yellow foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0164] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) atropisomer mixture; δ 7.88 (s, 1H), 7.75 (s, 2H), 7.07 (m, 1H), 6.90-6.82 (m, 2H), 5.63 (d, *J* = 8.1, 1H), 4.06-3.92 (m, 2H), 3.81, 3.78 (2s, 3H), 3.53, 3.43 (2d, *J* = 14.8, 1H), 3.21, 3.15 (2s, 3H), 2.52-2.15 (m, 3H), 1.99-1.87 (m, 2H), 1.56-1.40 (m, 2H), 1.06-0.94 (m, 12H), 0.47, 0.45, 0.37, 0.35 (4s, 3H). MS (ESI) *m/z* 641 (M⁺ + H).

Compound 114

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-(methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0165] Compound 9 was subjected to a Suzuki reaction with 6-(trifluoromethyl)benzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol, and then, the obtained intermediate compound was used as the same method as the synthesis of Compound 47, to obtain Compound 114 (60 mg, 74%) as white solid.

[0166] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (s, 3H), 7.55-7.47 (m, 1H), 7.13 (d, *J* = 7.8, 1H), 5.64, 5.57 (2d, *J* = 8.1, 1H), 4.36-4.26 (m, 2H), 4.01-3.81 (m, 2H), 3.71-3.21 (m, 1H), 3.43 (d, *J* = 4.1, 3H), 2.23-2.18 (m, 2H), 1.99-1.90 (m, 2H), 1.55-1.46 (m, 2H), 1.07-0.87 (m, 6H), 0.55, 0.38 (2d, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 624 (M⁺ + H).

Compound 115

(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0167] Compound 115 (9 mg, 39%) as a gray solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0168] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.71 (s, 2H), 7.22-7.19 (m, 1H), 6.95 (dd, *J* = 12.6, 2.5, 1 H), 6.80-6.72 (m, 1H), 5.60-5.54 (m, 1H), 4.00-3.86 (m, 2H), 3.73 (d, *J* = 9.9, 3H), 3.57, 3.43 (2d, *J* = 14.7, 1H), 2.55-2.04 (m, 2H), 1.93-1.91 (m, 2H), 1.52-1.42 (m, 2H), 1.28-1.23 (m, 9H), 1.04-1.00 (m, 6H), 0.36, 0.26 (2d, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 598 (M⁺ + H).

Compound 116

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide

[0169] 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzaldehyde (32 mg, 0.06 mmol), which is a starting material, and 2,2,2-trifluoroethane amine (5.4 μl, 0.067 mmol) were dissolved in methylene chloride (2 mL). The obtained solution was stirred at room temperature overnight. Sodium cyanoborohydride (4 mg, 0.056 mmol) and acetic acid (3.2 μl, 0.06 mmol) were added dropwise to the solution, and stirred at room temperature for 1 hour. After the completion of the reaction, the reaction mixture was neutralized with saturated sodium hydrogen carbonate solution, extracted with methylene chloride, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The obtained intermediate compound (39 mg, 0.06 mmol) was dissolved in methylene chloride (2 mL). Diisopropylethylamine (26 μl, 0.15 mmol) and acetyl chloride (4.6 μl, 0.06 mmol) were added dropwise carefully to the obtained solution, and stirred at room temperature for 2 hours. The reaction was quenched with water. The reaction mixture was extracted with

methylene chloride, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (silica, 20 ~ 50% Hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 116 (25 mg, 61%) as colorless oil.

[0170] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (d, *J* = 12.2, 2H), 7.08-6.98 (m, 1H), 6.88-6.75 (m, 2H), 5.62-5.54 (m, 1H), 4.67-4.53 (m, 2H), 4.03-3.90 (m, 4H), 3.78-3.69 (m, 3H), 3.50-3.31 (m, 1H), 2.21-2.15 (m, 2H), 2.04 (s, 3H), 1.92-1.88 (m, 2H), 1.52-1.45 (m, 2H), 1.05-1.00 (m, 6H), 0.43, 0.34 (dt, *J* = 5.9, 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 695 (M⁺ + H).

Compound 117

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0171] Compound 117 (27.8 mg, 67%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0172] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.74 (s, 2H), 7.11-7.08 (m, 1H), 6.89-6.81 (m, 2H), 4.01-3.89 (m, 2H), 3.79, 3.77 (2s, 3H), 3.56, 3.39 (2d, *J* = 14.8, 1H), 2.50-2.04 (m, 2H), 1.99-1.89 (m, 2H), 1.54-1.45 (m, 2H), 1.05, 1.05, 1.02, 1.019 (4s, 6H), 0.40, 0.39, 0.37, 0.35 (4s, 3H). MS (ESI) *m/z* 626 (M⁺ + H).

Compound 118

N-acetyl-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide

[0173] Compound 118 (0.15 g, 79%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 71.

[0174] MS (ESI) *m/z* 641 (M⁺ + H).

Compound 120

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide

[0175] As shown in reaction scheme 5, intermediate 17 was synthesized. Intermediate 17 (0.16 g, 0.29 mmol), a starting material, was reacted with di-tert-butyl carboxylate. The obtained intermediate compound was subjected to methylation, and then subjected to deprotection using hydrogen chloride, thus obtaining (4S,5R)-5-(bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxooxazolidin-2-one. The obtained compound (40 mg, 0.07 mmol), a starting material, was dissolved in methylene chloride (1.5 mL). Trifluoroacetic anhydride (TFAA) (20 μL, 0.14 mmol) was added dropwise to the obtained solution at room temperature diisopropylamine (37 μL, 0.21 mmol), and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with water. The reaction mixture was extracted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by Prep TLC (silica, 25% hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 120 (37 mg, 80%) as yellow oil.

[0176] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 7.12-7.09 (m, 1H), 6.89-6.83 (m, 2H), 5.61 (d, *J* = 8.0, 1H), 4.01-3.84 (m, 2H), 3.81, 3.78 (2s, 3H), 3.54-3.42 (m, 1H), 3.32 (s, 1.8H), 3.27 (s, 1.2H), 2.50-1.90 (m, 4H), 1.53-1.42 (m, 2H), 1.38, 1.29 (2d, *J* = 6.5, 3H), 1.04-0.99 (m, 6H).

Compound 121

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0177] As shown in reaction scheme 4, 3-iodo-4-methoxyaniline, a starting material, was subjected to acylation using acyl chloride and then reacted with sodium methoxide, a base, to synthesize a compound forming a ring. The obtained compound was reacted with bis(pinacolato)diborane to synthesize a pinacolato intermediate compound. The obtained pinacolato compound (0.05 g, 0.16 mmol) was subjected to a Suzuki reaction with Compound 9 (0.09 g, 0.138 mmol), thus obtaining Compound 121 (29 mg, 30%) as brown oil.

[0178] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (d, *J* = 7.4, 2H), 7.77 (m, 1H), 7.09-7.60 (m, 2H), 6.84

(t, $J = 1.0$, 1H), 5.62 (d, $J = 7.9$, 0.5H), 5.52 (d, $J = 8.0$, 0.5H) 3.70-4.12 (m, 4H), 3.80-3.82 (m, 3H), 2.12-2.60 (m, 6H), 2.05-2.11 (m, 2H), 1.45-2.11 (m, 2H), 1.01-1.04 (m, 6H), 0.31-0.42 (m, 3H). MS (ESI) m/z 626 ($M^+ + H$).

Compound 122

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0179] Compound 122 (18 mg, 21%) as brown oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 121.

[0180] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.83 (s, 1H), 7.81 (s, 2H), 6.82-7.17 (m, 3H), 5.58 (d, $J = 8.0$, 0.5H), 5.47 (d, $J = 7.9$, 0.5H), 3.95-4.02 (m, 2H), 3.78 (d, $J = 4.6$, 3H), 3.44-3.75 (m, 3H), 2.50-2.55 (m, 2H), 2.05-2.15 (m, 2H), 1.91-1.96 (m, 6H), 1.43-1.49 (m, 2H), 0.99-1.03 (m, 6H), 0.37-0.42 (m, 3H). MS (ESI) m/z 640 ($M^+ + H$).

Compound 123

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-(5,5-difluoro-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0181] Compound 123 (45 mg, 58%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0182] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 6.81-6.77 (m, 1H), 6.59-6.51 (m, 1H), 5.65-5.62 (m, 1H), 3.99-3.86 (m, 3H), 3.73 (s, 1.5H), 3.70 (s, 1.5H), 3.57 (d, $J = 14.8$, 1H), 3.46 (d, $J = 14.8$, 1H), 3.15-3.09 (m, 1H), 2.70-2.47 (m, 6H), 1.32-1.13 (m, 6H), 0.40 (d, $J = 6.5$, 1.5H), 0.33 (d, $J = 6.5$, 1.5H).

Compound 124

methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(methyl)carbamate

[0183] Compound 124 (18 mg, 55%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 120.

[0184] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.75 (s, 2H), 7.07-7.03 (m, 1H), 7.00-6.83 (m, 1H), 6.84-6.77 (m, 1H), 5.60-5.51 (m, 1H), 4.00-3.90 (m, 2H), 3.76 (d, $J = 5.4$, 3H), 3.68-3.57 (m, 3H), 3.55-3.42 (m, 1H), 3.34, 3.25 (2s, 3H), 2.40-2.04 (m, 2H), 1.92-1.88 (m, 2H), 1.52-1.41 (m, 2H), 1.03-1.00 (m, 6H), 0.41, 0.36 (2d, $J = 6.0$, 3H).

Compound 128

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylmethanesulfonamide

[0185] Compound 128 (30 mg, 59%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0186] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.86 (d, $J = 3.8$, 1H), 7.76 (d, $J = 10.2$, 2H), 7.02-7.24 (m, 2H), 6.83-6.88 (m, 1H), 5.58 (t, $J = 9.6$, 1H), 3.92-4.02 (m, 2H), 3.82 (d, $J = 1.0$, 3H), 3.38-3.57 (m, 1H), 3.28 (d, $J = 13.8$, 3H), 2.81 (d, $J = 28.0$, 3H), 2.10-2.47 (m, 2H), 1.94-2.02 (m, 2H), 1.44-1.51 (m, 2H), 1.02-1.06 (m, 6H), 1.36-1.48 (m, 3H). MS (ESI) m/z 650 ($M^+ + H$).

Compound 130

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-N-methylpropanamide

[0187] Compound 130 (17 mg, 43%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 120.

[0188] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.72 (d, $J = 5.0$, 2H), 7.07-7.03 (m, 1H), 6.92-6.83 (m, 2H), 5.61 (t, $J = 8.0$, 1H), 4.05-3.91 (m, 2H), 3.82, 3.78 (2s, 3H), 3.51-3.35 (m, 1H), 3.26, 3.19 (2s, 3H), 2.98-2.88 (m, 2H), 2.48-1.97 (m, 2H), 1.93-1.86 (m, 2H), 1.55-1.44 (m, 2H), 1.03-0.97 (m, 6H), 0.47, 0.39 (2d, $J = 6.0$,

3H). MS (ESI) m/z 681, 682 ($M^+ + 1$, $M^+ + 2$).

Compound 132

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)-phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0189] 2-Fluoro-4-methoxyacetophenone, a starting material, was subjected to several synthesis processes to obtain a pinacolato compound. The obtained pinacolato compound was subjected to a Suzuki reaction with Compound 2, thus synthesizing an aldehyde compound. The obtained aldehyde compound was reacted with Compound 4 to synthesize an amino alcohol compound, as an intermediate compound. The obtained amino alcohol compound was reacted with triphosgene, thus obtaining Compound 132 (24 mg, 68%) as colorless oil.

[0190] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.94-6.96 (m, 1H), 6.57-6.64 (m, 2H), 5.53-5.62 (m, 1H), 3.80-3.99 (m, 2H), 3.77-3.78 (m, 3H), 3.75-3.80 (m, 1H), 1.20-2.50 (m, 6H), 1.45-1.52 (m, 3H), 1.00-1.05 (m, 6H), 0.30-0.43 (m, 3H). MS (ESI) m/z 657 ($M^+ + \text{H}$).

Compound 133

Methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetate

[0191] As shown in reaction scheme 4, pinacolato compound was synthesized. The obtained pinacolato compound (0.1 g, 0.33 mmol), Compound 9 (0.17 g, 0.167 mmol), palladium catalyst (10 mg, 0.02 mmol) and sodium carbonate (70 mg, 0.65 mmol) were dissolved in dimethoxyethane/water (5 mL). The obtained solution was refluxed with stirring in microvessel at 120°C for 15 minutes. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with saturated ammonium chloride solution. The reaction product was extracted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 1:1 = Hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 133 (91 mg, 45%) as brown oil.

[0192] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.76 (d, $J = 7.0$, 2H), 7.09-7.13 (m, 1H), 6.76-6.93 (m, 2H), 5.61 (d, $J = 8.1$, 0.5H), 5.55 (d, $J = 8.0$, 0.5H), 3.90-4.03 (m, 2H), 3.75 (d, $J = 7.3$, 3H), 3.64 (d, $J = 38.0$, 3H), 3.41-3.68 (m, 2H), 3.41-3.68 (m, 1H), 2.04-2.53 (m, 2H), 1.89-1.98 (m, 2H), 1.42-1.54 (m, 2H), 1.01-1.04 (m, 6H), 0.33-0.37 (m, 3H). MS (ESI) m/z 615 ($M^+ + \text{H}$).

Compound 134

2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetic acid

[0193] Compound 133 (0.08 g, 0.13 mmol) was dissolved in dioxan/water (5 mL V/V 2:1). Lithium hydroxide (0.06 g, 1.32 mmol) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 6 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with saturated ammonium solution. The reaction mixture was extracted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 1:1 = Hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 134 (60 mg, 76%) as brown oil.

[0194] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1.3 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.74 (d, $J = 5.4$, 2H), 7.09-7.13 (m, 1H), 6.77-6.91 (m, 2H), 5.58 (t, $J = 7.7$, 1H), 3.92-4.02 (m, 2H), 3.70-3.76 (m, 3H), 3.41-3.60 (m, 2H), 3.41-3.60 (m, 1H), 2.17-2.50 (m, 2H), 1.88-1.97 (m, 2H), 1.41-1.54 (m, 2H), 1.04-1.07 (m, 6H), 0.41 (d, $J = 6.5$, 1.3H), 0.33 (d, $J = 6.5$, 1.7H). MS (ESI) m/z 601 ($M^+ + \text{H}$).

Compound 136

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanesulfonamide

[0195] Compound 136 (37 mg, 63%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0196] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.74 (d, $J = 6.4$, 2H), 7.16, 7.08 (2dd, $J = 8.7$, 2.7, 1H), 7.04, 6.94 (2d, $J = 2.7$, 1H), 6.83-6.78 (m, 1H), 6.35-6.28 (m, 1H), 5.59 (dd, $J = 4.5$, 8.0, 1H), 4.04-3.92 (m,

2H), 3.76, 3.74 (2s, 3H), 3.54, 3.39 (2d, $J = 14.0$, 1H), 2.46-2.01 (m, 3H), 1.92 (bs, 2H), 1.53-1.43 (m, 2H), 1.12-1.06 (m, 2H), 1.06-1.03 (m, 6H), 1.02-0.82 (m, 2H), 0.43, 0.38 (2d, $J = 6.5$, 3H).

Compound 137

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluoromethanesulfonamide

[0197] Compound 137 (43 mg, 98%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0198] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (d, $J = 4.9$, 2H), 7.29-7.25 (m, 1H), 7.21-6.99 (m, 1H), 6.96-6.81 (m, 1H), 5.63-5.51 (m, 1H), 3.98-3.87 (m, 2H), 3.84 (d, $J = 5.2$, 2H), 3.77 (d, $J = 8.3$, 1H), 3.56, 3.37 (2d, $J = 15.0$, 1H), 2.46-1.99 (m, 2H), 1.95-1.91 (m, 2H), 1.55-1.40 (m, 2H), 1.04-0.95 (m, 6H), 0.37-0.33 (m, 3H). MS (ESI) m/z 689 ($\text{M}^+ + \text{H}$).

Compound 138

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylcyclopropanesulfonamide

[0199] Compound 138 (21 mg, 66%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0200] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.75 (d, $J = 4.6$, 2H), 7.27-7.20 (m, 1H), 7.10, 7.04 (2d, $J = 2.7$, 1H), 6.83 (dd, $J = 12.1$, 8.8, 1H), 5.57 (dd, $J = 14.9$, 8.0, 1H), 4.01-3.91 (m, 2H), 3.77 (d, $J = 7.1$, 3H), 3.56, 3.41 (2d, $J = 14.6$, 1H), 3.30, 3.25 (2s, 3H), 2.47-2.22 (m, 3H), 1.92 (bm, 2H), 1.51-1.44 (m, 2H), 1.11-0.84 (m, 4H), 1.02-1.00 (m, 6H), 0.39 (dd, $J = 6.5$, 2.4, 3H). MS (ESI) m/z 675 ($\text{M}^+ + \text{H}$).

Compound 140

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylthiourea

[0201] As shown in reaction scheme 5, intermediate 17 was synthesized. Intermediate 17 (30 mg, 0.049 mmol) was dissolved in ethanol. Isothiocyanato methane (an excess amount) was added dropwise to the obtained solution, and then refluxed with stirring. After the completion of the reaction, the reaction mixture was extracted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 15% ~ 35% = hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 140 (20 mg, 59%) as white solid.

[0202] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:2 atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.75 (s, 1H), 7.72 (s, 1H), 7.08-6.96 (m, 1H), 6.92-6.87 (m, 2H), 5.63 (m, 0.5H), 5.42-5.40 (m, 0.5H), 4.32-4.29 (m, 0.5H), 4.18-4.10 (m, 1H), 3.96-3.92 (m, 0.5H), 3.87 (s, 2H), 3.76 (s, 1H), 3.18-3.10 (m, 3H), 2.45-2.39 (m, 1H), 2.208-1.87 (m, 2H), 1.80-1.71 (m, 3H), 1.03-1.00 (m, 6H), 0.62-0.60 (d, $J = 6.4$, 2H), 0.52-0.51 (d, $J = 6.4$, 1H). MS(ESI) 630 ($\text{M}+\text{H}$) $^+$.

Compound 141

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide

[0203] Compound 141 (23 mg, 62%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0204] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.73 (d, $J = 4.1$, 2H), 7.24-7.17 (m, 1H), 7.03, 6.99 (2d, $J = 2.7$, 1H), 6.86 (dd, $J = 13.4$, 8.8, 1H), 5.58, 5.52 (2d, $J = 8.0$, 1H), 3.97-3.81 (m, 2H), 3.79 (d, $J = 7.0$, 3H), 3.56 (d, $J = 15.0$, 0.5H), 3.42 (d, $J = 15.3$, 3H), 3.36 (d, $J = 14.9$, 0.5H), 2.46-2.04 (m, 2H), 1.99-1.94 (m, 2H), 1.55-1.42 (m, 2H), 1.02 (d, $J = 11.6$, 6H), 0.37, 0.32 (2d, $J = 6.5$, 3H). MS (ESI) m/z 703 ($\text{M}^+ + \text{H}$).

Compound 142

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0205] As shown in reaction scheme 5, intermediate 17 was synthesized. Intermediate 17 (50 mg, 0.081 mmol) was reacted with 2-bromoethane amine (20 mg, 0.10 mmol) to synthesize an intermediate compound. The obtained intermediate compound (0.1 g, 0.167 mmol), diisopropylethylamine (43 μ L, 0.25 mmol) and triphosgene (25 mg, 0.08 mmol) were dissolved in methylene chloride (3 mL). The obtained solution was stirred at room temperature. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with saturated ammonium solution. The reaction mixture was extracted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 10% ~ 20% = hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 142 (61.6 mg, 59%) as white solid.

[0206] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.83 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 7.54-7.53 (m, 0.5H), 7.32-7.25 (m, 0.5H), 7.10-7.07 (m, 0.5H), 6.88-6.83 (m, 1H), 5.59-5.51 (dd, J = 8.2, 23.7, 1H), 5.50-5.48 (d, J = 7.9, 0.5H), 4.09-3.86 (m, 2H), 3.74-3.67 (m, 3H), 3.57-3.53 (d, J = 14.7, 0.5H), 3.41-3.37 (d, J = 4.7, 0.5H), 2.45-2.41 (m, 0.5H), 2.24-2.22 (m, 1H), 2.17-2.13 (m, 0.5H), 1.93-1.91 (m, 3H), 1.61 (brs, 2H), 1.51-1.41 (m, 3H), 1.02-1.00 (m, 6H), 0.39-0.35 (m, 3H). MS (ESI) m/z 626 (M^+ + H).

Compound 143

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0207] Compound 143 (10 mg, 32%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 142.

[0208] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.83 (s, 1H), 7.77-7.72 (m, 2H), 7.29 (m, 0.5H), 7.17-7.16 (m, 0.5H), 7.14-7.07 (m, 0.5H), 6.97-6.94 (0.5H), 6.80-6.75 (m, 1H), 6.49-6.44 (m, 1H), 5.61-5.59 (d, J = 7.9, 0.5H), 5.50-5.48 (d, J = 7.9, 0.5H), 4.09-3.86 (m, 2H), 3.74-3.67 (m, 3H), 3.57-3.53 (d, J = 14.7, 0.5H), 3.41-3.37 (d, J = 14.7, 0.5H), 2.45-2.41 (m, 0.5H), 2.24-2.22 (m, 1H), 2.17-2.13 (m, 0.5H), 1.93-1.91 (m, 3H), 1.61 (brs, 2H), 1.51-1.41 (m, 3H), 1.02-1.00 (m, 6H), 0.39-0.35 (m, 3H). MS (ESI) m/z 627 (M^+ + H).

Compound 144

(4S,5R)-3-(((2-(2-amino-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0209] Compound 144 (54 mg, 50%) as brown oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 132.

[0210] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:2 atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.63-6.96 (m, 3H), 5.63 (d, J = 8.0, 0.68H), 5.54 (d, J = 8.1, 0.32H), 3.71-4.04 (m, 2H), 3.49 (d, J = 14.6, 1H), 2.70-2.81 (m, 1H), 2.21-2.31 (m, 2H), 1.90-2.05 (m, 2H), 1.48-1.55 (m, 2H), 1.10-1.31 (m, 6H), 1.04-1.09 (m, 6H), 0.57 (d, J = 6.5, 1H), 0.33 (d, J = 6.5, 2H). MS (ESI) m/z 569 (M^+ + H).

Compound 145

N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-isopropylphenyl)-N-methylacetamide

[0211] According to the same method as the synthesis of compound 110, compound 166 was synthesized and then reacted with iodomethane to obtain Compound 145 (10 mg, 45%) as yellow oil.

[0212] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.90 (s, 1H), 7.79 (d, J = 15.0, 2H), 6.90-7.20 (m, 3H), 5.70-5.73 (m, 1H), 3.94-4.13 (m, 2H), 3.13-3.41 (m, 1H), 2.87-3.24 (m, 3H), 2.82-3.00 (m, 1H), 1.62-2.30 (m, 4H), 1.44-1.49 (m, 2H), 1.17-1.29 (m, 6H), 1.00-1.29 (m, 6H), 0.42-0.72 (m, 3H). MS (ESI) m/z 625 (M^+ + H).

Compound 146

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea

[0213] Compound 146 (21 mg, 55%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0214] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) atropisomer mixture; δ 7.82 (s, 1H), 7.79 (d, *J* = 6.2, 2H), 7.77-7.11 (m, 1H), 7.09-6.92 (m, 1H), 6.76 (t, *J* = 9.0, 1H), 6.14 (d, *J* = 14.4, 1H), 5.59, 5.44 (2d, *J* = 7.9, 1H), 4.05-3.91 (m, 2H), 3.73 (s, 3H), 3.52-3.41 (m, 1H), 3.00 (d, *J* = 15.4, 6H), 2.42-2.09 (m, 2H), 1.93-1.89 (m, 2H), 1.50-1.41 (m, 2H), 1.01-0.99 (m, 6H), 0.40, 0.36 (2d, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 628 (M⁺ + H).

Compound 147

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methylthio)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0215] As shown in reaction scheme 5, intermediate 17 was synthesized. Intermediate 17 (50 mg, 0.076 mmol), a starting material, was dissolved in chloroform (1.5 mL). Dimethyl sulfide (10 μl, 0.11 mmol) and tert-butyl nitrile (18 μl, 0.15 mmol) were added dropwise to the obtained solution at room temperature, stirred at room temperature for 30 minutes, and then refluxed with stirring and heating for 3 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was cooled down to room temperature, diluted with n-hexane, and immediately purified by column chromatography (silica, 20% Hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 147 (9 mg, 21 %) as yellow oil.

[0216] (ESI) *m/z* (586.2 neg.(M⁺ - H)).

Compound 148

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5,5-dimethyl-2-(2-(methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0217] Compound 148 (25 mg, 50%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 57.

[0218] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 7.12-7.10 (m, 2H), 6.85-6.83 (m, 1H), 5.64, 5.61 (2d, *J* = 8.0, 1H), 4.10-4.05 (m, 1H), 3.91-3.83 (m, 1H), 3.54, 3.28 (2d, *J* = 15.0, 1H), 2.60-2.00 (m, 2H), 2.41 (s, 3H), 1.94 (bm, 2H), 1.56-1.46 (m, 2H), 1.08-1.03 (m, 6H), 0.50, 0.37 (2d, *J* = 6.5, 3H).

Compound 151

(E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-3-methylguanidine

[0219] As shown in reaction scheme 5, intermediate 17 was synthesized. Intermediate 17 (70 mg, 0.113 mmol), a starting material, was reacted with diphenyl cyanocarboimide to synthesize an intermediate compound. The obtained intermediate compound (70 mg, 0.1 mmol) and methylamine (13 mg, 0.2 mmol) were dissolved in acetonitrile (3 mL). The obtained solution was refluxed with stirring at 80°C. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with methylene chloride, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 25% ~ 35% = Hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 151 (30 mg, 47%) as white solid.

[0220] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:2 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73 (s, 1H), 7.67 (s, 1H), 7.09-7.05 (m, 1H), 6.95-6.87 (m, 2H), 5.40-5.38 (m, 1H), 4.36-4.32 (m, 0.5H), 4.22-4.18 (m, 1H), 3.94-3.91 (m, 0.5H), 3.88 (s, 2H), 3.76 (s, 1H), 3.08-3.05 (m, 1H), 2.84-2.80 (m, 3H), 2.50-2.37 (m, 1H), 2.08-1.91 (m, 3H), 1.69 (brs, 2H), 1.56-1.42 (m, 2H), 1.03-0.97 (m, 6H), 0.64-0.62 (d, *J* = 6.6, 2H), 0.57-0.56 (d, *J* = 6.5, 1H). MS (ESI) 638 (M+H)⁺.

Compound 149

(Z)-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-1,1-dimethylguanidine

[0221] Compound 149 (20 mg, 51 %) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 151.

[0222] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.74-7.72 (m, 2H), 6.95-6.91 (m, 1H), 6.84-6.75 (m, 1H), 6.70-6.68 (m, 1H), 5.61-5.55 (dd, *J* = 8.1, 17.2, 1H), 4.07-3.92 (m, 2H), 3.88 (s, 1.5H), 3.76 (s, 1.5H), 3.63-3.59 (d, *J* = 14.6, 0.5H), 3.51-3.47 (d, *J* = 14.6, 0.5H), 2.95-2.92 (m, 6H), 2.45-2.22 (m, 2H), 1.92 (s, 2H), 1.65 (brs, 2H), 1.49-1.43 (m, 1H), 1.03-0.94 (m, 6H), 0.52-0.50 (d, *J* = 6.5, 1.5H), 0.42-0.41 (d, *J* = 6.5, 1.5H). MS (ESI) *m/z* 652 (*M*⁺ + H).

Compound 153

(E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-1,3,3-trimethylguanidine

[0223] Compound 153 (5 mg, 25%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 47.

[0224] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) 1:1 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.74-7.72 (m, 2H), 6.89-6.79 (m, 2H), 6.67-6.62 (m, 1H), 5.63-5.58 (m, 1H), 4.04-3.89 (m, 2H), 3.76-3.73 (m, 3H), 3.55-3.43 (m, 1H), 3.37-3.31 (m, 3H), 2.81-2.79 (m, 6H), 2.40-2.20 (m, 1H), 1.99 (s, 2H), 1.53-1.49 (m, 4H), 1.04-0.96 (m, 6H), 0.49-0.48 (d, *J* = 6.5, 1.5H), 0.39-0.37 (d, *J* = 6.5, 1.5H). MS (ESI) *m/z* 666 (*M*⁺ + H).

Compound 156

(Z)-methyl N-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl-N'-methylcarbamimidothioate

[0225] Compound 156 (16 mg, 64%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 47.

[0226] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (d, *J* = 9.1, 2H), 7.11-7.08 (m, 1H), 6.90-6.83 (m, 2H), 5.60, 5.53 (2d, *J* = 8.0, 1H), 4.64-4.63 (m, 0.5H), 4.29-4.27 (m, 0.5H), 4.19-3.95 (m, 2H), 3.82, 3.75 (2s, 3H), 3.45, 3.21 (2d, *J* = 15.0, 1H), 3.21, 3.16 (2s, 3H), 2.71 (dd, *J* = 14.7, 4.7, 3H), 2.45-2.0 (m, 2H), 1.92 (s, 2H), 1.51-1.46 (m, 2H), 1.04-1.00 (m, 6H), 0.53, 0.41 (2d, *J* = 6.6 Hz, 3H).

Compound 157

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,3,3-trimethylurea

[0227] Compound 157 (8 mg, 44%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0228] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.95-6.91 (m, 1H), 6.79, 6.77 (dd, *J* = 8.8, 1H), 6.72 (dd, *J* = 13.0, 2.7, 1H), 5.61 (dd, *J* = 4.4, 8.0, 1H), 4.02-3.89 (m, 2H), 3.74 (d, *J* = 8.9, 3H), 3.53, 3.44 (2d, *J* = 14.0, 1H), 3.13, 3.06 (2s, 3H), 2.65 (d, *J* = 12.3, 6H), 2.50-2.00 (m, 2H), 2.07-2.04 (m, 2H), 1.50-1.45 (m, 2H), 1.04-0.99 (m, 6H), 0.43, 0.33 (2d, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 642 (*M*⁺ + H).

Compound 159

methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoate

[0229] Compound 159 (30 mg, 32%) as brown oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 133.

[0230] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73-7.75 (m, 2H), 7.13-7.16 (m, 1H), 6.77-6.96 (m, 2H), 5.31-5.61 (m, 1H), 3.89-4.00 (m, 2H), 3.73-3.75 (m, 3H), 3.53-3.68 (m, 3H), 3.53-3.68 (m, 1H), 3.37-3.68 (m,

1H), 1.94-2.47 (m, 6H), 1.44-1.59 (m, 3H), 1.01-1.25 (m, 6H), 0.27-0.38 (m, 3H). MS (ESI) m/z 628 (M⁺ + H).

Compound 160

5 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-ylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

10 **[0231]** According to the same method as the synthesis of Compound 133, 3-iodo-4-methoxyaniline, a starting material, was subjected to several synthesis processes to obtain a pinacolato compound. The obtained pinacolato compound was reacted with Compound 4 to synthesize an amino alcohol compound, which is an intermediate compound. The obtained amino alcohol compound was reacted with triphosgene, thus obtaining Compound 160 (72 mg, 38%) as brown oil.

15 **[0232]** ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73 (m, 2H), 6.67-6.77 (m, 1H), 6.52-6.56 (m, 1H), 6.33-6.36 (m, 1H), 5.57-5.60 (m, 1H), 4.00-4.04 (m, 1H), 3.84-3.99 (m, 2H), 3.69 (d, J = 8.2, 3H), 3.46-3.64 (m, 1H), 3.34 (br s, 1H), 1.43-2.50 (m, 6H), 1.33-1.41 (m, 3H), 0.97-1.04 (m, 6H), 0.32-0.46 (m, 3H), 1.01-1.04 (m, 6H), 0.33-0.37 (m, 3H). MS (ESI) m/z 653 (M⁺ + H).

Compound 161

20 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)amino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0233] Compound 161 (25 mg, 54%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

25 **[0234]** ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.69-6.81 (m, 2H), 6.48-6.52 (m, 1H), 5.56-5.60 (m, 1H), 4.10-4.14 (m, 1H), 3.90-4.02 (m, 2H), 3.69-3.72 (m, 3H), 3.43-3.69 (m, 1H), 2.80 (d, J = 15.6, 3H), 2.05-2.48 (m, 2H), 1.93 (s, 2H), 1.47-1.55 (m, 2H), 1.34-1.48 (m, 3H), 1.01-1.05 (m, 6H), 0.31-0.45 (m, 3H). MS (ESI) m/z 666 (M⁺ + H).

Compound 162

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxoxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide

35 **[0235]** Compound 162 (0.21 mg, 92%) as yellow foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0236] MS (ESI) m/z 653 (M⁺ + H).

Compound 163

40 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxoxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-bromoacetamide

45 **[0237]** Compound 163 (44 mg, 100%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0238] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.11, 8.04 (2s, 1H), 7.84 (d, J = 5.5, 1H), 7.79, 7.74 (2s, 1H), 7.43-7.36 (m, 1H), 7.15-7.09 (m, 1H), 6.82 (t, J = 9.1, 1H), 5.60, 5.52 (2d, J = 8.0, 1H), 4.08-3.90 (m, 4H), 3.75 (d, J = 7.3, 3H), 3.57, 3.38 (2d, J = 14.7, 1H), 2.24-2.03 (m, 2H), 1.93 (d, J = 11.2, 2H), 1.51-1.41 (m, 2H), 1.01 (dd, J = 10.0, 4.4, 6H), 0.39, 0.34 (2d, J = 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 676.0, 679.0 (M⁺-1, M⁺+2).

Compound 166

55 N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxoxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-isopropylphenyl)acetamide

[0239] Compound 166 (25 mg, 44%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0240] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.2 atropisomer mixture; δ 7.88 (s, 1H), 7.78 (s, 2H), 6.98-7.25 (m, 3H), 5.64-5.67

(m, 1H), 3.77-4.02 (m, 2H), 3.41-3.49 (m, 1H), 2.86-2.98 (m, 1H), 2.52 (s, 1H), 2.47 (s, 2H), 2.14-2.22 (m, 2H), 1.83-1.99 (m, 2H), 1.41-1.50 (m, 2H), 1.22 - 1.31 (m, 6H), 0.90-1.03 (m, 6H), 0.71 (d, $J = 6.4$, 1H), 0.57 (d, $J = 6.5$, 2H). MS (ESI) m/z 611 ($M^+ + H$).

5 Compound 167

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-(methylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

10 **[0241]** Compound 167 (13 mg, 11%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 47.

[0242] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.87 (d, $J = 5.2$, 1H), 7.72 (d, $J = 7.4$, 2H), 7.00-7.07 (m, 1H), 6.54-6.70 (m, 2H), 5.63 (d, $J = 8.1$, 0.5H), 5.49 (d, $J = 8.2$, 0.5H), 3.98 (d, $J = 14.7$, 0.5H), 3.83-3.92 (m, 1H), 3.71-3.73 (m, 1H), 3.42 (d, $J = 14.6$, 0.5H), 2.81 (d, $J = 8.4$, 3H), 2.72-2.78 (m, 1H), 2.18-2.29 (m, 2H), 1.87-1.98 (m, 2H), 1.47-1.54 (m, 2H), 0.74-1.35 (m, 15H), 0.55 (d, $J = 6.5$, 1.7H), 0.32 (d, $J = 6.5$, 1.3H). MS (ESI) m/z 583 ($M^+ + H$).

Compound 168

20 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-(dimethylamino)-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0243] Compound 144 (34 mg, 0.06 mmol), paraformaldehyde (1 mL) and sodium cyanoborohydride (7 mg, 0.12 mmol) were dissolved in acetonitrile (2 mL). Acetic acid (7.4 μL , 0.12 mmol) was added dropwise slowly to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 4:1 = Hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 168 (30 mg, 85%) as colorless oil.

[0244] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:3.2 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.99-7.02 (m, 1H), 6.80-6.86 (m, 2H), 5.59-5.61 (m, 1H), 3.40-3.82 (m, 3H), 2.75-2.78 (m, 1H), 2.67 (d, $J = 10.2$, 3H), 2.15-2.25 (m, 2H), 1.88-2.05 (m, 2H), 1.52-1.56 (m, 2H), 1.27-1.33 (m, 6H), 1.12-1.19 (m, 6H), 1.04-1.07 (m, 6H), 0.61 (d, $J = 6.6$, 0.7H), 0.16 (d, $J = 6.5$, 2.3H). MS (ESI) m/z 597 ($M^+ + H$).

Compound 170

35 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0245] (3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzaldehyde (0.18 g, 0.32 mmol), a starting material, was dissolved in dimethoxyethane (5.0 mL). Cesium fluoride (5 mg, 0.03 mmol) and trimethylsilyl trifluoride (0.05 mL, 0.36 mmol) were added dropwise slowly to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with 1M HCl (hydrochloride) solution. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 4:1 = Hexane/EtOAc), thus obtaining an intermediate compound (0.14 g, 68%) as colorless oil. The obtained intermediate compound (0.14 g, 0.22 mmol) and Dess-Martin periodinane (0.14 mg, 0.33 mmol) were dissolved in methylene chloride (5.0 mL), and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with water. The reaction mixture was extracted with methylene chloride. The obtained organic layer was dried with anhydrous sodium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 3:1 = hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 170 (0.1 g, 70%), which is an intermediate compound, as colorless oil.

[0246] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1.2 atropisomer mixture; δ 8.03 (d, $J = 7.6$, 1H), 7.87 (s, 1H), 7.73 (d, $J = 7.5$, 3H), 6.99 (t, $J = 9.0$, 1H), 5.66 (d, $J = 7.6$, 0.55H), 5.55 (d, $J = 7.9$, 0.45H), 3.91-4.03 (m, 2H), 3.90 (d, $J = 10.4$, 3H), 3.54 (d, $J = 15.0$, 0.45H), 3.31 (d, $J = 14.8$, 0.55H), 2.21-2.26 (m, 2H), 1.52-1.53 (m, 2H), 1.48-1.51 (m, 2H), 1.02-1.06 (m, 6H), 0.39-0.43 (m, 3H). MS (ESI) m/z 638 ($M^+ + H$).

Compound 171

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(perfluoroprop-1-en-2-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0247] Compound 170 (0.1 g, 0.149 mmol) was dissolved in dimethylformamide (5 mL). Triphenylphosphine (0.08 g, 0.3 mmol) and sodium chlorodifluoroacetate (0.05 g, 0.3 mmol) were added dropwise in sequence to the obtained solution at room temperature, and then refluxed with stirring at 135°C for 6 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with water. The reaction mixture was extracted with ethyl acetate. The obtained organic layer was dried with anhydrous sodium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (4 g silica, 3:1 = hexane/EtOAc), thus obtaining the intermediate Compound 171 (17 mg, 20%) as colorless oil.

[0248] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 7.18-7.22 (m, 1H), 6.86-6.96 (m, 2H), 5.55-5.62 (m, 1H), 3.84-3.99 (m, 2H), 3.80 (d, *J* = 8.6, 3H), 3.58 (d, *J* = 12.2, 0.5H), 3.39 (d, *J* = 14.9, 0.5H), 2.08-2.51 (m, 2H), 1.88 (s, 2H), 1.49-1.55 (m, 6H), 1.01-1.05 (m, 6H), 0.31-0.34 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 672 (M⁺ + H).

Compound 172

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0249] Compound 172 (14 mg, 14%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 171.

[0250] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1 atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 7.24-7.31 (m, 1H), 7.01-7.06 (m, 1H), 6.87-6.92 (m, 1H), 5.55-5.63 (m, 1H), 3.83-4.03 (m, 2H), 3.83-4.03 (m, 1H), 3.80 (d, *J* = 7.2, 3H), 3.55 (d, *J* = 14.7, 0.5H), 3.37 (d, *J* = 14.8, 0.5H), 2.21-2.53 (m, 2H), 1.89-1.99 (m, 2H), 1.44-1.52 (m, 2H), 1.04 (d, *J* = 13.4, 6H), 0.27-0.33 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 692 (M⁺ + H).

Compound 173

tert-butyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(isopropyl)carbamate

[0251] Compound 173 (50 mg, 56%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0252] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.2 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 6.92-6.90 (m, 1H), 6.81-6.74 (m, 1H), 6.68-6.66 (m, 1H), 5.62-5.56 (m, 1H), 4.47 (brs, 1H), 3.99-3.90 (m, 2H), 3.89-3.87 (m, 3H), 3.60-3.48 (m, 1H), 2.54-2.49 (m, 1H), 2.24-2.02 (m, 1H), 1.92 (s, 2H), 1.53-1.42 (m, 2H), 1.33-1.21 (m, 9H), 1.19-1.00 (m, 12H), 0.46 (d, *J* = 6.6, 1H), 0.27 (d, *J* = 6.3, 2H). MS (ESI) *m/z* 699 (M⁺ + H).

Compound 174

tert-butyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(ethyl)carbamate

[0253] Compound 174 (45 mg, 52%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0254] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.79 (s, 2H), 6.95 (s, 1H), 6.81 (m, 2H), 5.57 (m, 1H), 3.99-3.85 (m, 2H), 3.75-3.74 (m, 3H), 3.63-3.41 (m, 3H), 2.47-1.86 (m, 4H), 1.58-1.23 (m, 11H), 1.16-0.88 (m, 9H), 0.44-0.22 (m, 4H). MS (ESI) *m/z* 684 (M⁺ + H).

Compound 177

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-ethylacetamide

[0255] Compound 177 (15 mg, 79%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0256] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.3 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 7.03-7.01 (m, 1H), 6.99-6.77

(m, 2H), 5.62-5.60 (d, $J = 8.0$, 1H), 4.06-3.87 (m, 2H), 3.79 (s, 1.2H), 3.76 (s, 1.8H), 3.74-3.61 (m, 2H), 3.54-3.34 (m, 1H), 2.51-2.47 (m, 0.5H), 2.29-2.08 (m, 1.5H), 2.06-2.01 (m, 1H), 1.93-1.79 (m, 3H), 1.79 (s, 1.5H), 1.75 (s, 1.5H), 1.55-1.43 (m, 2H), 1.17-0.92 (m, 6H), 0.46-0.44 (d, $J = 6.2$, 1.3H), 0.34-0.32 (d, $J = 6.2$, 1.7H). MS (ESI) m/z 627 ($M^+ + H$).

5 Compound 178

(4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoro-1-(methoxyimino)ethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

10 **[0257]** Compound 170 (0.1 g, 0.157 mmol) and methylamine (26 mg, 0.31 mmol) were dissolved in methanol (5 mL). Pyridine (25 μ L, 0.31 mmol) was added dropwise slowly to the obtained solution at room temperature, and stirred at 60°C for 12 hours. After the completion of the reaction, the reaction was quenched with water. The reaction mixture was extracted with methylene chloride. The obtained organic layer was dried with anhydrous sodium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 3:1 = hexane/EtOAc), thus

15 obtaining Compound 178 (35 mg, 30%), which is an intermediate compound, as colorless oil.
[0258] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:3.2 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.99-7.02 (m, 1H), 6.80-6.86 (m, 2H), 5.59-5.61 (m, 1H), 3.40-3.82 (m, 3H), 2.75-2.78 (m, 1H), 2.67 (d, $J = 10.2$, 3H), 2.15-2.25 (m, 2H), 1.88-2.05 (m, 2H), 1.52-1.56 (m, 2H), 1.27-1.33 (m, 6H), 1.12-1.19 (m, 6H), 1.04-1.07 (m, 6H), 0.61 (d, $J = 6.6$, 0.7H), 0.16 (d, $J = 6.5$, 2.3H). MS (ESI) m/z 685 ($M^+ + H$).

20 Compound 179

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)acetamide

25 **[0259]** As the same method as the synthesis of Compound 112, except using isobutylene oxide instead of iodomethane, Compound 179 (10 mg, 50%) as colorless oil was obtained.

30 **[0260]** ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.88 (s, 1H), 7.82-7.78 (m, 1H), 7.48-7.45 (m, 0.5H), 7.24-7.23 (m, 0.5H), 7.17-7.00 (m, 2H), 6.82-6.79 (m, 1H), 4.99-4.98 (d, $J = 5.5$, 1H), 3.93-3.41 (m, 7H), 2.38-2.32 (m, 1H), 2.17-2.15 (m, 3H), 1.97-1.83 (m, 3H), 1.50-1.42 (m, 2H), 1.38-1.22 (m, 6H), 1.15-1.05 (m, 3H), 0.89-0.86 (m, 3H), 0.69-0.61 (m, 3H). MS (ESI) 671 ($M^+ + H$).

Compound 180

35 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3,3-difluoroazetidine-1-carbonyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0261] Compound 180 (17 mg, 77%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 67.

40 **[0262]** ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 7.55-7.44 (m, 1H), 7.43-7.33 (m, 1H), 6.88 (dd, $J = 8.6$, 3.9, 1H), 5.60, 5.53 (2d, $J = 8.0$, 1H), 4.55-4.47 (m, 4H), 4.01-3.93 (m, 2H), 3.83, 3.80 (2s, 3H), 3.48, 3.35 (2d, $J = 14.9$, 1H), 2.39-2.01 (m, 4H), 1.80-1.73 (m, 4H), 0.42 (dd, $J = 15.7$, 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 633, 634 ($M^+ + H$, $M^+ + 2$).

45 Compound 181

(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

50 **[0263]** Compound 181 (37 mg, 72%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 170.

55 **[0264]** ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:3.2 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.99-7.02 (m, 1H), 6.80-6.86 (m, 2H), 5.59-5.61 (m, 1H), 3.40-3.82 (m, 3H), 2.75-2.78 (m, 1H), 2.67 (d, $J = 10.2$, 3H), 2.15-2.25 (m, 2H), 1.88-2.05 (m, 2H), 1.52-1.56 (m, 2H), 1.27-1.33 (m, 6H), 1.12-1.19 (m, 6H), 1.04-1.07 (m, 6H), 0.61 (d, $J = 6.6$, 0.7H), 0.16 (d, $J = 6.5$, 2.3H). MS (ESI) m/z 708 ($M^+ + H$).

Compound 182

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0265] Compound 182 (12 mg, 47%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 47.

[0266] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:3.2 atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.99-7.02 (m, 1H), 6.80-6.86 (m, 2H), 5.59-5.61 (m, 1H), 3.40-3.82 (m, 3H), 2.75-2.78 (m, 1H), 2.67 (d, J = 10.2, 3H), 2.15-2.25 (m, 2H), 1.88-2.05 (m, 2H), 1.52-1.56 (m, 2H), 1.27-1.33 (m, 6H), 1.12-1.19 (m, 6H), 1.04-1.07 (m, 6H), 0.61 (d, J = 6.6, 0.7H), 0.16 (d, J = 6.5, 2.3H). MS (ESI) m/z 722 (M^+ + H).

Compound 183

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-((2-hydroxy-2-methylpropyl)(methyl)amino)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0267] Compound 183 (8 mg, 24%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 120.

[0268] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.88 (s, 1H), 7.78 (s, 2H), 6.76-6.72 (m, 1H), 6.52-6.49 (m, 1H), 6.24 (dd, J = 10.1, 2.9, 1 H), 4.99-4.97 (m, 1H), 3.94-3.83 (m, 1H), 3.67-3.61 (2s, 3H), 3.70-3.53 (m, 2H), 2.79, 2.77 (2s, 3H), 2.39-1.91 (m, 4H), 1.86, 1.81 (2s, 1H), 1.60-1.52 (m, 2H), 1.53, 1.49 (2s, 1H), 1.47-1.25 (m, 6H), 1.04-0.97 (m, 6H), 0.79, 0.55 (2s, 3H).

Compound 184

(4S,5R)-3-((2-(5-acetyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0269] As shown in reaction scheme 4, Compound 12 was synthesized. The obtained Compound 12 (0.24 g, 0.83 mmol) was subjected to a Suzuki reaction with Compound 9 (0.39 g, 0.756 mmol) to obtain Compound 184 (0.11 g, 25%) as brown oil.

[0270] MS (ESI) m/z 602 (M^+ + H).

Compound 185

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0271] (3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzaldehyde (35 mg, 0.06 mmol), a starting material, was dissolved in tert-butyl alcohol (2 mL). Ethanolamine (4 μL , 0.07 mmol) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred for 30 minutes at room temperature. Potassium carbonate (25 mg, 0.18 mmol) and iodine (31 mg, 0.12 mmol) were added dropwise to the obtained reaction mixture. The obtained reaction mixture was refluxed with stirring at 70°C overnight. After the completion of the reaction, saturated sodium thiosulfate solution was added dropwise to the reaction mixture, to quench the reaction. The reaction mixture was extracted with ethyl acetate. The obtained organic layer was dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography, thus obtaining the intermediate Compound 185 (11 mg, 30%) as white solid.

[0272] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.82-7.77 (m, 1H), 7.74, 7.71 (2s, 2H), 7.61 (dd, J = 13.5, 2.1, 1H), 6.87 (dd, J = 8.6, 11.3, 1H), 5.62, 5.49 (2d, J = 8.1, 1H), 4.42-4.32 (m, 2H), 4.04-3.83 (m, 4H), 3.81, 3.79 (2s, 3H), 3.53, 3.35 (d, J = 14.8, 1H), 2.41-2.04 (m, 2H), 1.91 (bs, 2H), 1.52-1.42 (m, 2H), 1.03-1.00 (m, 6H), 0.35 (dd, J = 8.9, 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 611 (M^+ + H).

Compound 187

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-hydroxyazetidine-1-carbonyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0273] Compound 187 (16 mg, 52%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 67.

[0274] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.74 (d, *J* = 4.0, 2H), 7.54 (dd, *J* = 8.5, 2.2, 0.5H), 7.47 (dd, *J* = 8.5, 2.1, 0.5H), 7.41 (d, *J* = 2.1, 0.5H), 7.30 (d, *J* = 2.2, 0.5H), 6.86 (dd, *J* = 8.6, 4.0, 1H), 5.61, 5.56 (2d, *J* = 8.0, 1H), 4.69 (bm, 1H), 4.44 (bs, 2H), 4.15-3.93 (m, 3H), 3.82, 3.79 (2s, 3H), 3.52, 3.37 (2d, *J* = 14.6, 1H), 3.13, 3.03 (2d, *J* = 5.4, 1H), 2.47-2.08 (m, 2H), 1.92 (bs, 2H), 1.53-1.44 (m, 2H), 1.04-1.01 (m, 6H), 0.44, 0.37 (2d, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 642, 663 ((*M*+H)⁺, (*M*+H)⁺+21).

Compound 188

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-((*R*)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0275] Compound 188 (14 mg, 40%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 185.

[0276] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84-7.77 (m, 2H), 7.74, 7.71 (2s, 2H), 7.59 (dd, *J* = 12.1, 2.1, 1H), 6.85 (dd, *J* = 8.6, 12.4, 1H), 5.63, 5.50 (2d, *J* = 8.0, 1H), 4.38-4.30 (m, 1H), 4.12-3.93 (m, 4H), 3.80, 3.78 (2s, 3H), 3.52, 3.36 (2d, *J* = 14.8, 1H), 2.47-2.12 (m, 2H), 1.92 (bs, 2H), 1.87-1.71 (m, 1H), 1.50-1.45 (m, 2H), 1.06-1.01 (m, 7.5H), 0.91-0.89 (m, 3H), 0.80 (d, *J* = 6.7, 1.5H), 0.36 (2d, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 653 (*M*⁺ + H).

Compound 189

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile

[0277] According to the same method as the synthesis of Compound 12 in reaction scheme 4, a pinacolato compound was synthesized. And then the synthesis procedure was operated according to the same method as shown in reaction scheme 2, to obtain Compound 189 (0.25 g, 81%) as green foam.

[0278] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.74 (d, *J* = 5.7, 2H), 7.16 (dd, *J* = 8.5, 2.5, 0.5H), 7.07 (d, *J* = 2.4, 0.5H), 7.02 (dd, *J* = 8.5, 2.5, 0.5H), 6.90 (d, *J* = 2.5, 0.5H), 6.81 (dd, *J* = 8.5, 11.4, 1H), 5.59 (dd, *J* = 8.3, 10.4, 1H), 4.00-3.94 (m, 2H), 3.76, 3.73 (2s, 3H), 3.50, 3.35 (2d, *J* = 14.7, 1H), 2.50-2.04 (m, 2H), 1.92 (bs, 2H), 1.68-1.56 (m, 2H), 1.50-1.47 (m, 2H), 1.34-1.23 (m, 2H), 1.04-1.00 (m, 6H), 0.43, 0.36 (2d, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 607 (*M*⁺ + H).

Compound 190

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxamide

[0279] Compound 189 (0.1 g, 0.165 mmol), 30% hydrogen peroxide (0.6 mL) and 7M potassium hydroxide (60 μl) were dissolved in ethanol (1 mL). The obtained solution was stirred at 85°C for 4 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography, thus obtaining intermediate compound (27 mg, 28%). The obtained intermediate compound (26 mg, 0.04 mmol) was dissolved in anhydrous methylene chloride (1 mL). Diisopropylamine (45 μl, 0.26 mmol) and triphosgene (6 mg, 0.02 mmol) were added dropwise to the obtained solution at 0°C, and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography, thus obtaining Compound 190 (19 mg, 70%) as white solid.

[0280] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (d, *J* = 7.6, 2H), 7.30-7.27 (m, 1H), 7.07, 7.03 (2d, *J* = 2.3, 1H), 6.86, 6.81 (2d, *J* = 8.4, 1H), 5.88 (bs, 0.5H), 5.61, 5.54 (2d, *J* = 8.3, 1H), 5.52-5.42 (bm, 1.5H), 4.20-3.93 (m, 2H), 3.81 (s, 1.7H), 3.74 (s, 1.3H), 3.44, 3.20 (2d, *J* = 14.5, 1H), 2.50-2.03 (m, 2H), 1.93 (bs, 2H), 1.59-1.46 (m, 4H), 1.04-1.02 (m, 6H), 1.00-0.94 (m, 2H), 0.53, 0.38 (2d, *J* = 6.5, 3H). MS (ESI) *m/z* 625 (*M*⁺ + H).

Compound 191

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0281] Compound 191 (33 mg, 55%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 170.

[0282] MS (ESI) m/z 656 ($M^+ + H$).

Compound 192

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(cyclopropanecarbonyl)-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0283] According to the same method as the synthesis of Compound 133, 2-bromo-4-fluorophenol, a starting material, was subjected to several synthesis processes to obtain a pinacolato compound. The obtained pinacolato compound was reacted with Compound 4, to synthesize an amino alcohol compound, which is an intermediate compound. The obtained amino alcohol compound was reacted with triphosgene to obtain Compound 192 (4 mg, 48%) as brown oil.

[0284] ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.76-6.79 (m, 1H), 6.50-6.57 (m, 1H), 5.59-5.62 (m, 1H), 3.90-3.98 (m, 2H), 3.73 (s, 3H), 3.53-3.73 (m, 1H), 3.10-3.16 (m, 1H), 2.02-2.45 (m, 2H), 1.91-1.93 (m, 2H), 1.50-1.54 (m, 2H), 1.01-1.05 (m, 6H), 0.32-0.42 (m, 3H). MS (ESI) m/z 628 ($M^+ + H$).

Compound 193

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0285] Compound 193 (1 g, 99%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0286] MS (ESI) m/z 560 ($M^+ + H$).

Compound 194

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0287] Compound 194 (0.1 g, 80%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 52.

[0288] MS (ESI) m/z 627 ($M^+ + H$).

Compound 195

(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0289] Compound 194 (0.1 g, 0.16 mmol) was dissolved in methanol (3 mL). Raney-nickel (3 mL) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature under hydrogen balloon. After the completion of the reaction, the reaction mixture was filtered with celite, and concentrated under reduced pressure. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 1:1 = hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 195 (35 g, 35%) as yellow solid.

[0290] MS (ESI) m/z 597 ($M^+ + H$).

Compound 196

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide

[0291] Compound 196 (40 mg, 70%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0292] MS (ESI) m/z 640 ($M^+ + H$).

Compound 197

methyl 5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxybenzoate

[0293] According to the same method as the synthesis of Compound 133, 2-fluoro-4-methoxybenzoic acid, a starting material, was subjected to several synthesis processes to obtain a pinacolato compound. The obtained pinacolato compound was reacted with Compound 4 to synthesize an amino alcohol compound, which is an intermediate compound. The obtained amino alcohol compound was reacted with triphosgene, thus obtaining Compound 197 (0.21 g, 88%) as yellow oil.

[0294] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.74 (s, 1H), 7.71 (s, 1H), 7.57 (dd, $J = 8.3$, 10.2, 1H), 6.61 (dd, $J = 8.8$, 12.6, 1H), 5.64, 5.55 (2d, $J = 8.1$, 1H), 3.98-3.89 (m, 2H), 3.84, 3.82 (2s, 3H), 3.80, 3.79 (2s, 3H), 3.53, 3.33 (2d, $J = 14.6$, 1H), 2.41-2.01 (m, 2H), 1.92-1.87 (bm, 2H), 1.51-1.42 (m, 2H), 1.02 (dd, 13.0, 2.0, 6H), 0.43, 0.39 (2d, $J = 6.5$, 3H). MS (ESI) m/z 618 ($M^+ + H$).

Compound 204

5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxybenzoic acid

[0295] Compound 204 (83 mg, 45%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 34.

[0296] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73 (d, $J = 8.2$, 2H), 7.63 (dd, $J = 8.4$, 3.9, 1H), 6.65 (dd, $J = 9.0$, 12.6, 1H), 5.65, 5.56 (2d, $J = 8.0$, 1H), 4.00-3.92 (m, 2H), 3.83 (d, $J = 11.2$, 3H), 3.53, 3.31 (2d, $J = 14.8$, 1H), 2.41-2.04 (m, 2H), 1.97-1.84 (m, 2H), 1.50-1.44 (m, 2H), 1.04-1.00 (m, 6H), 0.43 (t, $J = 6.8$, 3H). MS (ESI) m/z 604 ($M^+ + H$).

Compound 206

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0297] As shown in reaction scheme 1, 4-methoxy-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, a starting material, was subjected to iodination using iodine. The obtained compound was subjected to Ullmann reaction using Compound 2 (Martin G. Banwell et al. Org. Lett. 2004, 6, 2741), to synthesize a compound, and then according to the same method as the synthesis of compound 52, Compound 206 (0.65 g, 83%) as yellow foam was obtained.

[0298] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.74 (d, $J = 4.9$, 2H), 7.69 (d, $J = 2.4$, 1H), 7.22 (d, $J = 11.4$, 1H), 5.66, 5.77 (2d, $J = 8.2$, 1H), 4.03-3.93 (m, 2H), 3.94, 3.93 (2s, 3H), 3.50, 3.31 (2d, $J = 14.9$, 1H), 2.40-2.03 (m, 2H), 1.95 (bs, 2H), 1.53-1.47 (m, 2H), 1.05-1.01 (m, 6H), 0.50 (t, $J = 6.8$, 3H).

Compound 207

(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0299] Compound 207 (0.33 mg, 56%) as white foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 195.

[0300] MS (ESI) m/z 625 ($M^+ + H$).

Compound 209

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide

[0301] Compound 209 (27 mg, 56%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0302] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (d, *J* = 9.6, 1H), 7.74-7.70 (m, 2H), 7.17-7.13 (m, 1H), 7.06 (d, *J* = 4.8, 1H), 5.65-5.46 (m, 1H), 4.03-3.53 (m, 6H), 3.41-3.29 (m, 3H), 2.22-2.06 (m, 2H), 2.02-1.87 (m, 2H), 1.52-1.46 (m, 2H), 1.04-0.99 (m, 2H), 1.50-0.47 (m, 1H), 0.38 (d, *J* = 6.5, 1H), 0.32 (d, *J* = 6.5, 1H). MS (ESI) *m/z* 771 (*M*⁺ + H).

Compound 210

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylacetamide

[0303] According to the same method as the synthesis of Compound 112, Compound 210 (31 mg, 84%) as white solid was obtained.

[0304] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 7.16-7.13 (m, 1H), 6.95 (d, *J* = 6.2, 1H), 5.63 (dd, *J* = 4.4, 8.0, 1H), 4.03-3.91 (m, 2H), 3.86, 3.83 (2s, 3H), 3.45-3.26 (m, 1H), 3.17-3.05 (m, 3H), 2.46-2.03 (m, 2H), 1.97-1.90 (bm, 2H), 1.76-1.71 (m, 3H), 1.53-1.45 (m, 2H), 1.04-0.96 (m, 6H), 0.50-0.36 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 681 (*M*⁺ + H).

Compound 212

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)amino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0305] Compound 212 (58.2 mg, 40.3%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0306] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73, 7.72 (2s, 2H), 7.22, 7.19 (2dd, *J* = 2.8, 0.9, 1H), 7.02, 7.00 (2d, *J* = 2.7, 1H), 6.92, 6.89 (2d, *J* = 8.8, 1H), 6.84, 6.79 (2t, *J* = 1.0, 1H), 5.61 (d, *J* = 8.1, 1H), 4.01 (m, 2H), 3.81, 3.78 (2s, 3H), 3.59, 3.47 (2d, *J* = 14.6, 15.0, 1H), 3.50, 3.44 (2s, 3H), 2.55-1.86 (brm, 4H), 1.51 (m, 2H), 1.27 (m, 2H), 1.05, 1.03, 1.00 (3s, 6H). MS (ESI) *m/z* 766 (*M*+K)⁺.

Compound 213

(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(4-(trifluoromethyl)thiazol-2-ylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0307] As shown in reaction scheme 5, intermediate 17 was synthesized. Intermediate 17 (0.3 g, 0.486 mmol) was dissolved in chloroform/saturated sodium carbonate solution (10 mL, V/V 3:1). Thiophosgene (62.5 μl) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate. The obtained organic layer was washed with water and brine. The organic layer was dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was dissolved in methanol (3 mL). Ammonia water (0.5 mL) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 5 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was crystallized, thus obtaining the intermediate Compound (0.3 g, 87.2%) as white solid. The obtained intermediate compound (0.16 g, 0.27 mmol) was dissolved in ethanol (3 mL). 3-bromo-1,1,1-trifluoropropane-2-one (44.6 μl) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and then refluxed with stirring at 90°C for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was cooled to room temperature. The reaction mixture was diluted with ethyl acetate. And then, the obtained organic layer was washed with saturated sodium hydrogen carbonate solution, water and brine. The organic layer was dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure, thus obtaining Compound 213 (0.18 g, 93.1%) as colorless oil.

[0308] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.23, 8.06 (2brs, 1H), 7.85, 7.84 (2s, 1H), 7.72 (s, 2H), 7.27-7.15 (m, 1.5H), 6.99-6.84 (m, 2.5H), 5.60 (d, *J* = 8.1, 1H), 4.01 (m, 2H), 3.80, 3.78 (2s, 3H), 3.68, 3.42 (2d, *J* =

14.2, 1H), 2.51-1.88 (brm, 6H), 1.50 (m, 2H), 1.04 (m, 6H), 0.42, 0.35 (2d, $J = 5.4, 6.5$, 3H).

Compound 215

5 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide

[0309] Compound 215 (21 mg, 31 %) as white foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

10 **[0310]** ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.86 (m, 1H), 6.68 (m, 1H), 5.64, 5.62 (2s, 1H), 3.97 (m, 2H), 3.79, 3.76 (2s, 3H), 3.51-3.33 (brm, 2H), 3.19, 3.18, 3.08 (3s, 3H), 2.46-1.62 (brm, 9H), 1.46 (m, 2), 1.00 (m, 6H), 0.49-0.36 (m, 3H). MS (ESI) m/z 631 ($\text{M}^+ + \text{H}$).

Compound 216

15 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)acetamide

20 **[0311]** Compound 216 (82 mg, 79%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0312] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.79-7.76 (m, 4H), 7.21, 7.18 (2s, 1H), 6.64, 6.61 (2d, $J = 7.4$, 1H), 5.63, 5.46 (2d, $J = 7.9$, 1H), 4.12 (m, 1H), 3.94 (m, 1H), 3.56, 3.30 (2d, $J = 15.0$, 1H), 2.19, 2.14 (2s, 3H), 1.93, 1.90 (2s, 2H), 1.45 (m, 2H), 1.01, 1.00, 0.99, 0.98 (4s, 6H), 0.46, 0.32 (2d, $J = 6.5$, 3H). MS (ESI) m/z 617 ($\text{M}^+ + \text{H}$).

Compound 217

(4S,5R)-3-((2-(5-amino-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

30 **[0313]** Compound 217 (0.12 g, 99%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 195.

35 **[0314]** ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.58, 6.54 (2d, $J = 12.6$, 1H), 6.44, 6.41 (2d, $J = 6.1$, 1H), 5.60, 5.58 (2d, $J = 2.9$, 1H), 4.0-3.89 (m, 2H), 3.67, 3.64 (2s, 3H), 3.58, 3.47 (2d, $J = 14.6$, 1H), 3.37 (brs, 2H), 2.42-1.89 (brm, 6H), 1.45 (m, 2H), 0.99 (m, 6H), 0.48, 0.34 (2d, $J = 6.6, 6.5$, 3H). MS (ESI) m/z 575 ($\text{M}^+ + \text{H}$).

Compound 218

40 (4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0315] Compound 218 (0.3 g, 80%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 206.

45 **[0316]** ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.78, 7.77 (2d, $J = 4.4$, 1H), 7.72, 7.71 (2s, 2H), 6.74, 6.71 (2d, $J = 7.6$, 1H), 5.56, 5.59 (2d, $J = 5.4$, 1H), 3.96 (m, 2H), 3.89, 3.86 (2s, 3H), 3.52, 3.30 (2d, $J = 15.0$, 1H), 2.38-1.87 (brm, 6H), 1.48 (m, 2H), 1.09, 1.08, 1.00, 0.99 (4s, 6H), 0.47 (t, $J = 6.7$, 3H). MS (ESI) m/z 649 ($\text{M}^+ + \text{K}$).

Compound 222

50 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methyloxazolidin-2-one

55 **[0317]** According to the same method as the synthesis of Compound 133, 2-fluoro-4-methoxyphenol, a starting material, was subjected to several synthesis processes to obtain an iodobenzene compound. The obtained compound was subjected to Ullmann reaction using Compound 2, thus synthesizing an aldehyde compound. The obtained aldehyde compound was reacted with Compound 4 to synthesize an amino alcohol compound, which is an Intermediate compound. The obtained amino alcohol compound was reacted with triphosgene, thus obtaining Compound 222 (7 mg, 47%) as yellow solid.

[0318] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 6.75 (dd, *J* = 15.5, 9.2, 1H), 6.65 (dd, *J* = 12.7, 11.4, 1H), 5.60 (dd, *J* = 8.1, 3.0, 1H), 4.38-1.28 (m, 2H), 3.99-3.88 (m, 2H), 3.74, 3.70 (2s, 3H), 3.52, 3.39 (2d, *J* = 14.6, 1H), 2.45-1.99 (m, 2H), 1.95-1.89 (m, 2H), 1.52-1.41 (m, 2H), 1.03-0.98 (m, 6H), 0.41 (2d, *J* = 6.5, 3H), MS (ESI) *m/z* 658 (M⁺ + H).

Compound 223

(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(6-methoxybenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0319] According to the same method as the synthesis of Compound 133, benzo[d][1,3]dioxol-5-ol, a starting material, was subjected to several synthesis processes to obtain a pinacolato compound. The obtained pinacolato compound was subjected to a Suzuki reaction using Compound 2, thus synthesizing an aldehyde compound. The obtained aldehyde compound was reacted with Compound 4 to synthesize an amino alcohol compound, which is an intermediate compound. The obtained amino alcohol compound was reacted with triphosgene, thus obtaining Compound 223 (4 mg, 49%) as colorless oil.

[0320] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.5 atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.74 (s, 2H), 6.45-6.52 (m, 2H), 5.87-5.92 (m, 2H), 5.62 (t, *J* = 7.7, 1H), 3.90-4.03 (m, 2H), 3.70 (d, *J* = 7.6, 3H), 3.65 (d, *J* = 3.8, 0.6H), 3.50 (d, *J* = 14.9, 0.4H), 2.01-2.45 (m, 2H), 1.89-1.91 (m, 2H), 1.44-1.49 (m, 2H), 1.00-1.04 (m, 6H), 0.49 (d, *J* = 6.6, 1.2H), 0.38 (d, *J* = 6.5, 1.8H). MS (ESI) *m/z* 586 (M⁺ + H).

Compound 224

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylisobutyramide

[0321] Compound 224 (49 mg, 74%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0322] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (d, *J* = 4.5, 2H), 7.17-7.13 (m, 1H), 6.95 (d, *J* = 10.4, 1H), 5.64-5.62 (m, 1H), 4.04-3.91 (m, 2H), 3.86-3.81 (m, 3H), 3.46-3.30 (m, 1H), 3.15-3.03 (m, 3H), 2.45-2.03 (m, 3H), 1.97-1.90 (m, 2H), 1.51-1.45 (m, 2H), 1.04-0.87 (m, 12H), 0.56-0.37 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 709, 710 (M⁺+H, M⁺+2).

Compound 225

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylpropionamide

[0323] Compound 225 (33 mg, 70%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0324] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (d, *J* = 4.5, 2H), 7.15 (d, *J* = 13.2, 1H), 6.92 (d, *J* = 7.2, 1H), 5.64 (dd, *J* = 8.0, 3.3, 1H), 4.03-3.91 (m, 2H), 3.85 (2d, *J* = 12.6, 1.3, 3H), 3.45-3.32 (m, 1H), 3.16 (s, 1H), 3.04 (s, 1H), 2.45-2.02 (m, 2H), 1.97-1.86 (m, 4H), 1.53-1.45 (m, 2H), 1.04-0.96 (m, 9H), 0.50-0.37 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 695 (M⁺ + H).

Compound 226

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylmethanesulfonamide

[0325] According to the same method as the synthesis of Compound 112, Compound 226 (20 mg, 39%) as white solid was obtained.

[0326] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (m, 1H), 7.75 (d, *J* = 12.1, 2H), 7.45-7.06 (m, 2H), 5.63-5.41 (m, 1H), 4.00-3.70 (m, 2H), 3.88-3.80 (m, 3H), 2.50-3.24 (m, 1H), 3.18-3.02 (m, 3H), 2.98, 2.87 (2s, 3H), 2.40-2.03 (m, 2H), 1.97-1.94 (m, 2H), 1.51-1.42 (m, 2H), 1.03-0.97 (m, 6H), 0.54-0.33 (m, 3H). MS (ESI) *m/z* 717 (M⁺ + H).

Compound 227

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide

[0327] Compound 227 (8 mg, 73%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0328] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.76-7.72 (m, 2H), 7.17-7.13 (m, 1H), 7.02-6.95 (m, 1H), 5.66-5.60 (m, 1H), 4.03-3.81 (m, 2H), 3.88-3.84 (m, 3H), 3.52-3.33 (m, 1H), 3.31-3.19 (m, 3H), 2.45-1.99 (m, 2H), 1.97-1.90 (m, 2H), 1.53-1.42 (m, 2H), 1.05-0.89 (m, 6H), 0.53-0.32 (m, 3H). MS (ESI) m/z 735 (M⁺).

Compound 228

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)trifluoromethanesulfonamide

[0329] Compound 228 (61 mg, 73%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0330] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.73 (d, J = 12.2H), 7.32-7.27 (m, 1H), 7.10 (d, J = 9.8, 1H), 5.62, 5.51 (2d, J = 8.0, 1H), 4.00-3.88 (m, 2H), 3.84 (d, J = 5.6, 3H), 3.57, 3.26 (2d, J = 14.9, 1H), 2.40-2.07 (m, 2H), 1.93 (bs, 2H), 1.51-1.44 (m, 2H), 1.03-0.98 (m, 6H), 0.44, 0.33 (2d, J = 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 757, 758 (M⁺, M⁺+H).

Compound 229

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2,4-dimethoxy-5-nitrophenyl)5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0331] Compound 229 (89 mg, 74%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0332] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); 1:1.7 atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.69-7.78 (m, 2H), 6.49 (d, J = 9.1, 1H), 5.67 (d, J = 7.4, 0.7H), 5.55 (d, J = 8.2H), 3.95-4.07 (m, 2H), 4.00-3.97 (m, 3H), 3.86-3.90 (m, 3H), 3.58 (d, J = 14.8, 0.5H), 3.34 (d, J = 14.9, 0.5H), 2.18-2.38 (m, 2H), 1.87, MS (ESI) m/z 617 (M⁺ + H).

Compound 230

N-(5-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2,4-dimethoxyphenyl)-N-methylacetamide

[0333] Compound 230 (4 mg, 85%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0334] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.74 (s, 2H), 6.76-6.81 (m, 1H), 6.44-6.48 (m, 1H), 5.61-5.64 (m, 1H), 3.91-4.04 (m, 2H), 3.74-3.85 (m, 6H), 3.40-3.59 (m, 1H), 3.13 (s, 2H), 3.01 (s, 1H), 2.07-2.49 (m, 2H), 1.95-2.10 (m, 3H), 1.78-1.81 (m, 3H), 1.50-1.59 (m, 2H), 1.01-1.08 (m, 6H), 0.07-0.47 (m, 3H), MS (ESI) m/z 643 (M⁺ + H).

Compound 232

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-hydroxy-2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0335] Compound 218 (0.12 g, 0.2 mmol) and 2-(methylsulfonyl)ethanol (32 mg) were dissolved in dimethylformamide (3 mL). Sodium hydride (15.3 mg) was added dropwise carefully to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature overnight. After the complexation of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with saturated ammonium chloride solution and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was crystallized, thus obtaining Compound 232 (91 mg, 77%) as yellow solid.

[0336] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 10.98, 10.96 (2s, 1H), 7.86 (s, 1H), 7.79-7.71 (m, 3H), 6.53,

6.51 (2s, 1H), 5.63 (2d, $J = 8.1$, 1H), 4.02-3.93 (m, 2H), 3.87, 3.86 (2s, 3H), 3.45 (2d, $J = 14.9$, 1H), 2.39-1.86 (m, 4H), 1.52-1.43 (m, 2H), 1.01 (2d, $J = 3.8$, 6H), 0.46 (2d, $J = 6.6$, 3H), MS (ESI) m/z 603 ($M^+ + H$).

Compound 233

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-(2-methoxy-5-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0337] Compound 233 (46mg, 85%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 120.

[0338] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3): atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 6.96, 6.89 (2s, 1H), 6.37 (d, $J = 8.0$, 1H), 5.61 (d, $J = 7.2$, 1H), 4.03-3.92 (m, 2H), 3.70 (d, $J = 7.6$, 3H), 3.60-3.49 (m, 1H), 2.84, 2.80 (2s, 3H), 2.49-2.02 (m, 2H), 1.92 (bs, 2H), 1.52-1.46 (m, 2H), 1.04-0.98 (m, 6H), 0.52, 0.36 (2d, $J = 0.3$, 3H). MS (ESI) m/z 639 ($M^+ + H$).

Compound 234

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-ethyl-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide

[0339] Compound 234 (1.4 mg, 74%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0340] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3): 1:1 atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.63 (s, 2H), 6.77 (m, 2H), 5.62 (m, 1H), 4.04-3.90 (m, 2H), 3.80, 3.77, 3.76 (3s, 3H), 3.56-3.89 (m, 2H), 3.16, 3.15, 3.03 (3s, 3H), 2.51 (m, 2H), 2.50-1.25 (m, 4H), 1.22 (m, 4H), 1.03 (m, 6H), 0.45-0.33 (m, 3H). MS (ESI) m/z 641 ($M^+ + H$).

Compound 235

(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxy-2-methylpropyl)(methylamino)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0341] Compound 235 (7 mg, 39%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 120.

[0342] MS (ESI) m/z 639 ($M^+ + H$).

Compound 237

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0343] According to the same method as the synthesis of Compound 133, 3-fluoro-4-bromoanisole, a starting material, was subjected to several synthesis processes to obtain a boronic acid compound. The obtained compound was subjected to a Suzuki reaction with Compound 2. The obtained compound was reacted with Compound 4, to obtain an amino alcohol compound, which is an intermediate compound. The obtained amino alcohol compound was reacted with triphosgene, thus obtaining Compound 237 (2 mg, 22%) as white solid.

[0344] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3): 1:1.3 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73-7.72 (m, 2H), 6.57-6.44 (m, 2H), 5.60 (t, $J = 8.0$, 1H), 3.98-3.88 (m, 2H), 3.71, 3.68 (2s, 3H), 3.50, 3.38 (2d, $J = 14.5$, 1H), 2.45-1.87 (m, 4H), 1.49-1.40 (m, 2H), 1.02-0.92 (m, 6H), 0.91-0.82 (m, 4H), 0.63-0.59 (m, 1H), 0.40 (d, $J = 6.5$, 1.3H), 0.32 (d, $J = 6.5$, 1.7H). MS (ESI) m/z 600 ($M^+ + H$).

Compound 240

1-((5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)(methylamino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate

[0345] Compound 240 (28 mg, 53%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0346] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3): atropisomer mixture; δ 7.85-7.74 (m, 3H), 7.11-7.07 (m, 1H), 6.86-6.78 (m, 1H), 5.65, 5.44 (2d, $J = 7.6$, 1H), 4.12-3.32 (m, 6H), 3.26 (d, $J = 9.4$, 3H), 2.45-1.88 (m, 7H), 1.49-1.47 (m, 6H), 1.45-1.39 (m,

2H), 1.02-0.97 (m, 6H), 0.65-0.36 (m, 3H). MS (ESI) m/z 767 ($M^+ + H$).

Compound 241

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropoxy-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0347] According to the same method as the synthesis of Compound 133, 2-fluoro-4-methoxyphenol, a starting material, was subjected to several synthesis processes to obtain boronic acid compound. The obtained compound was subjected to a Suzuki reaction with Compound 2. And then the obtained compound was reacted with Compound 4, to obtain an amino alcohol compound, which is an intermediate compound. The obtained amino alcohol compound was reacted with triphosgene, thus obtaining Compound 241 (3 mg, 60%) as white solid.

[0348] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); 1:1.5 atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.72 (s, 2H), 6.66-6.58 (m, 2H), 5.61 (dd, $J = 8.0, 4.6$, 1H), 4.39-4.21 (m, 1H), 4.02-3.88 (m, 2H), 3.70, 3.67 (2s, 3H), 3.56, 3.46 (2d, $J = 14.5$, 1H), 2.47-1.99 (m, 2H), 1.94-1.88 (m, 2H), 1.51-1.40 (m, 2H), 1.31 (d, $J = 6.0$, 3H), 1.21-1.17 (m, 3H), 1.03-0.98 (m, 6H), 0.44 (d, $J = 6.5, 1.2\text{H}$), 0.33 (d, $J = 6.5, 1.8\text{H}$). MS (ESI) m/z 618 ($M^+ + H$).

Compound 243

1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)(methyl)amino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate

[0349] Compound 243 (32 mg, 50%) as yellow solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0350] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture: δ 7.83 (s, 1H), 7.75 (s, 2H), 7.05 (d, $J = 8.6$, 1H), 6.85-6.78 (m, 2H), 5.62-5.57 (m, 1H), 4.02-3.90 (m, 2H), 3.77, 3.74 (2s, 3H), 3.52 (d, $J = 14.7$, 0.6H), 3.40 (d, $J = 14.7$, 0.4H), 3.38-3.00 (bm, 3H), 2.42-2.07 (m, 2H), 2.02-1.87 (m, 2H), 1.70-1.40 (bm, 9H), 1.02-0.98 (m, 6H), 0.44-0.38 (m, 3H), MS (ESI) m/z 699 ($M^+ + H$).

Compound 244

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-hydroxy-N,2-dimethylpropanamide

[0351] Compound 243 (19 mg, 0.027 mmol) was added to methanol (0.8 mL). The solution of potassium carbonate (4 mg, 0.029 mmol) in water (0.2 mL) was added dropwise to the obtained mixture, and stirred at room temperature overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was concentrated under reduced pressure, diluted with methylene chloride, washed with brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by PTLC (silica, 70% Hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 244 (11 mg, 65%) as white solid.

[0352] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1H), 7.74 (d, $J = 5.7$, 2H), 7.12-7.09 (m, 1H), 6.91-6.84 (m, 2H), 5.61 (dd, $J = 8.0, 2.1$, 1H), 4.36 (bs, 1H), 4.06-3.93 (m, 2H), 3.82, 3.79 (2s, 3H), 3.53, 3.42 (2d, $J = 14.6$, 1H), 3.29, 3.22 (2s, 3H), 2.47-1.99 (m, 2H), 1.94-1.92 (m, 2H), 1.56-1.46 (m, 2H), 1.20-1.10 (bm, 6H), 1.06-1.02 (m, 6H), 0.50, 0.41 (2d, $J = 6.5, 3\text{H}$), MS (ESI) m/z 657 ($M^+ + H$).

Compound 246

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-4-methyl-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0353] Compound 246 (0.13 g, 69.1%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 206.

[0354] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture: δ 7.86 (s, 1H), 7.76 (d, $J = 8.0$, 1H), 7.73 (d, $J = 7.3$, 2H), 6.72 (d, $J = 10.5$, 1H), 5.60 (dd, $J = 38.2, 8.1$, 1H), 3.97 (m, 2H), 3.87, 3.83 (2s, 3H), 3.55, 3.34 (2d, $J = 14.9$, 1H), 2.64, 2.63 (2s, 3H), 2.40-1.92 (m, 4H), 1.50 (m, 2H), 1.05, 1.04, 1.01 (3s, 6H), 0.47, 0.45, 0.44, 0.43 (4s, 3H), MS (ESI) m/z 601 ($M^+ + H$).

Compound 247

(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxy-4-methylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0355] Compound 247 (76.6 mg, 73%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 195.

[0356] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.60, 6.54 (2s, 1H), 6.33, 6.31 (2s, 1H), 5.59, 5.57 (2d, J = 8.0, 1H), 4.05-3.84 (m, 2H), 3.67-3.50 (m, 4H), 3.33 (brs, 2H), 2.49-1.90 (m, 7H), 1.50-1.41 (m, 2H), 1.03, 1.01, 0.99 (3s, 6H), 0.47, 0.31 (2d, J = 6.6, 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 571 (M⁺ + H).

Compound 248

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)acetamide

[0357] Compound 248 (28.8 mg, 67.1 %) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0358] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.83-7.79 (m, 3H), 7.40, 7.21 (2s, 1H), 6.82, 6.76 (2s, 1H), 6.68, 6.65 (2s, 1H), 5.59, 5.46 (2d, J = 8.0, 1H), 4.07 (m, 1H), 3.94 (m, 1H), 3.74, 3.73 (2s, 3H), 3.61, 3.39 (2d, J = 14.7, 1H), 2.23-1.91 (m, 10H), 1.45 (m, 2H), 1.01, 1.00, 0.98 (3s, 6H), 0.44, 0.31 (2d, J = 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 613 (M⁺ + H).

Compound 249

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)-N-methylacetamide

[0359] Compound 249 (9.2 mg, 45.8%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0360] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (s, 2H), 6.77-6.70 (m, 2H), 5.61 (m, 1H), 4.03-3.91 (m, 2H), 3.78, 3.75, 3.74 (3s, 3H), 3.55-3.27 (m, 1H), 3.15, 3.14, 3.03 (3s, 3H), 2.50-1.45 (m, 12H), 1.13-0.96 (m, 6H), 0.48-0.31 (m, 3H). MS (ESI) m/z 627 (M⁺ + H).

Compound 250

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoromethanesulfonamide

[0361] Compound 250 (24.2 mg, 57.3%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0362] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (d, J = 4.0, 1H), 7.72 (d, J = 6.9, 2H), 7.01, 6.94 (2s, 1H), 6.72, 6.70 (2s, 1H), 5.60, 5.53 (2d, J = 8.0, 1H), 3.93 (m, 2H), 3.77, 3.76 (2s, 3H), 3.57, 3.34 (2d, J = 14.7, 1H), 2.43-1.91 (m, 7H), 1.47 (m, 2H), 1.02, 0.99, 0.98 (3s, 6H), 0.36, 0.29 (2d, J = 6.5, 3H). MS (ESI) m/z 703 (M⁺ + H).

Compound 251

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide

[0363] Compound 251 (9.5 mg, 42.8%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0364] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.786, 7.84 (2s, 1H), 7.74, 7.71 (2s, 2H), 6.90-6.73 (m, 2H), 5.58-5.46 (m, 1H), 4.02-3.25 (m, 9H), 2.41-1.95 (m, 7H), 1.49 (m, 2H), 1.03, 1.01, 1.00 (3s, 6H), 0.44-0.32 (m, 3H). MS (ESI) m/z 717 (M⁺ + H).

Compound 259

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylethanethioamide

[0365] Compound 112 (35 mg, 0.057 mmol) was dissolved in toluene (1.3 mL). Lawesson's reagent (23 mg, 0.06 mmol) was added dropwise to the solution, and then stirred at 80°C overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was separated by MPLC (10-20% hexane/ EtOAc), thus obtaining Compound 259 (28 mg, 78%) as solid.

[0366] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.73 (d, 2 H, *J* = 4.6 Hz), 7.06 - 7.03 (m, 1 H), 6.91 - 6.86 (m, 1 H), 6.83 (q, 1 H, *J* = 2.7 Hz), 5.62 (dd, 1 H, *J* = 4.1, 8.4 Hz), 4.05 - 3.91 (m, 2 H), 3.81, 3.78 (2s, 3 H), 3.70, 3.64 (2s, 3 H), 3.49, 3.39 (2d, 1 H, *J* = 14.5 Hz), 2.49 - 2.43 (m, 1 H), 2.38, 2.34 (2s, 3 H), 2.29 - 2.00 (m, 2 H), 1.93 - 1.85 (m, 2 H), 1.53 - 1.43 (m, 2 H), 1.05 - 1.01 (m, 6 H), 0.47, 0.36 (2d, 3 H, *J* = 6.6 Hz); MS (ESI) *m/z* 629.0 (M⁺+H).

Compound 271

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-thiooxoxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide

[0367] Compound 112 (60 mg, 0.098 mmol) was dissolved in 2-propanol (0.6 mL). The solution of potassium hydroxide (28 mg) in water (0.1 mL) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at 80°C overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was cooled down to room temperature, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. Ethyl acetate was added dropwise to the residue. The obtained mixture was washed with water and brine, and concentrated under reduced pressure. The obtained residue was separated by MPLC (SiO₂, 10%-70% Hexane/ EtOAc), thus obtaining an amino alcohol compound (26 mg, 45%) as colorless oil. The obtained amino alcohol compound was dissolved in methylene chloride (1.5 mL). Thiophosgene (2 μL, 0.02 mmol) and diisopropylamine (0.05 mL, 0.27 mmol) were added dropwise to the obtained solution, and then stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with methylene, and washed with water and brine. The organic layer was dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (SiO₂ 30% -90% hexane/ EtOAc), thus obtaining Compound 271 (12 mg, 43%) as yellow solid.

[0368] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.88 (s, 1H), 7.75 (s, 2 H), 7.06 (dt, 1 H, *J* = 2.4, 8.6 Hz), 6.90 - 6.81 (m, 2 H), 5.77 - 5.74 (m, 1 H), 4.66 - 4.63 (m, 1 H), 4.25 - 4.09 (m, 1 H), 3.83, 3.79 (2s, 3 H), 3.72, 3.66 (2d, 1 H, *J* = 14.8 Hz), 3.22, 3.14 (2s, 3 H), 2.53 - 1.89 (m, 4 H), 1.84, 1.79 (2s, 3 H), 1.53 - 1.44 (m, 2 H), 1.05 - 1.02 (m, 6 H), 0.51, 0.37 (2d, 1 H, *J* = 6.7 Hz); MS (ESI) *m/z* 628.8 (M⁺).

Compound 272

methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoate

[0369] Compound 272 (0.12 g, 95.9%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 133.

[0370] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.75 (m, 2 H), 7.27 (2d, 1H, *J* = 2.12, 2.08 Hz), 6.83 (m, 2H), 5.60 (m, 1 H), 4.05-3.41 (m, 9 H), 2.89 (m, 2 H), 2.6 (m, 2 H), 2.50-2.00 (m, 2 H), 1.89 (m, 2 H), 1.50 (m, 2 H), 1.05 (m, 6 H), 0.40 (m, 3H).

Compound 273

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoic acid

[0371] Compound 273 (2 mg, 1.9%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0372] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.73 (s, 2H), 7.05 - 7.07 (m, 1 H), 6.74 - 6.85 (m, 2 H), 5.56 - 5.61 (m, 1 H), 3.72 - 3.89 (m, 3 H), 3.42 - 3.58 (m, 1 H), 2.83 - 2.90 (m, 2 H), 2.61 - 2.66 (m, 2 H), 2.26 - 2.59 (m, 2 H), 1.87 - 1.93 (m, 2 H), 1.44 - 1.53 (m, 2 H), 1.01 - 1.05 (m, 6 H), 0.30, 0.45 (2d, 3 H, *J* = 4.86, 4.92 Hz); MS (ESI) *m/z* 614.2 (M⁺ + H).

Compound 274

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0373] Compound 274 (0.12 g, 76.5%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0374] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.72 (d, *J* = 0.4 Hz, 2 H), 6.84, 6.80 (2d, *J* = 8.7 Hz, 1 H), 6.56, 6.52 (2d, *J* = 12.2 Hz, 1 H), 5.59 (t, *J* = 8.4 Hz, 1 H), 4.01-3.88 (m, 2 H), 3.73, 3.71 (2s, 3 H), 3.59, 3.46 (2d, *J* = 14.6 Hz, 1 H), 3.13 (m, 1 H), 2.44-1.13 (m, 16 H), 0.44-0.34 (m, 7H); MS (ESI): 600 (M⁺ + H).

Compound 275

tert-butyl 6-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-5-methoxyindoline-1-carboxylate

[0375] tert-Butyl 5-methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)indoline-1-carboxylate was synthesized using 4-methoxyindoline as a starting material, and then Compound 275 (0.24 g, 72.1 %) as white solid foam was obtained according to the similar method to the synthesis of compound 133.

[0376] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84, 7.77, 7.73 (3s, 3 H), 7.53-7.05 (brs, 1 H), 6.70, 6.66 (2s, 1 H), 5.65-5.58 (m, 1 H), 4.10-3.88 (m, 4 H), 3.71-3.39 (m, 4 H), 3.07-3.02 (m, 2 H), 2.45-1.85 (m, 4 H), 1.51-1.18 (m, 16 H), 1.02-0.94 (m, 6 H), 0.85 (m, 3 H), 0.43, 0.37 (2d, 3 H, *J* = 6.5, 6.3 Hz); MS (ESI): 683 (M⁺ + H).

Compound 276

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxyindolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0377] Compound 276 (0.13 g, 63.5%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 267.

[0378] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 6.74, 6.67 (2s, 1 H), 6.31, 6.29 (2s, 1 H), 5.59, 5.58 (2s, 1 H), 4.05-3.87 (m, 2 H), 3.67-3.63 (m, 4 H), 3.55-2.48 (m, 3 H), 3.01-2.97 (m, 2 H), 2.45-1.86 (m, 4 H), 1.45 (m, 2 H), 1.03, 1.01, 0.99 (3s, 6 H), 0.48, 0.33 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI): 583 (M⁺ + H).

Compound 277

(4S,5R)-3-((2-(1-acetyl-5-methoxyindolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0379] Compound 277 (18 mg, 64.6%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 261.

[0380] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.91-7.74 (m, 4 H), 6.71 (d, 1 H, *J* = 12.7 Hz), 6.54, 5.50 (2d, 1 H, *J* = 8.08, 8.04 Hz), 4.12-3.91 (m, 4 H), 3.73, 3.72 (2s, 3 H), 3.59, 3.37 (2d, 1 H, *J* = 14.7 Hz), 3.17 (m, 2 H), 2.37-1.91 (m, 6 H), 1.46 (m, 2 H), 1.02, 1.00, 0.99 (3s, 6 H), 0.41, 0.38 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI): 625 (M⁺ + H).

Compound 278

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxy-1-(2,2,2-trifluoroethyl)indolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0381] Compound 278 (4 mg, 11.3%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 261.

[0382] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73 (s, 2 H), 6.74, 6.68 (2s, 1 H), 6.12 (s, 1 H), 5.58, 5.56 (2d, 1 H, *J* = 4.2 Hz), 4.03-3.85 (m, 2 H), 3.69, 3.67 (2s, 3 H), 3.63-3.38 (m, 5 H), 3.02-2.98 (m, 2 H), 2.47-1.87 (m, 6 H), 1.47 (m, 2 H), 1.25 (m, 6 H), 0.37, 0.35 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI): 665 (M⁺ + H).

Compound 280

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxy-1-(methylsulfonyl)indolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0383] Compound 280 (19 mg, 64.4%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 261.

[0384] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.74 (s, 2 H), 7.06 (d, 1 H, *J* = 16.2 Hz), 6.75 (d, 1 H, *J* = 13.6 Hz), 5.59 (2d, 1 H, *J* = 8.2 Hz), 3.99-3.87 (m, 4 H), 3.75-3.72 (2s, 3 H), 3.52, 3.33 (2d, 1 H, *J* = 14.9, 14.6 Hz), 3.14-3.09 (m, 2 H), 2.84, 2.79 (2s, 3 H), 2.38-1.91 (m, 4 H), 1.45 (m, 2 H), 1.03, 1.01, 1.00 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI): 661, 683 (M⁺ + H).

Compound 285

methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoate

[0385] As shown in reaction scheme 6, Compound 22, an intermediate compound, was synthesized, and then subjected to reductive amination using Compound 4, which is an amino alcohol compound, to synthesize Compound 23. The obtained Compound 23 (0.21 g, 0.34 mmol) was dissolved in methylene chloride (3 mL). Diisopropylamine (0.36 mL) and triphosgene (0.15 g) were added dropwise in sequence to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 3:1 = n-hexane : EtOAc), thus obtaining Compound 285 (0.1 g, 45%) as white solid foam.

[0386] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (d, 1 H, *J* = 9.4 Hz), 6.92- 6.95 (m, 1 H), 6.67 - 6.77 (m, 2 H), 5.58 - 5.61 (m, 1 H), 3.87 - 4.01 (m, 2 H), 3.71, 3.73 (2s, 3 H), 3.63, 3.64 (2s, 3 H), 3.50, 3.59 (2d, 1 H, *J* = 11.25, 10.86 Hz), 2.73 - 2.77 (m, 2 H), 2.15 - 2.50 (m, 2 H), 1.90 - 2.05 (m, 2 H), 1.45 - 1.50 (m, 2 H), 1.12 - 1.15 (m, 6 H), 0.90 - 1.04 (m, 6 H), 0.28, 0.41 (2d, 3 H, *J* = 4.86, 4.92 Hz); MS (ESI) *m/z* 656 (M⁺ + H).

Compound 286

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid

[0387] Compound 286 (27 mg, 42.4%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0388] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆): atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 - 7.75 (m, 2 H), 6.99 - 7.02 (m, 1 H), 6.72 - 6.81 (m, 2 H), 5.61 (d, 1 H, *J* = 8.1 Hz), 3.88 - 4.02 (m, 2 H), 3.71 - 3.74 (m, 3 H), 3.52, 3.58 (2d, 1 H, *J* = 14.96, 14.52 Hz), 2.72 - 2.87 (m, 2 H), 2.00 - 2.50 (m, 2 H), 1.93 (m, 2 H), 1.14 - 1.17 (m, 6 H), 0.99 - 1.04 (m, 6 H), 0.28, 0.44 (d, 3 H, *J* = 6.52, 6.56 Hz); MS (ESI) *m/z* 656, 547 (M⁺ + H).

Compound 291

(R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide

[0389] Compound 291 (53 mg, 76%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0390] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃): atropisomer mixture; δ 8.55, 8.53 (2s, 1H), 7.87-6.81 (m, 11H, ArH), 5.60 (d, 0.5H, *J* = 8.2), 5.53 (d, 0.5H, *J* = 8.1), 4.08-3.93 (m, 2H), 3.77, 3.76 (2s, 3H), 3.52-3.56 (m, 4H), 2.48-2.08 (m, 3H), 1.92 (broad signal, 2H), 1.55-1.39 (m, 2H), 1.04, 1.01 (2s, 6H), 0.40 (d, 1.5H, *J* = 6.5), 0.36 (d, 1.5H, *J* = 6.5); MS (ESI) *m/z* 773.2 (M⁺ + H).

Compound 292

(S)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide

[0391] Compound 292 (54 mg, 78%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0392] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.54, 8.50 (2s, 1H), 7.87-6.80 (m, 11H, ArH), 5.59 (d, 0.5H, J = 8.1), 5.55 (d, 0.5H, J = 8.1), 4.06-3.94 (m, 2H), 3.77, 3.76 (2s, 3H), 3.55-3.37 (m, 4H), 2.48-2.06 (m, 3H), 1.91 (broad signal, 2H), 1.54-1.40 (m, 2H), 1.04, 1.03, 1.01 (3s, 6H), 0.39 (d, 1.5H, J = 6.5), 0.33 (d, 1.5H, J = 6.5); MS (ESI) m/z 773.2 (M⁺ + H).

Compound 293

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0393] Compound 293 (0.73 g, 71 %) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0394] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.72 (s, 2 H), 7.25-7.20 (m, 1 H), 7.04-6.83 (m, 3 H), 5.58 (t, 1 H, J = 8.5 Hz), 4.03-3.90 (m, 2 H), 3.75, 3.74 (2s, 3 H), 3.59, 3.48 (2d, 1 H, J = 15.0, 14.6 Hz), 2.47-1.21 (m, 10H), 0.44-0.31 (m, 7H); MS (ESI): 542 (M⁺ + H).

Compound 294

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(2-methoxy-5-nitrophenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0395] Compound 294 (0.73 g, 71%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 52.

[0396] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.18-8.14 (m, 1 H), 7.94 (dd, 1 H, J = 9.8, 2.8 Hz), 7.85 (s, 1 H), 7.71 (d, 2 H, J = 4.7 Hz), 6.95 (t, 1 H, J = 9.4 Hz), 5.63, 5.58 (2d, 1 H, J = 8.1 Hz), 4.01-3.94 (m, 2 H), 3.91, 3.88 (2s, 3 H), 3.53, 3.36 (2d, 1 H, J = 15.0 Hz), 2.39-1.31 (m, 7H), 0.46-0.35 (m, 7H); MS (ESI) m/z 585 (M⁺ + H).

Compound 295

(4S,5R)-3-((6-(5-amino-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0397] Compound 294 (0.21 g, 0.36 mmol) was dissolved in methanol (3 mL). Raney-nickel (3 mL) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred under hydrogen gas overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was filtered with celite, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was separated by MPLC (25%-60% n-hexane / EtOAc), thus obtaining Compound 295 (0.12 g, 60%) as colorless oil.

[0398] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.71 (d, 2 H, J = 4.1 Hz), 6.73-6.46 (m, 2 H), 5.59, 5.53 (2d, 1 H, J = 8.0 Hz), 4.09-3.89 (m, 2 H), 3.74, 3.70 (2s, 3 H), 3.70-3.49 (m, 1 H), 2.47-1.23 (m, 7H), 0.50-0.35 (m, 7H); MS (ESI) m/z 555 (M⁺ + H).

Compound 296

(R)-N-(3-(5-((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)spiro[2.5]oct-5-en-6-yl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide

[0399] Compound 296 (15 mg, 15%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0400] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.56 (s, 1 H), 7.97-7.94 (m, 1 H), 7.85-7.69 (m, 3 H), 7.51 (m, 2 H), 7.44-7.34 (m, 4 H), 6.84 (t, 1 H, J = 8.6 Hz), 5.56, 5.52 (2d, 1 H, J = 8.2 Hz), 4.11-3.89 (m, 3 H), 3.77, 3.76 (2s, 3 H), 3.56-3.34 (m, 4 H), 2.44-1.24 (m, 11 H), 0.46-0.29 (m, 9H); MS (ESI) m/z 771 (M⁺ + H).

Compound 297

(S)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)spiro[2.5]oct-5-en-6-yl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide

[0401] Compound 297 (17 mg, 21 %) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0402] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.55, 8.53 (2s, 1 H), 7.84 (s, 1 H), 7.72-7.65 (m, 3 H), 7.56 (m, 1 H), 7.43-7.40 (m, 3 H), 7.33-7.17 (m, 3 H), 6.84, 6.81 (2d, 1 H, *J* = 8.9 Hz), 5.54 (d, 1 H, *J* = 8.1 Hz), 4.04-3.89 (m, 3 H), 3.77, 3.76 (2s, 3 H), 3.57-3.39 (m, 4 H), 2.45-1.23 (m, 9H), 0.46-0.34 (m, 8H); MS (ESI) *m/z* 771 (*M*⁺ + H).

Compound 298

(R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-N-methyl-2-phenylpropanamide

[0403] Compound 298 (30 mg, 82%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0404] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (m, 1 H), 7.72 - 7.78 (m, 2 H), 7.59 - 7.60 (m, 1 H), 7.41 - 7.45 (m, 2 H), 7.30 - 7.36 (m, 2 H), 7.01 - 7.04 (m, 1 H), 6.84 - 6.90 (m, 2 H), 5.57 - 5.59 (m, 1 H), 3.90 - 4.10 (m, 2 H), 3.82 - 3.85 (m, 3 H), 3.47 - 3.65 (m, 3 H), 3.47 - 3.65 (m, 3 H), 2.91 - 3.29 (m, 3 H), 2.10 - 2.50 (m, 2 H), 1.80 - 2.00 (m, 2 H), 1.46 - 1.50 (m, 2 H), 0.94 - 1.04 (m, 6 H), 0.29 - 0.50 (m, 3 H); MS (ESI) *m/z* 787 (*M*⁺ + H).

Compound 299

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanamide

[0405] Compound 273 (0.48 g, 0.78 mmol) was dissolved in methylene chloride (5 mL). Thionyl chloride (0.1 mL) and dimethylformamide (1 drop) were added dropwise to the obtained solution, and stirred for 5 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was cooled down to room temperature, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was dissolved in tetrahydropuran (10 mL). Ammonia water (2 mL) was added dropwise to the obtained solution, and stirred for 1 hour at room temperature. Ethyl acetate was added dropwise to the reaction mixture. And then, the obtained reaction mixture was washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (SiO₂, 4:1 hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 299 (0.39 g, 84%) as colorless oil.

[0406] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (d, 1 H, *J* = 4.6 Hz), 7.04 - 7.08 (m, 1 H), 6.73 - 6.87 (m, 2 H), 5.47 - 5.62 (in, 3 H), 3.93 - 3.97 (m, 2 H), 3.71, 3.77 (2s, 3 H), 3.38, 3.55 (2d, 1 H, *J* = 11.25, 10.89 Hz), 2.85 - 2.91 (m, 2 H), 2.44 - 2.51 (m, 2 H), 1.90 - 2.30 (m, 4 H), 1.45 - 1.48 (m, 2H), 1.01 - 1.05 (m, 6 H), 0.33, 0.47 (2d, 3 H, *J* = 4.89, 4.92 Hz); MS (ESI) *m/z* 613.2 (*M*⁺ + H).

Compound 300

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanenitrile

[0407] Compound 299 (0.19 g, 0.32 mmol) was dissolved in pyridine (5 mL). Phosphoryl chloride (0.12 mL) and imidazole (40 mg) were added dropwise to the obtained solution, and stirred at - 20°C for 1 hour. The reaction was quenched with 1M HCl (hydrochloride) solution. The reaction mixture was extracted with ethyl acetate, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (SiO₂, 4:1 hexane/ EtOAc), thus obtaining Compound 300 (0.14 g, 74%) as white oil.

[0408] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-*d*₆); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.74 (s, 2 H), 7.06 - 7.12 (m, 1 H), 6.79 - 6.93 (m, 2 H), 5.58, 5.61 (2d, 1 H, *J* = 6.18, 6.09 Hz), 3.89 - 4.00 (m, 2 H), 3.74, 3.77 (2s, 3 H), 3.46, 3.60 (2d, 1 H, *J* = 11.28, 10.98 Hz), 2.82 - 2.90 (m, 2 H), 2.60 - 2.62 (m, 2 H), 2.20 - 2.59 (m, 2 H), 1.94 (m, 2 H), 1.47 - 1.51 (m, 2 H), 1.01 - 1.05 (m, 6 H), 0.35, 0.42 (2d, 3 H, *J* = 4.86, 4.92 Hz); MS (ESI) *m/z* 595.2 (*M*⁺ + H).

Compound 301

(4S,5R)-3-((2-(5-(2-(2H-tetrazol-5-yl)ethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0409] Compound 300 (0.1 g, 0.16 mmol) was dissolved in dimethylformamide (5 mL). Sodium azide (0.04 g) and ammonium chloride (0.04 g, 0.82 mmol) were added dropwise to the obtained solution, and stirred at 120 °C overnight. After the reaction was quenched with 1M HCl (hydrochloride) solution, the reaction mixture was extracted with ethyl acetate, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (SiO₂, 20:1 DCM/MeOH), thus obtaining Compound 301 (11 mg, 11%) as white oil.

[0410] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.88 (s, 1 H), 7.69 - 7.77 (m, 2 H), 6.73 - 6.83 (m, 2 H), 6.60 - 6.67 (m, 1 H), 5.41, 5.74 (2d, 1 H, *J* = 6.42, 5.97 Hz), 4.49 - 4.95 (m, 1 H), 4.15 - 4.33 (m, 1 H), 3.70, 3.84 (2s, 3 H), 2.90 - 3.36 (m, 4 H), 1.98 - 2.50 (m, 2 H), 1.90 - 1.98 (m, 2 H), 1.46 - 1.50 (m, 2 H), 1.00 - 1.05 (m, 6 H), 0.60 - 0.70 (2d, 3 H, *J* = 4.92, 4.98 Hz); MS (ESI) *m/z* 638.2 (M⁺ + H).

Compound 302

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0411] Compound 302 (0.12 g, 88.4%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compounds 18.

[0412] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1H), 7.73 (d, 1 H, *J* = 3.6 Hz), 6.86, 6.83 (2d, 1 H, *J* = 8.7 Hz), 6.53, 6.49 (2d, 1 H, *J* = 12.2 Hz), 5.60 (t, 1 H, *J* = 7.5 Hz), 3.99-3.89 (m, 2 H), 3.72, 3.68 (2s, 3H), 3.51, 3.39 (2d, 1 H, *J* = 14.6 Hz), 2.42-1.89 (m, 4 H), 1.45 (m, 2 H), 1.29-1.23 (m, 6 H), 1.03-0.85 (m, 8 H), 0.73-0.60 (m, 4 H), 0.38, 0.31 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI): 614 (M⁺ + H).

Compound 303

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0413] Compound 303 (80 mg, 54.7%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0414] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.72 (s, 2 H), 6.92, 6.88 (2d, 1 H, *J* = 8.8, 8.7 Hz), 6.55, 6.51 (2d, 1 H, *J* = 12.2, 12.1 Hz), 5.59 (t, 1 H, *J* = 7.8 Hz), 4.00-3.95 (m, 2 H), 3.73, 3.70 (2s, 3H), 3.54, 3.44 (2d, 1 H, *J* = 14.9, 14.6 Hz), 2.42-1.24 (m, 10 H), 0.74-0.61 (m, 4 H), 0.44-0.37 (m, 7 H); MS (ESI): 612 (M⁺ + H).

Compound 304

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(3',5'-difluoro-4-methoxy-4'-(methoxymethoxy)biphenyl-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0415] 3'-(2-(Bromomethyl)-4,4-dicyclohex-1-enyl)-3,5-difluoro-4'-methoxy-4-(methoxy methoxy)biphenyl, which is an intermediate compound, was dissolved in dimethylformamide (DMF). (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-oxazolidin-2-one and sodium hydride were added dropwise to the obtained solution at room temperature. After the completion of the reaction, the reaction mixture was extracted with ethyl acetate, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (SiO₂, 5:1 n-hexane : EtOAc), thus obtaining Compound 304 (60 mg, 46%) as white oil.

[0416] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.79 (s, 2 H), 7.36 - 7.39 (m, 1 H), 6.88 - 6.95 (m, 3 H), 5.57 - 5.62 (m, 1 H), 5.17 (d, 1 H, *J* = 9.9 Hz), 3.96 - 4.04 (m, 2 H), 3.79 - 3.82 (2s, 3 H), 3.58 - 3.62 (m, 3 H), 3.44 - 3.58 (m, 1 H), 2.00 - 2.50 (m, 2 H), 1.93 - 1.95 (m, 2 H), 1.50 - 1.55 (m, 2 H), 1.02 - 1.07 (m, 6 H), 0.37, 0.43 (2d, 3 H, *J* = 6.6, 6.5 Hz); MS (ESI) *m/z* 714 (M⁺ + H).

Compound 305

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(3',5'-difluoro-4'-hydroxy-4-methoxybiphenyl-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0417] Compound 304 (0.03 g, 0.04 mmol), a starting material, was dissolved in methanol (2 mL). The solution (0.5 mL) of hydrogen chloride in methanol was added dropwise to the obtained solution, and stirred at room temperature for 3 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was extracted with ethyl acetate, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue

was separated by MPLC (SiO₂, 5:1 n-hexane : EtOAc), thus obtaining Compound 305 (20 mg, 71%) as white solid.

[0418] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.72 (s, 2 H), 7.34 - 7.37 (m, 1 H), 6.99 - 7.12 (m, 3 H), 6.89, 6.94 (2d, 1 H, J = 8.60, 8.60 Hz), 5.95 (br s, 1 H), 5.61 (t, 1 H, J = 7.8 Hz), 3.93 - 4.05 (m, 2 H), 3.78, 3.81 (2s, 3 H), 3.49, 3.63 (2d, 1 H, J = 15.04, 14.64 Hz), 2.10 - 2.54 (m, 2 H), 1.95 (m, 2 H), 1.47 - 1.55 (m, 2 H), 1.02 - 1.06 (m, 6 H), 0.37, 0.43 (2d, 3 H, J = 6.48, 6.56 Hz); MS (ESI) m/z 670 (M⁺ + H).

Compound 306

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide

[0419] Compound 306 (42 mg, 56%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 299.

[0420] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 - 7.74 (m, 2 H), 7.00 - 7.03 (m, 1 H), 6.70 - 6.81 (m, 1 H), 5.52 - 5.60 (m, 3 H), 3.88 - 4.03 (m, 2 H), 3.71, 3.75 (2s, 3 H), 3.39, 3.58 (2d, 1 H, J = 14.84, 14.48 Hz), 2.65 - 2.82 (m, 2 H), 2.00 - 2.50 (m, 2 H), 1.92 (m, 2 H), 1.45 - 1.50 (m, 2 H), 1.14 - 1.18 (m, 6 H), 1.01 - 1.64 (m, 6 H), 0.29, 0.46 (2d, 3 H, J = 6.48, 6.56 Hz); MS (ESI) m/z 641 (M⁺ + H).

Compound 307

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile

[0421] Compound 307 (12 mg, 48%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 300.

[0422] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.73 - 7.93 (m, 3 H), 6.82 - 7.16 (m, 3 H), 5.58 - 5.60 (m, 1 H), 3.89 - 4.02 (m, 2 H), 3.75 - 3.77 (m, 3 H), 3.43 - 3.67 (m, 1 H), 2.57 - 2.86 (m, 2 H), 1.85 - 2.47 (m, 4 H), 1.94 (m, 2 H), 1.21 - 1.78 (m, 6 H), 0.85 - 0.89 (m, 6 H), 0.30 - 0.40 (m, 3 H); MS (ESI) m/z 623.3 (M⁺ + H).

Compound 308

methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate

[0423] Methyl 3-(4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate, an intermediate compound, was synthesized, and then Compound 308 (0.9 g, 66.5%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 285.

[0424] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.18 - 7.21 (m, 1 H), 6.92 - 6.96 (m, 1 H), 6.74 - 6.81 (m, 1 H), 5.58 - 5.61 (m, 1 H), 3.87 - 4.00 (m, 2 H), 3.73, 3.74 (2s, 3 H), 3.47, 3.60 (2d, 1 H, J = 11.22 10.89 Hz), 3.49, 3.50 (2s, 3 H), 2.54 - 2.59 (m, 2 H), 2.00 - 2.30 (m, 2 H), 1.93 - 1.94 (m, 2 H), 1.46 - 1.48 (m, 2 H), 1.38 - 1.41 (m, 6 H), 1.01 - 1.05 (m, 6 H), 0.28, 0.41 (2d, 3 H, J = 4.89, 4.92 Hz); MS (ESI) m/z 656.3 (M⁺ + H).

Compound 309

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoic acid

[0425] Compound 309 (0.24 g, 32.7%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0426] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.20 - 7.23 (m, 1 H), 6.94 - 6.98 (m, 1 H), 6.75 - 6.82 (m, 1 H), 5.57 - 5.60 (m, 1 H), 3.85 - 4.01 (m, 2 H), 3.73, 3.75 (2s, 3 H), 3.49, 3.58 (2d, 1 H, *J* = 10.98, 10.83 Hz), 2.55 - 2.64 (m, 2 H), 2.05 - 2.08 (m, 2 H), 1.92 - 1.94 (m, 2 H), 1.47 - 1.51 (m, 2 H), 1.43 - 1.44 (m, 6 H), 1.00 - 1.05 (m, 6 H), 0.26, 0.43 (2d, 3 H, *J* = 4.95, 4.86 Hz); MS (ESI) *m/z* 642.2 (M⁺ + H).

Compound 310

methyl 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylbutanoate

[0427] Compound 310 (0.7 g, 96.1 %) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 285.

[0428] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.73 - 7.75 (m, 2 H), 6.99 - 7.02 (m, 1 H), 6.71 - 6.79 (m, 2 H), 5.59 - 5.62 (m, 1 H), 3.91 - 4.02 (m, 2 H), 3.71, 3.74 (2s, 3 H), 3.63, 3.68 (2s, 3 H), 3.47, 3.59 (2d, 1 H, *J* = 11.10, 10.95 Hz), 2.40 - 2.47 (m, 2 H), 2.00 - 2.38 (m, 2 H), 1.91 - 1.93 (m, 2 H), 1.76 - 1.80 (m, 2 H), 1.46 - 1.49 (m, 2 H), 1.24 - 1.28 (m, 6 H), 1.19 (d, 1 H, *J* = 3.4 Hz), 1.01 - 1.05 (m, 6 H), 0.31, 0.43 (2d, 3 H, *J* = 4.86, 4.95 Hz); MS (ESI) *m/z* 670.2 (M⁺ + H).

Compound 311

4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylbutanoic acid

[0429] Compound 311 (0.11 g, 20%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0430] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.73 - 7.75 (m, 2 H), 7.70 - 7.04 (m, 1 H), 6.72 - 6.76 (m, 2 H), 5.59 - 5.61 (m, 1 H), 3.95 - 4.00 (m, 2 H), 3.71 - 3.80 (m, 3 H), 3.40 - 3.59 (m, 1 H), 2.46 - 2.54 (m, 2 H), 2.00 - 2.15 (m, 4 H), 1.84 - 1.93 (m, 2 H), 1.70 - 1.84 (m, 2 H), 1.46 - 1.49 (m, 2 H), 1.22 - 1.24 (m, 6 H), 0.31, 0.44 (2d, 3 H, *J* = 5.01, 4.83 Hz); MS (ESI) *m/z* 656.3 (M⁺ + H).

Compound 312

ethyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylate

[0431] Compound 312 (0.38 g, 85%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 285.

[0432] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84, 7.77, 7.73 (3 brs, 3 H), 7.70-6.95 (m, 1 H), 6.76-6.69 (m, 2 H), 5.58 (t, 1 H, *J* = 8.0 Hz), 4.13-4.05 (m, 2 H), 3.99-3.85 (m, 2 H), 3.72, 3.70 (2s, 3 H), 3.56, 3.45 (2d, 1 H, *J* = 14.9, 14.5 Hz), 2.99-2.94 (m, 2 H), 2.37-1.97 (m, 11 H), 1.46 (m, 2 H), 1.27-1.18 (m, 5 H), 1.03-0.86 (m, 6 H), 0.34, 0.25 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI): 726 (M⁺ + H).

Compound 313

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylic acid

[0433] Compound 313 (0.15 g, 47.4%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0434] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84, 7.75, 7.72 (3s, 3 H), 7.04-7.01 (m, 1 H), 6.82-6.70 (m, 2 H), 5.58 (d, 1 H, *J* = 8.1 Hz), 3.99-3.86 (m, 2 H), 3.72, 3.70 (2s, 3 H), 3.56, 3.46 (2d, 1 H, *J* = 14.9, 14.6 Hz), 3.04-2.96 (m, 2H), 2.47-1.81 (m, 12 H), 1.46 (m, 2 H), 1.03-0.98 (m, 6 H), 0.38, 0.25 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI): 654 (M⁺ + H).

Compound 314

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxamide

[0435] Compound 314 (0.04 g, 59.5%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 299.

[0436] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.06, 7.03 (2d, 1 H, *J* = 7.06, 7.04 Hz), 6.84, 6.79 (2d, 1 H, *J* = 6.84, 6.79 Hz), 6.77, 6.72 (2d, 1 H, *J* = 8.4 Hz), 5.58, 5.50 (2d, 1 H, *J* = 8.1, 8.0 Hz), 5.34-5.26 (brs, 2H), 4.12-3.85 (m, 2 H), 3.77, 3.70 (2s, 3 H), 3.54, 3.30 (2d, 1 H, *J* = 14.8, 14.5 Hz), 2.96 (d, 2 H, *J* = 10.6 Hz), 2.75-1.79 (m, 11 H), 1.46 (m, 2 H), 1.02-1.00 (m, 3 H); MS (ESI): 697 (M⁺ + H).

Compound 315

methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoate

[0437] Methyl 2-(4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoate, an intermediate compound, was synthesized, and then Compound 315 (0.16 g, 76.8%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 285.

[0438] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (d, 2 H, *J* = 4.4 Hz), 7.19, 7.17 (2t, 1 H, *J* = 2.7 Hz), 6.94, 6.90 (2d, 1 H, *J* = 2.5 Hz), 6.81, 6.76 (2d, 1 H, *J* = 8.7 Hz), 5.59, 5.55 (2d, 1 H, *J* = 8.2 Hz), 3.96-3.88 (m, 2 H), 3.75, 3.73 (2s, 3 H), 3.63, 3.55 (2s, 3 H), 3.54, 3.40 (2d, 1 H, *J* = 14.8, 13.3 Hz), 2.52-1.93 (m, 5 H), 1.55-1.44 (m, 10 H), 1.04, 1.02, 1.00 (3s, 6 H), 0.35, 0.27 (2d, 3 H, *J* = 6.7, 6.5 Hz); MS (ESI): 642 (M⁺ + H).

Compound 316

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0439] Compound 316 (0.08 g, 30.6%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0440] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.37 (m, 1 H), 7.88 (s, 1 H), 7.74 (s, 2H), 7.49 (m, 1H), 5.64 (m, 1 H), 4.02-3.94 (m, 5 H), 3.47-3.36 (m, 1 H), 2.60-2.00 (m, 2 H), 1.94 (s, 2 H), 1.55 (m, 2 H), 1.10 (m, 6 H), 0.40 (m, 3 H); MS (ESI): 611.2 (M+H)⁺.

Compound 317

methyl 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetate

[0441] Compound 317 (0.2 g, 77%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0442] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.76 (s, 2 H), 6.67 (m, 1H), 6.50 (m, 1H), 5.95 (2d, 2H, *J* = 1.04, 1.32 Hz), 5.57 (m, 1 H), 4.09 (m, 1 H), 3.95 (m, 1 H), 3.64 (m, 4 H), 3.50 (s, 2 H), 2.40-2.20 (m, 2 H), 1.95 (s, 2 H), 1.51 (m, 2 H), 1.03 (m, 6 H), 0.41 (m, 3 H); MS (ESI): 628.1 (M+H)⁺.

Compound 318

2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetic acid

[0443] Compound 318 (0.09 g, 76.7%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0444] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 6.65 (m, 1H), 6.46 (m, 1H), 5.93 (m, 2H), 5.59 (m, 1 H), 4.09-3.91 (m, 2 H), 3.66 (m, 1 H), 3.49 (s, 2 H), 2.40-2.18 (m, 2 H), 1.93 (s, 2 H), 1.50 (m, 2 H), 1.03 (m, 6 H), 0.42 (m, 3 H); MS (ESI): 614.1 (M+H)⁺.

Compound 319

2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-methylacetamide

[0445] Compound 318 (0.06 g, 0.1 mmol) was dissolved in methylene chloride (10 mL). Methylamine (0.02 g), 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide (0.04 g) and hydroxybenzotriazole (0.03 g) were added to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature overnight. After the completion of the reaction, ethyl acetate was added dropwise to the reaction mixture. The obtained reaction mixture was washed with saturated sodium hydrogen carbonate solution and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (SiO₂, 4:1 hexane/ EtOAc), thus obtaining Compound 319 (0.03 g, 49%) as white solid.

[0446] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.75 (s, 2 H), 6.64 (m, 1H), 6.49 (m, 1H), 5.96 (2d, 2H, J = 1.16, 1.28 Hz), 5.69 (br s, 1 H), 5.56 (m, 1 H), 4.17 (m, 1 H), 4.03 (m, 1 H), 3.53 (m, 1 H), 3.34 (s, 2 H), 2.74 (m, 3 H), 2.40-2.20 (m, 2 H), 1.94 (s, 2 H), 1.51 (m, 2 H), 1.02 (m, 6 H), 0.49 (m, 3 H).

Compound 320

2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid

[0447] Compound 320 (0.05 g, 31.4%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0448] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.71 (d, 2 H, J = 4.6 Hz), 7.24-7.21 (m, 1 H), 6.97, 6.96 (2d, 1 H, J = 2.6 Hz), 6.82, 6.77 (2d, 1 H, J = 8.7 Hz), 5.55 (t, 2 H, J = 7.9 Hz), 3.98-3.85 (m, 2 H), 3.75, 3.73 (2s, 3H), 3.54, 3.39 (2d, 1 H, J = 15.0, 14.6 Hz), 2.56-1.92 (m, 5 H), 1.54-1.44 (m, 8 H), 1.04, 1.01, 1.00 (3s, 6 H), 0.38, 0.28 (2d, 3 H, J = 6.6, 6.5 Hz); MS (ESI): 628 (M⁺ + H).

Compound 321

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N,2,2-trimethylpropanamide

[0449] Compound 321 (78 mg, 76.4%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 319.

[0450] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.73 - 7.75 (m, 2 H), 6.94 - 6.98 (m, 1 H), 6.71 - 6.76 (m, 2 H), 5.31 - 5.60 (m, 2 H), 3.88 - 4.06 (m, 2 H), 3.71, 3.76 (2s, 3 H), 3.37, 3.56 (2d, 1 H, J = 14.92, 14.40 Hz), 2.47 - 2.84 (m, 2 H), 2.67 - 2.76 (m, 3 H), 2.00 - 2.50 (m, 2 H), 1.93 (m, 2 H), 1.44 - 1.57 (m, 6 H), 1.11 - 1.14 (m, 6 H), 1.01 - 1.05 (m, 6 H), 0.29, 0.46 (2d, 3 H, J = 6.48, 6.56 Hz); MS (ESI) m/z 655 (M⁺ + H).

Compound 323

methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylate

[0451] Compound 323 (81 mg, 51%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 285.

[0452] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.77, 7.72 (2s, 2 H), 6.94 - 6.90 (m, 1 H), 6.74 - 6.66 (m, 2 H), 5.59 (t, 1 H, J = 8.0 Hz), 3.99 - 3.84 (m, 2 H), 3.75, 3.70 (2s, 3 H), 3.63, 3.59 (2s, 3 H), 3.57, 3.46 (2d, 1 H, J = 14.5 Hz), 2.85, 2.81 (2d, 1 H, J = 3.7 Hz), 2.53 - 2.42 (m, 1 H), 2.24 - 2.16 (m, 1 H), 2.02 - 1.93 (m, 5 H), 1.64 - 1.44 (m, 7 H), 1.03 - 0.99 (m, 6 H), 0.38, 0.26 (2d, 3 H, J = 6.6 Hz); MS (ESI) m/z 682.2, 704.1 (M⁺+H, M⁺+Na).

Compound 324

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylic acid

[0453] Compound 324 (6 mg, 9.4%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis

of compound 134.

[0454] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.03 - 6.99 (m, 1 H), 6.84 (dd, 1 H, *J* = 9.9, 2.2 Hz), 6.73 (dd, 1 H, *J* = 16.4, 8.4 Hz), 5.62 - 5.58 (m, 1 H), 3.99 - 3.89 (m, 2 H), 3.73, 3.70 (2s, 3 H), 3.54 - 3.50 (m, 1 H), 2.99 - 2.77 (m, 2 H), 2.17 - 1.88 (m, 7 H), 1.66 - 1.32 (m, 7 H), 1.03 - 0.98 (m, 6 H), 0.47, 0.32 (2d, 3 H, *J* = 6.6 Hz); MS (ESI) *m/z* 668.1, 690.1 (M⁺+H, M⁺+Na).

Compound 325

3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid

[0455] Compound 325 (1.07 g, 90%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0456] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.74 (d, 2 H, *J* = 7.0 Hz), 6.92 (t, 0 H, *J* = 58.5 Hz), 6.57 - 6.51 (m, 1 H), 5.62 (dd, 1 H, *J* = 8.2, 2.3 Hz), 4.00 - 3.81 (m, 2 H), 3.73, 3.70 (2s, 3 H), 3.51 - 3.47 (m, 1 H), 2.88 - 2.79 (m, 2 H), 2.49 - 2.41 (m, 1 H), 2.14 - 2.11 (m, 1 H), 1.90 - 1.88 (m, 2 H), 1.49 - 1.40 (m, 2 H), 1.29 - 1.10 (m, 6 H), 1.02 - 0.95 (m, 6 H), 0.46 (2d, 3 H, *J* = 6.6 Hz); MS (ESI) *m/z* 660.2 (M⁺+H).

Compound 326

methyl 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate

[0457] Methyl 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate, which is an intermediate compound, was synthesized, and then Compound 326 (0.21 g, 65%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 285.

[0458] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (d, 1 H, *J* = 5.0 Hz), 7.73 (d, 2 H, *J* = 4.5 Hz), 6.67-6.50 (m, 2 H), 5.62-5.58 (m, 1 H), 4.02-3.90 (m, 2 H), 3.72-3.41 (m, 7 H), 2.90-1.78 (m, 10 H), 1.46 (m, 2 H), 1.28 (m, 5 H), 1.03-0.96 (m, 6 H), 0.45 (t, 1.3 H, *J* = 5.9 Hz), 0.33 (d, 1.7 H, *J* = 6.5 Hz); MS(ESI): 654 (M⁺ + H).

Compound 327

7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid

[0459] Compound 327 (0.07 g, 38.7%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0460] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (d, 2 H, *J* = 4.3 Hz), 6.67, 6.66 (2d, 1 H, *J* = 2.2, 1.6 Hz), 6.56, 6.51, 6.50 (3s, 1 H), 5.60 (t, 1 H, *J* = 6.6 Hz), 4.02-3.90 (m, 2 H), 3.71, 3.69, 3.68 (3s, 3 H), 3.62-3.43 (m, 3 H), 2.52-1.81 (m, 4 H), 1.46 (m, 2 H), 1.04, 1.03, 0.99 (3s, 6 H), 0.48-0.33 (m, 3 H); MS(ESI): 640 (M⁺ + H).

Compound 328

methyl 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoate

[0461] Compound 328 (1.52 g, 98%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 285.

[0462] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.76, 7.72 (2s, 2 H), 6.67 (dd, 1 H, *J* = 16.1, 8.6 Hz), 6.53 (dd, 1 H, *J* = 14.7, 11.7 Hz), 5.60 (t, 1 H, *J* = 7.4 Hz), 3.98 - 3.84 (m, 2 H), 3.72, 3.70 (2s, 3 H), 3.64 (s, 3 H), 3.54, 3.44 (2d, 1 H, *J* = 14.4 Hz), 2.85 - 2.72 (m, 2 H), 2.47 - 2.41 (m, 1 H), 2.23 - 2.14 (m, 1 H), 2.00 - 1.91 (m, 2 H), 1.52 - 1.41 (m, 2 H), 1.18 - 1.12 (m, 6 H), 1.05 - 0.98 (m, 6 H), 0.41, 0.31 (2d, 3 H, *J* = 6.6 Hz); MS (ESI) *m/z* 674 (M⁺+H).

Compound 329

3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide

[0463] Compound 329 (23 mg, 23%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 299.

[0464] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.73 (d, 1 H, *J* = 7.2 Hz), 6.82 (dd, 1 H, *J* = 17.7, 8.6 Hz), 6.54 (dd, 1 H, *J* = 15.4, 11.6 Hz), 5.68 (brs, 0.47 H), 5.59 (dd, 1 H, *J* = 8.1, 3.0 Hz), 5.55 (brs, 0.13 H), 5.41 (brs, 0.4 H), 4.00 - 3.86 (m, 2 H), 3.73, 3.69 (2s, 3 H), 3.53, 3.32 (2d, 1 H, *J* = 14.6 Hz), 2.88 - 2.72 (m, 2 H), 2.45 - 1.97 (m, 2 H), 1.89 (brs, 2 H), 1.50 - 1.39 (m, 2 H), 1.17 (t, 6 H, *J* = 9.9 Hz), 1.00 (dd, 6 H, *J* = 5.3, 12.1 Hz), 0.44, 0.31 (2d, 3 H, *J* = 6.6 Hz); MS (ESI) *m/z* 659.1 (M⁺+H).

Compound 330

ethyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenethyl)cyclobutanecarboxylate

[0465] Compound 330 (0.03 g, 72.2%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 285.

[0466] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.74 (s, 2 H), 7.03 (m, 1H), 6.79 (m, 2H), 5.62 (m, 1H), 4.20-3.90 (m, 4 H), 3.75 (m, 3 H), 3.60 (m, 1 H), 2.50-1.83 (m, 13 H), 1.50 (m, 2 H), 1.30 (m, 5 H), 1.05 (m, 6 H), 0.44 (2d, 3H, *J* = 6.56, 6.52 Hz).

Compound 331

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenethyl)cyclobutanecarboxylic acid

[0467] Compound 331 (3 mg, 10.4%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 286.

[0468] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.74 (s, 2 H), 7.05 (m, 1H), 6.80 (m, 2H), 5.62 (m, 1H), 4.04-3.90 (m, 2 H), 3.76 (m, 3 H), 3.60 (m, 1 H), 2.50-1.83 (m, 13 H), 1.50 (m, 2 H), 1.30 (m, 5 H), 1.05 (m, 6 H), 0.46 (m, 3H).

Compound 332

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzonitrile

[0469] Compound 332 (0.2 g, 56.1%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0470] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.88 (s, 1 H), 7.75 (m, 2 H), 7.59 (m, 1H), 7.29 (m, 1H), 6.95 (m, 1H), 5.66, 5.60 (2d, 1H, *J* = 8.20, 8.08 Hz), 4.01-4.90 (m, 2H), 3.85 (m, 3H), 3.52-3.30 (m, 1 H), 2.20-2.04 (m, 2 H), 1.52-1.47 (m, 2 H), 1.05-0.98 (m, 6 H), 1.47 (m, 3H); MS (ESI): 610.1 (M+H)⁺.

Compound 333

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0471] Compound 333 (0.01 g, 18.6%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 301.

[0472] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.13 (m, 1 H), 7.92-7.72 (m, 4 H), 7.03-6.99 (m, 1H), 5.77, 5.62 (2d, 1H, *J* = 8.00, 8.24 Hz), 4.20-4.03 (m, 2H), 3.86 (m, 3H), 3.12 (m, 1 H), 2.60-2.04 (m, 2 H), 1.54-1.41 (m, 2 H), 1.05-0.98 (m, 6 H), 1.52, 0.46 (2d, 3H, *J* = 6.56, 6.52 Hz); MS (ESI): 610.1 (M+H)⁺.

Compound 334

(4R,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0473] Referring to the published article "Cameron J. Smith et al., J. Med. Chem. 2011 54 4880", (1R,2R)-2-amino-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)propane-ol was synthesized, and then Compound 334 (0.11 g, 61.1%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0474] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.91 (s, 1 H), 7.79 (s, 2 H), 6.74 - 6.78 (m, 2 H), 6.54 - 6.58 (m, 2 H), 5.00 (t, 1 H, J = 5.7 Hz), 3.85 - 3.94 (m, 1 H), 3.66 - 3.73 (2s, 3 H), 3.44 - 3.60 (m, 1 H), 3.34 - 3.50 (m, 1 H), 3.12 - 3.19 (m, 1 H), 2.12 - 2.40 (m, 2 H), 1.85 - 2.07 (m, 2 H), 1.15 - 1.45 (m, 2 H), 1.20 - 1.38 (m, 6 H), 0.95 - 1.19 (m, 3 H), 0.60 - 1.00 (m, 6 H); MS (ESI) m/z 602 (M⁺ + H).

Compound 335

(4S,5S)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0475] Referring to the published article "Cameron J. Smith et al., J. Med. Chem. 2011 54 4880", (1S,2S)-2-amino-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)propane-ol was synthesized, and then Compound 335 (0.16 g, 86%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0476] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.89 (s, 1 H), 7.78 (s, 2 H), 6.75 (dd, 1 H, J = 5.6, 8.6 Hz), 6.55 (dd, 1 H, J = 12.2, 3.2 Hz), 4.99 (t, 0 H, J = 5.6 Hz), 3.93 - 3.84 (m, 1 H), 3.73, 3.65 (2s, 3 H), 3.59 - 3.32 (m, 2 H), 3.16 - 3.11 (m, 1 H), 2.34 - 2.11 (m, 2 H), 1.94 - 1.84 (m, 2 H), 1.44 - 1.25 (m, 2 H), 1.22 - 1.16 (m, 6 H), 1.09, 0.98 (2d, 3 H, J = 6.2 Hz), 0.94 (s, 1.3 H), 0.90 (s, 1.7 H), 0.77 (s, 1.3 H), 0.59 (s, 1.7 H); MS (ESI) m/z 602.1 (M⁺+H). (ratio = 1 : 1.25).

Compound 336

(4R,5S)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0477] Referring to the published article "Cameron J. Smith et al., J. Med. Chem. 2011 54 4880", (1S,2R)-2-amino-1-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)propane-ol was synthesized, and then Compound 336 (0.09 g, 57%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0478] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 6.81 (2d, 1H, J = 12.64, 12.68 Hz), 6.56 (2d, 1H, J = 12.24, 12.12 Hz), 5.63 (m, 1H), 4.01-3.90 (m, 2H), 3.72(m, 3 H), 3.56 (m, 1 H), 3.14 (m, 1 H), 2.50-2.00 (m, 2 H), 1.92 (m, 2H), 1.51-1.47 (m, 2H), 1.20 (m, 6H), 1.04 (m, 6H), 0.40 (m, 3H).

Compound 337

7-2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxamide

[0479] Compound 337 (0.03 g, 79.5%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 299.

[0480] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (d, 2 H, J = 4.3 Hz), 6.67, 6.66 (2d, 1 H, J = 2.2, 1.6 Hz), 6.56, 6.51, 6.50 (3s, 1 H), 5.60 (t, 1 H, J = 6.6 Hz), 4.02-3.90 (m, 2 H), 3.71, 3.69, 3.68 (3s, 3 H), 3.62-3.43 (m, 3 H), 2.52-1.81 (m, 4 H), 1.46 (m, 2 H), 1.04, 1.03 (m, 6H).

Compound 338

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0481] Compound 333 (0.03 g, 0.048 mmol) was dissolved in acetonitrile (10 mL). Potassium carbonate (7 mg) and iodomethane (7 mg) were added to the obtained solution, and then stirred at 100°C overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was PTLC (SiO₂, Hx:EA = 1:1, thus obtaining Compound 338 (0.01 g, 39.1%) as colorless oil.

[0482] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.04 (m, 1 H), 7.85-7.71 (m, 4 H), 6.99-6.94 (m, 1H), 5.66, 5.54 (2d, 1H, *J* = 8.04, 8.04 Hz), 4.40 (m, 3H), 4.03 (m, 2H), 3.83 (m, 3 H), 3.62-3.40 (m, 1 H), 2.53-2.05 (m, 2 H), 1.95 (m, 2 H), 1.50 (m, 2H), 1.06 (m, 6H), 0.38 (m, 3H); MS (ESI): 624.1 (M+H)⁺.

5 Compound 339

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

10 **[0483]** Compound 339 (0.01 g, 39.1%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 338.

[0484] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.75 (m, 2 H), 7.65-7.48 (m, 2H), 7.06-7.02 (m, 1H), 5.63, 5.57 (2d, 1H, *J* = 8.24, 8.04 Hz), 4.21 (m, 3H), 4.10-3.95 (m, 2 H), 3.90-3.82 (m, 3 H), 3.58-3.35 (m, 1 H), 2.53-2.05 (m, 2 H), 1.95 (m, 2 H), 1.50 (m, 2H), 1.06 (m, 6H), 0.48, 0.44 (2d, 1H, *J* = 6.60, 6.62 Hz); MS (ESI): 624.1 (M+H)⁺.

15 Compound 340

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

20 **[0485]** Compound 340 (0.04 g, 26.7%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 301.

[0486] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.00 (s, 1 H), 7.86, 7.84 (2s, 1 H), 7.73, 7.71 (2s, 1 H), 6.72-6.33 (m, 2 H), 5.62, 5.50 (2d, 1 H, *J* = 8.0 Hz), 4.37-4.04 (m, 2 H), 3.80, 3.66 (2s, 3 H), 3.10, 2.83 (2d, 1 H, *J* = 15, 8.4 Hz), 2.38-1.89 (m, 4 H), 1.60-1.31 (m, 8 H), 1.03-0.97 (m, 6 H), 0.64, 0.38 (2d, 3 H, *J* = 6.6 Hz); MS (ESI): 666 (M⁺ + H).

25 Compound 341

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

30 **[0487]** Compound 341 (6 mg, 32.6%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 338.

[0488] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.76, 7.72 (2s, 2 H), 6.82-6.79 (m, 1 H), 6.68, 6.64 (2d, 1 H, *J* = 8.4 Hz), 6.43, 6.41 (2d, 1 H, *J* = 2.2 Hz), 5.60, 5.56 (2d, 1 H, *J* = 8.2 Hz), 4.27, 4.26 (2s, 3 H), 3.93-3.73 (m, 2 H), 3.70, 3.68 (2s, 3 H), 3.42, 3.35 (2d, 1 H, *J* = 14.9 Hz), 3.03-2.85 (m, 2 H), 2.48-1.64 (m, 6H), 1.46-1.20 (m, 8 H), 1.06-0.98 (m, 6 H), 0.38, 0.21 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI): 680 (M⁺ + H).

40 Compound 342

tert-butyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)acetate

45 **[0489]** Compound 37 (0.1 g, 0.17 mmol) was dissolved in methylene chloride (3 mL). tert-Butyl 2-aminoacetate·HCl (37 mg, 0.22 mmol), diisopropylethylamine (0.09 mL, 0.51 mmol) and hydroxybenzotriazole (46 mg, 0.34 mmol) were added dropwise to the obtained solution, and stirred at room temperature 10 minutes. 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide (66 mg, 0.34 mmol) was added dropwise to the reaction mixture, and then stirred at room temperature for 1 hour. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with methylene chloride, and washed with water and brine. The organic layers were collected, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure. The residue was separated by MPLC (SiO₂, 20%-30% Hexane/ EtOAc), thus obtaining Compound 342 (0.1 g, 87%) as white solid.

50 **[0490]** ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.82 (d, 1 H, *J* = 4.7 Hz), 7.73 - 7.70 (m, 2.5 H), 7.65 (dd, 0.5 H, *J* = 8.6, 2.3 Hz), 7.53, 7.47 (2d, 1 H, *J* = 2.4 Hz), 6.86 (t, 1 H, *J* = 8.6 Hz), 6.67 - 6.60 (m, 1 H), 5.56 (dd, 1 H, *J* = 16.3, 8.1 Hz), 4.12 - 4.03 (m, 2 H), 3.99 - 3.92 (m, 2 H), 3.80, 3.77 (2s, 3 H), 3.47, 3.32 (2d, 1 H, *J* = 14.8 Hz), 2.45 - 2.00 (m, 2 H), 1.90 (brs, 2 H), 1.48 - 1.44 (m, 11 H), 1.00 (dd, 6 H, *J* = 11.0, 2.3 Hz), 0.41, 0.34 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI) *m/z* 699.1 (M⁺+H).

Compound 343

tert-butyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)acetate

[0491] Compound 343 (21 mg, 21 %) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0492] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.74 (s, 2 H), 7.41 - 7.34 (m, 1 H), 7.20 - 7.12 (m, 1 H), 6.86 - 6.83 (m, 1 H), 5.62, 6.83 (2d, 1 H, *J* = 8.1 Hz), 4.13 - 3.82 (m, 4 H), 3.79, 3.77 (2s, 3 H), 3.52 - 3.34 (m, 1 H), 3.05 - 3.02 (m, 3 H), 2.39 - 2.04 (m, 2 H), 1.92 (brs, 2 H), 1.51 - 1.45 (m, 11 H), 1.03 - 1.00 (m, 6 H), 0.43, 0.37 (d, 3 H, *J* = 6.6 Hz); MS (ESI) *m/z* 713.1 (M⁺+H).

Compound 344

(R)-methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)-3-methylbutanoate

[0493] Compound 344 (96 mg, 81 %) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 342.

[0494] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.71 (dd, 0.5 H, *J* = 8.6, 2.4 Hz), 7.65 (dd, 0.5 H, *J* = 8.6, 2.4 Hz), 7.53, 7.48 (2d, 1 H, *J* = 2.3 Hz), 6.89 (t, 1 H, *J* = 8.8 Hz), 6.58 - 6.54 (m, 1 H), 5.55 (dd, 1 H, *J* = 19.5, 8.0 Hz), 4.76 - 4.69 (m, 1 H), 4.01 - 3.93 (m, 2 H), 3.83, 3.80 (2s, 3 H), 3.77, 3.74 (2s, 3 H), 3.50, 3.33 (2d, 1 H, *J* = 15.0 Hz), 2.45 - 2.21 (m, 2 H), 1.93 (brs, 2 H), 1.52 - 1.46 (m, 2 H), 1.04 - 0.89 (m, 12 H), 0.41 (t, 3 H, *J* = 6.7 Hz); MS (ESI) *m/z* 699.1 (M⁺+H).

Compound 345

(R)-methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)-3-methylbutanoate

[0495] Compound 345 (50 mg, 55%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0496] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.74 (d, 2 H, *J* = 8.5 Hz), 7.32 (dd, 1 H, *J* = 8.5, 2.2 Hz), 7.12 (dd, 1 H, *J* = 10.5, 2.2 Hz), 6.88 - 6.53 (m, 1 H), 5.61 (d, 0.5 H, *J* = 8.4 Hz), 5.46 (d, 0.5 H, *J* = 7.2 Hz), 4.08 - 3.90 (m, 3 H), 3.82 - 3.73 (m, 6 H), 3.68 - 3.36 (m, 2 H), 3.01 - 2.96 (m, 3 H), 2.44 - 2.19 (m, 2 H), 1.96 - 1.87 (m, 2 H), 1.53 - 1.41 (m, 2 H), 1.03 - 0.75 (m, 12 H), 0.41, 0.36 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); MS (ESI) *m/z* 713.2 (M⁺+H).

Compound 346

(R)-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)-3-methylbutanoic acid

[0497] Compound 346 (21 mg, 48%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0498] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.43 - 7.37 (m, 1 H), 7.22 - 7.09 (m, 1 H), 6.90 - 6.86 (m, 1 H), 5.63 - 5.48 (m, 1 H), 4.23 - 3.95 (m, 4 H), 3.82, 3.80 (2s, 3 H), 3.51 - 3.32 (m, 1 H), 3.06 (brs, 3 H), 2.56 - 2.17 (m, 2 H), 1.92 - 1.87 (m, 2 H), 1.49 - 1.41 (m, 2 H), 1.10 - 0.84 (m, 12 H), 0.43, 0.38 (2d, 3 H, *J* = 6.0 Hz); MS (ESI) *m/z* 699.1 (M⁺+H).

Compound 347

methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylate

[0499] Compound 313 (0.03g, 0.046 mmol) was dissolved in dimethylformamide (3 mL). Potassium carbonate (8.2 mg) and iodomethane (4.0 μL) were added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with ethyl acetate, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure to

remove the solvent. The residue was separated by MPLC (SiO₂, 5%-20% n-hexane / EtOAc), thus obtaining Compound 347 (0.02 g, 75.1%) as white solid foam.

[0500] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.77, 7.73 (2s, 2 H), 6.96-6.93 (m, 1 H), 6.76-6.69 (m, 2 H), 5.58 (t, 1 H, *J* = 8.2 Hz), 3.98-3.84 (m, 2 H), 3.72, 3.70 (2s, 3 H), 3.63, 3.61 (2s, 3 H), 3.55, 3.46 (2d, 1 H, *J* = 14.5 Hz), 3.00-2.94 (m, 2 H), 2.39-1.81 (m, 11 H), 1.46 (m, 2 H), 1.03-0.99 (m, 6 H), 0.35, 0.25 (2d, 3 H, *J* = 6.5 Hz); 668 (M⁺ + H).

Compound 348

2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)acetic acid

[0501] Compound 348 (1.4 mg, 8%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0502] MS (ESI) *m/z* 657.1 (M⁺+H).

Compound 349

Methyl 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropanoate

[0503] As shown in reaction scheme 7, Compound 31, an intermediate compound, was synthesized, and then Compound 349 (0.28 g, 69.5%) as white solid foam was obtained according to the similar method to the synthesis of compound 285.

[0504] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomers mixture; δ 7.86 (m, 1 H), 7.81, 7.83 (2d, 1 H, *J* = 1.77, 1.83 Hz), 7.74 - 7.75 (m, 2 H), 7.02, 7.05 (2d, 1 H, *J* = 1.77, 1.77 Hz), 5.60, 5.63 (2d, 1 H, *J* = 5.94, 6.00 Hz), 3.91 - 4.03 (m, 2 H), 3.85, 3.88 (2d, 3 H), 3.64, 3.65 (2s, 3 H), 3.46- 3.52 (m, 1 H), 2.73 - 2.80 (m, 2 H), 1.90 - 1.95 (m, 2 H), 1.43 - 1.48 (m, 2 H), 1.16 - 1.20 (m, 6 H), 1.01 - 1.09 (m, 6 H), 0.28, 0.49 (2d, 3 H, *J* = 4.89, 4.89 Hz); MS (ESI) *m/z* 657.2 (M⁺ + H).

Compound 350

3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid

[0505] Compound 350 (75 mg, 54%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 134.

[0506] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.90, 7.90 (2d, 1 H, *J* = 2.36, 2.36 Hz), 7.85 - 7.86 (m, 1 H), 7.73 - 7.74 (2s, 2 H), 7.13, 7.15 (2d, 1 H, *J* = 2.40, 2.36 Hz), 5.60, 5.64 (2d, 1 H, *J* = 8.16, 8.00 Hz), 3.91 - 4.02 (m, 2 H), 3.85 - 3.88 (2s, 3 H), 3.50, 3.55 (2d, 1 H, *J* = 14.64, 15.16 Hz), 2.71 - 2.86 (m, 2 H), 2.00 - 2.53 (m, 2H), 1.86 - 1.95 (m, 2 H), 1.46 - 1.49 (m, 2 H), 1.12 - 1.18 (m, 6 H), 1.00 - 1.04 (m, 6 H), 0.30, 0.52 (2d, 3 H, *J* = 6.52, 6.60 Hz); MS (ESI) *m/z* 643.2 (M⁺ + H).

Compound 353

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0507] Compound 353 (1.2 g, 62.6%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 18.

[0508] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.87 (s, 1 H), 7.75 (m, 2 H), 7.20-7.17 (m, 1H), 6.96 (m, 1H), 6.81, 6.77 (2d, 1H, *J* = 8.80, 8.80 Hz), 5.65, 5.59 (2d, 1H, *J* = 8.16, 8.24 Hz), 4.01-3.90 (m, 2H), 3.76(m, 3 H), 3.58-3.38 (m, 1 H), 2.50-2.00 (m, 2 H), 1.92 (m, 2H), 1.50-1.40 (m, 2H), 1.04 (m, 6H), 0.40 (m, 3H); MS (ESI): 576.0 (M+H)⁺.

Compound 354

tert-butyl 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate

[0509] Compound 353 (0.1 g, 0.174 mmol), tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate (0.05 g, 0.17 mmol), sodium carbonate (0.06 g) and palladium (0.01 g) were dissolved in dimethoxyethane/ water (0.8 mL, v/v 3:1). The obtained solution in microwave-reactor was stirred at 120°C for 30 minutes. After the completion of the reaction, the reaction mixture was cooled down to room temperature, diluted with EtOAc, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was separated by MPLC (SiO₂, 10:1 hexane/EtOAc), thus obtaining Compound 354 (10 mg, 8%) as colorless oil.

[0510] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1H), 7.73 (s, 2 H), 7.24 (m, 1 H), 7.00 (m, 1H), 6.85, 6.80 (2d, 1H, J = 8.68, 8.68 Hz), 5.90 (m, 1H), 5.59 (m, 1H), 4.10-3.85 (m, 4 H), 3.74 (m, 3 H), 3.60-3.40 (m, 3 H), 2.60-2.03 (m, 5H), 1.92 (m, 2H), 1.44 (m, 9H), 1.03-1.00 (m, 6H), 0.40 (m, 3H).

Compound 355

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0511] Compound 355 (30 mg, 27.7%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 354.

[0512] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.25 (m, 1 H), 7.02 (m, 1H), 6.85, 6.81 (2d, 1H, J = 8.60, 8.64 Hz), 6.04-5.96 (m, 1H), 5.61 (m, 1H), 4.32-4.26 (m, 1 H), 4.00-3.48 (m, 8 H), 2.48 (m, 2 H), 2.40-2.03 (m, 2H), 1.94 (m, 2H), 1.50 (m, 2H), 1.03-1.00 (m, 6H), 0.40, 0.33 (2d, 3H, J= 6.56, 6.52 Hz).

Compound 356

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0513] According to the same method as the synthesis of Compound 79, the aldehyde compound was synthesized. The obtained aldehyde compound (0.03 g, 0.05 mmol) and (s)-3-fluoropyrrolidine (5 mg) were dissolved in methylene chloride (10 mL). Acetic acid (30 µL) was added dropwise to the obtained solution, and stirred for 1 hour at room temperature. Sodium cyanoborohydride (4 mg) was added dropwise to the reaction mixture. The reaction mixture was stirred overnight, diluted with methylene chloride, washed with saturated sodium hydrogen carbonate solution, water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was separated by PTLC (SiO₂, Hx:EA = 1:1, thus obtaining "by-product" Compound 356 (0.01 g, 33.2%) as white solid foam.

[0514] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (m, 2 H), 7.24 (m, 1 H), 7.06-6.98 (m, 1 H), 6.87, 6.82 (2d, 1 H, J= 8.44, 8.40 Hz), 5.59, 5.51 (2d, 1 H, J= 7.96, 8.16 Hz), 4.62-4.53 (m, 2 H), 4.07-3.92 (m, 2 H), 3.79-3.74 (m, 3 H), 3.56-3.37 (m, 1 H), 2.51-2.05 (m, 2 H), 1.93 (m, 2 H), 1.53 (m, 2 H), 1.05-1.02 (m, 6 H), 0.45, 0.34 (2d, 3 H, J= 6.60, 6.52 Hz).

Compound 357

methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate

[0515] Compound 332 (0.03 g, 0.053 mmol) was dissolved in ethanol (20 mL). Sodium carbonate (22 mg) and hydroxylamine (11 mg) were added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at 90°C overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was cooled down to room temperature, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was dissolved in pyridine (5 mL). Methyl 2-chloro-2-oxoacetate (20 mg) was added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at 40°C overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was cooled down to room temperature. The reaction mixture was diluted with EtOAc, washed with saturated ammonium solution and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was separated by MPLC (SiO₂, Hx:EA =

4:1, thus obtaining Compound 357 (5 mg, 45%) as white solid foam.

[0516] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 8.07 (m, 1 H), 7.87 (m, 2 H), 7.74 (m, 2 H), 7.00, 6.97 (2d, 1 H, *J* = 8.64, 8.68 Hz), 5.66, 5.56 (2d, 1 H, *J* = 8.12, 8.24 Hz), 4.12 (m, 3 H), 4.03 (m, 2 H), 3.86 (m, 3 H), 3.58-3.36 (m, 1 H), 2.45-2.03 (m, 2 H), 1.95 (m, 2 H), 1.55-1.46 (m, 2 H), 1.06-1.01 (m, 6 H), 0.39 (m, 3 H).

Compound 358

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0517] Compound 354 (0.03 g, 0.042 mmol) was dissolved in methanol/HCl solution. The obtained solution was stirred at room temperature overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was concentrated under reduced pressure. The residue was separated by column chromatography, thus obtaining Compound 358 (0.02 g, 77%) as yellow solid.

[0518] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.99 (m, 1 H), 7.92 (m, 2 H), 7.40 (m, 1 H), 7.20-6.98 (m, 2 H), 6.10-6.00 (m, 1 H), 5.90-5.80 (m, 1 H), 4.20 (m, 1 H), 3.82-3.78 (m, 5 H), 3.60-3.40 (m, 3 H), 2.80 (m, 2 H), 2.45-1.85 (m, 4 H), 1.55-1.46 (m, 2 H), 1.09-1.01 (m, 6 H), 0.48, 0.38 (2d, 1 H, *J* = 5.64, 6.40 Hz).

Compound 359

methyl 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate

[0519] Compound 359 (20 mg, 62.5%) as white solid was obtained according to the same method as the synthesis of compound 110.

[0520] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.24 (m, 1 H), 7.00 (m, 1 H), 6.85, 6.80 (2d, 1 H, *J* = 8.68, 8.64 Hz), 6.00-6.84 (m, 1 H), 5.61 (m, 1 H), 4.11-3.90 (m, 4 H), 3.80-3.44 (m, 9 H), 2.52-1.91 (m, 6 H), 1.52-1.45 (m, 2 H), 1.06-1.01 (m, 6 H), 0.39 (2d, 3 H); MS (ESI): 681.1 (M+H)⁺.

Compound 360

(S)-methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)pyrrolidine-2-carboxylate

[0521] Compound 360 (65 mg, 54%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 356.

[0522] MS (ESI) *m/z* 683.2 (M+H).

Compound 361

(R)-methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzylamino)-3-methylbutanoate

[0523] Compound 361 (68 mg, 57%) as yellow oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 356.

[0524] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.72 (s, 2 H), 7.16 (dd, 1 H, *J* = 8.4, 2.2 Hz), 6.92 (dd, 1 H, *J* = 7.4, 2.2 Hz), 6.81 - 6.74 (m, 1 H), 5.60 (dd, 1 H, *J* = 3.6, 8.1 Hz), 4.03 - 3.86 (m, 2.5 H), 3.75 - 3.68 (m, 7 H), 3.65 - 3.41 (m, 2.5 H), 3.00 - 2.94 (m, 1 H), 2.45 - 2.05 (m, 2 H), 1.91 - 1.81 (m, 2 H), 1.51 - 1.42 (m, 2 H), 1.03 - 1.00 (m, 6 H), 0.94 - 0.83 (m, 6 H), 0.42, 0.30 (2d, 3 H, *J* = 6.6 Hz); MS (ESI) *m/z* 685.2 (M+H).

Compound 362

4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclohex-3-enecarboxylic acid

[0525] According to the same method as the synthesis of Compound 354, the obtained methyl 4-(3-(2-(((4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclohex-3-enecarboxylate was dissolved in dioxan/water (5 mL, v/v 2:1). Lithium hydroxide (10 mg) was added

dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 5 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was acidified with 2 M HCl solution. The reaction mixture was diluted with EtOAc, was washed with water and brine. The organic layers were collected, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was separated by MPLC (3:1 hexane:EtOAc), thus obtaining Compound 362 (30 mg, 24%) as white solid foam.

[0526] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); atropisomer mixture; δ 7.86 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.21 - 7.25 (m, 1 H), 6.99 - 7.00 (m, 1 H), 6.78, 6.83 (2d, 1 H, J = 8.68, 8.68 Hz), 5.94 - 6.03 (m, 1 H), 5.58, 5.61 (2d, 1 H, J = 8.04, 8.20 Hz), 3.91 - 4.01 (m, 2 H), 3.72 - 3.78 (m, 3 H), 3.49, 3.61 (2d, 1 H, J = 15.08, 14.68 Hz), 2.10 - 2.70 (m, 8 H), 1.90 - 1.93 (m, 2 H), 1.43 - 1.53 (m, 2 H), 1.01 - 1.05 (m, 6 H), 0.32 - 0.43 (2d, 3 H, J = 6.48, 5.76 Hz); MS (ESI) m/z 666 (M⁺ + H).

Compound 363

(R)-methyl 2-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)(methyl)amino)-3-methylbutanoate

[0527] Compound 363 (13 mg, 21%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 112.

[0528] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.85 (d, 1 H, J = 4.9 Hz), 7.72 (s, 2 H), 7.16 (d, 1 H, J = 8.4 Hz), 6.90 (d, 1 H, J = 2.0 Hz), 6.78 (dd, 1 H, J = 18.2, 8.4 Hz), 5.61 - 5.57 (m, 1 H), 4.03 - 3.88 (m, 2 H), 3.74 - 3.69 (m, 6 H), 3.65 - 3.30 (m, 3 H), 2.79 (dd, 1 H, J = 7.0, 10.7 Hz), 2.52 - 2.18 (m, 3 H), 2.10 - 2.01 (m, 3 H), 1.92 - 1.90 (m, 2 H), 1.51 - 1.44 (m, 2 H), 1.04 - 0.95 (m, 9 H), 0.87 - 0.81 (m, 3 H), 0.40, 0.27 (2d, 3 H, J = 6.6 Hz); MS (ESI) m/z 699.2 (M⁺ + H).

Compound 364

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(((R)-2-(trifluoromethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0529] Compound 364 (22 mg, 36%) as colorless oil was obtained according to the same method as the synthesis of compound 356.

[0530] ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃); atropisomer mixture; δ 7.84 (s, 1 H), 7.73 (d, 1 H, J = 4.2 Hz), 7.18 (dd, 0.5 H, J = 8.4, 2.1 Hz), 7.10 (dd, 0.5 H, J = 8.3, 2.0 Hz), 6.94, 6.88 (2d, 1 H, J = 2.0 Hz), 6.77 (d, 1 H, J = 8.4 Hz), 5.60 (dd, 1 H, J = 14.2, 8.1 Hz), 4.08 - 3.88 (m, 3 H), 3.74, 3.72 (2s, 3 H), 3.58, 3.50 (2d, 1 H, J = 14.8 Hz), 3.42 - 3.36 (m, 1 H), 3.23 - 3.18 (m, 1 H), 2.92 - 2.70 (m, 1 H), 2.47 - 2.05 (m, 3 H), 2.07 - 1.76 (m, 6 H), 1.53 - 1.43 (m, 2 H), 1.03 (d, 6 H, J = 12.1 Hz), 0.37, 0.29 (2d, 3 H, J = 6.6 Hz); MS (ESI) m/z 693.1 (M⁺ + H).

Compound 366

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(6-isopropyl-3-methoxypyridin-2-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0531] As shown in reaction scheme 8, 2-bromopyridin-3-ol, as a starting material, was subjected to the several processes, to synthesize 2-(2-(ethoxycarbonyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-diisopropyl-3-methoxypyridin 1-oxide. The synthesized compound was reacted with diisobutylaluminum hydride (DIBAL-H) and Dess-Martin periodinane (DMP) reagent, thus synthesizing an aldehyde compound. The obtained aldehyde compound was subjected to reductive amination using amino alcohol, thereby an amino alcohol compound was synthesized. 2-(2-(ethoxycarbonyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-diisopropyl-3-methoxypyridin-1-oxide (62 mg, 0.11 mmol), a starting compound, was dissolved in methylene chloride (5 mL). Diisopropylamine (0.11 mL) and triphosgene (0.05 g, 0.16 mmol) were added dropwise to the obtained solution at room temperature, and stirred at room temperature for 2 hours. After the completion of the reaction, the reaction mixture was diluted with EtOAc, washed with water and brine, dried with anhydrous magnesium sulfate, filtered, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was separated by MPLC (12 g silica, 3:1 = n-hexane : EtOAc, thus obtaining Compound 43 (32 mg, 48.4%) as colorless oil. Compound 43 (32 mg, 0.05 mmol) was dissolved in ethanol (5 mL). Indium (7 mg) and saturated ammonium solution (4 mL) were added dropwise to the obtained solution, and stirred at 80°C overnight. After the completion of the reaction, the reaction mixture was cooled down to room temperature. The reaction mixture was diluted with EtOAc, washed with water and brine, dried with sodium sulfate anhydrous, filtered, and concentrated under reduced pressure to remove the solvent. The residue was separated by MPLC (4 g silica, 1:1 = n-hexane : EtOAc, thus obtaining Compound 366 (5 mg, 16.1 %) as colorless oil.

[0532] ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆); δ 7.85 (s, 1 H), 7.73 (s, 2 H), 7.10 (d, 1 H, J = 8.6 Hz), 7.02 (d, 1 H, J = 8.5 Hz), 5.54 (d, 1 H, J = 7.6 Hz), 3.97 - 4.05 (m, 2 H), 3.77 (m, 3 H), 3.40 (d, 1 H, J = 15.0 Hz), 2.94 - 3.01 (m, 1 H), 2.18 - 2.48

(m, 2 H), 1.95 (m, 2 H), 1.41 - 1.55 (m, 2 H), 1.20 - 1.25 (m, 6 H), 0.33 (d, 3 H, $J = 6.5$ Hz); MS (ESI) m/z 585 ($M^+ + H$).

Compound 367

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(((S)-3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one

[0533] Compound 367 (10 mg, 30%) as white solid foam was obtained according to the same method as the synthesis of compound 356.

[0534] ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3); atropisomer mixture; δ 7.85 (s, 1 H), 7.74 (m, 2 H), 7.21-6.95 (m, 2 H), 6.82 (2d, 1 H, $J = 8.52, 8.36$ Hz), 5.62 (m, 1 H), 5.30-5.03 (m, 1 H), 4.04-3.91 (m, 2 H), 3.76 (m, 3 H), 3.70-3.42 (m, 3 H), 2.82-2.40 (m, 3 H), 2.30-1.98 (m, 4 H), 1.94 (m, 2 H), 1.53-1.44 (m, 2 H), 1.05-1.01 (m, 6 H), 0.40 (2d, 1 H, $J = 6.56, 6.52$ Hz); MS (ESI): 643.1 ($M+H$) $^+$.

[0535] The chemical structures of compounds 15 to 367 as described above are shown in Tables 1 to 45 below.

[Table 1]

Compound	Structure	Compound	Structure
15		16	
17		18	


(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
19		25	





[Table 2]

Compound	Structure	Compound	Structure
26		27	
28		29	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
		31	

[Table 3]

Compound	Structure	Compound	Structure
32		34	
36		37	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
41		42	

[Table 4]

Compound	Structure	Compound	Structure
43		44	
46		47	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
48		49	

[Table 5]

Compound	Structure	Compound	Structure
50		51	
52			



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
56		57	





[Table 6]

Compound	Structure	Compound	Structure
58		59	
60		61	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
62		63	

[Table 7]

Compound	Structure	Compound	Structure
64		65	
66		67	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
68		69	

[Table 8]

Compound	Structure	Compound	Structure
70		71	
72		76	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
79		80	

[Table 9]

Compound	Structure	Compound	Structure
81		82	
83		84	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
85		86	





[Table 10]

Compound	Structure	Compound	Structure
87		96	
97		101	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
103		104	





[Table 11]

Compound	Structure	Compound	Structure
107		108	
109		110	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
111		112	





[Table 12]

Compound	Structure	Compound	Structure
113		114	
115		116	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
117		118	





[Table 13]

Compound	Structure	Compound	Structure
120		121	
122		123	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
124		128	

[Table 14]

Compound	Structure	Compound	Structure
130		132	
133		134	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
136		137	





[Table 15]

Compound	Structure	Compound	Structure
138		140	
141		142	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
143		144	





[Table 16]

Compound	Structure	Compound	Structure
145		146	
147		148	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
149		151	





[Table 17]

Compound	Structure	Compound	Structure
153		156	
157		159	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
160		161	

[Table 18]

Compound	Structure	Compound	Structure
162		163	
166		167	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
168		170	

[Table 19]

Compound	Structure	Compound	Structure
171		172	
173		174	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
177		178	

[Table 20]

Compound	Structure	Compound	Structure
179		180	
181		182	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
183		184	

[Table 21]

Compound	Structure	Compound	Structure
185		187	
188		189	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
190		191	





[Table 22]

Compound	Structure	Compound	Structure
192		193	
194		195	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
196		197	

[Table 23]

Compound	Structure	Compound	Structure
204		206	
207		209	


(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
210		212	





[Table 24]

Compound	Structure	Compound	Structure
213		215	
216		217	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
218			




[Table 25]

Compound	Structure	Compound	Structure
222		223	
224		225	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
226		227	





[Table 26]

Compound	Structure	Compound	Structure
228		229	
230			

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
232		233	

[Table 27]

Compound	Structure	Compound	Structure
234		235	
237		240	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
241		243	




[Table 28]

Compound	Structure	Compound	Structure
244			
246		247	



(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
248		249	





[Table 29]

Compound	Structure	Compound	Structure
250		251	
259			

[Table 30]

Compound	Structure	Compound	Structure
271		272	

[Table 31]

Compound	Structure	Compound	Structure
273		274	
275		276	

(continued)

Compound	Structure	Compound	Structure
277		278	

[Table 32]

Compound	Structure	Compound	Structure
280			
		285	







[Table 33]

Compound	Structure	Compound	Structure
286		291	
292		293	
294		295	







[Table 34]

Compound	Structure	Compound	Structure
296		297	
298		299	
300		301	

[Table 35]

Compound	Structure	Compound	Structure
302		303	
304		305	
306		307	







[Table 36]

Compound	Structure	Compound	Structure
308		309	
310		311	
312		313	

[Table 37]

Compound	Structure	Compound	Structure
314		315	
316		317	
318		319	

[Table 38]

Compound	Structure	Compound	Structure
320		321	
323		324	
325		326	

[Table 39]

Compound	Structure	Compound	Structure
327		328	
329		330	
331		332	







[Table 40]

Compound	Structure	Compound	Structure
333		334	
335		336	
337		338	







[Table 41]

Compound	Structure	Compound	Structure
339		340	
341		342	
343		344	

[Table 42]

Compound	Structure	Compound	Structure
345		346	
347		348	
349		350	



[Table 43]

Compound	Structure	Compound	Structure
345		346	
347		348	
349		350	

[Table 44]

Compound	Structure	Compound	Structure
359		360	
361		362	
363		364	

[Table 45]

Compound	Structure	Compound	Structure
366		367	

Measurement of activities of the compounds of the present invention - experimental protocols

[0536] In order to test the effects of the compounds of formula I of the present invention on the prevention and treatment of arteriosclerosis and hyperlipidemia and the safety thereof, comparative tests were carried out using an existing material as a control.

Experimental Example 1: *In vitro* test for the ability to inhibit cholesteryl ester transfer

1. Preparation of cholesteryl ester donor

[0537] In order to prepare a cholesteryl ester donor to be used in the test, a radiolabeled recombinant HDL containing [³H]-cholesteryl oleate (GE healthcare, TRK886, 3.5 μ Ci/mg of apoA-1) and apoA-1 was synthesized. Then, rHDL-agarose obtained by immobilizing the recombinant HDL with CNBr-activated Sepharose 4B resin (Amersham Biosciences, Sweden) was used in the test.

2. Cholesteryl ester transfer test

[0538] As a source of cholesteryl ester transfer protein, plasma from healthy humans was used, and as cholesteryl ester receptor, LDL from healthy humans was used. Each of test compounds was added to be final concentrations of 16, 80, 400, 2000 and 10000 nM and tested in duplicate. In order to test cholesteryl ester transfer, 20 μ l of plasma, 50 μ l of LDL (0.25 mg/ml) and 50 μ l of rHDL-agarose (0.25 mg/ml) were mixed with each other, and a solution of each test compound was added thereto and reacted thereto at 37 °C. Then, the reaction solution was centrifuged at 4 °C for 3 minutes, thereby the reaction was stopped, 150 μ l of the supernatant was transferred into a 96-well plate for radioactivity measurement, and the radioactivity thereof was measured with a beta-ray detector.

3. Statistical processing

[0539] The ratio of [¹H]-cholesteryl oleate transferred from HDL to LDL was determined, and based on the determined ratio, the IC₅₀ value of each compound was determined using GraphPad Prism 5.0. The results are shown in Table 46 below.

Table 46. Results of cholesteryl ester transfer test

Compound	IC ₅₀ (μ M)	Compound	IC ₅₀ (μ M)
15	0.60	196	0.49
17	0.51	209	0.01
18	1.36	210	0.008
19	0.002	212	0.08

EP 2 697 207 B1

(continued)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Compound	IC ₅₀ (μM)	Compound	IC ₅₀ (μM)
25	0.20	215	0.02
26	0.92	222	0.04
27	0.24	223	0.1
28	0.39	227	0.14
36	1.09		
44	0.43	234	0.02
48	0.005	237	0.009
79	0.89	241	0.39
80	0.10	243	0.009
82	0.08	244	0.02
86	0.11		
97	0.02	249	0.001
101	0.07	251	0.69
103	0.03		
104	0.18		
107	0.004		
108	0.02	272	0.222
109	0.02	273	0.217
110	0.23	274	0.014
112	0.008	285	0.033
115	0.01	286	0.012
117	0.08	300	0.001
123	0.02	302	0.006
124	0.02	303	0.005
128	0.06	308	0.007
130	0.02	313	0.020
132	0.05	316	0.030
137	0.08	317	0.054
181	0.05	321	0.104
182	0.05	323	0.058
184	0.02	324	0.097
185	0.18	329	0.009
188	0.12	338	0.035
189	0.02	340	0.008
190	0.01	341	0.013
191	0.09	350	0.051
192	0.06	353	0.030
193	0.04	366	0.006

(continued)

Compound	IC ₅₀ (μM)	Compound	IC ₅₀ (μM)
194	0.1	367	0.083
195	0.84		

Experimental Example 2: *In vitro* test for anti-hyperlipidemia activity in hamsters

1. Experimental animals

[0540] As test animals, 8-week-old male golden syrian hamsters were purchased and used in the experimental. The animal facility was kept at constant temperature and constant humidity with a 12-hr dark/12-hr light cycle, and the animals were allowed to access food and water *ad libitum*.

2. Experimental for anti-hyperlipidemia activity in hamsters

[0541] The test animals were used in the test after an acclimation of 1 week. The test animals were divided according to body weight into several groups, each consisting of 5-8 animals. 3 mg/kg of each test compound (CETP inhibitor) was administered orally to the animals. Each test compounds was suspended in a solvent vehicle that is a solution of 5% ethanol, 10% solutol and 85% deionized water (DW), to be used. Each of test compounds suspended in a solvent vehicle was administered orally to the mice for 5 days. To the control group, a solvent vehicle itself was administered. And then, after 4 hours from the last administration, blood was collected through the cardiac puncture. The collected blood was centrifuged at 3000 rpm for 15 minutes, and the concentration of HDL-cholesterol (Biosystem) in the separated serum was measured using a biochemical analyzer (ILab 300 plus, Instrumentation Laboratory).

3. Statistical processing

[0542] All the results were expressed as mean $\pm$ SEM, and each test group and the control group were compared using one-way ANOVA test (Dunnett's test, $p < 0.001$) in order to determine the effect of each test group. The results are shown in Table 47 below.


Table 47. Results of measurement of increase in blood HDL-c levels in hamsters

Compound	HDL-c Increase (%)	Compound	HDL-c Increase (%)
019	35	112	43
025	33	113	17
036	11	115	29
048	41	132	33
073	17	205	8
093	17	106	17
097	22	274	21
099	16	286	42
108	23	287	22
102	25	289	53
106	26	302	38

Claims

1. Cycloalkenyl aryl derivatives of the following formule 1, racemates, racemic mixtures, enantiomers, diastereomeric mixtures, diastereomers, atropisomers and mixtures of atropisomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof or solvates thereof:


[Formula 1]



wherein

B¹ and B² are each independently N or C, with the proviso that both B¹ and B² cannot be N at the same time, and if one of B¹ and B² is N, R² or R⁵ is absent;


R¹ and R² are each independently H, -F, -OH, -NH₂, -C(=O)H, -CH₂OH, -OC₁-C₆alkyl, -SC₁-C₆alkyl, -CH₂OC₁-C₆alkyl, -NH(C₁-C₆alkyl), -NH(C=O)(C₁-C₆alkyl), -N(C₁-C₆alkyl)₂, or




R¹ and R² together with the carbon atoms to which they are bonded may form a 5- or 6-membered heterocyclic aromatic or non-aromatic ring compound having 1 to 3 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, and C(=O), wherein the heterocyclic aromatic or non-aromatic ring compound may optionally be substituted with R⁸;


R³ is -H, -F, -OH, -C₁-C₆alkyl, or -OC₁-C₆alkyl;

R⁴ is -H, halogen, -CN, -NO₂, -C₁-C₆alkyl, -C₂-C₆alkenyl, -C₁-C₆cycloalkyl,






-OR⁷, -CH₂OR⁷, -CH₂NR⁷R⁸, -SR⁷, -C(=O)R⁷, -CO₂R⁷, -CHR⁷CO₂R⁸, -C(=O)NR⁷R⁸,





-NR⁷R⁸, -NR⁷C(=O)R⁸, -NR⁷CO₂R⁸,



-NR⁷C(=O)NR⁸R⁹, -NR⁷C(=S)NR⁸R⁹,

Ar or H et;

R³ and R⁴ together with the carbon atoms to which they are bonded may form a 5- or 6-membered cycloalkyl or heterocyclic ring compound having 0 to 3 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, and C(=O), wherein the cycloalkyl or heterocyclic ring compound may optionally be substituted with R⁸; Ar is a C₆ monocyclic aromatic compound, which is unsubstituted or optionally substituted with one or more selected from the group consisting of halogen, -OH, -NH₂, -C₁-C₆alkyl and -OC₁-C₆alkyl;



Het is a 5- or 6-membered heterocyclic ring compound containing 0 to 2 double bonds and having 1 to 4 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, C(=O) and C(=S), and may be unsubstituted or may optionally be substituted with R⁸;

R⁵ is -H, -F, -OH, -CF₃, -C₁-C₆alkyl, or -OC₁-C₆alkyl;


R⁶ is -H or -C₁-C₆alkyl;

R⁷ is -H, halogen, -C(=O)(C₁-C₃alkyl), -C₁-C₆alkyl, -OC₁-C₆alkyl, -C₃-C₆cycloalkyl, or -OC(=O)(C₁-C₃alkyl);

R⁸ is -H, halogen, -OH, -CN, -NH₂, -NH(C₁-C₃alkyl), -C(=O)NH₂, -CO₂H,




-C₁-C₆alkyl, -OC₁-C₆alkyl, -C₃-C₆cycloalkyl, -Ph or



R^9 is -H, -CN, -C₁-C₆alkyl, -OC₁-C₆alkyl, or -C(=O)(C₁-C₃alkyl);

R^{10} is -NH(C₁-C₃alkyl), -N(C₁-C₃alkyl)₂, or -S(C₁-C₃alkyl);

Z is -CH₂-;



R^a is -H, -Cl or -CF₃;

p is an integer ranging from 0 to 2;

A^1 and A^2 are each independently -(CR¹¹R¹²)-, wherein R¹¹ and R¹² are each independently -H, -F, or -C₁-C₆alkyl, or R¹¹ and R¹² together form a 3- or 4-membered spirocyclic non-aromatic ring compound;

A^3 is -(CH₂)_n-;

X is S or O;

m is an integer ranging from 0 to 3;

n is an integer ranging from 0 to 2;


q is an integer ranging from 1 to 3;

wherein said -C₁-C₃alkyl, -C₃-C₆cycloalkyl-C₁-C₆alkyl or -C₂-C₆alkenyl is unsubstituted or substituted with one or more selected from the group consisting of halogen, -OH, -CF₃, -CN, -CO₂H, -C(=O)CH₃, -OC(=O)CH₃, -C₁-C₃alkyl, -OC₁-C₃alkyl, and -Ph.


2. The cycloalkenyl aryl derivatives of claim 1, racemates, racemic mixtures, enantiomers, diastereomeric mixtures, diastereomers, atropisomers and mixtures of atropisomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof, or solvates thereof, wherein

B^1 and B^2 are each independently N or C, with the proviso that both B^1 and B^2 cannot be N at the same time, and if any one of B^1 and B^2 is N, R² or R⁵ is absent;

R¹ is -F, -OH, -NH₂, -C(=O)H, -CH₂OH, -OCH₃, -OCF₃, -SCH₃, -CH₂OCH₃, -NHCH₃,




-N(CH₃)₂, or





R² is -H;

R¹ and R² together with the carbon atoms to which they are bonded may form a 5- or 6-membered heterocyclic aromatic or non-aromatic ring compound having 1 to 3 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, and C(=O), wherein the heterocyclic aromatic or non-aromatic ring compound may optionally be substituted with R⁸; R³ is -H, -F, -OH, -CH₃, -CF₃, -CH₂CH₃, or -OCH₃;




R⁴ is -H, -F, -Cl, -CN, -NO₂, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CF₃, -CH(CF₃)₂, -CH(CH₃)(CF₃), -C(OCH₃)(CF₃)₂, -CH(OH)CH₃, -C(OH)(CH₃)₂, -C(OH)(CF₃)₂, -C(=CF₂)CF₃, -cyclopropyl,



-OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCF₃, -OCH₂CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂NR⁷R⁸, -SCH₃,
-C(=O)R⁷, -CO₂R⁷, -CHR⁷CO₂R⁸, -C(=O)NR⁷R⁸,



-NR⁷R⁸, -NR⁷C(=O)R⁸, -NR⁷CO₂R⁸,




-NR⁷C(=O)NR⁸R⁹, -NR⁷C(=S)NR⁸R⁹,

Ar or Het;

R³ and R⁴ together with the carbon atoms to which they are bonded may form a 5- or 6-membered cycloalkyl or heterocyclic ring compound having 0 to 3 hetero atoms selected independently from the group consisting of N, O, S, and C(=O), wherein the cycloalkyl or heterocyclic ring compound may optionally be substituted with R⁸;
Ar is a C₆ monocyclic aromatic compound, which is unsubstituted or optionally substituted with one or more selected from the group consisting of -F, -Cl, -OH, -NH₂, -CH₃ and -OCH₃;

Het is selected from





R⁵ is -H;

R⁶ is -H or -CH₃;

R⁷ is -H, halogen, -C(=O)(C₁-C₃alkyl), -C₁-C₆alkyl, -OC₁-C₄alkyl, -C₃-C₆cycloalkyl, or -OC(=O)(C₁-C₃alkyl);


R⁸ is -H, halogen, -OH, -CN, -NH₂, -NH(C₁-C₃alkyl), -C(=O)NH₂, -CO₂H,



R⁹ is -H, -CN, -C₁-C₆alkyl, -OC₁-C₆alkyl, or -C(=O)(C₁-C₃alkyl);

R¹⁰ is -NH(C₁-C₃alkyl), -N(C₁-C₃alkyl)₂, or -S(C₁-C₃alkyl);

Z is -CH₂-



R^a is -H, -Cl or -CF₃;

p is 2;

A¹ is -CH₂- or -C(CH₃)₂-;

A² is -(CR¹¹R¹²)-, wherein R¹¹ and R¹² are each independently -H, -F, -CH₃, -CF₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, or -C(CH₃)₃, or R¹¹ and R¹² together form a 3- or 4-membered spirocyclic non-aromatic ring compound;

A³ is -(CH₂)_n-;

X is S or O;

m is an integer ranging from 0 to 3;

n is an integer ranging from 0 to 2;

q is an integer ranging from 1 to 3;

wherein said -C₁-C₃alkyl, -C₃-C₆cycloalkyl, -C₁-C₆alkyl or -C₂-C₆alkenyl is unsubstituted or substituted with one or more selected from the group consisting of -F, -Cl, -Br, -OH, -CF₃, -CN, -CO₂H, -C(=O)CH₃, -OC(=O)CH₃, -C₁-C₃alkyl, -OC₁-C₃alkyl, and -Ph.

3. The cycloalkenyl aryl derivatives, racemates, racemic mixtures, enantiomers, diastomeric mixtures, diastomers, atropisomers and mixtures of atropisomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof or solvates thereof according to claim 1, wherein the cycloalkenyl aryl derivatives are selected from the group consisting of the following compounds:

(4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione;

(4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohept-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclopent-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclopent-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoic acid;

methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoate;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoic acid;

methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoate;

(4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohept-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5-ethyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methoxymethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 5 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(3'-chloro-4,6'-dimethoxybiphenyl-3-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-chloro-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 10 (4S,5R)-3-((2-(1H-indol-4-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 15 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(dimethylamino)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-5-methoxybenzaldehyde;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-(hydroxymethyl)-4-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 20 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-methoxy-2-(methoxymethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(quinolin-8-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-one;
 25 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(1-methyl-1H-indazol-4-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 30 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 35 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-morpholinophenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamide;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-ethyl-4-methoxybenzamide;
 40 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-isopropyl-4-methoxybenzamide;
 45 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)isobutyramide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 50 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzaldehyde;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 55 (4S,5R)-3-((2-(5-acetyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(2-(trifluoromethoxy)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 5 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)ethyl acetate,
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramide;
 3-(2-(((4S,5R)-S-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-isopropyl-4-methoxy-N-methylbenzamide;
 10 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 15 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5-tert-butyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 20 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 25 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)isobutyramide;
 30 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramide (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-
 35 3-((2-(2-(methoxymethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide;
 40 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-acetyl-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide;
 45 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 50 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5,5-difluoro-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(methyl)carbamate;
 55 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylmethanesulfonamide;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-N-methylpropanamide;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetate;
5 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetic acid;
N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanesulfonamide;
N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluoromethanesulfonamide;
10 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylcyclopropanesulfonamide;
1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylthiourea;
15 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide;
(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)-5,5-dimethylethyl-20 cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
(4S,5R)-3-((2-(2-amino-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-isopropylphenyl)-N-methylacetamide;
25 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylurea;
(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(nethylthio)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5,5-dimethyl-2-(2-(methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
30 (Z)-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-1,1-dimethylguanidine;
(E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-3-methylguanidine;
35 (E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-1,3,3-trimethylguanidine;
(Z)-methyl N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N'-methylcarbamidodithioate;
1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,3,3-trimethylurea;
40 methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoate;
(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-ylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
45 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)amino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one
N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide;
N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-bromoacetamide;
50 N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-isopropylphenyl)acetamide;
(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-(methylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
55 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-(dimethylamino)-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(perfluoroprop-1-en-2-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 5 tert-butyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(isopropyl)carbamate;
 tert-butyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(ethyl)carbamate;
 10 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-ethylacetamide;
 (4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoro-1-(methoxyimino)ethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)acetamide;
 15 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3,3-difluoroazetidine-1-carbonyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 20 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxy-2-methylpropyl)(methyl)amino)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-3-((2-(5-acetyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 25 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-3-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-hydroxyazetidine-1-carbonyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-((R)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 30 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxamide;
 35 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(cyclopropanecarbonyl)-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 40 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 45 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide;
 methyl 5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxybenzoate;
 50 5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxybenzoic acid;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 55 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylacetamide;

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)amino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(4-(trifluoromethyl)thiazol-2-ylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 5 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)acetamide;
 (4S,5R)-3-((2-(5-amino-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 10 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 15 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-2-(6-methoxybenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylisobutyramide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylpropionamide;
 20 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylmethanesulfonamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide;
 25 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-1-(trifluoromethyl)phenyl)trifluoromethanesulfonamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2,4-dimethoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2,4-dimethoxyphenyl)-N-methylacetamide (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-hydroxy-2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 30 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-ethyl-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-((2-hydroxy-2-methylpropyl)(methyl)amino)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 35 1-(((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)(methyl)amino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropoxy-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 1-(((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)(methyl)amino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate;
 40 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-hydroxy-N,2-dimethylpropanamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-4-methyl-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxy-4-methylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)acetamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)-N-methylacetamide;
 55 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoromethanesulfonamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoromethanesulfonamide;

clohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylethanethioamide;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-thiooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide;
 methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimeth-
 ylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoate;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoic acid;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-
 yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 tert-butyl 6-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-5-methoxyindoline-1-carboxylate;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxyindolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-
 4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-3-((2-(1-acetyl-5-methoxyindolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluorome-
 thyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxy-1-(2,2,2-trifluoroethyl)indolin-6-yl)-5,5-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxy-1-(methylsulfonyl)indolin-6-yl)-5,5-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimeth-
 ylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoate;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;
 (R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide;
 (S)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyl-
 oxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(2-methoxy-5-nitrophenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-
 methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-3-((6-(5-amino-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-
 methyloxazolidin-2-one;
 (R)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)spiro[2.5]oct-5-
 en-6-yl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide;
 (S)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)spiro[2.5]oct-5-
 en-6-yl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanamide;
 (R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-N-methyl-2-phenylpropanamide;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanamide;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanenitrile;
 (4S,5R)-3-((2-(2-(2H-tetrazol-5-yl)ethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-
 bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)-5,5-
 dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phe-
 nyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(3',5'-difluoro-4-methoxy-4'-(methoxymethoxy)biphenyl-3-yl)-
 5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(3',5'-difluoro-4'-hydroxy-4-methoxybiphenyl-3-yl)-5,5-dimeth-
 ylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-

clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile;
 methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoic acid;
 methyl 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylbutanoate;
 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylbutanoic acid;;
 ethyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylate;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylic acid;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxamide;
 methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoate;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)-5,5-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 methyl 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetate;
 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetic acid;
 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-methyl acetamide;
 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N,2,2-trimethylpropanamide;
 methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylate;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylic acid;
 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;
 methyl 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate;
 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-
 1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid;
 methyl 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoate;
 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide;
 ethyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenethyl)cyclobutanecarboxylate;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenethyl)cyclobutanecarboxylic acid;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-
 1-enyl)-4-methoxybenzonitrile;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-
 1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4R,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5S)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-
 1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4R,5S)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-
 1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-

1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 tert-butyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)acetate;
 tert-butyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)acetate;
 (R)-methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)-3-methylbutanoate;
 (R)-methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)-3-methylbutanoate;
 (R)-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)-3-methylbutanoic acid;
 methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylate;
 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)acetic acid;
 methyl 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropanoate;
 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 tert-butyl 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 methyl 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate;
 (S)-methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)pyrrolidine-2-carboxylate;
 (R)-methyl 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzylamino)-3-methylbutanoate;
 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclohex-3-enecarboxylic acid;
 (R)-methyl 2-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)(methyl)amino)-3-methylbutanoate;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(((R)-2-(trifluoromethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(6-isopropyl-3-methoxypyridin-2-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one; and
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(((S)-3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one.

4. The cycloalkenyl aryl derivatives, racemates, racemic mixtures, enantiomers, diastereomeric mixtures, diastereomers, atropisomers and mixtures of atropisomers thereof, pharmaceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof or

solvates thereof according to claim 3, wherein the cycloalkenyl aryl derivatives are selected from the group consisting of the following compounds:

(4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidine-2-thione;
 methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoate;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzaldehyde;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5-tert-butyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((5,5-difluoro-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 methyl 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoate;

clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(methyl)carbamate;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylmethanesulfonamide;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluoro-N-methylpropanamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)phenyl)-5,5-
 dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluoromethanesulfonamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxy-
 phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropan-2-yl)-2-methoxy-
 phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-3-((2-(5-acetyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluor-
 omethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-((R)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphe-
 nyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroacetyl)phenyl)-5,5-
 dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(cyclopropanecarbonyl)-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-
 dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)-5-(trifluoromethyl)cy-
 clohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-methoxyphenyl)-5-(trifluoromethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluorome-
 thyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4-(trifluorome-
 thyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-N-methylacetamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(4-(trifluoromethyl)thiazol-2-yl)ami-
 no)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)-5,5-
 dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(6-methoxybenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-2-ethyl-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropoxy-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(methyl)amino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetate;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-

clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-hydroxy-N,2-dimethylpropanamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)-N-methylacetamide;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoro-N-methylmethanesulfonamide;
 methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimeth-
 ylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoate;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoic acid;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-
 yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimeth-
 ylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoate;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoic acid;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanenitrile;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)-5,5-
 dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluoro-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phe-
 nyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 methyl 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimeth-
 ylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoate;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutanecarboxylic acid;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)-5,5-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 methyl 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimeth-
 ylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetate;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N,2,2-trimethylpropanamide;
 methyl 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimeth-
 ylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylate;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentanecarboxylic acid;
 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-2-fluoro-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimeth-
 ylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl))-
 5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pro-
 pyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one;
 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcy-
 clohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropanoic acid;
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)me-
 thyl)-4-methyloxazolidin-2-one; and
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(6-isopropyl-3-methoxypyridin-2-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one.
 (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-3-((2-(5-(((S)-3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-
 dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one.

5. Pharmaceutical compositions comprising cycloalkenyl aryl derivatives of formula I, racemates, racemic mixtures,
 enantiomers, diastomeric mixtures, diastomers, atropisomers and mixtures of atropisomers thereof, pharma-
 ceutically acceptable salts thereof, hydrates thereof or solvates thereof according to any one of claims 1 to 3 together
 with pharmaceutically acceptable carriers.

6. The pharmaceutical compositions according to claim 5 for use in the prevention or treatment of dyslipidemia and

atherosclerosis associated with dyslipidemia, through increasing of High-density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C) and decreasing of Low-density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) by CETP activity inhibition.


7. A method for preparing cycloalkenyl aryl derivatives of formula 1, the method comprising the steps of:

subjecting a compound of the following formula 2 to a Vilsmeier reaction to prepare a compound of the following formula 3;


subjecting the obtained compound of the formula 3 to a Suzuki reaction with a compound of the following formula 4 in the presence of palladium to prepare a compound of the following formula 5; and

subjecting the obtained compound of the formula 5 and a compound of the following formula 6 to the reduction to prepare a compound of the following formula 7, and then subjecting the obtained compound of the formula 7 to formation of a ring:


[Formula 1]




[Formula 2]




[Formula 3]



[Formula 4]




[Formula 5]




(V)

[Formula 6]




(VI)

[Formula 7]



(VII)


wherein, A¹, A², A³, B¹, B², R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R^a, p and X are same as defined in claim 1; Y is Cl or Br; and Q is -B(OH)₂ or




8. A method for preparing cycloalkenyl aryl derivatives of formula 1, the method comprising the steps of:

subjecting compound of the following formula 3 and a compound of the following formula 6 to the reduction to prepare a compound of the following formula 8, and then subjecting the obtained compound of the formula 8 to formation of a ring; and
subjecting the obtained compound of the formula 9 to a Suzuki reaction with a compound of the following formula 4 in the presence of palladium to prepare a compound of the following formula 1:


[Formula 1]




[Formula 3]




[Formula 4]




[Formula 6]




[Formula 8]



[Formula 9]




wherein, A¹, A², A³, B¹, B², R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R^a, p and X are same as defined in claim 1; Y is Cl or Br; and Q is -B(OH)₂ or



Patentansprüche

1. Cycloalkenylaryl-Derivative der folgenden Formel 1, Racemate, racemische Mischungen, Enantiomere, diastereomere Mischungen, Diastereomere, Atropisomere und Mischungen von Atropisomeren davon, pharmazeutisch akzeptable Salze davon, Hydrate davon oder Solvate davon:

[Formel 1]




worin

B¹ und B² jeweils unabhängig N oder C sind, mit der Maßgabe, dass sowohl B¹ als auch B² nicht gleichzeitig

10


15

20




25

30




35




40


45



50



55



-NR⁷C(=O)NR⁸R⁹, -NR⁷C(=S)NR⁸R⁹,

Ar oder Het ist;

R³ und R⁴ zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, eine 5- oder 6-gliedrige Cycloalkyl- oder heterocyclische Ringverbindung mit 0 bis 3 Heteroatomen unabhängig ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus N, O, S und C(=O) bilden können, wobei die Cycloalkyl- oder heterocyclische Ringverbindung gegebenenfalls substituiert sein kann mit R⁸;

Ar eine monocyclische aromatische C₆-Verbindung ist, die unsubstituiert oder gegebenenfalls mit einer oder mehreren ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Halogen, -OH, -NH₂, -C₁-C₆-Alkyl und -OC₁-C₆-Alkyl substituiert ist;



Het eine 5- oder 6-gliedrige heterocyclische Ringverbindung enthaltend 0 bis 2 Doppelbindungen und mit 1 bis 4 Heteroatomen unabhängig ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus N, O, S, C(=O) und C(=S) ist, und unsubstituiert sein kann oder gegebenenfalls substituiert sein kann mit R⁸;

R⁵ -H, -F, -OH, -CF₃, -C₁-C₆-Alkyl oder -OC₁-C₆-Alkyl ist;


R⁶ -H oder -C₁-C₆-Alkyl ist;

R⁷ -H, Halogen, -C(=O)(C₁-C₃-Alkyl), -C₁-C₆-Alkyl, -OC₁-C₆-Alkyl, -C₃-C₆-Cycloalkyl oder -OC(=O)(C₁-C₃-Alkyl) ist;

R⁸ -H, Halogen, -OH, -CN, -NH₂, -NH(C₁-C₃-Alkyl), -C(=O)NH₂, -CO₂H,




-C₁-C₆-Alkyl, -OC₁-C₆-Alkyl, -C₃-C₆-Cycloalkyl, -Ph oder



ist;

R⁹ -H, -CN, -C₁-C₆-Alkyl, -OC₁-C₆-Alkyl oder -C(=O)(C₁-C₃-Alkyl) ist;

R¹⁰ -NH(C₁-C₃-Alkyl), -N(C₁-C₃-Alkyl)₂ oder -S(C₁-C₃-Alkyl) ist; Z -CH₂-,



R^a -H, -Cl oder -CF₃ ist;

p eine ganze Zahl im Bereich von 0 bis 2 ist;


A¹ und A² jeweils unabhängig -(CR¹¹R¹²)- sind, worin R¹¹ und R¹² jeweils unabhängig -H, -F oder -C₁-C₆-Alkyl sind oder R¹¹ und R¹² zusammen eine 3- oder 4-gliedrige spirocyclische nicht-aromatische Ringverbindung bilden;

$A^3-(CH_2)_n-$ ist;
 X S oder O ist;
 m eine ganze Zahl im Bereich von 0 bis 3 ist;
 n eine ganze Zahl im Bereich von 0 bis 2 ist;
 q eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 3 ist;

wobei die genannten $-C_1-C_3$ -Alkyl, $-C_3-C_6$ -Cycloalkyl $-C_1-C_6$ -Alkyl oder $-C_2-C_6$ -Alkenyl unsubstituiert oder mit einer oder mehreren ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Halogen, $-OH$, $-CF_3$, $-CN$, $-CO_2H$, $-C(=O)CH_3$, $-OC(=O)CH_3$, $-C_1-C_3$ -Alkyl, $-OC_1-C_3$ -Alkyl und $-Ph$ substituiert sind.

2. Cycloalkenylaryl-Derivative nach Anspruch 1, Racemate, racemische Mischungen, Enantiomere, diastereomere Mischungen, Diastereomere, Atropisomere und Mischungen von Atropisomeren davon, pharmazeutisch akzeptable Salze davon, Hydrate davon oder Solvate davon,

worin
 B^1 und B^2 jeweils unabhängig N oder C sind, mit der Maßgabe, dass sowohl B^1 als auch B^2 nicht gleichzeitig N sein können, und wenn irgendeines von B^1 und B^2 N ist, R^2 oder R^5 abwesend ist;
 R^1 $-F$, $-OH$, $-NH_2$, $-C(=O)H$, $-CH_2OH$, $-OCH_3$, $-OCF_3$, $-SCH_3$, $-CH_2OCH_3$, $-NHCH_3$,




ist;

R^2 $-H$ ist;



R^1 und R^2 zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, eine 5- oder 6-gliedrige heterocyclische aromatische oder nicht-aromatische Ringverbindung mit 1 bis 3 Heteroatomen unabhängig ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus N, O, S und $C(=O)$ bilden können, wobei die heterocyclische aromatische oder nicht-aromatische Ringverbindung gegebenenfalls substituiert sein kann mit R^8 ;

R^3 $-H$, $-F$, $-OH$, $-CH_3$, $-CF_3$, $-CH_2CH_3$ oder $-OCH_3$ ist;

R^4 $-H$, $-F$, $-Cl$, $-CN$, $-NO_2$, $-CH_3$, $-CH_2CH_3$, $-CH(CH_3)_2$, $-C(CH_3)_3$, $-CF_3$, $-CH(CF_3)_2$, $-CH(CH_3)(CF_3)$, $-C(OCH_3)(CF_3)_2$, $-CH(OH)CH_3$, $-C(OH)(CH_3)_2$, $-C(OH)(CF_3)_2$, $-C(=CF_2)CF_3$, $-Cyclopropyl$,




$-OCH_3$, $-OCH_2CH_3$, $-OCH(CH_3)_2$, $-OC(CH_3)_3$, $-OCF_3$, $-OCH_2CF_3$, $-CH_2OH$, $-CH_2OCH_3$, $-CH_2NR^7R^8$, $-SCH_3$, $-C(=O)R^7$, $-CO_2R^7$, $-CHR^7CO_2R^8$, $-C(=O)NR^7R^8$,




$-\text{NR}^7\text{C}(=\text{O})\text{R}^8$, $-\text{NR}^7\text{CO}_2\text{R}^8$,

5




10

15



20



25

$-\text{NR}^7\text{C}(=\text{O})\text{NR}^8\text{R}^9$, $-\text{NR}^7\text{C}(=\text{S})\text{NR}^8\text{R}^9$,

Ar oder Het ist;


R^3 und R^4 zusammen mit den Kohlenstoffatomen, an die sie gebunden sind, eine 5- oder 6-gliedrige Cycloalkyl- oder heterocyclische Ringverbindung mit 0 bis 3 Heteroatomen unabhängig ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus N, O, S und C(=O) bilden können, wobei die Cycloalkyl- oder heterocyclische Ringverbindung gegebenenfalls substituiert sein kann mit R^8 ;

30


Ar eine monocyclische aromatische C6-Verbindung ist, die unsubstituiert oder gegebenenfalls mit einer oder mehreren ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus -F, -Cl, -OH, -NH₂, -CH₃ und -OCH₃ substituiert ist;

Het ausgewählt ist aus


35




40



45



50





55

R⁵ -H ist;


R⁶ -H oder -CH₃ ist;

R⁷ -H, Halogen, -C(=O)(C₁-C₃-Alkyl), -C₁-C₆-Alkyl, -OC₁-C₆-Alkyl, -C₃-C₆-Cycloalkyl oder -OC(=O)(C₁-C₃-Alkyl) ist;

R⁸ -H, Halogen, -OH, -CN, -NH₂, -NH(C₁-C₃-Alkyl), -C(=O)NH₂, -CO₂H,





-C₁-C₆-Alkyl, -OC₁-C₆-Alkyl, -C₃-C₆-Cycloalkyl, -Ph oder



ist;

R⁹ -H, -CN, -C₁-C₆-Alkyl, -OC₁-C₆-Alkyl oder -C(=O)(C₁-C₃-Alkyl) ist;

R¹⁰ -NH(C₁-C₃-Alkyl), -N(C₁-C₃-Alkyl)₂ oder -S(C₁-C₃-Alkyl) ist; Z -CH₂-,



oder

ist;

R^a -H, -Cl oder -CF₃ ist;

p 2 ist;

A¹ -CH₂- oder -C(CH₃)₂- ist;

A² -(CR¹¹R¹²)- ist, worin R¹¹ und R¹² jeweils unabhängig -H, -F, -CH₃, -CF₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂ oder -C(CH₃)₃ sind oder R¹¹ und R¹² zusammen eine 3- oder 4-gliedrige spirocyclische nicht-aromatische Ringverbindung bilden;

A³ -(CH₂)_n- ist;

X S oder O ist;

m eine ganze Zahl im Bereich von 0 bis 3 ist;

n eine ganze Zahl im Bereich von 0 bis 2 ist;

q eine ganze Zahl im Bereich von 1 bis 3 ist;

wobei die genannten -C₁-C₃-Alkyl, -C₃-C₆-Cycloalkyl, -C₁-C₆-Alkyl oder -C₂-C₆-Alkenyl unsubstituiert oder mit einer oder mehreren ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus -F, -Cl, -Br, -OH, -CF₃, -CN, -CO₂H, -C(=O)CH₃, -OC(=O)CH₃, -C₁-C₃-Alkyl, -OC₁-C₃-Alkyl und -Ph substituiert sind.

3. Cycloalkenylaryl-Derivative, Racemate, racemische Mischungen, Enantiomere, diastereomere Mischungen, Diastereomere, Atropisomere und Mischungen von Atropisomeren davon, pharmazeutisch akzeptable Salze davon, Hydrate davon oder Solvate davon nach Anspruch 1, wobei die Cycloalkenylaryl-Derivative ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus den folgenden Verbindungen:

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-thion;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-thion;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-thion;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-thion;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-thion;
 (4S,5R,Z)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohept-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclopent-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclopent-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoesäure;
 Methyl-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoat;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoesäure;
 Methyl-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzoat;
 (4S,5R,Z)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohept-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((5-ethyl-2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methoxymethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluormethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(3'-chlor-4,6'-dimethoxybiphenyl-3-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-chlor-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(1H-Indol-4-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(dimethylamino)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-

enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-5-methoxybenzaldehyd;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-(hydroxymethyl)-4-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-methoxy-2-(methoxymethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(chinolin-8-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(1-methyl-1H-indazol-4-yl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-hydroxy-5-isopropylphenyl)-5-(trifluormethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-morpholinophenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamid;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-ethyl-4-methoxybenzamid;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-(2,2,2-trifluorethyl)benzamid;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-isopropyl-4-methoxybenzamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)isobutyramid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzaldehyd;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(5-Acetyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-3-((2-(2-(trifluormethoxy)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)oxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-fluor-5-(trifluormethyl)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)ethylacetat;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramid;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-N-isopropyl-4-methoxy-N-methylbenzamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((5-tert-butyl-2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-

enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluormethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)isobutyramid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylisobutyramid (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-(methoxymethyl)-4-(trifluormethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)-N-(2,2,2-trifluorethyl)acetamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluormethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-Acetyl-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((5,5-difluor-2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 Methyl-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(methyl)carbamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylmethansulfonamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluor-N-methylpropanamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 Methyl-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetat;
 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)essigsäure;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropan-sulfonamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluormethansulfonamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylcyclopropan-sulfonamid;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylthioharnstoff;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluor-N-methylmethansulfonamid;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxoimidazolidin-1-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

5 (4S,5R)-3-((2-(2-Amino-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-isopropylphenyl)-N-methylacetamid;

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylharnstoff;

10 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methylthio)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((5,5-dimethyl-2-(2-(methylthio)-5-(trifluormethoxy)phenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

15 (Z)-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-1,1-dimethylguanidin;

(E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-3-methylguanidin;

(E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-cyano-1,3,3-trimethylguanidin;

20 (Z)-Methyl-N-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl-N'-methylcarbamiimidothioat;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,3,3-trimethylharnstoff;

25 Methyl-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoat;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1,1,1-trifluorpropan-2-ylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(1,1,1-trifluorpropan-2-yl)amino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on

30 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoracetamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-bromacetamid;

35 N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-isopropylphenyl)acetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-(methylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-(dimethylamino)-5-isopropylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

40 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoracetyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(perfluorprop-1-en-2-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

45 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

tert.-Butyl-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(isopropyl)carbammat;

tert.-Butyl-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(ethyl)carbammat;

50 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-ethylacetamid;

(4S,5R,Z)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2,2,2-trifluor-1-(methoxyimino)ethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

55 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-(2-hydroxy-2-methylpropyl)acetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3,3-difluorazetidin-1-carbonyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methoxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 5 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-((2-hydroxy-2-methylpropyl)(methyl)amino)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(5-Acetyl-4-fluor-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 10 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3-hydroxyazetidin-1-carbonyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-((R)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 15 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitril;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoracetyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 20 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(cyclopropanecarbonyl)-4-fluor-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)-5-(trifluormethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 25 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5-(trifluormethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(5-Amino-2-methoxyphenyl)-5-(trifluormethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4-(trifluormethyl)cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamid;
 30 Methyl-5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluor-4-methoxybenzoat;
 5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluor-4-methoxybenzoesäure;
 35 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(5-Amino-2-methoxy-4-(trifluormethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)trifluor-N-methylmethansulfonamid;
 40 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)-N-methylacetamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(4-(trifluormethyl)thiazol-2-yl)amino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 45 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(4-(trifluormethyl)thiazol-2-ylamino)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluor-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamid;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluor-4-methoxyphenyl)acetamid;
 50 (4S,5R)-3-((2-(5-Amino-4-fluor-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 55 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(6-methoxybenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)-N-methylisobutyramid;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)-N-methylpropionamid;
 5 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)-N-methylmethansulfonamid;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid;
 10 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)trifluormethansulfonamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2,4-dimethoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2,4-dimethoxyphenyl)-N-methylacetamid (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-hydroxy-2-methoxy-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 15 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methylamino)-4-(trifluormethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-ethyl-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamid;
 20 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxy-2-methylpropyl)(methyl)amino)-2-methoxy-4-(trifluormethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-cyclopropyl-4-fluor-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 1-((5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)(methyl)amino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl-acetat;
 25 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropoxy-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)(methyl)amino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetat;
 30 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-hydroxy-N,2-dimethylpropanamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-4-methyl-5-nitrophenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(5-Amino-2-methoxy-4-methylphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 35 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)acetamid;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)-N-methylacetamid;
 40 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluormethansulfonamid;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluor-N-methylmethansulfonamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylethanthioamid;
 45 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-thiooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamid;
 Methyl-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoat;
 50 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propansäure;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 tert.-Butyl-6-(2-(((4S,SR)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-5-methoxyindolin-1-carboxylat;
 55 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxyindolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(1-Acetyl-5-methoxyindolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluorme-

thyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxy-1-(2,2,2-trifluorethyl)indolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-methoxy-1-(methylsulfonyl)indolin-6-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 Methyl-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoat;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropansäure;
 (R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanamid;
 (S)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((6-(2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((6-(2-methoxy-5-nitrophenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((6-(5-Amino-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (R)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)spiro[2.5]oct-5-en-6-yl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanamid;
 (S)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)spiro[2.5]oct-5-en-6-yl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanamid;
 (R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluor-2-methoxy-N-methyl-2-phenylpropanamid;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanamid;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanitril;
 (4S,5R)-3-((2-(5-(2-(2H-Tetrazol-5-yl)ethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluor-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(3',5'-difluor-4-methoxy-4'-(methoxymethoxy)biphenyl-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(3',5'-difluor-4'-hydroxy-4-methoxybiphenyl-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamid;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanitril;
 Methyl-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoat;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutansäure;
 Methyl-4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylbutanoat;
 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylbutansäure;
 Ethyl-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutancarboxylat;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutancarbonsäure;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutancarboxamid;
 Methyl-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-

cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-methylpropanoat;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 Methyl-2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetat;
 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)essigsäure;
 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-methylacetamid;
 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-methylpropansäure;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N,2,2-trimethylpropanamid;
 Methyl-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentancarboxylat;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentancarbonsäure;
 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluor-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropansäure;
 Methyl-7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-carboxylat;
 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-carbonsäure;
 Methyl-3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluor-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoat;
 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluor-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamid;
 Ethyl-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenethyl)cyclobutancarboxylat;
 1-(3-(2-(((4S,SR)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenethyl)cyclobutancarbonsäure;
 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzonitril;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4R,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5S)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4R,5S)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-2-carboxamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 tert.-Butyl-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)acetat;
 tert.-Butyl-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)acetat;
 (R)-Methyl-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)-3-methylbutanoat;
 (R)-Methyl-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dime-

thylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)-3-methylbutanoat;
 (R)-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzamido)-3-methylbutansäure;
 Methyl-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutancarboxylat;
 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxy-N-methylbenzamido)essigsäure;
 Methyl-3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropanoat;
 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropansäure;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-chlor-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 tert.-Butyl-4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-5,6-dihydropyridin-1(2H)-carboxylat;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 Methyl-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxylat;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-one ;
 Methyl-4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-5,6-dihydropyridin-1(2H)-carboxylat;
 (S)-Methyl-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)pyrrolidin-2-carboxylat;
 (R)-Methyl-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzylamino)-3-methylbutanoat;
 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclohex-3-encarbonsäure;
 (R)-Methyl-2-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)(methyl)amino)-3-methylbutanoat;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(((R)-2-(trifluormethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(6-isopropyl-3-methoxypyridin-2-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on; und
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(((S)-3-fluorpyrrolidin-1-yl)methyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on.

4. Cycloalkenylaryl-Derivative, Racemate, racemische Mischungen, Enantiomere, diastereomere Mischungen, Diastereomere, Atropisomere und Mischungen von Atropisomeren davon, pharmazeutisch akzeptable Salze davon, Hydrate davon oder Solvate davon nach Anspruch 3, wobei die Cycloalkenylaryl-Derivative ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus den folgenden Verbindungen:

(4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-thion;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-thion;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-thion;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-

4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-
 4-methyloxazolidin-2-thion;
 Methyl-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-
 5 enyl)-4-methoxybenzoat;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluormethyl)cyclo-
 hex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 10 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-me-
 thoxybenzaldehyd;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-
 4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-
 15 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)cyclohex-1-enyl)-4-
 methoxyphenyl)-N-methylisobutyramid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 20 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((5-tert-butyl-2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclo-
 25 hex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-5-(trifluormethyl)cyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 30 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 35 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluormethoxy)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 40 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((5,5-difluor-2-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)cyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 Methyl-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl(methyl)carbamate;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 45 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N-methylmethansulfonamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3,3,3-trifluor-N-methylpropanamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-methoxy-5-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)phenyl)-5,5-di-
 methylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 50 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)trifluormethansulfonamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)-2-methoxy-
 phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methoxypropan-2-yl)-2-methoxy-
 55 phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(5-Acetyl-4-fluor-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-Bis(trifluorme-
 thyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclo-

lohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-((R)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 5 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitril;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)cyclopropanecarboxamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluoracetyl)phenyl)-5,5-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 10 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-(cyclopropanecarbonyl)-4-fluor-2-methoxyphenyl)-5,5-dime-
 thylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluormethyl)phenyl)-5-(trifluormethyl)cyclo-
 hex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-5-(trifluormethyl)cyclohex-1-
 15 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(5-Amino-2-methoxyphenyl)-5-(trifluormethyl)cyclohex-1-enyl)methyl)-5-(3,5-bis(trifluorme-
 thyl)phenyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4-(trifluormethyl)cy-
 clohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)acetamid;
 20 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)trifluor-N-methylmethansulfonamid;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)-N-methylacetamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(methyl(4-(trifluormethyl)thiazol-2-yl)amino)phe-
 25 nyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-2-fluor-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-2-methoxy-5-(2,2,2-trifluorethoxy)phenyl)-5,5-dime-
 thylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 30 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(6-methoxybenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-
 enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxy-2-(trifluormethyl)phenyl)-2,2,2-trifluor-N-methylacetamid;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 35 hex-1-enyl)-2-ethyl-4-methoxyphenyl)-N-methylacetamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-cyclopropyl-4-fluor-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-
 1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(4-fluor-5-isopropoxy-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-
 1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 40 1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)(methyl)amino)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl acetat;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2-hydroxy-N,2-dimethylpropanamid;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 45 hex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)-N-methylacetamid;
 N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxy-2-methylphenyl)trifluor-N-methylmethansulfonamid;
 Methyl-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propanoat;
 50 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propansäure;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluor-5-isopropyl-2-methoxyphenyl)spiro[2.5]oct-5-en-5-
 yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 Methyl-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethyl-
 cyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanoat;
 55 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-
 hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropansäure;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclo-

hex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)propannitril;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluor-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((6-(4-fluor-2-methoxy-5-(1-methylcyclopropyl)phenyl)spi-
 5 ro[2.5]oct-5-en-5-yl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 Methyl-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-3-methylbutanoat;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclobutancarbonsäure;
 10 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(trifluormethyl)pyridin-3-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 Methyl-2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetat;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxyphenyl)-N,2,2-trimethylpropanamid;
 15 Methyl-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentancarboxylat;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-4-methoxybenzyl)cyclopentancarbonsäure;
 20 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-2-fluor-4-methoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 25 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(2-methoxy-5-(2-methyl-2-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)propyl)phenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on;
 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-4-methyl-2-oxooxazolidin-3-yl)methyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enyl)-6-methoxypyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropansäure;
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-chlor-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on; und
 30 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(6-isopropyl-3-methoxypyridin-2-yl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on,
 (4S,5R)-5-(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)-3-((2-(5-((S)-3-fluorpyrrolidin-1-yl)methyl)-2-methoxyphenyl)-5,5-dimethylcyclohex-1-enyl)methyl)-4-methyloxazolidin-2-on.


5. Pharmazeutische Zusammensetzungen, umfassend Cycloalkenylaryl-Derivative der Formel I, Racemate, racemische Mischungen, Enantiomere, diastereomere Mischungen, Diastereomere, Atropisomere und Mischungen von Atropisomeren davon, pharmazeutisch akzeptable Salze davon, Hydrate davon oder Solvate davon nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 3 zusammen mit pharmazeutisch akzeptablen Trägern.

6. Pharmazeutische Zusammensetzungen nach Anspruch 5 zur Verwendung bei der Prävention oder Behandlung von Dyslipidämie und mit Dyslipidämie assoziierter Arteriosklerose durch Erhöhung von High-density-Lipoprotein-Cholesterin (HDL-C) und Verringerung von Low-density-Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C) durch Inhibierung der CETP-Aktivität.


7. Verfahren zur Herstellung von Cycloalkenylaryl-Derivativen der Formel 1, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

Unterwerfen einer Verbindung der folgenden Formel 2 einer Vilsmeier-Reaktion, um eine Verbindung der folgenden Formel 3 herzustellen;
 Unterwerfen der erhaltenen Verbindung der Formel 3 einer Suzuki-Reaktion mit einer Verbindung der folgenden Formel 4 in Anwesenheit von Palladium, um eine Verbindung der folgenden Formel 5 herzustellen; und
 Unterwerfen der erhaltenen Verbindung der Formel 5 und einer Verbindung der folgenden Formel 6 der Reduktion, um eine Verbindung der folgenden Formel 7 herzustellen, und dann Unterwerfen der erhaltenen Verbindung der Formel 7 einer Bildung eines Rings:


[Formel 1]




[Formel 2]




[Formel 3]




[Formel 4]




[Formel 5]




[Formel 6]



[Formel 7]



worin A¹, A², A³, B¹, B², R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R^a, p und X gleich wie in Anspruch 1 definiert sind; Y Cl oder Br ist; und Q -B(OH)₂ oder




ist.

8. Verfahren zur Herstellung von Cycloalkenylaryl-Derivativen der Formel 1, wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:


Unterwerfen der Verbindung der folgenden Formel 3 und einer Verbindung der folgenden Formel 6 der Reduktion, um eine Verbindung der folgenden Formel 8 herzustellen, und dann Unterwerfen der erhaltenen Verbindung der Formel 8 einer Bildung eines Rings; und

Unterwerfen der erhaltenen Verbindung der Formel 9 einer Suzuki-Reaktion mit einer Verbindung der folgenden Formel 4 in Anwesenheit von Palladium, um eine Verbindung der folgenden Formel 1 herzustellen:


[Formel 1]




[Formel 3]




[Formel 4]




[Formel 6]




[Formel 8]



[Formel 9]



worin A¹, A², A³, B¹, B², R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R^a, p und X gleich wie in Anspruch 1 definiert sind; Y Cl oder Br ist; und Q -B(OH)₂ oder




ist.

Revendications

1. Dérivés de cycloalcényl aryle de la formule 1 suivante, leurs isomères, leurs sels pharmaceutiquement acceptables, leurs hydrates ou leurs produits de solvation :

[Formule 1]




dans laquelle

B¹ et B² sont chacun indépendamment N ou C, à la condition que les deux B¹ et B² ne peuvent pas être N en même temps, et si un de B¹ et B² est N, R² ou R⁵ est absent ;

R¹ et R² sont chacun indépendamment H, -F, -OH, -NH₂, -C(=O)H, -CH₂OH, -O-alkyle en C₁ à C₆, -S-alkyle



en C₁ à C₆, -CH₂O-alkyle en C₁ à C₆, -NH(alkyle en C₁ à C₆), -NH(C=O)(alkyle en C₁ à C₆), -N(alkyle en C₁ à C₆)₂ ou





R¹ et R² ensemble avec les atomes de carbone auxquels ils sont liés peuvent former un composé noyau aromatique ou non aromatique hétérocyclique penta- ou hexagonal ayant 1 à 3 hétéroatomes choisis indépendamment dans le groupe constitué par N, O, S et C(=O), où le composé noyau aromatique ou non aromatique hétérocyclique peut éventuellement être substitué avec R⁸ ;

R³ est -H, -F, -OH, -alkyle en C₁ à C₆ ou -O-alkyle en C₁ à C₆ ;


R⁴ est -H, un halogène, -CN, -NO₂, -alkyle en C₁ à C₆, -alcényle en C₂ à C₆, -cycloalkyle en C₃ à C₆,





OR⁷, -CH₂OR⁷, CH₂NR⁷R⁸, -SR⁷, -C(=O)R⁷, -CO₂R⁷, -CHR⁷CO₂R⁸, C(=O)NR⁷R⁸,



-NR⁷R⁸, -NR⁷C(=O)R⁸, -NR⁷CO₂R⁸,





$-\text{NR}^7\text{C}(=\text{O})\text{NR}^8\text{R}^9$, $-\text{NR}^7\text{C}(=\text{S})\text{NR}^8\text{R}^9$, Ar ou Het ;

R^3 et R^4 ensemble avec les atomes de carbone auxquels ils sont liés peuvent former un composé noyau cycloalkyle ou hétérocyclique penta- ou hexagonal ayant de 0 à 3 hétéroatomes choisis indépendamment dans le groupe constitué par N, O, S et C(=O), où le composé noyau cycloalkyle ou hétérocyclique peut être éventuellement substitué avec R^8 ;



Ar est un composé aromatique monocyclique en C_6 , qui est non substitué ou éventuellement substitué avec un ou plusieurs choisis dans le groupe constitué par un halogène, -OH, $-\text{NH}_2$, -alkyle en C_1 à C_6 ou -O-alkyle en C_1 à C_6 ; Het est un composé noyau hétérocyclique penta- ou hexagonal contenant de 0 à 2 double liaisons et ayant 1 à 4 hétéroatomes choisis indépendamment dans le groupe constitué par N, O, S, (C=O) et C(=S) et peut être non substitué ou peut être éventuellement substitué avec R^8 ;

R^5 est -H, -F, -OH, $-\text{CF}_3$, -alkyle en C_1 à C_6 ou -O-alkyle en C_1 à C_6 ;


R^6 est -H ou -alkyle en C_1 à C_6 ;

R^7 est -H, un halogène, $-\text{C}(=\text{O})(\text{alkyle en } C_1 \text{ à } C_3)$, -alkyle en C_1 à C_6 , -O-alkyle en C_1 à C_6 , -cycloalkyle en C_3 à C_6 ou $-\text{OC}(=\text{O})(\text{alkyle en } C_1 \text{ à } C_3)$;

R^8 est -H, un halogène, -OH, -CN, $-\text{NH}_2$, $-\text{NH}(\text{alkyle en } C_1 \text{ à } C_3)$, $-\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{CO}_2\text{H}$,




-alkyle en C_1 à C_6 , -O-alkyle en C_1 à C_6 , cycloalkyle en C_3 à C_6 , -Ph ou



R^9 est -H, -CN, -alkyle en C_1 à C_6 , -O-alkyle en C_1 à C_6 ou $-\text{C}(=\text{O})(\text{alkyle en } C_1 \text{ à } C_3)$;

R^{10} est $-\text{NH}(\text{alkyle en } C_1 \text{ à } C_3)$, $-\text{N}(\text{alkyle en } C_1 \text{ à } C_3)_2$, ou $-\text{S}(\text{alkyle en } C_1 \text{ à } C_3)$;

Z est $-\text{CH}_2-$,



R^a est -H, -Cl ou -CF₃ ;

p est un nombre entier situé dans la plage allant de 0 à 2 ;

A¹ et A² sont chacun indépendamment -O-, -(CR¹¹R¹²)- ou -NR¹³, où R¹¹ et R¹² sont chacun indépendamment -H, -F ou un -alkyle en C₁ à C₆, ou R¹¹ et R¹² forment ensemble un composé noyau non aromatique spirocyclique tri- ou tétragonal, et R¹³ est -H, -alkyle en C₁ à C₆, -C(=O) (alkyle en C₁ à C₆), -CO₂ (alkyle en C₁ à C₆), -SO₂ (alkyle en C₁ à C₆) ou cycloalkyle en C₃ à C₆ ;

A³ est -(CH₂)_n- ;

X est S ou O ;

m est un nombre entier situé dans la plage allant de 0 à 3 ;


n est un nombre entier situé dans la plage allant de 0 à 2 ;

p est un nombre entier situé dans la plage allant de 1 à 3 ; où ledit -alkyle en C₁ à C₃, -cycloalkyle en C₃ à C₆, -alkyle en C₁ à C₆ ou alcényle en C₂ à C₆ est non substitué ou substitué avec un ou plusieurs choisis dans le groupe constitué par un halogène, -OH, -CF₃, -CN, -CO₂H, -C(=O)CH₃, -OC(=O)CH₃, -alkyle en C₁ à C₃, -O-alkyle en C₁ à C₃ et Ph.


2. Dérivés de cycloalcényl aryle selon la revendication 1, leurs isomères, leurs sels pharmaceutiquement acceptables, leurs hydrates ou leurs produits de solvation, dans lesquels

B¹ et B² sont chacun indépendamment N ou C, à la condition que les deux B¹ et B² ne peuvent pas être N en même temps, et si l'un quelconque de B¹ et B² est N, R² ou R⁵ est absent;

R¹ est -F, -OH, -NH₂, -C(=O)H, -CH₂OH, -OCH₃, -OCF₃, -SCH₃, -CH₂OCH₃, -NHCH₃,




-N(CH₃)₂ ou




R² est H ; R¹ et R² ensemble avec les atomes de carbone auxquels ils sont liés peuvent former un composé noyau aromatique ou non aromatique hétérocyclique penta- ou hexagonal ayant 1 à 3 hétéroatomes choisis indépendamment dans le groupe constitué par N, O, S et C(=O), où le composé noyau aromatique ou non aromatique hétérocyclique peut éventuellement être substitué avec R⁸ ;


R³ est -H, -F, -OH, -CH₃, -CF₃, -CH₂CH₃ ou -OCH₃ ;

R⁴ est -H, -F, -Cl, -CN, -NO₂, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CF₃, -CH(CF₃)₂, -CH(CH₃)(CF₃), -C(OCH₃)(CF₃)₂, -CH(OH)CH₃, -C(OH)(CH₃)₂, -C(OH)(CF₃)₂, -C(=CF₂)CF₃, cyclopropyle,






-OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCF₃, -OCH₂CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂NR⁷R⁸, -SCH₃, -C(=O)R⁷, -CO₂R⁷, -CHR⁷CO₂R⁸, -C(=O)NR⁷R⁸,





-NR⁷R⁸, -NR⁷C(=O)R⁸, -NR⁷CO₂R⁸,







-NR⁷C(=O)NR⁸R⁹, -NR⁷C(=S)NR⁸R⁹, Ar ou Het ;

R³ et R⁴ ensemble avec les atomes de carbone auxquels ils sont liés peuvent former un composé noyau cycloalkyle ou hétérocyclique penta- ou hexagonal ayant de 0 à 3 hétéroatomes choisis indépendamment dans le groupe constitué par N, O, S et C(=O), où le composé noyau cycloalkyle ou hétérocyclique peut être éventuellement substitué avec R⁸ ;

Ar est un composé aromatique monocyclique en C₆, qui est non substitué ou éventuellement substitué avec un ou plusieurs choisis dans le groupe constitué par -F, -Cl, -OH, -NH₂, -CH₃ et -OCH₃ ;

Het est choisi parmi







R⁵ est -H ;


R⁶ est -H ou -CH₃ ;

R⁷ est -H, un halogène, -C(=O)(alkyle en C₁ à C₃), -alkyle en C₁ à C₆, -O-alkyle en C₁ à C₆, -cycloalkyle en C₃ à C₆ ou -OC(=O)(alkyle en C₁ à C₃) ;

R⁸ est -H, un halogène, -OH, -CN, -NH₂, -NH(alkyle en C₁ à C₃), -C(=O)NH₂, -CO₂H,



-alkyle en C₁ à C₆, -O-alkyle en C₁ à C₆, -cycloalkyle en C₃ à C₆, Ph ou



R⁹ est -H, -CN, -alkyle en C₁ à C₆, -O-alkyle en C₁ à C₆ ou C(=O)(alkyle en C₁ à C₃) ;

R¹⁰ est -NH (alkyle en C₁ à C₃), -N (alkyle en C₁ à C₃)₂ ou -S(alkyle en C₁ à C₃) ; Z est -CH₂-




R^a est -H, -Cl ou -CF₃ ;

p est 2 ;

A¹ est -CH₂-, -C(CH₃)₂-, ou NR¹³ ;

A² est -O-, -(CR¹¹R¹²)-, ou NR¹³ où R¹¹ et R¹² sont chacun indépendamment -H, -F, -CH₃, -CF₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂ ou -C(CH₃)₃, ou R¹¹ et R¹² ensemble forment un composé noyau non aromatique spirocyclique tri- ou tétragonal, et R¹³ est -H, -CH₃, -CF₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂CF₃, -C(=O)CH₃, -C(=O)CF₃, -CO₂C(CH₃)₃, -SO₂CH₃, -SO₂CF₃, ou



A³ est -(CH₂)_n- ;

X est S ou O ;

m est un nombre entier situé dans la plage allant de 0 à 3 ;

n est un nombre entier situé dans la plage allant de 0 à 2 ;

q est un nombre entier situé dans la plage allant de 1 à 3 ;

où ledit -alkyle en C₁ à C₃, -cycloalkyle en C₃ à C₆, -alkyle en C₁ à C₆ ou alcényle en C₂ à C₆ est non substitué ou substitué avec un ou plusieurs choisis dans le groupe constitué par -F, -Cl, -Br, -OH, -CF₃, -CN, -CO₂H, -C(=O)CH₃, -OC(=O)CH₃, -alkyle en C₁ à C₃, -O-alkyle en C₁ à C₃, et Ph.

3. Dérivés de cycloalcényl aryle, leurs isomères, leurs sels pharmaceutiquement acceptables, leurs hydrates ou leurs produits de solvatation selon la revendication 1, dans lesquels les dérivés de cycloalcényl aryle sont choisis dans le groupe constitué par les composés suivantes :

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-thione ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-thione ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-thione ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5-méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5-méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-thione ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-thione ;
 la (4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclohept-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclopent-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclopent-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 l'acide 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzoïque ;
 le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzoate de méthyle ;
 l'acide 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzoïque ;
 le (2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzoate de méthyle ;
 la (4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclohept-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((5-éthyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(hydroxyméthyl)-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(méthoxyméthyl)phényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5-(trifluorométhyl)-cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(3'-chloro-4,6'-diméthoxybiphényl-3-yl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-chloro-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((2-(1H-indol-4-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

5 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-nitrophényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(2-méthoxyphényl)-5,6-dihydro-2H-pyran-3-yl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

10 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(diméthylamino)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

le 2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-5-méthoxybenzaldéhyde ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-(hydroxyméthyl)-4-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

15 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-méthoxy-2-(méthoxyméthyl)phényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-3-((2-(quinoléine-8-yl)cyclohex-1-ényl)méthyl)oxazolidine-2-one ;

20 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-3-((2-(1-méthyl-1H-indazole-4-yl)cyclohex-1-ényl)méthyl)oxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(3-isopropyl-1,2,4-oxadiazole-5-yl)-2-méthoxyphényl)-cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

25 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphényl)-5-méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-hydroxy-5-isopropylphényl)-5-(trifluorométhyl)-cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-morpholinophényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

30 le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-N-méthylbenzamide ;

le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-N-éthyl-4-méthoxybenzamide ;

35 le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-N-(2,2,2-trifluoroéthyl)benzamide ;

le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-N-isopropyl-4-méthoxybenzamide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)acétamide ;

40 le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)isobutyramide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole-5-yl)-2-méthoxyphényl)-cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

45 le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzaldéhyde ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(1-hydroxyéthyl)-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((2-(5-acetyl-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

50 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropane-2-yl)-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-3-((2-(2-(trifluorométhoxy)phényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)oxazolidine-2-one ;

55 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyl-oxazolidine-2-one ;

l'acétate de 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoro-méthyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)éthyle ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthylisobutyramide ;

le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-N-isopropyl-4-méthoxy-N-méthylbenzamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl)-5-méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((5-tert-butyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(1-hydroxyéthyl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropane-2-yl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5-(trifluorométhyl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)acétamide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)isobutyramide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthylacétamide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthylisobutyramide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-(méthoxyméthyl)-4-(trifluorométhyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-tert-butyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)-N-(2,2,2-trifluoroéthyl)acétamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-acétyl-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)acétamide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-oxopyrrolidine-1-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-oxopipéridine-1-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((5,5-difluoro-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le (2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl(méthyl)carbamate de méthyle ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthylméthanesulfonamide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-3,3,3-trifluoro-N-méthylpropanamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(1,1,1-trifluoropropane-2-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le (3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)acétate de méthyle ;

l'acide 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)acétique ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)cyclopropanesulfonamide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)trifluorométhanesulfonamide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthylcyclopropanesulfonamide ;

la 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-3-méthylthiourée ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)trifluoro-N-méthylméthanesulfonamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-oxoimidazolidine-1-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-oxooxazolidine-3-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((2-(2-amino-5-isopropylphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-(méthylloxazolidine-2-one) ;

le N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-isopropylphényl)-N-méthylacétamide ;

la 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-1,1-diméthylurée ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(méthylthio)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-(méthylloxazolidine-2-one) ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((5,5-diméthyl-2-(2-méthylthio)-5-(trifluorométhoxy)phényl)-cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (Z)-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2-cyano-1,1-diméthylguanidine ;

la (E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2-cyano-3-méthylguanidine ;

la (E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2-cyano-1,3,3-triméthylguanidine ;

le -3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl-N'-méthylcarbamimidothioate de (Z)-méthyle ;

la 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluoro-méthyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-1,3,3-triméthylurée ;

le (3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)propanoate de méthyle ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(1,1,1-trifluoropropane-2-ylamino)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(méthyl(1,1,1-trifluoropropane-2-yl)amino)-phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2,2-trifluoroacétamide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2-bromo-acétamide ;

le N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-isopropylphényl)acétamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-(méthylamino)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-(diméthylamino)-5-isopropylphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2,2,2-trifluoroacétyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(perfluoroprop-1-èn-2-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2-yl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le (2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl(isopropyl)carbamate de tert-butyle ;

le (2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl(éthyl)carbamate de tert-butyle ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-éthylacétamide ;

la (4S,5R,Z)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2,2,2-trifluoro-1-(méthoxyimino)éthyl)-phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-(2-hydroxy-2-méthylpropyl)acétamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(3,3-difluoroazétidine-1-carbonyl)-2-méthoxyphényl)-cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropane-2-yl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-méthoxypropane-2-yl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-((2-hydroxy-2-méthylpropyl)(méthyl)amino)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((2-(5-acétyl-4-fluoro-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(4,5-dihydrooxazole-2-yl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(3-hydroxyazétidine-1-carbonyl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-((R)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole-2-yl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-cyclopropanecarbonitrile ;

le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-cyclopropanecarboxamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(2,2,2-trifluoroacétyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(cyclopropanecarbonyl)-4-fluoro-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl)-5-(trifluorométhyl)-cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-nitrophényl)-5-(trifluorométhyl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-méthoxyphényl)-5-(trifluorométhyl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4-(trifluorométhyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-acétamide ;

le (2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2-fluoro-4-méthoxybenzoate de méthyle ;

l'acide 5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2-fluoro-4-méthoxybenzoïque ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)phényl)trifluoro-N-méthylméthanesulfonamide ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)-phényl)-N-méthylacétamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(méthyl(4-(trifluorométhyl)thiazole-2-yl)amino)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(4-(trifluorométhyl)thiazole-2-ylamino)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2-fluoro-4-méthoxyphényl)-N-méthylacétamide ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2-fluoro-4-méthoxyphényl)-acétamide ;

la (4S,5R)-3-((2-(5-amino-4-fluoro-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-méthoxy-5-nitrophényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le (((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate de tert-butyle ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(2,2,2-trifluoroéthoxy)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(6-méthoxybenzo[d][1,3]dioxo-1-5-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)phényl)-N-méthylisobutyramide ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)phényl)-N-méthylpropionamide ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)phényl)-N-méthylméthanesulfonamide ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)phényl)-2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)phényl)trifluorométhanesulfonamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2,4-diméthoxy-5-nitrophényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2,4-diméthoxyphényl)-N-méthylacétamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-méthyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-hydroxy-2-méthoxy-5-nitrophényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(méthylamino)-4-(trifluorométhyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2-éthyl-4-méthoxyphényl)-N-méthylacétamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-((2-hydroxy-2-méthylpropyl)(méthyl)amino)-2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-cyclopropyl-4-fluoro-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

l'acétate de 1-((5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)phényl)(méthyl)amino)-2-méthyl-1-oxopropane-2-yle ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropoxy-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

l'acétate de 1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)(méthyl)amino)-2-méthyl-1-oxopropane-2-yle ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2-hydroxy-N,2-diméthylpropanamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(trifluorométhyl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-4-méthyl-5-nitrophényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-méthoxy-4-méthylphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-méthylphényl)-acétamide ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-méthylphényl)-N-méthylacétamide ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-méthylphényl)-trifluorométhanesulfonamide ;

le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-méthylphényl)trifluoro-N-méthylméthanesulfonamide ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthyléthanthioamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(2,2,2-trifluoroacétyl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(trifluorométhylsulfonyl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((1-acétyl-4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(méthylsulfonyl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-isopropyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(2,2,2-trifluoroéthyl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-thiooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthylacétamide ;

le (3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)propanoate de méthyle ;

l'acide 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)propanoïque ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((6-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)spiro[2.5]oct-5-èn-5-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

le 6-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-5-méthoxyindoline-1-carboxylate de tert-butyle ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-méthoxyindoline-6-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)-méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((2-(1-acétyl-5-méthoxyindoline-6-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-méthoxy-1-(2,2,2-trifluoroéthyl)indoline-6-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-méthoxy-1-(méthylsulfonyl)indoline-6-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

le (((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-3-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate de tert-butyle ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((3-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-4-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((3-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(2,2,2-trifluoroéthyl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-4-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((3-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(trifluorométhylsulfonyl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-4-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

le (3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanoate de méthyle ;

l'acide 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanoïque ;

le (R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanamide ;

le (S)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((6-(2-méthoxyphényl)spiro[2.5]oct-5-èn-5-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((6-(2-méthoxy-5-nitrophényl)spiro[2.5]oct-5-èn-5-yl)méthyl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-3-((6-(5-amino-2-méthoxyphényl)spiro[2.5]oct-5-èn-5-yl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyloxazolidine-2-one ;

le (R)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-spiro[2.5]oct-5-èn-6-yl)-4-méthoxyphényl)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanamide ;

le (S)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-spiro[2.5]oct-5-èn-6-yl)-4-méthoxyphényl)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-2-phénylpropanamide ;

le (R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-3,3,3-trifluoro-2-méthoxy-N-méthyl-2-phénylpropanamide ;

le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)propanamide ;

le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)propanenitrile ;

la (4S,5R)-3-(2-(5-(2-(2H-tétrazole-5-yl)éthyl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(1-méthylcyclopropyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((6-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(1-méthylcyclopropyl)phényl)spiro[2.5]oct-5-èn-5-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(3',5'-difluoro-4-méthoxy-4'-(méthoxyméthoxy)biphényl-3-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(3',5'-difluoro-4'-hydroxy-4-méthoxybiphényl-3-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanamide ;

le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanenitrile ;

le -(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-3-méthylbutanoate de méthyle ;

l'acide 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-3-méthylbutanoïque ;

le 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylbutanoate de méthyle ;

l'acide 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylbutanoïque ;

le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)cyclobutanecarboxylate d'éthyle ;

l'acide 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)cyclobutanecarboxylique ;

le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)cyclobutanecarboxamide ;

le 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2-méthylpropanoate de méthyle ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine-3-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)benzo[d][1,3]dioxole-5-yl)acétate de méthyle ;

l'acide 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acétique ;

le 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-N-méthylacétamide ;

l'acide 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2-méthylpropanoïque ;

le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N,2,2-triméthylpropanamide ;

le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)cyclopentanecarboxylate de méthyle ;

l'acide 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)cyclopentanecarboxylique ;

l'acide 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2-fluoro-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanoïque ;

le 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-carboxylate de méthyle ;
l'acide 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-carboxylique ;
5 le 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2-fluoro-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanoate de méthyle ;
le 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2-fluoro-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanamide ;
10 le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphénéthyl)-cyclobutanecarboxylate d'éthyle ;
l'acide 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphénéthyl)cyclobutanecarboxylique ;
le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzonitrile ;
15 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2H-tétrazole-5-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4R,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4S,5S)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
20 la (4R,5S)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
le 7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-carboxamide ;
25 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(1-méthyl-1H-tétrazole-5-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-méthyl-2-(2H-tétrazole-5-yl)propyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
30 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-méthyl-2-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)propyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
le 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzamido)acétate de tert-butyle ;
35 le 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-N-méthylbenzamido)acétate de tert-butyle ;
le 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzamido)-3-méthylbutanoate de (R)-méthyle ;
le 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-N-méthylbenzamido)-3-méthylbutanoate de (R)-méthyle ;
40 l'acide (R)-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzamido)-3-méthylbutanoïque ;
le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanoate de méthyle ;
45 l'acide 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-N-méthylbenzamido)acétique ;
le 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-6-méthoxypyridine-3-yl)-2,2-diméthylpropanoate de méthyle ;
l'acide 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-6-méthoxypyridine-3-yl)-2,2-diméthylpropanoïque ;
50 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-chloro-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
le 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate de tert-butyle ;
55 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(hydroxyméthyl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate de méthyle ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(1,2,3,6-tétrahydropyridine-4-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
5 le 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate de méthyle ;
le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)pyrrolidine-2-carboxylate de (S)-méthyle ;
10 le 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzylamino)-3-méthylbutanoate de (R)-méthyle ;
l'acide 4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)cyclohex-3-ènecarboxylique ;
le 2-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)(méthyl)amino)-3-méthylbutanoate de (R)-méthyle ;
15 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-((R)-2-(trifluorométhyl)pyrrolidine-1-yl)méthyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(6-isopropyl-3-méthoxypyridine-2-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ; et
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(((S)-3-fluoropyrrolidine-1-yl)méthyl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one.

4. Dérivés de cycloalcénylaryle, leurs isomères, leurs sels pharmaceutiquement acceptables, leurs hydrates ou leurs produits de solvation selon la revendication 3, dans lesquels les dérivés de cycloalcényl aryle sont choisis dans le groupe constitué par les composés suivants :

25 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-thione ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-thione ;
30 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5-méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
35 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5-méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-thione ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
40 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-thione ;
le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzoate de méthyle ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
45 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5-(trifluorométhyl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzaldéhyde ;
50 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(1-hydroxyéthyl)-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropane-2-yl)-2-méthoxyphényl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthylisobutyramide ;
55 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((5-tert-butyl-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclo-

hex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(1-hydroxyéthyl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclo-
 hex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(2-hydroxypropane-2-yl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la 4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-
 ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-5-(trifluorométhyl)cyclohex-
 1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-4,4-diméthylcyclo-
 hex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)acétamide ;
 le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthylacétamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-tert-butyl-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-
 ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(trifluorométhoxy)phényl)-5,5-diméthylcyclo-
 hex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((5,5-difluoro-2-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)cyclo-
 hex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le 3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclo-
 hex-1-ényl)-4-méthoxyphényl(méthyl)carbamate de méthyle ;
 le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N-méthylméthanesulfonamide ;
 le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-3,3,3-trifluoro-N-méthylpropanamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(1,1,1-trifluoropropane-2-yl)phényl)-
 5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)trifluorométhanesulfonamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropane-2-yl)-2-mé-
 thoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-méthoxypropane-2-yl)-2-mé-
 thoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-3-((2-(5-acétyl-4-fluoro-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluoro-
 méthyl)phényl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(4,5-dihydrooxazole-2-yl)-2-méthoxyphényl)-5,5-dimé-
 thylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-((R)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole-2-yl)-2-méthoxyphé-
 nyl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcy-
 clohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)cyclopropanecarbonitrile ;
 le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcy-
 clohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)cyclopropanecarboxamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(2,2,2-trifluoroacétyl)phényl)-5,5-di-
 méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-(cyclopropanecarbonyl)-4-fluoro-2-méthoxyphényl)-5,5-di-
 méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phényl)-5-(trifluorométhyl)cy-
 clohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-nitrophényl)-5-(trifluorométhyl)cyclohex-1-
 ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-méthoxyphényl)-5-(trifluorométhyl)cyclohex-1-ényl)méthyl)-5-(3,5-bis(trifluoromé-
 thyl)phényl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4-(trifluoromé-
 thyl)cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-acétamide ;
 le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcy-

clohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)-phényl)-trifluoro-N-méthylméthanesulfonamide ;
 le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)-phényl)-N-méthylacétamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(méthyl(4-(trifluorométhyl)thiazol-2-yl)ami-
 5 no)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)-2-fluoro-4-méthoxyphényl)-N-méthylacétamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(2,2,2-trifluoroéthoxy)phényl)-5,5-di-
 méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 10 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(6-méthoxybenzo[d][1,3]dioxole-5-yl)-5,5-diméthylcyclohex-
 1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-(trifluorométhyl)-phényl)-2,2,2-trifluoro-N-méthylacétamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-méthyl-1,2,5,6-té-
 15 trahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcy-
 clohex-1-ényl)-2-éthyl-4-méthoxyphényl)-N-méthylacétamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-cyclopropyl-4-fluoro-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcy-
 clohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 20 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-5-isopropoxy-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcy-
 clohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 l'acétate de 1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-
 diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)(méthyl)amino)-2-méthyl-1-oxopropane-2-yle ;
 le N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 25 cyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2-hydroxy-N,2-diméthylpropanamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(trifluorométhyl)-
 1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcy-
 clohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-méthylphényl)-N-méthylacétamide ;
 30 le N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthyl-
 cyclohex-1-ényl)-4-méthoxy-2-méthylphényl)trifluoro-N-méthylméthanesulfonamide ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(trifluorométhyl)-
 sulfonyl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-isopropyl-1,2,5,6-
 35 tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((4-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)-1-(2,2,2-trifluoroé-
 thyl)-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcy-
 clohex-1-ényl)-4-éthoxyphényl)propanoate de méthyle ;
 40 l'acide 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-dimé-
 thylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)propanoïque ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((6-(4-fluoro-5-isopropyl-2-méthoxyphényl)spiro[2.5]oct-5-èn-5-
 yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcy-
 45 clohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanoate de méthyle ;
 l'acide 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-dimé-
 thylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanoïque ;
 le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcy-
 clohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)propanenitrile ;
 50 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(1-méthylcyclopropyl)phényl)-5,5-di-
 méthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((6-(4-fluoro-2-méthoxy-5-(1-méthylcyclopropyl)phé-
 nyl)spiro[2.5]oct-5-èn-5-yl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;
 le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcy-
 55 clohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-3-méthylbutanoate de méthyle ;
 l'acide 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-dimé-
 thylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)cyclobutane-carboxylique ;
 la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(trifluorométhyl)pyridine-3-yl)-5,5-diméthylcy-

clohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

le 2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)benzo[d][1,3]di-oxole-5-yl)acétate de méthyle ;

le 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxyphényl)-N,2,2-triméthylpropanamide ;

le 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)cyclopentanecarboxylate de méthyle ;

l'acide 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-4-méthoxybenzyl)cyclopentanecarboxylique ;

le 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-2-fluoro-4-méthoxyphényl)-2,2-diméthylpropanamide ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-méthyl-2-(2H-tétrazole-5-yl)propyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(2-méthoxy-5-(2-méthyl-2-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)propyl)phényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ;

l'acide 3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)-phényl)-4-méthyl-2-oxooxazolidine-3-yl)méthyl)-4,4-diméthylcyclohex-1-ényl)-6-méthoxypyridine-3-yl)-2,2-diméthylpropanoïque ;

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-chloro-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one ; et

la (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(6-isopropyl-3-méthoxypyridine-2-yl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one.

La (4S,5R)-5-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-3-((2-(5-((S)-3-fluoropyrrolidine-1-yl)méthyl)-2-méthoxyphényl)-5,5-diméthylcyclohex-1-ényl)méthyl)-4-méthylloxazolidine-2-one.

5. Compositions pharmaceutiques comprenant les dérivés de cycloalcényl aryle de formule 1, leurs isomères, leurs sels pharmaceutiquement acceptables, leurs hydrates ou leurs produits de solvation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 ensemble avec des véhicules pharmaceutiquement acceptables.

6. Compositions pharmaceutiques selon la revendication 5, dans lesquelles les compositions sont utilisées pour la prévention ou le traitement de la dyslipidémie et de l'athérosclérose associée à la dyslipidémie, en augmentant le cholestérol de lipoprotéine de haute densité (HDL-C) et en diminuant le cholestérol de lipoprotéine de basse densité (LDL-C) par inhibition de l'activité CETP.


7. Procédé de préparation de dérivés de cycloalcényl aryle de formule 1, le procédé comprenant les étapes de :

soumettre un composé de la formule 2 suivante à une réaction de Vilsmeier pour préparer un composé de la formule 3 suivante ;


soumettre le composé obtenu de la formule 3 à une réaction de Suzuki avec un composé de la figure 4 suivante en présence de palladium pour préparer un composé de la formule 5 suivante ; et

soumettre le composé obtenu de la formule 5 et un composé de la formule 6 suivante à la réduction pour préparer un composé de la formule 7 suivante, puis soumettre le composé obtenu de la formule 7 à la formation d'un noyau :


[Formule 1]




[Formule 2]




[Formule 3]




[Formule 4]




[Formule 5]



[Formule 6]




[Formule 7]



dans lesquelles A¹, A², A³, B¹, B², R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R^a, p et X sont les mêmes que définis dans la revendication 1 ;

Y est Cl ou Br ; et Q est -B(OH)₂ ou




8. Procédé de préparation de dérivés de cycloalcénylaryle de formule 1, le procédé comprenant les étapes de :

soumettre un composé de la formule 3 suivante et un composé de la formule 6 suivante à la réduction pour préparer un composé de la formule 8 suivante, puis soumettre le composé obtenu de la formule 9 à la formation d'un noyau ; et

soumettre le composé obtenu de la formule 9 à une réaction de Suzuki avec un composé de la formule 4 suivante en présence de palladium pour préparer un composé de la formule 1 suivante :




[Formule 1]




[Formule 3]

[Formule 4]


[Formule 6]




[Formule 8]



[Formule 9]



dans lesquelles A^1 , A^2 , A^3 , B^1 , B^2 , R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^a , p et X sont les mêmes que définis dans la revendication 1 ; Y est Cl ou Br ; et Q est $-B(OH)_2$ ou



REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION

This list of references cited by the applicant is for the reader's convenience only. It does not form part of the European patent document. Even though great care has been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all liability in this regard.

Patent documents cited in the description

- WO 02088085 A [0004]
- WO 2006014357 A [0004]
- WO 9835937 A [0004]
- WO 2007081569 A2 [0006]
- WO 2006014357 A1 [0014] [0017] [0018] [0021]
- US 20100081673 A1 [0026]
- US 5929094 A1 [0026]

Non-patent literature cited in the description


- GOLDBOURT et al. *Arterioscler Thromb Vase Biol*, 1997, vol. 17, 107-113 [0002]
- TAILOR et al. *Circulation*, 2004, vol. 110, 3512-3517 [0002]
- BARTER et al. *Arterioscler Thromb Vase Biol.*, 2003, vol. 23, 160-167 [0003]
- FERREST et al. *British Journal of Pharmacology*, 2008, vol. 154, 1465-1473 [0005]
- HISASHI SHINKAI. *Expert Opinion on Therapeutic Patents*, 2009, vol. 19 (9), 1229-1237 [0005]
- NIESOR et al. *Journal of lipid Research*, 2010, vol. 51, 3443-3453 [0005]
- MORRIS, G. A. et al. *Tetrahedron Lett.*, 2001, vol. 42, 2093 [0017] [0022] [0023] [0024] [0025] [0027]
- MARTIN G. BANWELL et al. *Org. Lett.*, 2004, vol. 6, 2741 [0017] [0297]
- ERIN F. DIMAURO et al. *J. Med. Chem.*, 2006, vol. 49, 5671 [0017]
- JINGJUN YIN et al. *J. Org. Chem.*, 2006, 840 [0018] [0021]
- AKIO BABA et al. *Tetrahedron*, 2009, vol. 65, 5462 [0025] [0026]
- CAMERON J. SMITH et al. *J. Med. Chem.*, 2011, vol. 54, 4880 [0473] [0475] [0477]



SZABADALMI IGÉNYPONTOK

1. I képletű cikloalkenil-aril-származékok, ezek racemátjai, racém keverékei, enantiomerjei, diasztereomer keverékei, diasztereomerjei, atropizomerjei és az atropizomerek keverékei, ezek gyógyszerészetileg alkalmazható sói, ezek hidrátjai vagy ezek szolvátjai:


[Formula I]



ahol

B¹ és B² jelentése egymástól függetlenül N vagy C, azzal a megszorítással, hogy mindkét B¹ és B² nem lehet N egyidejűleg, és ha B¹ és B² közül az egyik jelentése N, akkor R¹ vagy R⁵ hiányzik;


R¹ és R² jelentése egymástól függetlenül H, -F, -OH, -NH₂, -C(=O)H, -CH₂OH, -OC₁-C₆alkil, -SC₁-C₆alkil, -CH₂OC₁-C₆alkil, -NH(C₁-C₆alkil), -NH(C=O)(C₁-C₆alkil), -N(C₁-C₆alkil)₂, vagy




R³ és R⁴ jelentése a kapcsolódó szénatomokkal együtt 5- vagy 6-tagú heterociklusos aromás vagy nem-aromás gyűrű, amely tartalmaz 1 - 3 heteroatomot, egymástól függetlenül N, O, S, és C(=O) csoportjából megválasztva, ahol a heterociklusos aromás vagy nem-aromás gyűrű adott esetben szubsztituált lehet R⁶ szubsztituenssel;

R⁵ jelentése -H, -F, -OH, -C₁-C₆alkil, vagy -OC₁-C₆alkil;

R⁶ jelentése -H, halogén, -CN, -NO₂, -C₁-C₆alkil, -C₂-C₆alkenil, -C₁-C₆cikloalkil,



-OR⁷, -CH₂OR⁷, -CH₂NR⁷R⁸, -SR⁷, -C(=O)R⁷, -CO₂R⁷, -CHR⁷CO₂R⁸, -C(=O)NR⁷R⁸,





Ar jelentése C₆ monociklusos aromás gyűrű, amely szubsztituálatlan vagy adott esetben szubsztituált egy vagy több szubsztituenssel, halogén, -OH, -NH₂, -C₁-C₆alkil és -OC₁-C₆alkil csoportjából megválasztva;

R⁵ jelentése -H, -F, -OH, -CF₃, -C₁-C₆ alkil, vagy -OC₁-C₆ alkil.

R³ jelentése -H, halogén, -C(=O)(C₁-C₃alkil), -C₁-C₃alkil, -OC₁-C₃alkil, -C₁-C₃cikloalkil, vagy -OC(=O)(C₁-C₃alkil);

R⁸ jelentése -H, halogén, -OH, -CN, -NH₂, -NH(C₁-C₃alkil), -C(=O)NH₂, -CO₂H,



$-\text{C}_1\text{--C}_6\text{alkil}$, $-\text{OC}_1\text{--C}_6\text{alkil}$, $-\text{C}_3\text{--C}_6\text{cikloalkil}$, $-\text{Ph}$ vagy



R^9 jelentése $-\text{H}$, $-\text{CN}$, $-\text{C}_1\text{--C}_6\text{alkil}$, $-\text{OC}_1\text{--C}_6\text{alkil}$, vagy $-\text{C}(=\text{O})(\text{C}_1\text{--C}_3\text{alkil})$;

R^{10} jelentése $-\text{NH}(\text{C}_1\text{--C}_3\text{alkil})$, $-\text{N}(\text{C}_1\text{--C}_3\text{alkil})_2$, vagy $-\text{S}(\text{C}_1\text{--C}_3\text{alkil})$;

Z jelentése $-\text{CH}_2$;



R^9 jelentése $-\text{H}$, $-\text{Cl}$ vagy $-\text{CF}_3$;

p értéke 0 – 2 egész szám;

A^1 és A^2 jelentése egymástól függetlenül $-(\text{CR}^{11}\text{R}^{12})$ -, ahol R^{11} és R^{12} jelentése egymástól függetlenül $-\text{H}$, $-\text{F}$, vagy $-\text{C}_1\text{--C}_6\text{alkil}$, vagy R^{11} és R^{12} jelentése együtt 3- vagy 4-tagú spiróciklusos nem-aromás gyűrű;

A^3 jelentése $-(\text{CH}_2)_6$;

X jelentése S vagy O ;

m értéke 0 – 3 egész szám;

n értéke 0 – 2 egész szám;

q értéke 1 – 3 egész szám;

ahol az említett $-\text{C}_1\text{--C}_3\text{alkil}$, $-\text{C}_3\text{--C}_6\text{cikloalkil}$, $-\text{C}_1\text{--C}_6\text{alkil}$ vagy $-\text{C}_2\text{--C}_6\text{alkenil}$ szubsztituálatlan vagy szubsztituált egy vagy több szubsztituenssel, halogén, $-\text{OH}$, $-\text{CF}_3$, $-\text{CN}$, $-\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$, $-\text{OC}(=\text{O})\text{CH}_3$, $-\text{C}_1\text{--C}_3\text{alkil}$, $-\text{OC}_1\text{--C}_3\text{alkil}$, és $-\text{Ph}$ csoportjából megválasztva.


2. Az 1. igénypont szerinti cikloalkenil-aryl-származékok, ezek racemátjai, racém keverékei, enantiomerjei, diasztereomer keverékei, diasztereomerjei, atropizomerjei és az atropizomerek keverékei, ezek gyógyszerészetileg alkalmazható sói, ezek hidrátjai vagy ezek szolvátjai, ahol

B^1 és B^2 jelentése egymástól függetlenül N vagy C , azzal a megszorítással, hogy mindkét B^1 és B^2 nem lehet N egyidejűleg, és ha B^1 és B^2 közül az egyik jelentése N , akkor R^2 vagy R^3 hiányzik;

R^1 jelentése $-\text{F}$, $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{C}(=\text{O})\text{H}$, $-\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{OCF}_3$, $-\text{SCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$, $-\text{NHCH}_3$,



$\text{---}\text{N}(\text{CH}_3)_2$, vagy




R^2 jelentése -H;



R^1 és R^2 jelentése a kapcsolódó szénatomokkal együtt 5- vagy 6-tagú heterociklusos aromás vagy nem-aromás gyűrű, amely tartalmaz 1 - 3 heteroatomot, egymástól függetlenül N, O, S, és C(=O) csoportjából megválasztva, ahol a heterociklusos aromás vagy nem-aromás gyűrű adott esetben szubsztituált lehet R^6 szubsztituenssel;

R^3 jelentése -H, -F, -OH, -CH₃, -CF₃, -CH₂CH₃, vagy -OCH₃;



R^4 jelentése -H, -F, -Cl, -CN, -NO₂, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CF₃, -CH(CF₃)₂, -CH(CH₃)(CF₃), -C(OCH₃)(CF₃)₂, -CH(OH)CH₃, -C(OH)(CH₃)₂, -C(OH)(CF₃)₂, -C(=CF₂)CF₃, -ciklopropil,




-OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCF₃, -OCH₂CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂NR⁷R⁸, -SCH₃, -C(=O)R⁷, -CO₂R⁷, -CHR⁷CO₂R⁸, -C(=O)NR⁷R⁸,



-NR⁷R⁸, -NR⁷C(=O)R⁸, -NR⁷CO₂R⁸,






Ar vagy Het;

R¹ és R⁴ jelentése a kapcsolódó szénatomokkal együtt 5- vagy 6-tagú cikloalkil vagy heterociklusos gyűrű, amely 0 - 3 heteroatomot tartalmaz, egymástól függetlenül N, O, S, és C(=O) csoportjából megválasztva, ahol a cikloalkil vagy heterociklusos gyűrű adott esetben szubsztituált lehet R⁸ szubsztituenssel;

Ar jelentése C₆ monociklusos aromás vegyület, amely szubsztituálatlan vagy adott esetben szubsztituált egy vagy több szubsztituenssel, -F, -Cl, -OH, -NH₂, -CH₃ és -OCH₃ csoportjából megválasztva,

Het jelentése az alábbiak közül megválasztott




R⁵ jelentése -H;

R⁶ jelentése -H vagy -CH₃;

R⁷ jelentése -H, halogén, -C(=O)(C₁-C₃alkil), -C₁-C₆alkil, -OC₁-C₆alkil, -C₁-C₆cikloalkil, vagy -OC(=O)(C₁-C₃alkil);

R⁸ jelentése -H, halogén, -OH, -CN, -NH₂, -NH(C₁-C₃alkil), -C(=O)NH₂, -CO₂H,




alkil, $-C_1-C_6$ cikloalkil, $-Ph$ vagy



R^9 jelentése $-H$, $-CN$, $-C_1-C_6$ alkil, $-OC_1-C_6$ alkil, vagy $-C(=O)(C_1-C_3$ alkil);

R^{10} jelentése $-NH(C_1-C_3$ alkil), $-N(C_1-C_3$ alkil) $_2$, vagy $-S(C_1-C_3$ alkil);

Z jelentése $-CH_2-$;



R^9 jelentése $-H$, $-Cl$ vagy $-CF_3$;

p értéke 2;

A^1 jelentése $-CH_2-$ vagy $-C(CH_3)_2-$;

A^2 jelentése $-(CR^{11}R^{12})-$, ahol R^{11} és R^{12} jelentése egymástól függetlenül $-H$, $-F$, $-CH_3$, $-CF_3$, $-CH_2CH_3$, $-CH(CH_3)_2$, vagy $-C(CH_3)_3$, vagy R^{11} és R^{12} jelentése együtt 3- vagy 4-tagú spirociklusos nem-aromás gyűrű;

A^3 jelentése $-(CH_2)_n-$;

X jelentése S vagy O ;

m értéke 0 – 3 egész szám;

n értéke 0 – 2 egész szám;

q értéke 1 – 3 egész szám;

ahol az említett $-C_1-C_3$ alkil, $-C_3-C_6$ cikloalkil, $-C_1-C_6$ alkil vagy $-C_2-C_6$ alkenil is szubsztituálatlan vagy szubsztituált egy vagy több szubsztituenssel, $-F$, $-Cl$, $-Br$, $-OH$, $-CF_3$, $-CN$, $-CO_2H$, $-C(=O)CH_3$, $-OC(=O)CH_3$, $-C_1-C_3$ alkil, $-OC_1-C_3$ alkil, és $-Ph$ csoportjából megválasztva.

3. Az 1. igénypont szerinti cikloalkenil-aril-származékok, ezek racemátjai, racém keverékei, enantiomerjei, diasztereomer keverékei, diasztereomerjei, atropizomerjei és az atropizomerek keverékei, ezek gyógyszerészetileg alkalmazható sói, ezek hidrátjai vagy ezek szolvátjai, ahol a cikloalkenil-aril-származék az alábbi vegyületeket tartalmazó csoportból megválasztott:

(4S,SR)-5-(3,5-bisz(trifluorometil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-ion;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluorometil)fenil)-3-((2-(2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-ion;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluorometil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-ion;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluorometil)fenil)-3-((2-(2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5-metilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5-metilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-ion;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-ion;

(4S,5R,Z)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohept-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklopent-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)ciklopent-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxibenzoesav;

metil-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxibenzoát;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzoesav;

metil-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzoát;

(4S,5R,Z)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohept-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((5-etil-2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(hidroximetil)-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(metoximetil)fenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(3'-klór-4,6'-dimetoxibifenil-3-il)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-klór-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((2-(1H-indol-4-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-nitrofenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(dimetilamino)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-5-metoxibenzaldehid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-(hidroximetil)-4-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-metoxi-2-(metoximetil)fenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-3-((2-(kinolin-8-il)ciklohex-1-enil)metil)oxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-3-((2-(1-metil-1H-indazol-4-il)ciklohex-1-enil)metil)oxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(3-izopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-hidroxi-5-izopropilfenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-hidroxi-5-izopropilfenil)-5-metilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-hidroxi-5-izopropilfenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-morfolinofenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxi-N-metilbenzamid;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-N-etil-4-metoxibenzamid;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxi-N-(2,2,2-trifluoretil)benzamid;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-N-izopropil-4-metoxibenzamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)acetamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)izobutiramid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(3-ciklopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxibenzaldehid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(1-hidroxietil)-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((2-(5-acetil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-3-((2-(2-(trifluormetoxi)fenil)ciklohex-1-enil)metil)oxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-fluor-5-(trifluormetil)fenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)etil-acetát;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metilizobutiramid;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-N-izopropil-4-metoxi-N-metilbenzamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(trifluormetil)fenil)-5-metilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(trifluormetil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((5-tere-butyl-2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(1-hidroxietil)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)acetamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)izobutiramid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metilacetamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metilizobutiramid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-(metoximetil)-4-(trifluormetil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-terc-butil-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)-N-(2,2,2-trifluoretil)acetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(trifluormetoxi)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-acetil-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)acetamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2,2-trifluor-N-metilacetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-oxopirrolidin-1-il)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-oxopiperidin-1-il)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((5,5-difluor-2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

metil-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil(metil)karbamát;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metilmetánszulfonamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-3,3,3-trifluor-N-metilpropánamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-metoxi-5-(1,1,1-trifluorpropan-2-il)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
 metil-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)acetát;
 2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)ecetsav;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)ciklopropánszulfonamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)trifluormetánszulfonamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metilciklopropánszulfonamid;
 1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-3-metiltiokarbamid;
 N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)trifluor-N-metilmetánszulfonamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-oxoimidazolidin-1-il)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-oxooxazolidin-3-il)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-3-((2-(2-amino-5-izopropilfenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;
 N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-izopropilfenil)-N-metilacetamid;
 3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-1,1-dimetilkarbamid;
 (4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(metiltio)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
 (4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((5,5-dimetil-2-(2-(metiltio)-5-(trifluormetoxi)fenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
 (Z)-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2-ciano-1,1-dimetilguanidin;
 (E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2-ciano-3-metilguanidin;

(E)-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2-ciano-1,3,3-trimetilguanidin;

(Z)-metil-N-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil-N'-metilkarbamimidotioát;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-1,3,3-trimetilkarbamid;

metil-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)propanoát;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-(2-(2-metoxi-5-(1,1,1-trifluorpropan-2-ilamino)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-(2-(2-metoxi-5-(metil(1,1,1-trifluorpropan-2-il)amino)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2,2-trifluoracetamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2-brómacetamid;

N-(2-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-izopropilfenil)acetamid;

(4S,5R)-3-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-(2-(5-izopropil-2-(metilamino)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-(2-(2-(dimetilamino)-5-izopropilfenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-(2-(2-metoxi-5-(2,2,2-trifluoracetil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-(2-(2-metoxi-5-(perfluorprop-1-en-2-il)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-(2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

terc-butil-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil(izopropil)karbamát;

terc-butil-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil(etil)karbamát;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-etilacetamid;

(4S,5R,Z)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-(2-(2-metoxi-5-(2,2,2-trifluor-1-(metoxilimino)etil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)acetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(3,3-difluorazetidin-1-karbonil)-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hidroxiopropan-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-metoxipropan-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-((2-hidroxi-2-metilpropil)(metil)amino)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((2-(5-acetil-4-fluor-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(4,5-dihidrooxazol-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-3-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(3-hidroxiazetidin-1-karbonil)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-((R)-4-izopropil-4,5-dihidrooxazol-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)ciklopropánkarbonitril;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)ciklopropánkarboxamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-metoxi-5-(2,2,2-trifluoracetil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(ciklopropánkarbonil)-4-fluor-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(trifluormetil)fenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-nitrofenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-metoxifenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)acetamid;

metil-5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-fluor-4-metoxibenzoát;

5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-fluor-4-metoxibenzoesav;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-nitro-4-(trifluormetil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-metoxi-4-(trifluormetil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)trifluor-N-metilmetánszulfonamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)-N-metilacetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(metil(4-(trifluormetil)tiazol-2-il)amino)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(4-(trifluormetil)tiazol-2-ilamino)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-fluor-4-metoxifenil)-N-metilacetamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-fluor-4-metoxifenil)acetamid;

(4S,5R)-3-((2-(5-amino-4-fluor-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-metoxi-5-nitrofenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-metoxi-5-(2,2,2-trifluoretoksi)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-2-(6-metoxibenzo[d][1,3]dioxol-5-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)-N-metilizobutiramid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)-N-metilpropionamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)-N-metilmetánszulfonamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)-2,2,2-trifluor-N-metilacetamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-1-(trifluormetil)fenil)trifluormetánszulfonamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2,4-dimetoxi-5-nitrofenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2,4-dimetoxifenil)-N-metilacetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-hidroxi-2-metoxi-5-nitrofenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(metilamino)-4-(trifluormetil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-etil-4-metoxifenil)-N-metilacetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-((2-hidroxi-2-metilpropil)(metilamino)-2-metoxi-4-(trifluormetil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-ciklopropil-4-fluor-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

1-((5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)(metilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-acetát;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropoxi-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)(metilamino)-2-metil-1-oxopropan-2-il)-acetát;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2-hidroxi-N,2-dimetilpropánamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-4-metil-5-nitrofenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-metoxi-4-metilfenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-metilfenil)acetamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-metilfenil)-N-metilacetamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-metilfenil)trifluormetánszulfonamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-metilfenil)trifluor-N-metilmetánszulfonamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metiletántioamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metilacetamid;

metil-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)propanoát;

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)propionsav;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((6-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)spiro[2.5]okt-5-en-5-il)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

terc-butil-6-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-5-metoxiindolin-1-karboxilát;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-metoxiindolin-6-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((2-(1-acetil-5-metoxiindolin-6-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-metoxi-1-(2,2,2-trifluoretil)indolin-6-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-metoxi-1-(metilszulfonil)indolin-6-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

metil-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropanoát;

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropionsav;

(R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-3,3,3-trifluor-2-metoxi-2-fenilpropánamid;

(S)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-3,3,3-trifluor-2-metoxi-2-fenilpropánamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((6-(2-metoxifenil)spiro[2.5]okt-5-en-5-il)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((6-(2-metoxi-5-nitrofenil)spiro[2.5]okt-5-en-5-il)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((6-(5-amino-2-metoxifenil)spiro[2.5]okt-5-en-5-il)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(R)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)spiro[2.5]okt-5-en-6-il)-4-metoxifenil)-3,3,3-trifluor-2-metoxi-2-fenilpropánamid;

(S)-N-(3-(5-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)spiro[2.5]okt-5-en-6-il)-4-metoxifenil)-3,3,3-trifluor-2-metoxi-2-fenilpropánamid;

(R)-N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-3,3,3-trifluor-2-metoxi-N-metil-2-fenilpropánamid;
3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)propánamid;
3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)propánnitril;
(4S,5R)-3-((2-(5-(2-(2H-tetrazol-5-il)etil)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;
(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-metoxi-5-(1-metilciklopropil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((6-(4-fluor-2-metoxi-5-(1-metilciklopropil)fenil)spiro[2.5]okt-5-en-5-il)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(3',5'-difluor-4-metoxi-4'-(metoximetoxi)bifenil-3-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(3',5'-difluor-4'-hidroxi-4-metoxibifenil-3-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropánamid;
3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropánnitril;
metil-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-3-metilbutanoát;
3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-3-metilbutánsav;
metil-4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2-dimetilbutanoát;
4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2-dimetilbutánsav;
etil-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)ciklobutánkarboxilát;
1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)ciklobutánkarbonsav;
1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)ciklobutánkarboxamid;
metil-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2-metilpropanoát;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(trifluormetil)piridin-3-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

metil-2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)benzo[d][1,3]dioxol-5-il)acetát;

2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)benzo[d][1,3]dioxol-5-il)ecetsav;

2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N-metil-acetamid;

2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2-metilpropionsav;

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N,2,2-trimetilpropánamid;

metil-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)ciklopentánkarboxilát;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)ciklopentánkarbonsav;

3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-fluor-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropionsav;

metil-7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-6-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-2-karboxilát;

7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-6-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-2-karbonsav;

metil-3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-fluor-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropanoát;

3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-fluor-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropánamid;

etil-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenetil)ciklobutánkarboxilát;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenetil)ciklobutánkarbonsav;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzonitril;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2H-tetrazol-5-il)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4R,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5S)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4R,5S)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-6-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-2-karboxamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)fenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)fenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-metil-2-(2H-tetrazol-5-il)propil)fenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-metil-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)propil)fenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

terc-butil-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxibenzamido)acetát;

terc-butil-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxi-N-metilbenzamido)acetát;

(R)-metil-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxibenzamido)-3-metilbutanoát;

(R)-metil-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxi-N-metilbenzamido)-3-metilbutanoát;

(R)-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxibenzamido)-3-metilbutánsav;

metil-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)ciklobutánkarboxilát;

2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxi-N-metilbenzamido)ecetsav;

metil-3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-6-metoxipiridin-3-il)-2,2-dimetilpropanoát;

3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-6-metoxipiridin-3-il)-2,2-dimetilpropionsav;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-klór-2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

terc-butil-4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-5,6-dihidropiridin-1(2H)-karboxilát;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(hidroximetil)-2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

metil-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-1,2,4-oxadiazol-5-karboxilát;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)fenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

metil-4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-5,6-dihidropiridin-1(2H)-karboxilát;

(S)-metil-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)pirolidin-2-karboxilát;

(R)-metil-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxibenzilamino)-3-metilbutanoát;

4-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxifenil)ciklohex-3-énkarbonsav;

(R)-metil-2-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetileiklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)(metil)amino)-3-metilbutanoát;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(((R)-2-(trifluormetil)pirrolidin-1-il)metil)fenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(6-izopropil-3-metoxipiridin-2-il)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on; és

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(((S)-3-fluorpirrolidin-1-il)metil)-2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on.

4. A 3. igénypont szerinti cikloalkenil-aril-származékok, ezek racémátjai, racém keverékei, enantiomerjei, diasztereómer keverékei, diasztereómerjei, atropizomerjei és az atropizomerek keverékei, ezek gyógyszerészetileg alkalmazható sói, ezek hidrátjai vagy ezek szolvátjai, ahol a cikloalkenil-aril-származék az alábbi vegyületeket tartalmazó csoportból megválasztott:

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetileiklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5-metilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5-metilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-tion;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-tion;

metil-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxibenzoát;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxibenzaldehid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(1-hidroxietil)-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)ciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metilizobutiramid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(trifluormetil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((5-terc-butil-2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(1-hidroxietil)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(2-hidroxipropan-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-izopropil-2-metoxifenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)acetamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metilacetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-terc-butil-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(trifluormetoxi)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((5,5-difluor-2-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

metil-3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil(metil)karbamát;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N-metilmetánszulfonamid;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-3,3,3-trifluor-N-metilpropánamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-metoxi-5-(1,1,1-trifluorpropan-2-il)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)trifluormetánszulfonamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hidroxipropan-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-metoxipropan-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((2-(5-acetil-4-fluor-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(4,5-dihidroxazol-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-((R)-4-izopropil-4,5-dihidroxazol-2-il)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)ciklopropánkarbonitril;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)ciklopropánkarboxamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-metoxi-5-(2,2,2-trifluoracetyl)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(ciklopropánkarbonil)-4-fluor-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(trifluormetil)fenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-nitrofenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-3-((2-(5-amino-2-metoxifenil)-5-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)metil)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4-(trifluormetil)ciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)acetamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)trifluor-N-metilmetánszulfonamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)-N-metilacetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(metil(4-(trifluormetil)tiazol-2-il)amino)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-fluor-4-metoxifenil)-N-metilacetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-metoxi-5-(2,2,2-trifluoretoksi)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(6-metoxibenzo[d][1,3]dioxol-5-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-(trifluormetil)fenil)-2,2,2-trifluor-N-metilacetamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-etil-4-metoxifenil)-N-metilacetamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-ciklopropil-4-fluor-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-5-izopropoxi-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

1-((3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)(metil)amino)-2-metil-1-oxopropan-2-il-acetát;

N-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2-hidroxi-N,2-dimetilpropánamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-metilfenil)-N-metilacetamid;

N-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxi-2-metilfenil)trifluor-N-metilmetánszulfonamid;

metil-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)propanoát;

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)propionsav;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((6-(4-fluor-5-izopropil-2-metoxifenil)spiro[2.5]okt-5-en-5-il)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

metil-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropanoát;

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropionsav;

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)propánnitril;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(4-fluor-2-metoxi-5-(1-metilciklopropil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((6-(4-fluor-2-metoxi-5-(1-metilciklopropil)fenil)spiro[2.5]okt-5-en-5-il)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

metil-3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-3-metilbutanoát;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)ciklobutánkarbonsav;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(trifluormetil)piridin-3-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

metil-2-(7-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)benzo[d][1,3]dioxol-5-il)acetát;

3-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxifenil)-N,2,2-trimetilpropánamid;

metil-1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)ciklopentánkarboxilát;

1-(3-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-4-metoxibenzil)ciklopentánkarbonsav;

3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxooxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-2-fluor-4-metoxifenil)-2,2-dimetilpropánamid;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;

(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-metil-2-(2H-tetrazol-5-il)propil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(2-metoxi-5-(2-metil-2-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)propil)fenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on;
3-(5-(2-(((4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-4-metil-2-oxoxazolidin-3-il)metil)-4,4-dimetilciklohex-1-enil)-6-metoxipiridin-3-il)-2,2-dimetilpropionsav;
(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-klór-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on; és
(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(6-izopropil-3-metoxipiridin-2-il)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on,
(4S,5R)-5-(3,5-bisz(trifluormetil)fenil)-3-((2-(5-(((S)-3-fluorpirrolidin-1-il)metil)-2-metoxifenil)-5,5-dimetilciklohex-1-enil)metil)-4-metiloxazolidin-2-on.

5. Gyógyszerkészítmény, amely tartalmazza az 1-3. igénypontok bármelyike szerinti 1 képletű cikloalkenil-aril-származékokat, ezek racemátjait, racém keverékeit, enantiomerjeit, diasztereomer keverékeit, diasztereomerjeit, atropizomerjeit és az atropizomerek keverékeit, ezek gyógyszerészetileg alkalmazható sóit, ezek hidrátjait vagy ezek szolvátjait, gyógyszerészetileg alkalmazható hordozóanyagok mellett.

6. Az 5. igénypont szerinti gyógyszerkészítmény diszlipidémia és diszlipidémiával társult ateroszklerózis megelőzésében vagy kezelésében történő alkalmazásra, a CETP aktivitás gátlásán keresztül a nagy sűrűségű lipoprotein koleszterin (HDL-C) növelésével és a kis sűrűségű lipoprotein koleszterin (LDL-C) csökkentésével.


7. Eljárás 1 képletű cikloalkenil-aril-származékok előállítására, amely eljárás tartalmazza az alábbi lépéseket:

alábbi 2 képletű vegyületen Vilsmeier reakciót végzünk alábbi 3 képletű vegyület előállításához;

a kapott 3 képletű vegyületen Suzuki reakciót végzünk alábbi 4 képletű vegyülettel palládium jelenlétében alábbi 5 képletű vegyület előállításához; és

a kapott 5 képletű vegyületet és alábbi 6 képletű vegyületet redukálásnak vetjük alá alábbi 7 képletű vegyület előállításához, majd a kapott 7 képletű vegyületen gyűrűzárást végzünk:

[Formula 1]




[Formula 2]





[Formula 5]

[Formula 3]





[Formula 6]


[Formula 4]



[Formula 7]



ahol A^1 , A^2 , A^3 , B^1 , B^2 , R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , p és X jelentése az 1. igénypontban megadott; Y jelentése Cl vagy Br; és Q jelentése $-B(OH)_2$ vagy




8. Eljárás 1 képletű cikloalkenil-aril-származékok előállítására, amely eljárás tartalmazza az alábbi lépéseket:


alábbi 3 képletű vegyületet és alábbi 6 képletű vegyületet redukálásnak vetjük alá alábbi 8 képletű vegyület előállításához, majd a kapott 8 képletű vegyületen gyűrűzárást végzünk; és

a kapott 9 képletű vegyületen Suzuki reakciót végzünk alábbi 4 képletű vegyülettel palládium jelenlétében alábbi 1 képletű vegyület előállításához:


[Formula 1]




[Formula 3]




[Formula 4]




[Formula 6]



[Formula 8]



[Formula 9]



ahol A^1 , A^2 , A^3 , B^1 , B^2 , R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , R^5 , R^6 , R^7 , p és X jelentése az 1. igénypontban megadott; Y jelentése Cl vagy Br ; és Q jelentése $-B(OH)_2$ vagy

