

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2021-532157

(P2021-532157A)

(43) 公表日 令和3年11月25日 (2021.11.25)



(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 0 7 D 487/10 (2006.01)	C 0 7 D 487/10	C S P 4 C 0 5 0
A 6 1 P 35/00 (2006.01)	A 6 1 P 35/00	4 C 0 7 2
A 6 1 P 35/02 (2006.01)	A 6 1 P 35/02	4 C 0 8 6
A 6 1 P 35/04 (2006.01)	A 6 1 P 35/04	
A 6 1 K 31/506 (2006.01)	A 6 1 K 31/506	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 190 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2021-505198 (P2021-505198)	(71) 出願人	515251713
(86) (22) 出願日	令和1年8月1日 (2019.8.1)		アラクセス ファーマ エルエルシー
(85) 翻訳文提出日	令和3年3月24日 (2021.3.24)		アメリカ合衆国 カリフォルニア 921
(86) 国際出願番号	PCT/US2019/044729		21, サンディエゴ, サイエンス パ
(87) 国際公開番号	W02020/028706		ーク ロード 3033, スイート 2
(87) 国際公開日	令和2年2月6日 (2020.2.6)		20
(31) 優先権主張番号	62/713, 371	(74) 代理人	100078282
(32) 優先日	平成30年8月1日 (2018.8.1)		弁理士 山本 秀策
(33) 優先権主張国・地域又は機関	米国 (US)	(74) 代理人	100113413
(31) 優先権主張番号	62/713, 298		弁理士 森下 夏樹
(32) 優先日	平成30年8月1日 (2018.8.1)	(74) 代理人	100181674
(33) 優先権主張国・地域又は機関	米国 (US)		弁理士 飯田 貴敏
		(74) 代理人	100181641
			弁理士 石川 大輔
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 がんを処置するための複素環式スピロ化合物およびその使用方法

(57) 【要約】

G12C変異体KRASタンパク質のインヒビターとしての活性を有する化合物を提供する。化合物は、以下の構造 (I) (式中、 R^1 、 L^1 、 L^2 、 L^3 、 A^1 、 A^2 、 A^3 、 A^4 、 G^1 、 G^2 、 E 、 W 、 X 、 Y 、 Z 、 m および n は、本明細書中で定義の通りである) またはその薬学的に許容され得る塩、立体異性体、同位体形態もしくはプロドラッグを有する。かかる化合物、かかる化合物を含む薬学的組成物の調製および使用に関連する方法、ならびにがんなどの障害の処置のためのG12C変異体KRASタンパク質の活性を調整する方法も提供する。




【特許請求の範囲】

【請求項 1】

以下の構造 (I) :

【化 5 9】



(I)

(式中、

【化 6 0】



は、芳香環を示し；

A¹、A²、A³ および A⁴ は、各出現において独立して、CR^{4 a}R^{4 b} または NR⁵ であり；

X、Y および Z は、それぞれ独立して、N、CR^{3 a} または NR^{3 b} であり、但し、X、Y および Z のうちの少なくとも 1 つの少なくとも 1 つは、N または NR^{3 b} であり；

W は、CR² または N であり；

G¹ および G² は、それぞれ独立して、CR' または N であり、但し、A¹ および A² のうちの少なくとも 1 つが NR⁵ である場合、G¹ は CR' であり、A³ および A⁴ のうちの少なくとも 1 つが NR⁵ である場合、G² は CR' であり；

L¹ は、結合または -NR⁵- であり；

L² は、結合または C₁ ~ C₆ アルキレンであり；

L³ は、結合、アルケニレン、シクロアルキレン、アルキニレン、CR^{4 a}R^{4 b}、-S-、-O-、C(=O)、-S(O)₂、-S(O)-、-C(=O)NR⁵、-S(O)₂NR⁵、-NR⁵C(=O)NR⁵、-NR⁵S(O)₂NR⁵ または -NR⁵- であり；

R' は、H、C₁ ~ C₆ アルキル、C₂ ~ C₆ アルケニル、C ~ C₆ アルキニル、C₁ ~ C₆ ヒドロキシアルキル、C₁ ~ C₆ シアノアルキル、C₁ ~ C₆ ハロアルキル；C₃ ~ C₈ シクロアルキルアルキルであり；

R¹ は、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクリルまたはヘテロアリールであり；

R² は、H、シアノ、ヒドロキシ、ハロ、C₁ ~ C₆ アルキル、C₂ ~ C₆ アルケニル、C₂ ~ C₆ アルキニル、C₁ ~ C₆ ヒドロキシアルキル、C₁ ~ C₆ シアノアルキル、C₁ ~ C₆ アルコキシ、C₁ ~ C₆ ハロアルコキシ、C₁ ~ C₆ ハロアルキル、アミノアルキル、アルキルアミノ、アミノカルボニル、C₃ ~ C₈ シクロアルキル、C₃ ~ C₈ ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、アリールまたはヘテロアリールであり；

R^{3 a} は、H、シアノ、アミノ、オキソ、アルキル、シクロアルキル、ハロアルキル、アルキニル、アルケニル、アミノカルボニル、アミノカルボニルアルコキシ、アミノスルホニル、アルキルスルホニルアミノ、アルキルカルボニル、アミノアルキルカルボニル、シクロアルキルカルボニル、ヘテロシクリルカルボニル、ヘテロシクリルカルボニルアルコキシ、アルキルスルホニル、アミノアルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、ヘテロシクリルスルホニル、アルキルチオエーテル、アミノアルキルチオエーテル、シクロアルキルチオエーテル、ヘテロシクリルチオエーテル、アミノアルキル

10

20

30

40

50

、アミノアルキル、アミノアルキルアミノ、アミノアルコキシ、アルキルカルボニルアミノ、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアミノ、ヘテロシクリルオキシ、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロシクリルアルキルアミノ、ヘテロシクリルアルコキシ、ヘテロシクリルカルボニルアミノ、アリール、アリールアルキル、アリールアルキルアミノ、アリールアルコキシ、アリールアルキルアミノ、アリールアルコキシ、アリールカルボニルアミノ、ヘテロアリール、ヘテロアリールアミノ、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアルキル、ヘテロアリールアルキルアミノ、ヘテロアリールアルコキシ、ヘテロアリールカルボニルアミノであり；

R^{3b} は、H、シアノ、アルキル、シクロアルキル、ハロアルキル、アルキニル、アルケニル、アミノカルボニル、アミノスルホニル、アルキルカルボニル、アミノアルキルカルボニル、シクロアルキルカルボニル、ヘテロシクリルカルボニル、アルキルスルホニル、アミノアルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、ヘテロシクリルスルホニル、アルキルチオエーテル、アミノアルキルチオエーテル、シクロアルキルチオエーテル、ヘテロシクリルチオエーテル、アミノアルキル、アミノアルキニル、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；

R^{4a} および R^{4b} は、各出現において独立して、H、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-CO_2H$ 、ハロ、シアノ、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_2 \sim C_6$ アルケニル、 $C_2 \sim C_6$ アルキニル、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ ヒドロキシルアルキル、アルコシアルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、 $C_1 \sim C_6$ シアノアルキル、 $C_1 \sim C_6$ カルボキシアルキル、アミノカルボニルアルキルまたはアミノカルボニルであるか、または R^{4a} および R^{4b} は、同じ炭素に結合している場合、接合して、オキソまたは炭素環式環もしくは複素環式環を形成するか、または R^{4a} および R^{4b} は、異なる炭素に結合している場合、接合して、炭素環式環または複素環式環を形成し；

R^5 は、各出現において独立して、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_2 \sim C_6$ アルケニル、 $C_2 \sim C_6$ アルキニル、 $C_1 \sim C_6$ ヒドロキシルアルキル、 $C_1 \sim C_6$ シアノアルキル、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル； $C_3 \sim C_8$ シクロアルキルアルキルであり；

m は、1、2 または 3 であり；

n は、1 または 2 であり；


E は、求電子部分である）

を有する化合物またはその薬学的に許容され得る塩、同位体形態、立体異性体もしくはプロドラッグ。

【請求項 2】

以下の構造 (Ia)、(Ib)、(Ic) または (Id)：

【化 61】




のうちの 1 つを有する、請求項 1 に記載の化合物。


【請求項 3】

以下の構造 (I' a)、(I' b)、(I' c) または (I' d) :

【化 6 2】



【化 6 3】



(式中、

【化 6 4】

≡

は、二重結合または三重結合を表し；

Q は、 $-\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{C}(=\text{NR}^8)-$ 、 $-\text{NR}^8\text{C}(=\text{O})-$ 、 $-\text{S}(=\text{O})_2-$ または $-\text{NR}^8\text{S}(=\text{O})_2-$ であり；

R^8 は、H、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_6$ アルキル、ヒドロキシアルキル、アミノアルキル、アルコキシアルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキル、アミノカルボニルアルキル、 $\text{C}_3 \sim \text{C}_8$ シクロアルキルまたはヘテロシクリルアルキルであり；

$\text{R}^{8'}$ は、H、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{CN}$ または $\text{C}_1 \sim \text{C}_6$ アルキルであり；

【化 6 5】

≡

が二重結合である場合、 R^9 および R^{10} は、それぞれ独立して、H、ハロ、シアノ、カルボキシ、 $\text{C}_1 \sim \text{C}_6$ アルキル、アルコキシカルボニル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、アリール、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロアリールまたはヒドロキシアルキルであるか、または R^9 と R^{10} とは、接合して、炭素環式環、複素環式環またはヘテロアリール環を形成し；

10

20

30

40

50

【化 6 6】

≡

が三重結合である場合、 R^9 は存在せず、 R^{10} は、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキルまたはヒドロキシアルキルであり、
 ここで、アルキル、ヒドロキシアルキル、アミノアルキル、アルコキシアルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキル、アミノカルボニルアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクリルアルキル、アルコキシカルボニル、ヘテロアリールならびに炭素環式環、複素環式環およびヘテロアリール環の各出現は、特に指定がない限り、1つまたはそれを超える置換基で必要に応じて置換される) 10
 のうちの1つを有する、請求項2に記載の化合物。

【請求項4】

R' が H であり、 m が2であり、 X 、 Y および Z のうちの少なくとも1つの出現が CR^3_a (式中、 R^3_a は H ではない)であるか、または X 、 Y および Z のうちの少なくとも1つの出現が NR^3_b (式中、 R^3_b は H ではない)である、請求項1～3のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項5】

X が N であり、 Y が CR^3_a であり、 Z が CR^3_a である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項6】

X が CR^3_a であり、 Y が CR^3_a であり、 Z が N である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項7】

X が CR^3_a であり、 Y が N であり、 Z が CR^3_a である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項8】

X が N であり、 Y が CR^3_a であり、 Z が N である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項9】

X が N であり、 Y が N であり、 Z が CR^3_a である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項10】

X が CR^3_a であり、 Y が N であり、 Z が N である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項11】

X が NR^3_b であり、 Y が CR^3_a であり、 Z が N である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項12】

X が N であり、 Y が CR^3_a であり、 Z が NR^3_b である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項13】

X が CR^3_a であり、 Y が NR^3_b であり、 Z が N である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項14】

X が CR^3_a であり、 Y が NR^3_b であり、 Z が CR^3_a である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項15】

X が NR^3_b であり、 Y が CR^3_a であり、 Z が CR^3_a である、請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項16】

10

20

30

40

50

R' が H であり、m が 2 であり、X、Y および Z が、それぞれ独立して、CH または N であり、但し、X、Y および Z のうちの少なくとも 1 つの少なくとも 1 つが N である、請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 17】

X が N であり、Y が CH であり、Z が CH である、請求項 16 に記載の化合物。

【請求項 18】

X が CH であり、Y が N であり、Z が CH である、請求項 16 に記載の化合物。

【請求項 19】

X が CH であり、Y が CH であり、Z が N である、請求項 16 に記載の化合物。

【請求項 20】

X が N であり、Y が N であり、Z が CH である、請求項 16 に記載の化合物。

【請求項 21】

X が N であり、Y が CH であり、Z が N である、請求項 16 に記載の化合物。

【請求項 22】

X が CH であり、Y が N であり、Z が N である、請求項 16 に記載の化合物。

【請求項 23】

X が N であり、Y が N であり、Z が N である、請求項 16 に記載の化合物。

【請求項 24】

W が CR^2 である、請求項 1 ～ 23 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 25】

W が N である、請求項 1 ～ 23 のいずれか 1 項に記載の化合物。


【請求項 26】

以下の構造 (I a 1)、(I a 2)、(I a 3)、(I a 4)、(I a 5)、(I a 6) または (I a 7)：


10

20


【化 6 7】



10



20



30


のうちの1つを有する、請求項1～15、24または25のいずれか1項に記載の化合物。

40

【請求項27】

以下の構造 (Ib1)、(Ib2)、(Ib3)、(Ib4)、(Ib5)、(Ib6) または (Ib7) :

【化 6 8】



10

20




30

のうちの1つを有する、請求項1～15、24または25のいずれか1項に記載の化合物。




【請求項28】

以下の構造 (Ic1)、(Ic2)、(Ic3)、(Ic4)、(Ic5)、(Ic6) または (Ic7) :


【化 6 9】



10



20



30


のうちの1つを有する、請求項1～15、24または25のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項29】

以下の構造 (Id1)、(Id2)、(Id3)、(Id4)、(Id5)、(Id6) または (Id7) :

40

【化 7 0】



10

20


30

のうちの 1 つを有する、請求項 1 ～ 1 5、2 4 または 2 5 のいずれか 1 項に記載の化合物。


【請求項 3 0】

以下の構造 (I e 1)、(I e 2)、(I e 3)、(I e 4)、(I e 5)、(I e 6) または (I e 7)：


【化 7 1】



10



20



30


のうちの 1 つを有する、請求項 16～25 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 31】

以下の構造 (If1)、(If2)、(If3)、(If4)、(If5)、(If6) または (If7)：

40

【化 7 2】



のうちの1つを有する、請求項16～25のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項32】


以下の構造 (I g 1)、(I g 2)、(I g 3)、(I g 4)、(I g 5)、(I g 6) または (I g 7) :

10


20

30


【化 7 3】




(Ig1)




(Ig2)




(Ig3)




(Ig4)



(Ig5)



(Ig6)



(Ig7)

のうちの1つを有する、請求項16～25のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項33】


以下の構造 (Ih1)、(Ih2)、(Ih3)、(Ih4)、(Ih5)、(Ih6) または (Ih7)：

10

20

30

【化 7 4】



10

20

30

40

50

のうちの1つを有する、請求項16～25のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項34】

R¹ がアリールである、請求項1～33のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項35】

R¹ がフェニルまたはナフチルである、請求項1～34のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項36】

R¹ が1つまたはそれを超える置換基で置換される、請求項34～35のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項37】

R¹ が、ハロ、アミノ、ヒドロキシル、C₁～C₆ アルキル、シアノ、C₁～C₆ ハロアルキル、C₁～C₆ アルコキシ、アルキルアミノ、シクロアルキル、ヘテロシクリルアルキル、アリール、ヘテロアリール、ホスフェート、ホスホアルコキシ、ボロン酸、ボロン酸エステル、-OC(=O)RもしくはC₁～C₆ アルキルカルボニルオキシまたはそれらの組み合わせで置換され、ここで、Rは、C₁～C₆ アルキルである、請求項36に記載の化合物。


【請求項38】

R¹ が、フルオロ、クロロ、ヒドロキシル、メチル、イソプロピル、シクロプロピル、トリフルオロメチルもしくはメトキシまたはそれらの組み合わせで置換される、請求項37に記載の化合物。


【請求項39】

R¹ が、以下の構造：

【化 7 5】



【化 7 6】



のうちの 1 つを有する、請求項 34～38 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 40】

R¹ がヘテロアリールである、請求項 1～33 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 41】

R¹ が、インダゾリル、インドリル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾトリアゾリル、ピロロピリジルまたはキノリニルである、請求項 40 に記載の化合物。

【請求項 4 2】

R¹ が、1 つまたはそれを超える置換基で置換される、請求項 4 0 ～ 4 1 のいずれか 1 項に記載の化合物。


【請求項 4 3】

R¹ が、シアノ、ニトロ、 $-\text{NH}_2$ 、 $-(\text{C}=\text{O})\text{NH}_2$ 、ヒドロキシル、アルキルヒドロキシ、ハロもしくは C₁ ～ C₆ アルキルまたはそれらの組み合わせで置換される、請求項 4 2 に記載の化合物。

【請求項 4 4】

R¹ が、以下の構造：


【化 7 7】



10

20

【化 7 8】




10

20

30

40

【化 7 9】



10

のうちの 1 つを有する、請求項 40～43 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 45】

20

R¹ がヘテロシクリルである、請求項 1～33 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 46】

R¹ が置換される、請求項 45 に記載の化合物。


【請求項 47】

R¹ が、ヒドロキシル、ヒドロキシルアルキル、オキソおよびアミニルカルボニルから選択される 1 つまたはそれを超える置換基で置換される、請求項 46 に記載の化合物。

【請求項 48】

R¹ が、以下の構造：

【化 8 0】



30

のうちの 1 つを有する、請求項 45～47 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 49】


40

R² が、H、シアノ、ヒドロキシル、ハロ、C₁～C₆ アルキル、C₁～C₆ シアノアルキル、C₁～C₆ アルコキシ、C₁～C₆ ハロアルコキシ、C₁～C₆ ハロアルキル、C₁～C₆ ヒドロキシルアルキル、C₃～C₈ シクロアルキル、アミニルアルキル、アルキルアミニルまたはアミニルカルボニルである、請求項 1～24、26、27、30、31 または 34～48 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 50】

R² が、以下の構造：

【化 8 1】



10

のうちの 1 つを有する、請求項 4 9 に記載の化合物。

【請求項 5 1】

R^2 がシアノである、請求項 5 0 に記載の化合物。

【請求項 5 2】


R^{3a} の少なくとも 1 つの出現が、シアノ、オキソ、ハロアルキル、アミノカルボニル、アミノカルボニルアルコキシ、アミノスルホニル、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルカルボニル、ヘテロシクリルカルボニルアルコキシ、アミノアルキル、アルキルアミノアルコキシ、アミノアルキニル、アミノアルキルアミノヘテロシクリル、アルキルアミノヘテロシクリル、ヘテロシクリルオキシ、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロシクリルアルコキシ、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルコキシまたはヘテロアリールカルボニルアミノである、請求項 1 ~ 2 9 または 3 4 ~ 5 1 のいずれか 1 項に記載の化合物。

20

【請求項 5 3】


R^{3a} の少なくとも 1 つの出現が、以下の構造：

【化 8 2】



30

【化 8 3】



*OCc1ccccc1; *OCc1ccnnc1; *OCc1ccnnc1; *c1ccccc1F; *c1ccncc1; *OCc1ccncc1C;
*OCc1cc(C(F)(F)F)cn1; *OCc1cc(C(F)(F)F)cn1; *OCc1cc(C(F)(F)F)cn1; *OCc1cc(C(F)(F)F)ccc1;
*OCc1ccc(C(F)(F)F)cc1; *N1CCCCC1c2ccccc2; *N1CCOC1Cc2ccccc2; *N1CCCCC1O; *N1CCOC1; *N1CCCCC1N(C)C;
*N1CCCCC1N(C)C; *N1CCCCC1CN(C)C; または *N1Cc2ccccc21

20


 または

50

Qが $-C(=O)-$ である、請求項3～61のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項63】

Qが $-S(=O)_2-$ である、請求項3～61のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項64】

Qが $-NR^8C(=O)-$ である、請求項3～61のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項65】


Qが $-NR^8S(=O)_2-$ である、請求項3～61のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項66】

Eが、以下の構造：


【化86】

10



20

【化87】



30


40

のうちの1つを有する、請求項1～65のいずれか1項に記載の化合物。

【請求項67】

Eが

【化88】




である、請求項66に記載の化合物。

【請求項68】

50

E が

【化 8 9】



である、請求項 1 ～ 6 5 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 6 9】

L¹ が結合である、請求項 1 ～ 6 8 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 7 0】


10

L² が結合である、請求項 1 ～ 6 9 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 7 1】

L³ が、以下の構造：

【化 9 0】



20

のうちの 1 つを有する、請求項 1 ～ 7 0 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 7 2】

L³ が $-NR^5-$ である、請求項 1 ～ 7 0 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 7 3】

R⁵ が H である、請求項 7 1 または 7 2 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 7 4】

R⁵ がメチルである、請求項 7 1 または 7 2 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 7 5】

L³ が結合である、請求項 1 ～ 7 0 のいずれか 1 項に記載の化合物。

30

【請求項 7 6】

L³ が $-O-$ である、請求項 1 ～ 7 0 のいずれか 1 項に記載の化合物。

【請求項 7 7】

表 1 中の化合物から選択される、請求項 1 に記載の化合物。

【請求項 7 8】

請求項 1 ～ 7 7 のいずれか 1 項に記載の実質的に精製されたアトロプ異性体。

【請求項 7 9】

請求項 1 ～ 7 8 のいずれか 1 項に記載の化合物および薬学的に許容され得るキャリアを含む、薬学的組成物。

【請求項 8 0】

40

がんを処置するための方法であって、有効量の請求項 7 9 に記載の薬学的組成物をがんの処置を必要とする被験体に投与する工程を含む、方法。

【請求項 8 1】

前記がんが、KRAS G12C、HRAS G12C または NRAS G12C 変異によって媒介される、請求項 8 0 に記載の方法。

【請求項 8 2】

前記がんが、血液がん、膵臓がん、MYH 関連ポリープ、結腸直腸がんまたは肺がんである、請求項 8 0 または 8 1 に記載の方法。

【請求項 8 3】

腫瘍転移を阻害するための方法であって、有効量の請求項 7 9 に記載の薬学的組成物を腫

50

瘍転移の阻害を必要とする被験体に投与する工程を含む、方法。

【請求項 8 4】

がんの処置を必要とする被験体におけるがんを処置するための方法において使用するための、請求項 7 9 に記載の薬学的組成物。

【請求項 8 5】

前記がんが、K R A S G 1 2 C、H R A S G 1 2 C または N R A S G 1 2 C 変異によって媒介される、請求項 8 4 に記載の薬学的組成物。

【請求項 8 6】

前記がんが、血液がん、膵臓がん、M Y H 関連ポリープ、結腸直腸がんまたは肺がんである、請求項 8 4 または 8 5 に記載の薬学的組成物。

10

【請求項 8 7】

E が、標的タンパク質のシステイン残基と共有結合を形成することができる求電子部分である、請求項 1 または 2 に記載の化合物。

【請求項 8 8】

E が、K R A S、H R A S または N R A S G 1 2 C 変異体タンパク質の 1 2 位でシステイン残基と共有結合を形成することができる求電子部分である、請求項 8 7 に記載の化合物。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

20

背景

技術分野

本発明の実施形態は、一般に、新規の化合物およびその調製方法、ならびに例えばがんの処置のための治療薬または予防薬としての使用に関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

関連技術の説明

R A S は、原形質膜と会合し、G D P または G T P のいずれかと結合する、1 8 9 個のアミノ酸（分子質量 2 1 k D a）の密接に関連した単量体球状タンパク質群を表す。R A S は分子スイッチとして作用する。R A S が結合した G D P を有するときは、休止状態またはオフ側にあり、「不活性」である。一定の成長促進刺激に対する細胞の曝露に応答して、R A S は、結合した G D P を G T P と交換するように誘導される。G T P 結合により、R A S は「スイッチオン」し、他のタンパク質（その「下流標的」）と相互作用し、活性化することができる。R A S タンパク質自体は G T P を加水分解して G D P に戻し、それによって R A S 自体をオフ状態にする内因性の能力は非常に低い。R A S のスイッチオフには、R A S と相互作用して G T P の G D P への変換を非常に促進する G T P アーゼ活性化タンパク質（G A P）と呼ばれる外因性タンパク質が必要である。G A P と相互作用するか G T P を変換して G D P に戻す能力に影響をおよぼす R A S の任意の変異により、そのタンパク質の活性化が延長され、その結果細胞に成長および分裂を継続するように指示するシグナルが延長される。これらのシグナルによって細胞が成長および分裂するので、過度に活動的な R A S シグナル伝達は、最終的にがんを引き起こし得る。

30

40

【0 0 0 3】

構造的に、R A S タンパク質は、R A S の酵素活性（グアニンヌクレオチド結合および加水分解（G T P アーゼ反応））を担う G ドメインを含む。R A S タンパク質はまた、C A A X ボックスとして公知の C 末端伸長領域を含み、この C A A X ボックスは翻訳後修飾することができる、R A S タンパク質の膜へのターゲティングを担う。G ドメインは、サイズがおよそ 2 1 ~ 2 5 k D a であり、リン酸結合ループ（P - l o o p）を含む。P - l o o p は、R A S タンパク質中のヌクレオチドが結合するポケットを示し、ヌクレオチド結合および加水分解に不可欠な保存アミノ酸残基（グリシン 1 2、トレオニン 2 6、およびリジン 1 6）を有する上記ドメインの固定部分である。G ドメインはまた、いわゆるス

50

スイッチ I 領域（残基 30～40）およびスイッチ II 領域（残基 60～76）を含み、これらの領域は共に休止状態と負荷状態とをスイッチする能力のためにしばしば「スプリング負荷」機構と表されるタンパク質の動的部分である。重要な相互作用は、スイッチ 1 領域およびスイッチ 2 領域をそれぞれその活性な高次構造に維持する、トレオニン-35 およびグリシン-60 と GTP の γ -リン酸とによって形成される水素結合である。GTP の加水分解およびリン酸の放出後、これら 2 つは不活性な GDP 高次構造に弛緩される。

【0004】

RAS サブファミリーの最も顕著なメンバーは、主に多くのがん型に関与する HRAS、KRAS、および NRAS である。しかし、多数の他のメンバー（DIRAS1；DIRAS2；DIRAS3；ERAS；GEM；MRAS；NKIRAS1；NKIRAS2；NRAS；RALA；RALB；RAP1A；RAP1B；RAP2A；RAP2B；RAP2C；RASD1；RASD2；RASL10A；RASL10B；RASL11A；RASL11B；RASL12；REM1；REM2；REERG；REERGL；RRAD；RRAS および RRAS2 が含まれる）が存在する。

10

【0005】

RAS 遺伝子の 3 つの主なイソ型（HRAS、NRAS、または KRAS）のうちのいずれか 1 つの変異は、ヒト腫瘍発生において最も一般的な事象である。全ヒト腫瘍の約 30% が、いくらかの RAS 遺伝子変異を保有することが見出されている。意外なことに、KRAS 変異は 25～30% の腫瘍で検出される。比較すると、NRAS および HRAS ファミリーメンバーで生じる発がん性変異の割合ははるかに低い（それぞれ、8% および 3%）。最も一般的な KRAS 変異は、P-loop 中の残基 G12 および G13 ならびに残基 Q61 で見出される。

20

【0006】

G12C は、KRAS 遺伝子の頻繁な変異である（グリシン-12 からシステインへの変異）。この変異は、約 13% のがん、約 43% の肺がん、およびほぼ 100% の MYH 関連ポリポーシス（家族性結腸がん症候群）で見出されている。しかし、小分子を使用したこの遺伝子のターゲティングは困難である。

【0007】

したがって、この分野は進歩しているが、例えば、KRAS、HRAS、または NRAS の阻害によるがん処置のための化合物および方法の改良が当該分野で依然として必要とされている。本発明の実施形態は、この要求を満たし、さらに関連する利点を提供する。

30

【発明の概要】

【0008】

簡単な概要


簡潔に述べれば、本発明の実施形態は、G12C 変異体 KRAS、HRAS、および／または NRAS タンパク質を調整することができる化合物（その薬学的に許容され得る塩、同位体形態、立体異性体またはプロドラッグが含まれる）を提供する。いくつかの例では、本化合物は、KRAS、HRAS、または NRAS G12C 変異体タンパク質の 12 位でシステイン残基と共有結合を形成することができる求電子剤として作用する。がんなどの種々の疾患または状態の処置のためのかかる化合物の使用方法も提供する。

40

【0009】

一実施形態では、以下の構造（I）：

【化 1】



(I)

10

(式中、 R^1 、 L^1 、 L^2 、 L^3 、 A^1 、 A^2 、 A^3 、 A^4 、 G^1 、 G^2 、 E 、 W 、 X 、 Y 、 Z 、 m および n は、本明細書中で定義の通りである)を有する化合物またはその薬学的に許容され得る塩、立体異性体、同位体形態もしくはプロドラッグを提供する。他の種々の実施形態では、1つまたはそれを超える構造(I)の化合物および薬学的に許容され得るキャリアを含む薬学的組成物も提供する。

【0010】

他の実施形態では、本発明は、がんの処置方法であって、有効量の構造(I)の化合物のいずれか1つまたはそれを超えるものを含む薬学的組成物を必要とする被験体に投与する工程を含む、方法を提供する。

20

【0011】

他の提供した方法は、KRAS、HRAS、またはNRAS G12C変異体タンパク質の活性を調節する方法であって、KRAS、HRAS、またはNRAS G12C変異体タンパク質を構造(I)の化合物のうちのいずれか1つと反応させる工程を含む、方法を含む。他の実施形態では、細胞集団の増殖を阻害する方法であって、細胞集団を構造(I)の化合物のうちのいずれか1つと接触させる工程を含む、方法も提供する。

【0012】

他の実施形態では、本発明は、KRAS、HRAS、またはNRASのG12C変異によって媒介される障害の処置を必要とする被験体において該処置を行う方法であって、被験体がKRAS、HRAS、またはNRASのG12C変異を有するかどうかを決定する工程；および被験体がKRAS、HRAS、またはNRASのG12C変異を有すると決定された場合、被験体に治療有効量の1つまたはそれを超える構造(I)の化合物を含む薬学的組成物を投与する工程を含む、方法に関する。

30

【0013】

なおさらなる実施形態では、本発明は、標識されたKRAS、HRAS、またはNRAS G12C変異体タンパク質を調製する方法であって、KRAS、HRAS、またはNRAS G12C変異体を構造(I)の化合物と反応させて標識されたKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cタンパク質を得る工程を含む、方法に関する。

【0014】

本発明のこれらおよび他の態様は、以下の詳細な説明を参照すると明らかになるであろう。

40

【発明を実施するための形態】

【0015】

詳細な説明

以下の説明では、本開示の種々の実施形態の完全な理解を得るために特定の具体的な細目が示される。しかし、当業者は、本開示をこれらの細目を用いることなく実施することができることと理解するであろう。

【0016】

文脈上他の意味に解すべき場合を除き、本明細書および特許請求の範囲を通して、用語

50

「含む (comprise)」およびその変形形態 (「含む (comprises)」および「含む (comprising)」など) は、オープンエンド型、すなわち、「～が含まれるが、これらに限定されない」のような包含の意味と解釈すべきである。

【0017】

本説明において、いずれの濃度の範囲、パーセンテージの範囲、比の範囲または整数の範囲も、記載の範囲内の任意の整数の値、および他の意味を示さない限り、適宜その分数 (例えば、ある整数の10分の1および100分の1) を含むと理解されるべきである。また、任意の物理的特性、例えば、ポリマーのサブユニット、サイズまたは厚さに関する本明細書中に記載の任意の数値範囲は、他の意味を示さない限り、その記載の範囲内の任意の整数を含むと理解されるべきである。本明細書中で使用する場合、用語「約」および「およそ」は、他の意味を示さない限り、示された範囲、値または構造の±20%、±10%、±5%または±1%を意味する。本明細書中で使用する場合、用語「a」および「an」は、「1つまたはそれを超える」列挙される成分をいうことが理解されるべきである。選択肢の使用 (例えば、「または」) は、それらの選択肢のうちの1つ、両方、またはそれらの任意の組み合わせを意味すると理解されるべきである。

【0018】

本明細書を通して、「一実施形態 (one embodiment)」または「ある実施形態 (an embodiment)」への参照は、実施形態と併せて記載した特定の特性、構造、または特徴が本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。したがって、本明細書を通じた種々の箇所において認められる句「一実施形態において (in one embodiment)」または「ある実施形態において (in an embodiment)」は、全てが必ずしも同一の実施形態について言及していない。さらに、特定の特性、構造、または特徴を、任意の適切な様式で1つまたはそれを超える実施形態中で組み合わせることができる。

【0019】

他で定義しない限り、本明細書中で使用される全ての技術用語および科学用語は、本発明が属する当業者によって一般的に理解されているものと同じ意味を有する。文脈上そうでないと明確に示されない限り、本明細書および特許請求の範囲中で使用する場合、単数形「a」、「an」、および「the」には、複数の参照が含まれる。

【0020】

「アミジニル」は、式 $-(C=NR_a)NR_bR_c$ (式中、 R_a 、 R_b 、および R_c は、それぞれ独立して、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルである) のラジカルをいう。

【0021】

「アミノ」は、 $-NH_2$ ラジカルをいう。

【0022】

「アミノスルホン」は、 $-S(O)_2NH_2$ ラジカルをいう。

【0023】

「カルボキシ」または「カルボキシル」は、 $-CO_2H$ ラジカルをいう。

【0024】

「シアノ」は、 $-CN$ ラジカルをいう。

【0025】

「グアニジニル」は、式 $-NR_d(C=NR_a)NR_bR_c$ (式中、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、それぞれ独立して、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルである) のラジカルをいう。

【0026】

「ヒドロキシ」または「ヒドロキシル」は、 $-OH$ ラジカルをいう。

【0027】

「イミノ」は、 $=NH$ 置換基をいう。

【0028】

「ニトロ」は、 $-NO_2$ ラジカルをいう。

【0029】

「オキソ」は、=O置換基をいう。

【0030】

「チオキソ」は、=S置換基をいう。

【0031】

「アルキル」は、炭素原子および水素原子のみからなり、1～12個の炭素原子（ $C_1 \sim C_{12}$ アルキル）、好ましくは1～8個の炭素原子（ $C_1 \sim C_8$ アルキル）、または1～6個の炭素原子（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）を有し、分子の残部が単結合によって結合している飽和の直鎖または分岐鎖の炭化水素鎖ラジカルをいう（例えば、メチル、エチル、 n -プロピル、1-メチルエチル（イソプロピル）、 n -ブチル、 n -ペンチル、1,1-ジメチルエチル（ t -ブチル）、3-メチルヘキシル、2-メチルヘキシルなど）。「アミジニルアルキル」は、少なくとも1つのアミジニル置換基を含むアルキル基をいう。「グアニジニルアルキル」は、少なくとも1つのグアニジニル置換基を含むアルキル基をいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキル、アミジニルアルキル、および／またはグアニジニルアルキル基は、必要に応じて置換される。

10

【0032】

「アルケニル」は、炭素原子および水素原子のみからなり、1つまたはそれを超える炭素-炭素二重結合を含み、2～12個の炭素原子（ $C_2 \sim C_{12}$ アルケニル）、好ましくは2～8個の炭素原子（ $C_2 \sim C_8$ アルケニル）、または2～6個の炭素原子（ $C_2 \sim C_6$ アルケニル）を有し、分子の残部が単結合によって結合している不飽和の直鎖または分岐鎖の炭化水素鎖ラジカルをいう（例えば、エテニル、プロパー1-エニル、ブター1-エニル、ペンター1-エニル、ペンター1,4-ジエニルなど）。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルケニル基は、必要に応じて置換される。

20

【0033】

「アルキニル」は、炭素原子および水素原子のみからなり、1つまたはそれを超える炭素-炭素三重結合を含み、2～12個の炭素原子（ $C_2 \sim C_{12}$ アルキニル）、好ましくは2～8個の炭素原子（ $C_2 \sim C_8$ アルキニル）、または2～6個の炭素原子（ $C_2 \sim C_6$ アルキニル）を有し、分子の残部が単結合によって結合している不飽和の直鎖または分岐鎖の炭化水素鎖ラジカルをいう（例えば、エチニル、プロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニルなど）。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキニル基は、必要に応じて置換される。

30

【0034】

「アルキレン」または「アルキレン鎖」は、炭素および水素のみからなり、飽和または不飽和であり（すなわち、1つもしくはそれを超える二重結合を含む、つまり「アルケニレン」、および／または1つもしくはそれを超える三重結合を含む、つまり「アルキニレン」）、1～12個の炭素原子を有する、分子の残部をラジカル基に連結する直鎖または分岐鎖の2価の炭化水素鎖をいう（例えば、メチレン、エチレン、プロピレン、 n -ブチレン、エテニレン、プロベニレン、 n -ブテニレン、プロビニレン、 n -ブチニレンなど）。アルキレン鎖は、単結合または二重結合を介して分子の残部に結合し、単結合または二重結合を介してラジカル基に結合する。分子の残部およびラジカル基へのアルキレン鎖の結合点は、鎖内の1つの炭素または任意の2つの炭素を介し得る。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキレン鎖は、必要に応じて置換される。

40

【0035】

「アルキルシクロアルキル」は、式- $R_b R_d$ （式中、 R_b は本明細書中に定義のシクロアルキルであり、 R_d は上記定義のアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルシクロアルキル基は必要に応じて置換される。

【0036】

「アルキルカルボニル」は、式- $C(=O)R_a$ （式中、 R_a は、1～12個の炭素原子を含む上記定義のアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に

50

他の意味を示さない限り、アルキルカルボニル基は、必要に応じて置換される。

【0037】

「アルコキシ」は、式 —OR_a （式中、 R_a は、1～12個の炭素原子を含む上記定義のアルキルラジカルである）のラジカルをいう。「アミジニルアルキルオキシ」は、アルキル基上に少なくとも1つのアミジニル置換基を含むアルコキシ基をいう。「グアニジニルアルキルオキシ」は、アルキル基上に少なくとも1つのグアニジニル置換基を含むアルコキシ基をいう。「アルキルカルボニルアミニルアルキルオキシ」は、アルキル基上に少なくとも1つのアルキルカルボニルアミニル置換基を含むアルコキシ基をいう。「ヘテロシクリルアルキルオキシ」は、アルキル基上に少なくとも1つのヘテロシクリル置換基を含むアルコキシ基をいう。「ヘテロアリールアルキルオキシ」は、アルキル基上に少なくとも1つのヘテロアリール置換基を含むアルコキシ基をいう。

10

【0038】

「アミニルアルキルオキシ」または「アミニルアルコキシ」は、アルキル基上に少なくとも1つの式（form） $\text{—NR}_a\text{R}_b$ （式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、Hまたは $C_1\sim C_6$ アルキルである）の置換基を含むアルコキシ基をいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルコキシ、アミジニルアルキルオキシ、グアニジニルアルキルオキシ、アルキルカルボニルアミニルアルキルオキシ、ヘテロシクリルアルキルオキシ、ヘテロアリールアルキルオキシ（heteroarylalkoxy）および／またはアミニルアルキルオキシ基は、必要に応じて置換される。

20

【0039】

「アルコキシアルキル」は、式 $\text{—R}_b\text{OR}_a$ （式中、 R_a は1～12個の炭素原子を含む上記定義のアルキルラジカルであり、 R_b は1～12個の炭素原子を含む上記定義のアルキレンラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルコキシアルキル基は必要に応じて置換される。

【0040】

「アルコキシカルボニル」は、式 —C(=O)OR_a （式中、 R_a は、1～12個の炭素原子を含む上記定義のアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルコキシカルボニル基は、必要に応じて置換される。

【0041】

「アルキルホスホリル」は、式 $\text{—P(=O)(R}_a)$ （式中、各 R_a は、独立して、上記定義のアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルホスホリル基は必要に応じて置換される。

30

【0042】

「アルキルホスホリルアミニル」は、式 $\text{—NR}_b\text{P(=O)(R}_a)$ （式中、各 R_a は、独立して、上記定義のアルキルラジカルであり、 R_b は、Hまたは上記定義のアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルホスホリルアミニル基は必要に応じて置換される。

【0043】

「アリールオキシ」は、式 —OR_a （式中、 R_a は本明細書中に定義のアリールラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アリールオキシ基は必要に応じて置換される。

40

【0044】

「アルキルアミニル」は、式 —NHR_a または $\text{—NR}_a\text{R}_a$ （式中、各 R_a は、独立して、1～12個の炭素原子を含む上記定義のアルキルラジカルである）のラジカルをいう。「ハロアルキルアミニル」基は、アルキル基上に少なくとも1つのハロ置換基を含むアルキルアミニル基である。「ヒドロキシアルキルアミニル」基は、アルキル基上に少なくとも1つのヒドロキシ置換基を含むアルキルアミニル基である。「アミジニルアルキルアミニル」基は、アルキル基上に少なくとも1つのアミジニル置換基を含むアルキルアミニル基である。「グアニジニルアルキルアミニル」基は、アルキル基上に少なくとも1つのグアニジニル置換基を含むアルキルアミニル基である。本明細書中で具体的に他の意

50

味を示さない限り、アルキルアミノ基、ハロアルキルアミノ基、ヒドロキシアルキルアミノ基、アミノアルキルアミノ基、および／またはグアニジンアルキルアミノ基は必要に応じて置換される。

【0045】

「アミノアルキル」は、少なくとも1つのアミノ置換基（ $-NR_aR_b$ 、式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルである）を含むアルキル基をいう。「アミノアルキニル」は、少なくとも1つのアミノ置換基を含むアルキニル基をいう。アミノ置換基は、第三級炭素、第二級炭素、または第一級炭素上に存在し得る。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミノアルキルまたはアミノアルキニル基は、必要に応じて置換される。

10

【0046】

「アミノアルキルアミノ」は、式 $-NR_aR_b$ （式中、 R_a はHまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルであり、 R_b はアミノアルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミノアルキルアミノ基は必要に応じて置換される。

【0047】

「アミノアルキルカルボニル」は、式 $-C(=O)R_aNR_bR_c$ （式中、 R_a は、アルキレンであり、 R_b および R_c は、それぞれ独立して、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミノアルキルカルボニル基は、必要に応じて置換される。

【0048】

「アミノアルコキシ」は、式 $-OR_aNH_2$ （式中、 R_a はアルキレンである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミノアルコキシ基は必要に応じて置換される。

20

【0049】

「アルキルアミノアルコキシ」は、式 $-OR_aNR_bR_c$ （式中、 R_a はアルキレンであり、 R_b および R_c は、それぞれ独立して、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルであり、但し、 R_b または R_c のうちの1つは $C_1 \sim C_6$ アルキルであることを条件とする）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルアミノアルコキシ基は必要に応じて置換される。

【0050】

「アルキルカルボニルアミノ」は、式 $-NH(C=O)R_a$ （式中、 R_a は1～12個の炭素原子を含む上記定義のアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルカルボニルアミノ基は必要に応じて置換される。アルケニルカルボニルアミノは、少なくとも1つの炭素-炭素二重結合を含むアルキルカルボニルアミノである。アルケニルカルボニルアミノ基は必要に応じて置換される。

30

【0051】

「アルキルカルボニルアミノアルコキシ」は、式 $-OR_bNH(C=O)R_a$ （式中、 R_a は1～12個の炭素原子を含む上記定義のアルキルラジカルであり、 R_b はアルキレンである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルカルボニルアミノアルコキシ基は必要に応じて置換される。

40

【0052】

「アルキルアミノアルキル」は、少なくとも1つのアルキルアミノ置換基を含むアルキル基をいう。アルキルアミノ置換基は、第三級炭素、第二級炭素、または第一級炭素上に存在し得る。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルアミノアルキル基は必要に応じて置換される。

【0053】

「アミノカルボニル」は、式 $-C(=O)R_aR_b$ （式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、Hまたはアルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミノカルボニル基は必要に応じて置換される。

50

【0054】

「アルキルアミニルカルボニル」は、式 $-C(=O)NR_aR_b$ （式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、Hまたはアルキルであり、但し、 R_a または R_b のうちの少なくとも1つはアルキルであることを条件とする）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルアミニルカルボニル基は必要に応じて置換される。

【0055】

「アミニルカルボニルアルキル」は、式 $-R_cC(=O)NR_aR_b$ （式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、Hまたはアルキルであり、 R_c はアルキレンである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミニルカルボニルアルキル基は必要に応じて置換される。

10

【0056】

「アミニルカルボニルアルコキシ」は、式 $-OR_cC(=O)NR_aR_b$ （式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、Hまたはアルキルであり、 R_c は、アルキレンである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミニルカルボニルアルコキシ基は、必要に応じて置換される。

【0057】

「アミニルカルボニルシクロアルキル (Aminyl carbonylcycloalkyl)」は、式 $-R_cC(=O)NR_aR_b$ （式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、Hまたはアルキルであり、 R_c は、シクロアルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミニルカルボニルシクロアルキル基は、必要に応じて置換される。

20

【0058】

「アミニスルホニル」は、式 $-S(O)_2NR_aR_b$ （式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、Hまたはアルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミニスルホニル基は、必要に応じて置換される。

【0059】

「アルキルスルホニル」は、式 $-S(O)_2R_a$ （式中、 R_a は、上記定義のアルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルスルホニル基は、必要に応じて置換される。

【0060】

「アルキルスルホニルアミニル」は、式 $-NR_aS(O)_2R_b$ （式中、 R_a は、Hまたはアルキルであり、 R_b は、アルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルスルホニルアミニル基は、必要に応じて置換される。

30

【0061】

「アミニルアルキルスルホニル」は、式 $-S(O)_2R_aNR_bR_c$ （式中、 R_a は、アルキレンであり、 R_b および R_c は、それぞれ独立して、Hまたはアルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミニルアルキルスルホニル基は、必要に応じて置換される。

【0062】

「芳香環」は、同じ一連の原子を有する他の結合配置と比べて増加した安定性を示す共鳴結合の環を有する分子の環状平面部分（すなわち、ラジカル）をいう。一般に、芳香環は、一連の共有結合共平面原子を含み、4の倍数ではない偶数の π 電子（例えば、交互の二重結合および単結合）を含む（すなわち、 $4n+2$ π 電子、 $n=0, 1, 2, 3$ など）。芳香環には、フェニル、ナフテニル、イミダゾリル、ピロリル、ピリジニル、ピリミジニル、ピラジニル、ピリドニル、ピリダジニル、ピリミドニルが含まれるが、これらに限定されない。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、「芳香環」は、必要に応じて置換されている全てのラジカルを含む。

40

【0063】

「アリール」は、6～18個の炭素原子、および少なくとも1つの芳香環を含む炭素環

50

式環系ラジカルをいう。本発明の実施形態の目的のために、アリールラジカルは、単環式環系、二環式環系、三環式環系、または四環式環系であり、この環系は縮合環系または架橋環系を含み得る。アリールラジカルには、アセアントリレン、アセナフチレン、アセフェナントリレン、アントラセン、アズレン、ベンゼン、クリセン、フルオランテン、フルオレン、*a s*ーインダセン、*s*ーインダセン、インダン、インデン、ナフタレン、フェナレン、フェナントレン、プレイアデン、ピレン、およびトリフェニレンから誘導されるアリールラジカルが含まれるが、これらに限定されない。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、用語「アリール」または接頭辞「*a r*ー」（「アラルキル」などの場合）は、必要に応じて置換されたアリールラジカルを含むことを意味する。

【0064】

10

「アリールアルキル」は、式 $-R_b-R_c$ （式中、 R_b は、上記定義のアルキレン鎖であり、 R_c は、1つまたはそれを超える上記定義のアリールラジカル、例えば、ベンジル、ジフェニルメチルなどである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アリールアルキル基は、必要に応じて置換される。

【0065】

「アリールアルキルオキシ」または「アリールアルコキシ」は、式 $-OR_b-R_c$ （式中、 R_b は、上記定義のアルキレン鎖であり、 R_c は、1つまたはそれを超える上記定義のアリールラジカル、例えば、ベンジル、ジフェニルメチルなどである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アリールアルキルオキシ基は、必要に応じて置換される。

20

【0066】

「アリールアルキルアミノ」は、式 $-N(R_a)R_b-R_c$ （式中、 R_a はHまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルであり、 R_b は上記定義のアルキレン鎖であり、 R_c は、1つまたはそれを超える上記定義のアリールラジカル、例えばベンジル、ジフェニルメチルなどである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アリールアルキルアミノ基は必要に応じて置換される。

【0067】

「アリールカルボニルアミノ」は、式 $-N(R_a)R_bC(=O)R_c$ （式中、 R_a は、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルであり、 R_b は、アルキレン鎖または直接の結合であり、 R_c は、1つまたはそれを超える上記定義のアリールラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アリールカルボニルアミノ基は、必要に応じて置換される。

30

【0068】


「ボロン酸」は、 $-B(OH)_2$ 基をいう。

【0069】

「ボロン酸エステル」は、 $-B(OR_a)(OR_b)$ 基（式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、 $C_1 \sim C_6$ アルキルであるか；または R_a と R_b とが一緒に接合して、構造


【化2】

40



（式中、曲線状の結合は、必要に応じて置換されるアルキレン基を表す）の複素環式環を形成する）をいう。ボロン酸エステルの例には、

【化3】



50

が含まれるが、これらに限定されない。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ボロン酸エステル基は、必要に応じて置換される。

【0070】

「カルボキシアルキル」は、式 $-R_b-R_c$ （式中、 R_b は上記定義のアルキレン鎖であり、 R_c は上記定義のカルボキシル基である）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、カルボキシアルキル基は必要に応じて置換される。

【0071】

「シアノアルキル」は、式 $-R_b-R_c$ （式中、 R_b は上記定義のアルキレン鎖であり、 R_c は上記定義のシアノ基である）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、シアノアルキル基は必要に応じて置換される。

10

【0072】

「炭素環式」または「炭素環」は、各環原子が炭素である環系をいう。

【0073】

「シクロアルキル」または「炭素環式環」は、炭素原子および水素原子のみからなり、この環は縮合環系または架橋環系を含むことができ、3～15個の炭素原子を有し、好ましくは3～10個の炭素原子を有し、飽和または不飽和であり、単結合によって分子の残部に結合する安定な非芳香族の単環式または多環式の炭素環式ラジカルをいう。単環式ラジカルには、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、およびシクロオクチルが含まれる。多環式ラジカルには、例えば、アダマンチル、ノルボルニル、デカリニル、および7,7-ジメチルービスシクロ[2.2.1]ヘプタニルなどが含まれる。「シクロアルケニル」は、環内に1つまたはそれを超える炭素-炭素二重結合を含むシクロアルキルである。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、シクロアルキル（またはシクロアルケニル）基は必要に応じて置換される。

20

【0074】

「シクロアルキレン」は、上記定義の2価のシクロアルキル基をいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、シクロアルキレン基は、必要に応じて置換される。

【0075】

「シアノシクロアルキル」は、式 $-R_b-R_c$ （式中、 R_b はシクロアルキルであり、 R_c は上記定義のシアノ基である）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、シアノシクロアルキル基は必要に応じて置換される。

30

【0076】

「シクロアルキルカルボニル」は、式 $-C(=O)R_a$ （式中、 R_a は、上記定義のシクロアルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、シクロアルキルカルボニル基は、必要に応じて置換される。

【0077】

「シクロアルキルスルホニル」は、式 $-S(O)_2R_a$ （式中、 R_a は、上記定義のシクロアルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、シクロアルキルスルホニル基は、必要に応じて置換される。

【0078】

「シクロアルキルアミニルカルボニル」は、式 $-C(=O)NR_aR_b$ （式中、 R_a および R_b は、それぞれ独立して、Hまたはシクロアルキルであり、但し、 R_a または R_b のうちの少なくとも1つはシクロアルキルであることを条件とする）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、n-シクロアルキルアミニルカルボニル基は、必要に応じて置換される。

40

【0079】

「シクロアルキルアルキル」は、式 $-R_bR_d$ （式中、 R_b は上記定義のアルキレン鎖であり、 R_d は上記定義のシクロアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、シクロアルキルアルキル基は必要に応じて置換される。

【0080】

50

「縮合」は、本発明の化合物中の既存の環構造に縮合した本明細書中に記載の任意の環構造をいう。融合環がヘテロシクリル環またはヘテロアリール環である場合、縮合ヘテロシクリル環または縮合ヘテロアリール環の一部となる既存の環構造上の任意の炭素原子が窒素原子で置換される。

【0081】

「ハロ」または「ハロゲン」は、ブロモ、クロロ、フルオロ、またはヨードをいう。

【0082】

「ハロアルキル」は、1つまたはそれを超える上記定義のハロラジカルで置換された上記定義のアルキルラジカルをいう（例えば、トリフルオロメチル、ジフルオロメチル、トリクロロメチル、2, 2, 2-トリフルオロエチル、1, 2-ジフルオロエチル、3-ブロモ-2-フルオロプロピル、および1, 2-ジブロモエチルなど）。「ペルハロアルキル」は、各H原子がハロゲンで置き換えられた、上記定義のアルキルラジカルである。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ハロアルキル基は必要に応じて置換される。

10

【0083】

「ハロアルコキシ」は、式-OR_a（式中、R_aは、1～12個の炭素原子を含む本明細書中に定義のハロアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ハロアルコキシ基は必要に応じて置換される。

【0084】

「ヘテロシクリル」または「複素環式環」は、1～12個の環炭素原子（例えば、2～12個）ならびに窒素、酸素および硫黄からなる群から選択される1～6個の環ヘテロ原子を有する安定な3～18員の非芳香環ラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロシクリルラジカルは、単環式環系、二環式環系、三環式環系、または四環式環系であり、この環系は縮合環系、スピロ環系（「スピロヘテロシクリル」）、および／または架橋環系を含むことができ；ヘテロシクリルラジカル中の窒素原子、炭素原子、または硫黄原子は必要に応じて酸化され；窒素原子は必要に応じて四級化され；ヘテロシクリルラジカルは部分的にまたは完全に飽和している。かかるヘテロシクリルラジカルの例には、3, 4-ジヒドロキノリニル、ジオキサニル、チエニル[1, 3]ジチアニル、デカヒドロイソキノリル、イミダゾリニル、イミダゾリジニル、イソチアゾリジニル、イソオキサゾリジニル、モルホリニル、オクタヒドロインドリル、オクタヒドロイソインドリル、2-オキソピペラジニル、2-オキソピペリジニル、2-オキソピロリジニル、オキサゾリジニル、ピペリジニル、ピペラジニル、4-ピペリドニル、ピロリジニル、ピラゾリジニル、キヌクリジニル、チアゾリジニル、テトラヒドロフリル、トリチアニル、テトラヒドロピラニル、チオモルホリニル、チアモルホリニル、1-オキソチオモルホリニル、1, 2, 3, 4-テトラヒドロキノリニルおよび1, 1-ジオキソチオモルホリニルが含まれるが、これらに限定されない。「ヘテロシクリルオキシ」は、酸素結合（-O-）を介して分子の残部に結合したヘテロシクリル基をいう。「ヘテロシクリルアミニル」は、窒素結合（-NR_a-（式中、R_aはHまたはC₁～C₆アルキルである））を介して分子の残部に結合したヘテロシクリル基をいう。「ヘテロシクリルカルボニル」は、カルボニル炭素（-C(=O)-）を介して分子の残部に結合したヘテロシクリル基をいう。「ヘテロシクリルスルホニル」は、スルホニル基（-S(O)₂-）を介して分子の残部に結合したヘテロシクリル基をいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルオキシおよび／またはヘテロシクリルアミニル基は、必要に応じて置換される。

20

30

40

【0085】

「N-ヘテロシクリル」は、少なくとも1つの窒素を含み、ヘテロシクリルラジカルの分子の残部への結合点がヘテロシクリルラジカル中の窒素原子を介する上記定義のヘテロシクリルラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、N-ヘテロシクリル基は必要に応じて置換される。

【0086】

50

「ヘテロシクリレン」は、上記定義の二価ヘテロシクリル基をいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロシクリレン基は必要に応じて置換される。

【0087】

「アミノヘテロシクリレン」は、式 $-N(R_a)R_b-$ （式中、 R_a は、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルであり、 R_b は、上記定義のヘテロシクリレンである）の二価ラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミノヘテロシクリレン基は必要に応じて置換される。

【0088】

「アルキルヘテロシクリレン」は、式 $-R_aR_b-$ （式中、 R_a は、アルキレンであり、 R_b は、上記定義のヘテロシクリレンである）の二価ラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アルキルヘテロシクリレン基は必要に応じて置換される。

10

【0089】

「ヘテロアルキルヘテロシクリレン」は、式 $-R_aR_b-$ （式中、 R_a は、ヘテロアルキレンであり、 R_b は、上記定義のヘテロシクリレンである）の二価ラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロアルキルヘテロシクリレン基は必要に応じて置換される。

【0090】

「ヘテロシクリルアルキル」または「ヘテロシクロアルキル」は、式 $-R_bR_e$ （式中、 R_b は、上記定義のアルキレン鎖であり、 R_e は、上記定義のヘテロシクリルラジカルであり、ヘテロシクリルが窒素含有ヘテロシクリルである場合、ヘテロシクリルの窒素原子がアルキレン鎖に必要に応じて結合する）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロシクリルアルキルまたはヘテロシクロアルキル基は、必要に応じて置換される。

20

【0091】

「ヘテロシクリルアルキルオキシ」は、式 $-OR_bR_e$ （式中、 R_b は上記定義のアルキレン鎖であり、 R_e は上記定義のヘテロシクリルラジカルであり、ヘテロシクリルが窒素含有ヘテロシクリルである場合、ヘテロシクリルの窒素原子がアルキルラジカルに必要に応じて結合する）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロシクリルアルキルオキシ基は必要に応じて置換される。

30

【0092】

「ヘテロシクリルカルボニルアルコキシ」は、式 $-OR_b-C(=O)-R_e$ （式中、 R_b は、上記定義のアルキレン鎖であり、 R_e は、上記定義のヘテロシクリルラジカルであり、ヘテロシクリルが窒素含有ヘテロシクリルである場合、ヘテロシクリルの窒素原子がアルキレン鎖に必要に応じて結合する）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロシクリルカルボニルアルコキシ基は、必要に応じて置換される。

【0093】

「ヘテロシクリルアルキルアミノ」は、式 $-N(R_c)R_bR_e$ （式中、 R_b は、上記定義のアルキレン鎖であり、 R_e は、上記定義のヘテロシクリルラジカルであり、ヘテロシクリルが窒素含有ヘテロシクリルである場合、ヘテロシクリルの窒素原子がアルキルラジカルに必要に応じて結合し、 R_c は、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロシクリルアルキルアミノ基は、必要に応じて置換される。

40

【0094】

「ヘテロシクリルカルボニルアミノ」は、式 $-N(R_a)R_b(C=O)R_c$ （式中、 R_a は、Hまたはアルキルであり、 R_b は、アルキレン鎖または直接の結合であり、 R_c は、上記定義のヘテロシクリルラジカルであり、ヘテロシクリルが窒素含有ヘテロシクリルである場合、ヘテロシクリルの窒素原子がカルボニル基に必要に応じて結合する）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロシクリルカルボ

50

ニルアミニル基は、必要に応じて置換される。

【0095】

「ヘテロアリール」は、水素原子、1～13個の環炭素原子、1～6個の窒素、酸素、および硫黄からなる群から選択される環ヘテロ原子、およびヘテロ原子を含む少なくとも1つの芳香環を含む5～14員の環系ラジカルをいう。本発明の実施形態の目的のために、ヘテロアリールラジカルは、単環式環系、二環式環系、三環式環系、または四環式環系であってよく、この環系は縮合環系または架橋環系を含むことができ；ヘテロアリールラジカル中の窒素原子、炭素原子、または硫黄原子は必要に応じて酸化されていてよく；窒素原子は必要に応じて四級化されていてよい。例には、アゼピニル、アクリジニル、ベンゾイミダゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾインドリル、ベンゾジオキサソリル、ベンゾフラニル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾチアジアゾリル、ベンゾ[1,4]ジオキセピニル、1,4-ベンゾジオキサニル、ベンゾナフトフラニル、ベンゾオキサゾリル、ベンゾジオキサソリル、ベンゾジオキシニル、ベンゾピラニル、ベンゾピラノニル、ベンゾフラニル、ベンゾフラノニル、ベンゾチエニル（ベンゾチオフエニル）、ベンゾトリアゾリル、ベンゾ[4,6]イミダゾ[1,2-a]ピリジニル、カルバゾリル、シンノリニル、ジベンゾフラニル、ジベンゾチオフエニル、フラニル、フラノニル、イソチアゾリル、イミダゾリル、インダゾリル、インドリル、インダゾリル、イソインドリル、インドリニル、イソインドリニル、イソキノリル、インドリジニル、イソオキサゾリル、ナフチリジニル、オキサジアゾリル、2-オキソアゼピニル、オキサゾリル、オキシラニル、1-オキシドピリジニル、1-オキシドピリミジニル、1-オキシドピラジニル、1-オキシドピリダジニル、1-フェニル-1H-ピロリル、フェナジニル、フェノチアジニル、フェノキサジニル、フタラジニル、プテリジニル、プリニル、ピロリル、ピラゾリル、ピリジニル、ピラジニル、ピリミジニル、ピリダジニル、キナゾリニル、キノキサリニル、キノリニル、キヌクリジニル、イソキノリニル、テトラヒドロキノリニル、チアゾリル、チアジアゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、トリアジニル、およびチオフエニル（すなわち、チエニル）が含まれるが、これらに限定されない。「ヘテロアリールオキシ」は、酸素結合（-O-）を介して分子の残部に結合したヘテロアリール基をいう。「ヘテロアリールアミニル」は、窒素結合（-NR_a-（式中、R_aはHまたはC₁～C₆アルキルである））を介して分子の残部に結合したヘテロアリール基をいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロアリール基、ヘテロアリールオキシ基、および／またはヘテロアリールアミニル基は必要に応じて置換される。

【0096】

「N-ヘテロアリール」は、少なくとも1つの窒素を含み、ヘテロアリールラジカル分子の残部への結合点がヘテロアリールラジカル中の窒素原子を介する上記定義のヘテロアリールラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、N-ヘテロアリール基は必要に応じて置換される。

【0097】

「ヘテロアリールアルキル」は、式-R_bR_f（式中、R_bは上記定義のアルキレン鎖であり、R_fは上記定義のヘテロアリールラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロアリールアルキル基は必要に応じて置換される。

【0098】

「ヘテロアリールアミニル」は、式-N(R_a)R_f（式中、R_aは、Hまたは上記定義のアルキルであり、R_fは、上記定義のヘテロアリールラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロアリールアミニル基は、必要に応じて置換される。

【0099】

「ヘテロアリールオキシ」は、式-OR_f（式中、R_fは、上記定義のヘテロアリールラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロアリールオキシ基は、必要に応じて置換される。

【0100】

「ヘテロアリールアルキルオキシ」または「ヘテロアリールアルコキシ」は、式 $-OR_bR_f$ （式中、 R_b は、上記定義のアルキレン鎖であり、 R_f は、上記定義のヘテロアリールラジカルであり、ヘテロアリールが窒素含有ヘテロアリールである場合、ヘテロアリールの窒素原子がアルキレン鎖に必要に応じて結合する）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロアリールアルキルオキシまたはヘテロアリールアルコキシ基は、必要に応じて置換される。

【0101】

「ヘテロアリールアルキルアミニル」は、式 $-NR_cR_bR_f$ （式中、 R_b は、上記定義のアルキレン鎖であり、 R_f は、上記定義のヘテロアリールラジカルであり、ヘテロアリールが窒素含有ヘテロアリールである場合、ヘテロアリールの窒素原子がアルキレン鎖に必要に応じて結合し、 R_c は、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロアリールアルキルアミニル基は、必要に応じて置換される。

10

【0102】

「ヘテロアリールカルボニルアミニル」は、式 $-NR_cR_b(C=O)R_f$ （式中、 R_b は、上記定義のアルキレン鎖または直接の結合であり、 R_f は、上記定義のヘテロアリールラジカルであり、ヘテロアリールが窒素含有ヘテロアリールである場合、ヘテロアリールの窒素原子がカルボニル基に必要に応じて結合し、 R_c は、Hまたは $C_1 \sim C_6$ アルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロアリールカルボニルアミニル基は、必要に応じて置換される。

20

【0103】

「ヒドロキシルアルキル」は、少なくとも1つのヒドロキシル置換基を含むアルキル基をいう。 $-OH$ 置換基は、第一級炭素、第二級炭素、または第三級炭素上に存在し得る。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヒドロキシルアルキル基は必要に応じて置換される。

【0104】

「ヒドロキシルアルキルアミニル」は、第一級炭素、第二級炭素、または第三級炭素上に存在する少なくとも1つの $-OH$ 置換基を含むアルキルアミニル基である。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヒドロキシルアルキルアミニル基は必要に応じて置換される。

30

【0105】

「ホスフェート」は、 $-OP(=O)(R_a)R_b$ 基（式中、 R_a は、 OH 、 O^- 、または OR_c であり、 R_b は、 OH 、 O^- 、 OR_c 、またはさらなるホスフェート基（例えば、ジホスフェートまたはトリホスフェートを形成する）であり、 R_c は、対イオン（例えば、 Na^+ など）である）をいう。

【0106】

「ホスホアルコキシ」は、本明細書中に定義の少なくとも1つのホスフェート基で置換された本明細書中に定義のアルコキシ基をいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ホスホアルコキシ基は必要に応じて置換される。

40

【0107】

「チオアルキル」または「アルキルチオエーテル」は、式 $-SR_a$ （式中、 R_a は、1～12個の炭素原子を含む上記定義のアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、チオアルキルまたはアルキルチオエーテル基は、必要に応じて置換される。

【0108】

「アミニルアルキルチオエーテル」は、式 $-SR_aNR_bR_c$ （式中、 R_a は、アルキレンであり、 R_b および R_c は、それぞれ独立して、Hまたはアルキルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、アミニルアルキルチオエーテル基は、必要に応じて置換される。

50

【0109】

「シクロアルキルチオエーテル」は、式 $-SR_a$ （式中、 R_a は、上記定義のシクロアルキルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、シクロアルキルチオエーテル基は、必要に応じて置換される。

【0110】

「ヘテロシクリルチオエーテル」は、式 $-SR_a$ （式中、 R_a は、上記定義のヘテロシクリルラジカルである）のラジカルをいう。本明細書中で具体的に他の意味を示さない限り、ヘテロシクリルチオエーテル基は、必要に応じて置換される。

【0111】

本明細書中で使用する場合、用語「置換」は、少なくとも1つの水素原子（例えば、1つ、2つ、3つ、または全ての水素原子）が非水素原子（ハロゲン原子（F、Cl、BrおよびIなど）；ヒドロキシル基、アルコキシ基およびエステル基などの基中の酸素原子；チオール基、チオアルキル基、スルホン基、スルホニル基およびスルホキシド基などの基中の硫黄原子；アミン、アミド、アルキルアミン、ジアルキルアミン、アリールアミン、アルキルアリールアミン、ジアリールアミン、N-オキシド、イミドおよびエナミンなどの基中の窒素原子；トリアルキルシリル基、ジアルキルアリールシリル基、アルキルジアリールシリル基およびトリアリールシリル基などの基中のケイ素原子；ボロン酸、ボロン酸エステル（boronic acid esters）およびボロン酸エステル（boronic esters）などの基中のホウ素原子；および種々の他の基中の他のヘテロ原子などであるが、これらに限定されない）への結合によって置き換えられている、上記の任意の基（例えば、アルキル、アルキレン、アルキルシクロアルキル、アルコキシ、アルキルホスホリル、アルキルホスホリルアミニル、アミジニルアルキルオキシ、グアニジニルアルキルオキシ、アルキルカルボニルアミニルアルキルオキシ、ヘテロシクリルアルキルオキシ、ヘテロアリールアルキルオキシ、アミニルアルキルオキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニル、ハロアルキルアミニル、ヒドロキシルアルキルアミニル、アミジニルアルキルアミニル、グアニジニルアルキルアミニル、アミニルアルキル、アミニルアルキルアミニル、アミニルアルコキシ、アルキルアミニルアルコキシ、アリールオキシ、アルキルアミニル、アルキルカルボニルアミニル、アルキルアミニルアルキル、アミニルカルボニル、アルキルアミニルカルボニル、アルキルカルボニルアミニルアルコキシ、アミニルカルボニルアルキル、アミニルカルボニルシクロアルキル、チオアルキル、アリール、アラルキル、アリールアルキルオキシ、アリールアルキルアミニル、カルボキシアルキル、シアノアルキル、シクロアルキル、シクロアルキルオキシ、シクロアルキルアミニル、シアノシクロアルキル、シクロアルキルアミニルカルボニル、シクロアルキルアルキル、ハロアルキル、ハロアルコキシ、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルオキシ、ヘテロシクリルアミニル、N-ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロシクリルアルキルオキシ、ヘテロシクリルアルキルアミニル、ヘテロアリール、N-ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、ヘテロアリールアルキルオキシ、ヘテロアリールアルキルアミニル、ヒドロキシルアルキルアミニル、ホスホアルコキシおよび／またはヒドロキシルアルキル）を意味する。「置換」はまた、1つまたはそれを超える水素原子がヘテロ原子（オキシ基、カルボニル基、カルボキシ基およびエステル基中の酸素；ならびにイミン、オキシム、ヒドラゾンおよびニトリルなどの基中の窒素など）へのより高次の結合（例えば、二重結合または三重結合）によって置き換えられている上記基のいずれかを意味する。例えば、「置換」には、1つまたはそれを超える水素原子が、 $-NR_gR_h$ 、 $-NR_gC(=O)R_h$ 、 $-NR_gC(=O)NR_gR_h$ 、 $-NR_gC(=O)OR_h$ 、 $-NR_gSO_2R_h$ 、 $-OC(=O)NR_gR_h$ 、 $-OR_g$ 、 $-SR_g$ 、 $-SOR_g$ 、 $-SO_2R_g$ 、 $-OSO_2R_g$ 、 $-SO_2OR_g$ 、 $=NSO_2R_g$ および $-SO_2NR_gR_h$ で置き換えられている上記基のいずれかが含まれる。「置換」はまた、1つまたはそれを超える水素原子が $-C(=O)R_g$ 、 $-C(=O)OR_g$ 、 $-C(=O)NR_gR_h$ 、 $-CH_2SO_2R_g$ 、 $-CH_2SO_2NR_gR_h$ で置き換えられている上記基のいずれかを意味する。前述では、 R_g および R_h は、同一または異なり、独立して、水素、アルキ

10

20

30

40

50

ル、アルコキシ、アルキルアミノ、チオアルキル、アリール、アラキル、シクロアルキル、シクロアルキルアルキル、ハロアルキル、ヘテロシクリル、N-ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロアリール、N-ヘテロアリールおよび／またはヘテロアリールアルキルである。「置換」は、さらに、1つまたはそれを超える水素原子がアミノ基、シアノ基、ヒドロキシ基、イミノ基、ニトロ基、オキソ基、チオキソ基、ハロ基、アルキル基、アルコキシ基、アルキルアミノ基、チオアルキル基、アリール基、アラキル基、シクロアルキル基、シクロアルキルアルキル基、ハロアルキル基、ヘテロシクリル基、N-ヘテロシクリル基、ヘテロシクリルアルキル基、ヘテロアリール基、N-ヘテロアリール基および／またはヘテロアリールアルキル基への結合によって置き換えられている上記基のいずれかを意味する。さらに、前述の置換基の各々を、1つまたはそれを超える上記置換基で必要に応じて置換することもできる。

10

【0112】

R^1 、 R^2 、 R^{3a} 、 R^{3b} 、 R^{4a} 、 R^{4b} 、 R^5 、 R^8 、 $R^{8'}$ 、 R^9 、 R^{10} 、 L^2 、 L^3 および E の各選択は、具体的に他の意味を示さない限り、全ての原子価が置換によって満たされることを条件として、上記のように必要に応じて置換されると理解される。具体的には、 R^1 、 R^2 、 R^{3a} 、 R^{3b} 、 R^{4a} 、 R^{4b} 、 R^5 、 R^8 、 $R^{8'}$ 、 R^9 、 R^{10} 、 L^2 、 L^3 および E の各選択は、具体的に他の意味を示さない限り、かかる置換が安定な分子をもたらすことを条件として、必要に応じて置換される（例えば、H およびハロなどの基は、必要に応じて置換されない）。

20

【0113】

「求電子剤」または「求電子部分」は、求核剤（例えば、孤立電子対、負電荷、部分的負電荷、および／または過剰な電子を有する部分、例えば、-SH基）と反応することができる任意の部分である。求電子剤は、典型的には、電子不足であるか、電子不足の原子を含む。一定の実施形態では、求電子剤は、正電荷または部分的正電荷を含むか、正電荷または部分的正電荷を含む共鳴構造を有するか、電子の非局在化または分極により1つまたはそれを超える正電荷または部分的正電荷を含む原子が得られる部分である。いくつかの実施形態では、求電子剤は、共役二重結合を含む（例えば、 α 、 β -不飽和カルボニル化合物または α 、 β -不飽和チオカルボニル化合物）。

【0114】

用語「有効量」または「治療有効量」は、意図する適用（以下に定義の疾患処置が含まれるが、これらに限定されない）を達成するのに十分な本明細書中に記載の化合物の量をいう。治療有効量は、意図する処置への適用（*in vivo*）、または処置される被験体および病状（例えば、被験体の体重および年齢、病状の重症度、および投与様式など）に応じて変動してよく、当業者によって容易に決定することができる。本用語は、標的細胞における特定の応答（例えば、血小板接着および／または細胞遊走の低下）を誘導する用量にも適用する。特定の用量は、選択した特定の化合物、従うべき投与レジメン、他の化合物と組み合わせるかどうか、投与のタイミング、投与される組織、および保有される物理的送達系に応じて変動する。

30

【0115】

本明細書中で使用する場合、「処置（*treatment*）」または「処置する（*treating*）」は、疾患、障害、または病状に関して有利または望ましい結果（治療的利点および／または予防的利点が含まれるが、これらに限定されない）を得るためのアプローチをいう。治療的利点は、処置される基礎障害の根絶または改善を意味する。また、治療的利点は、被験体が依然として基礎障害を罹患し得るにもかかわらず、被験体において改善が認められるように基礎障害に関連する1つまたはそれを超える生理学的症状の根絶または改善をもって達成される。一定の実施形態では、予防的利点について、組成物を、疾患が診断されていないかもしれない場合でさえ、特定の疾患を発症するリスクのある被験体または疾患の1つまたはそれを超える生理学的症状が報告されている被験体に投与する。

40

【0116】

50

「治療効果」は、本用語を本明細書中で使用する場合、上記の治療的利点および／または予防的利点を含む。予防効果には、疾患もしくは状態の出現の遅延もしくは除去、疾患もしくは状態の症状の発生の遅延もしくは除去、疾患もしくは状態の進行の遅延、停止、もしくは逆転、またはその任意の組み合わせが含まれる。

【0117】

用語「共投与」、「～と組み合わせた投与」、およびその文法上の等価物は、本明細書中で使用する場合、2つまたはそれを超える薬剤の動物（ヒトが含まれる）への投与であって、両方の薬剤および／またはそれらの代謝産物が同時に被験体内に存在する、投与を含む。共投与には、個別の組成物の共投与、個別の組成物の異なる時間の投与、または両薬剤が存在する組成物での投与が含まれる。

10

【0118】

「薬学的に許容され得る塩」には、酸付加塩および塩基付加塩の両方が含まれる。

【0119】

「薬学的に許容され得る酸付加塩」は、遊離塩基の生物学的有効性および性質が保持され、生物学的またはその他の点で望ましくないわけではなく、無機酸（例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、硝酸、およびリン酸などであるが、これらに限定されない）および有機酸（例えば、酢酸、2,2-ジクロロ酢酸、アジピン酸、アルギン酸、アスコルビン酸、アスパラギン酸、ベンゼンスルホン酸、安息香酸、4-アセトアミド安息香酸、ショウノウ酸、カンファー10-スルホン酸、カプリン酸、カプロン酸、カプリル酸、炭酸、桂皮酸、クエン酸、シクラミン酸、ドデシル硫酸、エタン-1,2-ジスルホン酸、エタンスルホン酸、2-ヒドロキシエタンスルホン酸、ギ酸、フマル酸、ガラクトール酸、ゲンチシン酸、グルコヘプトン酸、グルコン酸、グルクロン酸、グルタミン酸、グルタル酸、2-オキシグルタル酸、グリセロリン酸、グリコール酸、馬尿酸、イソ酪酸、乳酸、ラクトビオン酸、ラウリン酸、マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、マンデル酸、メタンスルホン酸、ムチン酸、ナフタレン-1,5-ジスルホン酸、ナフタレン-2-スルホン酸、1-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸、ニコチン酸、オレイン酸、オロチン酸、シュウ酸、パルミチン酸、パモ酸、プロピオン酸、ピログルタミン酸、ピルビン酸、サリチル酸、4-アミノサリチル酸、セバシン酸、ステアリン酸、コハク酸、酒石酸、チオシアン酸、p-トルエンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、およびウンデシレン酸などであるが、これらに限定されない）を使用して形成される塩をいう。

20

30

【0120】

「薬学的に許容され得る塩基付加塩」は、遊離酸の生物学的有効性および性質が保持され、生物学的またはその他の点で望ましくないわけではない塩をいう。これらの塩を、遊離酸への無機塩基または有機塩基の付加から調製する。無機塩基由来の塩には、ナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩、アンモニウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、鉄塩、亜鉛塩、銅塩、マンガン塩、およびアルミニウム塩などが含まれるが、これらに限定されない。好ましい無機塩は、アンモニウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩、およびマグネシウム塩である。有機塩基由来の塩には、第一級アミン、第二級アミン、および第三級アミン、置換アミン（天然に存在する置換アミンが含まれる）、環状アミン、および塩基性イオン交換樹脂（例えば、アンモニア、イソプロピルアミン、トリメチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、ジエタノールアミン、エタノールアミン、デアノール、2-ジメチルアミノエタノール、2-ジエチルアミノエタノール、ジシクロヘキシルアミン、リジン、アルギニン、ヒスチジン、カフェイン、プロカイン、ヒドラバミン、コリン、ベタイン、ベネタミン、ベンザチン、エチレンジアミン、グルコサミン、メチルグルカミン、テオブロミン、トリエタノールアミン、トロメタミン、プリン、ピペラジン、ペペリジン、N-エチルピペリジン、およびポリアミンの樹脂など）の塩が含まれるが、これらに限定されない。特に好ましい有機塩基は、イソプロピルアミン、ジエチルアミン、エタノールアミン、トリメチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、コリン、およびカフェインである。

40

【0121】

50

いくつかの実施形態では、薬学的に許容され得る塩は、第四級アンモニウム塩、例えば第四級アミンアルキルハロゲン化物塩（例えば、臭化メチル）を含む。

【0122】

用語「アンタゴニスト」および「インヒビター」を互換的に使用し、これらの用語は、標的タンパク質（KRAS、HRAS、またはNRASのG12Cなど）の活性または発現の阻害によって標的タンパク質の生物学的機能を阻害する能力を有する化合物をいう。したがって、用語「アンタゴニスト」および「インヒビター」を、標的タンパク質の生物学的役割の文脈で定義する。本明細書中の好ましいアンタゴニストが標的と特異的に相互作用する（例えば、結合する）一方で、標的タンパク質がメンバーであるシグナル伝達経路の他のメンバーとの相互作用によって標的タンパク質の生物学的活性を阻害する化合物も本定義内に具体的に含まれる。アンタゴニストによって阻害される好ましい生物学的活性は、腫瘍の発生、成長、または拡大に関連する。

10

【0123】

用語「アゴニスト」は、本明細書中で使用する場合、標的タンパク質の活性または発現の阻害によって標的タンパク質の生物学的機能を開始または増強する能力を有する化合物をいう。したがって、用語「アゴニスト」を、標的ポリペプチドの生物学的役割の文脈で定義する。本明細書中の好ましいアゴニストが標的と特異的に相互作用する（例えば、結合する）一方で、標的ポリペプチドがメンバーであるシグナル伝達経路の他のメンバーとの相互作用によって標的ポリペプチドの生物学的活性を開始または増強する化合物も本定義内に具体的に含まれる。

20

【0124】

本明細書中で使用する場合、「薬剤」または「生物学的に活性な薬剤」は、生物学的、薬学的、または化学的な化合物または他の部分をいう。非限定的な例には、単純または複雑な有機分子または無機分子、ペプチド、タンパク質、オリゴヌクレオチド、抗体、抗体誘導体、抗体フラグメント、ビタミン誘導体、炭水化物、毒素、または化学療法化合物が含まれる。種々の化合物（例えば、小分子およびオリゴマー（例えば、オリゴペプチドおよびオリゴヌクレオチド）、および種々のコア構造に基づいた合成有機化合物）を合成することができる。さらに、種々の天然供給源（例えば、植物性または動物性の抽出物など）からスクリーニングのための化合物を得ることができる。

【0125】

「シグナル伝達」は、細胞内応答を誘発するために刺激シグナルまたは阻害シグナルが細胞中または細胞内に伝達される過程である。シグナル伝達経路の調整因子は、同一の特異的シグナル伝達経路にマッピングされる1つまたはそれを超える細胞タンパク質の活性を調整する化合物をいう。調整因子は、シグナル伝達分子の活性を増強する（アゴニスト）または抑制する（アンタゴニスト）ことができる。

30

【0126】

「抗がん剤」、「抗腫瘍剤」、または「化学療法剤」は、新生物性状態の処置で有用な任意の薬剤をいう。1つの抗がん剤クラスは、化学療法薬を含む。「化学療法」は、種々の方法（静脈内、経口、筋肉内、腹腔内、嚢内、皮下、経皮、口内、もしくは吸入、または坐剤の形態が含まれる）によるがん患者への1つまたはそれを超える化学療法薬および/または他の薬剤の投与を意味する。

40

【0127】

用語「細胞増殖」は、分裂の結果として細胞数が変化した現象をいう。本用語はまた、増殖シグナルに一致して細胞の形態が変化した（例えば、サイズが増加した）細胞成長を含む。

【0128】

用語「選択的阻害」または「選択的に阻害する」は、生物学的に活性な薬剤が、オフターゲットのシグナル伝達活性と比較して、標的との直接または間接的な相互作用を介して標的シグナル伝達活性を優先的に低下させるその薬剤の能力をいう。

【0129】

50

「被験体」は、哺乳動物（例えば、ヒト）などの動物をいう。本明細書中に記載の方法は、ヒト治療および動物への応用の両方で有用であり得る。いくつかの実施形態では、被験体は哺乳動物であり、いくつかの実施形態では、被験体はヒトである。

【0130】

「哺乳動物」には、ヒトならびに飼育動物（実験動物および愛玩動物（例えば、ネコ、イヌ、ブタ、ウシ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、ウサギ）など）および非飼育動物（例えば、野生動物など）の両方が含まれる。

【0131】

「放射線療法」は、当業者に公知の日常的な方法および組成物を使用して、被験体を放射線放出体（ α 粒子放出放射性核種（例えば、アクチニウム放射性核種およびトリウム放射性核種）、低線エネルギー付与（LET）放射線放出体（すなわち、 β 放出体）、転換電子放出体（例えば、ストロンチウム-89およびサマリウム-153-EDTMP）など）、または高エネルギー放射線（X線、 γ 線、および中性子が含まれるが、これらに限定されない）に暴露することを意味する。

【0132】

「抗がん剤」、「抗腫瘍剤」、または「化学療法剤」は、新生物性状態の処置で有用な任意の薬剤をいう。1つの抗がん剤クラスは、化学療法剤を含む。「化学療法」は、1つまたはそれを超える化学療法薬および／または他の薬剤を、種々の方法（静脈内、経口、筋肉内、腹腔内、嚢内、皮下、経皮、口内、または吸入、または坐剤の形態が含まれる）によってがん患者に投与することを意味する。

【0133】


「プロドラッグ」は、生理学的条件下または加溶媒分解によって本明細書中に記載の生物学的に活性な化合物（例えば、構造（I）の化合物）に変換することができる化合物を示すことを意味する。したがって、用語「プロドラッグ」は、薬学的に許容され得る生物学的に活性な化合物の前駆体をいう。いくつかの態様では、プロドラッグは、被験体への投与時は不活性であるが、例えば、加水分解によって *in vivo* で活性な化合物に変換される。プロドラッグ化合物は、しばしば、哺乳動物において溶解性、組織適合性、または遅延放出といった利点を付与する（例えば、Bundgard, H., Design of Prodrugs (1985), pp. 7-9, 21-24 (Elsevier, Amsterdam) を参照のこと）。プロドラッグは、Higuchi, T., "Pro-drugs as Novel Delivery Systems," A. C. S. Symposium Series, Vol. 14 および Bioreversible Carriers in Drug Design, ed. Edward B. Roche, American Pharmaceutical Association and Pergamon Press, 1987（その両方が本明細書中で参考として完全に組み込まれる）で考察されている。用語「プロドラッグ」はまた、かかるプロドラッグを哺乳動物被験体に投与した場合に *in vivo* で活性化化合物を放出する任意の共有結合したキャリアが含まれることを意味する。活性化化合物のプロドラッグを、本明細書中に記載されるように、典型的には、日常的な操作または *in vivo* のいずれかにて修飾を切断して親活性化化合物となるような方法で活性化化合物中に存在する官能基を修飾することによって調製する。プロドラッグには、ヒドロキシ基、アミノ基、またはメルカプト基を、活性化化合物のプロドラッグを哺乳動物被験体に投与した場合にこれらの基が切断されて遊離ヒドロキシ基、遊離アミノ基、または遊離メルカプト基をそれぞれ形成する任意の基に結合した化合物が含まれる。プロドラッグの例には、ヒドロキシ官能基の酢酸誘導体、ギ酸誘導体、および安息香酸誘導体またはアミン官能基のアセトアミド誘導体、ホルムアミド誘導体、およびベンズアミド誘導体を含む活性化化合物などが含まれるが、これらに限定されない。

【0134】

いくつかの実施形態では、プロドラッグには、ホスフェート置換基、ホスホアルコキシ置換基、エステル置換基、またはボロン酸エステル置換基を有する構造（I）の化合物が

含まれる。理論に拘束されるものではないが、かかる置換基は、生理学的条件下においてヒドロキシル基に変換されると考えられている。したがって、実施形態は、ヒドロキシル基が、ホスフェート基、ホスホアルコキシ基、エステル基、またはボロン酸エステル基、例えば、ホスフェートまたはホスホアルコキシ基で置き換えられた、本明細書中に開示の任意の化合物を含む。例えば、いくつかの実施形態では、 R^1 部分上のヒドロキシル基は、ホスフェート基、ホスホアルコキシ基、エステル基、またはボロン酸エステル基、例えば、ホスフェート基またはアルコキシホスフェート基で置き換えられている。したがって、一定の実施形態の例示的なプロドラッグには、以下の置換基：

【化 4】



10

のうちの 1 つで置換された R^1 部分が含まれる。

【0135】

用語「*in vivo*」は、被験体の体内で起こる事象をいう。

【0136】

本明細書中に開示の発明の実施形態はまた、1 つまたはそれを超える原子が異なる原子質量または質量数を有する原子で置き換えられることによって同位体標識された構造 (I) の全ての薬学的に許容され得る化合物 (すなわち、構造 (I) の化合物の「同位体形態」) を含むことを意味する。開示の化合物中に組み込むことができる同位体の例には、水素、炭素、窒素、酸素、リン、フッ素、塩素、およびヨウ素の同位体 (それぞれ、 ^2H 、 ^3H 、 ^{11}C 、 ^{13}C 、 ^{14}C 、 ^{13}N 、 ^{15}N 、 ^{15}O 、 ^{17}O 、 ^{18}O 、 ^{31}P 、 ^{32}P 、 ^{35}S 、 ^{18}F 、 ^{36}Cl 、 ^{123}I および ^{125}I など) が含まれる。これらの放射性標識された化合物は、例えば、作用部位もしくは作用様式、または薬理学的に重要な作用部位に対する結合親和性を特徴づけることによって化合物の有効性を決定または測定するのを補助するために有用であり得る。一定の同位体標識した構造 (I) の化合物 (例えば、放射性同位体を組み込んだ化合物) は、薬物および/または基質の組織分布研究で有用である。放射性同位体であるトリチウム (すなわち、 ^3H) および炭素-14 (すなわち、 ^{14}C) は、その組み込みの容易さおよび検出の既存の手段の見地から、この目的に特に有用である。

20

30

【0137】

重水素 (すなわち、 ^2H) などのより重い同位体での置換は、より大きな代謝安定性に起因する一定の治療上の利点 (例えば、*in vivo* 半減期の増大または必要な投薬量の減少) を得ることができ、それ故、いくつかの状況下で好ましい。

【0138】

陽電子放出同位体 (^{11}C 、 ^{18}F 、 ^{15}O および ^{13}N など) での置換は、基質受容体占有率の試験のための陽電子放出断層撮影 (PET) 研究で有用であり得る。同位体標識された構造 (I) の化合物を、一般に、前に使用した非標識試薬の代わりに適切な同位体標識試薬を使用して、当業者に公知の従来技術または下記の実施例に記載のプロセスに類似のプロセスによって調製することができる。

40

【0139】

一定の実施形態はまた、開示の化合物の *in vivo* 代謝産物を含むことを意味する。かかる産物は、例えば、主に酵素過程による、投与した化合物の酸化、還元、加水分解、アミド化、およびエステル化などに起因し得る。したがって、実施形態は、本発明の化合物をその代謝産物を生成するために十分な期間にわたって哺乳動物に投与する工程を含む過程によって生成された化合物を含む。かかる産物を、典型的には、検出可能な用量の本発明の放射性標識化合物を動物 (ラット、マウス、モルモット、サル、またはヒトなど) に投与し、代謝が起こるために十分な時間を置き、その変換生成物を尿、血液、または

50

他の生物サンプルから単離することによって同定する。

【0140】

「安定な化合物」および「安定な構造」は、反応混合物からの有用な純度への単離および有効な治療薬への製剤化に耐えるのに十分に頑強である化合物を示すことを意味する。

【0141】

しばしば、結晶化により本発明の化合物の溶媒和物が生成される。本明細書中で使用する場合、用語「溶媒和物」は、1つまたはそれを超える溶媒分子と共に1つまたはそれを超える本発明の化合物の分子を含む凝集体をいう。いくつかの実施形態では、溶媒は水であり、この場合、溶媒和物は水和物である。あるいは、他の実施形態では、溶媒は有機溶媒である。したがって、本発明の化合物は、水和物（一水和物、二水和物、半水和物、セスキ水和物、三水和物、および四水和物などが含まれる）および対応する溶媒和形態として存在し得る。いくつかの態様では、本発明の化合物は真の溶媒和物であり、一方で、他の場合、本発明の化合物は、外来性の水のみを保持するか、水といくつかの外来性の溶媒との混合物である。

10

【0142】

「必要に応じた」または「必要に応じて」は、その後に記載の環境事象が起こっても起こらなくてもよいこと、および記載事項が前記事象または環境が起こる例および起こらない例を含むことを意味する。例えば、「必要に応じて置換されたアリール」は、アリールラジカルが置換されていてもされていなくてもよいこと、および記載事項が置換されたアリールラジカルおよび置換されていないアリールラジカルの両方を含むことを意味する。

20

【0143】

「薬学的組成物」は、本発明の化合物と哺乳動物（例えば、ヒト）への生物学的に活性な化合物の送達用として当技術分野で一般に許容されている媒質との製剤をいう。かかる媒質には、該化合物のための全ての薬学的に許容され得るキャリア、希釈剤、または賦形剤が含まれる。

【0144】

「薬学的に許容され得るキャリア、希釈剤、または賦形剤」には、米国食品医薬品局によってヒトまたは飼育動物での使用が許容できるとして承認されている任意のアジュバント、キャリア、賦形剤、流動促進剤、甘味剤、希釈剤、防腐剤、色素／着色剤、香味強化剤、界面活性剤、湿潤剤、分散剤、懸濁化剤、安定剤、等張剤、溶媒、または乳化剤が含まれるが、これらに限定されない。

30

【0145】

本発明の化合物（すなわち、構造（I）の化合物およびその実施形態）またはその薬学的に許容され得る塩は、1つまたはそれを超える幾何学的不斉中心を含むことができ、したがって、絶対立体化学の観点から、（R）型または（S）型としてか、アミノ酸の場合（D）型または（L）型として定義される鏡像異性体、ジアステレオマー、および他の立体異性体の形態を生じ得る。したがって、実施形態には、全てのかかる可能な異性体、ならびにそのラセミ体および光学的に純粋な形態が含まれる。光学的に活性な（+）および（-）、（R）異性体および（S）異性体、または（D）異性体および（L）異性体を、キラルシントロンまたはキラル試薬を使用して調製することができるか、従来技術（例えば、クロマトグラフィおよび分別晶出）を使用して分割することができる。各鏡像異性体の調製／単離のための従来技術には、適切な光学的に純粋な前駆体からのキラル合成、あるいは例えば、キラル高圧液体クロマトグラフィ（HPLC）を使用したラセミ体（またはラセミ体の塩もしくは誘導体）の分割が含まれる。本明細書中に記載の化合物がオレフィン性二重結合または他の幾何学的不斉中心を含む場合、特に指定されない限り、該化合物がE幾何異性体およびZ幾何異性体の両方を含むことを意図する。同様に、全ての互変異性型も含まれることが意図される。

40

【0146】

本発明の実施形態は、本発明の化合物の回転異性体および高次構造が制限された状態の全ての様式を含む。アトロプ異性体も含まれ、この異性体は、立体ひずみまたは他の誘因

50

によるエネルギー差が各配座異性体を単離するために十分に高い回転障壁を生じる単結合の回転障害を原因とする立体異性体である。例として、本発明の一定の化合物は、アトロプ異性体の混合物または1つのアトロプ異性体が精製またはその存在が富化された形態として存在することができる。

【0147】

いくつかの実施形態では、構造（I）の化合物は、アトロプ異性体の混合物である。他の実施形態では、構造（I）の化合物は、実質的に精製されたアトロプ異性体である。いくつかの実施形態では、構造（I）の化合物は、実質的に精製されたR-アトロプ異性体である。いくつかの他の実施形態では、構造（I）の化合物は、実質的に精製されたS-アトロプ異性体である。

10

【0148】

「立体異性体」は、同一の結合によって結合した同一の原子で構成されているが、互換的でない異なる三次元構造を有する化合物をいう。本発明は、種々の立体異性体およびその混合物を意図し、「鏡像異性体」が含まれ、鏡像異性体は、2つの立体異性体であって、その分子が相互に重ね合わせられない鏡像である立体異性体をいう。

【0149】

「互変異性体」は、分子の1つの原子から同一分子の別の原子へのプロトン移動をいう。したがって、実施形態は、開示の化合物の互変異性体を含む。

【0150】

本明細書中で使用した化学命名プロトコールおよび構造線図は、ACD/Nameバージョン9.07ソフトウェアプログラムおよび/またはChemDraw Ultraバージョン11.0.1ソフトウェア命名プログラム（CambridgeSoft）を使用したI.U.P.A.C.命名法の修正形態である。本明細書中で使用した複雑な化学名について、置換基を、典型的には、置換基が結合している基の前に命名する。例えば、シクロプロピルエチルは、シクロプロピル置換基を有するエチル骨格を含む。下記を除いて、原子価を完全にするのに十分な水素原子に結合すると考えられるいくつかの炭素原子上の全ての結合を除いた全ての結合を本明細書中の化学構造線図中で特定する。

20

【0151】

化合物

1つの態様では、本発明は、G12C変異体KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質に選択的に結合し、および/またはこれらを調整することができる化合物を提供する。化合物は、アミノ酸との反応によってG12C変異体KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質を調整することができる。理論に拘束されるものではないが、本出願者らは、いくつかの実施形態では、G12C変異体KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質の12位のシステインとの共有結合の形成によって、本発明の化合物がG12C変異体KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質と選択的に反応すると考える。システイン12への結合により、本発明の化合物は、G12C変異体KRAS、HRAS、またはNRASのスイッチIIを不活性段階に閉じ込めることができる。この不活性段階は、GTPおよびGDPに結合したKRAS、HRAS、またはNRASで認められるものと異なり得る。いくつかの本発明の化合物はまた、スイッチIの高次構造を乱すことができる。いくつかの本発明の化合物は、GTPよりもむしろGDPに結合したKRAS、HRAS、またはNRASへの結合を優先し、したがって、KRAS、HRAS、またはNRASを不活性なKRAS、HRAS、またはNRASのGDP結合状態に隔離し得る。KRAS、HRAS、またはNRASへのエフェクター結合がスイッチIおよびIIの高次構造に高度に影響を受けやすいので、これらの化合物の不可逆的結合がKRAS、HRAS、またはNRASの下流シグナル伝達を破壊し得る。

30


40

【0152】

上記のように、本発明の一実施形態では、G12C変異体KRAS、HRASまたはNRASタンパク質のモジュレーターとしての活性を有する化合物が提供され、化合物は、以下の構造（I）：

50

【化 5】



(I)

10

またはその薬学的に許容され得る塩、同位体形態、立体異性体もしくはプロドラッグを有し、式中、

【化 6】



は、芳香環を示し；

A^1 、 A^2 、 A^3 および A^4 は、各出現において独立して、 $CR^{4a}R^{4b}$ または NR^5 であり；

X 、 Y および Z は、それぞれ独立して、 N 、 CR^{3a} または NR^{3b} であり、但し、 X 、 Y および Z のうちの少なくとも 1 つの少なくとも 1 つは、 N または NR^{3b} であり；

20

W は、 CR^2 または N であり；

G^1 および G^2 は、それぞれ独立して、 CR' または N であり、但し、 A^1 および A^2 のうちの少なくとも 1 つが NR^5 である場合、 G^1 は CR' であり、 A^3 および A^4 のうちの少なくとも 1 つが NR^5 である場合、 G^2 は CR' であり；

L^1 は、結合または $-NR^5-$ であり；

L^2 は、結合または $C_1 \sim C_6$ アルキレンであり；

L^3 は、結合、アルケニレン、シクロアルキレン、アルキニレン、 $CR^{4a}R^{4b}$ 、 $-S-$ 、 $-O-$ 、 $C(=O)$ 、 $-S(O)_2-$ 、 $-S(O)-$ 、 $-C(=O)NR^5-$ 、 $-S(O)_2NR^5-$ 、 $-NR^5C(=O)NR^5-$ 、 $-NR^5S(O)_2NR^5-$ または $-NR^5-$ であり；

30

R' は、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_2 \sim C_6$ アルケニル、 $C_2 \sim C_6$ アルキニル、 $C_1 \sim C_6$ ヒドロキシアルキル、 $C_1 \sim C_6$ シアノアルキル、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル； $C_3 \sim C_8$ シクロアルキルアルキルであり；

R^1 は、アリール、シクロアルキル、ヘテロシクリルまたはヘテロアリールであり；

R^2 は、 H 、シアノ、ヒドロキシル、ハロ、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_2 \sim C_6$ アルケニル、 $C_2 \sim C_6$ アルキニル、 $C_1 \sim C_6$ ヒドロキシアルキル、 $C_1 \sim C_6$ シアノアルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル、アミノアルキル、アルキルアミノ、アミノカルボニル、 $C_3 \sim C_8$ シクロアルキル、 $C_3 \sim C_8$ ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、アリールまたはヘテロアリールであり；

40

R^{3a} は、 H 、シアノ、アミノ、オキソ、アルキル、シクロアルキル、ハロアルキル、アルキニル、アルケニル、アミノカルボニル、アミノカルボニルアルコキシ、アミノスルホニル、アルキルスルホニルアミノ、アルキルカルボニル、アミノアルキルカルボニル、シクロアルキルカルボニル、ヘテロシクリルカルボニル、ヘテロシクリルカルボニルアルコキシ、アルキルスルホニル、アミノアルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、ヘテロシクリルスルホニル、アルキルチオエーテル、アミノアルキルチオエーテル、シクロアルキルチオエーテル、ヘテロシクリルチオエーテル、アミノアルキル、アミノアルキニル、アミノアルキルアミノ、アミノアルコキシ、アルキルカルボニルアミノ、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアミノ、ヘテロシクリルオキシ、ヘ

50

テロシクリルアルキル、ヘテロシクリルアルキルアミニル、ヘテロシクリルアルコキシ、ヘテロシクリルカルボニルアミニル、アリール、アリールアルキル、アリールアルキルアミニル、アリールアルコキシ、アリールアルキルアミニル、アリールアルコキシ、アリールカルボニルアミニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアミニル、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアルキル、ヘテロアリールアルキルアミニル、ヘテロアリールアルコキシ、ヘテロアリールカルボニルアミニルであり；

R^{3b}は、H、シアノ、アルキル、シクロアルキル、ハロアルキル、アルキニル、アルケニル、アミニルカルボニル、アミニスルホニル、アルキルカルボニル、アミニルアルキルカルボニル、シクロアルキルカルボニル、ヘテロシクリルカルボニル、アルキルスルホニル、アミニルアルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、ヘテロシクリルスルホニル、アルキルチオエーテル、アミニルアルキルチオエーテル、シクロアルキルチオエーテル、ヘテロシクリルチオエーテル、アミニルアルキル、アミニルアルキニル、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；

R^{4a}およびR^{4b}は、各出現において独立して、H、-OH、-NH₂、-CO₂H、ハロ、シアノ、C₁~C₆アルキル、C₂~C₆アルケニル、C₂~C₆アルキニル、C₁~C₆ハロアルキル、C₁~C₆ハロアルコキシ、C₁~C₆ヒドロキシアルキル、アルコキシアルキル、アミニルアルキル、アルキルアミニルアルキル、C₁~C₆シアノアルキル、C₁~C₆カルボキシアルキル、アミニルカルボニルアルキルまたはアミニルカルボニルであるか、またはR^{4a}およびR^{4b}は、同じ炭素に結合している場合、接合して、オキソまたは炭素環式環もしくは複素環式環を形成するか、またはR^{4a}およびR^{4b}は、異なる炭素に結合している場合、接合して、炭素環式環または複素環式環を形成し；

R⁵は、各出現において独立して、H、C₁~C₆アルキル、C₂~C₆アルケニル、C₂~C₆アルキニル、C₁~C₆ヒドロキシアルキル、C₁~C₆シアノアルキル、C₁~C₆ハロアルキル；C₃~C₈シクロアルキルアルキルであり；

mは、1、2または3であり；

nは、1または2であり；

【0153】

Eは、求電子部分である。

【0154】

いくつかの実施形態では、Eは、標的タンパク質のシステイン残基と共有結合を形成することができる求電子部分である。一定のさらなる特定の実施形態では、標的タンパク質は、KRAS、HRASまたはNRAS G12C変異体タンパク質である。いくつかの実施形態では、システイン残基は、標的タンパク質の12位に存在する。さらなる特定の実施形態では、システイン残基との共有結合は、KRAS、HRASまたはNRAS G12C変異体タンパク質の12位に存在する。いくつかのさらなる特定の実施形態では、Eは、KRAS、HRASまたはNRAS G12C変異体タンパク質の12位のシステイン残基と共有結合を形成することができる求電子部分である。

【0155】

前述のいくつかの実施形態では、C₁~C₆アルキル、C₂~C₆アルケニル、C₂~C₆アルキニル、C₁~C₆アルキレン、C₁~C₆ハロアルキル、C₁~C₆アルコキシ、C₁~C₆ハロアルコキシ、C₁~C₆ヒドロキシアルキル、アルコキシアルキル、アミニルアルキル、アルキルアミニルアルキル、C₁~C₆シアノアルキル、C₁~C₆カルボキシアルキル、アミニスルホニル、アルキルスルホニルアミニル、アルキルカルボニル、アミニルアルキルカルボニル、シクロアルキルカルボニル、ヘテロシクリルカルボニル、アルキルスルホニル、アミニルアルキルスルホニル、シクロアルキルスルホニル、ヘテロシクリルスルホニル、アルキルチオエーテル、アミニルアルキルチオエーテル、シクロアルキルチオエーテル、ヘテロシクリルチオエーテル、アミニルカルボニルアルキル、アミニルカルボニル、アリール、ヘテロアリール、アミニルアルキルアミニル、ア

10

20

30

40

50

ミニルアルコキシ、アルキルカルボニルアミニル、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアミニル、ヘテロシクリルオキシ、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロシクリルアルキルアミニル、ヘテロシクリルアルコキシ、ヘテロシクリルカルボニルアミニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアミニル、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアルキル、ヘテロアリールアルキルアミニル、ヘテロアリールアルコキシ、ヘテロアリールカルボニルアミニルおよび炭素環式環および複素環式環の各出現は、特に指定がない限り、1つまたはそれを超える置換基で必要に応じて置換される。

【0156】

構造 (I) の化合物における R^1 、 R^2 、 R^{3a} 、 R^{3b} 、 R^{4a} 、 R^{4b} 、 R^5 、 R^8 、 $R^{8'}$ 、 R^9 、 R^{10} 、 L^2 、 L^3 および E はそれぞれ、具体的に他の意味を示さないか、またはかかる置換が不安定な構造もしくは不適切な原子価をもたさない限り、必要に応じて置換される。例えば、いくつかの実施形態では、アルキル、アルキニル、アルケニル、アルキレン、アリール、アラルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキル、シクロアルキルアルキル、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、アルキルアミニル、ハロアルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、ハロアルコキシ、ヘテロシクリルアルキル、アミニルアルキル、アルキルアミニルアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキル、アミニルカルボニル、アミニルカルボニルアルキルならびに炭素環式環および複素環式環の各出現は、構造 (I) の化合物において必要に応じて置換され、1つまたはそれを超える置換基で必要に応じて置換される。

【0157】

いくつかの実施形態では、 A^1 は、 $CR^{4a}R^{4b}$ である。他の実施形態では、 A^1 は、 NR^5 である。いくつかの実施形態では、 A^2 は、 $CR^{4a}R^{4b}$ である。他の実施形態では、 A^2 は、 NR^5 である。いくつかの実施形態では、 A^3 は、 $CR^{4a}R^{4b}$ である。他の実施形態では、 A^3 は、 NR^5 である。いくつかの実施形態では、 A^4 は、 $CR^{4a}R^{4b}$ である。他の実施形態では、 A^4 は、 NR^5 である。

【0158】

いくつかの実施形態では、 R' は、 H である。

【0159】

いくつかの実施形態では、 m は、1 である。いくつかの実施形態では、 m は、2 である。いくつかの実施形態では、 m は、3 である。

【0160】

いくつかの実施形態では、 n は、1 である。いくつかの実施形態では、 n は、2 である。

【0161】

いくつかの実施形態では、 m は 2 であり、 n は 1 である。他の実施形態では、 m は 2 であり、 n は 2 である。


いくつかの実施形態では、化合物は、以下の構造 (Ia)、(Ib)、(Ic) または (Id) :

10

20

30

【化 7】




10

のうちの 1 つを有する。

他の特定の実施形態では、化合物は、以下の構造 (I' a)、(I' b)、(I' c) または (I' d) :

【化 8】



20

30

40

のうちの 1 つを有し、式中、

【化 9】

≡

は、二重結合または三重結合を表し；

50

Qは、 $-C(=O)-$ 、 $-C(=NR^{8'})-$ 、 $-NR^8C(=O)-$ 、 $-S(=O)_2-$ または $-NR^8S(=O)_2-$ であり；

R^8 は、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、ヒドロキシアルキル、アミノアルキル、アルコキシアルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキル、アミノカルボニルアルキル、 $C_3 \sim C_8$ シクロアルキルまたはヘテロシクリルアルキルであり；

$R^{8'}$ は、H、 $-OH$ 、 $-CN$ または $C_1 \sim C_6$ アルキルであり；

【化10】

≡

10

が二重結合である場合、 R^9 および R^{10} は、それぞれ独立して、H、ハロ、シアノ、カルボキシル、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、アルコキシカルボニル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、アリール、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロアリールまたはヒドロキシアルキルであるか、または R^9 と R^{10} とは、接合して、炭素環式環、複素環式環またはヘテロアリール環を形成し；

【化11】

≡

が三重結合である場合、 R^9 は存在せず、 R^{10} は、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキルまたはヒドロキシアルキルであり、

20

ここで、アルキル、ヒドロキシアルキル、アミノアルキル、アルコキシアルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキル、アミノカルボニルアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクリルアルキル、アルコキシカルボニル、ヘテロアリールならびに炭素環式環、複素環式環およびヘテロアリール環の各出現は、特に指定がない限り、1つまたはそれを超える置換基で必要に応じて置換される。

【0162】

いくつかの実施形態では、 R' はHであり、 m は2であり、X、YおよびZのうちの少なくとも1つの出現は、 CR^{3a} （式中、 R^{3a} はHではない）であるか、またはX、YおよびZのうちの少なくとも1つの出現は、 NR^{3b} （式中、 R^{3b} はHではない）である。いくつかの実施形態では、X、YおよびZのうちの少なくとも1つの出現は、 CR^{3a} （式中、 R^{3a} はHではない）であるか、またはX、YおよびZのうちの少なくとも1つの出現は、 NR^{3b} （式中、 R^{3b} はHではない）である。いくつかの実施形態では、XはNであり、Yは CR^{3a} であり、Zは CR^{3a} である。他の実施形態では、Xは CR^{3a} であり、Yは CR^{3a} であり、ZはNである。一定の他の実施形態では、Xは CR^{3a} であり、YはNであり、Zは CR^{3a} である。さらに他の実施形態では、XはNであり、Yは CR^{3a} であり、ZはNである。いくつかのさらなる特定の実施形態では、XはNであり、YはNであり、Zは CR^{3a} である。いくつかの実施形態では、Xは CR^{3a} であり、YはNであり、ZはNである。いくつかの実施形態では、Xは NR^{3b} であり、Yは CR^{3a} であり、ZはNである。一定の実施形態では、XはNであり、Yは CR^{3a} であり、Zは NR^{3b} である。いくつかの実施形態では、Xは CR^{3a} であり、Yは NR^{3b} であり、ZはNである。いくつかの実施形態では、Xは CR^{3a} であり、Yは NR^{3b} であり、Zは CR^{3a} である。一定の特定の実施形態では、Xは NR^{3b} であり、Yは CR^{3a} であり、Zは CR^{3a} である。

30

40

【0163】

いくつかの実施形態では、 R' はHであり、 m は2であり、X、YおよびZは、それぞれ独立して、CHまたはNであり、但し、X、YおよびZのうちの少なくとも1つの少なくとも1つはNである。他の特定の実施形態では、X、YおよびZは、それぞれ独立して、CHまたはNであり、但し、X、YおよびZのうちの少なくとも1つの少なくとも1つはNである。例えば、いくつかの実施形態では、XはNであり、YはCHであり、ZはCHである。他の実施形態では、XはCHであり、YはNであり、ZはCHである。さらに

50

他の実施形態では、XはCHであり、YはCHであり、ZはNである。なお異なる実施形態では、XはNであり、YはNであり、ZはCHである。さらなる実施形態では、XはNであり、YはCHであり、ZはNである。さらなる実施形態では、XはCHであり、YはNであり、ZはNである。他の例示的な実施形態では、XはNであり、YはNであり、ZはNである。



【0164】

前述の実施形態のいくつかでは、Wは CR^2 である。前述の他の実施形態では、WはNである。


【0165】

いくつかのさらなる特定の実施形態では、化合物は、以下の構造 (Ia1)、(Ia2)、(Ia3)、(Ia4)、(Ia5)、(Ia6) または (Ia7) :

【化12】



【化13】



10

20

30

40


50

のうちの1つを有する。

【0166】

他の特定の実施形態では、化合物は、以下の構造 (Ib1)、(Ib2)、(Ib3)、(Ib4)、(Ib5)、(Ib6) または (Ib7) :

【化14】






のうちの1つを有する。




【0167】

いくつかの実施形態では、化合物は、以下の構造 (Ic1)、(Ic2)、(Ic3)、(Ic4)、(Ic5)、(Ic6) または (Ic7) :


【化 1 5】



10



20



30

のうちの1つを有する。

【0168】

他の実施形態では、化合物は、以下の構造 (I d 1)、(I d 2)、(I d 3)、(I d 4)、(I d 5)、(I d 6) または (I d 7) :

40

10




【 0 1 6 9 】


【化 1 7】



【化 1 8】



10




20

のうちの 1 つを有する。

【0170】

他の実施形態では、化合物は、以下の構造 (If1)、(If2)、(If3)、(If4)、(If5)、(If6) または (If7) :


【化 1 9】



30

40

【化 2 0】



10


のうちの1つを有する。

【 0 1 7 1】

いくつかのさらなる実施形態では、化合物は、以下の構造 (I g 1)、(I g 2)、(I g 3)、(I g 4)、(I g 5)、(I g 6) または (I g 7) :

20


【化 2 1】



30

40

【化 2 2】




10

のうちの 1 つを有する。

【0 1 7 2】

一定の他の特定の実施形態では、化合物は、以下の構造 (Ih1)、(Ih2)、(Ih3)、(Ih4)、(Ih5)、(Ih6) または (Ih7) :

【化 2 3】



20

30


40

のうちの 1 つを有する。

【0 1 7 3】

一定の実施形態では、E は、以下の構造 :

【化 2 4】



を有し、式中、

【化 2 5】



は、二重結合または三重結合を表し；

10

Q は、 $-C(=O)-$ 、 $-C(=NR^{8'})-$ 、 $-NR^8C(=O)-$ 、 $-S(=O)_2-$ または $-NR^8S(=O)_2-$ であり；

R^8 は、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、ヒドロキシアルキル、アミノアルキル、アルコキシアルキル、アミニルアルキル、アルキルアミニルアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキル、アミニルカルボニルアルキル、 $C_3 \sim C_8$ シクロアルキルまたはヘテロシクリルアルキルであり；

$R^{8'}$ は、H、 $-OH$ 、 $-CN$ または $C_1 \sim C_6$ アルキルであり；

【化 2 6】



20

が二重結合である場合、 R^9 および R^{10} は、それぞれ独立して、H、ハロ、シアノ、カルボキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、アルコキシカルボニル、アミニルアルキル、アルキルアミニルアルキル、アリール、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロアリールまたはヒドロキシアルキルであるか、または R^9 と R^{10} とは、接合して、炭素環式環、複素環式環またはヘテロアリール環を形成し；

【化 2 7】



が三重結合である場合、 R^9 は存在せず、 R^{10} は、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、アミニルアルキル、アルキルアミニルアルキルまたはヒドロキシアルキルであり、

30

ここで、アルキル、ヒドロキシアルキル、アミノアルキル、アルコキシアルキル、アミニルアルキル、アルキルアミニルアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキル、アミニルカルボニルアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクリルアルキル、アルコキシカルボニル、ヘテロアリールならびに炭素環式環、複素環式環およびヘテロアリール環の各出現は、特に指定がない限り、1 つまたはそれを超える置換基で必要に応じて置換される。

【0174】

いくつかの実施形態では、 R^1 は、KRAS、HRAS、またはNRAS G12C 変異体タンパク質と可逆的に相互作用することができる。いくつかの実施形態では、 R^1 は、KRAS、HRAS、またはNRAS に対して高い親和性を有し、G12C の KRAS、HRAS、またはNRAS に高い特異性を示す。いくつかの実施形態では、 R^1 は、KRAS、HRAS、またはNRAS G12C と疎水性相互作用することができる。いくつかの実施形態では、 R^1 は、G12C の KRAS、HRAS、またはNRAS タンパク質の種々の残基と水素結合を形成することができる。

40

【0175】

いずれかの前述の実施形態では、 R^1 は、アリール、例えばフェニルまたはナフチルである。かかるいくつかの実施形態では、 R^1 は、1 つまたはそれを超える置換基で置換される。例えば、例示的な実施形態では、 R^1 は、ハロ、アミノ、ヒドロキシ、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、シアノ、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、アルキルアミニル、シクロアルキル、ヘテロシクリルアルキル、アリール、ヘテロアリール、ホスフェート、ホスホアルコキシ、ボロン酸、ボロン酸エステル、 $-OC(=O)R$ 、 $-C(=O)$


50

NH₂もしくはC₁～C₆アルキルカルボニルオキシまたはそれらの組み合わせで置換され、ここで、Rは、C₁～C₆アルキルである。他の実施形態では、R¹は、フルオロ、クロロ、ヒドロキシル、メチル、イソプロピル、シクロプロピル、トリフルオロメチルもしくはメトキシまたはそれらの組み合わせで置換される。

【0176】

一定の実施形態では、R¹は、以下の構造：

【化28】



のうちの1つを有する。

【0177】

異なる実施形態では、R¹は、ヘテロアリアル、例えば、インダゾリル、インドリル、

10

20

30

40


50

ベンゾイミダゾリル、ベンゾトリアゾリル、ピロロピリジルまたはキノリニルである。いくつかのこれらの実施形態では、 R^1 は、1つまたはそれを超える置換基で置換され、例えば、シアノ、ニトロ、 $-NH_2$ 、 $-(C=O)NH_2$ 、ヒドロキシル、アルキルヒドロキシ、ハロもしくは $C_1 \sim C_6$ アルキルまたはそれらの組み合わせで置換される。

【0178】

いくつかの異なる実施形態では、 R^1 は、以下の構造：

【化29】




10

20

30

40

【化 3 0】



10

20

のうちの 1 つを有する。

【0179】


30

なおもさらなる実施形態では、 R^1 は、ヘテロシクリル、例えば、置換複素環である。いくつかの実施形態では、その複素環は、ヒドロキシル、ヒドロキシルアルキル、オキソおよびアミニルカルボニルから選択される 1 つまたはそれを超える置換基で置換される。

【0180】

他の例示的な実施形態では、 R^1 は、以下の構造：

【化 3 1】



40

のうちの 1 つを有する。


【0181】

いくつかの他の実施形態では、 R^2 は、H、シアノ、ヒドロキシル、ハロ、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ シアノアルキル、 $C_1 \sim C_6$ アルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルコキシ、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ ヒドロキシルアルキル、 $C_3 \sim C_8$ シクロアル

50

キル、アミノアルキル、アルキルアミノまたはアミノカルボニルである。例えば、例示的な実施形態では、 R^2 は、以下の構造：

【化 3 2】



10

のうちの 1 つを有する。

【0182】


いくつかの特定の実施形態では、 R^{3a} は、H である。いくつかの実施形態では、 R^{3b} は、H である。他の実施形態では、 R^{3a} は、シアノ、オキソ、ハロアルキル、アミノカルボニル、アミノカルボニルアルコキシ、アミノスルホニル、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルカルボニル、ヘテロシクリルカルボニルアルコキシ、アミノアルキル、アルキルアミノアルコキシ、アミノアルキニル、アミノアルキルアミノヘテロシクリル、アルキルアミノヘテロシクリル、ヘテロシクリルオキシ、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロシクリルアルコキシ、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルコキシまたはヘテロアリールカルボニルアミノである。

20

【0183】

他のさらなる特定の実施形態では、 R^{3a} は、以下の構造：


【化 3 3】



30

40

【化 3 4】



10

20


30

のうちの1つを有する。

【0184】


他のさらなる特定の実施形態では、R^{3a}は、以下の構造：

【化 3 5】



40

【化 3 6】




10

20

30

40

【化 3 7】




10

のうちの1つを有する。

【0185】

一定の実施形態では、 R^{3a} は、オキソである。他の実施形態では、 R^{3b} は、以下の構造： $-CH_3$ ；

【化 3 8】




20

のうちの1つを有する。

【0186】

他の実施形態では、 R^{3b} は、以下の構造： $-CH_3$ ；

【化 3 9】



30

のうちの1つを有する。

【0187】

前述の構造（I）の化合物のいずれかのさらなる実施形態およびその下位実施形態では、 R^{4a} および R^{4b} は、各出現において、Hである。他の実施形態では、 R^{4a} または R^{4b} のうちの少なくとも1つの出現はHではない。異なる実施形態では、 R^{4a} または R^{4b} の出現のうちの少なくとも1つは、 $C_1 \sim C_6$ アルキルであり、例えば、いくつかの実施形態では、 $C_1 \sim C_6$ アルキルは、メチルである。

【0188】

一定の実施形態では、 R^{4a} および R^{4b} は、各出現において独立して、H、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-CO_2H$ 、ハロ、シアノ、ヒドロキシアルキル、アミノアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキルまたはアミノカルボニルである。

40

【0189】

他の前述の実施形態では、 R^{4a} および R^{4b} は、各出現において独立して、H、 $-OH$ 、ヒドロキシアルキル、シアノまたはアミノカルボニルである。

【0190】

一定の他の実施形態では、 R^{4a} および R^{4b} は、各出現において独立して、H、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-CO_2H$ 、ハロ、シアノ、ヒドロキシアルキル、アミノアルキル、シアノアルキル、カルボキシアルキルまたはアミノカルボニルである。

【0191】

異なる実施形態では、 R^{4a} および R^{4b} のうちの少なくとも1つは、 $C_1 \sim C_6$ シア

50

ノアルキル、例えばシアノメチルである。

【0192】

他の実施形態では、 R^{4a} の少なくとも1つの出現は、 R^{4b} と接合して、炭素環式環または複素環式環を形成する。


【0193】

なおさらなる実施形態では、 R^{4a} の少なくとも1つの出現は、 R^{4b} と接合して、オキソを形成する。

【0194】

さらに他の実施形態では、 R^{4a} または R^{4b} のうちの少なくとも1つの出現は、アミノカルボニルである。例えば、一定の実施形態では、アミノカルボニルは、

【化40】



10


である。他の実施形態では、 R^{4a} または R^{4b} のうちの少なくとも1つの出現は、シアノである。他の実施形態では、 R^{4a} または R^{4b} のうちの少なくとも1つの出現は、 $-OH$ である。他の実施形態では、 R^{4a} または R^{4b} のうちの少なくとも1つの出現は、ヒドロキシアルキル、例えばヒドロキシメチルである。

【0195】

20

なおさらなる前述の実施形態のいずれかでは、 E は、以下の構造：

【化41】



(式中、

Q は、 $-C(=O)-$ 、 $-C(=NR^8)-$ 、 $-NR^8C(=O)-$ 、 $-S(=O)_2-$ または $-NR^8S(=O)_2-$ であり；

R^8 は、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキルまたはヒドロキシアルキルであり；

$R^{8'}$ は、 H 、 $-OH$ 、 $-CN$ または $C_1 \sim C_6$ アルキルであり；ならびに


30

R^9 および R^{10} は、それぞれ独立して、 H 、ハロ、シアノ、カルボキシル、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、アルコキシカルボニル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキル、アリール、ヘテロシクリル、ヘテロシクリルアルキル、ヘテロアリールまたはヒドロキシアルキルであるか、または R^9 と R^{10} とは接合して、炭素環式環、複素環式環またはヘテロアリール環を形成する)を有する。

【0196】

さらに他の前述の実施形態のいずれかでは、 E は、以下の構造：

【化42】



40

(式中、

Q は、 $-C(=O)-$ 、 $-NR^8C(=O)-$ 、 $-S(=O)_2-$ または $-NR^8S(=O)_2-$ であり；

R^8 は、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキルまたはヒドロキシアルキルであり；ならびに

R^{10} は、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、アミノアルキル、アルキルアミノアルキルまたはヒドロキシアルキルである)を有する。

【0197】

Q 部分は、典型的には、 E の反応性(すなわち、求電子性)を最適化するように選択される。いくつかの前述の実施形態では、 Q は、 $-C(=O)-$ 、 $-NR^8C(=O)-$ 、

50

—S(=O)₂—または—NR⁸S(=O)₂—である。一定の前述の実施形態では、Qは—C(=O)—である。他の実施形態では、Qは—S(=O)₂—である。なおさらなる実施形態では、Qは—NR⁸C(=O)—である。なおさらなる異なる実施形態では、Qは—NR⁸S(=O)₂—である。

【0198】

いくつかの他の前述の実施形態では、Qは—C(=NR^{8'})—であり、ここで、R^{8'}は、H、—OH、—CNまたはC₁～C₆アルキルである。例えば、いくつかの実施形態では、R^{8'}はHである。他の実施形態では、R^{8'}は—CNである。他の実施形態では、R^{8'}は—OHである。

【0199】

前述の実施形態のいくつかでは、R⁸はHである。他のこれらの実施形態では、R⁸はヒドロキシアルキルであり、例えば、いくつかの実施形態では、ヒドロキシアルキルは2-ヒドロキシアルキルである。


【0200】

いくつかの前述の実施形態のいずれか1つでは、R⁹またはR¹⁰のうちの少なくとも1つはHである。例えば、いくつかの実施形態では、R⁹およびR¹⁰はそれぞれHである。

【0201】

他の前述の実施形態では、R¹⁰はアルキルアミノアルキルである。いくつかのこれらの実施形態では、R¹⁰は、以下の構造：

【化43】



を有する。


【0202】

他の実施形態では、R¹⁰はヒドロキシアルキル、例えば2-ヒドロキシアルキルである。

【0203】

前述の実施形態のいくつかの他の異なる実施形態では、R⁹とR¹⁰とは接合して、炭素環式環を形成する。例えば、いくつかのこれらの実施形態では、炭素環式環は、シクロペンテン、シクロヘキセンまたはフェニル環である。他の実施形態では、炭素環式環は、シクロペンテンまたはシクロヘキセン環である。他の実施形態では、炭素環式環は、フェニル環、例えば以下の構造：

【化44】



を有するフェニル環である。

【0204】

いくつかの前述の実施形態のいずれかでは、Eは、G12C変異を含むKRAS、HRASまたはNRASタンパク質と結合することができる求電子剤である。いくつかの実施形態では、求電子剤Eは、G12C変異体KRAS、HRASまたはNRASタンパク質と不可逆的共有結合を形成することができる。いくつかの場合では、求電子剤Eは、G12C変異体KRAS、HRASまたはNRASタンパク質の12位のシステイン残基と結合し得る。前述のいずれかの種々の実施形態では、Eは、以下の構造：


10

20

30

40

【化 4 5】



10

20


30

のうちの 1 つを有する。

【0 2 0 5】


いくつかの実施形態では、E は、

【化 4 6】




である。いくつかの実施形態では、E は、

【化 4 7】



である。いくつかの実施形態では、E は、


【化 4 8】



である。いくつかの実施形態では、E は、

40

【化 4 9】



である。

【0206】

いずれかの前述の実施形態では、 L^1 は、結合である。他の実施形態では、 L^1 は、 $-NR^5-$ である。


【0207】

L^2 は、適切な間隔および／または方向を E 基に提供して、KRAS、HRAS または NRAS タンパク質との結合を形成するように選択され得る。前述の実施形態のいくつかでは、 L^2 は、結合である。他の前述の実施形態では、 L^2 は、アルキレンである。

【0208】

いずれかの前述の実施形態では、 L^3 は、 $-O-$ である。いくつかの実施形態では、 L^3 は、結合である。他の実施形態では、 L^3 は、 $-NR^5-$ 、例えば、 $-NH-$ または $-NCH_3-$ である。いくつかの実施形態では、 L^3 は、以下の構造：

【化 5 0】



のうちの 1 つを有する。

【0209】

化合物のいくつかの実施形態は、1 つを超える立体異性体を含む。他の実施形態は、単一の立体異性体に関する。いくつかの実施形態では、化合物はラセミ体（例えば、アトロプ異性体の混合物）であり、他の実施形態では、化合物は、実質的に単一の異性体、例えば実質的に精製されたアトロプ異性体である。いくつかの実施形態では、化合物は、実質的に精製された S-アトロプ異性体である。いくつかの異なる実施形態では、化合物は、実質的に精製された R-アトロプ異性体である。

【0210】

種々の異なる実施形態では、化合物は、以下の表 1 に記載されている構造のうちの 1 つを有する。示されている方法または当該分野で公知の方法によって、表 1 の例示的な化合物を調製し、質量分析および／または ^1H NMR によって分析した。

【表 1 - 1】

表 1. 構造 (I) の代表的な化合物

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-1		1-(6-(5-エチニル-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(ピロリジン-1-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	469.5
I-2		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	513.7
I-3		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	485.4
I-4		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(3-(ジメチルアミノ)アゼチジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	498.5





10

20

30

40

【表 1 - 2】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-5		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-2-(3-(ジメチル アミノ)プロポキシ)- 6-(5-メチル-1H-イン ダゾール-4-イル)ピ リミジン-5-カルボニ トリル	501.5
I-6		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-6-(5-メチル-1H- インダゾール-4-イ ル)-2-((R)-1-メチ ルピロリジン-2-イ ル)メトキシ)ピリミ ジン-5-カルボニトリ ル	513.4
I-7		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-2-((3-(ジメチル アミノ)プロピル)ア ミノ)-6-(5-メチル- 1H-インダゾール-4- イル)ピリミジン-5- カルボニトリル	
I-8		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-6-(5-メチル-1H- インダゾール-4-イル) -2-(2-(ピリジン-2- イル)エトキシ)ピリ ミジン-5-カルボニト リル	521.4





10

20

30

40

【表 1 - 3】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-9		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-10		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-2,5-ジカルボニトリル	425.4
I-11		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	466.4
I-12		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-(ピロリジン-1-イル)エトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	514.0





10

20

30

40

【表 1 - 4】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-13		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-ヒドロキシピペリジン-1-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	482.5
I-14		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-(ピリミジン-2-イル)エトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	523.0
I-15		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(ピリジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	507.4
I-16		(S)-4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)-6-(2-(トリフルオロメチル)フェニル)ピリミジン-5-カルボニトリル	527.4





10

20

30

40

【表 1 - 5】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-17		(S)-4-(2-アクリロイル-2, 6-ジアザスピロ [3. 4]オクタン-6-イル)-6-(2, 2-ジフルオロベンゾ[d] [1, 3]ジオキソール-4-イル)-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	539.6
I-18		(S)-4-(2-アクリロイル-2, 6-ジアザスピロ [3. 4]オクタン-6-イル)-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)-6-((ピリジン-3-イルメチル)アミノ)ピリミジン-5-カルボニトリル	489.5
I-19		4-(2-アクリロイル-2, 6-ジアザスピロ [3. 4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)オキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	496.4
I-20		4-(2-アクリロイル-2, 6-ジアザスピロ [3. 4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-(2-オキソピロリジン-1-イル)エトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	527.7

10

20

30

40

【表 1 - 6】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-21		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(2-(3,3-ジフルオロプロピル)オキシ)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	549.3
I-22		(S)-4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-ヒドロキシ-2-メチルフェニル)-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	489.5
I-23		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-オキソピロリジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	483.4
I-24		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(イソインドリン-2-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	517.4





10

20

30

40

【表 1 - 7】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-25		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)オキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	500.5
I-26		(S)-4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(2,3-ジヒドロベンゾ[b][1,4]ジオキシン-5-イル)-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	517.4
I-27		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(3,3-ジフルオロピロリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	505.5
I-28		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(4-メチル-3-オキソピペラジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	512.5





10

20

30

40

【表 1 - 8】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-29		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-4-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	513.5
I-30		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(4-メチルピペラジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	498.5
I-31		(S)-4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1H-イミダゾール-1-イル)-2-(((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	449.5
I-32		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(8-メチル-2,8-ジアザスピロ[4.5]デカン-2-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	552.5

10

20

30

40





10

20

30

40

【表 1 - 1 0】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-37		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((R)-1-メチルピロリジン-3-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	513.9
I-38		(S)-4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル)-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	499.5
I-39		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(5-メチルヘキサヒドロピロロ[3,4-c]ピロール-2(1H)-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	524.5
I-40		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(1-メチルオクタヒドロ-6H-ピロロ[2,3-c]ピリジン-6-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	538.5




10

20

30

40

【表 1 - 1 1】




番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-41		N-(4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-2-イル)ピコリンアミド	520.3
I-42		4-(2-アクリロイル-2,7-ジアザスピロ[3.5]ノナン-7-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	499.4
I-43		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((1-メチルピペリジン-4-イル)オキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	513.4

10

20

30

【表 1 - 1 2】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-44		(S)-3-((6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)アミノ)ベンズアミド	517.4
I-45		2-(6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)-3-フルオロベンズアミド	520.4
I-46		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(5-メチロクタヒドロ-2H-ピロロ[3,4-c]ピリジン-2-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	





10

20

30

40

【表 1 - 1 3】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-47		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(8-メチル-3,8-ジアザビシクロ[3.2.1]オクタン-3-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-48		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(トリフルオロメチル)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-49		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-2-カルボキサミド	
I-50		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(モルホリン-4-カルボニル)ピリミジン-5-カルボニトリル	





10

20

30

40

【表 1 - 1 4】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-51		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-6-(5-メチル-1H- インダゾール-4-イル) -2-(4-メチルピペラ ジン-1-カルボニル) ピリミジン-5-カルボ ニトリル	
I-52		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-6-(5-メチル-1H- インダゾール-4-イル) -2-(1-メチルピペリ ジン-4-イル)ピリミ ジン-5-カルボニトリ ル	
I-53		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-6-(5-メチル-1H- インダゾール-4-イル) -2-(テトラヒドロ- 2H-ピラン-4-イル)ピ リミジン-5-カルボニ トリル	
I-54		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-2-(1-メチル-1H- イミダゾール-4-イル) -6-(5-メチル-1H-イ ンダゾール-4-イル) ピリミジン-5-カルボ ニトリル	

10

20

30

40

【表 1 - 1 5】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-55		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-2-スルホンアミド	
I-56		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-((ジメチルアミノ)エチニル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-57		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-(ピロリジン-1-イル)エチル)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-58		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(2-((S)-3-メトキシピロリジン-1-イル)エトキシ)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	





10

20

30

40

【表 1 - 1 6】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-59		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(1-メチルオクタヒドロ-5H-ピロロ[3,2-c]ピリジン-5-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-60		(S)-6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2'-アミノ-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)-[4,4'-ビピリミジン]-5-カルボニトリル	
I-61		(S)-4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-アミノ-2-オキソピリジン-1(2H)-イル)-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-62		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-ヒドロキシ-2-オキソペリジン-1-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	

10

20

30

40

【表 1 - 1 7】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-63		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-64		(S)-1-(6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)ピロリジン-2-カルボキサミド	
I-65		(R)-1-(6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)ピロリジン-2-カルボキサミド	

10

20

30

【表 1 - 1 8】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-66		(S)-2-((6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)オキシ)ベンズアミド	
I-67		(S)-2-((6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)(メチル)アミノ)ベンズアミド	
I-68		(S)-3-((6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)オキシ)ベンズアミド	

10

20

30

40

【表 1 - 1 9】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-69		(S)-3-((6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)(メチル)アミノ)ベンズアミド	
I-70		5-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-1-(3-(ジメチルアミノ)プロピル)-3-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-オキソ-1,2-ジヒドロピリジン-4-カルボニトリル	
I-71		5-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-1-シクロペンチル-3-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-オキソ-1,2-ジヒドロピリジン-4-カルボニトリル	

10

20

30

【表 1 - 2 0】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-72		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-1-メチル-2-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-6-オキソ-1,6-ジヒドロピリジン-3-カルボニトリル	
I-73		4-(2-アクリロイル-7-オキソ-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-74		4-(2-アクリロイル-7-オキソ-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(6-メチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	
I-75		4-(2-アクリロイル-2,7-ジアザスピロ[3.5]ノナン-7-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-(ピリジン-2-イル)エトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	535.3





10

20

30

40

【表 1 - 2 1】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-76		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	485.5
I-77		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(7-メチル-2,7-ジアザスピロ[4.4]ノナン-2-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	538.5
I-78		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3,5-ジメチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	499.5
I-79		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,5-ジメチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	499.4





10

20

30

40

【表 1 - 2 2】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-80		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-ヒドロキシナフタレン-1-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	497.3
I-81		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((S)-4-メチルモルホリン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	529.4
I-82		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(6-メチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	513.4
I-83		(E)-4-(2-(ブタ-2-エノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	499.4





10

20

30

40

【表 1 - 2 3】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-84		4-(2-(ブタ-2-イノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	497.4
I-85		(E)-4-(2-(4-(ジメチルアミノ)ブタ-2-エノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	542.4
I-86		4-(2-アクリロイル-2,7-ジアザスピロ[3.5]ノナン-7-イル)-2-(3-(ジメチルアミノ)プロポキシ)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	515.4
I-87		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(2-(3,3-ジフルオロオロアゼチジン-1-イル)エトキシ)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	535.5




10

20

30

40

【表 1 - 2 4】





番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-88		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3,4-ジヒドロキノリン-1(2H)-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	486.2
I-89		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-ヒドロキシ-3,4-ジヒドロキノリン-1(2H)-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	502.2
I-90		(S)-4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1H-インダゾール-3-イル)-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	499.6

10

20

30

【表 1 - 2 5】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-91		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(((S)-4-メチルモルホリン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	529.4
I-92		(S)-4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-ヒドロキシナフタレン-1-イル)-2-(((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	525.4
I-93		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(6-メチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(ピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	507.4
I-94		(S)-3-(6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-(((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)-4-フルオロベンズアミド	520.4





10

20

30

40

【表 1 - 2 6】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-95		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	471.4
I-96		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3,5-ジメチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	499.5
I-97		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1-シクロプロピル-6-メチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	525.3
I-98		(E)-4-(2-(ブタ-2-エノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(ピリジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	521.5

10

20

30

40





10

20

30

40

【表 1 - 2 8】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-103		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1-シクロプロピル-6-メチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	553.4
I-104		4-(2-(ブタ-2-イノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	525.5
I-105		4-(2-((E)-ブタ-2-エノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	527.5
I-106		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1-シクロプロピル-6-メチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(ピリジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	547.4





10

20

30

40

【表 1 - 2 9】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-107		(S)-4-(2-(1H-ピラゾール-4-イル)フェニル)-6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	525.5
I-108		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-アミノ-5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	528.4
I-109		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-フェニルモルホリノ)ピリミジン-5-カルボニトリル	561.2
I-110		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(3-(ジメチルアミノ)ピペリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	526.3





10

20

30

40

【表 1 - 3 0】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-111		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(4-メチル-2-オキソピペラジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	512.6
I-112		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-メチル-2,7-ジアザスピロ[3.5]ノン-7-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	538.5
I-113		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(ナフタレン-1-イル)-2-(ピリジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	503.4
I-114		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-ヒドロキシナフタレン-1-イル)-2-(ピリジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	519.4





10

20

30

40

【表 1 - 3 1】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-115		(S)-4-(2-アクリロイル-2, 6-ジアザスピロ [3. 4]オクタン-6-イル)-6-(2-フルオロ-5-(1H-ピラゾール-4-イル)フェニル)-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	543.4
I-116		4-(2-アクリロイル-2, 6-ジアザスピロ [3. 4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-3-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	513.5
I-117		4-(2-アクリロイル-2, 6-ジアザスピロ [3. 4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(((S)-4-メチルモルホリン-3-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	529.5
I-118		1-(6-(5-フルオロ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3. 4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	478.5

10

20

30

40

【表 1 - 3 2】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-119		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(6-フルオロ-1-メチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	503.4
I-120		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1-シクロプロピル-6-フルオロ-1H-インダゾール-7-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	529.3
I-121		1-(6-(5-メトキシ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパン-2-エン-1-オン	490.5
I-122		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(3-ヒドロキシピペリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	499.2

10

20

30

40

【表 1 - 3 3】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-123		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(6-フルオロ-1-メチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(ピリジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	525.4
I-124		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1-シクロプロピル-6-フルオロ-1H-インダゾール-7-イル)-2-((S)-1-メチルピロリジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	557.4
I-125		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(ベンジルオキシ)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	506.4
I-126		3-((4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-2-イル)オキシ)-N,N-ジメチルプロパンアミド	515.4





10

20

30

40

【表 1 - 3 4】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-127		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-オキソ-2-(ピロリジン-1-イル)エトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	527.5
I-128		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(4-(ジメチルアミノ)ピペリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	526.5
I-129		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)ピペリジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	581.5
I-130		4-(2-アクリロイル-7-オキソ-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	499.6





10

20

30

40

【表 1 - 3 5】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-131		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-アミノ-5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(ピリジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	522.4
I-132		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((6-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	575.3
I-133		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((4-(トリフルオロメチル)ベンジル)オキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	574.2
I-134		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((5-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	575.5





10

20

30

40

【表 1 - 3 6】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-135		5-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-1-メチル-3-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-オキソ-1,2-ジヒドロピリジン-4-カルボニトリル	429.4
I-136		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(ピリジン-3-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	521.4
I-137		3-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(ピリジン-2-イルメトキシ)イソニコチノニトリル	506.4
I-138		2-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-6-モルホリノニコチノニトリル	484.5





10

20

30

40

【表 1 - 3 7】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-139		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(4-(ジメチルアミノ)ピペリジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	540.5
I-140		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((3-(トリフルオロメチル)ベンジル)オキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	574.4
I-141		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	400.6
I-142		2-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-6-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	485.5

10

20

30

40

【表 1 - 3 8】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-143		1-(6-(4-(3-(ジメチルアミノ)アゼチジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-2-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	473.4
I-144		1-(6-(4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-6-モルホリノピリミジン-2-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	460.4
I-145		2-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	400.4
I-146		1-(6-(4-(3-(ジメチルアミノ)プロポキシ)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-2-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	476.6





10

20

30

40

【表 1 - 3 9】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-147		2-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-4-(3-(ジメチルアミノ)アゼチジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	498.5
I-148		(S)-1-(6-(4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-6-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-2-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	488.5
I-149		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-((2-メトキシピリミジン-5-イル)メトキシ)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	538.4
I-150		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(ピリジン-3-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	507.4




10

20

30

40

【表 1 - 4 0】




番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-151		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-((3-メトキシベンジル)オキシ)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	536.4
I-152		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-((3,5-ジフルオロベンジル)オキシ)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	542.4
I-153		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((5-モルホリノピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	592.4

10

20

30

【表 1 - 4 1】




番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-154		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(ピリミジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	508.4
I-155		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(5-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	589.4
I-156		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(6-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	589.4

10

20

30

【表 1 - 4 2】




番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-157		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((4-(トリフルオロメチル)ベンジル)オキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	588.3
I-158		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((3-(トリフルオロメチル)ベンジル)オキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	588.3
I-159		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((3-メトキシベンジル)オキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	550.4

10

20

30

【表 1 - 4 3】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-160		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(4-(4-メチルピペラジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	595.4
I-161		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((2-メトキシピリミジン-5-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	552.3
I-162		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((5-モルホリノピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	606.5

10

20

30

40

【表 1 - 4 4】




番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-163		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(ベンジルオキシ)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	520.4
I-164		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(ピリダジン-4-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	522.5
I-165		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(ピリダジン-4-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	556.4

10

20

30

【表 1 - 4 5】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-166		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((4-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	589.3
I-167		(S)-6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2'-アミノ-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)-[4,4'-ビピリミジン]-5-カルボニトリル	476.3
I-168		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(ピリミジン-2-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	522.4

10

20

30

【表 1 - 4 6】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-169		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((2-メチルピリミジン-5-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	536.4
I-170		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((6-メチルピリミジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	535.4
I-171		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((2-メチルピリミジン-5-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	522.4
I-172		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((6-メチルピリミジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	521.3





10

20

30

40

【表 1 - 4 7】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-173		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(ピリジン-4-イルメトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	508.6
I-174		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((4-(トリフルオロメチル)ピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	575.4
I-175		3-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(ピリジン-2-イルメトキシ)イソニコチノニトリル	520.4
I-176		4-(2-アクリロイル-7-オキソ-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(6-メチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-モルホリン-4-イルピリミジン-5-カルボニトリル	499.4

10

20

30

40

【表 1 - 4 8】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-177		4-(2-アクリロイル-7-オキソ-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(2-フルオロ-6-ヒドロキシフェニル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	480.3
I-178		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-1-ベンジル-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-オキソ-1,2-ジヒドロピリミジン-5-カルボニトリル	506.2
I-179		6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-1-ベンジル-4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-オキソ-2H-1,4,3-ベンゾピリミジン-5-カルボニトリル	506.2
I-180		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(1-メチルピペリジン-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	497.5

10

20

30

40

【表 1 - 4 9】




番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-181		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((5-(4-メチルピペラジン-1-イル)ピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	605.4
I-182		3-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)イソニコチノニトリル	526.5
I-183		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-(ピロリジン-1-イル)エチル)ピリミジン-5-カルボニトリル	497.4

10

20

30

【表 1 - 5 0】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-184		3-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(3-(ジメチルアミノ)プロポキシ)イソニコチノニトリル	514.4
I-185		2-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-6-(((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ニコチノニトリル	512.4
I-186		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-((5-(4-メチルピペラジン-1-イル)ピリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	619.3

10

20

30

【表 1 - 5 1】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-187		2-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-(ジメチルアミノ)アゼチジン-1-イル)-4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ニコチノニトリル	497.4
I-188		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(4-((R)-3,4-ジメチルピペラジン-1-イル)ピペリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	595.4
I-189		1-(6-(4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-6-モルホリノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	461.4
I-190		1-(6-(5-(シクロプロピルエチニル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	524.5




10

20

30

40

【表 1 - 5 2】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-191		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(4-((S)-3,4-ジメチルピペラジン-1-イル)ピペリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	595.6
I-192		4-(2-メタクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	499.5
I-193		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-(4-((S)-3,4-ジメチルピペラジン-1-イル)ピペリジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	609.5

10

20

30

【表 1 - 5 3】




番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-194		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(4-(4-メチル-4,7-ジアザスピロ[2.5]オクタン-7-イル)ピペリジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	607.6
I-195		1-(6-(6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノー5-(プロパ-1-イン-1-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	499.1
I-196		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(テトラヒドロ-2H-ピラン-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	485.0

10

20

30

【表 1 - 5 4】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-197		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-6-(1,6-ジメチル -1H-インダゾール-7- イル)-2-(4-(4-メチ ル-4,7-ジアザスピロ [2.5]オクタン-7-イ ル)ピペリジン-1-イ ル)ピリミジン-5-カ ルボニトリル	621.4
I-198		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-6-(1,6-ジメチル -1H-インダゾール-7- イル)-2-(4-((R)- 3,4-ジメチルピペラ ジン-1-イル)ピペリ ジン-1-イル)ピリミ ジン-5-カルボニトリ ル	610.0
I-199		3-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-5-(5-メチル-1H- インダゾール-4-イル)-2-(((S)-1-メチル ピロリジン-2-イル) メトキシ)イソニコチ ノニトリル	512.0

10

20

30

【表 1 - 5 5】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-200		(E)-4-(2-(4-(アゼチジン-1-イル)ブタ-2-エノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリン-4-カルボニトリル	554.0
I-201		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(モルホリン-4-カルボニル)ピリミジン-5-カルボニトリル	513.8
I-202		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-2-カルボキサミド	443.6
I-203		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(4-メチルピペラジン-1-カルボニル)ピリミジン-5-カルボニトリル	526.0




10

20

30

40

【表 1 - 5 6】





番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-204		4-(2-((E)-4-(ジメチルアミノ)ブタ-2-エノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	570.7
I-205		4-(2-((E)-4-(アゼチジン-1-イル)ブタ-2-エノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-((S)-1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル	582.0
I-206		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-シクロプロピル-5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-5-カルボニトリル	525.9

10

20

30

【表 1 - 5 7】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-207		5-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-3-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-フェニルイソニコチノニトリル	475.9
I-208		5-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-3-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)-2-フェニルイソニコチノニトリル	489.0
I-209		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-((R)-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	499.2
I-210		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-((S)-2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	499.2





10

20

30

40

【表 1 - 5 8】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-211		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-((S)-3-(ヒドロキシメチル)ピペリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	513.2
I-212		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-((R)-3-(ヒドロキシメチル)ピペリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	513.2
I-213		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(4-((ジメチルアミノ)メチル)ピペリジン-1-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	540.2
I-214		5-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-3-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-フェノキシニコチノニトリル	491.4

10

20

30

40

【表 1 - 5 9】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-215		5-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-3-(1,6-ジメチル -1H-インダゾール-7- イル)-2-フェノキシ イソニコチノニトリ ル	505.4
I-216		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-2-(4-(4-シクロ プロピルピペラジン- 1-イル)ピペリジン- 1-イル)-6-(1,6-ジメ チル-1H-インダゾー ル-7-イル)ピリミジ ン-5-カルボニトリル	621.6
I-217		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-2-(4-(4-シクロ プロピルピペラジン- 1-イル)ピペリジン- 1-イル)-6-(5-メチル -1H-インダゾール-4- イル)ピリミジン-5- カルボニトリル	607.4

10

20




30

40

20

40

【表 1 - 6 1】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-222		5-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-3-(1,6-ジメチル -1H-インダゾール-7- イル)-2-フェネトキ シイソニコチノニト リル	533.4
I-223		5-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-2-ベンジル-3- (5-メチル-1H-インダ ゾール-4-イル)イソ ニコチノニトリル	489.4
I-224		5-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-2-ベンジル-3- (1,6-ジメチル-1H-イ ンダゾール-7-イル) イソニコチノニトリ ル	503.5

10

20

30

40

【表 1 - 6 2】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-225		5-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-2-(ベンジルオキシ)-3-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)イソニコチノニトリル	519.4
I-226		1-(6-(6-(6-メチル-1H-インダゾール-7-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	375.5
I-227		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(6-メチル-1H-インダゾール-7-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	400.9
I-228		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(2-フルオロ-6-ヒドロキシフェニル)ピリミジン-5-カルボニトリル	380.8





10

20

30

40

【表 1 - 6 3】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-229		1-(6-(6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	375.4
I-230		1-(6-(6-(2-フルオロ-6-ヒドロキシフェニル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	355.5
I-231		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	400.6
I-232		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-((5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)エチニル)ピリミジン-5-カルボニトリル	423.2





10

20

30

40

【表 1 - 6 4】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-233		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イル)- 6-(3-ヒドロキシ ナフタレン-1-イル) ピリミジン-5-カルボ ニトリル	412.4
I-234		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イル)- 6-(6-メチル-1H- インダゾール-5-イル) ピリミジン-5-カル ボニトリル	400.4
I-235		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イル)- 6-(5-メチル-1H- インダゾール-6-イル) ピリミジン-5-カル ボニトリル	400.5
I-236		4-(2-アクリロイル- 2,7-ジアザスピロ [3.5]ノナン-7-イル) -6-(5-メチル-1H-イ ンダゾール-4-イル) ピリミジン-5-カルボ ニトリル	414.7

10

20

30

40

【表 1 - 6 5】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-237		4-(2-アクリロイル- 2, 7-ジアザスピロ [3. 5]ノナン-7-イル)-6-(6-メチル-1H-イ ンダゾール-7-イル) ピリミジン-5-カルボ ニトリル	414.5
I-238		4-(2-アクリロイル- 2, 6-ジアザスピロ [3. 4]オクタン-6-イ ル)-6-(3-シクロプロ ピル-5-メチル-1H-イ ンダゾール-4-イル) ピリミジン-5-カルボ ニトリル	440.5
I-239		1-(6-(5-フルオロ-6- (5-メチル-1H-インダ ゾール-4-イル)ピリ ミジン-4-イル)-2, 6- ジアザスピロ [3. 4]オ クタン-2-イル)プロ パ-2-エン-1-オン	393.5
I-240		4-(2-アクリロイル- 2, 7-ジアザスピロ [3. 5]ノナン-7-イル)-6-(2-フルオロ-6- ヒドロキシフェニル) ピリミジン-5-カルボ ニトリル	394.5





10

20

30

40

【表 1 - 6 6】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-241		2-(4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-イル)アセトニトリル	414.9
I-242		4-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(3-アミノ-5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	416.5
I-243		1-(6-(5-メトキシ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	405.9
I-244		2-((6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノピリミジン-4-イル)オキシ)ベンズアミド	405.4





10

20

30

40

【表 1 - 6 7】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-245		1-(6-(5-ヒドロキシ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	391.4
I-246		4-(2-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(2-(ヒドロキシメチル)ピロリジン-1-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	369.2
I-247		(R)-1-(6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノピリミジン-4-イル)ピロリジン-2-カルボキサミド	382.2
I-248		(S)-1-(6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノピリミジン-4-イル)ピロリジン-2-カルボキサミド	383.3





10

20

30

40

【表 1 - 6 8】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-249		1-(6-(5-シクロプロ ピル-6-(5-メチル- 1H-インダゾール-4- イル)ピリミジン-4- イル)-2,6-ジアザス ピロ[3.4]オクタン- 2-イル)プロパ-2-エ ン-1-オン	415.5
I-250		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-6-(5-メチル-1H- ベンゾ[d]イミダゾー ル-4-イル)ピリミジ ン-5-カルボニトリル	
I-251		1-(6-(5-(ヒドロキシ メチル)-6-(5-メチル -1H-インダゾール-4- イル)ピリミジン-4- イル)-2,6-ジアザス ピロ[3.4]オクタン- 2-イル)プロパ-2-エ ン-1-オン	405.3
I-252		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-2-(5-メチル-1H- インダゾール-4-イル)ニコチノニトリル	399.5





10

20

30

40

【表 1 - 6 9】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-253		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-6-(5-メチル-1H- インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カル ボキサミド	418.4
I-254		4-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-N,N-ジメチル-6- (5-メチル-1H-インダ ゾール-4-イル)ピリ ミジン-5-カルボキサ ミド	446.4
I-255		3-((6-(2-アクリロイ ル-2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-5-シアノピリミ ジン-4-イル)オキシ) ベンズアミド	405.4
I-256		3-(2-アクリロイル- 2,6-ジアザスピロ [3.4]オクタン-6-イ ル)-5-(5-メチル-1H- インダゾール-4-イル)イソニコチノニトリ ル	399.4





10

20

30

40

【表 1 - 7 0】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-257		1-(6-(5-メチル-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	389.8
I-258		1-(6-(5-(ジメチルアミノ)メチル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	432.4
I-259		1-(6-(6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-5-(2,2,2-トリフルオロエチル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	457.4
I-260		1-(6-(6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-5-(トリフルオロメチル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	443.3





10

20

30

40

【表 1 - 7 1】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-261		1-(6-(6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-5-(ピロリジン-1-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	444.4
I-262		1-(6-(5-エチル-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	403.4
I-263		3-(2-アクリロイル-2,7-ジアザスピロ[3.5]ノナン-7-イル)-5-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)イソニコチノニトリル	413.4
I-264		3-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)イソニコチノニトリル	413.4





10

20

30

40

【表 1 - 7 2】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-265		3-(2-アクリロイル-2,7-ジアザスピロ[3.5]ノナン-7-イル)-5-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)イソニコチノニトリル	427.4
I-266		(E)-4-(2-(ブタ-2-エノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	414.4
I-267		2-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ニコチノニトリル	399.5
I-268		1-(6-(5-エチニル-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	399.5





10

20

30

40

【表 1 - 7 3】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-269		3-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(2-フルオロ-6-ヒドロキシフェニル)イソニコチノニトリル	379.5
I-270		3-(2-(ブタ-2-イノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(2-フルオロ-6-ヒドロキシフェニル)イソニコチノニトリル	391.6
I-271		3-(2-(ブタ-2-イノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(1,6-ジメチル-1H-インダゾール-7-イル)イソニコチノニトリル	425.4
I-272		3-(2-(ブタ-2-イノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)イソニコチノニトリル	411.4





10

20

30

40

【表 1 - 7 4】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-273		4-(2-アクリロイル-7-オキソ-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	414.4
I-274		1-(6-(2-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	375.8
I-275		1-(6-(4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-2-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパ-2-エン-1-オン	375.4
I-276		4-(2-アクリロイル-7-オキソ-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	414.4





10

20

30

40

【表 1 - 7 5】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-277		3-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(3-アミノ-5-メチル-1H-インダゾール-4-イル) イソニコチノニトリル	414.4
I-278		3-(3-アミノ-5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-5-(2-(ブタ-2-イノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル) イソニコチノニトリル	426.1
I-279		(E)-3-(2-(4-(ジメチルアミノ)ブタ-2-エノイル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル) イソニコチノニトリル	456.5
I-280		1-(6-(4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-1,3,5-トリアジン-2-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル) プロパ-2-エン-1-オン	376.5

10

20

30

40

【表 1 - 7 6】

番号	構造	名称	[M+H] ⁺
I-281		4-(2-(2-アクリロイル-1-イソプロピル-2,7-ジアザスピロ[3.5]ノナン-7-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル	456.2

10

【0211】

本説明では、記載の式の置換基および／または可変物の組み合わせは、かかる寄与によって安定な化合物が得られる場合に限り、容認されると理解される。

【0212】

さらに、遊離塩基または遊離酸の形態で存在する本発明の全ての化合物を、当業者に公知の方法による適切な無機または有機の塩基または酸を用いた処理によってその薬学的に許容され得る塩に変換することができる。本発明の化合物の塩を、標準的技術によってその遊離塩基形態または遊離酸形態に変換することができる。

20


【0213】

構造 (I) の化合物は、当該分野で公知の方法にしたがって調製され得る。例えば、構造 (I) の化合物は、国際公開第 2015/054572 号 (この全開示は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる) に開示されている方法と類似の方法にしたがって調製され得る。一般に、出発成分を、Sigma Aldrich、Lancaster Synthesis, Inc.、Maybridge、Matrix Scientific、TCI および Fluorochem USA などの供給者から入手することができるか、当業者に公知の情報源にしたがって合成することができるか (例えば、Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, 5th edition (Wiley, December 2000) を参照のこと)、または本発明に記載されているように調製することができる。

30

一般的な反応スキーム 1 (「方法 A」)

【化 5 1】



【0214】

構造 (I) の化合物の実施形態は、一般的な反応スキーム 1 (「方法 A」) (式中、 R^1 、 L^1 、 L^2 、 L^3 、 A^1 、 A^2 、 A^3 、 A^4 、 G^1 、 G^2 、 E 、 W 、 X 、 Y 、 Z 、 m および n は、本明細書中で定義の通りである) にしたがって調製され得る。 X^1 、 X^2 、 Y^1 、 Y^2 および Y^3 は、反応スキーム全体との適合性ならびに所望の反応選択性および反応位置に基づいて選択される反応性の官能基 (例えば、 F 、 Cl 、 Br 、ボロン酸/エステル、酸塩化物など) である。 PG は、保護基 (例えば、 Boc 、 $Fmoc$ など) を表し、その使用は当該分野で公知である。一般的な反応スキーム 1 に示されているように、化合物 $A-1$ は、公知の方法にしたがって調製されるか、または市販の試薬として購入し、適切な求核剤 (例えば、 Y^1 が第二級アミンである $A-2$) と結合して $A-3$ を形成する。次いで、所望の $-L^3-R^1$ 置換基を鈴木カップリングによって付加して (例えば、 Y^3 はボロン酸部分であり、 X^1 は Cl である)、 $A-4$ を得てもよい。保護基の除去 (例えば、 TFA または塩酸による Boc の除去) の後、適切に置換された E 部分 (例えば、 X^3-E は塩化アクリロイルまたはアクリル酸無水物である) との反応によって、構造 (I) の所望の化合物を得る。あるいは、任意の工程において W 、 X 、 Y および/または Z で示される位置に置換基を付加するように上記の反応スキームを改変することもできる。

【0215】

当業者は、本明細書中に記載の化合物の調製プロセスにおいて、中間体化合物の官能基を適切な保護基によって保護する必要があると認識するであろう。かかる官能基には、ヒドロキシ、アミノ、メルカプト、およびカルボン酸が含まれるが、これらに限定されない。ヒドロキシに適切な保護基には、トリアルキルシリルまたはジアリールアルキルシリル (例えば、 t -ブチルジメチルシリル、 t -ブチルジフェニルシリル、またはトリメチルシリル)、テトラヒドロピラニル、およびベンジルなどが含まれる。アミノ、アミジノ、およびグアニジノに適切な保護基には、 t -ブトキシカルボニルおよびベンジロキシカルボニルなどが含まれる。メルカプトに適切な保護基には、 $-C(O)-R''$ (式中、 R'' は、アルキル、アリール、またはアリールアルキルである)、 p -メトキシベンジル、およびトリチルなどが含まれる。カルボン酸に適切な保護基には、アルキルエステル、アリールエステル、またはアリールアルキルエステルが含まれる。保護基を、当業者に公知であり、本明細書中に記載の標準的技術にしたがって必要に応じて付加または除去する。保護基の使用は、Green, T. W. and P. G. M. Wutz, *Protective Groups in Organic Synthesis* (199

9), 3rd Ed., Wileyに詳述されている。当業者が認識するように、保護基はまた、ポリマー樹脂 (Wang 樹脂、Rink 樹脂、または2-クロロトリチルクロリド樹脂など) であり得る。

【0216】

当業者は、かかる本発明の化合物の保護された誘導体自体は薬理学的活性を保有しなくてよいが、誘導体を哺乳動物に投与し、体内で代謝後に薬理学的に活性な本発明の化合物を形成することができることも認識するであろう。したがって、かかる誘導体を、「プロドラッグ」と記載することができる。本発明の化合物のプロドラッグは、本発明の実施形態の範囲内に含まれる。

【0217】

薬学的組成物

他の実施形態は、薬学的組成物に関する。薬学的組成物は、前述の化合物のうちのいずれか1つ (または複数) および薬学的に許容され得るキャリアを含む。いくつかの実施形態では、薬学的組成物は経口投与のために製剤化されている。他の実施形態では、薬学的組成物は注射のために製剤化されている。なおさらなる実施形態では、薬学的組成物は、本明細書中に開示の化合物およびさらなる治療薬 (例えば、抗がん剤) を含む。かかる治療薬の非限定的な例を、本明細書中の以下に記載する。

【0218】

適切な投与経路には、経口、静脈内、直腸、エアロゾル、非経口、眼、肺、経粘膜、経皮、膺、耳、鼻、および局所への投与が含まれるが、これらに限定されない。さらに、ほんの一例として、非経口送達には、筋肉内、皮下、静脈内、髄内への注射、ならびに髄腔内、直接的な脳室内、腹腔内、リンパ管内、および鼻腔内への注射が含まれる。

【0219】

一定の実施形態では、本明細書中に記載の化合物を、全身様式よりもむしろ局所に、例えば、しばしばデポ調製物または徐放製剤に含めた化合物の器官への直接注射を介して投与する。特定の実施形態では、長時間作用性製剤を、埋め込み (例えば、皮下または筋肉内) または筋肉内注射によって投与する。さらに、他の実施形態では、薬物を、標的化された薬物送達系、例えば、器官特異的抗体をコーティングしたリポソームに含めて送達する。かかる実施形態では、リポソームは、器官にターゲティングされ、器官によって選択的に取り込まれる。さらに他の実施形態では、本明細書中に記載の化合物を、急速放出製剤の形態、長期放出製剤の形態、または中期放出製剤の形態で提供する。さらに他の実施形態では、本明細書中に記載の化合物を局所投与する。

【0220】

本発明の化合物は、広い投薬範囲で有効である。例えば、成人の処置では、0.01~1000mg/日、0.5~100mg/日、1~50mg/日、および5~40mg/日の投薬量がいくつかの実施形態で使用される投薬量の例である。例示的投薬量は10~30mg/日である。正確な投薬量は、投与経路、化合物が投与される形態、処置すべき被験体、処置すべき被験体の体重、ならびに主治医の優先度および経験に依存する。

【0221】

いくつかの実施形態では、本発明の化合物を、単回用量で投与する。典型的には、薬剤を迅速に導入するためのかかる投与は注射 (例えば、静脈内注射) による。しかし、必要に応じて他の経路を使用する。本発明の化合物の単回用量を、急性状態の処置のために使用することもできる。

【0222】

いくつかの実施形態では、本発明の化合物を、複数回用量で投与する。いくつかの実施形態では、投与は、1日あたりおよそ1回、2回、3回、4回、5回、6回、または6回を超える。他の実施形態では、投与は、およそ1ヶ月に1回、2週間毎に1回、1週間に1回、1日おきに1回である。別の実施形態では、本発明の化合物および別の薬剤を共に約1回/日~約6回/日投与する。別の実施形態では、本発明の化合物および薬剤の投与を、約7日未満継続する。さらに別の実施形態では、投与を、約6日間、10日間、14

10

20

30

40

50

日間、28日間、2ヶ月間、6ヶ月間、または1年間を超えて継続する。いくつかの場合、継続投与を行い、必要な限り投与を維持する。

【0223】

本発明の化合物の投与を、必要な限り継続することができる。いくつかの実施形態では、本発明の化合物を、1、2、3、4、5、6、7、14、または28日間を超えて投与する。いくつかの実施形態では、本発明の化合物を、28、14、7、6、5、4、3、2、または1日未満投与する。いくつかの実施形態では、本発明の化合物を、例えば、慢性効果を得る処置のために継続して長期に投与する。

【0224】

いくつかの実施形態では、本発明の化合物を、複数の投薬量で投与する。被験体間で化合物の薬物動態が変動するので、最適な治療のためには投与レジメンの個別化が必要であることが当該分野で公知である。本開示を考慮した日常的試験によって本発明の化合物の投与レジメンを見出すことができる。

【0225】

いくつかの実施形態では、本明細書中に記載の化合物を、薬学的組成物に製剤化する。特定の実施形態では、薬学的組成物を、活性化合物の、薬学的に使用することができる調製物への加工を容易にする賦形剤および佐剤を含む1つまたはそれを超える生理学的に許容され得るキャリアを使用する従来の様式で製剤化する。適切な製剤は、選択した投与経路に依存する。任意の薬学的に許容され得る技術、キャリア、および賦形剤を、本明細書中に記載の薬学的組成物の製剤化に適切にように使用する。Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Ninth Ed (Easton, Pa.: Mack Publishing Company, 1995); Hoover, John E., Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack Publishing Co., Easton, Pennsylvania 1975; Liberman, H. A. and Lachman, L., Eds., Pharmaceutical Dosage Forms, Marcel Dekker, New York, N. Y., 1980; および Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Seventh Ed. (Lippincott Williams & Wilkins 1999)。

【0226】

構造(I)の化合物および薬学的に許容され得る希釈剤、賦形剤、またはキャリアを含む薬学的組成物を本明細書中に提供する。一定の実施形態では、記載の化合物を、併用療法を目的として構造(I)の化合物を他の有効成分と混合した薬学的組成物として投与する。以下の併用療法の節および本開示を通して記載の活性物質の全ての組み合わせが本明細書中に含まれる。特定の実施形態では、薬学的組成物は、1つまたはそれを超える構造(I)の化合物を含む。

【0227】

薬学的組成物は、本明細書中で使用する場合、構造(I)の化合物の他の化学成分(キャリア、安定剤、希釈剤、分散剤、懸濁化剤、増粘剤、および/または賦形剤など)との混合物をいう。一定の実施形態では、薬学的組成物は、化合物の生物への投与を容易にする。いくつかの実施形態では、本明細書中に提供した処置方法または使用方法の実施の際、治療有効量の明細書中に提供した構造(I)の化合物を、薬学的組成物に含めて処置すべき疾患、障害、または病状を有する哺乳動物に投与する。特定の実施形態では、哺乳動物はヒトである。一定の実施形態では、治療有効量は、疾患の重症度、被験体の年齢および相対的な健康状態、使用する化合物の効力、ならびに他の要因に応じて変動する。本明細書中に記載の化合物を単独で使用するか、混合物の成分として1つまたはそれを超える治療薬と組み合わせて使用する。

【0228】

一実施形態では、1つまたはそれを超える構造(I)の化合物は、水溶液に含めて製剤

10

20

30

40

50

化されている。特定の実施形態では、水溶液は、ほんの一例として、生理学的に適合性を示す緩衝液（ハanks液、リンゲル液、または生理食塩緩衝液など）から選択される。他の実施形態では、1つまたはそれを超える構造（I）の化合物を、経粘膜投与のために製剤化する。特定の実施形態では、経粘膜製剤は、浸透すべきバリアに適切な浸透剤を含む。本明細書中に記載の化合物を他の非経口注射のために製剤化するさらに他の実施形態では、適切な製剤は、水溶液または非水溶液を含む。特定の実施形態では、かかる溶液は、生理学的に適合する緩衝液および／または賦形剤を含む。

【0229】

別の実施形態では、本明細書中に記載の化合物は、経口投与のために製剤化されている。本明細書中に記載の化合物は、活性化合物を、例えば、薬学的に許容され得るキャリアまたは賦形剤と組み合わせることにより製剤化されている。種々の実施形態では、本明細書中に記載の化合物は、経口剤形で製剤化され、この剤形には、ほんの一例として、錠剤、散剤、丸薬、糖衣錠、カプセル、液体、ゲル、シロップ、エリキシル、スラリー、および懸濁液などが含まれる。

10

【0230】

一定の実施形態では、経口使用用の薬学的調製物を、1つまたはそれを超える固体賦形剤を1つまたはそれを超える本明細書中に記載の化合物と混合し、得られた混合物を必要に応じて粉碎し、必要に応じて適切な佐剤の添加後に顆粒の混合物を加工して錠剤または糖衣錠コアを得ることによって得る。適切な賦形剤は、特に、糖（ラクトース、スクロース、マンニトール、またはソルビトールが含まれる）；セルロース調製物（例えば、トウモロコシデンプン、コムギデンプン、コメデンプン、ジャガイモデンプン、ゼラチン、トラガcantゴム、メチルセルロース、微結晶性セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウムなど）；またはその他（ポリビニルピロリドン（PVPまたはポビドン）またはリン酸カルシウムなど）などの充填剤である。特定の実施形態では、崩壊剤を必要に応じて添加する。崩壊剤には、ほんの一例として、架橋クロスカルメロースナトリウム、ポリビニルピロリドン、寒天、またはアルギン酸またはその塩（アルギン酸ナトリウムなど）が含まれる。

20

【0231】

1つの実施形態では、1つまたはそれを超える適切なコーティングを有する剤形（糖衣錠コアおよび錠剤など）を提供する。特定の実施形態では、濃縮糖溶液を、剤形のコーティングのために使用する。糖溶液は、必要に応じて、さらなる成分（ほんの一例として、アラビアゴム、タルク、ポリビニルピロリドン、カルボポールゲル、ポリエチレングリコール、および／または二酸化チタン、ラッカー溶液、および適切な有機溶媒または溶媒混合物など）を含む。染料および／または色素も、必要に応じて、識別目的のためにコーティングに添加する。さらに、染料および／または色素を、必要に応じて、活性化合物の用量の異なる組み合わせを特徴づけるために使用する。

30

【0232】

一定の実施形態では、治療有効量の少なくとも1つの本明細書中に記載の化合物は、他の経口剤形に製剤化されている。経口剤形には、ゼラチンで作製されたプッシュフィットカプセルならびにゼラチンおよび可塑剤（グリセロールまたはソルビトールなど）で作製された密封軟カプセルが含まれる。特定の実施形態では、プッシュフィットカプセルは、1つまたはそれを超える充填剤との混合物中に有効成分を含む。充填剤には、ほんの一例として、ラクトース、結合剤（デンプンなど）、および／または滑沢剤（タルクまたはステアリン酸マグネシウムなど）、ならびに、必要に応じて、安定剤が含まれる。他の実施形態では、軟カプセルは、適切な液体に溶解または懸濁した1つまたはそれを超える活性化合物を含む。適切な液体には、ほんの一例として、1つまたはそれを超える脂肪油、流動パラフィン、または液体ポリエチレングリコールが含まれる。さらに、安定剤を必要に応じて添加する。

40

【0233】

他の実施形態では、治療有効量の少なくとも1つの本明細書中に記載の化合物は、口内

50

または舌下投与のために製剤化されている。口内または舌下投与に適切な製剤には、ほんの一例として、錠剤、ロゼンジ、またはゲルが含まれる。さらなる他の実施形態では、本明細書中に記載の化合物は、非経口（parental）注射のために製剤化されている（ボラス注射または連続注入に適切な製剤が含まれる）。特定の実施形態では、注射用製剤は、単位剤形（例えば、アンプル中）または多用量容器中に存在する。防腐剤を、必要に応じて、注射製剤に添加する。さらなる他の実施形態では、薬学的組成物は、無菌の油性または水性のビヒクルの懸濁液、溶液、または乳濁液として非経口注射に適切な形態で製剤化されている。非経口注射製剤は、必要に応じて、製剤化剤（懸濁化剤、安定剤、および／または分散剤など）を含む。特定の実施形態では、非経口投与のための薬学的製剤には、水溶性形態の活性化合物の水溶液が含まれる。さらなる実施形態では、活性化合物（例えば、構造（I）の化合物）の懸濁液を、適切な油性注射懸濁液として調製する。本明細書中に記載の薬学的組成物での使用に適切な親油性の溶媒またはビヒクルには、ほんの一例として、脂肪油（ゴマ油など）、または合成脂肪酸エステル（オレイン酸エチルまたはトリグリセリドなど）、またはリポソームが含まれる。一定の特定の実施形態では、水性注射懸濁液は、懸濁液の粘度を増大させる物質（カルボキシメチルセルロースナトリウム、ソルビトール、またはデキストランなど）を含む。必要に応じて、懸濁液は、適切な安定剤または高濃度の溶液を調製可能にするために化合物の溶解性を増大させる剤を含む。あるいは、他の実施形態では、有効成分は、使用前に適切なビヒクル（例えば、無菌発熱性物質不含水）で構成するための粉末形態である。

10

【0234】

20

さらなる他の実施形態では、構造（I）の化合物を局所投与する。本明細書中に記載の化合物は、種々の局所投与可能な組成物（溶液、懸濁液、ローション、ゲル、ペースト、薬用スティック、香膏、クリーム、または軟膏など）に製剤化されている。かかる薬学的組成物は、必要に応じて、可溶化剤、安定剤、張度増強剤、緩衝剤、および防腐剤を含む。

【0235】

さらに他の実施形態では、構造（I）の化合物は、経皮投与のために製剤化されている。特定の実施形態では、経皮製剤は、経皮送達デバイスおよび経皮送達パッチを使用し、ポリマーまたは接着剤に溶解および／または分散される親油性乳濁液または緩衝水溶液であり得る。種々の実施形態では、かかるパッチを、医薬品の連続的、拍動性、またはオンデマンド型の送達のために構築する。さらなる実施形態では、構造（I）の化合物を、イオン導入パッチなどを用いて経皮送達する。一定の実施形態では、経皮パッチにより、構造（I）の化合物が制御送達される。特定の実施形態では、律速膜の使用またはポリマーマトリックスまたはゲル内に化合物を捕捉することによって吸収速度を低下させる。別の実施形態では、吸収促進剤を使用して吸収を増大させる。吸収促進剤またはキャリアには、皮膚の通過を補助する薬学的に許容され得る吸収性溶媒が含まれる。例えば、1つの実施形態では、経皮デバイスは、裏打ち部材、必要に応じてキャリアと共に化合物を含むリザーバ、長期間にわたって制御された所定の速度で宿主の皮膚に化合物を送達させるための必要に応じた律速バリア、および皮膚にデバイスを固定する手段を含む帯具の形態である。

30

40

【0236】

他の実施形態では、構造（I）の化合物は、吸入による投与のために製剤化されている。吸入による投与に適切な種々の形態には、エアロゾル、ミスト、または粉末が含まれるが、これらに限定されない。任意の構造（I）の化合物のいずれかの薬学的組成物は、適切な噴射剤（例えば、ジクロロジフルオロメタン、トリクロロフルオロメタン、ジクロロテトラフルオロエタン、二酸化炭素、または他の適切なガス）を使用した加圧パックまたは噴霧器から提供するエアロゾルスプレーの形態で送達させることが都合が良い。特定の実施形態では、加圧エアロゾルの投薬単位を、一定量を送達させるための弁を設けることによって決定する。一定の実施形態では、ほんの一例として、吸入器または注入器で用いる、化合物と適切な粉末基剤（ラクトースまたはデンプンなど）との粉末混合物を含むぜ

50

ラチンなどのカプセルおよびカートリッジが製剤化される。

【0237】

さらなる他の実施形態では、構造（I）の化合物は、従来の坐剤基剤（カカオバターまたは他のグリセリドなど）および合成ポリマー（ポリビニルピロリドンおよびPEGなど）を含む直腸組成物（浣腸、直腸ゲル、直腸フォーム、直腸エアロゾル、坐剤、ゼリー坐剤、または停留浣腸など）に含めて製剤化されている。組成物の坐剤形態では、低融点ワックス（必要に応じてカカオバターと組み合わせた脂肪酸グリセリドの混合物などであるが、これらに限定されない）が最初に融解する。

【0238】

一定の実施形態では、薬学的組成物は、活性化合物の加工を容易にする賦形剤および佐剤を含む1つまたはそれを超える生理学的に許容され得るキャリアを使用した任意の従来の様式で薬学的に使用することができる調製物に製剤化されている。適切な製剤は、選択した投与経路に依存する。任意の薬学的に許容され得る技術、キャリア、および賦形剤を、必要に応じて適宜使用する。構造（I）の化合物を含む薬学的組成物を、従来の様式で（ほんの一例として、従来の混合、溶解、造粒、糖衣錠作製、湿式粉碎、乳化、カプセル化、捕捉、または圧縮プロセスなどによる）製造する。

【0239】

薬学的組成物は、少なくとも1つの薬学的に許容され得るキャリア、希釈剤、または賦形剤および有効成分としての少なくとも1つの本明細書中に記載の構造（I）の化合物を含む。有効成分は、遊離酸形態または遊離塩基形態または薬学的に許容され得る塩の形態である。さらに、本明細書中に記載の方法および薬学的組成物は、N-オキシド、結晶形態（多形としても公知）、および同じタイプの活性を有するこれらの化合物の活性代謝産物の使用を含む。本明細書中に記載の化合物の全ての互変異性体が本明細書中に示す化合物の範囲内に含まれる。さらに、本明細書中に記載の化合物は、非溶媒和形態および薬学的に許容され得る溶媒（水およびエタノールなど）との溶媒和形態を含む。本明細書中に示す化合物の溶媒和形態も本明細書中に開示されると見なされる。さらに、薬学的組成物は、必要に応じて、他の医薬または医薬品、キャリア、アジュバント（防腐剤、安定剤、湿潤剤、または乳化剤、溶解促進剤、浸透圧を調節するための塩、緩衝剤、および／または他の薬学的に有益な物質など）を含む。

【0240】

本明細書中に記載の化合物を含む組成物の調製方法は、固体、半固体、または液体を形成するための1つまたはそれを超える不活性の薬学的に許容され得る賦形剤またはキャリアを使用して化合物を製剤化する工程を含む。固体組成物には、散剤、錠剤、分散性顆粒剤、カプセル、カシェ、および坐剤が含まれるが、これらに限定されない。液体組成物には、化合物が溶解した溶液、化合物を含む乳濁液、または本明細書中に開示の化合物を含むリポソーム、ミセル、またはナノ粒子を含む溶液が含まれる。半固体組成物には、ゲル、懸濁液、およびクリームが含まれるが、これらに限定されない。本明細書中に記載の薬学的組成物の形態には、溶液または懸濁液、使用前に液体に含めて溶液または懸濁液にするのに適切な固体、または乳濁液が含まれる。これらの組成物はまた、必要に応じて、少量の非毒性補助物質（湿潤剤または乳化剤、およびpH緩衝剤など）を含む。

【0241】

いくつかの実施形態では、少なくとも1つの構造（I）の化合物を含む薬学的組成物は、実例として、薬剤が溶液、懸濁液、またはその両方に存在する液体の形態を取る。典型的には、組成物を溶液または懸濁液として投与した場合、薬剤の第1の部分が溶液中に存在し、薬剤の第2の部分が液体マトリックス中の懸濁液中に、粒状の形態で存在する。いくつかの実施形態では、液体組成物にはゲル製剤が含まれる。他の実施形態では、液体組成物は水性である。

【0242】

一定の実施形態では、有用な水性懸濁液は、懸濁化剤として1つまたはそれを超えるポリマーを含む。有用なポリマーには、水溶性ポリマー（セルロースポリマー（例えば、ヒ

10

20

30

40

50

ドロキシプロピルメチルセルロース) など) および水不溶性ポリマー (架橋カルボキシル含有ポリマーなど) が含まれる。本明細書中に記載の一定の薬学的組成物は、例えば、カルボキシメチルセルロース、カルボマー (アクリル酸ポリマー)、ポリ (メチルメタクリレート)、ポリアクリルアミド、ポリカルボフィル、アクリル酸/ブチルアクリレートコポリマー、アルギン酸ナトリウム、およびデキストランから選択される粘膜付着性ポリマーを含む。

【0243】

有用な薬学的組成物は、必要に応じて、構造 (I) の化合物の溶解性を補助する溶解補助剤も含む。用語「溶解補助剤」には、一般に、薬剤のミセル溶液または真溶液を形成する剤が含まれる。一定の許容され得る非イオン性界面活性剤 (例えば、ポリソルベート 80) は、眼科的に許容され得るグリコール、ポリグリコール (例えば、ポリエチレングリコール 400)、およびグリコールエーテルと同様に、溶解補助剤として有用である。

10

【0244】

さらに、有用な薬学的組成物は、必要に応じて、1つまたはそれを超える pH 調整剤または緩衝剤 (酢酸、ホウ酸、クエン酸、乳酸、リン酸、および塩酸などの酸; 水酸化ナトリウム、リン酸ナトリウム、ホウ酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム、乳酸ナトリウム、およびトリス-ヒドロキシメチルアミノメタンなどの塩基; ならびにシトレート/デキストロース、重炭酸ナトリウム、および塩化アンモニウムなどのバッファが含まれる) を含む。かかる酸、塩基、およびバッファは、組成物の pH を許容され得る範囲内に維持するために必要な量で含まれる。

20

【0245】

さらに、有用な組成物はまた、必要に応じて、組成物の重量オスモル濃度を許容され得る範囲にするのに必要な量で1つまたはそれを超える塩を含む。かかる塩には、ナトリウム、カリウム、またはアンモニウムの陽イオンおよび塩素、クエン酸、アスコルビン酸、ホウ酸、リン酸、重炭酸、硫酸、チオ硫酸、または亜硫酸水素の陰イオンを有する塩が含まれ、適切な塩には、塩化ナトリウム、塩化カリウム、チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸水素ナトリウム、および硫酸アンモニウムが含まれる。

【0246】

他の有用な薬学的組成物は、必要に応じて、微生物の活動を阻害するための1つまたはそれを超える防腐剤を含む。適切な防腐剤には、水銀含有物質 (メルフェンおよびチオメルサルなど); 安定化二酸化塩素; ならびに第四級アンモニウム化合物 (塩化ベンザルコニウム、セチルトリメチルアンモニウムブロミド、およびセチルピリジニウムクロリドなど) が含まれる。

30

【0247】

さらなる他の有用な組成物は、物理的安定性を増強するか他の目的のための1つまたはそれを超える界面活性剤を含む。適切な非イオン性界面活性剤には、ポリオキシエチレン脂肪酸グリセリドおよび植物油 (例えば、ポリオキシエチレン (60) 硬化ヒマシ油); ならびにポリオキシエチレンアルキルエーテルおよびアルキルフェニルエーテル (例えば、オクトキシノール 10、オクトキシノール 40) が含まれる。

【0248】

さらに他の有用な組成物は、必要に応じて化学的安定性を増強するための1つまたはそれを超える抗酸化剤を含む。適切な抗酸化剤には、ほんの一例として、アスコルビン酸およびメタ重亜硫酸ナトリウムが含まれる。

40

【0249】

一定の実施形態では、水性懸濁液組成物を、単回用量の再度密封できない容器にパッケージングする。あるいは、組成物中に防腐剤を含むことが典型的である場合、複数回用量の再度密封可能な容器を使用する。

【0250】

別の実施形態では、疎水性薬学的化合物のための他の送達系を使用する。リポソームおよび乳濁液は、本明細書中で有用な送達用ビヒクルまたはキャリアの例である。一定の実

50

施形態では、N-メチルピロリドンなどの有機溶媒も使用する。さらなる実施形態では、本明細書中に記載の化合物を、徐放系（治療薬を含む固体疎水性ポリマーの半透性マトリックスなど）を使用して送達させる。種々の徐放材料が本明細書中で有用である。いくつかの実施形態では、徐放カプセルは、数週間から100日間までにわたって化合物を放出する。治療試薬の化学的性質および生物学的安定性のために、さらなるタンパク質安定化戦略を使用する。

【0251】

一定の実施形態では、本明細書中に記載の製剤は、1つまたはそれを超える抗酸化剤、金属キレート剤、チオール含有化合物、および／または他の一般的な安定剤を含む。かかる安定剤の例には、以下が含まれるが、これらに限定されない：（a）約0.5%～約2% w/v グリセロール、（b）約0.1%～約1% w/v メチオニン、（c）約0.1%～約2% w/v モノチオグリセロール、（d）約1 mM～約10 mM EDTA、（e）約0.01%～約2% w/v アスコルビン酸、（f）0.003%～約0.02% w/v ポリソルベート80、（g）0.001%～約0.05% w/v ポリソルベート20、（h）アルギニン、（i）ヘパリン、（j）硫酸デキストラン、（k）シクロデキストリン、（l）ペントサンポリサルファートおよび他のヘパリノイド、（m）マグネシウムおよび亜鉛などの2価の陽イオン；または（n）その組み合わせ。

10

【0252】

いくつかの実施形態では、本発明の薬学的組成物中に提供された1つまたはそれを超える化合物の濃度は、w/w、w/v、またはv/vで、100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、19%、18%、17%、16%、15%、14%、13%、12%、11%、10%、9%、8%、7%、6%、5%、4%、3%、2%、1%、0.5%、0.4%、0.3%、0.2%、0.1%、0.09%、0.08%、0.07%、0.06%、0.05%、0.04%、0.03%、0.02%、0.01%、0.009%、0.008%、0.007%、0.006%、0.005%、0.004%、0.003%、0.002%、0.001%、0.0009%、0.0008%、0.0007%、0.0006%、0.0005%、0.0004%、0.0003%、0.0002%、または0.0001%未満である。

20

【0253】

いくつかの実施形態では、1つまたはそれを超える本発明の化合物の濃度は、w/w、w/v、またはv/vで、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、19.75%、19.50%、19.25%、19%、18.75%、18.50%、18.25%、18%、17.75%、17.50%、17.25%、17%、16.75%、16.50%、16.25%、16%、15.75%、15.50%、15.25%、15%、14.75%、14.50%、14.25%、14%、13.75%、13.50%、13.25%、13%、12.75%、12.50%、12.25%、12%、11.75%、11.50%、11.25%、11%、10.75%、10.50%、10.25%、10%、9.75%、9.50%、9.25%、9%、8.75%、8.50%、8.25%、8%、7.75%、7.50%、7.25%、7%、6.75%、6.50%、6.25%、6%、5.75%、5.50%、5.25%、5%、4.75%、4.50%、4.25%、4%、3.75%、3.50%、3.25%、3%、2.75%、2.50%、2.25%、2%、1.75%、1.50%、1.25%、1%、0.5%、0.4%、0.3%、0.2%、0.1%、0.09%、0.08%、0.07%、0.06%、0.05%、0.04%、0.03%、0.02%、0.01%、0.009%、0.008%、0.007%、0.006%、0.005%、0.004%、0.003%、0.002%、0.001%、0.0009%、0.0008%、0.0007%、0.0006%、0.0005%、0.0004%、0.0003%、0.0002%、または0.0001%を超える。

30

40

【0254】

いくつかの実施形態では、1つまたはそれを超える本発明の化合物の濃度は、w/w、

50

w/v、またはv/vで、およそ0.0001%～およそ50%、およそ0.001%～およそ40%、およそ0.01%～およそ30%、およそ0.02%～およそ29%、およそ0.03%～およそ28%、およそ0.04%～およそ27%、およそ0.05%～およそ26%、およそ0.06%～およそ25%、およそ0.07%～およそ24%、およそ0.08%～およそ23%、およそ0.09%～およそ22%、およそ0.1%～およそ21%、およそ0.2%～およそ20%、およそ0.3%～およそ19%、およそ0.4%～およそ18%、およそ0.5%～およそ17%、およそ0.6%～およそ16%、およそ0.7%～およそ15%、およそ0.8%～およそ14%、およそ0.9%～およそ12%、およそ1%～およそ10%の範囲である。

【0255】

10

いくつかの実施形態では、1つまたはそれを超える本発明の化合物の濃度は、w/w、w/v、またはv/vで、およそ0.001%～およそ10%、およそ0.01%～およそ5%、およそ0.02%～およそ4.5%、およそ0.03%～およそ4%、およそ0.04%～およそ3.5%、およそ0.05%～およそ3%、およそ0.06%～およそ2.5%、およそ0.07%～およそ2%、およそ0.08%～およそ1.5%、およそ0.09%～およそ1%、およそ0.1%～およそ0.9%の範囲である。

【0256】

いくつかの実施形態では、1つまたはそれを超える本発明の化合物の量は、10g、9.5g、9.0g、8.5g、8.0g、7.5g、7.0g、6.5g、6.0g、5.5g、5.0g、4.5g、4.0g、3.5g、3.0g、2.5g、2.0g、1.5g、1.0g、0.95g、0.9g、0.85g、0.8g、0.75g、0.7g、0.65g、0.6g、0.55g、0.5g、0.45g、0.4g、0.35g、0.3g、0.25g、0.2g、0.15g、0.1g、0.09g、0.08g、0.07g、0.06g、0.05g、0.04g、0.03g、0.02g、0.01g、0.009g、0.008g、0.007g、0.006g、0.005g、0.004g、0.003g、0.002g、0.001g、0.0009g、0.0008g、0.0007g、0.0006g、0.0005g、0.0004g、0.0003g、0.0002g、または0.0001gに等しいか、あるいはこれら未満である。

20

【0257】

いくつかの実施形態では、1つまたはそれを超える本発明の化合物の量は、0.0001g、0.0002g、0.0003g、0.0004g、0.0005g、0.0006g、0.0007g、0.0008g、0.0009g、0.001g、0.0015g、0.002g、0.0025g、0.003g、0.0035g、0.004g、0.0045g、0.005g、0.0055g、0.006g、0.0065g、0.007g、0.0075g、0.008g、0.0085g、0.009g、0.0095g、0.01g、0.015g、0.02g、0.025g、0.03g、0.035g、0.04g、0.045g、0.05g、0.055g、0.06g、0.065g、0.07g、0.075g、0.08g、0.085g、0.09g、0.095g、0.1g、0.15g、0.2g、0.25g、0.3g、0.35g、0.4g、0.45g、0.5g、0.55g、0.6g、0.65g、0.7g、0.75g、0.8g、0.85g、0.9g、0.95g、1g、1.5g、2g、2.5g、3g、3.5g、4g、4.5g、5g、5.5g、6g、6.5g、7g、7.5g、8g、8.5g、9g、9.5g、または10gを超える。

30

40

【0258】

いくつかの実施形態では、1つまたはそれを超える本発明の化合物の量は、0.0001～10g、0.0005～9g、0.001～8g、0.005～7g、0.01～6g、0.05～5g、0.1～4g、0.5～4g、または1～3gの範囲である。

【0259】

キット／製品

本明細書中に記載の治療適用で用いるために、キットおよび製品も提供する。いくつか

50

の実施形態では、かかるキットは、キャリア、パッケージ、または容器を含み、該容器は、バイアルおよびチューブなどの1つまたはそれを超える容器（各容器は本明細書中に記載の方法で使用すべき個別の要素のうちの1つを含む）を入れるために区画化されている。適切な容器には、例えば、ボトル、バイアル、シリンジ、および試験管が含まれる。容器は、ガラスまたはプラスチックなどの種々の材料から形成されている。

【0260】

本明細書中に提供される製品は、包装材料を含む。医薬製品の包装で用いる包装材料には、例えば、米国特許第5,323,907号、同第5,052,558号、および同第5,033,252号に見出される包装材料が含まれる。薬学的包装材料の例には、ブリストスターパック、ボトル、チューブ、吸入器、ポンプ、バッグ、バイアル、容器、シリンジ、ボトル、ならびに選択された製剤ならびに意図する投与様式および処置様式に適切な任意の包装材料が含まれるが、これらに限定されない。例えば、容器（単数または複数）は、必要に応じて組成物中または本明細書中に開示の別の薬剤と組み合わせた1つまたはそれを超える本明細書中に記載の化合物を含む。容器（単数または複数）は、必要に応じて、無菌のアクセスポートを有する（例えば、容器は皮下注射針によって貫通可能なストッパーを有する静注用溶液バッグまたはバイアルである）。かかるキットは、必要に応じて、識別用の説明もしくはラベルまたは本明細書中に記載の方法におけるその使用に関する指示と共に化合物を含む。

【0261】

例えば、キットは、典型的には、1つまたはそれを超えるさらなる容器を含み、各容器は、本明細書中に記載の化合物の使用について商業的観点および使用者の観点から望ましい1つまたはそれを超える種々の材料（必要に応じて濃縮形態の試薬および／またはデバイス）を有する。かかる材料の非限定的な例には、バッファ、希釈剤、フィルター、針、シリンジ；内容物および／または使用についての説明を列挙したキャリア、パッケージ、容器、バイアル、および／またはチューブのラベル、ならびに使用のための指示を含む添付文書が含まれるが、これらに限定されない。典型的には、説明書一式も含まれるであろう。ラベルは、必要に応じて、容器上または容器と共に存在する。例えば、ラベルを形成する文字、数字、または他の符号を容器自体に付着させるか、成形するか、エッチングする場合、ラベルは容器上に存在し、容器を保持もする貯蔵容器またはキャリア内に、例えば、添付文書としてラベルが存在する場合、ラベルは容器と共に存在する。さらに、ラベルを、内容物が特定の治療に適用するために使用すべきであることを示すために使用する。さらに、ラベルは、本明細書中に記載の方法などにおける内容物の使用法を示す。一定の実施形態では、薬学的組成物は、本明細書中に提供した化合物を含む1つまたはそれを超える単位剤形を含むパックまたはディスペンサーデバイス中に存在する。パックは、例えば、金属またはプラスチック製の箔（ブリストスター包装など）を含む。または、パックまたはディスペンサーデバイスは、投与説明書が添付されている。または、パックまたはディスペンサーは、医薬品の製造、使用、または販売を規制する政府機関が指示する形態の容器に関連する通知書が同封されており、この通知書は、政府機関によって承認されたヒトまたは動物への投与のための薬物の形態が反映されている。かかる通知書は、例えば、米国食品医薬品局によって承認された処方薬についてのラベルまたは承認された製品の添付書類である。いくつかの実施形態では、適合性薬学的キャリア中に製剤化した本明細書中に提供した化合物を含む組成物を、調製し、適切な容器に入れ、適応の状態の処置について表示する

【0262】

方法

本発明の実施形態は、RAS媒介細胞のシグナル伝達を阻害する方法であって、細胞を有効量の1つまたはそれを超える本明細書中に開示の化合物と接触させる工程を含む方法を提供する。RAS媒介シグナル伝達の阻害を、当該分野で公知の広範な種々の方法によって評価および実証することができる。非限定的な例には、以下を示すことが含まれる：
（a）RASのGTPアーゼ活性の減少；（b）GTP結合親和性の減少またはGDP結

合親和性の増加；（c）GTPのK o f fの増加またはGDPのK o f fの減少；（d）RAS経路の下流のシグナル伝達分子レベルの減少（pMEKレベルの減少など）；および／または（e）下流シグナル伝達分子（Rafが含まれるが、これらに限定されない）へのRAS複合体の結合の減少。キットおよび市販のアッセイを、1つまたは複数の上記の決定のために利用することができる。

【0263】

実施形態はまた、病状（G12CのKRAS、HRAS、またはNRASの変異、G12C HRAS変異および／またはG12C NRAS変異（例えば、がん）に關与する状態が含まれるが、これらに限定されない）を処置するための本発明の化合物または薬学的組成物の使用方法を提供する。

【0264】

いくつかの実施形態では、がんを処置する方法を提供し、その方法は、がんの処置を必要とする被験体に、有効量の、構造（I）の化合物を含む前述の薬学的組成物のいずれかを投与する工程を含む。いくつかの実施形態では、がんは、KRAS、HRAS、またはNRASのG12C変異によって媒介される。他の実施形態では、がんは、膵臓がん、結腸がん、MYH関連ポリポーシス、結腸直腸がん、または肺がんである。

【0265】

いくつかの実施形態では、本発明は、障害の処置を必要とする被験体における障害を処置する方法であって、被験体がKRAS、HRAS、またはNRASのG12C変異を有するかどうかを決定し、被験体がKRAS、HRAS、またはNRASのG12C変異を有すると決定された場合、治療有効用量の少なくとも1つの構造（I）の化合物、またはその薬学的に許容され得る塩、エステル、プロドラッグ、互変異性体、溶媒和物、水和物、または誘導体を被験体に投与する工程を含む、方法を提供する。

【0266】

開示の化合物は、足場非依存性細胞成長を強く阻害し、したがって、腫瘍転移を阻害する可能性がある。したがって、別の実施形態では、本開示は、腫瘍転移を阻害する方法であって、有効量の本明細書中に開示の任意の化合物および薬学的に許容され得るキャリアを含む薬学的組成物を腫瘍転移を阻害する必要がある被験体に投与する工程を含む、方法を提供する。

【0267】

KRAS、HRAS、またはNRASのG12C変異はまた、血液学的悪性疾患（例えば、血液、骨髄、および／またはリンパ節に影響を及ぼすがん）で同定されている。したがって、一定の実施形態は、血液学的悪性疾患の処置を必要とする患者への開示の化合物（例えば、薬学的組成物の形態）の投与に関する。かかる悪性疾患には、白血病およびリンパ腫が含まれるが、これらに限定されない。例えば、本開示の化合物を、急性リンパ芽球性白血病（ALL）、急性骨髄性白血病（AML）、慢性リンパ球性白血病（CLL）、小リンパ球性リンパ腫（SLL）、慢性骨髄性白血病（CML）、急性単球性白血病（AMoL）、および／または他の白血病などの疾患の処置のために使用することができる。他の実施形態では、化合物は、リンパ腫（ホジキンリンパ腫または非ホジキンリンパ腫の全てのサブタイプなど）の処置に有用である。

【0268】

腫瘍またはがんがG12CのKRAS、HRAS、またはNRAS変異を含むかどうかの決定を、KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質をコードするヌクレオチド配列の評価、KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質のアミノ酸配列の評価、または推定されるKRAS、HRAS、またはNRASの変異体タンパク質の特徴の評価によって行うことができる。野生型のヒトKRAS、HRAS、またはNRASの配列は、当該分野で公知である（例えば、アクセッション番号NP203524）。

【0269】

KRAS、HRAS、またはNRASのヌクレオチド配列の変異の検出方法は、当業者に公知である。これらの方法には、ポリメラーゼ連鎖反応－制限酵素切断断片長多型（P

10

20

30

40

50

CR-RFLP) アッセイ、ポリメラーゼ連鎖反応ー一本鎖DNA高次構造多型(PCR-SSCP) アッセイ、リアルタイムPCRアッセイ、PCR配列決定、変異体対立遺伝子特異的PCR増幅(MASA) アッセイ、直接配列決定、プライマー伸長反応、電気泳動、オリゴヌクレオチドライゲーションアッセイ、ハイブリッド形成アッセイ、TaqManアッセイ、SNP遺伝子型同定アッセイ、高分解能融解アッセイ、およびマイクロアレイ解析が含まれるが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、サンプルを、リアルタイムPCRによってG12CのKRAS、HRAS、またはNRAS変異について評価する。リアルタイムPCRでは、KRAS、HRAS、またはNRASのG12C変異に特異的な蛍光プローブを使用する。変異が存在する場合、プローブが結合し、蛍光が検出される。いくつかの実施形態では、KRAS、HRAS、またはNRASのG12C変異を、KRAS、HRAS、またはNRASの遺伝子中の特定の領域(例えば、エクソン2および/またはエクソン3)の直接配列決定法を使用して同定する。この技術は、配列決定された領域中の全ての可能な変異を同定する。

10

【0270】

KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質中の変異を検出する方法は、当業者に公知である。これらの方法には、変異体タンパク質に特異的な結合剤(例えば、抗体)、タンパク質電気泳動、およびウェスタンブロッティング、ならびに直接ペプチド配列決定を使用したKRAS、HRAS、またはNRAS変異体の検出が含まれるが、これらに限定されない。

【0271】

20

腫瘍またはがんがG12CのKRAS、HRAS、またはNRASの変異を含むかどうか決定する方法は、種々のサンプルを使用することができる。いくつかの実施形態では、腫瘍またはがんを有する被験体からサンプルを採取する。いくつかの実施形態では、がんまたは腫瘍を有する被験体からサンプルを採取する。いくつかの実施形態では、サンプルは、新鮮な腫瘍/がんサンプルである。いくつかの実施形態では、サンプルは凍結された腫瘍/がんサンプルである。いくつかの実施形態では、サンプルは、ホルマリン固定パラフィン包埋サンプルである。いくつかの実施形態では、サンプルを、細胞ライセートに加工する。いくつかの実施形態では、サンプルをDNAまたはRNAに加工する。

【0272】

30

本発明の実施形態はまた、哺乳動物に治療有効量の本発明の化合物またはその薬学的に許容され得る塩、エステル、プロドラッグ、溶媒和物、水和物、もしくは誘導体を投与する工程を含む、哺乳動物の過剰増殖性障害を処置する方法に関する。いくつかの実施形態では、前記方法は、以下などのがんの処置に関する：急性骨髄性白血病、青年期のがん、小児副腎皮質癌、AIDS関連がん(例えば、リンパ腫およびカポジ肉腫)、肛門がん、虫垂がん、星状細胞腫、非定型奇形腫様腫瘍、基底細胞癌、胆管がん、膀胱がん、骨のがん、脳幹部神経膠腫、脳腫瘍、乳がん、気管支腫瘍、バーキットリンパ腫、カルチノイド腫瘍、非定型奇形腫様腫瘍、胎児性腫瘍、胚細胞腫瘍、原発性リンパ腫、子宮頸がん、小児がん、脊索腫、心臓腫瘍、慢性リンパ球性白血病(CLL)、慢性骨髄性白血病(CML)、慢性骨髄増殖性障害(chronic myeloproliferative disorder)、結腸がん、結腸直腸がん、頭蓋咽頭腫、皮膚T細胞リンパ腫、肝外腺管上皮内癌(DCIS)、胎児性腫瘍、CNSがん、子宮内膜がん、上衣腫、食道がん、感覚神経芽細胞腫、ユーイング肉腫、頭蓋外胚細胞腫瘍、性腺外生殖細胞腫瘍、眼のがん、骨の線維性組織球腫、胆嚢がん、胃がん、消化管カルチノイド腫瘍、消化管間質腫瘍(GIST)、胚細胞腫瘍、妊娠性絨毛性腫瘍、毛様細胞白血病、頭頸部がん、心臓がん、肝臓がん、ホジキンリンパ腫、下咽頭がん、眼内黒色腫、島細胞腫、膵神経内分泌腫瘍、腎臓がん、喉頭がん、口唇がんおよび口腔がん(oral cavity cancer)、肝臓がん、小葉上皮内癌(LCIS)、肺がん、リンパ腫、原発不明の転移性頸部扁平上皮がん、正中管癌、口腔がん(mouth cancer)、多発性内分泌腫瘍症候群、多発性骨髄腫/形質細胞新生物、菌状息肉症、骨髄異形成症候群、骨髄異形成/骨髄増殖性新生物、多発性骨髄腫、メルケル細胞癌、悪性中皮腫、骨の悪性線維性組織球腫

40

50

および骨肉腫、鼻腔がんおよび副鼻腔がん、鼻咽頭がん、神経芽細胞腫、非ホジキンリンパ腫、非小細胞肺癌（NSCLC）、口腔がん（oral cancer）、口唇がんおよび口腔がん（oral cavity cancer）、口腔咽頭がん、卵巣がん、膵臓がん、乳頭腫症、傍神経節腫、副鼻腔がんおよび鼻腔がん、副甲状腺がん、陰茎がん、咽頭がん、胸膜肺芽腫、原発性中枢神経系（CNS）リンパ腫、前立腺がん、直腸がん、移行細胞がん、網膜芽細胞腫、横紋筋肉腫、唾液腺がん、皮膚がん、胃がん（胃がん）、小細胞肺癌、小腸がん、軟部組織肉腫、T細胞リンパ腫、睾丸がん、咽喉がん、胸腺腫および胸腺癌、甲状腺がん、腎盂および尿管の移行細胞がん、絨毛性腫瘍、小児期のまれながん、尿道がん、子宮肉腫、膣がん、外陰がん、またはウイルス誘発がん。いくつかの実施形態では、前記方法は、非がん性過剰増殖性障害（皮膚の良性過形成（例えば、乾癬）、再狭窄、または前立腺（例えば、良性前立腺肥大症（BPH））など）の処置に関する。

10

【0273】

一定の特定の実施形態では、本発明は、肺がんの処置方法であって、有効量の任意の上記化合物（または上記化合物を含む薬学的組成物）を肺がんの処置を必要とする被験体に投与する工程を含む、方法に関する。一定の実施形態では、肺がんは、非小細胞肺癌（NSCLC）（例えば、腺癌、肺扁平上皮癌、または大細胞肺癌）である。他の実施形態では、肺がんは小細胞肺癌である。開示の化合物で処置可能な他の肺がんには、腺腫瘍、カルチノイド腫瘍、および未分化癌が含まれるが、これらに限定されない。

【0274】

20

本発明の方法にしたがって本発明の化合物、または前記化合物の薬学的に許容され得る塩、エステル、プロドラッグ、溶媒和物、互変異性体、水和物、もしくは誘導体で処置することができる被験体には、例えば、以下を有すると診断されている被験体が含まれる：急性骨髄性白血病、慢性骨髄性白血病、青年期のがん、小児副腎皮質癌、AIDS関連がん（例えば、リンパ腫およびカポジ肉腫）、肛門がん、虫垂がん、星状細胞腫、非定型奇形腫様腫瘍、基底細胞癌、胆管がん、膀胱がん、骨のがん、脳幹部神経膠腫、脳腫瘍、乳がん、気管支腫瘍、パーキットリンパ腫、カルチノイド腫瘍、非定型奇形腫様腫瘍、胎児性腫瘍、胚細胞腫瘍、原発性リンパ腫、子宮頸がん、小児がん、脊索腫、心臓腫瘍、慢性リンパ球性白血病（CLL）、慢性骨髄性白血病（CML）、慢性骨髄増殖性障害、結腸がん、結腸直腸がん、頭蓋咽頭腫、皮膚T細胞リンパ腫、肝外腺管上皮内癌（DCIS）、胎児性腫瘍、CNSがん、子宮内膜がん、上衣腫、食道がん、感覚神経芽細胞腫、ユーイング肉腫、頭蓋外胚細胞腫瘍、性腺外生殖細胞腫瘍、眼のがん、骨の線維性組織球腫、胆嚢がん、胃がん、消化管カルチノイド腫瘍、消化管間質腫瘍（GIST）、胚細胞腫瘍、妊娠性絨毛性腫瘍、毛様細胞白血病、頭頸部がん、心臓がん、肝臓がん、ホジキンリンパ腫、下咽頭がん、眼内黒色腫、島細胞腫、膵神経内分泌腫瘍、腎臓がん、喉頭がん、口唇がんおよび口腔がん（oral cavity cancer）、肝臓がん、小葉上皮内癌（LCIS）、肺がん、リンパ腫、原発不明の転移性頸部扁平上皮がん、正中管癌、口腔がん（mouth cancer）、多発性内分泌腫瘍症候群、多発性骨髄腫／形質細胞新生物、菌状息肉症、骨髄異形成症候群、骨髄異形成／骨髄増殖性新生物、多発性骨髄腫、メルケル細胞癌、悪性中皮腫、骨の悪性線維性組織球腫および骨肉腫、鼻腔がんおよび副鼻腔がん、鼻咽頭がん、神経芽細胞腫、非ホジキンリンパ腫、非小細胞肺癌（NSCLC）、口腔がん（oral cancer）、口唇がんおよび口腔がん（oral cavity cancer）、口腔咽頭がん、卵巣がん、膵臓がん、乳頭腫症、傍神経節腫、副鼻腔がんおよび鼻腔がん、副甲状腺がん、陰茎がん、咽頭がん、胸膜肺芽腫、原発性中枢神経系（CNS）リンパ腫、前立腺がん、直腸がん、移行細胞がん、網膜芽細胞腫、横紋筋肉腫、唾液腺がん、皮膚がん、胃がん（胃がん）、小細胞肺癌、小腸がん、軟部組織肉腫、T細胞リンパ腫、睾丸がん、咽喉がん、胸腺腫および胸腺癌、甲状腺がん、腎盂および尿管の移行細胞がん、絨毛性腫瘍、小児期のまれながん、尿道がん、子宮肉腫、膣がん、外陰がん、またはウイルス誘発がん。いくつかの実施形態では、本発明の化合物で処置される被験体には、非がん性過剰増殖性障害（皮膚の良性過形成（例えば、

30

40

50

乾癬）、再狭窄、または前立腺（例えば、良性前立腺肥大症（BPH））などを有すると診断されている被験体が含まれる。

【0275】

本発明の実施形態は、G12C変異体KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質活性を、前記タンパク質を有効量の本発明の化合物と接触させることによって調整する方法をさらに提供する。調整は、タンパク質活性の阻害または活性化であり得る。いくつかの実施形態では、本発明は、溶液中でG12C変異体KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質を有効量の本発明の化合物と接触させることによってタンパク質活性を阻害する方法を提供する。いくつかの実施形態では、本発明は、目的のタンパク質を発現する細胞、組織、器官と接触させることによってG12C変異体KRAS、HRAS、またはNRASタンパク質活性を阻害する方法を提供する。いくつかの実施形態では、本発明は、被験体（齧歯類および哺乳動物（例えば、ヒト）が含まれるが、これらに限定されない）のタンパク質活性を、有効量の本発明の化合物を被験体に投与することによって阻害する方法を提供する。いくつかの実施形態では、調整率は、25%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、または90%を超える。いくつかの実施形態では、阻害率は、25%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、または90%を超える。

10

【0276】

いくつかの実施形態では、本発明は、細胞中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を、前記細胞を前記細胞中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を阻害するのに十分な量の本発明の化合物と接触させることによって阻害する方法を提供する。いくつかの実施形態では、本発明は、組織中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を、前記組織を前記組織中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を阻害するのに十分な量の本発明の化合物と接触させることによって阻害する方法を提供する。いくつかの実施形態では、本発明は、生物中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を、前記生物を前記生物中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を阻害するのに十分な量の本発明の化合物と接触させることによって阻害する方法を提供する。いくつかの実施形態では、本発明は、動物中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を、前記動物を前記動物中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を阻害するのに十分な量の本発明の化合物と接触させることによって阻害する方法を提供する。いくつかの実施形態では、本発明は、哺乳動物中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を、前記哺乳動物を前記哺乳動物中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を阻害するのに十分な量の本発明の化合物と接触させることによって阻害する方法を提供する。いくつかの実施形態では、本発明は、ヒト中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を、前記ヒトを前記ヒト中のKRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性を阻害するのに十分な量の本発明の化合物と接触させることによって阻害する方法を提供する。他の実施形態では、本発明は、KRAS、HRAS、またはNRAS G12Cの活性によって媒介される疾患の処置を、かかる処置を必要とする被験体において行う方法を提供する。

20

30

40

【0277】

他の実施形態は、他の経路、または同一経路の他の成分、またはさらに重複する標的酵素の組を調整することが既知の薬剤を本発明の化合物、またはその薬学的に許容され得る塩、エステル、プロドラッグ、溶媒和物、互変異性体、水和物、または誘導体と組み合わせて使用する併用療法のための方法を提供する。1つの態様では、かかる治療には、相乗的または付加的な治療効果を得るための1つまたはそれを超える本発明の化合物の、化学療法剤、治療用抗体、および放射線処置との組み合わせが含まれるが、これらに限定されない。

【0278】

多数の化学療法剤が現在当該分野で公知であり、本発明の化合物と組み合わせて使用す

50

ることができる。いくつかの実施形態では、化学療法剤は、有糸分裂インヒビター、アルキル化剤、代謝拮抗物質、挿入抗生物質、成長因子インヒビター、細胞周期インヒビター、酵素、トポイソメラーゼインヒビター、生物学的応答調節物質、アンチホルモン、血管新生インヒビター、および抗アンドロゲン剤からなる群から選択される。

【0279】

非限定的な例は、化学療法剤、細胞毒性剤、非ペプチド小分子（グリベック（登録商標）（メシル酸イマチニブ）、ベルケイド（登録商標）（ボルテゾミブ）、カソデックス（ビカルタミド）、イレッサ（登録商標）（ゲフィチニブ）、およびアドリアマイシンなど）、ならびに多数の化学療法剤である。化学療法薬の非限定的な例には、アルキル化剤（チオテパおよびシクロホスファミド（サイトキサン（登録商標））など）；スルホン酸アルキル（ブスルファン、インプロスルファン、およびピボスルファンなど）；アジリジン（ベンゾドーパ、カルボコン、メツレドーパ、およびウレドーパなど）；エチレンイミンおよびメチルメラミン（methy lamel amines）（アルトレタミン、トリエチレンメラミン、トリエチレンホスホラミド、トリエチレンチオホスホラミド、およびトリメチロールメラミン（trimethylolomelamine）が含まれる）；ナイトロジェンマスタード（クロラムブシル、クロルナファジン、クロホスファミド、エストラムスチン、イフォスファミド、メクロレタミン、メクロレタミンオキシド塩酸塩、メルファラン、ノブエンピキン、フェネステリン、プレドニムスチン、トロホスファミド、ウラシルマスタードなど）；ニトロソ尿素（カルムスチン、クロロゾトシン、ホテムスチン、ロムスチン、ニムスチン、ラニムスチンなど）；抗生物質（アクラシノマイシン、アクチノマイシン、アントラマイシン（authramycin）、アザセリン、ブレオマイシン、カクチノマイシン、カリケアマイシン、カラビシン、カルミノマイシン、カルジノフィリン、カソデックス（登録商標）、クロモマイシン、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、デトルビシン、6-ジアゾ-5-オキソ-L-ノルロイシン、ドキシルビシン、エピルビシン、エソルビシン、イダルビシン、マルセロマイシン、マイトマイシン、ミコフェノール酸、ノガラマイシン、オリボマイシン、ペプロマイシン、ポトフィロマイシン、ピューロマイシン、ケラマイシン、ロドルビシン、ストレプトニグリン、ストレプトゾシン、ツベルシジン、ウベニメクス、ジノスタチン、ゾルビシンなど）；代謝拮抗物質（メトトレキサートおよび5-フルオロウラシル（5-FU）など）；葉酸アナログ（デノプテリン、メトトレキサート、プテロプテリン、トリメトトレキサートなど）；プリンアナログ（フルダラビン、6-メルカプトプリン、チアミプリン、チオグアニンなど）；ピリミジンアナログ（アンシタビン、アザシチジン、6-アザウリジン、カルモフル、シタラビン、ジデオキシウリジン、ドキシフルリジン、エノシタビン、フロクスウリジンなど）；アンドロゲン（カルステロン、ドロモスタノロンプロピオナート、エピチオスタノール、メピチオスタン、テストラクトンなど）；抗副腎剤（アミノグルテチミド、ミトタン、トリロスタンなど）；葉酸補充物質（フロリン酸など）；アセグラトン；アルドホスファミド グリコシド；アミノレプリン酸；アムサクリン；ベストラブシル；ビサントレン；エダトラキサート；デフォファミン；デメコルシン；ジアジコン；エルフォミチン；エリプチニウムアセタート；エトグルシド；硝酸ガリウム；ヒドロキシ尿素；レンチナン；ロニダミン；ミトグアゾン；ミトキサントロン；モビダモール；ニトラクリン；ペントスタチン；フェナメット；ピラルビシン；ポドフィリン酸；2-エチルヒドラジド；プロカルバジン；PSK（登録商標）；ラゾキサン；シゾフィラン；スピロゲルマニウム；テヌアゾン酸；トリアジコン；2, 2', 2''-トリクロロトリエチルアミン；ウレタン；ビンデシン；ダカルバジン；マンノムスチン；ミトブロニトール；ミトラクトール；ピボプロマン；ガシトシン；アラビノシド（「Ara-C」）；シクロホスファミド；チオテパ；タキサン（例えば、パクリタキセル（タキソール（商標）、Bristol-Myers Squibb Oncology, Princeton, N. J.）およびドセタキセル（タキソテール（商標）、Rhône-Poulenc Rorer, Antony, France））；レチノイン酸；エスペラミシン；カペシタビン；および上記のもののいずれかの薬学的に許容され得る塩、酸、または誘導体が含まれる。適切な化学療法

10

20

30

40

50

細胞調整剤として、腫瘍に対するホルモン作用を調節または阻害するように作用する抗ホルモン剤（抗エストロゲン剤（例えば、タモキシフェン（ノルバデックス（商標））、ラロキシフェン、アロマターゼ阻害4（5）-イミダゾール、4-ヒドロキシタモキシフェン、トリオキシフェン、ケオキシフェン、LY 117018、オナプリストン、およびトレミフェン（フェアストン）が含まれる）；および抗アンドロゲン剤（フルタミド、ニルタミド、ピカルタミド、ロイプロリド、およびゴセレリンなど））；クロラムブシル；ゲムシタビン；6-チオグアニン；メルカプトプリン；メトトレキサート；白金アナログ（シスプラチンおよびカルボプラチンなど）；ビンブラスチン；白金；エトポシド（VP-16）；イフォスファミド；マイトマイシンC；ミトキサントロン；ビンクリスチン；ビノレルビン；ナベルビン；ノバントロン；テニポシド；ダウノマイシン；アミノプテリン；ゼローダ；イバンドロネート；カンプトテシン-11（CPT-11）；トポイソメラーゼインヒビターRFS2000；ジフルオロメチルオルニチン（DMFO）も含まれる。所望により、本発明の化合物または薬学的組成物を、一般に処方される抗がん薬（ハーセプチン（登録商標）、アバスチン（登録商標）、エルビタックス（登録商標）、リツキサン（登録商標）、タキソール（登録商標）、アリミデックス（登録商標）、タキソテール（登録商標）、ABVD、AVICINE、アバゴボマブ、アクリジンカルボキサミド、アダカツムマブ、17-N-アリルアミノ-17-デメトキシゲルダナマイシン、アルファラジン、アルボシジブ、3-アミノピリジン-2-カルボキシアルデヒドチオセミカルバゾン、アモナフィド、アントラセンジオン、抗CD22免疫毒素、抗悪性腫瘍薬、抗腫瘍形成性ハーブ、アパジコン、アチプリモド、アザチオプリン、ベロテカン、ベンダムスチン、BIBW2992、ビリコダール、プロスタリシン、プリオスタチン、ブチオニンスルホキシミン、CBV（化学療法）、カリクリン、細胞周期非特異的抗新生物剤、ジクロロ酢酸、ジスコデルモリド、エルサミトルシン、エノシタビン、エポチロン、エリブリン、エベロリムス、エクサテカン、エクシスリンド、フェルギノール、フォロデシン、ホスフェストロール、ICE化学療法レジメン、IT-101、イメキシソン、イミキモド、インドロカルバゾール、イロフルベン、ラニクイダール、ラロタキセル、レナリドミド、ルカントン、ルルトテカン、マホスファミド、ミトゾロミド、ナホキシジン、ネダプラチン、オラパリブ、オルタタキセル、PAC-1、ポーポー、ピキサントロン、プロテアソームインヒビター、レベッカマイシン、レシキモド、ルビテカン、SN-38、サリノスポラミドA、サパシタビン、スタンフォードV、スワインソニン、タラポルフィン、タリキダール、テガフルーウラシル、テモダール、テセタキセル、四硝酸トリブラチン、トリス（2-クロロエチル）アミン、トロキサシタビン、ウラムスチン、バジメザン、ビンフルニン、ZD6126、またはゾスキダルなど）と組み合わせて使用することができる。

10

20

30

40

【0280】

実施形態は、さらに、哺乳動物における異常細胞成長の阻害または過剰増殖性障害の処置のための放射線療法と組み合わせて本明細書中に提供した化合物または薬学的組成物を使用する方法に関する。放射線療法の施行技術は当該分野で公知であり、これらの技術を本明細書中に記載の併用療法で使用することができる。この併用療法における本発明の化合物の投与を、本明細書中に記載のように決定することができる。

【0281】

放射線療法を、いくつかの方法のうちの1つまたは方法の組み合わせ（外照射療法、内部放射線療法、組織内照射、定位手術的照射、全身放射線療法、照射療法および持続性または一時的な組織内小線源治療が含まれるが、これらに限定されない）によって施行することができる。用語「近接照射療法」は、本明細書中で使用する場合、体内の腫瘍または他の増殖性組織の罹患部位またはその付近に挿入された空間的に制限された放射性物質によって送達する放射線療法をいう。この用語は、放射性同位体（例えば、At-211、I-131、I-125、Y-90、Re-186、Re-188、Sm-153、Bi-212、P-32、およびLuの放射性同位体）への曝露が含まれることが意図されるが、これらに制限されない。本発明の細胞調整剤としての使用に適切な放射線源には、固

50

体および液体の両方が含まれる。非限定的な例として、放射線源は、放射性核種（固体線源としての I-125、I-131、Yb-169、Ir-192、固体線源としての I-125 など）、または光子を放射する他の放射性核種、 β 粒子、 γ 線、または他の治療用放射線であり得る。放射性物質はまた、任意の放射性核種溶液（例えば、I-125 または I-131 の溶液）から作製した流体であり得るか、放射性流体を、固体放射性核種（Au-198、Y-90 など）の小粒子を含む適切な流体のスラリーを使用して生成することができる。さらに、放射性核種を、ゲルまたは放射性ミクロスフェア中に組み入れることができる。

【0282】

いかなる理論にも制限されないが、本発明の化合物は、異常細胞にかかる細胞の死滅および／または成長阻害を目的とした照射を使用した処置により高い感受性を示させることができる。したがって、本発明は、さらに、哺乳動物中の異常細胞の、照射を使用した処置に対する感受性を増加させる方法であって、本発明の化合物またはその薬学的に許容され得る塩、エステル、プロドラッグ、溶媒和物、水和物、または誘導体を、異常細胞の、照射を使用した処置に対する感受性を増加させるのに有効な量で哺乳動物に投与する工程を含む、方法に関する。本方法における化合物、塩、または溶媒和物の量を、有効量のかかる本明細書中に記載の化合物を確認する手段にしたがって決定することができる。

【0283】

本発明の化合物または薬学的組成物を、一定量の抗血管新生剤、シグナル伝達インヒビター、抗増殖剤、解糖インヒビター、または自食作用インヒビターから選択される 1 つまたはそれを超える物質と組み合わせて使用することができる。

【0284】

抗血管新生剤（MMP-2（マトリックスメタロプロテイナーゼ 2）インヒビター、MMP-9（マトリックスメタロプロテイナーゼ 9）インヒビター、および COX-1（シクロオキシゲナーゼ 1）インヒビターなど）を、本明細書中に記載の本発明の化合物および薬学的組成物と併せて使用することができる。抗血管新生剤には、例えば、ラパマイシン、テムシロリムス（CCI-779）、エベロリムス（RAD001）、ソラフェニブ、スニチニブ、およびベバシズマブが含まれる。有用な COX-1 インヒビターの例には、セレブレックス（商標）（アレコキシブ）、バルデコキシブ、およびロフェコキシブが含まれる。有用なマトリックスメタロプロテイナーゼインヒビターの例は、WO 96/33172 号（1996 年 10 月 24 日公開）、WO 96/27583 号（1996 年 3 月 7 日公開）、欧州特許出願第 97304971.1 号（1997 年 7 月 8 日出願）、欧州特許出願第 99308617.2 号（1999 年 10 月 29 日出願）、WO 98/07697 号（1998 年 2 月 26 日公開）、WO 98/03516 号（1998 年 1 月 29 日公開）、WO 98/34918 号（1998 年 8 月 13 日公開）、WO 98/34915 号（1998 年 8 月 13 日公開）、WO 98/33768 号（1998 年 8 月 6 日公開）、WO 98/30566 号（1998 年 7 月 16 日公開）、欧州特許公開第 606,046 号（1994 年 7 月 13 日公開）、欧州特許公開第 931,788 号（1999 年 7 月 28 日公開）、WO 90/05719 号（1990 年 5 月 31 日公開）、WO 99/52910 号（1999 年 10 月 21 日公開）、WO 99/52889 号（1999 年 10 月 21 日公開）、WO 99/29667 号（1999 年 6 月 17 日公開）、PCT 国際出願番号 PCT/IB98/01113 号（1998 年 7 月 21 日出願）、欧州特許出願第 99302232.1 号（1999 年 3 月 25 日出願）、英国特許出願第 9912961.1 号（1999 年 6 月 3 日出願）、米国仮特許出願第 60/148,464 号（1999 年 8 月 12 日出願）、米国特許第 5,863,949 号（1999 年 1 月 26 日発行）、米国特許第 5,861,510 号（1999 年 1 月 19 日発行）、および欧州特許公開第 780,386 号（1997 年 6 月 25 日公開）（上記の全文献全体が本明細書中で参考として組み込まれる）に記載されている。好ましい MMP-2 インヒビターおよび MMP-9 インヒビターは、MMP-1 阻害活性をほとんどまたは全く持たないインヒビターである。他のマトリックスメタロプロテイナーゼ（すなわち、MAP-1、M

10

20

30

40

50

MMP-3、MMP-4、MMP-5、MMP-6、MMP-7、MMP-8、MMP-10、MMP-11、MMP-12、およびMMP-13)と比較してMMP-2および/またはAMP-9を選択的に阻害するインヒビターがより好ましい。本発明で有用なMMPインヒビターのいくつかの具体例は、AG-3340、RO32-3555、およびRS13-0830である。

【0285】

自食作用インヒビターには、クロロキン、3-メチルアデニン、ヒドロキシクロロキン(プラケニル(商標))、パフィロマイシンA1、5-アミノ-4-イミダゾールカルボキサミドリボシド(AICAR)、オカダ酸、タンパク質ホスファターゼ2A型または1型を阻害する自食作用抑制藻類毒素、cAMPのアナログ、およびcAMPレベルを上昇させる薬物(アデノシン、LY204002、N6-メルカプトプリンリボシド、およびビンブラスチンなど)が含まれるが、これらに限定されない。さらに、タンパク質(ATG5(自食作用に関与する))が含まれるが、これらに限定されない)の発現を阻害するアンチセンスまたはsiRNAも使用することができる。

【0286】

実施形態は、また、一定量の本発明の化合物、あるいはその薬学的に許容され得る塩、エステル、プロドラッグ、溶媒和物、互変異性体、水和物、または誘導体、またはその同位体標識された誘導体、および一定量の心血管疾患の処置用の1つまたはそれを超える治療薬を含む哺乳動物における心血管疾患の処置のための方法および薬学的組成物に関する。

【0287】

心血管疾患への使用時に用いる例示的な薬剤は、抗血栓薬(例えば、プロスタサイクリンおよびサリチラート)、血栓溶解剤(例えば、ストレプトキナーゼ、ウロキナーゼ、組織プラスミノゲンアクチベーター(TPA)、およびアニソイル化プラスミノゲンストレプトキナーゼアクチベーター複合体(APSAC))、抗血小板剤(例えば、アセチルサリチル酸(ASA)およびクロピドゲル)、血管拡張剤(例えば、ニトラート)、カルシウムチャネル遮断薬、抗増殖剤(例えば、コルヒチンおよびアルキル化剤)、挿入剤、成長調整因子(インターロイキン、形質転換成長因子-β、および血小板由来成長因子の同類物、成長因子に指向するモノクローナル抗体など)、抗炎症剤(ステロイド性および非ステロイド性の両方)、ならびに血管の緊張、機能、動脈硬化、および介入後の血管または器官の傷害に対する治療応答を調整することができる他の薬剤である。抗生物質もまた、本発明に含まれる組み合わせ物またはコーティング中に含めることができる。さらに、コーティングを使用して、血管壁内に局所的に治療薬を送達させることができる。膨潤性ポリマー中に活性薬剤を組み込むことにより、ポリマーの膨潤の際に活性薬剤は放出される。

【0288】

いくつかの実施形態では、本明細書中に記載の化合物を、潤滑剤としても公知の液体または固体の組織バリアと併せて製剤化または投与する。組織バリアの例には、ポリサッカリド、ポリグリカン、セプラフィルム、インターシード、およびヒアルロン酸が含まれるが、これらに限定されない。

【0289】

いくつかの実施形態では、本明細書中に記載の化合物と併せて投与される薬品には、吸入によって有用に送達される任意の適切な薬物(例えば、鎮痛薬(例えば、コデイン、ジヒドロモルヒネ、エルゴタミン、フェンタニル、またはモルヒネ);アンギナ調製物(例えば、ジルチアゼム);抗アレルギー薬(例えば、クロモグリカート、ケトチフェン、またはネドクロミル);抗感染症薬(例えば、セファロスポリン、ペニシリン、ストレプトマイシン、スルホンアミド、テトラサイクリン、またはペンタミジン);抗ヒスタミン薬(例えば、メタピリレン);抗炎症薬(例えば、ベクロメタゾン、フルニソリド、ブデソニド、チプレダン、トリアムシノロンアセトニド、またはフルチカゾン);鎮咳薬(例えば、ノスカピン);気管支拡張薬(例えば、エフェドリン、アドレナリン、フェノテロール

、ホルモテロール、イソプレナリン、メタプロテレノール、フェニレフリン、フェニルプロパノールアミン、ピルブテロール、レプロテロール、リミテロール、サルブタモール、サルメテロール、テルブタリン、イソエタリン、ツロブテロール、オルシブレナリン、または(－)－4－アミノ－3, 5－ジクロロ－ α －[[[6－[2－(2－ピリジニル)エトキシ]ヘキシル]－アミノ]メチル]ベンゼンメタノール)；利尿薬(例えば、アミロライド)；抗コリン作用薬(例えば、イプラトロピウム、アトロピン、またはオキシトロピウム)；ホルモン(例えば、コルチゾン、ヒドロコルチゾン、またはプレドニゾロン)；キサンチン(例えば、アミノフィリン、コリンテオフィリナート、リジンテオフィリナート、またはテオフィリン)；ならびに治療タンパク質および治療ペプチド(例えば、インスリンまたはグルカゴン)が含まれる。適切な場合には、薬品を、薬品の活性および／または安定性を最適にするために塩の形態(例えば、アルカリ金属塩またはアミン塩としてまたは酸付加塩として)で、またはエステル(例えば、低級アルキルエステル)として、または溶媒和物(例えば、水和物)として使用することが当業者に明らかであろう。

10

【0290】

併用療法に有用な他の例示的な治療薬には、上記放射線療法の薬剤、ホルモンアンタゴニスト、ホルモンおよびその放出因子、甲状腺薬および抗甲状腺薬、エストロゲンおよびプロゲステリン、アンドロゲン、副腎皮質刺激ホルモン；副腎皮質ステロイドおよびその合成アナログ；副腎皮質ホルモンの合成および作用、インスリン、経口血糖降下剤、ならびに膵内分泌部の薬理作用のインヒビター、石灰化および骨代謝回転に影響をおよぼす薬剤：カルシウム、ホスファート、副甲状腺ホルモン、ビタミンD、カルシトニン、ビタミン(水溶性ビタミン、ビタミンB複合体、アスコルビン酸、脂溶性ビタミン、ビタミンA、K、およびEなど)、成長因子、サイトカイン、ケモカイン、ムスカリン受容体アゴニストおよびアンタゴニスト；抗コリンエステラーゼ剤；神経筋接合部および／または自律神経節で作用する薬剤；カテコールアミン、交感神経様作用薬、およびアドレナリン作動性受容体のアゴニストまたはアンタゴニスト；ならびに5－ヒドロキシトリプタミン(5－HT、セロトニン)受容体のアゴニストおよびアンタゴニストが含まれるが、これらに限定されない。

20

【0291】

治療薬には、疼痛および炎症のための薬剤(ヒスタミンおよびヒスタミンアンタゴニスト、ブランジキニンおよびブランジキニンアンタゴニスト、5－ヒドロキシトリプタミン(セロトニン)など)、膜リン脂質の選択的加水分解生成物の生体内変換によって生成される脂質物質、エイコサノイド、プロスタグランジン、トロンボキサン、ロイコトリエン、アスピリン、非ステロイド性抗炎症剤、鎮痛剤－解熱剤、プロスタグランジンおよびトロンボキサンの合成を阻害する薬剤、誘導型シクロオキシゲナーゼの選択的インヒビター、誘導型シクロオキシゲナーゼ2の選択的インヒビター、オータコイド、パラクリンホルモン、ソマトスタチン、ガストリン、体液性免疫応答および細胞性免疫応答に関与する相互作用を媒介するサイトカイン、脂質由来オータコイド、エイコサノイド、 β －アドレナリン作動性アゴニスト、イプラトロピウム、糖質コルチコイド、メチルキサンチン、ナトリウムチャンネル遮断薬、オピオイド受容体アゴニスト、カルシウムチャンネル遮断薬、膜安定剤、およびロイコトリエンインヒビターも含まれ得る。

30

40

【0292】

本明細書中で意図されるさらなる治療薬には、利尿薬、バソプレシン、腎臓内の保水に影響を及ぼす薬剤、レンニン、アンギオテンシン、心筋虚血の処置に有用な薬剤、抗高血圧薬、アンギオテンシン変換酵素インヒビター、 β －アドレナリン作動性受容体アンタゴニスト、高コレステロール血症処置のための薬剤、および異常脂質血症処置のための薬剤が含まれる。

【0293】

意図される他の治療薬には、胃液酸度の制御のために使用される薬物、消化性潰瘍処置のための薬剤、胃食道逆流疾患処置のための薬剤、消化管運動促進剤、制吐薬、過敏性腸

50

症候群で使用される薬剤、下痢のために使用される薬剤、便秘のために使用される薬剤、炎症性腸疾患のために使用される薬剤、胆管疾患のために使用される薬剤、脾疾患のために使用される薬剤が含まれる。原生動物感染症を処置するために使用される治療薬、マラリア、アメーバ症、ジアルジア症、トリコモナス症、トリパソノーマ症、および／もしくはリーシュマニア症を処置するために使用される薬物、ならびに／または蠕虫症の化学療法で用いる薬物。他の治療薬には、抗菌剤、スルホンアミド、トリメトプリムスルファメトキサゾールキノロン、および尿路感染症のための薬剤、ペニシリン、セファロsporinなど、β-ラクタム抗生物質、アミノグリコシドを含む薬剤、タンパク質合成インヒビター、結核、マイコバクテリウム・アビウム複合体病、および癩病の化学療法で用いる薬物、抗真菌薬、抗ウイルス薬（非レトロウイルス薬および抗レトロウイルス薬が含まれる）が含まれる。

10

【0294】

本発明の化合物と組み合わせることができる治療用抗体の例には、抗受容体チロシンキナーゼ抗体（セツキシマブ、パニツムマブ、トラスツズマブ）、抗CD20抗体（リツキシマブ、トシツモマブ）、および他の抗体（アレムツズマブ、ベバシズマブ、およびゲムツズマブなど）が含まれるが、これらに限定されない。

【0295】

さらに、免疫調節のために使用される治療薬（免疫調節薬、免疫抑制薬、寛容原、および免疫刺激薬など）は、本明細書中の方法で意図される。さらに、血液および血液形成器官に作用する治療薬、造血剤、成長因子、ミネラル、およびビタミン、抗凝固薬、血栓溶解薬、および抗血小板薬。

20

【0296】

腎癌の処置のために、本発明の化合物をソラフェニブおよび／またはアバスチンと組み合わせることができる。子宮内膜障害の処置のために、本発明の化合物をドキソルビシン、タキソテール（タキソール）、および／またはシスプラチン（カルボプラチン）と組み合わせることができる。卵巣がんの処置のために、本発明の化合物をシスプラチン（カルボプラチン）、タキソテール、ドキソルビシン、トポテカン、および／またはタモキシフェンと組み合わせることができる。乳がんの処置のために、本発明の化合物をタキソテール（タキソール）、ゲムシタビン（カペシタビン）、タモキシフェン、レトロゾール、タルセバ、ラパチニブ、PD0325901、アバスチン、ハーセプチン、OSI-906、および／またはOSI-930と組み合わせることができる。肺がんの処置のために、本発明の化合物をタキソテール（タキソール）、ゲムシタビン、シスプラチン、ペメトレキセド、タルセバ、PD0325901、および／またはアバスチンと組み合わせることができる。

30

【0297】

他の実施形態では、構造（I）の1つまたはそれを超える化合物との併用療法のための方法において有用な薬剤には、エルロチニブ、アファチニブ、イレッサ、GDC0941、MLN1117、BYL719（アルペリシブ）、BKM120（ブパルリシブ（Buparlisib））、CYT387、GLPG0634、バリシチニブ、レスタウルチニブ、モメロチニブ、パクリチニブ、ルキシロチニブ、TG101348、クリゾチニブ、チバンチニブ、AMG337、カボザンチニブ、フォレチニブ、オナルツズマブ、NVP-AEW541、ダサチニブ、ボナチニブ、サラカチニブ、ボスチニブ、トラメチニブ、セルメチニブ、コビメチニブ、PD0325901、RO5126766、アクシチニブ、ベバシズマブ、ボスチニブ（Bostutinib）、セツキシマブ、クリゾチニブ、ホスタマチニブ、ゲフィチニブ、イマチニブ、ラパチニブ、レンバチニブ、イブルチニブ、ニロチニブ、パニツムマブ、パゾパニブ、ペガブタニブ、ラニビズマブ、ルキシロチニブ、ソラフェニブ、スニチニブ、SU6656、トラスツズマブ、トファシチニブ、パンドタニブ、ベムラフェニブ、イリノテカン、タキソール、ドセタキセル、ラパマイシン、またはMLN0128が含まれるが、これらに限定されない。

40

【0298】

50

本発明の化合物と組み合わせることができるさらなる治療薬は、Goodman and Gilman's "The Pharmacological Basis of Therapeutics" Tenth Edition edited by Hardman, Limbird and Gilmanまたはthe Physician's Desk Reference（共にその全体が本明細書中で参考として組み込まれる）に見出される。

【0299】

本明細書中に記載の化合物を、処置する状態に応じて、本明細書中に開示の薬剤または他の適切な薬剤と組み合わせ使用することができる。それ故、いくつかの実施形態では、1つまたはそれを超える本発明の化合物を、上記の他の薬剤と共投与する。併用療法で使用する場合、本明細書中に記載の化合物を、第2の薬剤と同時または個別に投与する。この組み合わせ投与には、同一の剤形中の2つの薬剤の同時投与、個別の剤形中の同時投与、および個別の投与が含まれ得る。すなわち、本明細書中に記載の化合物および任意の上記薬剤は、同一の剤形中で共に製剤化されて、同時に投与することができる。あるいは、個別の製剤中に存在する本発明の化合物および任意の上記薬剤を、同時投与することができる。別の代替的方法では、本発明の化合物の投与直後に任意の上記薬剤を投与するか、その逆を行うことができる。個別投与プロトコールのいくつかの実施形態では、本発明の化合物および任意の上記薬剤を、数分間、数時間、または数日間の間隔をあけて投与する。

【0300】

以下に提供した実施例および調製は、本発明の化合物およびかかる化合物の調製方法をさらに説明および例示している。本発明の範囲が以下の実施例および調製の範囲に決して制限されないと理解すべきである。以下の実施例中ならびに明細書および特許請求の範囲を通して、単一の立体中心を有する分子は、別途記載がない限り、ラセミ混合物として存在する。2つまたはそれを超える立体中心を有する分子は、別途記載がない限り、ジアステレオマーのラセミ混合物として存在する。単一の鏡像異性体／ジアステレオマーを、当業者に公知の方法によって得ることができる。

【実施例】

【0301】

以下の実施例は、例示目的で提供される。構造（I）の化合物を調製する方法は当該分野で公知であるか、または当業者によって導き出され得る。

【0302】

実施例1

化合物の生化学アッセイ

試験化合物を、DMSO（Fisherカタログ番号BP-231-100）中10mMの原液として調製する。KRAS G12C 1-169（hisタグ化タンパク質、GDP負荷）を、緩衝液（20mM Hepes、150mM NaCl、1mM MgCl₂）で2μMまたは0.5μMに希釈する。化合物を、以下のように活性について試験する。

【0303】

化合物を、96ウェル保存プレート中でDMSOにて50×最終試験濃度に希釈する。化合物原液を、使用前にボルテックスし、沈殿のあらゆる兆候を注意深く観察する。以下のように希釈する。

- ・最終化合物濃度を32μMにするために、化合物を1600μM（3μLの10mM化合物原液+15.75μLのDMSO）に希釈し、ピペッティングによって十分に混合する。

- ・最終化合物濃度を8μMにするために、化合物を400μM（2μLの10mM化合物原液+48μLのDMSO）に希釈し、ピペッティングによって十分に混合する。

【0304】

49 μ Lのタンパク質原液を、96-ウェルPCRプレート（Fisherカタログ番号1423027）の各ウェルに添加する。1 μ Lの50 $\times$ 希釈化合物を、12-チャンネルピペッターを使用してPCRプレート中の適切なウェルに添加する。反応物を、200 μ L多チャンネルピペッターを使用したピペットの上下操作によって慎重且つ完全に混合する。プレートを、アルミニウムプレートシールで十分に密封し、タンパク質および化合物を所望の長さの時間にわたって保存する。次いで、5 μ Lの2%ギ酸（Fisherカタログ番号A117）の脱イオン化H₂O溶液を各ウェルに添加後、ピペットを使用して混合して、反応をクエンチする。次いで、プレートをアルミニウムシールで再度密封し、下記のように分析するまでドライアイス上で冷凍保存する。

10

【0305】

上記アッセイを、以下の2つの手順のうちの1つにしたがった質量分析によって分析する。

【0306】

RapidFire/TOFアッセイ：

MS装置を、正極性、分解能2 GHz、および低質量（1700）モードに設定し、30分間平衡化する。次いで、装置を較正し、収集モードに切り替え、適切な方法をロードする。

【0307】

さらに30分間の平衡時間の後、ブランクバッチ（すなわち、緩衝液）で運転して、装置が適切に動作していることを確認する。サンプルを37℃で10分間解凍し、短時間遠心分離し、ベンチトップに移す。ウェルA1およびH12を1 μ Lの500 μ M内部標準ペプチドでスパイクし、プレートを2000 $\times$ gで5分間遠心分離する。次いで、方法を実施し、各ウェルの質量を記録する。

20

【0308】

各ウェルの質量（積算データが望まれる）をプレートマップにペーストし、分析からエクスポートする。内部標準の質量もエクスポートする。50 ppmでのデータを荷電状態+19について抽出し、内部標準スパイクを使用してウェルA1の同一性を割り当て、積算する。ピークデータをTOFリストとしてエクスポートし、上記工程を荷電状態+20、+21、+22、+23、+24および+25についてそれぞれ反復する。

30

【0309】

Q-Exactiveアッセイ：

KRAS G12Cタンパク質種の質量およびピーク強度を、Q-Exactive Plus質量分析計（Thermo Scientific）に接続されたDionex RSLCナノシステム（Thermo Scientific）を使用して測定する。

【0310】

20 μ Lの各サンプルを、80%溶媒A（0.1%ギ酸のH₂O溶液）および20%溶媒B（0.1%ギ酸のアセトニトリル溶液）を用いて40℃、600 μ L/分の流量で維持されたAeris（商標）3.6 μ m WIDEPORE C4 200 Å, LC Column 50 $\times$ 2.1 mmカラム上にロードする。液体クロマトグラフィの条件は、1分間の20%溶媒B、1.5分間の20%～60%溶媒B、0.5分間の60%～90%溶媒、0.2分間の90%溶媒B、0.2分間の90%～20%溶媒B、次いで、1.6分間の平衡化の後、引き続くサンプルの注入である。流量は、サンプルの分析全体を通して600 μ L/分で維持する。

40

【0311】

質量分析計を、50ミリ秒の最大注入時間および1 $\times$ 10⁶のAGCターゲットを使用して17500の分解能、5マイクロスキンのプロファイルモードで動作させ、800～1850 m/zの全質量範囲を記録する。イオン移動を最適にするためおよび感度を最大にするために、インタクトなタンパク質モードを適用する。イオン化の方法は、4 kVのスプレー電圧、50 AUに設定されたシースガス流、10 AUに設定された補助ガス流

50

および1 AUに設定されたスweepガス流を使用した、エレクトロスプレーイオン化である。毛細管イオン移動温度は、320℃であり、S-レンズRFレベルを50電圧に設定する。サンプル中の各タンパク質種の電荷エンベロープの定量的デコンボリューションのために、Protein Deconvolutionソフトウェア(Thermo Scientific)を使用して、各親種(修飾タンパク質または非修飾タンパク質)の質量および強度を決定する。デコンボリュートされたピーク強度に基づいて修飾率を算出する。他のin vitro分析は以下のとおりである。

【0312】

細胞成長の阻害：

本発明の化合物がRAS媒介細胞成長を阻害する能力を、以下のように評価し、実証する。野生型RASまたは変異体RASを発現する細胞を、白色透明底96ウェルプレート中に5,000細胞/ウェルの密度でプレートする。細胞を、プレート後約2時間付着させ、その後、本明細書中に開示の化合物を添加する。一定時間後(例えば、24時間、48時間、または72時間の細胞成長後)、細胞増殖を、製造者の指示にしたがってCell Titer Glo試薬(Promega)を使用して総ATP含有量を測定することによって決定する。増殖EC₅₀を、100 μMからハーフログ間隔で減少する8点の化合物用量応答の分析によって決定する。

10

【0313】

RAS媒介シグナル伝達の阻害：

本明細書中に開示の化合物がRAS媒介シグナル伝達を阻害する能力を、以下のように評価し、実証する。野生型RASまたは変異体RAS(G12C、G12V、もしくはG12Aなど)を発現する細胞を、本発明の化合物を用いるか、用いずに(コントロール細胞)処理する。1つまたはそれを超える本発明の化合物によるRASシグナル伝達の阻害を、コントロール細胞と比較した場合の1つまたはそれを超える本発明の化合物で処理した細胞におけるリン酸化MEK、リン酸化ERK、リン酸化RSKの定常状態レベルおよび/またはRaf結合の減少によって実証する。

20

【0314】

上記方法にしたがって、表1の代表的な化合物を試験したところ、KRAS G12Cに共有結合することが見出された。代表的なデータは、表2に提供されている。

【表 2 - 1】

表 2. 代表的な化合物の改変活性

3番号	結合 %	番号	結合 %	番号	結合 %	番号	結合 %	番号	結合 %
I-1	+++	I-2	+++	I-3	+++	I-4	+++	I-5	+++
I-6	+++	I-7	--	I-8	+++	I-9	--	I-10	++
I-11	+++	I-12	++	I-13	+	I-14	++	I-15	+++
I-16	+	I-17	+	I-18	+	I-19	++	I-20	++
I-21	++	I-22	+	I-23	++	I-24	++	I-25	+
I-26	+	I-27	+++	I-28	+++	I-29	+	I-30	+++
I-31	+	I-32	++	I-33	+++	I-34	+++	I-35	+
I-36	+	I-37	+	I-38	+	I-39	+	I-40	+++
I-41	+++	I-42	--	I-43	+++	I-44	+	I-45	+
I-46	+++	I-47	+++	I-48	--	I-49	--	I-50	--
I-51	--	I-52	--	I-53	--	I-54	--	I-55	--
I-56	--	I-57	--	I-58	--	I-59	--	I-60	--
I-61	--	I-62	--	I-63	--	I-64	--	I-65	--
I-66	--	I-67	--	I-68	--	I-69	--	I-70	--
I-71	--	I-72	--	I-73	--	I-74	--	I-75	++
I-76	++	I-77	+++	I-78	+++	I-79	+	I-80	+++
I-81	+++	I-82	+	I-83	+	I-84	+	I-85	+
I-86	++	I-87	++	I-88	+	I-89	+	I-90	+
I-91	++	I-92	++	I-93	+++	I-94	+	I-95	+
I-96	+++	I-97	+	I-98	+	I-99	+	I-100	+
I-101	+	I-102	++	I-103	+	I-104	+	I-105	+
I-106	+	I-107	+	I-108	++	I-109	++	I-110	+++
I-111	+	I-112	+++	I-113	+	I-114	+++	I-115	+
I-116	++	I-117	++	I-118	++	I-119	++	I-120	+++
I-121	++	I-122	++	I-123	+	I-124	+	I-125	--
I-126	--	I-127	+	I-128	--	I-129	--	I-130	++
I-131	--	I-132	--	I-133	--	I-134	--	I-135	--
I-136	--	I-137	--	I-138	--	I-139	--	I-140	--
I-141	+	I-142	+	I-143	+	I-144	+	I-145	+
I-146	+	I-147	+	I-148	+	I-149	+++	I-150	++
I-151	++	I-152	++	I-153	++	I-154	++	I-155	++
I-156	++	I-157	++	I-158	++	I-159	++	I-160	++
I-161	++	I-162	++	I-163	++	I-164	++	I-165	++
I-166	++	I-167	+	I-168	+	I-169	++	I-170	++

10

20

30

40

【表 2 - 2】

3 番号	結合 %	番号	結合 %	番号	結合 %	番号	結合 %	番号	結合 %
I-171	+++	I-172	+++	I-173	++	I-174	++	I-175	++
I-176	+	I-177	+	I-178	+	I-179	+	I-180	++
I-181	++	I-182	+	I-183	+	I-184	+	I-185	+++
I-186	+	I-187	+	I-188	+++	I-189	+	I-190	+
I-191	+++	I-192	+	I-193	+++	I-194	+++	I-195	+
I-196	++	I-197	+++	I-198	+++	I-199	++	I-200	++
I-201	+	I-202	+	I-203	+	I-204	+	I-205	+
I-206	+	I-207	++	I-208	+	I-209	++	I-210	+
I-211	++	I-212	++	I-213	+++	I-214	++	I-215	++
I-216	++	I-217	++	I-218	++	I-219	+	I-220	++
I-221	++	I-222	++	I-223	++	I-224	++	I-225	++
I-226	+	I-227	+	I-228	+	I-229	+	I-230	+
I-231	+	I-232	+	I-233	+	I-234	+	I-235	+
I-236	+	I-237	+	I-238	+	I-239	+	I-240	+
I-241	+	I-242	++	I-243	+	I-244	+	I-245	+
I-246	+	I-247	+	I-248	+	I-249	+	I-250	+
I-251	+	I-252	+	I-253	+	I-254	+	I-255	+
I-256	+++	I-257	+	I-258	+	I-259	+	I-260	+
I-261	+	I-262	+	I-263	+	I-264	++	I-265	+
I-266	+	I-267	+	I-268	+	I-269	+	I-270	+
I-271	+	I-272	+	I-273	+	I-274	+	I-275	+
I-276	+	I-277	++	I-278	+	I-279	+	I-280	+
I-281	+								

＋は、０％超～最大５０％の結合活性を示す

＋＋は、５０％～８５％の結合活性を示す

＋＋＋は、８５％超の結合活性を示す

実施例 2


化合物 I - 1 の合成

10

20

30

【化 5 2】



【0315】

化合物 I-1 を以下の手順にしたがって調製した。

tert-ブチル 6- (6-クロロ-5-シアノ-2- (メチルチオ) ピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-2-カルボキシレート (2B)

【0316】

4, 6-ジクロロ-2- (メチルチオ) ピリミジン-5-カルボニトリル (2A) (550 mg、2.52 mmol) を含むジクロロメタン (40 mL) の溶液に、Et₃N (764 mg、7.56 mmol) および tert-ブチル 2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-2-カルボキシレート (479 mg、2.26 mmol) を 0℃ で添加し、得られた混合物を 0℃ で 1 時間攪拌した。反応混合物を NaHCO₃ 水溶液およびブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濾過し、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュカラムクロマトグラフィー (5% メタノール/ジクロロメタン) によって精製して、所望の生成物 2B (826 mg、収率 82.8%) を得た。ESI-MS m/z: 396 [M+H]⁺.

tert-ブチル 6- (5-シアノ-6- (5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2- (メチルチオ) ピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-2-カルボキシレート (2C)

【0317】

窒素下の化合物 2B (1 g、2.52 mmol) を含む 1, 4-ジオキサン (24 mL) および H₂O (6 mL) の攪拌溶液に、(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル) ボロン酸 (1.7 g、10.1 mmol)、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パ

10

20

30

40

50

ラジウム (291 mg、0.25 mmol) および Na_2CO_3 (1.07 g、10.1 mmol) を添加し、得られた混合物を 100 °C で一晩攪拌した。混合物を水と酢酸エチルとに分割した。有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、濾過し、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュカラムクロマトグラフィー (50 % 酢酸エチル/石油エーテル) によって精製して、所望の生成物 2 C (986 mg、収率 80 %) を得た。

tert-ブチル 6- (5-シアノ-6- (5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2- (メチルスルホニル) ピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-2-カルボキシレート (2 D)

【0318】

化合物 2 C (986 mg、2.0 mmol) を含むジクロロメタン (40 mL) の溶液に、mCPBA (1.03 g、6.02 mmol) を添加し、得られた混合物を室温で 30 分間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルと NaHCO_3 水溶液とに分割した。有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、濾過し、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュカラムクロマトグラフィー (2 % CH_3OH /ジクロロメタン) によって精製して、所望の生成物 2 D (602 mg、収率 57.5 %) を得た。ESI-MS m/z : 468 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

tert-ブチル 6- (5-シアノ-6- (5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2- (ピロリジン-1-イル) ピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-2-カルボキシレート (2 E)

【0319】

ピロリジン (54 mg、0.76 mmol) を含む THF (6 mL) の攪拌溶液に、 NaH (61 mg、1.52 mmol、収率 60 %) を 0 °C で添加し、得られた混合物を室温で 30 分間攪拌した。混合物を -70 °C に冷却し、化合物 2 D (80 mg、0.15 mmol) を添加し、得られた混合物を -70 °C で 15 分間攪拌した。混合物を氷水でクエンチし、酢酸エチルで抽出した。有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮して、粗生成物 2 E (64 mg、収率 82 %) を得た。

4- (5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2- (ピロリジン-1-イル)-6- (2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-6-イル) ピリミジン-5-カルボニトリル (2 F)

【0320】

化合物 2 E (64 mg、0.124 mmol) を含むジクロロメタン (4 mL) の攪拌溶液に、トリフルオロ酢酸 (1 mL) を 0 °C で添加し、得られた混合物を室温で 30 分間攪拌した。混合物を真空中で濃縮して、溶媒を除去し、残渣を水と酢酸エチルとに分割した。有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮して、粗生成物 2 F (41 mg、収率 80 %) を得た。

4- (2-アクリロイル-2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-6-イル)-6- (5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2- (ピロリジン-1-イル) ピリミジン-5-カルボニトリル (化合物 I-1)

【0321】


化合物 2 F (41 mg、0.099 mmol) を含むジクロロメタン (4 mL) の攪拌溶液に、 Et_3N (50 mg、0.495 mmol) および塩化アクリロイル (27 mg、0.297 mmol) を 0 °C で添加し、得られた混合物を 30 分間攪拌した。混合物を H_2O で洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣を THF (10 mL) に溶解し、水および $\text{LiOH} \cdot \text{H}_2\text{O}$ (81 mg、1.98 mmol) を含む水 (10 mL) を 0 °C で添加した。得られた混合物を 0 °C で 30 分間攪拌した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、ブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュカラムクロマトグラフィー (ジクロロメタン/ MeOH = 15 : 1) によって精製して、所望の生成物である化合物 I-1 (23 mg、収率 50 %) を得た。ESI-MS m/z : 469 $[\text{M}+\text{H}]^+$; ^1H NMR (400 MHz, DMSO-d_6):

δ 13.09 (s, 1H), 7.79 (s, 1H), 7.54-7.51 (m, 1H), 7.30-7.28 (m, 1H), 6.35-6.28 (m, 1H), 6.14-6.09 (m, 1H), 5.70-5.67 (m, 1H), 4.29-4.26 (m, 1H), 4.19-4.16 (m, 1H), 3.99-3.88 (m, 4H), 3.81-3.80 (m, 2H), 3.58-3.55 (m, 2H), 3.46-3.41 (m, 2H), 2.32 (s, 3H), 2.20-2.16 (m, 2H), 1.93-1.87 (m, 4H).

実施例 3

化合物 I-3 の合成

【化 5 3】



【0322】

化合物 I-3 を、上記例示の反応順序に示した試薬および反応条件を用いて調製した。

実施例 4


化合物 I-12 の合成

10

20

30

【化 5 4】



【0323】

化合物 I-12 を以下の手順にしたがって調製した。

tert-ブチル 6-((5-シアノ-6-((5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(メチルチオ)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-カルボキシレート (4A)

【0324】

tert-ブチル 6-((6-クロロ-5-シアノ-2-(メチルチオ)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-カルボキシレート (2B) (1 g、2.52 mmol) を含む 1,4-ジオキサン (24 mL) および H_2O (6 mL) の攪拌溶液に、(5-メチル-1-((テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル)-1H-インダゾール-4-イル)ボロン酸 (1.9 g、7.56 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム (291 mg、0.252 mmol) および Na_2CO_3 (1.07 g、10.1 mmol) を添加した。得られた混合物を脱気し、 N_2 を数サイクル再充填した。混合物を 100 °C で一晩攪拌した。反応物を冷却し、 H_2O (100 mL) を添加し、混合物を酢酸エチル (50 mL $\times$ 2) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、濃縮し、シリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィー (50% 酢酸エチル/石油エーテル) によって精製して、所望の生成物 4A (1.2 g、収率 83%) を得た。

tert-ブチル 6-((5-シアノ-6-((5-メチル-1-((テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル)-1H-インダゾール-4-イル)-2-(メチルスルホニル)ピリ

ミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-2-カルボキシレート (4B)

【0325】

4A (1.2 g, 2.08 mmol) を含むジクロロメタン (40 mL) の溶液に、mCPBA (1.07 g, 6.24 mmol) を 0℃ で添加し、得られた混合物を室温で 1 時間攪拌した。反応混合物を酢酸エチル (50 mL × 2) で抽出し、NaHCO₃ (水溶液) およびブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濃縮し、シリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィー (2% MeOH / ジクロロメタン) によって精製して、所望の生成物 4B (757 mg, 収率 60%) を得た。ESI-MS m/z: 608 [M+H]⁺.

10

tert-ブチル 6-(5-シアノ-6-(5-メチル-1-(テトラヒドロ-2H-ピラン-2-イル)-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-(ピロリジン-1-イル)エトキシ)ピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-2-カルボキシレート (4C)

【0326】

2-(ピロリジン-1-イル)エタノール (45 mg, 0.393 mmol) を含む THF (6 mL) の攪拌溶液に、NaH (60%, 52 mg, 1.31 mmol) を 0℃ で添加し、得られた混合物を室温で 30 分間攪拌した。化合物 4B (80 mg, 0.131 mmol) を -70℃ で添加し、混合物を 15 分間攪拌した。混合物を氷水でクエンチし、酢酸エチル (20 mL × 2) で抽出し、合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濃縮して、粗生成物 4C (72 mg, 収率 86%) を得た。ESI-MS m/z: 643 [M+H]⁺.

20

4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-(ピロリジン-1-イル)エトキシ)-6-(2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-6-イル)ピリミジン-5-カルボニトリル (4D)

【0327】

粗 4C (72 mg, 0.112 mmol) を含むジクロロメタン (4 mL) の攪拌溶液に、TFA (2 mL) を 0℃ で添加し、得られた混合物を室温で 2 時間攪拌した。混合物を真空中で濃縮して、溶媒を除去し、氷水にゆっくり注ぎ、酢酸エチル (20 mL × 2) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濃縮して、粗生成物 4D (48 mg, 収率 94%) を得た。

30

4-(2-アクリロイル-2, 6-ジアザスピロ [3. 4] オクタン-6-イル)-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(2-(ピロリジン-1-イル)エトキシ)ピリミジン-5-カルボニトリル (化合物 I-12)

【0328】

4D (48 mg, 0.105 mmol) を含むジクロロメタン (4 mL) の攪拌溶液に、Et₃N (32 mg, 0.315 mmol) および塩化アクリロイル (19 mg, 0.21 mmol) を 0℃ で添加した。混合物を 0℃ で 30 分間攪拌した。混合物を H₂O で洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濃縮して、粗生成物を得て、それを次の工程で直接使用した。

40

【0329】

上記で得た粗生成物を THF (10 mL) および H₂O (4 mL) に溶解し、LiOH 溶液 (6 mL の H₂O 中の 43 mg, 1.05 mmol) を 0℃ で添加した。混合物を 0℃ で 30 分間攪拌し、次いで、酢酸エチル (20 mL × 2) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮し、シリカゲルにおけるカラムクロマトグラフィー (ジクロロメタン: MeOH = 15:1) によって精製して、所望の生成物である化合物 I-12 (18 mg, 収率 33%) を得た。ESI-MS m/z: 514 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ: 13.18 (s, 1H), 7.85 (s, 1H), 7.59-7.57 (m, 1H), 7.34-7.32 (m, 1H), 6.35-6.28 (m, 1H), 6.15-6.10 (m, 1H), 5.71-5.68 (m, 1H), 4.62 (m, 2H), 4.30-4.20 (m, 3H), 4.01-3.91 (m, 5H), 3.80-3.72 (m,


50

2H), 3.55-3.46 (m, 2H), 3.14-3.00 (m, 2H), 2.33 (s, 3H), 2.28-2.00 (m, 2H), 1.93-1.85 (m, 4H).

実施例 5

化合物 I-44 の合成

【化 5 5】



【0330】

化合物 I-44 を以下の手順にしたがって調製した。

30

(S)-tert-butyl 6-((6-chloro-5-cyano-2-((1-methylpyrrolidin-2-yl)methoxy)pyrimidin-4-yl)-2,6-diazaspiro[3.4]octan-2-yl)carboxylate (5B)

【0331】

(S)-((1-methylpyrrolidin-2-yl)methanol (1.78 g, 15.45 mmol) を含む THF (20 mL) の攪拌溶液に、NaH (60%、1.24 g、30.9 mmol) を 0℃ で添加し、混合物を室温で 30 分間攪拌した。−70℃ に冷却した後、tert-butyl 6-((6-chloro-5-cyano-2-((1-methylpyrrolidin-2-yl)methoxy)pyrimidin-4-yl)-2,6-diazaspiro[3.4]octan-2-yl)carboxylate (5A) (2.2 g, 5.15 mmol) を添加した。得られた混合物を −70℃ で 15 分間攪拌し、次いで、混合物を氷水でクエンチし、酢酸エチル (20 mL × 2) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィー (5% MeOH/ジクロロメタン) によって精製して、所望の生成物 5B (1.9 g、収率 80%) を得た。ESI-MS m/z : 463.4 [M+H]⁺.

40

(S)-tert-butyl 6-((6-((3-carbamoylphenyl)amino)-5-cyano-2-((1-methylpyrrolidin-2-yl)methoxy)pyrimidin-4-yl)-2,6-diazaspiro[3.4]octan-2-yl)carboxylate (5C)

【0332】

化合物 5B (150 mg、0.32 mmol) および 3-アミノベンズアミド (48.

50

5 mg、0.36 mmol)を含むNMP (6 mL)の攪拌溶液に、 Cs_2CO_3 (318 mg、0.125 mmol)を室温で添加した。得られた混合物を100℃に加熱し、一晚攪拌した。反応物を冷却し、 H_2O でクエンチし、酢酸エチル (20 mL×2)で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィー (2% MeOH/ジクロロメタン)によって精製して、所望の生成物5C (30 mg、収率15.6%)を得た。ESI-MS m/z : 563.6 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

(S)-3-((5-シアノ-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)-6-(2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)ピリミジン-4-イル)アミノ)ベンズアミド (5D)

10

【0333】

化合物5C (30 mg、0.05 mmol)を含むジクロロメタン (4 mL)の攪拌溶液に、TFAを0℃で添加し、得られた混合物を室温で30分間攪拌した。混合物を真空中で濃縮して、粗生成物5D (25 mg)を得て、それを次の工程で直接使用した。

(S)-3-((6-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)-5-シアノ-2-((1-メチルピロリジン-2-イル)メトキシ)ピリミジン-4-イル)アミノ)ベンズアミド (化合物I-44)

【0334】

粗5D (25 mg、0.051 mmol)を含むジクロロメタン (4 mL)の攪拌溶液に、 Et_3N (25.7 mg、0.255 mmol)およびアクリル酸無水物 (6.5 mg、0.051 mmol)を-78℃で添加し、得られた混合物を-78℃で30分間攪拌した。混合物を H_2O で洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。得られた残渣をTHF (10 mL)に溶解し、0℃に冷却し、 H_2O およびLiOH・ H_2O を添加した。得られた混合物を0℃で30分間攪拌し、次いで、酢酸エチル (20 mL×2)で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をprep-TLCプレート (ジクロロメタン/MeOH=20/1)によって精製して、所望の生成物である化合物I-44 (8 mg、収率31%)を得た。ESI-MS m/z : 517.3 $[\text{M}+\text{H}]^+$; ^1H NMR (400 MHz, DMSO- d_6) δ : 8.22 (s, 1H), 7.66 (d, 1H), 7.61 (d, 1H), 7.49~7.41 (m, 1H), 6.42~6.36 (m, 1H), 6.31~6.26 (m, 1H), 5.79~5.77 (m, 1H), 5.36 (m, 1H), 4.34 (m, 1H), 4.11~4.01 (m, 4H), 3.61 (m, 2H), 3.15 (m, 1H), 3.06 (s, 3H), 2.34 (m, 1H), 2.31 (m, 2H), 2.31~2.03 (m, 2H), 1.61 (m, 2H), 0.92 (m, 2H).


20

30

実施例6

化合物I-118の合成

【化 5 6】



【0335】

化合物 I-118 を以下の手順にしたがって調製した。

5-フルオロ-6-ヒドロキシ-2-メチルチオ-4(1H)-ピリミジノン(6B)

【0336】

2-メチル-2-チオプロシド尿素硫酸塩(4.17g、15mmol)およびフルオロマロン酸ジメチル(6A)(4.5g、30mmol)を含むMeOH(60mL)の攪拌溶液に、NaOMe(4.86g、90mmol)を小分けにして0℃(氷浴)で添加した。添加完了後、氷浴を除去し、反応混合物を室温で一晩攪拌した。反応混合物を乾燥状態に近くなるまで真空中で濃縮し、水(5mL)で希釈し、6N HCl(15mL)でpH2まで酸性化して、生成物を沈殿させた。濾過した後、固体を1N HCl(2

× 10 mL) でリンスし、真空下で乾燥させて、所望の生成物 6 B (3.57 g、収率 68%) を得た。

4, 6-ジクロロ-5-フルオロ-2-(メチルチオ)ピリミジン (6 C)

【0337】

化合物 6 B (3.57 g、20.2 mmol) を含む CH₃CN (20 mL) の攪拌溶液に、POCl₃ (10 mL) を添加し、得られた混合物を 80 °C で 4 時間攪拌した。混合物を氷水 (20 mL) に注ぎ、酢酸エチル (20 mL × 2) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濃縮して、粗生成物 6 C (1.88 g、収率 44%) を得た。

tert-ブチル 6-(6-クロロ-5-フルオロ-2-(メチルチオ)ピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3.4] オクタン-2-カルボキシレート (6 D)

【0338】

粗 6 C (500 mg、2.36 mmol) を含むジクロロメタン (40 mL) の溶液に、Et₃N (718 mg、7.10 mmol) および tert-ブチル 2, 6-ジアザスピロ [3.4] オクタン-2-カルボキシレート (500 mg、2.36 mmol) を 0 °C で添加し、得られた混合物を 0 °C で 60 分間攪拌した。反応混合物を NaHCO₃ (水溶液) およびブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮し、シリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィー (5% CH₃OH/ジクロロメタン) によって精製して、所望の生成物 6 D (758 mg、収率 82.8%) を得た。ESI-MS m/z: 389 [M+H]⁺.

tert-ブチル 6-(5-フルオロ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(メチルチオ)ピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3.4] オクタン-2-カルボキシレート (6 E)

【0339】

6 D (758 mg、1.95 mmol) を含む 1, 4-ジオキサン (24 mL) および H₂O (6 mL) の攪拌溶液に、(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル) ボロン酸 (683 mg、3.9 mmol)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム (225 mg、0.195 mmol) および Na₂CO₃ (620 mg、5.8 mmol) を添加した。混合物に窒素をパージし、次いで、100 °C で一晩攪拌した。混合物に水 (100 mL) を添加し、次いで、酢酸エチル (50 mL × 2) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮し、シリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィー (50% 酢酸エチル/石油エーテル) によって精製して、所望の生成物 6 E (755 mg、収率 80%) を得た。

tert-ブチル 6-(5-フルオロ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-(メチルスルホニル)ピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3.4] オクタン-2-カルボキシレート (6 F)

【0340】

6 E (755 mg、1.55 mmol) を含むジクロロメタン (40 mL) の溶液に、mCPBA (800 mg、4.67 mmol) を 0 °C で添加した。得られた混合物を室温で 30 分間攪拌し、次いで、酢酸エチル (50 mL × 2) で抽出した。合わせた抽出物を NaHCO₃ (水溶液) およびブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮し、シリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィー (2% MeOH/ジクロロメタン) によって精製して、所望の生成物 6 F (479 mg、収率 60%) を得た。ESI-MS m/z: 517 [M+H]⁺.

tert-ブチル 6-(5-フルオロ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-4-イル)-2, 6-ジアザスピロ [3.4] オクタン-2-カルボキシレート (6 G)

【0341】

化合物 6 F (200 mg、0.387 mmol) を含むブチルアルコール (6 mL) の攪拌溶液に、モルホリン (1 mL) および DIPEA (1 mL) を室温で添加し、得られ

10

20

30

40

50

た混合物を、密封されたチューブ内において 150℃で 12 時間攪拌した。冷却後、混合物を酢酸エチル (20 mL×2) で抽出し、合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮して、粗生成物 6 G (113 mg、収率 56%) を得た。ESI-MS m/z: 524 [M+H]⁺.

4-(5-フルオロ-4-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-6-(2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)ピリミジン-2-イル)モルホリン(6H)

【0342】

化合物 6 G (113 mg、0.21 mmol) を含むジクロロメタン (4 mL) の攪拌溶液に、TFA (2 mL) を 0℃で添加し、得られた混合物を室温で 45 分間攪拌した。混合物を真空中で濃縮して、溶媒を除去し、氷水にゆっくり注ぎ、次いで、酢酸エチル (20 mL×2) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮して、粗生成物 6 H (80 mg、収率 90%) を得た。

1-(6-(5-フルオロ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-モルホリノピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパー-2-エン-1-オン(化合物 I-118)

【0343】

化合物 6 H (80 mg、0.19 mmol) を含むジクロロメタン (10 mL) の攪拌溶液に、Et₃N (57 mg、0.57 mmol) および塩化アクリロイル (17 mg、0.19 mmol) を 0℃で添加し、得られた混合物を 0℃で 10 分間攪拌した。混合物を H₂O で洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濃縮して、粗生成物を得た。

【0344】

粗生成物を 0℃で THF (10 mL) に溶解し、H₂O (4 mL) および LiOH・H₂O (6 mL の H₂O 中 60 mg、1.52 mmol) を添加した。得られた混合物を 0℃で 30 分間攪拌し、次いで、酢酸エチル (20 mL×2) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィー (ジクロロメタン/MeOH=15:1) によって精製して、所望の生成物である化合物 I-118 (20 mg、収率 22%) を得た。ESI-MS m/z: 478 [M+H]⁺. ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆) δ: 13.04(s, 1H), 7.79 (s, 1H), 7.50 (d, 1H), 7.28 (d, 1H), 6.34-6.27 (m, 1H), 6.13-6.09(m, 1H), 5.69-5.66 (m, 1H), 4.27-4.25 (m, 1H), 4.17-4.15 (m, 1H), 3.95-3.84 (m, 4H), 3.69 (m, 2H), 3.63-3.60 (m, 8H), 2.32 (s, 3H), 2.17-2.15 (m, 2H).

実施例 7


化合物 I-135 の合成

10

20

30

【化 5 7】



化合物 I-135

【0345】

化合物 I-135 を以下の手順にしたがって調製した。

2-(ベンジルオキシ)-3-ブロモ-5-クロロピリジン (7B)

【0346】

3-ブロモ-5-クロロピリジン-2-オール (7A) (4.2 g、20 mmol) を含む 80 mL のトルエンの攪拌溶液に、炭酸銀 (6.07 g、22.0 mmol) および臭化ベンジル (3.79 g、22.0 mmol) を添加し、得られた混合物を還流で 1 時間攪拌した。混合物を濾過し、EtOAc でリンスした。濾液を水で洗浄し、乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、生成物 (5.1 g、収率 86%) を得た。ESI-MS m/z : 298 [M+H]⁺。

2-(ベンジルオキシ)-3-ブロモ-5-クロロイソニコチンアルデヒド (7C)

【0347】

LDA (4.0 mL) を含む 20 mL の THF の溶液に、化合物 7B (2.0 g、6.

10

20

30

40

50

7 mmol) を含む 10 mL の THF を -78°C で滴下し、得られた混合物を -78°C で 30 分間攪拌した。混合物に、ギ酸エチル (4.96 g、67 mmol) を含む 15 mL の THF を滴下した。混合物を -78°C で 1.5 時間攪拌し、 NaHCO_3 (水溶液) でクエンチし、次いで、EtOAc (30 mL $\times$ 3) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、生成物 7C (1.2 g、収率 60%) を得た。ESI-MS m/z : 326.3 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

2-(ベンジルオキシ)-3-ブロモ-5-クロロイソニコチン酸 (7D)

【0348】

化合物 7C (1.0 g、3.06 mmol) を含む THF/ H_2O / $t\text{-BuOH}$ (10 mL/10 mL/5 mL) の溶液に、 NaH_2PO_4 (1.5 g、12.2 mmol) および NaClO_2 (1.1 g、12.2 mmol) を 0°C で添加し、得られた混合物を 0°C で 1 時間攪拌した。2-メチルブタ-2-エン (1.5 g、21.4 mmol) を添加し、得られた混合物を室温で一晩攪拌した。混合物を水で希釈し、1N HCl で pH を 3 に調整し、EtOAc (30 mL $\times$ 3) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。粗生成物 7D (1.8 g) を次の工程で直接使用した。ESI-MS m/z : 342.2 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

2-(ベンジルオキシ)-3-ブロモ-5-クロロイソニコチンアミド (7E)

【0349】

化合物 7D (2.0 g、5.84 mmol)、 NH_4Cl (3.1 g、58.4 mmol)、HATU (3.3 g、8.76 mmol) および DIEA (2.3 g、17.5 mmol) を含む 25 mL の DMF の溶液を、室温で 4 時間攪拌した。混合物を水と EtOAc とに分割した。有機層をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、所望の生成物 7E (500 mg、収率 25%) を得た。ESI-MS m/z : 341.2 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

3-ブロモ-5-クロロ-2-ヒドロキシイソニコチノニトリル (7F)

【0350】

化合物 7E (500 mg、1.46 mmol) を POCl_3 (15 mL) に溶解し、還流で一晩攪拌した。混合物を真空中で濃縮し、ジクロロメタンで希釈し、次いで、氷- NaHCO_3 (水溶液) にゆっくり注いだ。混合物をジクロロメタン (20 mL $\times$ 3) で抽出し、合わせた抽出物をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、化合物 7F (200 mg、収率 58%) を得た。ESI-MS m/z : 233 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

3-ブロモ-5-クロロ-1-メチル-2-オキソ-1,2-ジヒドロピリジン-4-カルボニトリル (7G)

【0351】

化合物 7F (250 mg、1.07 mmol)、 Bu_4NI (40 mg、0.107 mmol) および K_2CO_3 (740 mg、5.35 mmol) を含む 15 mL のトルエンの溶液に、 CH_3I (1.52 g、10.7 mmol) を添加した。混合物を 60°C で一晩攪拌した。混合物を水に注ぎ、次いで、EtOAc (20 mL $\times$ 3) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、 Na_2SO_4 で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、所望の生成物 7G (220 mg、収率 83%) を得た。ESI-MS m/z : 246.9 $[\text{M}+\text{H}]^+$.

$t\text{-tert}$ -ブチル 6-(5-ブロモ-4-シアノ-1-メチル-6-オキソ-1,6-ジヒドロピリジン-3-イル)-2,6-ジアザスピロ [3.4] オクタン-2-カルボキシレート (7H)

【0352】

化合物 7G (220 mg、0.89 mmol) および DIEA (345 mg、2.67 mmol) を含む NMP (12 mL) の溶液に、 $t\text{-tert}$ -ブチル 2,6-ジアザスピロ

10

20

30

40

50

〔3. 4〕オクタン-2-カルボキシレート (280 mg、1.34 mmol) を添加し、得られた混合物を80℃で2時間攪拌した。混合物を水に注ぎ、EtOAc (25 mL × 3) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、所望の生成物7H (340 mg、収率90%) を得た。

tert-ブチル6-(4-シアノ-1-メチル-5-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-6-オキソ-1,6-ジヒドロピリジン-3-イル)-2,6-ジアザスピロ〔3.4〕オクタン-2-カルボキシレート (7I)

【0353】

化合物7H (200 mg、0.473 mmol)、(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル) ボロン酸 (120 mg、0.71 mmol)、S-PhOS (50 mg、0.12 mmol)、Pd₂(dba)₃ (44 mg、0.0473 mmol) および Na₂CO₃ (250 mg、2.37 mmol) を含むトルエン/水 (16 mL/2 mL) の溶液を、還流で一晩攪拌した。混合物を水に注ぎ、EtOAc (25 mL × 3) で抽出した。合わせた抽出物をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、化合物7I (40 mg、収率18%) を得た。ESI-MS m/z: 475.2 [M+H]⁺.

5-(2-アクリロイル-2,6-ジアザスピロ〔3.4〕オクタン-6-イル)-1-メチル-3-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)-2-オキソ-1,2-ジヒドロピリジン-4-カルボニトリル (化合物I-135)


【0354】

化合物7I (80 mg、0.17 mmol) を含むジクロロメタン (6 mL) の攪拌溶液に、TFA (2 mL) を添加し、得られた混合物を室温で1時間攪拌した。溶媒を真空中で除去し、残渣をジクロロメタンとNa₂CO₃ (水溶液) とに分割した。有機層を分離し、0℃に冷却した。Et₃N (36 mg、0.36 mmol) および塩化アクリロイル (24 mg、0.27 mmol) を添加し、得られた混合物を0℃で30分間攪拌した。混合物をジクロロメタンで希釈し、NaHCO₃ (水溶液) で洗浄した。溶媒を真空中で除去し、残渣をシリカゲルにおけるフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、所望の生成物である化合物I-135 (20 mg、収率36%) を得た。ESI-MS m/z: 429 [M+H]⁺; ¹H NMR (400 MHz, DMSO-d₆): δ 13.09 (s, 1H), 7.88 (s, 1H), 7.52 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.34 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.13 (s, 1H), 6.36 (m, 1H), 6.16 (m, 1H), 5.73 (m, 1H), 4.16-4.32 (m, 4H), 3.91-4.08 (m, 4H), 3.49 (s, 3H), 2.36 (s, 3H), 2.16 (m, 2H).

実施例 8

化合物I-239の合成

【化 5 8】



【0355】

化合物 I-239 を以下の手順にしたがって調製した。

tert-ブチル-6-(6-クロロ-5-フルオロピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-カルボキシレート (8B)

【0356】

4,6-ジクロロ-5-フルオロピリミジン (8A) (200 mg、1.2 mmol) を含むジクロロメタン (20 mL) の溶液に、Et₃N (363 mg、3.6 mmol) および tert-ブチル 2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-カルボキシレート (229 mg、1.08 mmol) を 0℃ で添加し、得られた混合物を 0℃ で 3 時間攪拌した。混合物を水と酢酸エチルとに分割した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濾過し、真空中で濃縮した。残渣をシリカにおけるフラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製して、所望の生成物 8B (370 mg、収率 90%) を得た。

tert-ブチル 6-(5-フルオロ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-カルボキシレート (8C)

【0357】

化合物 8B (370 mg、1.08 mmol) を含むジオキサン (20 mL) および H₂O (5 mL) の溶液に、(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ボロン酸 (1.52 g、8.63 mmol)、Na₂CO₃ (915 mg、8.63 mmol) および Pd(PPh₃)₄ (127 mg、0.11 mmol) を室温で添加し、得られた混合物を窒素下、120℃で一晩攪拌した。混合物を室温に冷却し、水と酢酸エチルとに分割した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄ で乾燥させ、濾過し、真空中で濃縮した。残渣をシリカゲルにおけるフラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製して、所望の生成物 8C (473 mg、収率 100%) を得た。ESI-MS m/z: 439.35 [M+H]⁺。

4-(5-フルオロ-6-(2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-6-イル)ピ

10

20

30

40

50

リミジン-4-イル)-5-メチル-1H-インダゾール(8D)

【0358】

化合物8C(473mg、1.08mmol)にHCl/MeOH(15mL)を添加し、得られた混合物を室温で2時間攪拌した。混合物を真空中で濃縮して、所望の生成物8D(365mg、収率100%)を得て、それを次の工程で直接使用した。

1-(6-(5-フルオロ-6-(5-メチル-1H-インダゾール-4-イル)ピリミジン-4-イル)-2,6-ジアザスピロ[3.4]オクタン-2-イル)プロパー2-エン-1-オン(化合物I-239)

【0359】

化合物8D(365mg、1.08mmol)を含むジクロロメタン(15mL)の溶液に、Et₃N(566mg、5.6mmol)およびアクリル酸無水物(141mg、1.12mmol)を0℃で添加し、得られた混合物を10分間攪拌した。混合物を水とジクロロメタンとに分割した。有機層を真空中で濃縮し、残渣をTHF(10mL)に溶解し、0℃に冷却した。LiOH・H₂O(376mg、8.96mmol)およびH₂O(10mL)を添加し、混合物を0℃で20分間攪拌した。混合物を水と酢酸エチルとに分割した。有機層をブラインで洗浄し、Na₂SO₄で乾燥させ、濾過し、真空中で濃縮した。残渣をprep-TLCプレートによって精製して、所望の生成物である化合物I-239(125mg、収率28.5%)を得た。ESI-MS m/z: 393.45 [M+H]⁺; ¹H NMR (400MHz, DMSO-d₆): δ 13.11 (s, 1H), 8.42 (m, 1H), 7.77 (m, 1H), 5.44-5.67 (m, 1H), 7.33 (m, 1H), 6.28-6.32 (m, 1H), 6.10-6.14 (m, 1H), 5.67-5.69 (m, 1H), 4.11-4.17 (m, 2H), 3.89-3.91 (m, 2H), 3.75 (m, 2H), 3.18 (m, 2H), 2.30 (m, 3H), 2.19 (m, 2H).

【0360】

本明細書または添付の出願データシートに記載の全ての米国特許、米国特許出願公報、米国特許出願、外国特許、外国特許出願および非特許刊行物は、参照として全体が本明細書と矛盾しない程度に本明細書に援用される。

【0361】

本願が優先権を主張する米国特許仮出願第62/713,371号(2018年8月1日出願)および米国特許仮出願第62/713,298(2018年8月1日出願)は、それらの全体が参照として本明細書に援用される。

【0362】

本発明の特定の実施形態が例示を目的として本明細書に記載されているが、本発明の趣旨および範囲を逸脱することなく種々の修正が可能であることが、前述から認識されるであろう。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲以外によって限定されない。

10

20

30

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2019/044729

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. A61K31/4427 A61K31/506 A61P35/00 C07D487/10
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61K A61P C07D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, CHEM ABS Data, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2011/114275 A1 (UNIV BASEL [CH]; CMILJANOVIC VLADIMIR [CH] ET AL.) 22 September 2011 (2011-09-22) example P7; claims 1-14; table 4; compounds 209-211-250, 250-267, 305, 312-330, 366-368 -----	1-25, 27, 29, 31, 33-47, 53, 66, 78-86
X	WO 2016/044604 A1 (EPIZYME INC [US]) 24 March 2016 (2016-03-24) Table 1, compounds 41-43, 62, 99, 215, 219, 220, 233, 255, 264-267, 283-285, 298; pages 235, 237, 306, 316; claims 1, 130, 133, 136, 143-158 ----- -/-	1, 2, 5, 25, 78-86

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 October 2019

Date of mailing of the international search report

17/10/2019

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Rufet, Jacques

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/US2019/044729

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2014/081718 A1 (GENENTECH INC [US]) 30 May 2014 (2014-05-30) claims 1-25; example 38 -----	1,6,25, 78-86
X	WO 2014/144169 A1 (EPIZYME INC [US]) 18 September 2014 (2014-09-18) Table 1B, compounds 179, 252-253, 294-297, 299; claims 1-14,24-34 -----	1,2,5, 25,78-86
A	WO 2010/054398 A1 (VERTEX PHARMA [US]; CHARRIER JEAN-DAMIEN [GB] ET AL.) 14 May 2010 (2010-05-14) claims 1-63,69; compounds 1-368 -----	1,2,7, 25,78-86
X	WO 2016/055394 A1 (HOFFMANN LA ROCHE [CH]; HOFFMANN LA ROCHE [US]) 14 April 2016 (2016-04-14) claims 1-17; examples 1-55,59-61 -----	1,2,7, 24,78,79
A	WO 2015/054572 A1 (ARAXES PHARMA LLC [US]; LI LIANSHENG [US] ET AL.) 16 April 2015 (2015-04-16) cited in the application claims 1-95 -----	1-88

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/US2019/044729

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2011114275 A1	22-09-2011	AU 2011228703 A1	20-09-2012
		BR 112012023320 A2	24-05-2016
		CA 2791737 A1	22-09-2011
		CN 102939292 A	20-02-2013
		EP 2547684 A1	23-01-2013
		JP 2013522286 A	13-06-2013
		KR 20130086520 A	02-08-2013
		NZ 602292 A	29-08-2014
		RU 2012143689 A	20-04-2014
		SG 184062 A1	30-10-2012
		US 2013040934 A1	14-02-2013
		WO 2011114275 A1	22-09-2011
		ZA 201206580 B	29-05-2013
WO 2016044604 A1	24-03-2016	EP 3193608 A1	26-07-2017
		JP 2017530959 A	19-10-2017
		US 2017305922 A1	26-10-2017
		WO 2016044604 A1	24-03-2016
WO 2014081718 A1	30-05-2014	BR 112015011456 A2	11-07-2017
		CA 2891655 A1	30-05-2014
		CN 104955824 A	30-09-2015
		EP 2922851 A1	30-09-2015
		EP 3181564 A1	21-06-2017
		JP 6430390 B2	28-11-2018
		JP 2016500075 A	07-01-2016
		KR 20150087850 A	30-07-2015
		RU 2015118647 A	10-01-2017
		US 2016016948 A1	21-01-2016
		WO 2014081718 A1	30-05-2014
WO 2014144169 A1	18-09-2014	AU 2014227775 A1	10-09-2015
		AU 2018211214 A1	23-08-2018
		BR 112015022787 A2	07-11-2017
		CA 2903813 A1	18-09-2014
		CN 105228997 A	06-01-2016
		EA 201591532 A1	31-03-2016
		EP 2970219 A1	20-01-2016
		HK 1219947 A1	21-04-2017
		JP 2016519078 A	30-06-2016
		JP 2018118994 A	02-08-2018
		KR 20160003647 A	11-01-2016
		SG 11201507070X A	29-10-2015
		US 2016039834 A1	11-02-2016
		US 2017320883 A1	09-11-2017
		US 2018282343 A1	04-10-2018
		US 2019135819 A1	09-05-2019
		WO 2014144169 A1	18-09-2014
WO 2010054398 A1	14-05-2010	AU 2009313198 A1	30-06-2011
		AU 2016203414 A1	23-06-2016
		CA 2743134 A1	14-05-2010
		CN 102264721 A	30-11-2011
		EP 2370424 A1	05-10-2011
		HK 1161260 A1	06-01-2017
		IL 212817 A	31-05-2015
		JP 5702293 B2	15-04-2015
		JP 5972942 B2	17-08-2016

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/US2019/044729

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date	
		JP 2012508260 A	05-04-2012	
		JP 2014240410 A	25-12-2014	
		JP 2016216495 A	22-12-2016	
		KR 20110084527 A	25-07-2011	
		KR 20170015566 A	08-02-2017	
		NZ 593316 A	28-06-2013	
		RU 2011123647 A	20-12-2012	
		US 2012040020 A1	16-02-2012	
		US 2014113005 A1	24-04-2014	
		WO 2010054398 A1	14-05-2010	
		ZA 201103411 B	26-09-2012	

WO 2016055394	A1	14-04-2016	AU 2015330141 A1	30-03-2017
			BR 112017006829 A2	12-12-2017
			CA 2962122 A1	14-04-2016
			CL 2017000804 A1	15-12-2017
			CN 106852142 A	13-06-2017
			CR 20170118 A	10-07-2017
			EP 3204383 A1	16-08-2017
			JP 2017534606 A	24-11-2017
			KR 20170057307 A	24-05-2017
			PE 10572017 A1	21-07-2017
			PH 12017500658 A1	02-10-2017
			SG 11201702335V A	27-04-2017
			US 2017204107 A1	20-07-2017
			WO 2016055394 A1	14-04-2016

WO 2015054572	A1	16-04-2015	AU 2014331794 A1	21-04-2016
			BR 112016008016 A2	12-09-2017
			CA 2926328 A1	16-04-2015
			CN 106488910 A	08-03-2017
			EA 201690752 A1	29-07-2016
			EP 3055290 A1	17-08-2016
			JP 6559123 B2	14-08-2019
			JP 2016532656 A	20-10-2016
			KR 20160076519 A	30-06-2016
			PH 12016500538 A1	13-06-2016
			SG 11201602662Y A	30-05-2016
			WO 2015054572 A1	16-04-2015
			ZA 201602245 B	25-09-2019

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 K 31/5377 (2006.01)	A 6 1 K 31/5377	
C 0 7 D 519/00 (2006.01)	C 0 7 D 519/00	3 1 1
A 6 1 K 31/4439 (2006.01)	A 6 1 K 31/4439	
A 6 1 K 31/53 (2006.01)	A 6 1 K 31/53	

(81)指定国・地域 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT

(74)代理人 230113332

弁護士 山本 健策

(72)発明者 リー, リアンシェン

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 2 1 3 0, サンディエゴ, アロヨ デイル レーン 1 3 5 6 9

(72)発明者 フェン, ジュン

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 2 1 3 0, サンディエゴ, クエイル ラン ストリート 6 1 6 0

(72)発明者 ウー, タオ

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 2 0 0 9, カールズバッド, テラザ ギタラ 2 3 5 5

(72)発明者 リウ, ユアン

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 2 1 2 2, サンディエゴ, カミノ リンドー 3 8 7 1

(72)発明者 ワン, イー

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 2 1 2 2, サンディエゴ, チャーマント ドライブ 7 5 5 6, アpartment 1 7 3 2

(72)発明者 ボラム, アラナ ケー.

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 2 0 2 4, エンシニータス, ブマン ロード 3 4 4 2

(72)発明者 レン, ピンダ

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 2 1 3 0, サンディエゴ, ハイブンリッジ ウェイ 5 5 3 4

(72)発明者 リウ, イー

アメリカ合衆国 カリフォルニア 9 2 1 3 0, サンディエゴ, バーロウズ ランディング コーブ 4 8 4 1

F ターム(参考) 4C050 AA04 BB02 CC04 CC07 EE02 FF01 GG01 HH02 HH04

4C072 MM02 UU01

4C086 AA01 AA02 AA03 CB02 CB03 CB05 MA01 MA04 MA31 MA52

MA55 MA56 MA57 MA66 NA14 NA15 ZB26 ZB27