(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104491238 A
(43)申请公布日 2015.04.08

(21)申请号 201410755058.7

(22)申请日 2014.12.11

(71)申请人 青岛百瑞吉生物工程有限公司
地址 266005 山东省青岛市市南区莘县路39号219室

(72)发明人 朱静 赵兰

(74)专利代理机构 江苏圣典律师事务所 32237
代理人 贺翔

(51)Int.Cl.
A61K 36/884(2006.01)
A61P 1/08(2006.01)
A61P 9/12(2006.01)
A61P 3/06(2006.01)
A61K 35/618(2015.01)
A61K 35/62(2006.01)
A61K 35/646(2015.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

治疗眩晕的中药制剂及其制作方法和应用

(57)摘要

本发明公开了治疗眩晕的中药制剂，每剂配方组成中包括以下组分且各组分的质量分别为：白术：10-15g；茯苓：9-12g；泽泻：10-15g；节菖蒲：10-15g；川牛膝：5-10g；女贞子：15-20g；荷叶：20-30g；草决明：10-15g；全蝎：5-10g；牡蛎：10-15g；赤芍：10-15g；山楂：15-20g；地龙：20-25g；鸡血藤：20-30g；丹参：20-25g；桃仁：10-12g。本发明同时公开了其制作方法及应用。本发明通过中药配方中各组分的药用价值，以及相互之间的配伍作用，能够有效降血压降血脂，祛湿活血，潜降熄风，使眩晕症状消失，具有疗效好、成本低，服用方便的优势。

CN 104491238 A

1. 治疗眩晕的中药制剂，其特征在于，每剂中药制剂的配方组成中包括以下组分且各组分的质量分别为：

白术：10-15g；

茯苓：9-12g；

泽泻：10-15g；

节菖蒲：10-15g；

川牛膝：5-10g；

女贞子：15-20g；

荷叶：20-30g；

草决明：10-15g；

全蝎：5-10g；

牡蛎：10-15g;

赤芍：10-15g；

山楂：15-20g；

地龙：20-25g；

鸡血藤：20-30g；

丹参：20-25g；

桃仁：10-12g。

2. 根据权利要求 1 所述的用于治疗眩晕的中药制剂，其特征在于，每剂中药制剂的配方组成中包括以下组分且各组分的质量分别为：白术：12g；茯苓：10g；泽泻：10g；节菖蒲：10g；川牛膝：9g；女贞子：15g；荷叶：30g；草决明：12g；全蝎：9g；牡蛎：15g; 赤芍：10g；山楂：15g；地龙：21g；鸡血藤：30g；丹参：20g；桃仁：12g。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的用于治疗眩晕的中药制剂，其特征在于，还包括党参 10-15g。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的用于治疗眩晕的中药制剂，其特征在于，每剂中药制剂的配方组成中包括以下组分且各组分的质量分别为：白术：12g；茯苓：10g；泽泻：10g；节菖蒲：10g；川牛膝：9g；女贞子：15g；荷叶：30g；草决明：12g；全蝎：9g；牡蛎：15g; 赤芍：10g；山楂：15g；地龙：21g；鸡血藤：30g；丹参：20g；桃仁：12g，党参 15g。

5. 用于治疗眩晕的中药制剂的制作方法，其特征在于，将所述的用于治疗眩晕的中药制剂中各组分的质量配比混合后，进行粉碎研磨成细粉，过 60-100 目筛，然后将过筛后的细粉投入混合搅拌机中充分混匀，并按照每剂的计量分装备用。

6. 根据权利要求 5 所述的中药制剂在制备治疗眩晕药物上的应用。

治疗眩晕的中药制剂及其制作方法和应用

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药制剂及其制作方法和应用，尤其是属于治疗眩晕的中药制剂及其制作方法和应用，属于中药配方及应用技术领域。

背景技术

[0002] 眩晕是因机体对空间定位障碍而产生的一种动性或位置性错觉，它涉及多个学科。眩晕可分为真性眩晕和假性眩晕。真性眩晕是由眼、本体觉或前庭系统疾病引起的，有明显的外物或自身旋转感。假性眩晕多由全身系统性疾病引起，如心血管疾病、脑血管疾病、贫血、尿毒症、药物中毒、内分泌疾病及神经官能症等几乎都有轻重不等的头晕症状，患者感觉“飘飘荡荡”，没有明确转动感。特别是由动脉硬化或高血压、颈椎病导致的眩晕等，现有药物治疗效果差。因此，眩晕的根本治疗成为重中之重。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本发明的目的在于提供一种副作用小、疗效好、费用低，治疗效果明显的用于治疗眩晕的的中药配方组成及其制作方法。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明的技术方案为：

治疗眩晕的中药制剂，每剂配方组成中包括以下组分且各组分的质量分别为：白术：10-15g；茯苓：9-12g；泽泻：10-15g；节菖蒲：10-15g；川牛膝：5-10g；女贞子：15-20g；荷叶：20-30g；草决明：10-15g；全蝎：5-10g；牡蛎：10-15g; 赤芍：10-15g；山楂：15-20g；地龙：20-25g；鸡血藤：20-30g；丹参：20-25g；桃仁：10-12g。

[0005] 进一步，治疗眩晕的中药制剂优选为，每剂中药制剂的配方组成中包括以下组分且各组分的质量分别为：白术：12g；茯苓：10g；泽泻：10g；节菖蒲：10g；川牛膝：9g；女贞子：15g；荷叶：30g；草决明：12g；全蝎：9g；牡蛎：15g; 赤芍：10g；山楂：15g；地龙：21g；鸡血藤：30g；丹参：20g；桃仁：12g。

[0006] 此外，所述的用于治疗眩晕的中药制剂，还包括党参 10-15g。

[0007] 而进一步，治疗眩晕的中药制剂优选为：每剂中药制剂的配方组成中包括以下组分且各组分的质量分别为：白术：12g；茯苓：10g；泽泻：10g；节菖蒲：10g；川牛膝：9g；女贞子：15g；荷叶：30g；草决明：12g；全蝎：9g；牡蛎：15g; 赤芍：10g；山楂：15g；地龙：21g；鸡血藤：30g；丹参：20g；桃仁：12g，党参 15g。

[0008] 用于治疗眩晕的中药制剂的制作方法，其特征在于，将所述的用于治疗眩晕的中药制剂中各组分的质量配比混合后，进行粉碎研磨成细粉，过 60-100 目筛，然后将过筛后的细粉投入混合搅拌机中充分混匀，并按照每剂的计量分装备用。

[0009] 而上述的中药制剂在制备治疗眩晕药物上的应用，其特征在于，将每剂中药制剂的细粉每日分两次，用温水在饭前半小时冲服。

[0010] 本发明的有益效果为：本发明通过中药制剂中各组分的药用价值，以及相互之间的配伍作用，能够有效降血压降血脂，祛湿活血，潜降熄风，使眩晕症状消失，具有疗效好、

成本低，服用方便的优势。

具体实施方式

[0011] 下面结合具体实施例对本发明进行详细的说明。

[0012] 针对本发明所述的中药制剂中组分的药理分析情况如下：

治疗药方以白术、茯苓、泽泻、荷叶健脾益气，利湿化浊；女贞子滋补肝肾之阴，以涵肝木；节菖蒲、山楂开窍化湿，助脾健胃；草决明、全蝎、牡蛎、地龙平肝潜阳，清热熄风，其中牡蛎为介类之品，咸寒质重，性能沉降，且气味俱轻不碍痰湿，眩晕肝阳上亢者多用之，以潜阳镇逆，使风灭火降；赤芍、鸡血藤、丹参、桃仁、山楂、川牛膝活血化瘀，清热凉血。加党参，益气以促血运。其中泽泻、荷叶、山楂、草决明等药有很好的降血脂作用，在本治疗药方中尤显重要。

[0013] 实施例 1：

将所述的用于治疗眩晕的中药制剂中的组分：白术：12g；茯苓：10g；泽泻：10g；节菖蒲：10g；川牛膝：9g；女贞子：15g；荷叶：30g；草决明：12g；全蝎：9g；牡蛎：15g；赤芍：10g；山楂：15g；地龙：21g；鸡血藤：30g；丹参：20g；桃仁：12g，党参 15g 混合后，进行粉碎研磨成细粉，过 60 目筛，然后将过筛后的细粉投入混合搅拌机中充分混匀，将每剂中药制剂的细粉每日分两次，用温水在饭前半小时冲服。

[0014] 实施例 2：

将所述的用于治疗眩晕的中药制剂中的组分：白术：10g；茯苓：9g；泽泻：12g；节菖蒲：12g；川牛膝：5g；女贞子：18g；荷叶：20g；草决明：10g；全蝎：5g；牡蛎：10g；赤芍：15g；山楂：18g；地龙：25g；鸡血藤：20g；丹参：25g；桃仁：10g，党参 10g 混合后，进行粉碎研磨成细粉，过 80 目筛，然后将过筛后的细粉投入混合搅拌机中充分混匀，将每剂中药制剂的细粉每日分两次，用温水在饭前半小时冲服。

[0015] 实施例 3：

将所述的用于治疗眩晕的中药制剂中的组分：白术：15g；茯苓：12g；泽泻：15g；节菖蒲：15g；川牛膝：10g；女贞子：20g；荷叶：25g；草决明：15g；全蝎：10g；牡蛎：12g；赤芍：12g；山楂：20g；地龙：25g；鸡血藤：30g；丹参：22g；桃仁：12g，党参 15g 混合后，进行粉碎研磨成细粉，过 100 目筛，然后将过筛后的细粉投入混合搅拌机中充分混匀，将每剂中药制剂的细粉每日分两次，用温水在饭前半小时冲服。

[0016] 实施例 4：

将所述的用于治疗眩晕的中药制剂中的组分：白术：12g；茯苓：10g；泽泻：10g；节菖蒲：10g；川牛膝：9g；女贞子：15g；荷叶：30g；草决明：12g；全蝎：9g；牡蛎：15g；赤芍：10g；山楂：15g；地龙：21g；鸡血藤：30g；丹参：20g；桃仁：12g 混合后，进行粉碎研磨成细粉，过 60 目筛，然后将过筛后的细粉投入混合搅拌机中充分混匀，将每剂中药制剂的细粉每日分两次，用温水在饭前半小时冲服。

[0017] 实施例 5：

将所述的用于治疗眩晕的中药制剂中的组分：白术：10g；茯苓：9g；泽泻：12g；节菖蒲：12g；川牛膝：5g；女贞子：18g；荷叶：20g；草决明：10g；全蝎：5g；牡蛎：10g；赤芍：15g；山楂：18g；地龙：25g；鸡血藤：20g；丹参：25g；桃仁：10g 混合后，进行粉碎研磨成细

粉，过 80 目筛，然后将过筛后的细粉投入混合搅拌机中充分混匀，将每剂中药制剂的细粉每日分两次，用温水在饭前半小时冲服。

[0018] 实施例 6：

将所述的用于治疗眩晕的中药制剂中的组分：白术：15g；茯苓：12g；泽泻：15g；节菖蒲：15g；川牛膝：10g；女贞子：20g；荷叶：25g；草决明：15g；全蝎：10g；牡蛎：12g；赤芍：12g；山楂：20g；地龙：25g；鸡血藤：30g；丹参：22g；桃仁：12g 混合后，进行粉碎研磨成细粉，过 100 目筛，然后将过筛后的细粉投入混合搅拌机中充分混匀，将每剂中药制剂的细粉每日分两次，用温水在饭前半小时冲服。

[0019] 为验证本发明制剂的临床效果，进行了临床实验。

[0020] 1、病例选择标准：

凡临床上具有眩晕、耳鸣、时觉头沉、体倦乏力，胸闷，恶心，神经功能紊乱等症状者均作为选择病例的标准。

[0021] 2、诊断标准

患者感到自身或周围物体旋转、摇摆、浮动感，伴有恶心、呕吐、 耳鸣、平衡失调、眼震等症，具有高、低血压、心血管病、失眠、植物神经功能紊乱、更年期综合症、颈椎病等原因引起眩晕。

[0022] 3、治疗方案

治疗组服用本发明实施例 1 所述的中药制剂，每日一剂，每日两次，7 天为一个疗程，服用 3-5 个疗程，对照组服用尼莫地平、西比灵、脑灵素、丹参或者肌肉注射：培他定。

[0023] 4、疗程评定标准：

痊愈：症状完全消失无复发，无任何不适症状；

显效：症状消失，一年以内无复发；

有效：症状明显减轻，或部分症状消失，需继续治疗；

无效：症状未有任何改善，甚而有加重之趋势。

[0024] 100 例患者均为门诊患者。随机分为治疗组和对照组。治疗组 50 例，其中，男性 38 例，女性 12 例，年龄 30 ～ 68 岁，平均 48 岁；对照组 50 例，男性 32 例 女性 18 例，年龄 32 ～ 65 岁，平均 47 岁。两组中，病程最长 10 年，最短 2 年，平均为 5 年。经统计学分析，两组病例资料无显著性差异 ($P<0.05$)。

[0025] 6、治疗效果：

治疗组治愈 38 例，显效 6 例，有效 4 例，无效 2 例，总有效率为 96%；对照组治愈 12 例，显效 10 例，有效 8 例，无效 20 例，总有效率为 60%，治疗组总有效率明显高于对照组，具体见表 1。

[0026] 表 1 两组治疗效果比较

组别	例数	治愈	显效	有效	无效	总有效率(%)
治疗组	50	38	6	4	2	96
对照组	50	12	10	8	20	60

本发明通过中药配方中各组分的药用价值，以及相互之间的配伍作用，能够有效降血压降血脂，祛湿活血，潜降熄风，使眩晕症状消失，具有疗效好、成本低，服用方便的优势。

[0027] 以上具体实施方式不以任何形式限制本发明，凡是以等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案，均落在本发明的保护范围内。