



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102293964 B

(45) 授权公告日 2013.05.08

(21) 申请号 201110255933.1

(22) 申请日 2011.09.01

(73) 专利权人 孙桂侠

地址 233400 安徽省阜阳市临泉县城关镇水
上新村二巷 24 号

(72) 发明人 孙桂侠

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务
所 34108

代理人 徐宝泉

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994 (2006.01)

A61P 1/04 (2006.01)

A61K 35/24 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

审查员 李莹

权利要求书2页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗胃溃疡的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗胃溃疡的药物及其制备方法,它主要是由苍术、厚朴、陈皮、甘草、五灵脂、蒲黄、人参、丹参、山药、薏苡仁、瓦楞子、木香、紫草、白术、白芍、当归、枳壳、麦冬、半夏、黄芪按一定重量配比制备而成,本发明药物具有健脾益气、和胃、清肝泄热、活血化淤、滋养胃阴、收敛制酸、清热解毒、活血止痛的功效,治疗胃溃疡见效快、疗程短,不复发,不反弹。

1. 一种治疗胃溃疡的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:

苍 术 5—15 克 厚 朴 5—15 克 陈 皮 5—15 克
甘 草 7—11 克 五灵脂 5—15 克 蒲 黄 5—15 克
人 参 10—15 克 丹 参 10—20 克 山 药 10—20 克
薏苡仁 10—20 克 瓦楞子 10—20 克 木 香 5—15 克
紫 草 10—15 克 白 术 10—20 克 白 芍 10—20 克
当 归 10—20 克 枳 壳 10—20 克 麦 冬 10—20 克
半 夏 10—20 克 黄 芪 10—20 克。

2. 根据权利要求 1 所述的药物,其中各原料药的用量为:

苍 术 10 克 厚 朴 10 克 陈 皮 10 克
甘 草 9 克 五灵脂 10 克 蒲 黄 10 克
人 参 12 克 丹 参 15 克 山 药 15 克
薏苡仁 15 克 瓦楞子 15 克 木 香 10 克
紫 草 12 克 白 术 15 克 白 芍 15 克
当 归 15 克 枳 壳 15 克 麦 冬 15 克
半 夏 15 克 黄 芪 15 克。

3. 根据权利要求 1 所述药液的制备方法,它包括下列步骤:

(一) 备料

- (1) 苍术:拣去杂质,用水泡至七、八成透,捞出,润透后切片,晒干;
- (2) 厚朴:用水浸泡捞出,润透后刮去粗皮,洗净,切丝,晾干;
- (3) 陈皮:取原药材,除去杂质及变黑的果皮,抢水洗净,润软,切丝,晒干或低温干燥,筛去灰屑;
- (4) 甘草:拣去杂质,洗净,用水浸泡至八成透时,捞出,润透,切片,凉干;
- (5) 五灵脂:拣净杂质,打碎或筛去灰屑;
- (6) 蒲黄:揉碎结块,过筛,除去杂质;
- (7) 人参:除去芦头,切段;
- (8) 丹参:拣净杂质,除去根茎,洗净,捞出,润透后切片,晾干;
- (9) 山药:拣去杂质,用水浸泡至山药中心部软化为度,捞出稍晾,切片晒干或烘干;
- (10) 薏苡仁:取拣净的薏苡仁置锅内用文火炒至微黄色,取出,放凉即可,或用麸皮同炒亦可,每薏苡仁 100 斤,用麸皮 10 斤;
- (11) 瓦楞子:洗净晒干,碾碎;
- (12) 木香:将原生药放清水内洗净,捞出,闷润 12—24 小时使软,切片,晒干;
- (13) 紫草:洗净,润透,切片,晒干;
- (14) 白术:拣净杂质,用水浸泡润透后捞出,切片,晒干;
- (15) 白芍:拣去杂制裁,分开大小个,用水浸泡至八成透,捞出,晒晾,润至内外湿度均匀,切片,干燥;
- (16) 当归:拣去杂制裁,洗净,闷润,稍晾至内外湿度适宜时,切片晒干;
- (17) 枳壳:除去瓢、核,洗净,稍浸,捞出,润软,以手能捏对折为度,切片,晾干;
- (18) 麦冬:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透后抽去心,再洗净晒干;

(19) 半夏 : 拣去杂质, 筛去灰屑 ;

(20) 黄芪 : 拣净杂质, 除去残留的根头和空心较大者, 用水浸泡, 捞出, 润透后及时切片, 晒干 ;

(二) 制备

(1) 将所述重量的苍术、厚朴、陈皮、甘草、五灵脂、蒲黄、人参、丹参、山药、薏苡仁、瓦楞子、木香、紫草、白术、白芍、甘草、当归、枳壳、麦冬、半夏、黄芪加水煎煮, 第一次加水 2 倍量, 武火煎煮沸腾 30 分钟, 再用文火煎煮 15 分钟, 即得第一次煎煮液 ;

(2) 将第一次过滤后药渣加水 1.5 倍量, 煎煮沸腾, 再用文火煎煮 20 分钟即得第二次煎煮液 ;

(3) 将两次煎煮液混合, 再用文火煮 15 分钟, 将煮液分为 2 剂。

一种治疗胃溃疡的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗胃溃疡的药物及其制备方法,属中药领域。

技术背景

[0002] 胃溃疡是消化系统常见疾病,其典型表现为饥饿不适、饱胀暖气、泛酸或餐后定时的慢性中上腹疼痛,严重时可有黑便与呕血。比较明显的病因为幽门螺杆菌感染以及胃酸分泌过多;另外还可以由遗传因素和情绪波动、过度劳累、饮食失调、吸烟、酗酒等因素引起。胃溃疡由于病情延绵,病情复杂,又与精神情绪有关,病情加重或治疗不及时,还会导致出血、穿孔、幽门梗阻和癌变等恶劣后果,严重危害人民健康。目前在西医治疗方面,始终解决不了疗效慢和好转率低两个难题。

发明内容

[0003] 因此人们对疗效独特的中药存在极大的需求。本发明人依据中医理论的研究及临床反复的试验和验证,终于找到了快速治疗胃溃疡的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种治疗胃溃疡的组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物选择苍术、厚朴、陈皮、甘草、五灵脂、蒲黄、人参、丹参、山药、薏苡仁、瓦楞子、木香、紫草、白术、白芍、当归、枳壳、麦冬、半夏、黄芪药物进行组合的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够快速治疗胃溃疡的复发。其中选用苍术是因为其性味辛苦,温,入脾、胃经,有健脾,燥湿,解郁,辟秽的功能,治湿盛困脾,倦怠嗜卧,脘痞腹胀,食欲不振,呕吐,泄泻,痢疾,疟疾,痰饮,水肿,时气感冒,风寒湿痹,足痿,夜盲。选用厚朴是因为其性味苦辛,温,入脾、胃、大肠经,有温中,下气,燥湿,消痰的功能,治胸腹痞满胀痛,反胃、呕吐,宿食不消,痰饮喘咳,寒湿泻痢。选用陈皮是因为其性味苦、辛,温,归肺、脾经,有理气健脾,燥湿化痰的功能,治胸脘胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。选用甘草是因为其性味甘平,入脾、胃、肺经,有和中缓急,润肺,解毒,调和诸药的功能,炙用治脾胃虚弱,食少,腹痛便溏,劳倦发热,肺痿咳嗽,心悸,惊痫,生用治咽喉肿痛,消化性溃疡,痈疽疮疡,解药毒及食物中毒。选用五灵脂是因为其性味苦甘,温,入肝、脾经,生用有行血止痛的功能,治心腹血气诸痛,妇女经闭,产后瘀血作痛;外治蛇、蝎、蜈蚣咬伤,炒用止血,治妇女血崩,经水过多,赤带不绝。选用蒲黄是因为其性味甘辛苦,凉,入肝、心经,有凉血止血,活血消瘀的功能,生用治经闭腹痛,产后瘀阻作痛,跌扑血闷,疮疖肿毒,炒黑止吐血,衄血,崩漏,泻血,尿血,血痢,带下,外治重舌,口疮,聾耳流脓,耳中出血,阴下湿痒。选用人参是因为其性味甘微甘,温,入脾、肺经,有大补元气,固脱生津,安神的功能,治劳伤虚损,食少,倦怠,反胃吐食,大便滑泄,虚咳喘促,自汗暴脱,惊悸,健忘,眩晕头痛,阳痿,尿频,消渴,妇女崩漏,小儿慢惊及久虚不复,一切气血津液不足之症。选用丹参是因为其性味苦,微温,入心、肝经,有活血去瘀,安神宁心,排脓,止痛的功能,治心绞痛,月经不调,痛经,以闭,血崩带下,癥瘕,积聚,瘀血腹痛,骨节疼痛,惊悸不眠,恶疮肿毒。选用山药是因为其性味甘苦甘,

平,入肺、脾、肾经,有健脾,补肺,固肾,益精的功能,治脾虚泄泻,久痢,虚劳咳嗽,消渴,遗精、带下,小便频数。选用薏苡仁是因为其性味甘淡,凉,入脾、肺、肾经,有健脾,补肺,清热,利湿的功能,治泄泻,湿痹,筋脉拘挛,屈伸不利,水肿,脚气,肺痿,肺痛,肠痛,淋浊,白带。选用瓦楞子是因为其性味甘,咸,平,入肝、脾经,有化痰,软坚,散瘀,消积的功能,治痰积,胃痛,嘈杂,吐酸,癥瘕,瘰疬,牙疳。选用木香是因为其性味辛苦,温,入肺、肝、脾经,有行气止痛,温中和胃的功能,治中寒气滞,胸腹胀痛,呕吐,泄泻,下痢里急后重,寒疝。选用紫草是因为其性味苦苦,寒,入心包络、肝经,有凉血,活血,清热解毒的功能,治温热斑疹,湿热黄疸,紫癜,吐、衄、尿血,淋浊,血痢,热结便秘,烧伤,湿疹,丹毒,痈疮。选用白术是因为其性味苦甘,温,入脾、胃经,有补脾,益胃,燥湿,和中的功能,治脾胃气弱,不思饮食,倦怠少气,虚胀,泄泻,痰饮,水肿,黄疸,湿痹,小便不利,头晕,自汗,胎气不安。选用白芍是因为其性味苦酸,凉,入肝、脾经,有养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗的功能,治胸腹胁肋疼痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热,月经不调,崩漏,带下。选用当归是因为其性味甘辛,温,入心、肝、脾经,有补血和血,调经止痛,润燥滑肠的功能,治月经不调,经闭腹痛,癥瘕结聚,崩漏,血虚头痛,眩晕,痿痹,肠燥难便,赤痢后重,痈疽疮疡,金疮,跌扑损伤。选用枳壳是因为其性味苦辛,凉,入肺、脾、大肠经,有破气,行痰,消积的功能,治胸膈痰滞,胸痞,胁胀,食积,噎气,呕逆,下痢后重,脱肛,子宫脱垂。选用麦冬,又名麦门冬,是因为其性味甘微苦,寒,入肺、胃、心经,有养阴润肺,清心除烦,益胃生津的功能,治肺燥干咳,吐血,咯血,肺痿,肺痛,虚劳烦热,清渴,热病津伤,咽干口燥,便秘。选用半夏是因为其性味辛,温,有毒,入脾、胃经,有燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结的功能,治湿痰冷饮,呕吐,反胃,咳喘痰多,胸膈胀满,痰厥头痛,头晕不眠,外消痈肿。选用黄芪是因为其性味甘,微温,入肺、脾经,生用有益卫固表,利水消肿,托毒,生肌的功能,治自汗,盗汗,血痹,浮肿,痈疽不溃或溃久敛;炙用有补中益的功能,治内伤劳倦,脾虚泄泻,脱肛,气虚血脱,崩带及一切气衰血虚之症。

具体实施方式

[0007] 本发明组合的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各分组的用量在下列重量范围内都具有较好疗效:

[0008]	苍术	5—15克	厚朴	5—15克	陈皮	5—15克
[0009]	甘草	7—11克	五灵脂	5—15克	蒲黄	5—15克
[0010]	人参	10—15克	丹参	10—20克	山药	10—20克
[0011]	薏苡仁	10—20克	瓦楞子	10—20克	木香	5—15克
[0012]	紫草	10—15克	白术	10—20克	白芍	10—20克
[0013]	当归	10—20克	枳壳	10—20克	麦冬	10—20克
[0014]	半夏	10—20克	黄芪	10—20克		

[0015] 其中,优选为

[0016]	苍术	10克	厚朴	10克	陈皮	10克
[0017]	甘草	9克	五灵脂	10克	蒲黄	10克
[0018]	人参	12克	丹参	15克	山药	15克
[0019]	薏苡仁	15克	瓦楞子	15克	木香	10克
[0020]	紫草	12克	白术	15克	白芍	15克

[0021] 当归 15克 枳壳 15克 麦冬 15克

[0022] 半夏 15克 黄芪 15克

[0023] 本发明药物的制备方法如下

[0024] 一、备料

[0025] 1、苍术：拣去杂质，用水泡至七、八成透，捞出，润透后切片，晒干；

[0026] 2、厚朴：用水浸泡捞出，润透后刮去粗皮，洗净，切丝，晾干；

[0027] 3、陈皮：取原药材，除去杂质及变黑的果皮，抢水洗净，润软，切丝，晒干或低温干燥，筛去灰屑；

[0028] 4、甘草：拣去杂质，洗净，用水浸泡至八成透时，捞出，润透，切片，凉干；

[0029] 5、五灵脂：拣净杂质，打碎或筛去灰屑；

[0030] 6、蒲黄：揉碎结块，过筛，除去杂质；

[0031] 7、人参：除去芦头，切段即可；

[0032] 8、丹参：拣净杂质，除去根茎，洗净，捞出，润透后切片，晾干；

[0033] 9、山药：拣去杂质，用水浸泡至山药中心部软化为度，捞出稍晾，切片晒干或烘干；

[0034] 10、薏苡仁：取拣净的薏苡仁置锅内用文火炒至微黄色，取出，放凉即可，或用麸皮同炒亦可（每薏苡仁 100 斤，用麸皮 10 斤）；

[0035] 11、瓦楞子：洗净晒干，碾碎；

[0036] 12、木香：将原生药放清水内洗净，捞出，闷润 12—24 小时使软，切片，晒干；

[0037] 13、紫草：洗净，润透，切片，晒干；

[0038] 14、白术：拣净杂质，用水浸泡润透后捞出，切片，晒干；

[0039] 15、白芍：拣去杂制裁，分开大小个，用水浸泡至八成透，捞出，晒晾，润至内外湿度均匀，切片，干燥；

[0040] 16、当归：拣去杂制裁，洗净，闷润，稍晾至内外湿度适宜时，切片晒干；

[0041] 17、枳壳：除去瓢、核，洗净，稍浸，捞出，润软，以手能捏对折为度，切片，晾干；

[0042] 18、麦冬：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透后抽去心，再洗净晒干；

[0043] 19、半夏：拣去杂质，筛去灰屑；

[0044] 20、黄芪：拣净杂质，除去残留的根头和空心较大者，用水浸泡，捞出，润透后及时切片，晒干。

[0045] 二、制备

[0046] 1、将所述重量的苍术、厚朴、陈皮、甘草、五灵脂、蒲黄、人参、丹参、山药、薏苡仁、瓦楞子、木香、紫草、白术、白芍、甘草、当归、枳壳、麦冬、半夏、黄芪加水煎煮，第一次加水 2 倍量，武火煎煮沸腾 30 分钟，再用文火煎煮 15 分钟，即得第一次煎煮液。

[0047] 2、将第一次过滤后药渣加水 1.5 倍量，煎煮沸腾，再用文火煎煮 20 分钟即得第二次煎煮液。

[0048] 3、将两次煎煮液混合，再用文火煮 15 分钟，将煎煮液分为 2 剂。

[0049] 本发明药物具有健脾益气、和胃、清肝泄热、活血化瘀、滋养胃阴、收敛制酸、清热解毒、活血止痛的功效，治疗胃溃疡见效快、疗程短，不复发，不反弹。以下通过试验例来进一步阐述本发明药物的有益效果，这些试验包括本发明药物的动物毒性试验和临床观察试

验。

[0050] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验报告：

[0051] 取家兔 50 只，雌雄兼用，体重 2.5—2.8kg，分两组，每组 25 只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超常量组为 30ml/kg，正常量为 15ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天两次，连服 20 天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0052] [试验例 2] 本发明药物的临床观察资料

[0053] 1、一般资料

[0054] 收治门诊患者 150 例，年龄 20—30 岁 30 例，30—40 岁 50 例，40—50 岁 40 例，50 岁以上 30 例。

[0055] 2、诊断标准

[0056] 胃溃疡临床表现为上腹部疼痛，位于剑突（心窝）下或上腹部中线周围，呈烧灼性、啮咬性或饥饿性钝痛、胀痛或隐痛。但有时也仅局限于胸腔下部。疼痛发生后持续半小时到三小时。一阵阵的疼痛时发时消，经过历时数周的间歇性疼痛后，会出现一段短暂的无痛期。这种疼痛与饮食有关，常因饥饿、服药、酸性食物或饮料而诱发。疼痛可以因进食、饮水、服用碱性食物而缓解。其他可能症状是烧心、吐酸水、嗝气、食欲丧失、体重减轻、贫血、偶尔呕吐，呕吐后就会使疼痛缓和下来。

[0057] 3、治疗方法

[0058] 选用上述药剂，给患者服用，每次服用 1 剂，每天早、晚各服 1 次，20 天为一个疗程，连续服用两个疗程。

[0059] 4、疗效评定标准

[0060] 显效：腹痛症状消失，胃镜检查溃疡消失，身体恢复正常，观察半年后无复发；

[0061] 好转：症状明显好转，胃镜检查溃疡逐渐缩小，身体素质明显恢复；

[0062] 无效：症状无改善，达不到好转标准者。

[0063] 5、治疗结果

[0064]

类 型	病例 总数	治疗 时间	显 效		好 转		无 效		总有效 率%
			例 数	显效率 %	例 数	好转率 %	例 数	无效率 %	
胃溃疡	150	40 天	141	94	7	4.67	2	1.33	98.67

[0065] 在上述的治疗中，用本发明药物治疗胃溃疡患者 150 例，结果显效 140 例，显效率为 94%，好转 7 例，好转率为 4.67%，无效 2 例，总有效率为 98.67%。