



## (12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101804142 B

(45) 授权公告日 2011. 07. 20

(21) 申请号 201010109740. 0

CN 1245692 A, 2000. 03. 01, 全文.

(22) 申请日 2010. 02. 04

关素洁. 《宫颈癌的发病机制及中医药治疗研究进展》. 《中医药导报》. 2007, 第 13 卷 (第 2 期), 95-96、107.

(73) 专利权人 罗启淼

地址 415000 湖南省常德市武陵区三岔路中山外语学校院内

连花敏等. 《香砂六君子汤加味治疗晚期宫颈癌的疗效观察》. 《辽宁中医杂志》. 2003, 第 30 卷 (第 11 期), 915.

(72) 发明人 罗启淼

(74) 专利代理机构 常德市长城专利事务所  
43204

田景丰. 《中医药治疗 II、III 期宫颈癌 30 例 10 年疗效观察》. 《中医杂志》. 1989, (第 9 期), 30-31.

代理人 蔡大盛

审查员 王静

(51) Int. Cl.

A61K 36/896 (2006. 01)  
A61K 36/899 (2006. 01)  
A61K 36/8905 (2006. 01)  
A61P 15/00 (2006. 01)  
A61P 35/00 (2006. 01)  
A61K 35/64 (2006. 01)  
A61K 35/56 (2006. 01)  
A61K 35/24 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 1695719 A, 2005. 11. 16, 全文.

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗子宫体癌的中药组合物

(57) 摘要

一种治疗子宫体癌的中药组合物, 采用扶正祛邪、凉血止血、消除脓血性分泌物, 解除腹胀、痉挛疼痛、软坚散结、益肝补肾, 利尿通淋的中药对症进行治疗, 根据患者病情分为三期, 分别对子宫癌的初期、中期和晚期患者治疗, 可提高治疗子宫癌的疗效, 避免因手术切除, 给患者和家人带来的痛苦。本发明药物可以采用中药制剂的常规方法制成, 任何常规内服制剂, 如汤剂、胶囊剂、片剂或丸剂。治疗 120 例, 用本发明药物 2~6 个疗程, 全愈 70 例, 占 58. 3%, 有效 40 例, 占 33. 3%, 无效 10 例, 占 8. 4%, 总有效率 91. 6%。

1. 一种治疗子宫体癌的中药组合物,其特征是:治疗后期子宫癌的中药原料药为:

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| 党参 20~30 g    | 白术 15~20 g  | 茯苓 20~30 g  |
| 当归 10~15 g    | 黄芪 15~20 g  | 泽兰 10~20 g  |
| 益母草 10~15 g   | 白英 15~20 g  | 枸杞 15~20 g  |
| 白花蛇舌草 20~30 g | 土茯苓 20~30 g | 半枝莲 15~20 g |
| 田三七 3~5 g     | 蒲公英 20~30 g | 金银花 30~50 g |
| 虻虫 5~10 g     | 土鳖虫 15~20 g | 地骨皮 20~25 g |
| 瞿麦 20~30 g。   |             |             |

## 一种治疗子宫体癌的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗子宫体癌的中药组合物,属中药技术领域。

### 背景技术

[0002] 子宫体癌简称子宫癌,是发生于子宫体腺上皮的恶性肿瘤,又称子宫内膜癌,是女性生殖器内的恶性肿瘤之一。绝大多数的子宫体癌为腺癌,占80%以上。它是一种发展缓慢,转移较晚的肿瘤,早期发现,及时治疗,五年生存率可达80%左右,30~60岁以上和绝经期内的妇女患此病的机率较高。目前,西医对子宫癌采用的方法是手术切除,虽然简单省事,造成女性生殖器官残缺,性格改变,给患者和夫妻之间带来诸多痛苦和不幸。广大患者很希望有一种不用手术切除来治疗子宫癌的药物,用以减轻患者精神上的痛苦,促进家庭和睦。

### 发明内容

[0003] 为减轻子宫体癌患者的痛苦,宏扬中华中医药的精华。本发明的目的是提供治疗子宫体癌的中药组合物。

[0004] 本发明人是从小就跟着老中医当学徒,一直在中医岗位上坚持临床实践的一名老中医,现在已年迈七十,从临床经验中总结出子宫癌的发病原因主要有二:一是肥胖,体内有过多脂肪积蓄,使代谢缓慢,雌激素在体内维持较高,加上脂肪细胞能使雄二稀酮芳得化而转化为雌酮,雌酮比雌激素更能刺激子宫内膜,更易产生子宫癌;二是高血压、糖尿病。针对上述病因,本发明人采用扶正祛邪、凉血止血、消除脓血性分泌物,解除腹胀、痉挛疼痛、软坚散结、益肝补肾,利尿通淋的中药对症进行治疗。根据患者病情将跨世纪分为三期,分别对子宫癌的初期、中期和晚期患者治疗。

[0005] 其中治疗初期子宫癌的中药原料药为:  
益母草 20~30g 当归 9~15g 丹参 15~20g

川芎 5~10g 小茴 6~12g 丹皮 10-15g

四制香附 10~20g 艾叶 3~10g 三不留行 10~15g

治疗中期子宫癌

虎杖 10~20g 天丁(又名皂果刺) 10~15g

的中药原料药为:仙鹤草 15~20g 贯众 15~20g 白茅根 15~20g 白芷 10~15g 蒲黄 10~15g 玄胡(又名元胡)10~20g 海螵蛸 15~20g 五灵脂 10~15g 黄芪 15~20g 治疗后期子宫癌的中药原料药有:

党参 20~30 g 白术 15~20 g 茯苓 20~30 g

当归 10~15 g 黄芪 15~20 g 泽兰 10~20 g

益母草 10~15 g 白英 15~20 g 枸杞 15~20 g

白花蛇舌草 20~30 g 土茯苓 20~30 g 半枝莲 15~20 g 本发明药物可以采用中药

田三七 3~5 g 蒲公英 20~30 g 金银花 30~50 g

虻虫 5~10 g 土鳖虫 15~20 g 地骨皮 20~25 g

瞿麦 20~30 g

制剂的常规方法制成,任何常规内服制剂,如将中药材用水煎煮成汤剂或将中药材分别粉碎成粉末,混合物均匀后,添加常规制剂的辅料,制成胶囊剂、片剂或丸剂。

[0006] 本发明药物根据子宫癌的初、中、后期病症,分别给出治疗的药物,有针对性的治疗,可提高治疗子宫癌的疗效,避免因手术切除,不给患者和家人带来的痛苦和麻烦。

[0007] 【具体实施方式】下面结合临床观察资料和典型病例,对本发明的有益效果,进一步说明。

[0008] 一、一般资料:共医治子宫癌患者 120 人,其 20~30 岁女子 40 例,31~45 岁女子 60 例,45 岁以上的女子 20 例。

[0009] 二、诊断标准:经医院 CT 检查照片确诊为子宫癌者。初期的症状为:阴道出血,多见于绝经期或绝经后出血为血性分泌物或不规则阴道流血。出血持续 1-4 天不等,反复发作,未到绝经年龄者,表现月经量增多,经期延长出血,排尿拉便时出血;白带增多,为脓血浆性分泌物。中期的症状为:疼痛,癌瘤浸润周围组织,压迫神经时可下腹及腰骶部疼痛,向下肢及足部放射,癌瘤侵犯宫颈,堵塞颈管,导致宫腔积液,下腹胀痛,痉挛疼痛。晚期的症状为:子宫增大,下腹部触及肿块,超出子宫以外的包块,转移至附件、盆腔;患者自己可触及下腹部固定肿块的大小,癌肿扩散直接蔓延到邻近器官形成癌肿块,全身症状贫血,消瘦,恶液质,发热,人整体衰竭等。

[0010] 三、治疗方法:根据患者所患子宫癌的时间长短,一年以内定为初期,1 年以上二年以内的定为中期,二年以上的定为后期。分别用初期、中期或后期的子宫癌中药进行治疗,以中药汤药最为简单,一天服一付剂量的中药,分三次服完,一个月为一个疗程。初期连服 3-4 个疗程可全愈,中期连续服 4-5 个疗程,后期 5-6 个疗程可全愈。

[0011] 四、疗效标准:全愈:肿瘤症状消失,经 CT 检查癌肿块消失,饮食和生活正常。

[0012] 有效:通过复查片查后肿瘤萎缩,癌细胞停止生长,但仍未被消灭。疼痛减轻,不能正常生活,必需追加治疗。

[0013] 无效:肿瘤症状不见减轻,肿块仍然存在。其原因往往是因为年轻妇女性生活过多所致。

[0014] 五、治疗结果:治疗 120 例,用本发明药物 2~6 个疗程,全愈 70 例,占 58.3%,有效 40 例,占 33.3%,无效 10 例,占 8.4%,总有效率 91.6%。

[0015] 典型病例 :1、廖秋桂,女,43岁,湖南省桃源县人,经桃源人民医院确诊为子宫癌初期,因不愿手术切除,故来到本诊所求治,给予初期中药汤剂治疗,每天1付初期癌症中药,连服30天,肿瘤消失,生活正常,一年后回访,未见复发。

[0016] 2、鲁秀清,女,62岁,张家界市慈利县人。因患子宫癌三年,早期未予重视,到了第三年时,病情加重,癌肿块长大到78×36cm大小,影响行走和生活,到本诊所求诊后,服用后期子宫癌中药,一天一付剂量,三次服完,连服30天,病情明显好转,癌肿块缩小到26×12cm大小,疼痛基本消失,三个疗程后,癌肿块消失,生活基本正常,现仍健在。

[0017] 3、文艳文,女,31岁,深圳市人,因患子宫癌,不愿手术切除,经人介绍前来就诊,来时CT检查癌肿块5.3×3.7cm大小,采用中期子宫癌中药汤剂,每天一付剂量,连服60天,癌肿块消失,饮食恢复,行动自如,生活正常,愈后还生下一男孩。