



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105055802 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201510540907. 1

(22) 申请日 2015. 08. 29

(71) 申请人 王秀娟

地址 261500 山东省潍坊市高密市凤凰大街  
88 号高密市中医院

(72) 发明人 王秀娟

(51) Int. Cl.

*A61K 36/896*(2006. 01)

*A61P 1/16*(2006. 01)

*A61K 35/57*(2015. 01)

*A61K 35/64*(2015. 01)

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

一种治疗胆囊炎的药物及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗胆囊炎的药物及制备方法,属中药领域;本发明药物有效成分的原料组成为:波棱瓜、风轮菜、蜂房、番泻叶、苦木、水百合、金钱草、梅根、鸡内金、秤钩风、亮菌、罗星草、睡菜、蒲公英、豇豆壳和角茴香;本发明药物疗效好、见效快,治愈后不复发,安全可靠,无任何毒副作用,成本较低,所选药材配伍相宜,符合中医药学和现代医药学理论,并具有益气养血、消肿止痛、消炎利胆之功效,能达到标本兼治的目的,服用方便,奇效实用,值得临床上广泛推广。

1. 一种治疗胆囊炎的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

波棱瓜 32 ~ 56 份 风轮菜 32 ~ 56 份 蜂房 31 ~ 55 份 番泻叶 31 ~ 55 份  
苦木 29 ~ 53 份 水百合 27 ~ 51 份 金钱草 27 ~ 51 份 梅根 26 ~ 50 份  
鸡内金 25 ~ 49 份 秤钩风 25 ~ 49 份 亮菌 22 ~ 46 份 罗星草 21 ~ 45 份  
睡菜 21 ~ 45 份 蒲公英 20 ~ 42 份 豇豆壳 19 ~ 37 份 角茴香 17 ~ 34 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗胆囊炎的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

波棱瓜 36 ~ 52 份 风轮菜 36 ~ 52 份 蜂房 35 ~ 51 份 番泻叶 35 ~ 51 份  
苦木 33 ~ 49 份 水百合 31 ~ 47 份 金钱草 31 ~ 47 份 梅根 30 ~ 46 份  
鸡内金 29 ~ 45 份 秤钩风 29 ~ 45 份 亮菌 26 ~ 42 份 罗星草 25 ~ 41 份  
睡菜 25 ~ 41 份 蒲公英 24 ~ 38 份 豇豆壳 22 ~ 34 份 角茴香 20 ~ 32 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种治疗胆囊炎的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

波棱瓜 40 ~ 48 份 风轮菜 40 ~ 48 份 蜂房 39 ~ 47 份 番泻叶 39 ~ 47 份  
苦木 37 ~ 45 份 水百合 35 ~ 43 份 金钱草 35 ~ 43 份 梅根 34 ~ 42 份  
鸡内金 33 ~ 41 份 秤钩风 33 ~ 41 份 亮菌 30 ~ 38 份 罗星草 29 ~ 37 份  
睡菜 29 ~ 37 份 蒲公英 28 ~ 34 份 豇豆壳 25 ~ 31 份 角茴香 23 ~ 29 份。

4. 根据权利要求 1 所述的一种治疗胆囊炎的药物,其特征在于:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

波棱瓜 44 份 风轮菜 44 份 蜂房 43 份 番泻叶 43 份  
苦木 41 份 水百合 39 份 金钱草 39 份 梅根 38 份  
鸡内金 37 份 秤钩风 37 份 亮菌 34 份 罗星草 33 份  
睡菜 33 份 蒲公英 31 份 豇豆壳 28 份 角茴香 26 份。

5. 一种如权利要求 1 ~ 4 任一项所述治疗胆囊炎的药物制备方法,其特征在于:包括以下工艺步骤:

(1) 将波棱瓜、番泻叶、水百合、梅根、秤钩风、罗星草、蒲公英和豇豆壳洗净,放入容器内,加入 8 ~ 10 倍量的蒸馏水,浸泡 5 ~ 6 小时后,煮沸 3 ~ 4 小时提取;再次加入 6 ~ 8 倍量蒸馏水,煮沸 2 ~ 3 小时提取;最后,加入 4 ~ 6 倍量蒸馏水,加热煮沸 1 ~ 2 小时提取;合并三次提取液,过滤,得滤液,浓缩成 60℃ 下相对密度为 1.12 ~ 1.15 的稠膏,备用;

(2) 将风轮菜和睡菜洗净,切碎,放入容器内,绞汁,滤杂质,留汁液备用;

(3) 将蜂房、鸡内金、亮菌和角茴香放入容器内,进行粉碎处理,研末,得到过 160 目的细粉,备用;

(4) 将苦木和金钱草洗净,浸入 4 倍量的 70% 的乙醇溶液浸泡 1 ~ 2 小时,加热提取 3 小时,回收乙醇,滤过,得滤液,浓缩为 65℃ 下相对密度为 1.13 ~ 1.16 的稠膏,备用;

(5) 将上述步骤(1) ~ (4) 所制得的稠膏、汁液以及细粉混合,制成片剂,即得所述的治疗胆囊炎的药物。

## 一种治疗胆囊炎的药物及制备方法

### 所属技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,尤其涉及一种治疗胆囊炎的药物及制备方法。

### 背景技术

[0002] 随着生活水平的提高,生活节奏的加快,生活压力的加大,一部人的免疫力在下降,出现消化不良等病症。胆囊炎是较常见的疾病,发病率较高。根据其临床表现和临床经过,又可分为急性的和慢性的两种类型,常与胆石症合并存在。右上腹剧痛或绞痛,多为结石或寄生虫嵌顿梗阻胆囊颈部所致的急性胆囊炎,疼痛常突然发作,十分剧烈,或呈现绞痛样。胆囊管非梗阻性急性胆囊炎时,右上腹疼痛一般不剧烈,多为持续性胀痛,随着胆囊炎症的进展,疼痛亦可加重,疼痛呈现放射性,最常见的放射部位是右肩部和右肩胛骨下角等处。

[0003] 急性胆囊炎疼痛右上腹剧痛或绞痛,多为结石或寄生虫嵌顿梗阻胆囊颈部所致的急性胆囊炎;疼痛常突然发作,十分剧烈,或呈现绞痛样,多发生在进食高脂食物后,多发生在夜间;右上腹一般性疼痛,见于胆囊管非梗阻性急性胆囊炎时,右上腹疼痛一般不剧烈,多为持续性胀痛,随着胆囊炎症的进展,疼痛亦可加重,疼痛呈现放射性,最常见的放射部位是右肩部和右肩胛骨下角等处,乃系胆囊炎症刺激右膈神经末梢和腹壁周围神经所致。恶心、呕吐是最常见的症状,如恶心、呕吐顽固或频繁,可造成脱水,虚脱和电解质紊乱,多见于结石或蛔虫梗阻胆囊管时。畏寒、寒战、发热轻型病例常有畏寒和低热;重型病例则可有寒战和高热,热度可达39℃以上,并可出现谵语、谵妄等精神症状。黄疸较少见,如有黄疸一般程度较轻,表示感染经淋巴管蔓延到了肝脏,造成了肝损害,或炎症已侵犯胆总管。慢性胆囊炎持续性右上腹钝痛或不适感;有恶心、嗝气、反酸、腹胀和胃部灼热等消化不良症状;右下肩胛区疼痛;进食高脂或油腻食物后症状加重;病程长,病情经过有急性发作和缓解相交替的特点,急性发作时与急性胆囊炎症状同,缓解期有时可无任何症状。

[0004] 目前,临床上胆囊炎的治疗主要以中、西药和手术切除治疗,手术治疗风险大,不易被患者接受,而西药多以抗生素药物治疗为主,但抗生素药物对身体的副作用较大,而中药治疗胆囊炎,具有疗效好、见效快,安全可靠,无任何毒副作用的中药取得了各医院的认可。

### 发明内容

[0005] 本发明提供了一种治疗胆囊炎的药物及制备方法;本发明药物疗效好、见效快,治愈后不复发,安全可靠,无任何毒副作用,成本较低,所选药材配伍相宜,符合中医药学和现代医药学理论,并具有益气养血、消肿止痛、消炎利胆之功效,能达到标本兼治的目的,服用方便,奇效实用,值得临床上广泛推广。

[0006] 为实现上述目的,本发明的技术方案实施如下:

[0007] 一种治疗胆囊炎的药物,制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

[0008]

波棱瓜 32~56 份 风轮菜 32~56 份 蜂房 31~55 份 番泻叶 31~55 份  
苦木 29~53 份 水百合 27~51 份 金钱草 27~51 份 梅根 26~50 份  
鸡内金 25~49 份 秤钩风 25~49 份 亮菌 22~46 份 罗星草 21~45 份  
睡菜 21~45 份 蒲公英 20~42 份 豇豆壳 19~37 份 角茴香 17~34 份。

[0009] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0010]

波棱瓜 36~52 份 风轮菜 36~52 份 蜂房 35~51 份 番泻叶 35~51 份  
苦木 33~49 份 水百合 31~47 份 金钱草 31~47 份 梅根 30~46 份  
鸡内金 29~45 份 秤钩风 29~45 份 亮菌 26~42 份 罗星草 25~41 份  
睡菜 25~41 份 蒲公英 24~38 份 豇豆壳 22~34 份 角茴香 20~32 份。

[0011] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0012]

波棱瓜 40~48 份 风轮菜 40~48 份 蜂房 39~47 份 番泻叶 39~47 份  
苦木 37~45 份 水百合 35~43 份 金钱草 35~43 份 梅根 34~42 份  
鸡内金 33~41 份 秤钩风 33~41 份 亮菌 30~38 份 罗星草 29~37 份  
睡菜 29~37 份 蒲公英 28~34 份 豇豆壳 25~31 份 角茴香 23~29 份。

[0013] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0014]

波棱瓜 44 份 风轮菜 44 份 蜂房 43 份 番泻叶 43 份  
苦木 41 份 水百合 39 份 金钱草 39 份 梅根 38 份  
鸡内金 37 份 秤钩风 37 份 亮菌 34 份 罗星草 33 份  
睡菜 33 份 蒲公英 31 份 豇豆壳 28 份 角茴香 26 份。

[0015] 一种治疗胆囊炎的药物的制备方法,包括以下工艺步骤：

[0016] (1) 将波棱瓜、番泻叶、水百合、梅根、秤钩风、罗星草、蒲公英和豇豆壳洗净,放入容器内,加入 8~10 倍量的蒸馏水,浸泡 5~6 小时后,煮沸 3~4 小时,提取;再次加入 6~8 倍量蒸馏水,煮沸 2~3 小时,提取;最后,加入 4~6 倍量蒸馏水,加热煮沸 1~2 小时,提取;合并三次提取液,过滤,得滤液,浓缩成 60℃下相对密度为 1.12~1.15 的稠膏,备用;

[0017] (2) 将风轮菜和睡菜洗净,切碎,放入容器内,绞汁,滤杂质,留汁液备用;

[0018] (3) 将蜂房、鸡内金、亮菌和角茴香放入容器内,进行粉碎处理,研末,得到过 160 目的细粉,备用;

[0019] (4) 将苦木和金钱草洗净,浸入 4 倍量的 70%的乙醇溶液浸泡 1~2 小时,加热提取 3 小时,回收乙醇,滤过,得滤液,浓缩为 65℃下相对密度为 1.13~1.16 的稠膏,备用;

[0020] (5) 将上述步骤 (1)~(4) 所制得的稠膏、汁液以及细粉混合,制成片剂,即得所述

的治疗胆囊炎的药物。

[0021] 本发明所用中药的药性如下：

[0022] 波棱瓜：性寒，味苦。清热解毒，柔肝。治黄疸型传染性肝炎，消化不良。

[0023] 风轮菜：味辛、苦，性凉。疏风清热，解毒止痢，止血。用于感冒、中暑、痢疾、肝炎；外用治疗疮肿毒、皮肤瘙痒、外伤出血。广州空军《常用中草药手册》载：“清热泻火，活血消肿。治急性胆囊炎，肝炎，痢疾，腮腺炎，肠炎，血尿，急性结膜炎，毒蛇咬伤，无名肿毒，乳腺炎，刀伤。”

[0024] 蜂房：味甘，性平；归胃经。去腐生肌，消炎止痛，抗过敏。适用龋齿牙痛，疮疡肿毒，乳痈，瘰疬，皮肤顽癣，鹅掌风，过敏性体质。《云南思茅中草药选》载：“舒筋活络，祛风湿，利尿。治风湿性关节炎，腰膝湿痹，肾炎水肿。”现代医学研究证实，蜂巢制剂有促进机体细胞免疫功能的作用。

[0025] 番泻叶：味甘、苦，性寒，有小毒；归大肠经。主治泻热行滞，通便，利水。用于热结积滞，便秘腹痛，水肿胀满。现代医学研究证实，番泻叶浸液对多种细菌有抑制作用，如大肠杆菌、变形杆菌、痢疾杆菌、甲型链球菌以及白色念珠和某些致病性皮肤真菌。

[0026] 苦木：味苦，性寒，有小毒；归肺、大肠经。清热解毒，燥湿杀虫。主上呼吸道感染，肺炎，急性胃肠炎，痢疾，胆道感染，疮疖，疥癣，湿疹，水火烫伤，毒蛇咬伤。

[0027] 水百合：味苦、微甘，性凉。清肺止咳，解毒消肿。主感冒，肺热咳嗽，咯血，鼻渊，耳鸣，乳痈，无名肿毒。《贵州民间药物》载：“消肿，去毒。”

[0028] 金钱草：味甘、微苦，性凉；归肝、胆、肾、膀胱经。清热解毒，散瘀消肿，利湿退黄。可用于热淋，沙淋，尿涩作痛，黄疸尿赤，痈肿疔疮，毒蛇咬伤，肝胆结石，尿路结石等症。现代医学研究证实，该品主要含酚性成分具有排石、抑菌、抗炎作用，对体液免疫、细胞免疫均有抑制作用。

[0029] 梅根：味微苦，性微寒；归肝、胆经。祛风除湿，清热解毒。主风痹，休息痢，胆囊炎，瘰疬。《民间常用草药汇编》载：“红梅根调和气血，走血分。”

[0030] 鸡内金：味甘，性寒；归脾、胃、小肠、膀胱经。消食健胃助消化，涩精止遗。可以促进胃液分泌，提高胃酸度及消化力，使胃运动功能明显增强，胃排空加快。《滇南本草》载：“宽中健脾，消食磨胃。治小儿乳食结滞，肚大筋青，痞积疳积。”

[0031] 秤钩风：味苦，性凉；归肝、膀胱经。清热利湿，消肿解毒。用于风湿骨痛，胆囊炎，尿路感染，毒蛇咬伤。

[0032] 亮菌：味苦，性寒；归肝、胆经。清热解毒。主急慢性胆囊炎，胆道感染，肝炎，阑尾炎，中耳炎。

[0033] 罗星草：味苦，性寒。清热消肿，散瘀止痛，接骨。主治急性胆囊炎，急性肠炎，急性扁桃体炎；外用治跌打，骨折，关节肿痛。

[0034] 睡菜：味甘、微苦，性寒；归心、脾经。清热利尿，健胃，安神。用于胃炎，消化不良，胆囊炎，黄疸，高血压，心悸，失眠。《北方常用中草药手册》载：“健脾消食，养心安神。治胃炎，胃痛，消化不良，心悸失眠，心神不安。”

[0035] 蒲公英：味甘、微苦，性寒；入脾、胃、肾三经。清热解毒，消痈散结。主治上呼吸道感染，眼结膜炎，流行性腮腺炎，高血糖，乳痈肿痛，胃炎，痢疾，肝炎，胆囊炎，急性阑尾炎，泌尿系感染，盆腔炎，痈疖疔疮，咽炎，治急性乳腺炎，淋巴腺炎，瘰疬，疔毒疮肿，急性结膜

炎,感冒发热,急性扁桃体炎,急性支气管炎、尿路感染。现代医学研究证实,蒲公英具有丰富的维生素 A 和 C 及矿物质,对消化不良、便秘都有改善的作用,能够消炎利尿,可用于医治肝胆结石。

[0036] 豇豆壳:味甘,性平;归胃经。补肾健脾,利水消肿,镇痛,解毒。主腰痛,肾炎,胆囊炎,带状疱疹,乳痈。

[0037] 角茴香:味苦、辛,性凉;归肺、大肠、肝经。治急性咽喉炎,气管炎咳嗽,目赤肿痛。《河南中草药手册》载:“清热,消炎,止痛。”

[0038] 本发明与现有技术相比,具有以下有益效果:

[0039] 本发明药物疗效好、见效快,治愈后不复发,安全可靠,无任何毒副作用,成本较低,所选药材配伍相宜,符合中医药学和现代医药学理论,并具有益气养血、消肿止痛、消炎利胆之功效,能达到标本兼治的目的,服用方便,奇效实用,值得临床上广泛推广。

### 具体实施方式

[0040] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0041] 实施例 1

[0042] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为:

[0043]

波棱瓜 52g 风轮菜 52g 蜂房 51g 番泻叶 51g

苦木 49g 水百合 47g 金钱草 47g 梅根 46g

鸡内金 45g 秤钩风 45g 亮菌 42g 罗星草 41g

睡菜 41g 蒲公英 38g 豇豆壳 34g 角茴香 32g。

[0044] 一种治疗胆囊炎的药物的制备方法,包括以下工艺步骤:

[0045] (1) 将波棱瓜、番泻叶、水百合、梅根、秤钩风、罗星草、蒲公英和豇豆壳洗净,放入容器内,加入 8~10 倍量的蒸馏水,浸泡 5~6 小时后,煮沸 3~4 小时,提取;再次加入 6~8 倍量蒸馏水,煮沸 2~3 小时,提取;最后,加入 4~6 倍量蒸馏水,加热煮沸 1~2 小时,提取;合并三次提取液,过滤,得滤液,浓缩成 60℃下相对密度为 1.12~1.15 的稠膏,备用;

[0046] (2) 将风轮菜和睡菜洗净,切碎,放入容器内,绞汁,滤杂质,留汁液备用;

[0047] (3) 将蜂房、鸡内金、亮菌和角茴香放入容器内,进行粉碎处理,研末,得到过 160 目的细粉,备用;

[0048] (4) 将苦木和金钱草洗净,浸入 4 倍量的 70%的乙醇溶液浸泡 1~2 小时,加热提取 3 小时,回收乙醇,滤过,得滤液,浓缩为 65℃下相对密度为 1.13~1.16 的稠膏,备用;

[0049] (5) 将上述步骤(1)~(4)所制得的稠膏、汁液以及细粉混合,制成片剂,即得所述的治疗胆囊炎的药物。

[0050] 用法用量:口服,每日 2 次,早晚各 1 次,每次 1 片(每片 0.5g),饭后温开水送服;8 天为 1 个疗程,3~4 个疗程即可痊愈,病情严重者遵医嘱酌增用量。

[0051] 实施例 2

[0052] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为:

[0053]

波棱瓜 48g 风轮菜 48g 蜂房 47g 番泻叶 47g

苦木 45g 水百合 43g 金钱草 43g 梅根 42g

鸡内金 41g 秤钩风 41g 亮菌 38g 罗星草 37g

[0054]

睡菜 37g 蒲公英 34g 豇豆壳 31g 角茴香 29g。

[0055] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0056] 实施例 3

[0057] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0058]

波棱瓜 44g 风轮菜 44g 蜂房 43g 番泻叶 43g

苦木 41g 水百合 39g 金钱草 39g 梅根 38g

鸡内金 37g 秤钩风 37g 亮菌 34g 罗星草 33g

睡菜 33g 蒲公英 31g 豇豆壳 28g 角茴香 26g。

[0059] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0060] 实施例 4

[0061] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0062]

波棱瓜 40g 风轮菜 40g 蜂房 39g 番泻叶 39g

苦木 37g 水百合 35g 金钱草 35g 梅根 34g

鸡内金 33g 秤钩风 33g 亮菌 30g 罗星草 29g

睡菜 29g 蒲公英 28g 豇豆壳 25g 角茴香 23g。

[0063] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0064] 实施例 5

[0065] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0066]

波棱瓜 36g 风轮菜 36g 蜂房 35g 番泻叶 35g

苦木 33g 水百合 31g 金钱草 31g 梅根 30g

鸡内金 29g 秤钩风 29g 亮菌 26g 罗星草 25g

睡菜 25g 蒲公英 24g 豇豆壳 22g 角茴香 20g。

[0067] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0068] 临床资料：

[0069] 1、病例选择：

[0070] 作为治疗胆囊炎的药物，选择确诊的胆囊炎患者 222 例临床观察，病人随机分成

治疗组和对照组两组,治疗组 111 例,其中男性 55 例,女性 56 例,年龄 37 ~ 62 岁,平均年龄 49.5 岁,平均病程 4 年;对照组 111 例,其中男性 56 例,女性 55 例,年龄 36 ~ 63 岁,平均年龄 49.5 岁,平均病程 4 年。

[0071] 治疗组和对照组两组病例的病程、症状轻重程度基本一致,无显著差异,具有可比性。

[0072] 2、药物选择:

[0073] 治疗组服用本发明药物,口服,每日 2 次,早晚各 1 次,每次 1 片(每片 0.5g),饭后温开水送服;8 天为 1 个疗程,连续服用 3 ~ 4 个疗程,病情严重者遵医嘱酌增用量。

[0074] 对照组服用去氢胆酸片,口服,一次 1 ~ 2 片,一日 3 次,饭后服,疗程视病情而定。

[0075] 3、疗效判定:

[0076] (1) 治愈:腹部不适症状全部消失,经 B 超检查胆囊恢复正常。

[0077] (2) 显效:腹部不适症状明显减轻,经 B 超检查胆囊明显好转。

[0078] (3) 有效:腹部不适症状有所减轻,经 B 超检查胆囊有所好转。

[0079] (4) 无效:通过治疗后腹部不适症状无减轻或加重。

[0080] 4、结果:

[0081]

	例数	治愈	显效	有效	无效	治愈率	总有效率
治疗组	111	68	24	15	3	61.3%	96.4%
对照组	111	59	19	12	21	53.2%	81.1%

[0082] 以上结果显示,治疗组的治愈率和总有效率明显高于对照组。

[0083] 典型病例举例:

[0084] 1、李某,女,39 岁,天津河西人。患者胃痛、胃胀,后背疼痛,有时恶心、无力,右侧肋弓部有叩击痛,右侧肩胛下缘有反射性疼痛;B 超检查胆囊增大、胆壁欠光滑,诊断为胆囊炎,服用本发明药物治疗,服用 1 个疗程后,胆囊区疼痛明显好转,服用 3 个疗程后,症状消失,半年后复查未复发。

[0085] 2、黄某,男,40 岁,辽宁抚顺人。患者右上腹痛,伴有后背部放射性疼痛,恶心、呕吐;去医院就诊,经 B 超检查,患有胆囊炎,给予服用本发明药物治疗,服用 1 个疗程后,腹部疼痛症状缓解,继续服用 3 个疗程后,症状消失,经 B 超检查胆囊恢复正常。

[0086] 3、陈某,女,43 岁,黑龙江大庆人。患者患胆囊炎 2 年余,病症时轻时重,几月前又感胃部不适,恶心食欲差,自知旧病复发,经服用本发明药物治疗,服用 2 个疗程后,不适症状明显减轻,继续服用 2 个疗程后,症状全部消失,痊愈,1 年后复查无复发。

[0087] 4、董某,男,51 岁,河北唐山人。患者右上腹痛,伴有后背部放射性疼痛,胃部不适,去医院 B 超检查发现胆囊肿大,胆囊壁厚 0.4cm,确诊为急性胆囊炎。因患有心脏病不宜进行手术,后服用本发明药物治疗,服用 1 个疗程后,腹部疼痛症状有所减轻,继续服用 3 个疗程后,症状全部消失,经 B 超检查胆囊恢复正常。

[0088] 5、孙某,男,47 岁,吉林通化人。患者患胆囊炎 3 年,因感冒引发病情加重,胃部胀饱隐痛,服用过几种药物治疗,有所缓解,但仍未能根治,经人推荐服用本发明药物治疗,服



用 1 个疗程后,症状明显减轻,继续服用 2 个疗程后,症状全部消失,痊愈。

[0089] 6、赵某,女,56 岁,山东淄博人。患者患有慢性胆囊炎,胃痛胃胀,右侧肩胛下缘疼痛。服用本发明药物治疗,服用 1 个疗程后,胆囊区疼痛症状有所好转,服用 3 个疗程后,无胃痛胃胀,胆囊区无压痛,症状全部消失,痊愈,1 年后复查未见复发。