

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710138540.6

[51] Int. Cl.

A61K 36/8888 (2006.01)

A61P 33/14 (2006.01)

[43] 公开日 2008 年 1 月 16 日

[11] 公开号 CN 101104038A

[22] 申请日 2007.7.30

[21] 申请号 200710138540.6

[71] 申请人 徐萍儿

地址 311411 浙江省富阳市场口镇塘华村 207
号(便民诊所)

[72] 发明人 徐萍儿

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称

一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物
及制备方法

[57] 摘要

一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物及
制备方法, 涉及治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的中草
药配方, 其药物是由下述重量份的原料制成的: 柴
胡、枳实各 13 - 15 克, 茵陈、黄芩各 18 - 20 克,
白芍 50 - 60 克, 半夏、川楝子、大枣各 8 - 10 克。
本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、
见效快。

1、一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物及制备方法，其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的：柴胡、枳实各 13-15 克，茵陈、黄芩各 18-20 克，白芍 50-60 克，半夏、川楝子、大枣各 8-10 克。

一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物及制备方法

技术领域：

本发明涉及中草药领域，尤其是涉及防治肝气郁结型胆道蛔虫症效果十分理想的一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物及制备方法。

背景技术：

胆道蛔虫症是由肠道蛔虫钻进胆道所引起的一种疾病，以儿童为多见，女性多于男性。蛔虫是人体常见的寄生虫，其习性喜碱恶酸，常居于空肠下段和回肠上段，有钻孔的癖性。当胆道有病时，奥狄氏括约肌收缩功能失调，蛔虫常因此钻入胆道。胆道蛔虫症的一般症状表现为：剑突右下方，突然发生剧烈绞痛，捧腹屈膝，坐卧不安，全身汗出，四肢厥冷，恶心，呕吐，呕吐物含胆汁或蛔虫，绞痛缓解时一切如常，稍过一会又开始发作，出现阵发性疼痛。肝气郁结型胆道蛔虫症的症状表现为：除胆道蛔虫症一般症状外，伴有精神抑郁，易怒，胸闷，叹气纳呆、脘腹胀满等明显症状。目前，国内外治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的方法较多，如西医治疗法、中医治疗法等。但是，在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

经检索未发现与本发明相同的配方。

发明内容：

本发明采用的治疗方法为中草药汤剂治疗法。

本发明的目的在于克服目前在治疗肝气郁结型胆道蛔虫症上的不足之处，并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的中草药汤剂药物及制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的：

一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物，其药物是由下述重量份的原料制成的：柴胡、枳实各 13-15 克，茵陈、黄芩各 18-20 克，白芍 50-60 克，半夏、

川楝子、大枣各 8-10 克。

一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物，其药物的制备方法为：先将配比量柴胡、枳实、茵陈、黄芩、白芍、半夏、川楝子、大枣等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

本发明汤剂药物里：柴胡具有发表和里、升阳解郁作用；枳实具有破气、散痞、泻痰、消积作用；茵陈具有清热利湿、利胆退黄作用；黄芩具有清热泻火、除湿解毒作用；白芍具有养血柔肝、敛阴敛汗、缓中止痛作用；半夏具有燥湿化痰、消痞散结、止呕作用；川楝子具有清利湿热、止痛、杀虫作用；大枣具有补脾和胃、益气生津、调营卫作用。上述中草药经有机组合、辩证配伍和相互辅佐，增强了该药物清热解毒、养血柔肝、升阳解郁、利胆杀虫的功效，从而达到治愈肝气郁结型胆道蛔虫症的目的。

使用本发明的治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物治疗肝气郁结型胆道蛔虫症有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

服用方法：

- 1、药量：每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后，分两次服用。
- 2、服药时间：上、下午各一次，在饭后两小时服药。
- 3、药温控制：温服。

禁忌事项：

治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

实施例 1：一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物的原料配方：柴胡、枳实各 13 克，茵陈、黄芩各 18 克，白芍 50 克，半夏、川楝子、大枣各 8 克。药物的制备方法为：先将配比量柴胡、枳实、茵陈、黄芩、白芍、半夏、川楝子、大枣等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁

充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。。

实施例 2：一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物的原料配方：柴胡、枳实各 15 克，茵陈、黄芩各 20 克，白芍 60 克，半夏、川楝子、大枣各 10 克。药物的制备方法为：先将配比量柴胡、枳实、茵陈、黄芩、白芍、半夏、川楝子、大枣等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

治疗效果：

疗效标准：一种治疗肝气郁结型胆道蛔虫症的汤剂药物治疗肝气郁结型胆道蛔虫症之疗效判断主要依据于肝气郁结型胆道蛔虫症症状是否消失。服药 5 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——肝气郁结型胆道蛔虫症症状全部消失；好转——肝气郁结型胆道蛔虫症症状明显减少；无效——服药 1 个疗程后，肝气郁结型胆道蛔虫症症状毫无消失。

效果：用该药物治疗肝气郁结型胆道蛔虫症患者 17 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 14 例，好转 3 例，治愈率为 82%，有效率为 100%。

典型病例：

颜某某，女，36 岁，家庭主妇。2002 年 10 月就诊。患者自述这几天来，右上腹常阵发性剧痛，发作时坐卧不安，捧腹屈膝，全身汗出，恶心呕吐，胸口发闷，脘腹有胀满感。诊查，患者精神抑郁，易怒，叹气纳呆，呕吐物中发现蛔虫。诊断为肝气郁结型胆道蛔虫症。采用本发明汤剂药物，连服 5 天后，蛔虫随大便排出，症状全消。6 个月后随访，未见复发。