



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104353051 A

(43) 申请公布日 2015. 02. 18

(21) 申请号 201410689914. 3

(22) 申请日 2014. 11. 27

(71) 申请人 金妍

地址 276800 山东省日照市东港区望海路
35 号日照市中医医院

(72) 发明人 金妍

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006. 01)

A61K 9/20 (2006. 01)

A61P 1/04 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书7页

(54) 发明名称

一种治疗胃痛的中药制剂及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗胃痛的中药制剂,它是由菊花、炒白芍、酸枣仁、丹参、紫苏梗、玫瑰花、香附、延胡索、川芎、吴茱萸、枳壳、附子、厚朴、炒苍术、干姜、肉桂、高良姜、黄芪、饴糖、乌药、砂仁、五灵脂、生蒲黄、炙甘草按照一定的重量配比制成,具有强肝养胃、温胃散寒、理气宽中、祛瘀止痛的功效,治疗效果显著。

1. 一种治疗胃痛的中药制剂,其特征在于,该中药制剂是由以下重量份的药物制成:菊花 4-14 份、炒白芍 10-20 份、酸枣仁 13-23 份、丹参 13-23 份、紫苏梗 10-20 份、玫瑰花 4-14 份、香附 7-17 份、延胡索 13-23 份、川芎 7-17 份、吴茱萸 3-9 份、枳壳 7-17 份、附子 7-17 份、厚朴 7-17 份、炒苍术 10-20 份、干姜 13-23 份、肉桂 3-9 份、高良姜 3-9 份、黄芪 19-29 份、饴糖 15-25 份、乌药 3-9 份、砂仁 3-9 份、五灵脂 4-14 份、生蒲黄 7-17 份、炙甘草 3-9 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗胃痛的中药制剂,其特征在于,由以下重量份的药物制成:菊花 9 份、炒白芍 15 份、酸枣仁 18 份、丹参 18 份、紫苏梗 15 份、玫瑰花 9 份、香附 12 份、延胡索 18 份、川芎 12 份、吴茱萸 6 份、枳壳 12 份、附子 12 份、厚朴 12 份、炒苍术 15 份、干姜 18 份、肉桂 6 份、高良姜 6 份、黄芪 24 份、饴糖 20 份、乌药 6 份、砂仁 6 份、五灵脂 9 份、生蒲黄 12 份、炙甘草 6 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗胃痛的中药制剂,其特征在于:所述中药制剂为丸剂。

4. 一种治疗胃痛的中药制剂的制备方法,其特征在于,制备方法如下:步骤一:按本发明重量配比,先将酸枣仁、吴茱萸、枳壳、砂仁、五灵脂,用纱布包成药包,放于水中浸泡约 45 分钟,过滤,备用;步骤二:按本发明重量配比,将炒白芍、丹参、香附、川芎、附子、厚朴、炒苍术、干姜、肉桂、高良姜、黄芪、乌药、放入砂锅中加步骤一中浸泡后剩余冷水,超过药面 3~4 厘米,用武火煮沸后,再用文火煎 20~30 分钟,过滤,得滤液,在剩余药渣中加入 3 厘米左右的水,然后加入紫苏梗、延胡索、炙甘草以及步骤一中的药包煎煮约 30 分钟,之后加入菊花、玫瑰花煎煮 10 分钟过滤,得滤液,合并两次滤液,过滤,弃渣,趁热将饴糖放于热汤药中烱化,然后浓缩加乙醇,放置沉淀,过滤,弃沉淀,滤液回收乙醇,备用;步骤三:将步骤二中所得药液浓缩为 75℃ 环境下相对密度 1.15~1.20 的稠膏,将稠膏风干粉碎,加入蜂蜜、防腐剂、润湿剂等,进行捶打、搓条、成丸,晾干,分装入袋,既得本发明所述治疗胃痛的蜜丸。

一种治疗胃痛的中药制剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药制剂,具体涉及一种治疗胃痛的中药制剂,本发明还涉及该中药制剂的制备方法。

背景技术

[0002] 胃痛又称胃脘痛,是以胃脘近心窝处常发生疼痛为主的疾患。胃痛是临床上常见的一个症状,多见急慢性胃炎,胃、十二指肠溃疡病,胃神经官能症。也见于胃粘膜脱垂、胃下垂、胰腺炎、胆囊炎及胆石症等病。历代文献中所称的“心痛”、“心下痛”,多指胃痛而言。如《素问·六元正纪大论》说:“民病胃脘当心而痛。”《医学正传》说:“古方九种心痛……。详其所由,皆在胃脘,而实不在于心。”至于心脏疾患所引起的心痛症,《黄帝内经》曾指出:“真心痛,手足青至节,心痛甚,旦发夕死,夕发旦死”,在临床上与胃痛是有区别的。胃痛发生的常见原因有寒邪客胃、饮食伤胃、肝气犯胃和脾胃弱等。胃主受纳腐熟水谷,若寒邪客于胃中,寒凝不散,阻滞气机,可致胃气不和而疼痛或因饮食不节,饥饱无度,或过食肥甘,食滞不化,气机受阻,胃失和降引起胃痛;肝对脾胃有疏泄作用,如因恼怒抑郁,气郁伤肝,肝失条达,横逆犯胃,亦可发生胃痛;若劳倦内伤,久病脾胃虚弱,或禀赋不足,中阳亏虚,胃失温养,内寒滋生,中焦虚寒而痛;亦有气郁日久,瘀血内结,气滞血瘀,阻碍中焦气机,而致胃痛发作总之,胃痛发生的病机分为虚实两端,实证为气机阻滞,不通则痛;虚证为胃腑失于温煦或濡养,失养则痛。

[0003] 目前许多治疗胃痛的药物,多是化学合成的,有一定的副作用,临床效果并不理想,治标不治本,并且药物本身还具有对胃部的刺激作用,患者服药后很容易对药物产生依赖,停药后容易反复,给患者的生活带来严重的影响。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种治疗胃痛的中药制剂,该中药制剂对于胃痛具有疗效确切,价格低廉,安全方便,副作用小、标本兼治,养胃消痛的特点。

[0005] 本发明的另一目的是提供该治疗胃痛的中药制剂的制备方法。

[0006] 发明人在多年的临床医疗实践中,观察到胃痛给患者带来的痛苦,根据该病症的发展规律,以及中药的配伍原则,并通过大量的临床验证,反复探索总结出一种治疗胃痛的中药制剂的新配方,本发明选择菊花、炒白芍、酸枣仁、丹参、紫苏梗、玫瑰花、香附、延胡索、川芎、吴茱萸、枳壳、附子、厚朴、炒苍术、干姜、肉桂、高良姜、黄芪、饴糖、乌药、砂仁、五灵脂、生蒲黄、炙甘草进行组合,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,使之具有强肝养胃、温胃散寒、理气宽中、祛瘀止痛的功效,从而能够有效治疗胃痛。

[0007] 本发明中药物的作用:

其中:

菊花:为菊科植物菊 *Chrysanthemum morifolium* Ramat. 的干燥头状花序。性味:甘、苦,微寒。归肺、肝经。功效:散风清热,平肝明目。用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼

目昏花。因本品既能清肝火,又能散风热,可以治疗因肝气失调所引起的胃部不适。

[0008] 炒白芍:为双子叶植物毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥根。性味:凉,苦酸,微寒。功效:补血柔肝、平肝止痛,敛阴收汗。炒白芍较之白芍药性稍缓,以养血敛阴为主。炒后长于养血和肝,多用于肝旺脾虚痛泻者,本品能养肝血、敛肝阴、抑肝阳、疏肝气,又能缓挛急、止疼痛,为治疗肝经各种疼痛之良药。《滇南本草》:“泻脾热,止腹疼,止水泻,收肝气逆疼,调养心肝脾经血,舒经降气,止肝气疼痛。”《本经》芍药,虽未分别赤白,二者各有所主。然寻绎其主治诸病,一为补血养肝脾真阴,而收摄脾气之散乱,肝气之恣横,则白芍。

[0009] 酸枣仁:为鼠李科植物酸枣 *Ziziphus jujuba* Mill. var. *spinosa* (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。性味平,甘、酸。归心、脾、肝、胆经。功效:养肝,宁心,安神,敛汗。《本草经疏》:酸枣仁,实酸平,仁则兼甘。专补肝胆,亦复醒脾。熟则芳香,香气入脾,故能归脾。能补胆气,故可温胆。母子之气相通,故亦主虚烦、烦心不得眠。其主心腹寒热,邪结气聚,及四肢酸疼湿痹者,皆脾虚受邪之病,脾主四肢故也。胆为诸脏之首,十一脏皆取决于胆,五脏之精气,皆禀于脾,故久服之,功能安五脏。

[0010] 丹参:为双子叶植物唇形科 *Labiatae* 鼠尾草属植物丹参 *Salvia miltiorrhiza* Bge 的干燥根及根茎。性味:苦,微寒。归经:入心、肝经。功效:活血调经,祛瘀止痛,凉血消痈,清心除烦,养血安神。用于胸肋胁痛,风湿痹痛,症瘕结块。《日华子本草》:养神定志,通利关脉。治冷热劳,骨节疼痛,四肢不遂;排脓止痛,生肌长肉;破宿血,补新生血;安生胎,落死胎;止血崩带下,调妇人经脉不匀,血邪心烦;恶疮疥癣,瘰疬肿毒,丹毒;头痛,赤眼,热温狂闷。

[0011] 紫苏梗:为唇形科植物紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥茎。性味:辛,温。归肺、脾经。功效:理气宽中,止痛,安胎。《药品化义》:苏梗,能使郁滞上下宣行,凡顺气诸品惟此纯良。其性微温,比枳壳尤缓。病之虚者,宽胸利膈,疏气而不迅下。入安胎饮,顺气养阴;入消胀汤,散虚肿满。

[0012] 玫瑰花:为蔷薇科植物玫瑰 *Rosa rugosa* Thunb. 的干燥花蕾。性味:温、甘、微苦。归肝、脾、胃经。功效:行气解郁,和血,止痛,强肝养胃,活血调经,润肠通便,解郁安神。主治:胸膈满闷,胃脘、胁肋、乳房胀痛,月经不调,赤白带下。泄泻痢疾,跌打损伤,风痹,痈肿。《本草正义》中记载:玫瑰花香气最浓,清而不浊,和而不猛,柔肝醒胃,流气活血,宣通壅滞而绝无辛温刚燥之弊,推断气分药之中,最有捷效而最为驯良者,芳香诸品,殆无其匹。

[0013] 香附:为莎草科植物莎草 *Cyperus rotundus* L. 的干燥根茎。性味:辛、微苦、微甘,平。归肝、脾、三焦经。功效:行气解郁,调经止痛,安胎,理气舒郁,调和肝胃。本品辛苦泄,为疏肝理气之要药,可用于肝气郁滞所致诸痛证。《滇南本草》:调血中之气,开郁,宽中,消食。

[0014] 延胡索:为罂粟科植物延胡索 *Corydalis yanhusuo* W. T. Wang 的干燥块茎。性味:辛、苦、温。归肝、脾经。功效:活血,利气,止痛。用于胸肋、腕腹疼痛,经闭痛经,产后瘀阻,跌扑肿痛。本品辛散温通,能行血中气滞,气中血滞,活血行气止痛,善治血瘀气滞所致的多种疼痛,其止痛作用优良。《本草求真》中记载:延胡索,不论是血是气,积而不散者,服此力能通达,以其性温,则于气血能行能畅,味辛则于气血能润能散,所以理一身上下诸痛,往往独行功多。

[0015] 川芎:为伞形科植物川芎 *Ligusticum chuanxiong* Hort. 的干燥根茎。性味:辛,温。归肝、胆、心经。功效:活血行气,祛风止痛。本品辛散温通,能上行巅顶,下达血海,外彻皮毛,旁通四肢,既能活血又能行气,昔人谓川芎为血中之气药,殆言其寓辛散、解郁、通达、止痛等功能。

[0016] 吴茱萸:为芸香科植物吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.、石虎 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *bodinieri* (Dode) Huang 的干燥近成熟果实。性味:辛、苦,热;有小毒。归肝、脾、胃、肾经。功效:散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻。用于厥阴头痛,寒疝腹痛,寒湿脚气,经行腹痛,脘腹胀痛,呕吐吞酸,五更泄泻,常配生姜、补骨脂等。

[0017] 枳壳:为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实。性味:苦、辛、酸,温。归脾、胃经。功效:理气宽中,行滞消胀。用于胸胁气滞,胀满疼痛,食积不化,痰饮内停;胃下垂,脱肛,子宫脱垂。《本草经疏》:枳壳形大,其气散,其性缓,故其行稍迟,是以能入胸膈肺胃之分及入大肠也。其主风痒麻痹,通利关节,止风痛者,盖肺主皮毛,胃主肌肉,风寒湿入于二经,则皮肤瘙痒,或作痛,或麻木,此药有苦泄辛散之功,兼能引诸风药入于二脏,故为治风所需,风邪既散,则节自然通利矣。

[0018] 附子:为毛茛科植物乌头 *Aconitum carmichaeli* Debx. 的子根的加工品。性味辛、甘,大热;有毒。归心、肾、脾经。功效:回阳救逆,补火助阳,散寒止痛。用于亡阳虚脱,肢冷脉微,阳萎,宫冷,心腹冷痛,虚寒吐泻,阴寒水肿,阳虚外感,寒湿痹痛。本品大热,祛寒力强,故能治寒邪内侵之胃腹疼痛、泄泻,以及寒湿阻络之痹痛。

[0019] 厚朴:为木兰科植物厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 *Magnolia officinalis* Rehd. et Wils. var. *biloba* Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮。性味:苦、辛,温。归脾、胃、肺、大肠经。功效:燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。对气滞胸腹胀痛,可配木香、枳壳同用。常与苍朮、陈皮等配合用于湿困脾胃、脘腹致胀满等症。

[0020] 炒苍术:为菊科植物茅苍术 *Atractylodes lancea* (Thunb.) DC. 或北苍术 *Atractylodes chinensis* (DC.) Koidz. 的干燥根茎。性味:辛、苦,温;归脾、胃、肝经;功效:燥湿健脾、祛风散寒、明目;本品苦辛性温,芳烈燥散,可升可降,走而不守,能是湿邪除而恢复脾的运化功能。

[0021] 干姜:为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的干燥根茎。性味:辛、热。归脾、胃、心、肺经。功效:温中散寒,回阳通脉,燥湿消痰,温肺化饮。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,肢冷脉微,痰饮喘咳。干姜外用治疗外伤化脓性感染。本品辛热燥烈、主入脾胃经,长于温暖中焦脾阳而散寒,故凡中焦寒证,无论外寒内侵之实寒证,还是阳气不足之虚寒证,均为要药,常配高良姜治疗脘腹冷痛、泄泻。

[0022] 肉桂:为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的树皮。性味大热,辛、甘。归肾、脾、心、肝经。功效:补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经,通血脉。本品甘热,入脾肾经,善于补阳气而温暖脾肾,散寒止痛,中医讲脾通经脉于胃,脾健则胃部不适自消。

[0023] 高良姜:为姜科植物高良姜 *Alpinia officinarum* Hance 的干燥根茎。性味:辛,热。归脾、胃经。功效:温胃散寒,消食止痛。用于脘腹冷痛,胃寒呕吐,噎气吞酸。《本草汇言》中记载:“高良姜,祛寒湿、温脾胃之药也。若老人脾肾虚寒,泄泻自利,妇人心胃暴痛,

因气怒,因寒痰者,此药辛热纯阳,除一切沉寒窟冷,功与桂、附同等。苟非客寒犯胃,胃冷呕逆,及伤生冷饮食,致成霍乱吐泻者,不可轻用。”本品作用温和,适合老幼孕以及身体虚弱的病人。

[0024] 黄芪:为豆科植物蒙古黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. var. *mongholicus* (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge. 的干燥根。性味:甘,微温。归肺、脾、肝、肾经。功效:补气升阳、固表敛汗、利水消肿、托疮排脓、通调水道。在《本草汇言》中有记载:黄芪,补肺健脾,实卫敛汗,驱风运毒之药也。故阳虚之人,自汗频来,乃表虚而腠理不密也,黄芪可以实卫而敛汗;伤寒之证,行发表而邪汗不出,乃里虚而正气内乏也,黄芪可以济津以助汗;贼风之疴,偏中血脉而手足不随者,黄芪可以荣筋骨;痈疡之证,脓血内溃,阳气虚而不敛者,黄芪可以生肌肉,又阴疮不能起发,阳气虚而不愈者,黄芪可以生肌肉。

[0025] 饴糖:将米或其他淀粉物质,经过浸渍蒸熟后,加入麦芽,使其发酵,再加水煎熬,溶出所有糖分,滤除渣质,浓缩,即成饴糖。性味:甘,温。归脾、胃、肺经。功效:缓中,补虚,生津,润燥。治劳倦伤脾,里急腹痛,肺燥咳嗽,吐血,口渴,咽痛,便秘。《本草经疏》:饴糖,甘入脾,而米麦皆养脾胃之物,故主补虚乏,仲景建中汤用之是也。肺胃有火则发渴,火上炎,迫血妄行则吐血,甘能缓火之际,则火下降而渴自止,血自去也。

[0026] 乌药:为樟科植物乌药 *Lindera aggregata* (Sims) Kosterm. 的干燥块根。性味:辛,温。归肺、脾、肾、膀胱经。功效:顺气止痛,温肾散寒。用于胸腹胀痛,气逆喘急,膀胱虚冷,遗尿尿频,疝气,痛经。

[0027] 砂仁:为姜科植物阳春砂 *Amomum villosum* Lour.、绿壳砂 *Amomum villosum* Lour. var. *xanthioides* T. L. Wu et Senjen 或海南砂 *Amomum longiligulare* T. L. Wu 的干燥成熟果实。性味:辛、温。归脾、胃、肾经。功效:化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。对于湿阻脾胃引起的食欲不振及呕吐泄泻等症,常配合白朮、陈皮等同用。

[0028] 五灵脂:为鼯鼠科动物橙足鼯鼠 *Trogopterus Xanthipes* Milne-Edwards 或飞鼠科动物小飞鼠 *Pteromys volans* L. 的干燥粪便。性味:甘,温。入肝、脾经。功效:活血散瘀,炒炭止血。用于心腹淤血作痛,痛经,血瘀经闭,产后淤血腹痛;炒炭治崩漏下血;外用治跌打损伤,蛇、虫咬伤。

[0029] 生蒲黄:为香蒲科植物水烛香蒲 *Typha angustifolia* L.、东方香蒲 *T. orientalis* Presl 或同属植物的干燥花粉。生蒲黄是将其揉碎过筛。性味:甘、平、涩。归肝、心包经。功效:行血消瘀,止血。本品性平,既能止血又能化痰,对出血证无论寒热,有无淤血,均可随证配伍应用,但以属实夹淤尤宜。配五灵脂名失笑散,能祛瘀止痛,常用于产后腹痛、痛经及胃腹瘀痛。

[0030] 炙甘草:为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch., 胀果甘草 *Glycyrrhiza Inflatata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza Glabra* L. 的干燥根及根茎。炙甘草为甘草的蜜烘制加工品。性味甘,平。归心、肺、脾、胃经。功效:补脾和胃,益气复脉。《日华子本草》:安魂定魄。补五劳七伤,一切虚损、惊悸、烦闷、健忘。通九窍,利百脉,益精养气,壮筋骨,解冷热。

[0031] 本发明的方解是:方中菊花清风散热,炒白芍补血柔肝、平肝止痛,酸枣仁养肝宁

心,丹参祛瘀止痛,紫苏梗理气宽中,玫瑰花强肝养胃、行气解郁,以上六味共为君药,中医上讲肝气犯胃,是指肝对脾胃有疏泄作用,如因恼怒抑郁,气郁伤肝,肝失条达,横逆犯胃,亦可发生胃痛,君药以补血柔肝、养肝宁心为主,从疾病的根本上控制疾病的生成,阻止胃痛症状不断反复的发生,并且安抚五脏,使胃有所养,从而达到治疗胃痛的目的。香附行气解郁、调和肝胃,延胡索理气止痛,川芎活血行气、祛风止痛,吴茱萸、附子散寒止痛,枳壳理气宽中,厚朴、苍术燥湿健脾,散寒止痛,以上七味共为臣药,一方面脾不健运也会引起胃部不适,脾不健运则劳倦内伤,脾胃虚弱,或禀赋不足,中阳亏虚,胃失温养,内寒滋生,中焦虚寒而痛,亦有气郁日久,瘀血内结,气滞血瘀,阻碍中焦气机,而致胃痛发作。因此臣药从健脾理气,散寒止痛的方面治疗胃痛,同时臣药也增加了君药调和肝胃的做用,君臣协助,从多方面调理身体,减轻胃部不适。干姜、肉桂、高良姜温胃散寒、消食止痛,黄芪补气升阳、调通水道,饴糖缓中补虚、生津润燥,乌药顺气止痛,砂仁化湿开胃,五灵脂配生蒲黄祛瘀止痛,以上几味共为佐药,一方面多有温中散寒的作用,驱散中焦湿寒,温暖胃部,缓解胃部疼痛,另一方面补气升阳、补虚生津,使胃部得以濡养,患者逐渐恢复,炙甘草补脾和胃,调和诸药,引药归经,为使药。此方诸药合用,君臣协力,佐使共辅,具有强肝养胃、温胃散寒、理气宽中、祛瘀止痛的功效,能够有效治疗胃痛。

[0032] 本发明药物原料用量是经发明人进行大量摸索总结得出的,各原料用量为在下述重量份范围都具有较好的疗效:菊花 4-14 份、炒白芍 10-20 份、酸枣仁 13-23 份、丹参 13-23 份、紫苏梗 10-20 份、玫瑰花 4-14 份、香附 7-17 份、延胡索 13-23 份、川芎 7-17 份、吴茱萸 3-9 份、枳壳 7-17 份、附子 7-17 份、厚朴 7-17 份、炒苍术 10-20 份、干姜 13-23 份、肉桂 3-9 份、高良姜 3-9 份、黄芪 19-29 份、饴糖 15-25 份、乌药 3-9 份、砂仁 3-9 份、五灵脂 4-14 份、生蒲黄 7-17 份、炙甘草 3-9 份。

[0033] 其中优选为:菊花 9 份、炒白芍 15 份、酸枣仁 18 份、丹参 18 份、紫苏梗 15 份、玫瑰花 9 份、香附 12 份、延胡索 18 份、川芎 12 份、吴茱萸 6 份、枳壳 12 份、附子 12 份、厚朴 12 份、炒苍术 15 份、干姜 18 份、肉桂 6 份、高良姜 6 份、黄芪 24 份、饴糖 20 份、乌药 6 份、砂仁 6 份、五灵脂 9 份、生蒲黄 12 份、炙甘草 6 份。

[0034] 本发明药物可以采用中药制剂的常规方法制备成任何常规内服制剂,如丸剂、散剂、片剂、口服液等。例如可以将这些原料药研成粉末混合均匀制成散剂冲服;可以用水煎,经过滤得滤液,加入防腐剂制成口服液;必要时也可以直接服用汤剂。

[0035] 本发明优选的制备方法是丸剂,其制备方法如下:

步骤一:按本发明重量配比,先将酸枣仁、吴茱萸、枳壳、砂仁、五灵脂,用纱布包成药包,放于水中浸泡约 45 分钟,过滤,备用;

步骤二:按本发明重量配比,将炒白芍、丹参、香附、川芎、附子、厚朴、炒苍术、干姜、肉桂、高良姜、黄芪、乌药、放入砂锅中加步骤一中浸泡后剩余冷水,超过药面 3~4 厘米,用武火煮沸后,再用文火煎 20~30 分钟,过滤,得滤液,在剩余药渣中加入 3 厘米左右的水,然后加入紫苏梗、延胡索、炙甘草以及步骤一中的药包煎煮约 30 分钟,之后加入菊花、玫瑰花煎煮 10 分钟过滤,得滤液,合并两次滤液,过滤,弃渣,合并两次滤液,趁热将饴糖放于热汤药中烱化,然后浓缩加乙醇,放置沉淀,过滤,弃沉淀,滤液回收乙醇,备用;

步骤三:将步骤二中所得药液浓缩为 75℃环境下相对密度 1.15~1.20 的稠膏,将稠膏风干粉碎,加入蜂蜜、防腐剂、润湿剂等,进行捶打、搓条、成丸,晾干,分装入袋,既得本发

明所述治疗胃痛的蜜丸。

[0036] 本发明药物具有强肝养胃、温胃散寒、理气宽中、祛瘀止痛的功效，且疗效确切，价格低廉，安全方便，副作用小、标本兼治，养胃消痛。据对临床 180 例患者观察统计，使用本发明药物一个疗程总有效率 85%，两个疗程总有效率 97.2%。

具体实施方式

[0037] 实施例一、菊花 4 份、炒白芍 10 份、酸枣仁 13 份、丹参 13 份、紫苏梗 10 份、玫瑰花 4 份、香附 7 份、延胡索 13 份、川芎 7 份、吴茱萸 3 份、枳壳 7 份、附子 7 份、厚朴 7 份、炒苍术 10 份、干姜 13 份、肉桂 3 份、高良姜 3 份、黄芪 19 份、饴糖 15 份、乌药 3 份、砂仁 3 份、五灵脂 4 份、生蒲黄 7 份、炙甘草 3 份。

[0038] 实施例二、菊花 9 份、炒白芍 15 份、酸枣仁 18 份、丹参 18 份、紫苏梗 15 份、玫瑰花 9 份、香附 12 份、延胡索 18 份、川芎 12 份、吴茱萸 6 份、枳壳 12 份、附子 12 份、厚朴 12 份、炒苍术 15 份、干姜 18 份、肉桂 6 份、高良姜 6 份、黄芪 24 份、饴糖 20 份、乌药 6 份、砂仁 6 份、五灵脂 9 份、生蒲黄 12 份、炙甘草 6 份。

[0039] 实施例三、菊花 14 份、炒白芍 20 份、酸枣仁 23 份、丹参 23 份、紫苏梗 20 份、玫瑰花 14 份、香附 17 份、延胡索 23 份、川芎 17 份、吴茱萸 9 份、枳壳 17 份、附子 17 份、厚朴 17 份、炒苍术 20 份、干姜 23 份、肉桂 9 份、高良姜 9 份、黄芪 29 份、饴糖 25 份、乌药 9 份、砂仁 9 份、五灵脂 14 份、生蒲黄 17 份、炙甘草 9 份。

[0040] 下面是患者使用本发明药物的临床统计资料：

一、一般资料

收治门诊患者 180 例，其中男性 93 例，女性 87 例，平均年龄 37 岁，病程几天年到几年年不等。

[0041] 二、中医诊断标准

- 1、胃脘痞满，食后加重，喜温喜按；
- 2、纳少便溏、身疲力乏、面色无华或萎黄、舌质淡有齿印；
- 3、胃痛夜甚，痛久不愈、胃脘灼烧胀痛；
- 4、口干、口苦、口臭，小便赤黄、大便干结。

[0042] 三、治疗方法：

按照本发明药物实施例二，以及优选的制备方法制成的丸剂，温水送服，每天 3 次，每次 3-5 粒，10 天为一个疗程。

[0043] 四、疗效评定标准：

1、治愈：临床症状全部消失，胃胀、胃痛、口苦口干现象完全消失。

[0044] 2、好转：临床症状减轻，胃部疼痛发作次数减少，疼痛缓解，面色逐渐改善。

[0045] 3、无效：临床症状无明显好转或加重。

[0046] 五、治疗结果统计

治疗 时间	治愈		好转		未愈	
	例数	治愈率%	例数	好转率%	例数	未愈率%
一个疗程	93	51.7	60	33.3	27	15
两个疗程	139	77.2	36	20	5	2.8

其中：总有效率 = 治愈率 + 好转率

通过治疗结果的统计表明，本发明中药在治疗胃痛方面具有良好的临床效果，能有效提高治疗的治愈率，值得在临床应用上推广。

[0047] 典型病例及疗效：

病例一、患者钱某，男，47岁，患者自述近两三个月经常生气、上火，每次生气之后胃部开始胀痛，自服多潘立酮等药物，病情时轻时重，最近出现口苦、反酸等症状，朋友劝说，西药虽然可以缓解胃痛，但是对胃部的刺激较大，建议其服用中药，养胃治胃，后来我处就诊，后就在我处就诊，采用本发明实施例二中所制制剂，以及所选的制备方法，服用治疗一段时间后，口苦、反酸现象彻底消失，生气时胃部还会隐隐作痛，后又继续服用一个疗程，患者胃痛现象消失，食欲增加，面色也逐渐得到改善，痊愈。

[0048] 病例二、患者赵某，女，36岁，患者近半年经常食后胀闷，傍晚尤甚，吃饭不香，大便不爽，且饮食懒散，体倦乏力，去医院检查，并没有什么异常现象，只是嘱咐其多喝粥养胃，后经人介绍，来我处就诊，采用本发明实施例二中所制制剂，以及所选的制备方法，服用一个疗程后，患者食欲不振，食后胀痛现象明显好转，为巩固效率，继续服用一个月，患者明显感觉食欲增加，精力充沛，胃胀胃痛现象彻底消失，痊愈。

[0049] 病例三、患者张某，男，29岁，患者自述，最近因工作原因，经常吃饭不规律，晚上休息不好，自我感觉痞满，有暖气，反酸，肠鸣，大便溏泻，后来我处就诊，采用本发明实施例二中所制制剂，以及所选的制备方法，服用一个疗程后，患者症状缓解，食欲渐增，反酸暖气症状消失，继续服用一段时间后大便正常，体力如常，胃胀胃痛现象消失，痊愈。