

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 04.11.96.

③③ Priorité :

④③ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 07.05.98 Bulletin 98/19.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑥③ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : L'OREAL SOCIETE ANONYME —
FR.

⑦② Inventeur(s) : SIMON PASCAL et BORDEAUX
DOMINIQUE.

⑦③ Titulaire(s) : .

⑦④ Mandataire : L'OREAL.

⑤④ COMPOSITION RINCABLE POUR LE SOIN DE LA PEAU.

⑤⑦ L'invention a pour objet une composition cosmétique
et/ou dermatologique comprenant au moins un actif cos-
métique et/ou dermatologique caractérisée en ce que cet
actif est dissous ou dispersé dans un vecteur ayant l'aspect
d'un gel transparent stable comprenant:

(1) une phase grasse,

(2) au moins un ester gras d'hydrate de carbone en C₅-

C₇,
(3) au moins un polyol.



L'invention se rapporte à une composition ayant l'aspect d'un gel transparent rinçable pour son utilisation comme vecteur d'actifs cosmétiques et/ou dermatologiques.

5 L'invention se rapporte également aux compositions cosmétiques et/ou dermatologiques comprenant un tel vecteur et au moins un actif cosmétique et/ou dermatologique, choisi par exemple parmi les actifs dépigmentants, kératolytiques, amincissants, tenseurs, de traitement de l'acné, anti-inflammatoires, auto-bronzants.

10 Les actifs cosmétiques et/ou dermatologiques sont habituellement appliqués sur la peau dans des compositions dans lesquelles ils ont été incorporés, ces compositions se trouvant sous la forme de crèmes, de laits, de gels, que l'on étale sur la peau en massant du bout des doigts pour favoriser la pénétration de la composition, et en particulier des actifs, dans la peau.

15 Ces compositions sont habituellement appliquées après un nettoyage de la peau, et on évite de rincer la peau après leur application pour obtenir une bonne efficacité des actifs cosmétiques et/ou dermatologiques.

Ce mode d'application d'actifs cosmétiques et/ou dermatologiques n'est pas dépourvu d'inconvénients : les véhicules cosmétiques et/ou dermatologiques habituels comprennent différents ingrédients cosmétiques, dont notamment des tensioactifs et des conservateurs, en quantités non négligeables, à la fois pour stabiliser le véhicule cosmétique, pour y dissoudre l'actif et/ou pour protéger la composition d'éventuelles contaminations microbiennes.

20 L'application répétée et prolongée de tels milieux peut induire une sensibilisation de la peau et provoquer des réactions d'intolérance.

25 Pour solubiliser les actifs, on utilise habituellement dans les produits de soin des milieux comprenant des corps gras et/ou des glycols qui confèrent à ces compositions une certaine lourdeur. Or, certains utilisateurs trouvent désagréable de conserver sur le visage pendant plusieurs heures, en règle générale la journée, un produit de soin, ces produits étant parfois jugés gras ou collants.

30 Il subsiste donc le besoin d'une composition pouvant être utilisée comme véhicule pour des actifs cosmétiques et/ou dermatologiques, cette composition étant rinçable, stable, douce pour la peau et ayant la propriété de potentialiser les actifs de telle sorte qu'après un court temps d'application, suivi d'un rinçage, on obtienne la même efficacité de traitement non thérapeutique de la peau qu'avec un produit non rincé, et une efficacité supérieure aux compositions rincées de l'art antérieur.

40 De façon étonnante, la demanderesse a découvert des compositions pouvant être utilisées comme vecteur d'actifs cosmétiques et/ou dermatologiques, ces compositions étant rinçables et présentant une efficacité comparable après un court temps d'application, suivi d'un rinçage, à celle d'un vecteur cosmétique et/ou dermatologique non rincé habituel et supérieure à celle des produits rincés de l'art antérieur.

Aussi, l'invention a pour objet une composition cosmétique et/ou dermatologique comprenant au moins un actif cosmétique et/ou dermatologique caractérisée en ce que cet actif est dissous ou dispersé dans un vecteur ayant l'aspect d'un gel transparent

5 stable, comprenant :

- (i) une phase grasse,
- (ii) au moins un ester gras d'hydrate de carbone en C₅-C₇,
- (iii) au moins un polyol.

10 Le mot « transparent » signifie qu'au travers d'une bouteille transparente contenant la composition on peut distinguer les caractères imprimés sur une page de journal placée derrière cette bouteille.

La viscosité des compositions selon l'invention est préférentiellement supérieure à 2 Pa.s, plus préférentiellement à 4 Pa.s et encore plus préférentiellement à 5 Pa.s. De préférence elle est inférieure à 25 Pa.s

De préférence, la composition selon l'invention comprend en outre de l'eau. Dans ce cas elle est avantageusement sous la forme d'une émulsion huile-dans eau ayant l'aspect
20 d'un gel.

Par hydrates de carbone en C₅-C₇, on entend des pentoses, hexoses et heptoses (non réduits) et leurs dérivés alkyl-olosides dont le groupement alkyle contient de 1 à 6 atomes de carbone. Avantageusement, on choisit les hydrates de carbone parmi ceux ayant une
25 chaîne à 6 atomes de carbone, et préférentiellement ils sont choisis parmi le glucose, le fructose et leurs dérivés alkyl-glucoside et alkyl-fructoside en C₁-C₆. Encore plus préférentiellement, l'hydrate de carbone est le glucose ou un dérivé alkyl-glucoside, comme par exemple le méthyl-1-glucoside.

30 Par esters gras d'hydrates de carbone en C₅-C₇, on entend de préférence les composés obtenus par réaction d'un acide gras à chaîne saturée ou insaturée ayant de 8 à 30 atomes de carbone, préférentiellement de 12 à 22 atomes de carbone et encore plus préférentiellement de 16 à 20 atomes de carbone avec un hydrate de carbone choisi parmi les pentoses, les hexoses, les heptoses et leurs dérivés alkyl oloside dont le
35 groupement alkyle contient de 1 à 6 atomes de carbone.

L'ester d'acide gras et d'hydrate de carbone peut contenir un mélange de dérivés mono-, di-, tri-, tétra-ester.


40 Avantageusement, les esters d'hydrates de carbone en C₅-C₇ sont oxyalkylénés. Préférentiellement les esters d'hydrates de carbone en C₅-C₇ sont éthérifiés par un ou plusieurs fragments oxyéthylène ou oxypropylène, l'ensemble des substituants

oxyéthylène ou oxypropylène représentant au total de 5 à 200, et préférentiellement 15 à 150, unités oxyde d'alkylène.

- Avantageusement toutes les fonctions hydroxyle des dérivés d'hydrate de carbone
5 utilisés dans les compositions selon l'invention sont substituées par un groupement ester ou par un groupement oxyde d'alkylène.

- De tels composés sont bien connus de l'homme du métier. Plusieurs de ces composés
10 sont disponibles commercialement. Par exemple on peut utiliser les dérivés vendus sous la marque GLUCAMATE par la société AMERCHOL.


Avantageusement les esters d'hydrate de carbone en C_6 sont choisis parmi les composés répondant à la formule (I) :



15 (I)

dans laquelle :

R_1 est un groupement de formule (III) :



- 20 R' étant choisi parmi les groupements alkyle linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés en C_8-C_{30} et préférentiellement en $C_{12}-C_{22}$,


R_2, R_3, R_4 , identiques ou différents, représentent un groupement choisi parmi :

- un atome d'hydrogène,
- un groupement de formule (II) :

- 25 $-(C_nH_{2n}O)_p-R \quad (II)$

avec $n=2$ ou 3 ; p est un entier allant de 2 à 50 ; R représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en C_1-C_6 ,

- un groupement de formule (III) :



- 30 R' étant choisi parmi les groupements alkyle linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés en C_8-C_{30} et préférentiellement en $C_{12}-C_{22}$,

l'un au moins de R_2 , R_3 , R_4 étant un groupement de formule (II), le total des résidus oxyalkylénés, Σp , étant compris entre 5 et 200,

R_5 étant un groupement alkyle en C_1 - C_6 , linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé.

5 De préférence, on choisit :

- $R_5 = CH_3$,
- au moins deux groupements parmi R_2 , R_3 , R_4 , répondent à la formule (II),
- Σp est compris entre 15 et 150,
- $R = H$,

- 10 - R' est choisi parmi les groupements alkyle en C_{16} - C_{20} ,
- aucun des groupements R_2 , R_3 , R_4 , n'est l'atome d'hydrogène.

Avantageusement, les compositions selon l'invention comprennent, en poids par rapport au poids total de la composition, de 0,5 à 50% d'ester d'hydrate de carbone en C_5 - C_7 et

15 préférentiellement de 2 à 20%.

Les compositions selon l'invention comprennent au moins un polyol. Ce polyol peut éventuellement être oxyalkyléné. Avantageusement, le polyol comprend au moins deux fonctions hydroxyle libres. Ce polyol peut être choisi parmi l'éthylène glycol, le propylène

20 glycol, le 1,3-butylène glycol, le dipropylène glycol, la glycérine, les polyglycérines, comme la diglycérine, la triglycérine et la tétraglycérine, le glucose, le maltose, le maltitol, le saccharose, le fructose, le sorbitol, les sucres issus de la décomposition de l'amidon et leurs mélanges.

25 Le polyol représente avantageusement de 0,5 à 60% en poids par rapport au poids total de la composition, de préférence de 2 à 40% et encore plus préférentiellement de 5 à 30%.

30 La nature de la phase grasse rentrant dans la composition des émulsions selon l'invention n'est pas critique; elle peut ainsi être constituée par tous les composés qui sont déjà connus de façon générale comme convenant pour la fabrication d'émulsions de type huile-dans-eau. En particulier, ces composés peuvent être choisis, seuls ou en mélanges, parmi les différents corps gras, les huiles d'origine végétale, animale ou minérale, les

35 cires naturelles ou synthétiques, et analogues.

On peut citer parmi les huiles utilisables dans la présente invention les huiles d'origine végétale ou animale, comme par exemple le squalane, l'huile de coprah, l'huile de macadamia, l'huile de vison, l'huile de tortue, l'huile de soja, l'huile de pépins de raisin,

40 l'huile de sésame, l'huile de maïs, l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile de coton, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile de jojoba, l'huile d'arachide ; des huiles d'hydrocarbures telles que des huiles de paraffine, les isoparaffines, la vaseline ; des huiles de silicone comme les polydiméthylsiloxanes, les cyclopolydiméthylsiloxanes,

les polyméthylphénylsiloxanes, des polysiloxanes modifiés par des acides gras, des polysiloxanes modifiés par des alcools gras, des polysiloxanes modifiés par des polyoxyalkylènes, des silicones fluorées ; des huiles perfluorées et/ou organofluorées ; des acides gras supérieurs tels que l'acide myristique, l'acide palmitique, l'acide stéarique, l'acide béhénique, l'acide oléique, l'acide linoléique, l'acide linolénique, l'acide isostéarique, des alcools gras supérieurs tels que le céтанол, l'alcool stéarylique, l'alcool oléique ; des mono et des di-esters parmi lesquels on peut citer en particulier le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, le stéarate de butyle, le laurate d'hexyle, l'isononanoate d'isononyl, le palmitate de 2-éthyl hexyle, le laurate de 2-hexyl décyle, le palmitate de 2-octyl décyle, le myristate de 2-octyl dodécyle, le succinate de 2-diéthylhexyle, le malate de diisostéaryle, le lactate de 2-octyl dodécyle, le triisostéarate de glycérine, le triisostéarate de glycérine, l'adipate de di-n-butyle, l'adipate de di-(2-éthyl hexyle), le dioléate d'éthylène glycol, le di-isotridécanoate d'éthylène glycol, le di-isostéarate d'éthylène glycol, le di-caprylate de néopentylglycol.

De préférence on utilise une huile ou un mélange d'huiles ayant un indice de réfraction $^{20}n_D \leq 1,45$.

La phase grasse peut représenter de 1 à 95% en poids du poids total de la composition, de préférence de 20 à 85% et encore plus préférentiellement de 40 à 80%.

L'eau représente de préférence de 0,01 à 30% en poids par rapport au poids total de la composition. Avantageusement l'eau représente de 2 à 20% en poids par rapport au poids total de la composition.

Habituellement on entend par eau de l'eau pure. Toutefois, une partie de l'eau utilisée dans les compositions selon l'invention peut éventuellement être choisie parmi les eaux minérales ou thermales. En général, une eau minérale est propre à la consommation, ce qui n'est pas toujours le cas d'une eau thermale. Chacune de ces eaux contient, entre autre, des minéraux solubilisés et des oligo-éléments. Ces eaux sont connues pour être employées à des fins de traitement spécifique selon les oligo-éléments et les minéraux particuliers qu'elles contiennent, tels que l'hydratation et la désensibilisation de la peau ou le traitement de certaines dermatoses. Par eaux minérales ou thermales, on désignera non seulement les eaux minérales ou thermales naturelles, mais également des eaux minérales ou thermales naturelles enrichies en constituants minéraux et/ou en oligo-éléments supplémentaires, ainsi que des solutions aqueuses minérales et/ou oligo-élémentaires préparées à partir d'eau purifiée (deminéralisée ou distillée).

Une eau thermale ou minérale naturelle utilisée selon l'invention peut, par exemple être choisie parmi l'eau de Vittel, les eaux du bassin de Vichy, l'eau d'Uriage, l'eau de la Roche Posay, l'eau de la Bourboule, l'eau d'Enghien-les-Bains, l'eau de Saint Gervais-les-Bains, l'eau de Nérès-les-Bains, l'eau d'Allevard-les-Bains, l'eau de Digne, l'eau de Maizières, l'eau de Neyrac-les-Bains, l'eau de Lons-le-Saunier, les Eaux Bonnes, l'eau de

Rochefort, l'eau de Saint Christau, l'eau des Fumades et l'eau de Tercis-les-bains, l'eau d'Uriage-les-bains, l'eau d'Avenne.

5 Les compositions cosmétiques de l'invention peuvent, en outre, contenir des adjuvants hydrosolubles ou liposolubles habituels dans le domaine cosmétique tels que les conservateurs, les antioxydants, les parfums, les filtres, les matières colorantes, les nacres.

10 Les compositions selon l'invention comprennent en outre au moins un actif cosmétique et/ou dermatologique, choisi par exemple parmi les actifs anti-rides, anti-vieillesse, hydratant, dépigmentants, kératolytiques, amincissants, tenseurs, de traitement de l'acné, anti-séborrhéiques, anti-inflammatoires, auto-bronzants, anti-radicaux libres, raffermissants, les actifs traitant des maladies de peau comme les mycoses, les dermites, le psoriasis. Suivant sa nature, hydrophile ou lipophile, cet actif est présent dans la phase
15 aqueuse ou la phase grasse. De préférence ces actifs sont introduits dans le vecteur à raison de 0,1 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

Parmi les actifs utilisables dans la présente invention, on peut citer par exemple : l'acide ascorbique et ses esters, l'allantoïne, l'acide citrique, l'acide caféique, l'acide salicylique et
20 ses dérivés (par exemple acide n-octanoyl-5 ou décanoyl-5-salicylique), les α -hydroxyacides tels que l'acide lactique, l'acide méthyllactique, l'acide glucuronique, l'acide glycolique, l'acide pyruvique, l'acide 2-hydroxy-butanoïque, l'acide 2-hydroxypentanoïque, l'acide 2-hydroxyhexanoïque, l'acide 2-hydroxyheptanoïque, l'acide 2-hydroxyoctanoïque, l'acide 2-hydroxy-nonanoïque, l'acide 2-hydroxydécanoïque, l'acide 2-
25 hydroxyundécanoïque, l'acide 2-hydroxydodécanoïque, l'acide 2-hydroxytétradécanoïque, l'acide 2-hydroxyhexadécanoïque, l'acide 2-hydroxyoctadécanoïque, l'acide 2-hydroxy-tétraécosanoïque, l'acide 2-hydroxyeïcosanoïque, l'acide mandélique, l'acide benzoïque, l'acide phényllactique, l'acide gluconique, l'acide galacturonique, l'acide aleuritique, l'acide ribonique, l'acide tartronique, l'acide tartrique, l'acide malique, l'acide fumarique, l'acide
30 rétinol et ses dérivés, l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène 10-camphosulfonique), la di-hydroxy acétone (DHA), l'allantoïne, les sucres et les dérivés de sucre, les vitamines hydrosolubles, l'amidon, les extraits bactériens ou végétaux, notamment d'Aloe Vera, le tocophérol (vitamine E) et ses dérivés, les acides gras essentiels, les céramides, les huiles essentielles. On peut aussi, utiliser tous les composés naturels ou synthétiques
35 contenant de tels acides, comme les extraits végétaux et plus spécialement les extraits de fruits. On peut utiliser les protéines végétales et leurs hydrolysats. On peut aussi solubiliser les dérivés xanthiques (caféine, théophylline), l'acide β -glycyrhétinique, l'acide asiatique, l'octopirox ou encore le rétinol et ses esters, les dérivés naturels de la famille des flavonoïdes. On peut encore utiliser dans la présente invention les agents modulant
40 la différenciation et/ou la prolifération et/ou la pigmentation cutanée tels que la vitamine D et ses dérivés, les oestrogènes tels que l'oestradiol, l'acide kojique ou l'hydroquinone ; les agents anti-radicaux libres, tels que l'alpha-tocophérol ou ses esters, les superoxyde dismutases, certains chélatants de métaux ; des antagonistes de substance P et/ou de

CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide ou peptide lié au gène de la calcitonine) tels que l'Iris Pallida et les sels de strontium, notamment les chlorures et les nitrates de strontium, ou des antagonistes de substance P et/ou de CGRP tels que ceux décrits dans les demandes de brevet français FR-A-2719474 et FR-A-2729855.

5

Préférentiellement les actifs sont choisis parmi : l'acide ascorbique et ses esters, l'acide kojique, l'acide citrique, l'acide caféique, l'acide salicylique, l'acide lactique, l'acide glycolique, l'acide malique, la di-hydroxy acétone, l'alpha-tocophérol et ses esters.

- 10 Les compositions selon l'invention peuvent en outre contenir des charges insolubles : poudre de polyéthylène, particules de polyamide comme par exemple celles vendues sous la dénomination "ORGASOL" par la Société ATOCHEM également connues sous les noms (CTFA) de "*polyamide 12*" ou "*polyamide 6*". On peut également utiliser dans ces compositions du kaolin, des poudres de Nylon répertoriées sous le nom CTFA de
- 15 "*Nylon 12*" ou "*Nylon 6*". De telles compositions sont intéressantes dans le nettoyage de peau pour leurs propriétés exfoliantes.

- Les compositions selon l'invention ont la propriété de potentialiser les actifs qu'elles comprennent de telle sorte que ceux-ci ont la même efficacité dans les compositions selon l'invention après un très court temps d'application puis un rinçage, que dans une composition de soin qui est appliquée pendant plusieurs heures. Elle présentent l'avantage de proposer un meilleur confort que les compositions de soin non rincées. Le mode d'application permet d'obtenir un traitement non-thérapeutique de la peau plus uniforme par rapport aux compositions non rincées. Ce résultat est particulièrement
- 20 avantageux dans le cas des traitements auto-bronzants, les compositions non-rincées présentant souvent le défaut de produire un bronzage irrégulier en raison d'une application non-uniforme, difficile à contrôler.

- Les vecteurs selon l'invention ont l'apparence d'un gel, transparent, stable. En fonction des propriétés des actifs, en particulier leur facilité à être solubilisés dans le vecteur, on peut obtenir une composition de soin transparente, mais on peut aussi obtenir une composition de soin non transparente, en raison de l'insolubilité des actifs dans le vecteur ou parce qu'on lui a incorporé des composés qui lui retirent sa transparence, comme par exemple des agents nacrants ou des charges. En outre ces compositions ont une très
- 30 bonne rinçabilité. En particulier, les esters gras d'hydrates de carbone en C₅ à C₇ confèrent à ces compositions une rinçabilité améliorée par rapport aux compositions à base d'esters de saccharose et celles à base d'esters de sorbitol.

- 40 L'invention a également pour objet l'utilisation d'une composition ayant l'aspect d'un gel transparent stable comprenant :

- (i) une phase grasse,
- (ii) au moins esters gras d'hydrate de carbone en C₅-C₇,

(iii) au moins un polyol,
comme vecteur d'actif cosmétique.

5 Les compositions selon l'invention peuvent se présenter par exemple sous la forme d'un produit nettoyant et/ou démaquillant, d'un masque, d'un produit de gommage, d'un exfoliant.

ESSAIS COMPARATIFS

10

Un test cosmétique a été réalisé pour illustrer l'intérêt en termes d'efficacité et de confort des vecteurs selon l'invention avec comme actif, un mélange d'alpha-hydroxy-acides (acides lactique, glycolique, citrique, malique, tartrique). Un panel de 11 personnes a comparé une composition selon l'invention à un lait de nettoyage/démaquillage classique.

15 Les deux formules contiennent le même taux d'actifs, introduits, selon un mode opératoire identique, dans le compartiment aqueux des compositions.

Pour chaque composition, les pourcentages sont donnés en poids de matière active par rapport au poids total de la composition.

20

Composition 1 (selon l'invention) :

A)Phase aqueuse		
25	- Sesqui-stéarate de méthyl-glucose oxyéthyléné (20 OE)	4,5 %
	commercialisé sous la marque Glucamate SSE 20	
	- Glycérol	10 %
	- Mélange d'acides de fruits (acides glycolique, lactique, malique, tartrique)	1 %
30	- Eau	8 %
	- Conservateurs	qs
B) Phase huileuse		
35	- Cyclométhicone	18 %
	- Myristate d'isopropyle	12 %
	- Isoparaffine	30 %
	- Isobutylène	16 %
C) Parfum		0,5 %

40 Mode opératoire : le dérivé de glucose est dissout dans l'eau et les polyols sous agitation entre 25°C et 35°C jusqu'à l'obtention d'une pâte visqueuse homogène. La phase huileuse et le parfum sont alors introduits lentement sous forte agitation. Le produit est ensuite lissé à la pâte et débullé sous vide.

Composition 2 (selon l'art antérieur) :

A) Phase aqueuse		
5	- Sesqui-stéarate de méthyl-glucose oxyéthyléné (20 OE) commercialisé sous la marque Glucamate SSE 20	2 %
	- Sesqui-stéarate de méthyl-glucose commercialisé sous la marque Glucate SS	2 %
	- Glycérol	4 %
10	- Mélange d'acides de fruits (acides glycolique, lactique, malique, tartrique)	1 %
	- conservateurs	0,4 %
	- Eau	qsp 100
B) Phase huileuse		
15	- Alcool stéarylique	1,3 %
	- Cyclométhicone	8 %
	- Huile de sésame	5 %
	- Carbomer	0,3 %
20	- Isobutylène	3 %
	C) Parfum	0,2 %

On prépare un lait démaquillant sous la forme d'une émulsion huile-dans-eau à partir de l'ensemble des composants ci-dessus.

Les 11 personnes ont appliqué les 2 produits en hémi-visage, afin de bien comparer les effets, chaque personne a effectué un temps de pose de 10 minutes avant de rincer le produit et de se sécher le visage.

Les utilisateurs ont été interrogés au sujet des inconforts ressentis pendant et après l'application, et sur les effets des deux compositions après application. Le résultat est le suivant :

- Inconforts: nombre d'utilisateurs s'étant plaints de rougeurs, picotements, échauffements, sécheresse de la peau, démangeaisons et brûlures :
- avant rinçage
 - . 7/11 personnes pour la formule de lait classique (composition 2),
 - . 3/11 personnes avec la composition de l'invention (composition 1).
 - après rinçage :
 - . 10/11 personnes pour la formule de lait classique (composition 2),
 - . 2 /11 personnes avec la composition selon l'invention (composition 1).

- Efficacité :

Peau plus uniforme :

5 réponse :

oui :

- . 2/11 personnes pour la formule de lait classique (composition 2),
- . 7/11 personnes avec la composition de l'invention (composition 1),

non :

- 10 . 6/11 personnes pour la formule de lait classique (composition 2),
 . 2/11 personnes avec la composition de l'invention (composition 1).

Peau plus claire :

15 réponse :

oui :

- . 3/11 personnes pour la formule de lait classique (composition 2),
- . 4/11 personnes avec la composition de l'invention (composition 1),

non :

- 20 . 5/11 personnes pour la formule de lait classique (composition 2),
 . 3/11 personnes avec la composition de l'invention (composition 1).

Peau plus douce :

réponse :

25 oui :

- . 2/11 personnes pour la formule de lait classique (composition 2),
- . 8/11 personnes avec la composition de l'invention (composition 1),

30 Ces essais comparatifs soulignent la supériorité des compositions selon l'invention par rapport aux compositions rinçables de l'art antérieur, à la fois en termes d'innocuité et d'efficacité.

35 **EXEMPLES DE COMPOSITIONS**

Pour chaque composition, les pourcentages sont donnés en poids de matière active par rapport au poids total de la composition.

40 La viscosité est mesurée à 25°C à l'aide d'un viscosimètre Rhéomat 180, les mesures de viscosité sont données en Pascal seconde (Pa.s).

Exemple 1

A)Phase aqueuse		
	- Di-oléate de méthylglucose oxyéthyléné (120 OE)	3 %
5	- Sesqui-stéarate de méthyl-glucose oxyéthyléné (20 OE)	1 %
	- Glycérol	15 %
	- Acide glycolique	2 %
	- Eau	4 %
B) Phase huileuse		
10	- Huile de vaseline	10 %
	- Palmitate d'éthyl-2-hexyle	23,5 %
	- Isoparaffine hydrogénée	9 %
	- Cyclopentadiméthylsiloxane	14 %
15	- Tetraméthyl hexane-heptane-octane	18,5 %
	- Parfum	qs

Mode opératoire : le dérivé de glucose est dissout dans l'eau et les polyols sous agitation entre 25°C et 35°C jusqu'à l'obtention d'une pâte visqueuse homogène. La phase

20 huileuse est alors introduite lentement sous forte agitation. Le produit est ensuite lissé à la pâle et débullé sous vide.

Cette composition a un aspect gélifié transparent, cristallin, très attrayant d'un point de vue visuel. Elle a une viscosité Rhéomat de 9 Pa.s.

L'étalement des produits sur la peau est facile, la rinçabilité est excellente.

25 La peau après rinçage est nette, d'un toucher soyeux, non gras.

Exemple 2


A)Phase aqueuse :		
30	- Di-oléate de méthylglucose oxyéthyléné (120 OE)	6 %
	- Sesqui-stéarate de méthyl-glucose oxyéthyléné (20 OE)	2 %
	- Glycérol	11 %
	- PEG-20	6 %
	- Dihydroxyacétone	10 %
35	- Eau	5 %
B)Phase grasse :		
	- Huile de vaseline	12 %
	- Isoparaffine hydrogénée	26 %
40	- Cyclomethicone	22 %

Cette composition a un aspect gélifié transparent, cristallin, très attrayant d'un point de vue visuel. Elle a une viscosité Rhéomat de 9 Pa.s.

Après un temps de pose de 10 min suivi d'un rinçage, on observe un hâle uniforme et sans taches. Une répétition quotidienne de ce traitement cosmétique permet de faire évoluer ce hâle de façon régulière en lui conférant l'aspect d'un bronzage naturel.


REVENDICATIONS

- 1- Composition cosmétique et/ou dermatologique comprenant au moins un actif
5 cosmétique et/ou dermatologique caractérisée en ce que cet actif est dissous ou dispersé dans un vecteur ayant l'aspect d'un gel transparent comprenant :
- (i) une phase grasse,
 - (ii) au moins un ester gras d'hydrate de carbone en C_5-C_7 ,
 - (iii) au moins un polyol.
- 10 2- Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre de l'eau.
- 15 3- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'hydrate de carbone en C_5-C_7 est choisi parmi les pentoses, hexoses et heptoses et leurs dérivés alkyl-oloside dont le groupement alkyle contient de 1 à 6 atomes de carbone.
- 20 4- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'hydrate de carbone est le méthyl-1-glucoside.
- 25 5- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'ester gras d'hydrate de carbone en C_5-C_7 est un composé obtenu par réaction d'un acide gras à chaîne saturée ou insaturée ayant de 8 à 30 atomes de carbone et de préférence 12 à 22 atomes de carbone avec l'hydrate de carbone.
- 30 6- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'ester gras d'hydrate de carbone en C_5-C_7 est oxyalkyléné.
- 35 7- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'ester d'hydrate de carbone en C_5-C_7 est éthérifié par un ou plusieurs fragments oxyéthylène ou oxypropylène, l'ensemble des substituants oxyéthylène ou oxypropylène représentant de 5 à 200 unités oxyde d'alkylène.
- 8- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'ester gras d'hydrate de carbone est choisi parmi les composés répondant à la formule (I) :



(I)

dans laquelle

 R_1 est un groupement de formule (III) :

- 5 R' étant choisi parmi les groupements alkyle linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés en $\text{C}_8\text{-C}_{30}$ et préférentiellement en $\text{C}_{12}\text{-C}_{22}$,


 $\text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4$, identiques ou différents, représentent un groupement choisi parmi :

- un atome d'hydrogène,
- un groupement de formule (II) :

- 10 $-(\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O})_p\text{-R} \quad (\text{II})$

avec $n=2$ ou 3 ; p est un entier allant de 2 à 50 ; R représente un atome d'hydrogène ou un groupement alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_6$,

- un groupement de formule (III) :



- 15 R' étant choisi parmi les groupements alkyle linéaires ou ramifiés, saturés ou insaturés en $\text{C}_8\text{-C}_{30}$ et préférentiellement en $\text{C}_{12}\text{-C}_{22}$,

l'un au moins de $\text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4$ étant un groupement de formule (II), le total des résidus oxyalkylénés, Σp , étant compris entre 5 et 200, R_5 étant un groupement alkyle en $\text{C}_1\text{-C}_6$, linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé.

20

9- Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que

- $\text{R}_5 = \text{CH}_3$,
- au moins deux groupements parmi $\text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4$, répondent à la formule (II),
- Σp est compris entre 15 et 150,

25

- $\text{R} = \text{H}$,
- au moins un groupement parmi $\text{R}_1, \text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4$, répond à la formule (III),
- R' est choisi parmi les groupements alkyle en $\text{C}_{16}\text{-C}_{20}$,
- aucun des groupements $\text{R}_2, \text{R}_3, \text{R}_4$, n'est l'atome d'hydrogène.

- 30 10- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend, en poids par rapport au poids total de la composition, de 0,5 à 50% d'ester d'hydrate de carbone en $\text{C}_5\text{-C}_7$ et préférentiellement de 2 à 20%.

- 11- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le polyol est choisi parmi l'éthylène glycol, le propylène glycol, le 1,3-butylène glycol, le dipropylène glycol, la glycérine, la diglycérine, la triglycérine et la tétraglycérine, le glucose, le maltose, le maltitol, le saccharose, le fructose, le sorbitol, les sucres issus de la décomposition de l'amidon et leurs mélanges.
- 12- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend de 0,5 à 60% en poids par rapport au poids total de la composition, de préférence de 2 à 40% et encore plus préférentiellement de 5 à 30%, de polyol.
- 13- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la phase grasse comprend une huile ou un mélange d'huiles ayant un indice de réfraction $^{20}n_D \leq 1,45$.
- 14- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la phase grasse représente de 1 à 95% en poids du poids total de la composition, de préférence de 20 à 85%.
- 15- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'eau représente de 0,01 à 30%, avantageusement de 2 à 20% en poids par rapport au poids total de la composition.
- 16- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'eau est choisie parmi l'eau de Vittel, les eaux du bassin de Vichy, l'eau d'Uriage, l'eau de la Roche Posay, l'eau de la Bourboule, l'eau d'Enghien-les-Bains, l'eau de Saint Gervais-les-Bains, l'eau de Nérès-les-Bains, l'eau d'Allevard-les-Bains, l'eau de Digne, l'eau de Maizières, l'eau de Neyrac-les-Bains, l'eau de Lons-le-Saunier, les Eaux Bonnes, l'eau de Rochefort, l'eau de Saint Christau, l'eau des Fumades et l'eau de Tercis-les-bains, l'eau d'Uriage-les-bains, l'eau d'Avenne.
- 17- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'actif cosmétique et/ou dermatologique est choisi parmi les actifs dépigmentants, kératolytiques, amincissants, tenseurs, de traitement de l'acné, anti-séborrhéiques, anti-inflammatoires, auto-bronzants, anti-radicaux libres, raffermissants, les actifs traitant des maladies de peau comme les mycoses, les dermites, le psoriasis.
- 18- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'actif cosmétique et/ou dermatologique représente de 0,1 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition.
- 19- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'actif cosmétique et/ou dermatologique est choisi parmi : l'acide ascorbique et ses

esters, l'acide kojique, l'acide citrique, l'acide caféique, l'acide salicylique, l'acide lactique, l'acide glycolique, l'acide malique, la di-hydroxy acétone, l'alpha-tocophérol et ses esters.

- 20- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle est sous la forme d'un produit nettoyant et/ou démaquillant, d'un masque, d'un produit de gommage, d'un exfoliant.

- 21- Utilisation d'une composition ayant l'aspect d'un gel transparent stable comprenant :
- (i) une phase grasse,
 - (ii) au moins un ester gras d'hydrate de carbone en C_5-C_7 ,
 - (iii) au moins un polyol,
- comme vecteur d'actif cosmétique.

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la rechercheFA 534632
FR 9613404

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 93, no. 18, 3 Novembre 1980 Columbus, Ohio, US; abstract no. 173598z, page 345; colonne 1; XP002029045 * abrégé * & COSMET.TOILETRIES, vol. 95, no. 3, 1980, pages 85-86, ---	1-21
A	US 4 687 843 A (MARTIN SMOLIN ET AL) * le document en entier * ---	1-21
A	US 4 268 498 A (HARVEY GEDEON ET AL) * le document en entier * ---	1-21
A	WO 94 17830 A (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) * page 14 - page 16; revendications * ---	1-21
A	FR 2 237 615 A (SHISEIDO CO., LTD) * page 12; revendications * ---	1-21
A	US 4 482 537 A (EL-SAYED EL- MENSRAWY ET AL) * le document en entier * ---	1-21
A	WO 93 08840 A (ISP VAN DYK INC.) * page 12 - page 14; revendications * ---	1-21
A	EP 0 588 379 A (THORNFELDT, CARL RICHARD) * page 1 - page 3 * ---	1-21
A	EP 0 274 812 A (KABUSHIKI KAISHA HAYASHIBARA SEIBUTSU KAGAKU KENKYUJO) * le document en entier * ---	1-21
-/-		
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
5 Août 1997		Luyten, H
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		

EPO FORM 1503 03.82 (P04C13)

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

PRELIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la rechercheFA 534632
FR 9613404

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	DE 41 39 935 A (KAO CORPORATION GMBH) * le document en entier * ---	1-21
A	WO 92 07543 A (HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN) * page 13 - page 14; revendications * -----	1-21
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
5 Août 1997		Luyten, H
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		

1

EPO FORM 1503 01.82 (P04C13)