



(22) Date de dépôt/Filing Date: 1994/06/09

(41) Mise à la disp. pub./Open to Public Insp.: 1994/12/11

(45) Date de délivrance/Issue Date: 2005/09/06

(30) Priorité/Priority: 1993/06/10 (93 07 004) FR


(51) Cl.Int.⁵/Int.Cl.⁵ A61K 7/48

(72) Inventeurs/Inventors:
PICARD, ELISABETH, FR;
LAMBERT, JACQUELINE, FR;
GRIAT, JACQUELINE, FR

(73) Propriétaire/Owner:
L'OREAL, FR

(74) Agent: ROBIC

(54) Titre : EMULSION COSMETIQUE OU DERMATOLOGIQUE HUILE-DANS-EAU CONTENANT UNE COMPOSITION AUTO-EMULSIONNABLE A BASE D'UN ALCOOL GRAS ET D'UN ALKYL POLYOSIDE ET UN CO-EMULSIONNANT
(54) Title: COSMETIC OR DERMATOLOGIC OIL-IN-WATER EMULSION CONTAINING A SELF-EMULSIFIABLE COMPOSITION A FATTY ALCOHOL, AN ALKYL POLYOSACCHARIDE AND A CO-EMULSIFIER



(57) Abrégé/Abstract:

Composition cosmétique ou dermatologique sous forme d'une émulsion huile-dans-eau stable, caractérisée par le fait qu'elle contient : (a) de 5 à 40 % en poids d'une phase huileuse pouvant contenir, en une proportion inférieure à 15 % en poids, au moins une huile végétale ayant plus de 40 % en poids de triglycérides d'acide linoléique, (b) de 0,5 à 5 % en poids d'une composition auto-émulsionnable comprenant de 60 à 90 % en poids d'au moins un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone, de 10 à 40 % en poids d'un alkylpolyoside dont la chaîne alkyle a de 12 à 22 atomes de carbone et de 0 à 5 % en poids de polyoside, (c) de 0,5 à 4 % en poids d'au moins un co-émulsionnant choisi parmi les alcools gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les acides gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les alkyléthers de glycérile dont la chaîne alkyle a de 14 à 22 atomes de carbone, les composés de formule : (voir formule I) dans laquelle: R' et R'', identiques ou différents, représentent un radical cholestéryle, béhényle ou 2-octyldodécyle, et les mélanges desdits co-émulsionnants sous réserve que lorsqu'un seul co-émulsionnant est présent, sa proportion en poids est égale ou inférieure à 2 %, le reste étant essentiellement constitué par une phase aqueuse. Cette composition peut se présenter sous forme de crème, de lait, de masque ou encore sous forme de fond de teint.

CA2117322

A B R E G E


"Emulsion cosmétique ou dermatologique huile-dans-eau contenant une composition auto-émulsionnable à base d'un alcool gras et d'un alkylpolyoside et un co-émulsionnant"

Composition cosmétique ou dermatologique sous forme d'une émulsion huile-dans-eau stable, caractérisée par le fait qu'elle contient :

(a) de 5 à 40 % en poids d'une phase huileuse pouvant contenir, en une proportion inférieure à 15 % en poids, au moins une huile végétale ayant plus de 40 % en poids de triglycérides d'acide linoléique,

(b) de 0,5 à 5 % en poids d'une composition auto-émulsionnable comprenant de 60 à 90 % en poids d'au moins un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone, de 10 à 40 % en poids d'un alkylpolyoside dont la chaîne alkyle a de 12 à 22 atomes de carbone et de 0 à 5 % en poids de polyoside,

(c) de 0,5 à 4 % en poids d'au moins un co-émulsionnant choisi parmi les alcools gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les acides gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les alkyléthers de glycéryle dont la chaîne alkyle a de 14 à 22 atomes de carbone, les composés de formule :



dans laquelle :

R' et R'', identiques ou différents, représentent un radical cholestéryle, béhényle ou 2-octyldodécyle, et les mélanges desdits co-émulsionnants sous réserve que lorsqu'un seul co-émulsionnant est présent, sa proportion en poids est égale ou inférieure à 2 %,

le reste étant essentiellement constitué par une phase aqueuse.

Cette composition peut se présenter sous forme de crème, de lait, de masque ou encore sous forme de fond de teint.

Emulsion cosmétique ou dermatologique huile-dans-eau contenant une composition auto-émulsionnable à base d'un alcool gras et d'un alkylpolyoside et un co-émulsionnant

5 La présente invention a pour objet une composition sous forme d'une émulsion huile-dans-eau (H/E) stable, fine et homogène, essentiellement constituée d'une phase huileuse pouvant contenir en une proportion inférieure à 15 % en poids au moins une huile à teneur élevée en triglycérides d'acide linoléique, d'une composition auto-émulsionnable et d'un co-émulsionnant, et son utilisation dans différentes applications cosmétiques ou dermatologiques.

10 On sait que les émulsions utilisées dans les domaines cosmétique et dermatologique comprennent généralement, pour faciliter leur émulsification, des tensioactifs de nature non-ionique, de type hydrophile, obtenus par greffage d'une chaîne polyoxyéthylée. En vue d'éviter l'emploi de tels tensioactifs plus ou moins irritants en raison d'éventuelles impuretés dues à leurs procédés de préparation, il a été proposé dans la demande WO 92/06778,
15 l'utilisation d'une composition auto-émulsionnable à base d'alcools gras et d'alkylpolyoside.

Toutefois, les émulsions obtenues par l'utilisation d'une telle composition auto-émulsionnable ne sont pas totalement satisfaisantes.

En effet, elles manquent de finesse et d'homogénéité et sont notamment épaisses. En outre, elles pénètrent difficilement par application sur la peau, ce qui les rend cosmétiquement
20 peu acceptables.

Il a maintenant été constaté de façon surprenante et inattendue qu'en associant à la composition auto-émulsionnable selon WO 92/06778, un co-émulsionnant résultant d'une sélection bien particulière, il était possible de résoudre les inconvénients précités.

Les émulsions (H/E) selon l'invention sont en effet très stables, légères et
25 homogènes ce qui correspond aux critères recherchés en cosmétique et en dermatologie notamment lorsque les émulsions sont destinées aux soins du visage ou du corps.

La présente invention a donc pour objet une composition cosmétique ou dermatologique sous forme d'une émulsion huile-dans-eau contenant :


(a) de 5 à 40 % en poids d'une phase huileuse pouvant contenir, en une proportion
30 inférieure à 15 % en poids, au moins une huile végétale ayant plus de 40 % en poids de triglycérides d'acide linoléique.

(b) de 0,5 à 5 % en poids d'une composition ou association auto-émulsionnable comprenant de 60 à 90 % en poids d'au moins un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone, de 10 à 40 % en poids d'un alkylpolyoside dont la chaîne alkyle a de 12 à 22 atomes
35 de carbone et de 0 à 5 % en poids de polyoside,

(c) de 0,5 à 4 % en poids d'au moins un co-émulsionnant choisi parmi les alcools

2

gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les acides gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les alkyléthers de glycéryle dont la chaîne alkyle a de 14 à 22 atomes de carbone et les composés de formule :



dans laquelle :

R' et R'', identiques ou différents, représentent un radical cholestéryle, béhényle ou 2-octyldodécyle, et les mélanges desdits co-émulsionnants sous réserve que lorsqu'un seul co-émulsionnant est présent, sa proportion en poids est égale ou inférieure à 2 %, le reste étant essentiellement constitué par une phase aqueuse.

10


L'objet de la présente invention telle que revendiquée est de fournir une composition cosmétique ou dermatologique sous forme d'une émulsion huile-dans-eau stable, caractérisée par le fait qu'elle contient:

(a) de 5 à 40% en poids par rapport au poids total de la composition d'une phase huileuse,

(b) de 0,5 à 5% en poids par rapport au poids total de la composition d'une composition auto-émulsionnable comprenant de 60 à 90% en poids d'au moins un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone, de 10 à 40% en poids d'un alkylpolyoside dont la chaîne alkyle a de 12 à 22 atomes de carbone et de 0 à 5% en poids de polyoside, l'alcool gras, l'alkylpolyoside et le polyoside sont exprimés en pourcentage en poids par rapport au poids de la composition auto-émulsionnable,

20

(c) de 0,5 à 4% en poids par rapport au poids total de la composition d'au moins un co-émulsionnant choisi parmi les acides gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les mélanges desdits acides gras et d'alcools gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les alkyléthers de glycéryle dont la chaîne alkyle a de 14 à 22 atomes de carbone, les composés de formule:



30

2a

dans laquelle:

R' et R'', identiques ou différents, représentent un radical cholestéryle, béhényle ou 2-octyldodécyle, sous réserve que lorsqu'un seul co-émulsionnant est présent, sa proportion en poids est égale ou inférieure à 2%, et

(d) une phase aqueuse.

Selon un mode de réalisation préféré, le rapport pondéral entre la phase huileuse et l'alkylpolyoside de l'association auto-émulsionnable est égal ou supérieur à environ 15.

Parmi les huiles de la phase huileuse on peut citer :

- 10 - les huiles minérales telles que l'huile de paraffine, l'huile de Vaseline* et les huiles minérales ayant un point d'ébullition compris entre 300 et 400°C ;
- les huiles d'origine animale telles que le perhydrosqualène ;
- les huiles d'origine végétale constituées de moins de 40 % en poids de triglycérides d'acide linoléique telles que l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile d'arachide, l'huile de colza, l'huile de coprah, l'huile de noisette, le beurre de karité, l'huile de palme, l'huile de noyau d'abricot et l'huile de calophyllum ;
- les huiles synthétiques telles que l'huile de purcellin, le myristate de butyle, le myristate d'isopropyle, le myristate de cétyle, le palmitate d'isopropyle, le stéarate de butyle, le stéarate d'hexadécyle, le stéarate d'isopropyle, le stéarate d'octyle, le stéarate d'isocétyle, l'oléate de décyle, le laurate d'hexyle, le dicaprylate de propylène glycol et les esters dérivés
- 20 d'acide lanolique tels que le lanolate d'isopropyle, le lanolate d'isocétyle et les isoparaffines.

Parmi les huiles utilisables selon l'invention, on peut également citer : les acétylglycérides, les octanoates et décanoates d'alcools et de polyalcools tels que ceux de glycol et de glycérol, les ricinoléates d'alcools et de polyalcools tels que ceux de cétyle, les triglycérides d'acides gras tels que les triglycérides caprylique/caprique, les triglycérides d'acides gras saturés en C₁₀-C₁₈, les huiles de silicone volatiles ou non, et les huiles fluorées et perfluorées.

Parmi les huiles végétales ayant plus de 40 % en poids de triglycérides d'acide linoléique, on peut citer : l'huile de germes de maïs, l'huile de germes de blé, l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de sésame, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'onagre, l'huile de carthame, l'huile de passiflore et l'huile de seigle.

30

* (marque de commerce)

Parmi les associations ou compositions auto-émulsionnables décrites dans WO 92/06778, on peut notamment citer le produit commercialisé sous la dénomination de "Montanov 68^{*}" par la Société Seppic qui est essentiellement constitué par l'association d'environ 77 % d'alcool cétylstéarylique (C₁₆-C₁₈) et d'environ 23 % de cétéarylglucosides.

5 Selon un mode de réalisation particulier de l'invention, le radical alkyle de l'alkylpolyoside est identique à celui de l'alcool gras de la composition auto-émulsionnable.

Selon un mode de réalisation préféré des compositions selon l'invention, le rapport pondéral entre la phase huileuse et la composition auto-émulsionnable est compris entre 6 et 30.

10 Parmi les co-émulsionnants utilisables dans les compositions selon l'invention, on peut citer parmi les alcools gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, l'alcool stéarylique et l'alcool cétylique et leurs mélanges, parmi les acides gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, l'acide stéarique, et parmi les alkyléthers de glycéryle ayant une chaîne alkyle ayant de 14 à 22 atomes de carbone, l'alcool chimylique et l'alcool batylique.

15 Parmi les composés de formule (I) utilisables comme co-émulsionnants, on peut citer le produit commercialisé sous la dénomination de "ELDEW CL-301^{*}" par la Société Ajinomoto.

20 Comme co-émulsionnant appartenant au groupe des acides gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, on peut utiliser selon l'invention un produit d'origine naturelle à savoir la cire de sumac qui contient environ 40 % d'acides gras en C₁₆ et 50 % d'acides gras en C₁₈.

Les compositions selon l'invention peuvent contenir en outre divers adjuvants. Parmi les adjuvants de la phase grasse, on peut citer notamment des colorants, des principes actifs lipophiles, des filtres solaires, des antioxydants et des conservateurs.

25 Parmi les adjuvants de la phase aqueuse, on peut citer notamment des dérivés hydrosolubles tels que des colorants et des conservateurs, des principes actifs tels que l'hyaluronate de sodium et le gluconate de magnésium, des oligo-éléments, des dérivés biologiques tels que l'urée, l'acide lactique, l'acide pyrrolidone carboxylique et ses sels notamment son sel de sodium, des polyols tels que le propylène glycol, le butylène 1-3 glycol, le glycérol, le polyglycérol, le sorbitol, le glucose et le saccharose, des sels tels que le sulfate
30 de magnésium et le chlorure de sodium, des minéraux argileux gonflant en milieu aqueux tels que la saponite, l'héctorite et la smectite, des acides aminés, des agents gélifiants aqueux comme des polysaccharides tels que les dérivés celluloses (carboxyméthylcellulose, hydroxypropylméthylcellulose, ...), des gommes telles que la gomme de xanthane et la gomme de caroube, des protéines telles que les kératines sulfoniques, le collagène et l'élastine, des
35 silicates tels que le silicate d'aluminium et le silicate de magnésium, des dérivés acryliques tels que les Carbomers, les polyacrylates ou polyméthacrylates de glycéryle et les

*** (marques de commerce)**

polyacrylamides.

Les compositions selon l'invention peuvent également contenir divers ingrédients cosmétiques tels que des huiles essentielles, des parfums, des pigments, des charges, des vitamines et des céramides.

5 Les compositions selon l'invention sous forme d'émulsions (H/E) peuvent être utilisées dans différentes applications cosmétiques ou dermatologiques, par exemple sous forme de crèmes pour le visage, pour le corps, pour le cuir chevelu ou pour la chevelure, ou sous forme de laits pour le corps ou pour le démaquillage.

10 Ces compositions peuvent être également utilisées pour le maquillage, notamment sous forme de fonds de teint, après addition de pigments. Elles peuvent être utilisées également comme crèmes solaires après addition de filtres UV-B et/ou UV-A ou comme crèmes ou laits après-solaires après addition de composés apaisants tels que le panthénol.

15 Les émulsions (H/E) selon l'invention sont obtenues selon les méthodes classiques par mélange à chaud, à une température d'environ 70°C, de la phase grasse comprenant la phase huileuse et les émulsionnants et autres additifs à la phase aqueuse sous forte agitation, puis addition de la quantité d'eau complémentaire et refroidissement.

On va maintenant donner à titre d'illustration plusieurs exemples de compositions selon l'invention sous forme d'émulsions huile-dans-eau.

20 EXEMPLES DE COMPOSITIONS

EXEMPLE 1 : Crème de soin

	- Huile de sésame	10 %
	- Polyisobutène hydrogéné	15 %
25	- Composition auto-émulsionnable commercialisée sous la dénomination de "Montanov 68 [®] " par la Société Seppic	3 %
	- Alcool stéarylique	2 %
	- Acide stéarique	1 %
30	- Conservateurs	0,2 %
	- Parfum	0,1 %
	- Hydroxyde de sodium	0,012 %
	- Glycérine	3 %
	- Eau q.s.p.	100 %

35 La crème obtenue est stable, fine et homogène. Elle est douce et pénètre bien.

* (marque de commerce)

EXEMPLE 2 : Crème de soin pour peau grasse

	- Cyclométhicone	10 %
5	- Composition auto-émulsionnable commercialisée sous la dénomination de "Montanov 68 ^{**} " par la Société Seppic	1,5 %
	- Alcool stéarylique	1 %
	- Acide stéarique	0,5 %
10	- Conservateurs	0,2 %
	- Hydroxyde de sodium	0,006 %
	- Gomme de xanthane	0,2 %
	- Propylène glycol	3 %
	- Eau q.s.p.	100 %

15

La crème obtenue est légère, douce, fraîche à l'application et pénètre bien sans effet gras sur la peau.

EXEMPLE 3 : Fluide anti-âge

20	- Huile de noyau d'abricot	25 %
	- Composition auto-émulsionnable commercialisée sous la dénomination de "Montanov 68 ^{**} " par la Société Seppic	3 %
25	- Co-émulsionnant commercialisé sous la dénomination de "ELDEW CL-301 ^{**} " par la Société Ajinomoto	2 %
	- Méthoxycinnamate d'octyle	1 %
	- Mélange de dioxyde de titane et de stéarate d'aluminium commercialisé sous la dénomination de "Micro-titanium dioxide-MT ^{**} 100T" par la Société Tayca	1 %
30	- Conservateurs	0,2 %
	- Miel	1 %
	- Protéine de soja hydrolysée	0,1 %
	- Glycérine	3 %
35	- Eau q.s.p.	100 %

*** (marques de commerce)**

6

La crème obtenue est fluide, très douce et pénètre bien. Elle a un bon effet protecteur.

EXEMPLE 4 : Crème de soin

5	- Cyclométhicone	10 %
	- Mélange constitué de polyacrylamide-isoparaffine en C ₁₃ -C ₁₄ -Laureth 7	0,8 %
10	- Composition auto-émulsionnable commercialisée sous la dénomination de "Montanov 68 ^{***} " par la Société Seppic	2 %
	- Alcool stéarylique	1 %
	- Acide stéarique	0,5 %
	- Conservateurs	0,65 %
15	- Lysine	0,025 %
	- Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétra-acétique	0,05 %
	- Gomme de xanthane	0,2 %
	- Glycérine	3 %
20	- Eau q.s.p.	100 %

La crème obtenue est fine, douce et pénètre bien.

EXEMPLE 5 : Crème de soin

25	- Cyclométhicone	10 %
	- Mélange constitué de polyacrylamide-isoparaffine en C ₁₃ -C ₁₄ -Laureth 7	0,8 %
	- Perfluoropolyméthylisopropyléther	0,5 %
30	- Composition auto-émulsionnable commercialisée sous la dénomination de "Montanov 68 ^{***} " par la Société Seppic	2 %
	- Alcool stéarylique	1 %
	- Acide stéarique	0,5 %
35	- Conservateurs	0,65 %
	- Lysine	0,025 %

*** (marques de commerce)**

- 7 -

5	- Sel disodique de l'acide éthylènediaminetétra- acétique	0,05 %
	- Gomme de xanthane	0,2 %
	- Glycérine	3 %
	- Eau q.s.p.	100 %

La crème obtenue est stable, fine et homogène.

ETUDE COMPARATIVE

10

On a comparé, sur le plan de la stabilité et de la finesse, l'émulsion (H/E) selon l'exemple 2 ci-dessus à cette même émulsion (H/E) mais ne contenant pas de co-émulsionnant, cette dernière ayant la composition suivante :

15	- Cyclométhicone	10 %
	- Composition auto-émulsionnable commercialisée sous la dénomination de "Montanov 68**" par la Société Seppic	1,5 %
20	- Conservateurs	0,2 %
	- Hydroxyde de sodium	0,006 %
	- Gomme de xanthane	0,2 %
	- Propylène glycol	3 %
	- Eau q.s.p.	100 %

25 Après avoir laissé reposer les émulsions obtenues pendant une heure à une température de 20°C, on a procédé à leur examen à l'aide d'un microscope ayant un grossissement de 100.

Des photos des émulsions ont alors été prises et celles-ci sont annexées sous les références Photo (A) et Photo (B).

30 La Photo (A) correspond à l'émulsion de l'exemple 2 et la Photo (B) à celle de l'exemple comparatif.

Comme on peut le constater, l'émulsion de la Photo (A) est beaucoup plus fine et homogène que celle de la Photo (B) qui laisse apparaître des globules dénotant un manque d'homogénéité et de stabilité.

35

*** (marques de commerce)**


REVENDICATIONS

1. Composition cosmétique ou dermatologique sous forme d'une émulsion huile-dans-eau stable, caractérisée par le fait qu'elle contient:

(a) de 5 à 40% en poids par rapport au poids total de la composition d'une phase huileuse,

(b) de 0,5 à 5% en poids par rapport au poids total de la composition d'une composition auto-émulsionnable comprenant de 60 à 90% en poids d'au moins un alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone, de 10 à 40% en poids d'un alkylpolyoside dont la chaîne alkyle a de 12 à 22 atomes de carbone et de 0 à 5% en poids de polyoside, l'alcool gras, l'alkylpolyoside et le polyoside sont exprimés en pourcentage en poids par rapport au poids de la composition auto-émulsionnable,

(c) de 0,5 à 4% en poids par rapport au poids total de la composition d'au moins un co-émulsionnant choisi parmi les acides gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les mélanges desdits acides gras et d'alcools gras ayant de 14 à 22 atomes de carbone, les alkyléthers de glycéryle dont la chaîne alkyle a de 14 à 22 atomes de carbone, les composés de formule:



dans laquelle:

R' et R'', identiques ou différents, représentent un radical cholestéryle, béhényle ou 2-octyldodécyle, sous réserve que lorsqu'un seul co-émulsionnant est présent, sa proportion en poids est égale ou inférieure à 2%, et

(d) une phase aqueuse.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisé en ce que la phase huileuse comprend en outre, en une proportion inférieure à 15% en poids par rapport au poids de la phase huileuse, au moins une huile végétale

ayant plus de 40% en poids par rapport au poids de l'huile végétale de triglycérides d'acide linoléique.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par le fait que le rapport pondéral entre la phase huileuse et l'alkylpolyoside de la composition auto-émulsionnable est égal ou supérieur à 15.

4. Composition selon la revendication 3, caractérisée par le fait que l'alcool gras ayant de 12 à 22 atomes de carbone de la composition auto-émulsionnable est l'alcool cétylstéarylique (C₁₆-C₁₈) et l'alkylpolyoside est du cétéarylglucoside.

10 5. Composition selon la revendication 1, caractérisée par le fait que le co-émulsionnant est choisi dans le groupe constitué par l'alcool stéarylique, l'alcool cétylique, l'acide stéarique, l'alcool chimylique, l'alcool batylique et leurs mélanges.

6. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée par le fait que la phase huileuse de ladite émulsion contient en outre un adjuvant choisi parmi les colorants, les principes actifs lipophiles, les filtres solaires, les antioxydants et les conservateurs.

20 7. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée par le fait que la phase aqueuse de ladite émulsion contient en outre un adjuvant choisi parmi les colorants, les conservateurs, les principes actifs hydrophiles, les oligo-éléments, les dérivés biologiques, les polyols, les sels, les minéraux argileux gonflant en milieu aqueux, les acides aminés et les agents gélifiants aqueux.

8. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée par le fait qu'elle contient en outre au moins une substance

active choisie parmi les huiles essentielles, les parfums, les pigments, les charges, les vitamines et les céramides.

CA2117322

PHOTO (A)




PHOTO (B)

