(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105250781 A
(43)申请公布日 2016.01.20

(21)申请号 201510778775.6

(22)申请日 2015.11.13

(71)申请人 孙绪连
地址 266555 山东省青岛市经济技术开发区香江路82号305户

(72)发明人 不公告发明人

(74)专利代理机构 济南舜源专利事务所有限公司 37205
代理人 邵朋程

(51)Int.Cl.
A61K 36/899(2006.01)
A61K 9/08(2006.01)
A61P 1/00(2006.01)
A61K 33/12(2006.01)
A61K 33/26(2006.01)
A61K 35/02(2015.01)
A61K 35/36(2015.01)
A61K 35/64(2015.01)
A61K 35/646(2015.01)

权利要求书1页 说明书5页

(54)发明名称

一种治疗脱肛的中药汤剂

(57)摘要

本发明公开了一种治疗脱肛的中药汤剂，其是由以下重量份配比的中药原料组成：肉桂10、附片12、牛膝10、萹蓄7、瓦花6、紫荆皮10、牵牛子15、紫花地丁10、白槿花5、仙鹤草6、败酱草10、赤石脂15、葛根5、泽泻12、茯苓6、滑石10、穿山甲6、王不留行15、漏芦12、全蝎7、僵蚕6、威灵仙10、黄芪12、制马钱子4、龙骨8、天南星8、竹茹10、虎杖12、栀子8、三七8、山楂6、桑寄生8、乌梅10、紫菀12、海藻8、莞蔚子12、葶苈子12、络石藤15、海风藤6、合欢花15。本发明各原料药经辨证配伍，共奏补火助阳，活血散瘀，祛风通络、解郁安神之功效，对脱肛患者疗效显著。

CN 105250781 A

1. 一种治疗脱肛的中药汤剂，其特征在于它是由以下重量份配比的中药原料组成：肉桂 7-15、附片 9-20、牛膝 7-14、萹蓄 6-11、瓦花 5-10、紫荆皮 10-20、牵牛子 10-20、紫花地丁 5-20、白槿花 3-10、仙鹤草 5-10、败酱草 5-20、赤石脂 10-20、葛根 3-10、泽泻 5-17、茯苓 5-10、滑石 6-12、穿山甲 5-10、王不留行 10-20、漏芦 10-15、全蝎 5-10、僵蚕 5-10、威灵仙 8-15、黄芪 6-17、制马钱子 3-5、龙骨 6-12、天南星 6-13、竹茹 9-19、虎杖 7-14、栀子 4-17、三七 6-13、山楂 5-12、桑寄生 6-17、乌梅 5-13、紫菀 6-17、海藻 7-14、茺蔚子 10-15、葶苈子 10-15、络石藤 10-15、海风藤 5-10、合欢花 10-20。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗脱肛的中药汤剂，其特征在于各原料药的重量份配比为：肉桂 10、附片 12、牛膝 10、萹蓄 7、瓦花 6、紫荆皮 10、牵牛子 15、紫花地丁 10、白槿花 5、仙鹤草 6、败酱草 10、赤石脂 15、葛根 5、泽泻 12、茯苓 6、滑石 10、穿山甲 6、王不留行 15、漏芦 12、全蝎 7、僵蚕 6、威灵仙 10、黄芪 12、制马钱子 4、龙骨 8、天南星 8、竹茹 10、虎杖 12、栀子 8、三七 8、山楂 6、桑寄生 8、乌梅 10、紫菀 12、海藻 8、茺蔚子 12、葶苈子 12、络石藤 15、海风藤 6、合欢花 15。

一种治疗脱肛的中药汤剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗脱肛的中药汤剂，属于中药领域。

背景技术

[0002] 脱肛，亦即直肠壁部分或全层向下移位，称为直肠脱垂。主要症状为有肿物自肛门脱出。初发时肿物较小，排便时脱出，便后自行复位。以后肿物脱出渐频，体积增大，便后需用手托回肛门内，伴有排便不尽和下坠感。最后在咳嗽、用力甚至站立时亦可脱出。随着脱垂加重，引起不同程度的肛门失禁，常有黏液流出，导致肛周皮肤湿疹、瘙痒。因直肠排空困难，常出现便秘，大便次数增多，呈羊粪样。黏膜糜烂，破溃后有血液流出。内脱垂常无明显症状，偶尔在行肠镜检查时发现。针对脱肛的治疗，西医多采取药物注射及手术等方法，但在治愈率、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种治疗脱肛的中药汤剂。

[0004] 本发明所采用的技术解决方案是：

[0005] 一种治疗脱肛的中药汤剂，其是由以下重量份配比的中药原料组成：肉桂 7-15、附片 9-20、牛膝 7-14、萹蓄 6-11、瓦花 5-10、紫荆皮 10-20、牵牛子 10-20、紫花地丁 5-20、白槿花 3-10、仙鹤草 5-10、败酱草 5-20、赤石脂 10-20、葛根 3-10、泽泻 5-17、茯苓 5-10、滑石 6-12、穿山甲 5-10、王不留行 10-20、漏芦 10-15、全蝎 5-10、僵蚕 5-10、威灵仙 8-15、黄芪 6-17、制马钱子 3-5、龙骨 6-12、天南星 6-13、竹茹 9-19、虎杖 7-14、栀子 4-17、三七 6-13、山楂 5-12、桑寄生 6-17、乌梅 5-13、紫菀 6-17、海藻 7-14、菟蔚子 10-15、葶苈子 10-15、络石藤 10-15、海风藤 5-10、合欢花 10-20。

[0006] 优选的，各原料药的重量份配比为：肉桂 10、附片 12、牛膝 10、萹蓄 7、瓦花 6、紫荆皮 10、牵牛子 15、紫花地丁 10、白槿花 5、仙鹤草 6、败酱草 10、赤石脂 15、葛根 5、泽泻 12、茯苓 6、滑石 10、穿山甲 6、王不留行 15、漏芦 12、全蝎 7、僵蚕 6、威灵仙 10、黄芪 12、制马钱子 4、龙骨 8、天南星 8、竹茹 10、虎杖 12、栀子 8、三七 8、山楂 6、桑寄生 8、乌梅 10、紫菀 12、海藻 8、菟蔚子 12、葶苈子 12、络石藤 15、海风藤 6、合欢花 15。

[0007] 上述中药汤剂的制备方法如下：

[0008] 按上述重量份配比称取以上诸药混合，加 8 倍重量水，浸泡 2 小时，加热煎煮 1.5 小时，过滤得煎煮液一与残渣；残渣再加 8 倍重量水，加热煎煮 1 小时，过滤得煎煮液二；合并煎煮液一与煎煮液二，即得汤剂。

[0009] 本发明的药理及效果如下：

[0010] 脱肛属中医学“脱肛”“截肠”“直肠脱垂”等范畴。中医学认为，本病发病原因与人体气血虚弱，机体的新陈代谢功能下降，自身免疫能力降低，疲劳等因素有关。本发明有针对性的选取肉桂、附片、牛膝、萹蓄、瓦花、紫荆皮、牵牛子、紫花地丁、白槿花、仙鹤草、败酱草、赤石脂、葛根、泽泻、茯苓、滑石、穿山甲、王不留行、漏芦、全蝎、僵蚕、威灵仙、黄芪、制

马钱子、龙骨、天南星、竹茹、虎杖、栀子、三七、山楂、桑寄生、乌梅、紫菀、海藻、茺蔚子、葶苈子、络石藤、海风藤、合欢花共 40 味中药原料熬制成中药汤剂。

[0011] 其中：肉桂，补火助阳，引火归源，散寒止痛，活血通经。

[0012] 附片，回阳救逆，补火助阳，散寒除湿。

[0013] 牛膝，性味苦甘酸平，具有活血通经，补肝肾，强筋骨。

[0014] 萹蓄，利尿通淋，杀虫，止痒。

[0015] 瓦花，清热解毒，止血。

[0016] 紫荆皮，活血通经，消肿解毒。

[0017] 牵牛子，泻水，下气，杀虫。

[0018] 紫花地丁，具有清热解毒，凉血消肿，清热利湿的作用。

[0019] 白槿花，清热解毒。

[0020] 仙鹤草，有收敛止血，止痢，杀虫的功效。

[0021] 败酱草，有清热解毒，祛瘀排脓等功效。

[0022] 赤石脂，具有涩肠，止血，生肌敛疮之功效。

[0023] 葛根，升阳解肌，透疹止泻，除烦止渴。

[0024] 泽泻，利水渗湿；泄热通淋。

[0025] 茯苓，渗湿利水，益脾和胃，宁心安神。

[0026] 滑石，利水渗湿，清暑解热。

[0027] 穿山甲，活血散结；通经下乳；消痈溃坚。

[0028] 王不留行，具有活血通经，下乳消肿，利尿通淋的功效。

[0029] 漏芦，清热、解毒、排脓、消肿和通乳的功效。

[0030] 全蝎，息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。

[0031] 僵蚕，祛风定惊，化痰散结。

[0032] 威灵仙，祛风除湿，通络止痛。

[0033] 黄芪，补气固表，利尿消肿，托毒排脓，敛疮生肌。

[0034] 制马钱子苦寒有大毒，泻火，攻毒，通络。

[0035] 龙骨，镇惊安神，敛汗固精，止血涩肠，生肌敛疮。

[0036] 天南星燥湿化痰。

[0037] 竹茹，清热泻火。

[0038] 虎杖，活血散瘀，清热利湿，解毒，止咳。

[0039] 栀子，清热泻火。竹茹，栀子与虎杖，共同加强制马钱子泻火，攻毒通络之力。

[0040] 三七，止血；散血；定痛。

[0041] 山楂，具有降血脂、血压、强心、抗心律不齐等作用。

[0042] 桑寄生，补肝肾，强筋骨，祛风湿，安胎元。牛膝、桑寄生与龙骨并用，增强滋补肝肾的功效。

[0043] 乌梅，敛肺，涩肠，生津，安蛔。

[0044] 紫菀，润肺下气；化痰止咳。

[0045] 海藻，清热、软坚散结、软坚、消痰、利水退肿。

[0046] 茺蔚子，活血调经；清肝明目。

[0047] 葶苈子，泻肺降气；祛痰平喘；利水消肿。

[0048] 络石藤，祛风通络、凉血消肿。

[0049] 海风藤，祛风湿，通经络。

[0050] 合欢花，解郁安神，滋阴补阳，理气开胃，活络止痛。

[0051] 全方配伍，共奏补火助阳，活血散瘀，祛风通络、解郁安神之功效，对脱肛患者疗效显著。

具体实施方式

[0052] 实施例 1

[0053] 按下述重量份配比称取中药原料：

[0054] 肉桂 10、附片 12、牛膝 10、萹蓄 7、瓦花 6、紫荆皮 10、牵牛子 15、紫花地丁 10、白槿花 5、仙鹤草 6、败酱草 10、赤石脂 15、葛根 5、泽泻 12、茯苓 6、滑石 10、穿山甲 6、王不留行 15、漏芦 12、全蝎 7、僵蚕 6、威灵仙 10、黄芪 12、制马钱子 4、龙骨 8、天南星 8、竹茹 10、虎杖 12、栀子 8、三七 8、山楂 6、桑寄生 8、乌梅 10、紫菀 12、海藻 8、茺蔚子 12、葶苈子 12、络石藤 15、海风藤 6、合欢花 15。

[0055] 制备方法如下：

[0056] 按上述重量份配比将以上诸药混合，加 8 倍重量水，浸泡 2 小时，加热煎煮 1.5 小时，过滤得煎煮液一与残渣；残渣再加 8 倍重量水，加热煎煮 1 小时，过滤得煎煮液二；合并煎煮液一与煎煮液二，即得汤剂。

[0057] 实施例 2

[0058] 按下述重量份配比称取中药原料：

[0059] 肉桂 7、附片 20、牛膝 14、萹蓄 6、瓦花 5、紫荆皮 20、牵牛子 10、紫花地丁 5、白槿花 10、仙鹤草 10、败酱草 20、赤石脂 10、葛根 3、泽泻 17、茯苓 10、滑石 6、穿山甲 10、王不留行 10、漏芦 10、全蝎 10、僵蚕 10、威灵仙 15、黄芪 17、制马钱子 3、龙骨 6、天南星 13、竹茹 9、虎杖 7、栀子 17、三七 6、山楂 12、桑寄生 17、乌梅 5、紫菀 6、海藻 14、茺蔚子 15、葶苈子 15、络石藤 10、海风藤 5、合欢花 20。

[0060] 制备方法同实施例 1。

[0061] 实施例 3

[0062] 按下述重量份配比称取中药原料：

[0063] 肉桂 15、附片 9、牛膝 7、萹蓄 11、瓦花 10、紫荆皮 10、牵牛子 20、紫花地丁 20、白槿花 3、仙鹤草 5、败酱草 5、赤石脂 20、葛根 10、泽泻 5、茯苓 5、滑石 12、穿山甲 5、王不留行 20、漏芦 15、全蝎 5、僵蚕 5、威灵仙 8、黄芪 17、制马钱子 5、龙骨 12、天南星 6、竹茹 19、虎杖 14、栀子 4、三七 13、山楂 5、桑寄生 6、乌梅 13、紫菀 17、海藻 7、茺蔚子 10、葶苈子 10、络石藤 15、海风藤 10、合欢花 10。

[0064] 按常规方法制成颗粒剂。

[0065] 对比例 1

[0066] 按下述重量份配比称取中药原料：

[0067] 牛膝 10、萹蓄 7、瓦花 6、紫荆皮 10、牵牛子 15、紫花地丁 10、白槿花 5、仙鹤草 6、败酱草 10、赤石脂 15、葛根 5、泽泻 12、茯苓 6、滑石 10、穿山甲 6、王不留行 15、漏芦 12、全蝎 7、

僵蚕 6、威灵仙 10、黄芪 12、制马钱子 4、龙骨 8、天南星 8、竹茹 10、虎杖 12、栀子 8、三七 8、山楂 6、桑寄生 8、乌梅 10、紫菀 12、海藻 8、茺蔚子 12、葶苈子 12、络石藤 15、海风藤 6、合欢花 15。

[0068] 制备方法同实施例 1。

[0069] 对比例 2

[0070] 按下述重量份配比称取中药原料：

[0071] 按下述重量份配比称取中药原料：

[0072] 肉桂 10、附片 12、牛膝 10、萹蓄 7、瓦花 6、紫荆皮 10、牵牛子 15、紫花地丁 10、白槿花 5、仙鹤草 6、败酱草 10、赤石脂 15、葛根 5、泽泻 12、茯苓 6、滑石 10、穿山甲 6、王不留行 15、漏芦 12、全蝎 7、僵蚕 6、威灵仙 10、黄芪 12、制马钱子 4、龙骨 8、天南星 8、竹茹 10、虎杖 12、栀子 8、三七 8、山楂 6、乌梅 10、紫菀 12、海藻 8、茺蔚子 12、葶苈子 12、络石藤 15、海风藤 6、合欢花 15。

[0073] 临床资料

[0074] 1. 一般资料

[0075] 本发明对 150 例脱肛患者进行临床观察治疗，随机分为三个治疗组，治疗一组 50 例，治疗二组 50 例，治疗三组 50 例，三组患者在性别、年龄、病程等方面经统计学分析无显著性差异 (P>0.05)，资料具有可比性。

[0076] 2. 治疗方法

[0077] 治疗一组服用本发明实施例 1 制得的中药汤剂，一日一剂，分早晚服，7 天为 1 疗程。

[0078] 治疗二组服用本发明对比例 1 制得的中药汤剂，一日一剂，分早晚服，7 天为 1 疗程。

[0079] 治疗三组服用本发明对比例 2 制得的中药汤剂，一日一剂，分早晚服，7 天为 1 疗程。

[0080] 3. 疗效判定标准

[0081] 治愈：症状全部消失；主要理化检测指标均为正常。

[0082] 显效：全部症状消除或主要症状消除；理化检测指标基本正常。

[0083] 有效：主要症状基本消失；主要理化检测指标有所改善。

[0084] 无效：主要理化检测指标与治疗前无变化。

[0085] 4. 治疗结果

[0086] 如下表 1。

[0087] 表 1

[0088]

组别	治愈	显效	有效	无效	总有效率
治疗一组	38	7	5	0	100%
治疗二组	12	13	13	12	76%

治疗三组	10	15	10	15	70%

[0089] 从表 1 可以看出，本发明中药汤剂对脱肛患者有极其显著的治疗效果。而且治疗一组的治愈率以及总有效率均明显高于治疗二组和治疗三组。