

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges

Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum

3. April 2014 (03.04.2014)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

WO 2014/048853 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

C07D 413/04 (2006.01) C07F 9/6558 (2006.01)

C07D 413/14 (2006.01) A01N 43/80 (2006.01)

C07D 417/04 (2006.01) A01N 57/24 (2006.01)

C07D 417/14 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2013/069613

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. September 2013 (20.09.2013)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
12185775.9 25. September 2012 (25.09.2012) EP

(71) Anmelder: BAYER CROPSCIENCE AG [DE/DE];
Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder: FRENZEL, Thomas; Rungestraße 47, 51061
Köln (DE). HAAF, Klaus; Robert-Koch-Str. 9, 65779
Kelkheim (DE). LINDELL, Stephen David; Altenhainer
Str. 15, 65779 Kelkheim (DE). WILLMS, Lothar;
Königsteiner Str.50, 65719 Hofheim (DE). DIETRICH,
Hansjörg; Bonifatiusstraße 1b, 65835 Liederbach am
Taunus (DE). SCHMUTZLER, Dirk; Hauptmannweg 2,
65795 Hattersheim (DE). GATZWEILER, Elmar; Am
Nauheimer Bach 22, 61231 Bad Nauheim (DE).
ROSINGER, Christopher Hugh; Am Hochfeld 33, 65719
Hofheim (DE).

(74) Anwalt: BIP PATENTS; c/o Bayer Intellectual Property
GmbH, Creative Campus Monheim, Alfred-Nobel-Str. 10,
40789 Monheim (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:


— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: HERBICIDALLY AND FUNGICIDALLY ACTIVE 3-HETEROARYL-ISOXAZOLINE-5-CARBOXAMIDES AND 3-HETEROARYL-ISOXAZOLINE-5-THIOAMIDES

(54) Bezeichnung : HERBIZID UND FUNGIZID WIRKSAME 3-HETEROARYLISOXAZOLIN-5-CARBOXAMIDE UND 3-HETEROARYLISOXAZOLIN-5-THIOAMIDE



(57) Abstract: The invention relates to herbicidally and fungicidally active 3-heteroaryl-isoxazoline-5-carboxamides and 3-heteroaryl-isoxazoline-5-thioamides of formula (I). In said formula (I), R stands for groups such as hydrogen, halogen, and organic radicals such as substituted alkyl. A means a bond or a divalent unit. Y stands for a chalcogen.

(57) Zusammenfassung: Es werden herbizid und fungizid wirksame 3-Heteroaryl-isoxazolin-5-carboxamide und 3-Heteroaryl-isoxazolin-5-thioamide der Formel (I) beschrieben. In dieser Formel (I) steht R für Reste wie Wasserstoff, Halogen und organische Reste wie substituiertes Alkyl. A bedeutet eine Bindung oder eine divalente Einheit. Y steht für ein Chalkogen.



WO 2014/048853 A1

Herbizid und fungizid wirksame 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-
5 Heteroarylisoaxazolin-5-thioamide

Beschreibung

Die Erfindung betrifft das technische Gebiet der Herbizide und Fungizide,
10 insbesondere das der Herbizide zur selektiven Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern in Nutzpflanzenkulturen.

Speziell betrifft sie substituierte 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-
Heteroarylisoaxazolin-5-thioamide, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung
15 als Herbizide und Fungizide.

Aus DE 4026018 A1 und EP 520371 A2 und DE 4017665 sind 3-Phenylisoaxazolin-5-
carboxamide bekannt, die in 5-Position des Isoxazolin-Rings ein Wasserstoffatom
tragen. Diese Verbindungen werden dort als agrochemisch wirksame Safener
20 beschrieben, d.h. als Verbindungen, die die unerwünschte herbizide Wirkung von Herbiziden gegenüber Kulturpflanzen aufheben. Eine herbizide Wirkung dieser Verbindungen ist nicht offenbart. Die prioritätsältere nicht vorveröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 10170238 offenbart herbizid und fungizid wirksame 3-Phenylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-Phenylisoaxazolin-5-thioamide, die in 5-
25 Position des Isoxazolin-Rings ein Wasserstoffatom tragen. Aus Monatshefte Chemie (2010) 141, 461. Pesticides (2010) 21-31 und Letters in Organic Chemistry (2010), 7, 502 sind ebenfalls 3-Phenylisoaxazolin-5-carboxamide bekannt, die in 5-Position des Isoxazolin-Rings ein Wasserstoffatom tragen. Für einige der genannten Verbindungen wird eine fungizide Wirkung offenbart.

30

Aus WO 2005/021516 sind die Verbindungen
3-({[3-(4-tert-Butylpyridin-2-yl)-5-ethyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]carbonyl}amino)-5-
fluor-4-oxopentansäure

3-({[3-(4-tert-Butylpyridin-2-yl)-5-isopropyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]carbonyl}amino)-5-fluor-4-oxopentansäure,

3-({[3-(4-iso-Butylpyridin-2-yl)-5-ethyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]carbonyl}amino)-5-fluor-4-oxopentansäure,

5 3-({[3-(4-Acetylpyridin-2-yl)-5-ethyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]carbonyl}amino)-5-fluor-4-oxopentansäure,


3-({[5-Ethyl-3-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]carbonyl}amino)-5-fluor-4-oxopentansäure und

10 3-({[5-Ethyl-3-(4-isobutylpyridin-2-yl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl]carbonyl}amino)-5-fluor-4-oxopentansäure jeweils mit pharmakologischer Wirkung bekannt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung herbizid und fungizid wirksamer Verbindungen.

15 Es wurde gefunden, daß 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-Heteroarylisoaxazolin-5-thioamide als Herbizide und Fungizide besonders gut geeignet sind. Ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-Heteroarylisoaxazolin-5-thioamide der Formel (I) und deren N-Oxide

20



worin

25 R^1 und R^2 bedeuten unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod und Cyano substituiertes (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Alkoxy, oder


30 R^1 und R^2 bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gesättigten, teilweise oder vollständig ungesättigten drei-, vier- oder fünfgliedrigen Ring, der aus q Kohlenstoffatomen und p Sauerstoffatomen aufgebaut ist;

R^3 bedeutet Fluor, Chlor, Cyano, (C₁-C₃)-Alkylcarbonyloxy oder S(O)_nR⁵,
 oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod,
 Cyano, (C₁-C₄)-Alkoxy und Hydroxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl,
 5 (C₂-C₆)-Alkenyl oder (C₂-C₆)-Alkynyl,
 oder durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano
 und (C₁-C₆)-Alkoxy substituiertes (C₂-C₆)-Alkenylcarbonyl (;
 oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod,
 Cyano, (C₁-C₄)-Alkoxy und Hydroxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₃-C₆)-Cycloalkoxy,
 10 (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy,

R^4 bedeutet Wasserstoff, Cyano,
 oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod,
 Cyano, Hydroxy und (C₁-C₆)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₈)-Alkyl, (C₃-C₈)-Alkenyl, (C₃-
 C₈)-Alkynyl oder (C₃-C₈)-Cycloalkyl;

15

A bedeutet eine Bindung oder eine divalente Einheit aus der Gruppe bestehend
 aus



- 20 R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} und R^{15} bedeuten unabhängig voneinander jeweils
 Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy, Cyano, CO₂R⁸, CONR⁶R⁸, R⁵,
 oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod,
 Hydroxy und Cyano substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₅)-Cycloalkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl,
 (C₂-C₆)-Alkynyl,
 25 oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod,
 Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₃-C₆)-Cycloalkoxy, (C₂-C₆)-
 Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy;

Y bedeutet Sauerstoff oder Schwefel;

X bedeutet Wasserstoff, Cyano, Hydroxy, X^1 ,

5 oder

durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Hydroxy, OR^7 , X^1 , OX^1 , NHX^1 , $S(O)_n R^5$, $SO_2NR^6R^7$, $SO_2NR^6COR^8$, CO_2R^8 , $CONR^6R^8$, COR^6 , $CONR^8SO_2R^5$, NR^6R^8 , NR^6COR^8 , $NR^6CONR^8R^8$, $NR^6CO_2R^8$, $NR^6SO_2R^8$, $NR^6SO_2NR^6R^8$, $CONR^6R^8$, $OCSNR^6R^8$, POR^9R^9 und $C(R^6)=NOR^8$ substituiertes (C_1 -

10 C_{12})-Alkyl, (C_3 - C_8)-Cycloalkyl, (C_2 - C_{12})-Alkenyl oder (C_2 - C_{12})-Alkynyl,

oder

X, A und R^4 bilden mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gesättigten, teilweise oder vollständig ungesättigten fünf-, sechs- oder siebengliedrigen Ring, der neben diesem Stickstoffatom k Kohlenstoffatome, n

15 Sauerstoffatome, p Schwefelatome und p Elemente aus der Gruppe bestehend aus NR^7 und $NCOR^7$ als Ringatome enthält, wobei ein Kohlenstoffatom p Oxogruppen trägt;

X^1 bedeutet einen drei-, vier-, fünf- oder sechsgliedrigen gesättigten, teilweise

20 ungesättigten, vollständig ungesättigten oder aromatischen Ring, der aus r Kohlenstoffatomen, s Stickstoffatomen, n Schwefelatomen und n Sauerstoffatomen aufgebaut ist, und der durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus R^6 , R^{6a} , R^8 und R^9 substituiert ist, wobei die diesen Ring aufbauenden Schwefelatome und Kohlenstoffatome jeweils n Oxogruppen tragen;

25

Het bedeutet einen drei-, vier-, fünf- oder sechsgliedrigen gesättigten, teilweise ungesättigten, vollständig ungesättigten oder aromatischen Ring, der aus r Kohlenstoffatomen, s Stickstoffatomen, n Schwefelatomen und t Sauerstoffatomen aufgebaut ist, wobei die Indices n, s und t nicht alle gleichzeitig null sein sollen, und

30 wobei die diesen Ring aufbauenden Schwefelatome und Kohlenstoffatome jeweils n Oxogruppen tragen;

R bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy, Cyano, Nitro, SF_5 , $CONR^8SO_2R^5$, $CONR^6R^8$, COR^6 , CO_2R^8 , $CONR^6R^8$, $C(R^6)=NOR^8$, NR^6COR^8 , $NR^6CONR^8R^8$,

$\text{NR}^6\text{CO}_2\text{R}^8$, $\text{NR}^6\text{SO}_2\text{R}^8$, $\text{NR}^6\text{SO}_2\text{NR}^6\text{R}^8$, OCONR^6R^8 , OSO_2R^5 , $\text{S}(\text{O})_n\text{R}^5$, $\text{SO}_2\text{NR}^6\text{R}^8$, $\text{OSO}_2\text{NR}^6\text{R}^8$,

oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy und Cyano substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl, (C₂-C₆)-Alkynyl,

5 oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₃-C₆)-Cycloalkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy;

R^5 bedeutet durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und Hydroxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl oder (C₃-C₆)-Cycloalkyl;

R^6 bedeutet Wasserstoff oder R^5 ;

R^{6a} bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Hydroxy, $\text{S}(\text{O})_n\text{R}^5$ oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₃-C₆)-Alkenyloxy oder (C₃-C₆)-Alkinyloxy;

R^7 bedeutet Wasserstoff oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl oder (C₂-C₄)-Alkynyl;

R^8 bedeutet R^7 ;

R^9 bedeutet (C₁-C₃)-Alkyl oder (C₁-C₃)-Alkoxy;

k bedeutet 3, 4, 5 oder 6;

m bedeutet 0, 1, 2, 3, 4 oder 5;

n bedeutet 0, 1 oder 2;

p bedeutet 0 oder 1;

q bedeutet 3, 4 oder 5;

r bedeutet 1, 2, 3, 4 oder 5;

s bedeutet 0, 1, 2, 3 oder 4;

5

t bedeutet 0, 1 oder 2,

wobei die Verbindungen, in denen A-X den Rest 5-Fluor-4-oxopentan-3-yl-säure bildet, ausgenommen sind.

10

Alkyl bedeutet gesättigte, geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffreste mit der jeweils angegebenen Anzahl von Kohlenstoffatomen, z.B. C₁-C₆-Alkyl wie Methyl, Ethyl, Propyl, 1-Methylethyl, Butyl, 1-Methyl-propyl, 2-Methylpropyl, 1,1-Dimethylethyl, Pentyl, 1-Methylbutyl, 2-Methylbutyl, 3-Methylbutyl, 2,2-Di-methylpropyl, 1-Ethylpropyl, 15 Hexyl, 1,1-Dimethylpropyl, 1,2-Dimethylpropyl, 1-Methylpentyl, 2-Methylpentyl, 3-Methylpentyl, 4-Methylpentyl, 1,1-Dimethylbutyl, 1,2-Dimethylbutyl, 1,3-Dimethylbutyl, 2,2-Dimethylbutyl, 2,3-Dimethylbutyl, 3,3-Dimethylbutyl, 1-Ethylbutyl, 2-Ethylbutyl, 1,1,2-Trimethylpropyl, 1,2,2-Trimethylpropyl, 1-Ethyl-1-methylpropyl und 1-Ethyl-2-methylpropyl.

20

Durch Halogen substituiertes Alkyl bedeutet geradkettige oder verzweigte Alkylgruppen, wobei in diesen Gruppen teilweise oder vollständig die Wasserstoffatome durch Halogenatome ersetzt sein können, z.B. C₁-C₂-Halogenalkyl wie Chlormethyl, Brommethyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl, Fluormethyl, Difluormethyl, Trifluormethyl, 25 Chlorfluormethyl, Dichlorfluormethyl, Chlordifluormethyl, 1-Chlorethyl, 1-Bromethyl, 1-Fluorethyl, 2-Fluorethyl, 2,2-Difluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, 2-Chlor-2-fluorethyl, 2-Chlor,2-difluorethyl, 2,2-Dichlor-2-fluorethyl, 2,2,2-Trichlorethyl, Pentafluorethyl und 1,1,1-Trifluorprop-2-yl.

30

Alkenyl bedeutet ungesättigte, geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffreste mit der jeweils angegebenen Anzahl von Kohlenstoffatomen und einer Doppelbindung in einer beliebigen Position, z.B. C₂-C₆-Alkenyl wie Ethenyl, 1-Propenyl, 2-Propenyl, 1-Methylethenyl, 1-Butenyl, 2-Butenyl, 3-Butenyl, 1-Methyl-1-propenyl, 2-Methyl-1-propenyl, 1-Methyl-2-propenyl, 2-Methyl-2-propenyl, 1-Pentenyl, 2-Pentenyl, 3-

Pentenyl, 4-Pentenyl, 1-Methyl-1-butenyl, 2-Methyl-1-butenyl, 3-Methyl-1-butenyl, 1-Methyl-2-butenyl, 2-Methyl-2-butenyl, 3-Methyl-2-butenyl, 1-Methyl-3-butenyl, 2-Methyl-3-butenyl, 3-Methyl-3-butenyl, 1,1-Dimethyl-2-propenyl, 1,2-Dimethyl-1-propenyl, 1,2-Dimethyl-2-propenyl, 1-Ethyl-1-propenyl, 1-Ethyl-2-propenyl, 1-Hexenyl, 2-Hexenyl, 3-Hexenyl, 4-Hexenyl, 5-Hexenyl, 1-Methyl-1-pentenyl, 2-Methyl-1-pentenyl, 3-Methyl-1-pentenyl, 4-Methyl-1-pentenyl, 1-Methyl-2-pentenyl, 2-Methyl-2-pentenyl, 3-Methyl-2-pentenyl, 4-Methyl-2-pentenyl, 1-Methyl-3-pentenyl, 2-Methyl-3-pentenyl, 3-Methyl-3-pentenyl, 4-Methyl-3-pentenyl, 1-Methyl-4-pentenyl, 2-Methyl-4-pentenyl, 3-Methyl-4-pentenyl, 4-Methyl-4-pentenyl, 1,1-Dimethyl-2-butenyl, 1,1-Dimethyl-3-butenyl, 1,2-Dimethyl-1-butenyl, 1,2-Dimethyl-2-butenyl, 1,2-Dimethyl-3-butenyl, 1,3-Dimethyl-1-butenyl, 1,3-Dimethyl-2-butenyl, 1,3-Dimethyl-3-butenyl, 2,2-Dimethyl-3-butenyl, 2,3-Dimethyl-1-butenyl, 2,3-Dimethyl-2-butenyl, 2,3-Dimethyl-3-butenyl, 3,3-Dimethyl-1-butenyl, 3,3-Dimethyl-2-butenyl, 1-Ethyl-1-butenyl, 1-Ethyl-2-butenyl, 1-Ethyl-3-butenyl, 2-Ethyl-1-butenyl, 2-Ethyl-2-butenyl, 2-Ethyl-3-butenyl, 1,1,2-Trimethyl-2-propenyl, 1-Ethyl-1-methyl-2-propenyl, 1-Ethyl-2-methyl-1-propenyl und 1-Ethyl-2-methyl-2-propenyl.

Alkynyl bedeutet geradkettige oder verzweigte Kohlenwasserstoffreste mit der jeweils angegebenen Anzahl von Kohlenstoffatomen und einer Dreifachbindung in einer beliebigen Position, z.B. C₂-C₆-Alkynyl wie Ethinyl, 1-Propinyl, 2-Propinyl (oder Propargyl), 1-Butinyl, 2-Butinyl, 3-Butinyl, 1-Methyl-2-propinyl, 1-Pentinyl, 2-Pentinyl, 3-Pentinyl, 4-Pentinyl, 3-Methyl-1-butinyl, 1-Methyl-2-butinyl, 1-Methyl-3-butinyl, 2-Methyl-3-butinyl, 1,1-Dimethyl-2-propinyl, 1-Ethyl-2-propinyl, 1-Hexinyl, 2-Hexinyl, 3-Hexinyl, 4-Hexinyl, 5-Hexinyl, 3-Methyl-1-pentinyl, 4-Methyl-1-pentinyl, 1-Methyl-2-pentinyl, 4-Methyl-2-pentinyl, 1-Methyl-3-pentinyl, 2-Methyl-3-pentinyl, 1-Methyl-4-pentinyl, 2-Methyl-4-pentinyl, 3-Methyl-4-pentinyl, 1,1-Dimethyl-2-butinyl, 1,1-Dimethyl-3-butinyl, 1,2-Dimethyl-3-butinyl, 2,2-Dimethyl-3-butinyl, 3,3-Dimethyl-1-butinyl, 1-Ethyl-2-butinyl, 1-Ethyl-3-butinyl, 2-Ethyl-3-butinyl und 1-Ethyl-1-methyl-2-propinyl.

Alkoxy bedeutet gesättigte, geradkettige oder verzweigte Alkoxyreste mit der jeweils angegebenen Anzahl von Kohlenstoffatomen, z.B. C₁-C₆-Alkoxy wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy, 1-Methylethoxy, Butoxy, 1-Methyl-propoxy, 2-Methylpropoxy, 1,1-Dimethylethoxy, Pentoxy, 1-Methylbutoxy, 2-Methylbutoxy, 3-Methylbutoxy, 2,2-Dimethylpropoxy, 1-Ethylpropoxy, Hexoxy, 1,1-Dimethylpropoxy, 1,2-Dimethylpropoxy, 1-

Methylpentoxy, 2-Methylpentoxy, 3-Methylpentoxy, 4-Methylpentoxy, 1,1-Dimethylbutoxy, 1,2-Dimethylbutoxy, 1,3-Dimethylbutoxy, 2,2-Dimethylbutoxy, 2,3-Dimethylbutoxy, 3,3-Dimethylbutoxy, 1-Ethylbutoxy, 2-Ethylbutoxy, 1,1,2-Trimethylpropoxy, 1,2,2-Trimethylpropoxy, 1-Ethyl-1-methylpropoxy und 1-Ethyl-2-methylpropoxy. Durch

- 5 Halogen substituiertes Alkoxy bedeutet geradkettige oder verzweigte Alkoxyreste mit der jeweils angegebenen Anzahl von Kohlenstoffatomen, wobei in diesen Gruppen teilweise oder vollständig die Wasserstoffatome durch Halogenatome wie vorstehend genannt ersetzt sein können, z.B. C₁-C₂-Halogenalkoxy wie Chlormethoxy, Brommethoxy, Dichlormethoxy, Trichlormethoxy, Fluormethoxy, Difluormethoxy, 10 Trifluormethoxy, Chlorfluormethoxy, Dichlor-fluormethoxy, Chlordifluormethoxy, 1-Chlorethoxy, 1-Bromethoxy, 1-Fluorethoxy, 2-Fluorethoxy, 2,2-Difluorethoxy, 2,2,2-Trifluorethoxy, 2-Chlor-2-fluorethoxy, 2-Chlor,2-difluorethoxy, 2,2-Dichlor-2-fluorethoxy, 2,2,2-Trichlorethoxy, Pentafluor-ethoxy und 1,1,1-Trifluorprop-2-oxy.
- 15 Die Verbindungen der Formel (I) können je nach Art und Verknüpfung der Substituenten als Stereoisomere vorliegen. Sind beispielsweise ein oder mehrere asymmetrisch substituierte Kohlenstoffatome und/oder Sulfoxide vorhanden, so können Enantiomere und Diastereomere auftreten. Stereoisomere lassen sich aus den bei der Herstellung anfallenden Gemischen nach üblichen Trennmethoden, 20 beispielsweise durch chromatographische Trennverfahren, erhalten. Ebenso können Stereoisomere durch Einsatz stereoselektiver Reaktionen unter Verwendung optisch aktiver Ausgangs- und/oder Hilfsstoffe selektiv hergestellt werden. Die Erfindung betrifft auch alle Stereoisomeren und deren Gemische, die von der Formel (I) umfaßt, jedoch nicht spezifisch definiert sind. Im Folgenden wird der Einfachheit halber jedoch 25 stets von Verbindungen der Formel (I) gesprochen, obwohl sowohl die reinen Verbindungen als gegebenenfalls auch Gemische mit unterschiedlichen Anteilen an isomeren Verbindungen gemeint sind.

- Je nach Art der oben definierten Substituenten weisen die Verbindungen der Formel (I) 30 saure Eigenschaften auf und können mit anorganischen oder organischen Basen oder mit Metallionen Salze, gegebenenfalls auch innere Salze oder Addukte bilden. Tragen die Verbindungen der Formel (I) Hydroxy, Carboxy oder andere, saure Eigenschaften induzierende Gruppen, so können diese Verbindungen mit Basen zu Salzen umgesetzt werden. Geeignete Basen sind beispielsweise Hydroxide,

Carbonate, Hydrogencarbonate der Alkali- und Erdalkalimetalle, insbesondere die von Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium, weiterhin Ammoniak, primäre, sekundäre und tertiäre Amine mit (C₁-C₄)-Alkyl-Gruppen, Mono-, Di- und Trialkanolamine von (C₁-C₄)-Alkanolen, Cholin sowie Chlorcholin.

5

Ist eine Gruppe mehrfach durch Reste substituiert, so bedeutet dies, daß diese Gruppe durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene der genannten Reste substituiert ist.

10 In allen nachfolgend genannten Formeln haben die Substituenten und Symbole, sofern nicht anders definiert, dieselbe Bedeutung wie unter Formel (I) beschrieben. Pfeile in einer chemischen Formel bedeuten die Verknüpfungsorte zum restlichen Molekül.

15 Bevorzugt sind 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-Heteroarylisoaxazolin-5-thioamide der Formel (I), worin

R¹ und R² bedeuten unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor,

20 Chlor, Brom, Iod und Cyano substituiertes (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Alkoxy, oder

R¹ und R² bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gesättigten, teilweise oder vollständig ungesättigten drei-, vier- oder fünfgliedrigen Ring, der aus q Kohlenstoffatomen und p Sauerstoffatomen aufgebaut


25 ist;

R³ bedeutet durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, (C₁-C₄)-Alkoxy und Hydroxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl oder (C₂-C₆)-Alkinyl,

30

R⁴ bedeutet Wasserstoff, Cyano, oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Hydroxy und (C₁-C₆)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₈)-Alkyl, (C₃-C₈)-Alkenyl, (C₃-C₈)-Alkinyl oder (C₃-C₈)-Cycloalkyl;

A bedeutet eine Bindung oder eine divalente Einheit aus der Gruppe bestehend aus



5 R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} und R^{15} bedeuten unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy, Cyano, CO_2R^8 , CONR^6R^8 , R^5 , oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy und Cyano substituiertes (C_1-C_6) -Alkyl, (C_3-C_5) -Cycloalkyl, (C_2-C_6) -Alkenyl, (C_2-C_6) -Alkynyl,

10 oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und (C_1-C_2) -Alkoxy substituiertes (C_1-C_6) -Alkoxy, (C_3-C_6) -Cycloalkoxy, (C_2-C_6) -Alkenyloxy oder (C_2-C_6) -Alkinyloxy;

Y bedeutet Sauerstoff oder Schwefel;

15

X bedeutet Wasserstoff, Cyano, Hydroxy, X^1 , oder


durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Hydroxy, OR^7 , X^1 , OX^1 , NHX^1 , $\text{S}(\text{O})_n R^5$, $\text{SO}_2\text{NR}^6R^7$, $\text{SO}_2\text{NCOR}^6R^8$, CO_2R^8 , CONR^6R^8 ,
 20 COR^6 , $\text{CONR}^8\text{SO}_2R^5$, NR^6R^8 , NR^6COR^8 , $\text{NR}^6\text{CONR}^8R^8$, $\text{NR}^6\text{CO}_2R^8$, $\text{NR}^6\text{SO}_2R^8$, $\text{NR}^6\text{SO}_2\text{NR}^6R^8$, OCONR^6R^8 , OCSNR^6R^8 , POR^9R^9 und $\text{C}(\text{R}^6)=\text{NOR}^8$ substituiertes (C_1-C_{12}) -Alkyl, (C_3-C_8) -Cycloalkyl, (C_2-C_{12}) -Alkenyl oder (C_2-C_{12}) -Alkynyl, oder

X, A und R^4 bilden mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen

25 gesättigten, teilweise oder vollständig ungesättigten fünf-, sechs- oder siebengliedrigen Ring, der neben diesem Stickstoffatom k Kohlenstoffatome, n Sauerstoffatome, p Schwefelatome und p Elemente aus der Gruppe bestehend aus

NR⁷ und NCOR⁷ als Ringatome enthält, wobei ein Kohlenstoffatom p Oxogruppen trägt;

X¹ bedeutet einen durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus R⁶, R^{6a}, R⁸ und R⁹ substituierten Ring aus der Gruppe bestehend aus



oder X¹ bedeutet durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus R⁶, R^{6a}, R⁸ und R⁹ substituiertes Phenyl;

Het bedeutet Pyridin-2-yl, Pyridin-3-yl, Pyridin-4-yl, Pyridazin-3-yl, Pyridazin-4-yl, Pyrimidin-2-yl, Pyrimidin-4-yl, Pyrimidin-5-yl, Pyrazin-2-yl, 1,2,4-Triazin-3-yl, 1,2,4-Triazin-5-yl, 1,2,4-Triazin-6-yl, 1,3,5-Triazin-2-yl, 1,2,4,5-Tetrazin-3-yl, Pyrrol-1-yl, 5 Pyrrol-2-yl, Pyrrol-3-yl, Furan-2-yl, Furan-3-yl, Thiophen-2-yl, Thiophen-3-yl, Pyrazol-1-yl, Pyrazol-3-yl, Pyrazol-4-yl, Pyrazol-5-yl, Imidazol-1-yl, Imidazol-2-yl, Imidazol-4-yl, Imidazol-5-yl, Oxazol-2-yl, Oxazol-4-yl, Oxazol-5-yl, Thiazol-2-yl, Thiazol-4-yl, Thiazol-5-yl, Isoxazol-3-yl, Isoxazol-4-yl, Isoxazol-5-yl, Isothiazol-3-yl, Isothiazol-4-yl, Isothiazol-5-yl, 1H-1,2,3-triazol-1-yl, 1H-1,2,3-triazol-4-yl, 1H-1,2,3-triazol-5-yl, 2H- 10 1,2,3-triazol-2-yl, 2H-1,2,3-triazol-4-yl, 1H-1,2,4-Triazol-1-yl, 1H-1,2,4-Triazol-3-yl, 2H-1,2,4-Triazol-3-yl, 4H-1,2,4-Triazol-3-yl, 4H-1,2,4-Triazol-4-yl, 1,2,3-Oxadiazol-4-yl, 1,2,3-Oxadiazol-5-yl, 1,2,3-Thiadiazol-4-yl, 1,2,3-Thiadiazol-5-yl, 1,2,4-Oxadiazol-3-yl, 1,2,4-Oxadiazol-5-yl, 1,2,4-Thiadiazol-3-yl, 1,2,4-Thiadiazol-5-yl, 1,2,5-Oxadiazol-3-yl, 1,2,5-Thiadiazol-3-yl, 1,3,4-Oxadiazol-2-yl, 1,3,4-Thiadiazol-2-yl, 1H-Tetrazol-5-yl, 2H- 15 Tetrazol-5-yl, 1,4,5,6-Tetrahydropyrimidin-2-yl, 1,4,5,6-Tetrahydropyridazin-3-yl, 5,6-Dihydro-4H-1,3-oxazin-2-yl, 5,6-Dihydro-4H-1,2-oxazin-3-yl, 5,6-Dihydro-4H-1,3-thiazin-2-yl, 5,6-Dihydro-4H-1,2-thiazin-3-yl, 4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl, 4,5-Dihydro-1H-pyrazol-3-yl, 4,5-Dihydro-1,3-oxazol-2-yl, 4,5-Dihydro-1,2-oxazol-3-yl, 4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-yl, 4,5-Dihydro-1,2-thiazol-3-yl, Azetidin-1-yl, Azetidin-2-yl, 20 Azetidin-3-yl, Pyrrolidin-1-yl, Pyrrolidin-2-yl, Pyrrolidin-3-yl, Piperidin-1-yl, Piperidin-2-yl, Piperidin-3-yl, Piperidin-4-yl, Piperazin-1-yl, Piperazin-2-yl, Piperazin-3-yl, Oxiran-2-yl, Oxetan-2-yl, Oxetan-3-yl, Tetrahydrofuran-2-yl, Tetrahydrofuran-3-yl, Tetrahydro-2H-pyran-2-yl, Tetrahydro-2H-pyran-3-yl, Tetrahydro-2H-pyran-4-yl, 1,3-Dioxolan-2-yl, 1,3-Dioxolan-4-yl, 1,3-Dioxan-2-yl, 1,3-Dioxan-4-yl, 1,3-Dioxan-5-yl, Morpholin-2-yl, 25 Morpholin-3-yl oder Morpholin-4-yl;

R bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy, Cyano, Nitro, SF₅, CONR⁸SO₂R⁵, CONR⁶R⁸, COR⁶, CO₂R⁸, CONR⁶R⁸, C(R⁶)=NOR⁸, NR⁶COR⁸, NR⁶CONR⁸R⁸, NR⁶CO₂R⁸, NR⁶SO₂R⁸, NR⁶SO₂NR⁶R⁸, OCONR⁶R⁸, OSO₂R⁵, S(O)_nR⁵, SO₂NR⁶R⁸, 30 OSO₂NR⁶R⁸,
oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy und Cyano substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl, (C₂-C₆)-Alkynyl,

oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₃-C₆)-Cycloalkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy;

- 5 R⁵ bedeutet durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und Hydroxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl oder (C₃-C₆)-Cycloalkyl;

R⁶ bedeutet Wasserstoff oder R⁵;

- 10 R^{6a} bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Jod, Cyano, Hydroxy, S(O)_nR⁵ oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy;

- R⁷ bedeutet Wasserstoff oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend
15 aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl oder (C₂-C₄)-Alkinyl;

R⁸ bedeutet R⁷;

- 20 R⁹ bedeutet (C₁-C₃)-Alkyl oder (C₁-C₃)-Alkoxy;

k bedeutet 3, 4, 5 oder 6;

m bedeutet 0, 1, 2, 3, 4 oder 5;

25

n bedeutet 0, 1 oder 2;

p bedeutet 0 oder 1;

- 30 q bedeutet 3, 4 oder 5;

s bedeutet 0, 1, 2, 3 oder 4;

t bedeutet 0, 1 oder 2.

Besonders bevorzugt sind 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-Heteroarylisoaxazolin-5-thioamide der Formel (I), worin

R^1 und R^2 bedeuten unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod und Cyano substituiertes (C_1-C_4) -Alkyl;

R^3 bedeutet durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano, (C_1-C_2) -Alkoxy-substituiertes (C_1-C_4) -Alkyl, (C_3-C_4) -Cycloalkyl, (C_2-C_3) -Alkenyl oder (C_2-C_3) -Alkinyl,

A bedeutet eine Bindung oder eine divalente Einheit aus der Gruppe bestehend aus CH_2 , CH_2CH_2 , $CHCH_3$, $CH_2CH_2CH_2$, $CH(CH_2CH_3)$, $CH(CH_3)CH_2$, $C(CH_3)_2$, $C(CH_3)_2CH_2$, $C(iPr)CH_3$, $CH(CH_2iPr)CH_2$, $CH_2CH=CH$, $C(CH_3)_2C\equiv C$, $CH(CF_3)CH_2$, $CH(CH_3)CH_2O$, CH_2CH_2O , $CH(cPr)CH_2O$, $CH(CH_2OCH_3)$, $CH(CH_2CH_2SCH_3)$, $CH(COOH)$, $CH(COOCH_3)$, $CH(COOH)CH_2$, $CH(COOCH_3)CH_2$, $CH_2COH(CF_3)$, $CH(CONHCH_3)$, $CH(CONHCH_3)CH_2$ und $CH_2CH_2CONHCH_2$;


R^4 bedeutet Wasserstoff oder (C_1-C_8) -Alkyl;

Y bedeutet Sauerstoff oder Schwefel;

X bedeutet Wasserstoff, Cyano, Hydroxy, X^1 , oder

durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Cyano, Hydroxy, OR^7 , X^1 , OX^1 , NHX^1 , $S(O)_n R^5$, CO_2R^8 , $CONR^6R^8$, $CONR^8SO_2R^5$ und POR^9R^9 substituiertes (C_1-C_{12}) -Alkyl, (C_3-C_8) -Cycloalkyl, (C_2-C_{12}) -Alkenyl oder (C_2-C_{12}) -Alkinyl;

X^1 bedeutet einen durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus R^6 , R^{6a} , R^8 und R^9 substituierten Ring aus der Gruppe bestehend aus



- 10 Het bedeutet Pyridin-2-yl, Pyridin-3-yl, Pyridin-4-yl, Pyridazin-3-yl, Pyridazin-4-yl, Pyrimidin-2-yl, Pyrimidin-4-yl, Pyrimidin-5-yl, Pyrazin-2-yl, 1,2,4-Triazin-3-yl, 1,2,4-Triazin-5-yl, 1,2,4-Triazin-6-yl, 1,3,5-Triazin-2-yl, Pyrrol-3-yl, Furan-2-yl, Furan-3-yl, Thiophen-2-yl, Thiophen-3-yl, Pyrazol-3-yl, Pyrazol-4-yl, Oxazol-2-yl: Oxazol-4-yl, Oxazol-5-yl, Thiazol-2-yl, Thiazol-4-yl, Thiazol-5-yl, Isoxazol-3-yl, Isoxazol-4-yl,
- 15 Isoxazol-5-yl, Isothiazol-3-yl, Isothiazol-4-yl, Isothiazol-5-yl, 1H-1,2,3-triazol-4-yl, 2H-

1,2,3-triazol-4-yl, 1H-1,2,4-Triazol-3-yl, 1,2,4-Oxadiazol-3-yl, 1,2,4-Oxadiazol-5-yl, 1,2,4-Thiadiazol-3-yl, 1,2,4-Thiadiazol-5-yl, 1,3,4-Oxadiazol-2-yl, 1,3,4-Thiadiazol-2-yl, 2H-Tetrazol-5-yl oder 4,5-Dihydro-1,2-oxazol-3-yl.

- 5 R bedeutet, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor und Chlor substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, oder durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor und Chlor substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy;

10

R⁵ bedeutet Methyl oder Ethyl;

R⁶ bedeutet Wasserstoff oder R⁵;

- 15 R^{6a} bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Jod, Cyano, Hydroxy, S(O)_nR⁵ oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy;

- 20 R⁷ bedeutet Wasserstoff oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor und Chlor substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl;

R⁸ bedeutet R⁷;

- 25 R⁹ bedeutet (C₁-C₃)-Alkoxy;

m bedeutet 0, 1, 2 oder 3;


n bedeutet 0, 1 oder 2;

- 30 s bedeutet 0, 1, 2, 3 oder 4;

t bedeutet 0, 1 oder 2.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können gemäß dem Fachmann an sich bekannten Reaktionen beispielsweise nach der in Schema 1 genannten Reaktionsfolge hergestellt werden.

Schema 1:




10 Solche 1,3-dipolaren Cycloadditionen von Nitriloxiden mit geeigneten Dipolarophilen sind beispielsweise beschrieben in Reviews: 1,3 dipolar Cycloaddition Chemistry, Padwa, ed. Wiley, New York, 1984; Kanemasa and Tsuge, Heterocycles 1990, 30, 719.

15 Erfindungsgemäße Verbindungen, die in der 4- und 5- Position des Isoxazolin-ringsystems substituiert sind, lassen sich ebenfalls durch 1,3 dipolare Cycloaddition herstellen, indem geeignet 1,2-disubstituierte Olefine als Dipolarophile eingesetzt werden. Zumeist entstehen bei dieser Reaktion Diastereomeren-gemische, die durch Säulenchromatographie getrennt werden können. Optisch aktive Isoxazoline können durch chirale HPLC geeigneter Vorstufen oder Endstufen erhalten werden, ebenso auch durch enantioselektive Reaktionen wie z.B. enzymatische Ester- oder Amidspaltungen oder durch den Einsatz von chiralen Hilfsreagenzien am Dipolarophiel

20 wie von Olssen beschrieben, (J. Org.Chem. 1988, 53, 2468).

Erfindungsgemäße Verbindungen können auch durch den Einsatz von käuflichen, geeignet substituierten Alkenen als Edukt hergestellt werden. So können geeignet substituierte Acrylsäureester oder Acrylsäureamide eingesetzt werden.


Schema 2:



Zur Aktivierung der Acrylsäure bieten sich dabei Carbodiimide wie zum Beispiel EDCI an (Chen, F. M. F.; Benoiton, N. L. Synthesis 1979, 709). Zur Herstellung von

- 5 Acrylsäureamiden siehe US2521902, JP60112746, J. of Polymer Science 1979, 17 (6), 1655. Geeignet substituierte Acrylsäureamide können in einer 1,3-Cycloadditionsreaktion mit Nitriloxiden zu den erfindungsgemäßen Verbindungen umgesetzt werden.

10 Schema 3:




Transformationen der funktionellen Gruppen R^3 sind sowohl auf der Stufe der Alkene als auch auf der Stufe der Isoxazoline möglich. In Schema 4 ist der Zugang zu

15 verschiedenen R^3 -substituierten Isoxazolinen beschrieben.


19

Schema 4:



Erfindungsgemäße Verbindungen, die als Substituent R^3 eine Vinyl-Gruppe aufweisen, lassen sich von den erfindungsgemäße Verbindungen, die als Substituent R^3 eine Hydroxymethyl-Gruppe aufweisen, herstellen wie in Schema 5 erläutert

Schema 5:



Erfindungsgemäße Verbindungen, die als Substituent R^3 eine Cyano-Gruppe aufweisen, lassen sich analog unter Verwendung geeigneter Cyanacrylate wie zum Beispiel Ethyl-2-cyanacrylat aufbauen. Geeignet substituierte Crotonsäureester können zur Herstellung von R^2 und R^3 disubstituierten Isoxazolinen genutzt werden. Crotonsäureester sind zum Teil käuflich und können auch beispielsweise aus 3-

Bromacrylsäureethylester durch nucleophile Substitutionsreaktionen hergestellt werden. Solche Methoden sind beispielsweise beschrieben in Birkofer, L.; Hempel, K. Chem. Ber., 1963, 96, 1373; Tanoury, G.J.; Chen, M.; Dong, Y.; Forslund, R. E.; Magdziak, D.; Organic Letters, 2008, 10, 185.

5

Die Herstellung von geeignet substituierten 2-Alkoxyacrylsäureestern (für den Fall dass R³ Alkoxy ist) ist beispielsweise durch Umsetzung von alfa-Ketoestern zu entsprechenden Ketalen (Lit.: Wenkert, E; Alonso, M.E.; Buckwalter B.L., Sanchez E.L. J. Am Chem Soc. 1983, 105, 2021 and Lit.: LaMattina, J.L.; Mularski, C.J., J. Org Chem. 1984, 49, 4800), und deren Eliminierung zu 2-Alkoxyacrylsäureestern möglich (analog Lit.: Esswein A. et al, Helvetica Chimica Acta 1989, 72(2), 213.)

10

In Schema 6 ist der Zugang zu 3-Heteroarylisoaxazolin-5-thioamiden durch Umsetzung der 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamiden durch den Einsatz des Lawesson-Reagenz beschrieben. (Lit.: WYETH, WO2003/93277, Lit.: Wishka D.G., Walker D.P., Tetrahedron Letters 2011, 52, 4713-4715)

15

Schema 6:



20

Kollektionen aus Verbindungen der Formel (I) und/oder deren Salzen, die nach den oben genannten Reaktionen synthetisiert werden können, können auch in parallelisierter Weise hergestellt werden, wobei dies in manueller, teilweise automatisierter oder vollständig automatisierter Weise geschehen kann. Dabei ist es beispielsweise möglich, die Reaktionsdurchführung, die Aufarbeitung oder die Reinigung der Produkte bzw. Zwischenstufen zu automatisieren. Insgesamt wird hierunter eine Vorgehensweise verstanden, wie sie beispielsweise durch D. Tiebes in Combinatorial Chemistry – Synthesis, Analysis, Screening (Herausgeber Günther Jung), Verlag Wiley 1999, auf den Seiten 1 bis 34 beschrieben ist.

25

30

Zur parallelisierten Reaktionsdurchführung und Aufarbeitung können eine Reihe von im Handel erhältlichen Geräten verwendet werden, beispielsweise Calpyso-Reaktionsblöcke (Calpyso reaction blocks) der Firma Barnstead International, Dubuque, Iowa 52004-0797, USA oder Reaktionsstationen (reaction stations) der
5 Firma Radleys, Shirehill, Saffron Walden, Essex, CB 11 3AZ, England oder MultiPROBE Automated Workstations der Firma Perkin Elmar, Waltham, Massachusetts 02451, USA. Für die parallelisierte Aufreinigung von Verbindungen der Formel (I) und deren Salzen beziehungsweise von bei der Herstellung anfallenden Zwischenprodukten stehen unter anderem Chromatographieapparaturen zur
10 Verfügung, beispielsweise der Firma ISCO, Inc., 4700 Superior Street, Lincoln, NE 68504, USA.

Die aufgeführten Apparaturen führen zu einer modularen Vorgehensweise, bei der die einzelnen Arbeitsschritte automatisiert sind, zwischen den Arbeitsschritten jedoch
15 manuelle Operationen durchgeführt werden müssen. Dies kann durch den Einsatz von teilweise oder vollständig integrierten Automationssystemen umgangen werden, bei denen die jeweiligen Automations-module beispielsweise durch Roboter bedient werden. Derartige Automationssysteme können zum Beispiel von der Firma Caliper, Hopkinton, MA 01748, USA bezogen werden.

20 Die Durchführung einzelner oder mehrerer Syntheseschritte kann durch den Einsatz von Polymer-supported reagents/Scavenger-Harze unterstützt werden. In der Fachliteratur sind eine Reihe von Versuchsprotokollen beschrieben, beispielsweise in ChemFiles, Vol. 4, No. 1, Polymer-Supported Scavengers and Reagents for Solution-
25 Phase Synthesis (Sigma-Aldrich).

Neben den hier beschriebenen Methoden kann die Herstellung von Verbindungen der Formel (I) und deren Salzen vollständig oder partiell durch Festphasen unterstützte Methoden erfolgen. Zu diesem Zweck werden einzelne Zwischenstufen oder alle
30 Zwischenstufen der Synthese oder einer für die entsprechende Vorgehensweise angepassten Synthese an ein Syntheseharz gebunden. Festphasen- unterstützte Synthesemethoden sind in der Fachliteratur hinreichend beschrieben, z.B. Barry A. Bunin in "The Combinatorial Index", Verlag Academic Press, 1998 und Combinatorial Chemistry – Synthesis, Analysis, Screening (Herausgeber Günther Jung), Verlag

Wiley, 1999. Die Verwendung von Festphasen- unterstützten Synthesemethoden erlaubt eine Reihe von literaturbekannten Protokollen, die wiederum manuell oder automatisiert ausgeführt werden können. Die Reaktionen können beispielsweise mittels IRORI-Technologie in Mikroreaktoren (microreactors) der Firma Nexus
5 Biosystems, 12140 Community Road, Poway, CA92064, USA durchgeführt werden.

Sowohl an fester als auch in flüssiger Phase kann die Durchführung einzelner oder mehrerer Syntheseschritte durch den Einsatz der Mikrowellen-Technologie unterstützt werden. In der Fachliteratur sind eine Reihe von Versuchsprotokollen beschrieben,
10 beispielsweise in Microwaves in Organic and Medicinal Chemistry (Herausgeber C. O. Kappe und a. Stadler), Verlag Wiley, 2005.

Die Herstellung gemäß der hier beschriebenen Verfahren liefert Verbindungen der Formel (I) und deren Salze in Form von Substanzkollektionen, die Bibliotheken
15 genannt werden. Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind auch Bibliotheken, die mindestens zwei Verbindungen der Formel (I) und deren Salzen enthalten.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) (und/oder deren Salze), im folgenden zusammen als „erfindungsgemäße Verbindungen“ bezeichnet, weisen eine
20 ausgezeichnete herbizide Wirksamkeit gegen ein breites Spektrum wirtschaftlich wichtiger mono- und dikotyler annueller Schadpflanzen auf. Auch schwer bekämpfbare perennierende Schadpflanzen, die aus Rhizomen, Wurzelstöcken oder anderen Dauerorganen austreiben, werden durch die Wirkstoffe gut erfaßt.

25 Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Verfahren zur Bekämpfung von unerwünschten Pflanzen oder zur Wachstumsregulierung von Pflanzen, vorzugsweise in Pflanzenkulturen, worin eine oder mehrere erfindungsgemäße Verbindung(en) auf die Pflanzen (z.B. Schadpflanzen wie mono- oder dikotyle Unkräuter oder unerwünschte Kulturpflanzen), das Saatgut (z.B. Körner, Samen oder
30 vegetative Vermehrungsorgane wie Knollen oder Sprosssteile mit Knospen) oder die Fläche, auf der die Pflanzen wachsen (z.B. die Anbaufläche), ausgebracht werden. Dabei können die erfindungsgemäßen Verbindungen z.B. im Vorsaats- (ggf. auch durch Einarbeitung in den Boden), Vorauf- oder Nachaufverfahren ausgebracht werden. Im einzelnen seien beispielhaft einige Vertreter der mono- und dikotylen

Unkrautflora genannt, die durch die erfindungsgemäßen Verbindungen kontrolliert werden können, ohne dass durch die Nennung eine Beschränkung auf bestimmte Arten erfolgen soll.

- 5 Monokotyle Schadpflanzen der Gattungen: Aegilops, Agropyron, Agrostis, Alopecurus, Apera, Avena, Brachiaria, Bromus, Cenchrus, Commelina, Cynodon, Cyperus, Dactyloctenium, Digitaria, Echinochloa, Eleocharis, Eleusine, Eragrostis, Eriochloa, Festuca, Fimbristylis, Heteranthera, Imperata, Ischaemum, Leptochloa, Lolium, Monochoria, Panicum, Paspalum, Phalaris, Phleum, Poa, Rottboellia, Sagittaria, Scirpus, Setaria,
10 Sorghum.

- Dikotyle Unkräuter der Gattungen: Abutilon, Amaranthus, Ambrosia, Anoda, Anthemis, Aphanes, Artemisia, Atriplex, Bellis, Bidens, Capsella, Carduus, Cassia, Centaurea, Chenopodium, Cirsium, Convolvulus, Datura, Desmodium, Emex, Erysimum,
15 Euphorbia, Galeopsis, Galinsoga, Galium, Hibiscus, Ipomoea, Kochia, Lamium, Lepidium, Lindernia, Matricaria, Mentha, Mercurialis, Mullugo, Myosotis, Papaver, Pharbitis, Plantago, Polygonum, Portulaca, Ranunculus, Raphanus, Rorippa, Rotala, Rumex, Salsola, Senecio, Sesbania, Sida, Sinapis, Solanum, Sonchus, Sphenoclea, Stellaria, Taraxacum, Thlaspi, Trifolium, Urtica, Veronica, Viola, Xanthium.

20

Werden die erfindungsgemäßen Verbindungen vor dem Keimen auf die Erdoberfläche appliziert, so wird entweder das Auflaufen der Unkrautkeimlinge vollständig verhindert oder die Unkräuter wachsen bis zum Keimblattstadium heran, stellen jedoch dann ihr Wachstum ein und sterben schließlich nach Ablauf von drei bis vier Wochen

- 25 vollkommen ab.

- Bei Applikation der Wirkstoffe auf die grünen Pflanzenteile im Nachauflaufverfahren tritt nach der Behandlung Wachstumsstop ein und die Schadpflanzen bleiben in dem zum Applikationszeitpunkt vorhandenen Wachstumsstadium stehen oder sterben nach
30 einer gewissen Zeit ganz ab, so dass auf diese Weise eine für die Kulturpflanzen schädliche Unkrautkonkurrenz sehr früh und nachhaltig beseitigt wird.

Obgleich die erfindungsgemäßen Verbindungen eine ausgezeichnete herbizide Aktivität gegenüber mono- und dikotylen Unkräutern aufweisen, werden Kulturpflanzen

wirtschaftlich bedeutender Kulturen z.B. dikotyler Kulturen der Gattungen Arachis, Beta, Brassica, Cucumis, Cucurbita, Helianthus, Daucus, Glycine, Gossypium, Ipomoea, Lactuca, Linum, Lycopersicon, Nicotiana, Phaseolus, Pisum, Solanum, Vicia, oder monokotyler Kulturen der Gattungen Allium, Ananas, Asparagus, Avena, Hordeum, Oryza, Panicum, Saccharum, Secale, Sorghum, Triticale, Triticum, Zea, insbesondere Zea und Triticum, abhängig von der Struktur der jeweiligen erfindungsgemäßen Verbindung und deren Aufwandmenge nur unwesentlich oder gar nicht geschädigt. Die vorliegenden Verbindungen eignen sich aus diesen Gründen sehr gut zur selektiven Bekämpfung von unerwünschtem Pflanzenwuchs in Pflanzenkulturen wie landwirtschaftlichen Nutzpflanzen oder Zierpflanzen.

Darüberhinaus weisen die erfindungsgemäßen Verbindungen (abhängig von ihrer jeweiligen Struktur und der ausgebrachten Aufwandmenge) hervorragende wachstumsregulatorische Eigenschaften bei Kulturpflanzen auf. Sie greifen regulierend in den pflanzeigenen Stoffwechsel ein und können damit zur gezielten Beeinflussung von Pflanzeninhaltsstoffen und zur Ernteerleichterung wie z.B. durch Auslösen von Desikkation und Wuchsstauchung eingesetzt werden. Desweiteren eignen sie sich auch zur generellen Steuerung und Hemmung von unerwünschtem vegetativen Wachstum, ohne dabei die Pflanzen abzutöten. Eine Hemmung des vegetativen Wachstums spielt bei vielen mono- und dikotylen Kulturen eine große Rolle, da beispielsweise die Lagerbildung hierdurch verringert oder völlig verhindert werden kann.

Aufgrund ihrer herbiziden und pflanzenwachstumsregulatorischen Eigenschaften können die Wirkstoffe auch zur Bekämpfung von Schadpflanzen in Kulturen von bekannten oder noch zu entwickelnden gentechnisch veränderten Pflanzen eingesetzt werden. Die transgenen Pflanzen zeichnen sich in der Regel durch besondere vorteilhafte Eigenschaften aus, beispielsweise durch Resistenzen gegenüber bestimmten Pestiziden, vor allem bestimmten Herbiziden, Resistenzen gegenüber Pflanzenkrankheiten oder Erregern von Pflanzenkrankheiten wie bestimmten Insekten oder Mikroorganismen wie Pilzen, Bakterien oder Viren. Andere besondere Eigenschaften betreffen z.B. das Erntegut hinsichtlich Menge, Qualität, Lagerfähigkeit, Zusammensetzung und spezieller Inhaltsstoffe. So sind transgene Pflanzen mit erhöhtem Stärkegehalt oder veränderter Qualität der Stärke oder solche mit anderer

Fettsäurezusammensetzung des Ernteguts bekannt. Weitere besondere Eigenschaften können in einer Toleranz oder Resistenz gegen abiotische Stressoren z.B. Hitze, Kälte, Trockenheit, Salz und ultraviolette Strahlung liegen.

- 5 Bevorzugt ist die Anwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) oder deren Salze in wirtschaftlich bedeutenden transgenen Kulturen von Nutz- und Zierpflanzen, z.B. von Getreide wie Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Hirse, Reis, Maniok und Mais oder auch Kulturen von Zuckerrübe, Baumwolle, Soja, Raps, Kartoffel, Tomate, Erbse und anderen Gemüsesorten.

10

Vorzugsweise können die Verbindungen der Formel (I) als Herbizide in Nutzpflanzenkulturen eingesetzt werden, welche gegenüber den phytotoxischen Wirkungen der Herbizide resistent sind bzw. gentechnisch resistent gemacht wurden.

- 15 Herkömmliche Wege zur Herstellung neuer Pflanzen, die im Vergleich zu bisher vorkommenden Pflanzen modifizierte Eigenschaften aufweisen, bestehen beispielsweise in klassischen Züchtungsverfahren und der Erzeugung von Mutanten. Alternativ können neue Pflanzen mit veränderten Eigenschaften mit Hilfe gentechnischer Verfahren erzeugt werden (siehe z.B. EP 0221044, EP 0131624).

- 20 Beschrieben wurden beispielsweise in mehreren Fällen gentechnische Veränderungen von Kulturpflanzen zwecks Modifikation der in den Pflanzen synthetisierten Stärke (z.B. WO 92/011376 A, WO 92/014827 A, WO 91/019806 A),

- transgene Kulturpflanzen, welche gegen bestimmte Herbizide vom Typ Glufosinate (vgl. z.B. EP 0242236 A, EP 0242246 A) oder Glyphosate (WO 92/000377 A) oder der
25 Sulfonylharnstoffe (EP 0257993 A, US 5,013,659) oder gegen Kombinationen oder Mischungen dieser Herbizide durch „gene stacking“ resistent sind, wie transgenen Kulturpflanzen z. B. Mais oder Soja mit dem Handelsnamen oder der Bezeichnung Optimum™ GAT™ (Glyphosate ALS Tolerant).

- transgene Kulturpflanzen, beispielsweise Baumwolle, mit der Fähigkeit *Bacillus thuringiensis*-Toxine (Bt-Toxine) zu produzieren, welche die Pflanzen gegen
30 bestimmte Schädlinge resistent machen (EP 0142924 A, EP 0193259 A).
- transgene Kulturpflanzen mit modifizierter Fettsäurezusammensetzung (WO 91/013972 A).
- gentechnisch veränderte Kulturpflanzen mit neuen Inhalts- oder Sekundärstoffen

z.B. neuen Phytoalexinen, die eine erhöhte Krankheitsresistenz verursachen (EP 0309862 A, EP 0464461 A)

- gentechnisch veränderte Pflanzen mit reduzierter Photorespiration, die höhere Erträge und höhere Stresstoleranz aufweisen (EP 0305398 A)
- 5 - transgene Kulturpflanzen, die pharmazeutisch oder diagnostisch wichtige Proteine produzieren („molecular pharming“)
- transgene Kulturpflanzen, die sich durch höhere Erträge oder bessere Qualität auszeichnen
- transgene Kulturpflanzen die sich durch eine Kombinationen z.B. der o. g. neuen
- 10 Eigenschaften auszeichnen („gene stacking“)

Zahlreiche molekularbiologische Techniken, mit denen neue transgene Pflanzen mit veränderten Eigenschaften hergestellt werden können, sind im Prinzip bekannt; siehe z.B. I. Potrykus und G. Spangenberg (eds.) Gene Transfer to Plants, Springer Lab Manual (1995), Springer Verlag Berlin, Heidelberg. oder Christou, "Trends in Plant

15 Science" 1 (1996) 423-431).

Für derartige gentechnische Manipulationen können Nucleinsäuremoleküle in Plasmide eingebracht werden, die eine Mutagenese oder eine Sequenzveränderung durch Rekombination von DNA-Sequenzen erlauben. Mit Hilfe von Standardverfahren

20 können z.B. Basenaustausche vorgenommen, Teilsequenzen entfernt oder natürliche oder synthetische Sequenzen hinzugefügt werden. Für die Verbindung der DNA-Fragmente untereinander können an die Fragmente Adaptoren oder Linker angesetzt werden, siehe z.B. Sambrook et al., 1989, Molecular Cloning, A Laboratory Manual, 2. Aufl. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY; oder Winnacker

25 "Gene und Klone", VCH Weinheim 2. Auflage 1996

Die Herstellung von Pflanzenzellen mit einer verringerten Aktivität eines Genprodukts kann beispielsweise erzielt werden durch die Expression mindestens einer entsprechenden antisense-RNA, einer sense-RNA zur Erzielung eines

30 Cosuppressionseffektes oder die Expression mindestens eines entsprechend konstruierten Ribozyms, das spezifisch Transkripte des obengenannten Genprodukts spaltet. Hierzu können zum einen DNA-Moleküle verwendet werden, die die gesamte codierende Sequenz eines Genprodukts einschließlich eventuell vorhandener flankierender Sequenzen umfassen, als auch DNA-Moleküle, die nur Teile der

codierenden Sequenz umfassen, wobei diese Teile lang genug sein müssen, um in den Zellen einen antisense-Effekt zu bewirken. Möglich ist auch die Verwendung von DNA-Sequenzen, die einen hohen Grad an Homologie zu den codierenden Sequenzen eines Genprodukts aufweisen, aber nicht vollkommen identisch sind.

5

Bei der Expression von Nucleinsäuremolekülen in Pflanzen kann das synthetisierte Protein in jedem beliebigen Kompartiment der pflanzlichen Zelle lokalisiert sein. Um aber die Lokalisation in einem bestimmten Kompartiment zu erreichen, kann z.B. die codierende Region mit DNA-Sequenzen verknüpft werden, die die Lokalisierung in einem bestimmten Kompartiment gewährleisten. Derartige Sequenzen sind dem Fachmann bekannt (siehe beispielsweise Braun et al., EMBO J. 11 (1992), 3219-3227; Wolter et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 85 (1988), 846-850; Sonnewald et al., Plant J. 1 (1991), 95-106). Die Expression der Nukleinsäuremoleküle kann auch in den Organellen der Pflanzenzellen stattfinden.

15

Die transgenen Pflanzenzellen können nach bekannten Techniken zu ganzen Pflanzen regeneriert werden. Bei den transgenen Pflanzen kann es sich prinzipiell um Pflanzen jeder beliebigen Pflanzenspezies handeln, d.h., sowohl monokotyle als auch dikotyle Pflanzen. So sind transgene Pflanzen erhältlich, die veränderte Eigenschaften durch Überexpression, Suppression oder Inhibierung homologer (= natürlicher) Gene oder Gensequenzen oder Expression heterologer (= fremder) Gene oder Gensequenzen aufweisen.

20

Vorzugsweise können die erfindungsgemäßen Verbindungen (I) in transgenen Kulturen eingesetzt werden, welche gegen Wuchsstoffe, wie z.B. 2,4 D, Dicamba oder gegen Herbizide, die essentielle Pflanzenenzyme, z.B. Acetolactatsynthasen (ALS), EPSP Synthasen, Glutaminsynthasen (GS) oder Hydroxyphenylpyruvat Dioxygenasen (HPPD) hemmen, respektive gegen Herbizide aus der Gruppe der Sulfonylharnstoffe, der Glyphosate, Glufosinate oder Benzoylisoxazole und analogen Wirkstoffe, oder gegen beliebige Kombinationen dieser Wirkstoffe, resistent sind.

30

Besonders bevorzugt können die erfindungsgemäßen Verbindungen in transgenen Kulturpflanzen eingesetzt werden, die gegen eine Kombination von Glyphosaten und Glufosinaten, Glyphosaten und Sulfonylharnstoffen oder Imidazolinonen resistent sind.

Ganz besonders bevorzugt können die erfindungsgemäßen Verbindungen in transgenen Kulturpflanzen wie z. B. Mais oder Soja mit dem Handelsnamen oder der Bezeichnung Optimum™ GAT™ (Glyphosate ALS Tolerant) eingesetzt werden.

- 5 Bei der Anwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe in transgenen Kulturen treten neben den in anderen Kulturen zu beobachtenden Wirkungen gegenüber Schadpflanzen oftmals Wirkungen auf, die für die Applikation in der jeweiligen transgenen Kultur spezifisch sind, beispielsweise ein verändertes oder speziell erweitertes Unkrautspektrum, das bekämpft werden kann, veränderte
- 10 Aufwandmengen, die für die Applikation eingesetzt werden können, vorzugsweise gute Kombinierbarkeit mit den Herbiziden, gegenüber denen die transgene Kultur resistent ist, sowie Beeinflussung von Wuchs und Ertrag der transgenen Kulturpflanzen.
- 15 Gegenstand der Erfindung ist deshalb auch die Verwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel (I) und der Verbindungen der Formel (Ia) als Herbizide zur Bekämpfung von Schadpflanzen in transgenen Kulturpflanzen.

- Die erfindungsgemäßen Verbindungen können in Form von Spritzpulvern,
- 20 emulgierbaren Konzentraten, versprühbaren Lösungen, Stäubemitteln oder Granulaten in den üblichen Zubereitungen angewendet werden. Gegenstand der Erfindung sind deshalb auch herbizide und pflanzenwachstumsregulierende Mittel, welche die erfindungsgemäßen Verbindungen enthalten.

- 25 Die erfindungsgemäßen Verbindungen sind insbesondere als Herbizide geeignet.

- Die erfindungsgemäßen Verbindungen können auf verschiedene Art formuliert werden, je nachdem welche biologischen und/oder chemisch-physikalischen Parameter vorgegeben sind. Als Formulierungsmöglichkeiten kommen beispielsweise in Frage:
- 30 Spritzpulver (WP), wasserlösliche Pulver (SP), wasserlösliche Konzentrate, emulgierbare Konzentrate (EC), Emulsionen (EW), wie Öl-in-Wasser- und Wasser-in-Öl-Emulsionen, versprühbare Lösungen, Suspensionskonzentrate (SC), Dispersionen auf Öl- oder Wasserbasis, ölmischbare Lösungen, Kapselsuspensionen (CS), Stäubemittel (DP), Beizmittel, Granulate für die Streu- und Bodenapplikation,

Granulate (GR) in Form von Mikro-, Sprüh-, Aufzugs- und Adsorptionsgranulaten, wasserdispergierbare Granulate (WG), wasserlösliche Granulate (SG), ULV-Formulierungen, Mikrokapseln und Wachse. Diese einzelnen Formulierungstypen sind im Prinzip bekannt und werden beispielsweise beschrieben in: Winnacker-Küchler, 5 "Chemische Technologie", Band 7, C. Hanser Verlag München, 4. Aufl. 1986, Wade van Valkenburg, "Pesticide Formulations", Marcel Dekker, N.Y., 1973, K. Martens, "Spray Drying" Handbook, 3rd Ed. 1979, G. Goodwin Ltd. London.

Die notwendigen Formulierungshilfsmittel wie Inertmaterialien, Tenside, Lösungsmittel 10 und weitere Zusatzstoffe sind ebenfalls bekannt und werden beispielsweise beschrieben in: Watkins, "Handbook of Insecticide Dust Diluents and Carriers", 2nd Ed., Darland Books, Caldwell N.J., H.v. Olphen, "Introduction to Clay Colloid Chemistry", 2nd Ed., J. Wiley & Sons, N.Y., C. Marsden, "Solvents Guide", 2nd Ed., Interscience, N.Y. 1963, McCutcheon's "Detergents and Emulsifiers Annual", MC Publ. 15 Corp., Ridgewood N.J., Sisley and Wood, "Encyclopedia of Surface Active Agents", Chem. Publ. Co. Inc., N.Y. 1964, Schönfeldt, "Grenzflächenaktive Äthylenoxid-addukte", Wiss. Verlagsgesell., Stuttgart 1976, Winnacker-Küchler, "Chemische Technologie", Band 7, C. Hanser Verlag München, 4. Aufl. 1986.

20 Auf der Basis dieser Formulierungen lassen sich auch Kombinationen mit anderen Wirkstoffen, wie z.B. Insektiziden, Akariziden, Herbiziden, Fungiziden, sowie mit Safenern, Düngemitteln und/oder Wachstumsregulatoren herstellen, z.B. in Form einer Fertigformulierung oder als Tankmix. Geeignete Safener sind beispielsweise Mefenpyr-diethyl, Cyprosulfamid, Isoxadifen-ethyl, Cloquintocet-mexyl und Dichlormid.

25 Spritzpulver sind in Wasser gleichmäßig dispergierbare Präparate, die neben dem Wirkstoff außer einem Verdünnungs- oder Inertstoff noch Tenside ionischer und/oder nichtionischer Art (Netzmittel, Dispergiermittel), z.B. polyoxyethylierte Alkylphenole, polyoxethylierte Fettalkohole, polyoxethylierte Fettamine, Fettalkoholpolyglykoether-sulfate, Alkansulfonate, Alkylbenzolsulfonate, ligninsulfonsaures Natrium, 30 2,2'-dinaphthylmethan-6,6'-disulfonsaures Natrium, dibutyl-naphthalin-sulfonsaures Natrium oder auch oleoilmethyltaurinsaures Natrium enthalten. Zur Herstellung der Spritzpulver werden die herbiziden Wirkstoffe beispielsweise in üblichen Apparaturen

wie Hammermühlen, Gebläsemühlen und Luftstrahlmühlen feingemahlen und gleichzeitig oder anschließend mit den Formulierungshilfsmitteln vermischt.

- Emulgierbare Konzentrate werden durch Auflösen des Wirkstoffes in einem
- 5 organischen Lösungsmittel z.B. Butanol, Cyclohexanon, Dimethylformamid, Xylol oder auch höhersiedenden Aromaten oder Kohlenwasserstoffen oder Mischungen der organischen Lösungsmittel unter Zusatz von einem oder mehreren Tensiden ionischer und/oder nichtionischer Art (Emulgatoren) hergestellt. Als Emulgatoren können beispielsweise verwendet werden: Alkylarylsulfonsaure Calcium-Salze wie
- 10 Ca-Dodecylbenzolsulfonat oder nichtionische Emulgatoren wie Fettsäurepolyglykolester, Alkylarylpolyglykolether, Fettalkoholpolyglykolether, Propylenoxid-Ethylenoxid-Kondensationsprodukte, Alkylpolyether, Sorbitanester wie z.B. Sorbitanfettsäureester oder Polyoxethylensorbitanester wie z.B. Polyoxyethylensorbitanfettsäureester.
- 15 Stäubemittel erhält man durch Vermahlen des Wirkstoffes mit fein verteilten festen Stoffen, z.B. Talkum, natürlichen Tonen, wie Kaolin, Bentonit und Pyrophyllit, oder Diatomeenerde.
- 20 Suspensionskonzentrate können auf Wasser- oder Ölbasis sein. Sie können beispielsweise durch Naß-Vermahlung mittels handelsüblicher Perlmühlen und gegebenenfalls Zusatz von Tensiden, wie sie z.B. oben bei den anderen Formulierungstypen bereits aufgeführt sind, hergestellt werden.
- 25 Emulsionen, z.B. Öl-in-Wasser-Emulsionen (EW), lassen sich beispielsweise mittels Rühren, Kolloidmühlen und/oder statischen Mischern unter Verwendung von wäßrigen organischen Lösungsmitteln und gegebenenfalls Tensiden, wie sie z.B. oben bei den anderen Formulierungstypen bereits aufgeführt sind, herstellen.
- 30 Granulate können entweder durch Verdüsen des Wirkstoffes auf adsorptionsfähiges, granuliertes Inertmaterial hergestellt werden oder durch Aufbringen von Wirkstoffkonzentraten mittels Klebemitteln, z.B. Polyvinylalkohol, polyacrylsaurem Natrium oder auch Mineralölen, auf die Oberfläche von Trägerstoffen wie Sand, Kaolinite oder von granuliertem Inertmaterial. Auch können geeignete Wirkstoffe in der

für die Herstellung von Düngemittelgranulaten üblichen Weise - gewünschtenfalls in Mischung mit Düngemitteln - granuliert werden.

Wasserdispergierbare Granulate werden in der Regel nach den üblichen Verfahren
5 wie Sprühtrocknung, Wirbelbett-Granulierung, Teller-Granulierung, Mischung mit Hochgeschwindigkeitsmischern und Extrusion ohne festes Inertmaterial hergestellt.

Zur Herstellung von Teller-, Fließbett-, Extruder- und Sprühgranulate siehe z.B. Verfahren in "Spray-Drying Handbook" 3rd ed. 1979, G. Goodwin Ltd., London, J.E.
10 Browning, "Agglomeration", Chemical and Engineering 1967, Seiten 147 ff, "Perry's Chemical Engineer's Handbook", 5th Ed., McGraw-Hill, New York 1973, S. 8-57.

Für weitere Einzelheiten zur Formulierung von Pflanzenschutzmitteln siehe z.B. G.C. Klingman, "Weed Control as a Science", John Wiley and Sons, Inc., New York, 1961,
15 Seiten 81-96 und J.D. Freyer, S.A. Evans, "Weed Control Handbook", 5th Ed., Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1968, Seiten 101-103.

Die agrochemischen Zubereitungen enthalten in der Regel 0.1 bis 99 Gew.-%, insbesondere 0.1 bis 95 Gew.-%, erfindungsgemäße Verbindungen. In Spritzpulvern
20 beträgt die Wirkstoff-konzentration z.B. etwa 10 bis 90 Gew.-%, der Rest zu 100 Gew.-% besteht aus üblichen Formulierungsbestandteilen. Bei emulgierbaren Konzentraten kann die Wirkstoffkonzentration etwa 1 bis 90, vorzugsweise 5 bis 80 Gew.-% betragen. Staubförmige Formulierungen enthalten 1 bis 30 Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise meistens 5 bis 20 Gew.-% an Wirkstoff, versprühbare Lösungen
25 enthalten etwa 0.05 bis 80, vorzugsweise 2 bis 50 Gew.-% Wirkstoff. Bei wasserdispergierbaren Granulaten hängt der Wirkstoffgehalt zum Teil davon ab, ob die wirksame Verbindung flüssig oder fest vorliegt und welche Granulierhilfsmittel, Füllstoffe usw. verwendet werden. Bei den in Wasser dispergierbaren Granulaten liegt der Gehalt an Wirkstoff beispielsweise zwischen 1 und 95 Gew.-%, vorzugsweise
30 zwischen 10 und 80 Gew.-%.

Daneben enthalten die genannten Wirkstoffformulierungen gegebenenfalls die jeweils üblichen Haft-, Netz-, Dispergier-, Emulgier-, Penetrations-, Konservierungs-,

Frostschutz- und Lösungsmittel, Füll-, Träger- und Farbstoffe, Entschäumer, Verdunstungshemmer und den pH-Wert und die Viskosität beeinflussende Mittel.

5 Auf der Basis dieser Formulierungen lassen sich auch Kombinationen mit anderen pestizid wirksamen Stoffen, wie z.B. Insektiziden, Akariziden, Herbiziden, Fungiziden, sowie mit Safenern, Düngemitteln und/oder Wachstumsregulatoren herstellen, z.B. in Form einer Fertigformulierung oder als Tankmix.

10 Zur Anwendung werden die in handelsüblicher Form vorliegenden Formulierungen gegebenenfalls in üblicher Weise verdünnt z.B. bei Spritzpulvern, emulgierbaren Konzentraten, Dispersionen und wasserdispergierbaren Granulaten mittels Wasser. Staubbörmige Zubereitungen, Boden- bzw. Streugranulate sowie versprühbare Lösungen werden vor der Anwendung üblicherweise nicht mehr mit weiteren inerten

15 Stoffen verdünnt. Mit den äußeren Bedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit, der Art des verwendeten Herbizids, u.a. variiert die erforderliche Aufwandmenge der Verbindungen der Formel (I). Sie kann innerhalb weiter Grenzen schwanken, z.B. zwischen 0,001 und 1,0 kg/ha oder mehr Aktivsubstanz, vorzugsweise liegt sie jedoch zwischen 0,005 und 750 g/ha.

20 Neben den herbiziden Eigenschaften weisen die erfindungsgemäßen Verbindungen auch gute fungizide Eigenschaften auf. Die vorliegende Erfindung betrifft somit auch ein Mittel, zum Bekämpfen von unerwünschten Mikroorganismen, umfassend die erfindungsgemäßen Wirkstoffe. Vorzugsweise handelt es sich um fungizide Mittel, welche landwirtschaftlich verwendbare Hilfsmittel, Solventien, Trägerstoffe, oberflä-

25 chenaktive Stoffe oder Streckmittel enthalten. Weiterhin betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zum Bekämpfen unerwünschter Mikroorganismen, dadurch gekennzeichnet, dass man die erfindungsgemäßen Wirkstoffe auf die phytopathogenen Pilze und/oder deren Lebensraum ausbringt.

30 Erfindungsgemäß bedeutet Trägerstoff eine natürliche oder synthetische, organische oder anorganische Substanz, mit welchen die Wirkstoffe zur besseren Anwendbarkeit, v.a. zum Aufbringen auf Pflanzen oder Pflanzenteile oder Saatgut, gemischt oder verbunden sind. Der Trägerstoff, welcher fest oder flüssig sein kann, ist im Allgemeinen inert und sollte in der Landwirtschaft verwendbar sein.

Als feste oder flüssige Trägerstoffe kommen infrage: z.B. Ammoniumsalze und natürliche Gesteinsmehle, wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse Kieselsäure, Aluminiumoxid und natürliche oder synthetische Silikate, Harze, Wachse, feste Düngemittel, Wasser, Alkohole, besonders Butanol, organische Solventien, Mineral- und Pflanzenöle sowie Derivate hiervon. Mischungen solcher Trägerstoffe können ebenfalls verwendet werden. Als feste Trägerstoffe für Granulate kommen infrage: z.B. gebrochene und fraktionierte natürliche Gesteine wie Calcit, Marmor, Bims, Sepiolith, Dolomit sowie synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem Material wie Sägemehl, Kokosnussschalen, Maiskolben und Tabakstängel.

Als verflüssigte gasförmige Streckmittel oder Trägerstoffe kommen solche Flüssigkeiten infrage, welche bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasförmig sind, z.B. Aerosol-Treibgase, wie Halogenkohlenwasserstoffe, sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid.

Es können in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, natürliche und synthetische pulverige, körnige oder latexförmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabikum, Polyvinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natürliche Phospholipide, wie Kepheline und Lecithine, und synthetische Phospholipide. Weitere Additive können mineralische und vegetabile Öle sein.

Im Falle der Benutzung von Wasser als Streckmittel können z.B. auch organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden. Als flüssige Lösungsmittel kommen im Wesentlichen infrage: Aromaten, wie Xylol, Toluol oder Alkylnaphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Dichlormethan, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie Cyclohexan oder Paraffine, z.B. Erdölfraktionen, mineralische und pflanzliche Öle, Alkohole, wie Butanol oder Glykol sowie deren Ether und Ester, Ketone, wie Aceton, Methyl-ethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, stark polare Lösungsmittel wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser.

Die erfindungsgemäßen Mittel können zusätzlich weitere Bestandteile enthalten, wie z.B. oberflächenaktive Stoffe. Als oberflächenaktive Stoffe kommen Emulgier- und/oder Schaum erzeugende Mittel, Dispergiermittel oder Benetzungsmittel mit ionischen oder nicht-ionischen Eigenschaften oder Mischungen dieser

oberflächenaktiven Stoffe infrage. Beispiele hierfür sind Salze von Polyacrylsäure, Salze von Lignosulphonsäure, Salze von Phenolsulphonsäure oder Naphthalinsulphonsäure, Polykondensate von Ethylenoxid mit Fettalkoholen oder mit Fettsäuren oder mit Fettaminen, substituierten Phenolen (vorzugsweise Alkylphenole oder Arylphenole), Salze von Sulphobernsteinsäureestern, Taurinderivate (vorzugsweise Alkyltaurate), Phosphorsäureester von polyethoxylierten Alkoholen oder Phenole, Fettsäureester von Polyolen, und Derivate der Verbindungen enthaltend Sulphate, Sulphonate und Phosphate, z.B. Alkylarylpolglycolether, Alkylsulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate, Eiweißhydrolysate, Lignin-Sulfitablaugen und Methyl-cellulose. Die Anwesenheit einer oberflächenaktiven Substanz ist notwendig, wenn einer der Wirkstoff und/oder einer der inerten Trägerstoffe nicht in Wasser löslich ist und wenn die Anwendung in Wasser erfolgt. Der Anteil an oberflächenaktiven Stoffen liegt zwischen 5 und 40 Gewichtsprozent des erfindungsgemäßen Mittels. Es können Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z.B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyankblau und organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfarbstoffe und Spurennährstoffe, wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, Molybdän und Zink verwendet werden.

Gegebenenfalls können auch andere zusätzliche Komponenten enthalten sein, z.B. schützende Kolloide, Bindemittel, Klebstoffe, Verdicker, thixotrope Stoffe, Penetrationsförderer, Stabilisatoren, Sequestermittel, Komplexbildner. Im Allgemeinen können die Wirkstoffe mit jedem festen oder flüssigen Additiv, welches für Formulierungszwecke gewöhnlich verwendet wird, kombiniert werden. Im Allgemeinen enthalten die erfindungsgemäßen Mittel und Formulierungen zwischen 0,05 und 99 Gew.-%, 0,01 und 98 Gew.-%, vorzugsweise zwischen 0,1 und 95 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,5 und 90 % Wirkstoff, ganz besonders bevorzugt zwischen 10 und 70 Gewichtsprozent. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können als solche oder in Abhängigkeit von ihren jeweiligen physikalischen und/oder chemischen Eigenschaften in Form ihrer Formulierungen oder den daraus bereiteten Anwendungsformen, wie Aerosole, Kapselsuspensionen, Kaltnebelkonzentrate, Heißnebelkonzentrate, verkapselte Granulate, Feingranulate, fließfähige Konzentrate für die Behandlung von Saatgut, gebrauchsfertige Lösungen, verstäubbare Pulver, emulgierbare Konzentrate, Öl-in-Wasser-Emulsionen, Wasser-in-Öl-Emulsionen, Makrogranulate, Mikrogranulate, Öl dispergierbare Pulver, Öl mischbare fließfähige

Konzentrate, Öl mischbare Flüssigkeiten, Schäume, Pasten, Pestizid ummanteltes Saatgut, Suspensionskonzentrate, Suspensions-Emulsions-Konzentrate, lösliche Konzentrate, Suspensionen, Spritzpulver, lösliche Pulver, Stäubemittel und Granulate, wasserlösliche Granulate oder Tabletten, wasserlösliche Pulver für Saatgut-

5 behandlung, benetzbare Pulver, Wirkstoff-imprägnierte Natur- und synthetische Stoffe sowie Feinstverkapselungen in polymeren Stoffen und in Hüllmassen für Saatgut, sowie ULV-Kalt- und Warmnebel-Formulierungen eingesetzt werden.

Die genannten Formulierungen können in an sich bekannter Weise hergestellt werden,

10 z.B. durch Vermischen der Wirkstoffe mit mindestens einem üblichen Streckmittel, Lösungs- bzw. Verdünnungsmittel, Emulgator, Dispergier- und/oder Binde- oder Fixiermittels, Netzmittel, Wasser-Repellent, gegebenenfalls Sikkative und UV-Stabilisatoren und gegebenenfalls Farbstoffen und Pigmenten, Entschäumer, Konservierungsmittel, sekundäre Verdickungsmittel, Kleber, Gibberelline sowie weiteren Verarbeitungshilfs-

15 mitteln.

Die erfindungsgemäßen Mittel umfassen nicht nur Formulierungen, welche bereits anwendungsfertig sind und mit einer geeigneten Apparatur auf die Pflanze oder das Saatgut ausgebracht werden können, sondern auch kommerzielle Konzentrate,

20 welche vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden müssen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können als solche oder in ihren (handelsüblichen) Formulierungen sowie in den aus diesen Formulierungen bereiteten Anwendungsformen in Mischung mit anderen (bekannten) Wirkstoffen, wie Insektiziden, Lockstoffen, Sterilantien, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden, Fungiziden, Wachstumsregulatoren, Herbiziden, Düngemitteln, Safener bzw.

25 Semiochemicals vorliegen.

Die erfindungsgemäße Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteile mit den Wirkstoffen bzw. Mitteln erfolgt direkt oder durch Einwirkung auf deren Umgebung,

30 Lebensraum oder Lagerraum nach den üblichen Behandlungsmethoden, z.B. durch Tauchen, (Ver-)Spritzen, (Ver-)Sprühen, Berieseln, Verdampfen, Zerstäuben, Vernebeln, (Ver-)Streuen, Verschäumen, Bestreichen, Verstreichen, Gießen (drenchen), Tröpfchenbewässerung und bei Vermehrungsmaterial, insbesondere bei Samen, weiterhin durch Trockenbeizen, Nassbeizen, Schlammbeizen, Inkrustieren,

ein- oder mehrschichtiges Umhüllen usw. Es ist ferner möglich, die Wirkstoffe nach dem Ultra-Low-Volume-Verfahren auszubringen oder die Wirkstoffzubereitung oder den Wirkstoff selbst in den Boden zu injizieren.

- 5 Die Erfindung umfasst weiterhin ein Verfahren zur Behandlung von Saatgut. Die Erfindung betrifft weiterhin Saatgut, welches gemäß einem der im vorherigen Absatz beschriebenen Verfahren behandelt wurde. Die erfindungsgemäßen Saatgüter finden Anwendung in Verfahren zum Schutz von Saatgut vor unerwünschten Mikroorganismen. Bei diesen wird ein mit wenigstens einem erfindungsgemäßen
- 10 Wirkstoff behandeltes Saatgut verwendet. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel sind auch geeignet für die Behandlung von Saatgut. Ein großer Teil des durch Schadorganismen hervorgerufenen Schadens an Kulturpflanzen wird durch den Befall des Saatguts während der Lagerung oder nach der Aussaat sowie während und nach der Keimung der Pflanze ausgelöst. Diese Phase ist besonders kritisch, weil die
- 15 Wurzeln und Schösslinge der wachsenden Pflanze besonders empfindlich sind und auch nur eine kleine Schädigung zum Tod der Pflanze führen kann. Es besteht daher ein großes Interesse daran, das Saatgut und die keimende Pflanze durch Einsatz geeigneter Mittel zu schützen.
- 20 Die Bekämpfung von phytopathogenen Pilzen durch die Behandlung des Saatguts von Pflanzen ist seit langem bekannt und ist Gegenstand ständiger Verbesserungen. Dennoch ergeben sich bei der Behandlung von Saatgut eine Reihe von Problemen, die nicht immer zufrieden stellend gelöst werden können. So ist es erstrebenswert, Verfahren zum Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze zu entwickeln, die
- 25 das zusätzliche Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln nach der Saat oder nach dem Auflaufen der Pflanzen überflüssig machen oder zumindest deutlich verringern. Es ist weiterhin erstrebenswert, die Menge des eingesetzten Wirkstoffs dahingehend zu optimieren, dass das Saatgut und die keimende Pflanze vor dem Befall durch phytopathogene Pilze bestmöglich geschützt werden, ohne jedoch die Pflanze selbst durch
- 30 den eingesetzten Wirkstoff zu schädigen. Insbesondere sollten Verfahren zur Behandlung von Saatgut auch die intrinsischen fungiziden Eigenschaften transgener Pflanzen einbeziehen, um einen optimalen Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze bei einem minimalen Aufwand an Pflanzenschutzmitteln zu erreichen.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich daher auch auf ein Verfahren zum Schutz von Saatgut und keimenden Pflanzen vor dem Befall von phytopathogenen Pilzen, indem das Saatgut mit einem erfindungsgemäßen Mittel behandelt wird. Die Erfindung bezieht sich ebenfalls auf die Verwendung der erfindungsgemäßen Mittel zur

5 Behandlung von Saatgut zum Schutz des Saatguts und der keimenden Pflanze vor phytopathogenen Pilzen. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf Saatgut, welches zum Schutz vor phytopathogenen Pilzen mit einem erfindungsgemäßen Mittel behandelt wurde.

10 Die Bekämpfung von phytopathogenen Pilzen, die Pflanzen nach dem Auflaufen schädigen, erfolgt in erster Linie durch die Behandlung des Bodens und der oberirdischen Pflanzenteile mit Pflanzenschutzmitteln. Aufgrund der Bedenken hinsichtlich eines möglichen Einflusses der Pflanzenschutzmittel auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen und Tieren gibt es Anstrengungen, die Menge der
15 ausgebrachten Wirkstoffe zu vermindern.

Einer der Vorteile der vorliegenden Erfindung ist es, dass aufgrund der besonderen systemischen Eigenschaften der erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel die Behandlung des Saatguts mit diesen Wirkstoffen bzw. Mitteln nicht nur das Saatgut
20 selbst, sondern auch die daraus hervorgehenden Pflanzen nach dem Auflaufen vor phytopathogenen Pilzen schützt. Auf diese Weise kann die unmittelbare Behandlung der Kultur zum Zeitpunkt der Aussaat oder kurz danach entfallen.

Die erfindungsgemäßen Mittel eignen sich zum Schutz von Saatgut jeglicher
25 Pflanzensorte, die in der Landwirtschaft, im Gewächshaus, in Forsten oder im Garten- und Weinbau eingesetzt wird. Insbesondere handelt es sich dabei um Saatgut von Getreide (wie Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Hirse und Hafer), Mais, Baumwolle, Soja, Reis, Kartoffeln, Sonnenblume, Bohne, Kaffee, Rübe (z.B. Zuckerrübe und Futterrübe), Erdnuss, Raps, Mohn, Olive, Kokosnuss, Kakao, Zuckerrohr, Tabak,
30 Gemüse (wie Tomate, Gurke, Zwiebeln und Salat), Rasen und Zierpflanzen (siehe auch unten). Besondere Bedeutung kommt der Behandlung des Saatguts von Getreide (wie Weizen, Gerste, Roggen, Triticale und Hafer), Mais und Reis zu. Wie auch weiter unten beschrieben, ist die Behandlung von transgenem Saatgut mit den erfindungsgemäßen Wirkstoffen bzw. Mitteln von besonderer Bedeutung.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird das erfindungsgemäße Mittel alleine oder in einer geeigneten Formulierung auf das Saatgut aufgebracht. Vorzugsweise wird das Saatgut in einem Zustand behandelt, in dem so stabil ist, dass keine Schäden bei der
5 Behandlung auftreten. Im Allgemeinen kann die Behandlung des Saatguts zu jedem Zeitpunkt zwischen der Ernte und der Aussaat erfolgen. Üblicherweise wird Saatgut verwendet, das von der Pflanze getrennt und von Kolben, Schalen, Stängeln, Hülle, Wolle oder Fruchtfleisch befreit wurde. So kann zum Beispiel Saatgut verwendet werden, das geerntet, gereinigt und bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt von unter 15
10 Gew.-% getrocknet wurde. Alternativ kann auch Saatgut verwendet werden, das nach dem Trocknen z.B. mit Wasser behandelt und dann erneut getrocknet wurde.

Im Allgemeinen muss bei der Behandlung des Saatguts darauf geachtet werden, dass die Menge des auf das Saatgut aufgetragenen erfindungsgemäßen Mittels und/oder weiterer Zusatzstoffe so gewählt wird, dass die Keimung des Saatguts nicht
15 beeinträchtigt bzw. die daraus hervorgehende Pflanze nicht geschädigt wird. Dies ist vor allem bei Wirkstoffen zu beachten, die in bestimmten Aufwandmengen phytotoxische Effekte zeigen können.

Die erfindungsgemäßen Mittel können unmittelbar aufgebracht werden, also ohne weitere Komponenten zu enthalten und ohne verdünnt worden zu sein. In der Regel ist
20 es vorzuziehen, die Mittel in Form einer geeigneten Formulierung auf das Saatgut aufzubringen. Geeignete Formulierungen und Verfahren für die Saatgutbehandlung sind dem Fachmann bekannt und werden z.B. in den folgenden Dokumenten beschrieben: US 4,272,417 A, US 4,245,432 A, US 4,808,430, US 5,876,739, US 2003/0176428 A1, WO 2002/080675 A1, WO 2002/028186 A2.

Die erfindungsgemäß verwendbaren Wirkstoffe können in die üblichen Beizmittel-Formulierungen überführt werden, wie Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Pulver, Schäume, Slurries oder andere Hüllmassen für Saatgut, sowie ULV-Formulierungen. Diese Formulierungen werden in bekannter Weise hergestellt, indem man die Wirkstoffe mit üblichen Zusatzstoffen vermischt, wie zum Beispiel übliche Streckmittel
30 sowie Lösungs- oder Verdünnungsmittel, Farbstoffe, Netzmittel, Dispergiermittel, Emulgatoren, Entschäumer, Konservierungsmittel, sekundäre Verdickungsmittel, Kleber, Gibberelline und auch Wasser.

Als Farbstoffe, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke üblichen Farbstoffe in

Betracht. Dabei sind sowohl in Wasser wenig lösliche Pigmente als auch in Wasser lösliche Farbstoffe verwendbar. Als Beispiele genannt seien die unter den Bezeichnungen Rhodamin B, C.I. Pigment Red 112 und C.I. Solvent Red 1 bekannten Farbstoffe.

- 5 Als Netzmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen, die Benetzung fördernden Stoffe in Frage. Vorzugsweise verwendbar sind Alkylnaphthalin-Sulfonate, wie Diisopropyl- oder Diisobutyl-naphthalin-Sulfonate. Als Dispergiermittel und/oder Emulgatoren, die in den erfindungsgemäß verwendbaren
- 10 Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen nichtionischen, anionischen und kationischen Dispergiermittel in Betracht. Vorzugsweise verwendbar sind nichtionische oder anionische Dispergiermittel oder Gemische von nichtionischen oder anionischen Dispergiermitteln. Als geeignete nichtionische Dispergiermittel sind insbesondere
- 15 Ethylenoxid-Propylenoxid Blockpolymere, Alkylphenolpolyglykoether sowie Tristrylphenolpolyglykoether und deren phosphatierte oder sulfatierte Derivate zu nennen. Geeignete anionische Dispergiermittel sind insbesondere Ligninsulfonate, Polyacrylsäuresalze und Arylsulfonat-Formaldehydkondensate.
- Als Entschäumer können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formu-
- 20 lierungen alle zur Formulierung von agrochemischen Wirkstoffen üblichen schaumhemmenden Stoffe enthalten sein. Vorzugsweise verwendbar sind Silikonentschäumer und Magnesiumstearat.
- Als Konservierungsmittel können in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren
- 25 Stoffe vorhanden sein. Beispielhaft genannt seien Dichlorophen und Benzylalkoholhemiformal.
- Als sekundäre Verdickungsmittel, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle für derartige Zwecke in agrochemischen Mitteln einsetzbaren Stoffe in Frage. Vorzugsweise in Betracht
- 30 kommen Cellulosederivate, Acrylsäurederivate, Xanthan, modifizierte Tone und hochdisperse Kieselsäure.
- Als Kleber, die in den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen enthalten sein können, kommen alle üblichen in Beizmitteln einsetzbaren Bindemittel

in Frage. Vorzugsweise genannt seien Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylacetat, Polyvinylalkohol und Tylose.

Die erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen können entweder direkt oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser zur Behandlung von Saatgut der verschiedensten Art, auch von Saatgut transgener Pflanzen, eingesetzt werden. Dabei können im Zusammenwirken mit den durch Expression gebildeten Substanzen auch zusätzliche synergistische Effekte auftreten.

Zur Behandlung von Saatgut mit den erfindungsgemäß verwendbaren Beizmittel-Formulierungen oder den daraus durch Zugabe von Wasser hergestellten Zubereitungen kommen alle üblicherweise für die Beizung einsetzbaren Mischgeräte in Betracht. Im einzelnen geht man bei der Beizung so vor, dass man das Saatgut in einen Mischer gibt, die jeweils gewünschte Menge an Beizmittel-Formulierungen entweder als solche oder nach vorherigem Verdünnen mit Wasser hinzufügt und bis zur gleichmäßigen Verteilung der Formulierung auf dem Saatgut mischt.

Gegebenenfalls schließt sich ein Trocknungsvorgang an.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel weisen eine starke mikrobizide Wirkung auf und können zur Bekämpfung von unerwünschten Mikroorganismen, wie Pilzen und Bakterien, im Pflanzenschutz und im Materialschutz eingesetzt werden.

Fungizide lassen sich im Pflanzenschutz zur Bekämpfung von Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes und Deuteromycetes einsetzen.

Bakterizide lassen sich im Pflanzenschutz zur Bekämpfung von Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae und Streptomyetaceae einsetzen.

Die erfindungsgemäßen fungiziden Mittel können zur Bekämpfung von phytopathogenen Pilzen kurativ oder protektiv eingesetzt werden. Die Erfindung betrifft daher auch kurative und protektive Verfahren zum Bekämpfen von phytopathogenen Pilzen durch die Verwendung der erfindungsgemäßen Wirkstoffe oder Mittel, welche auf das Saatgut, die Pflanze oder Pflanzenteile, die Früchten oder den Boden, in welcher die Pflanzen wachsen, ausgebracht wird.

Die erfindungsgemäßen Mittel zum Bekämpfen von phytopathogenen Pilzen im Pflanzenschutz umfassen eine wirksame, aber nicht-phytotoxische Menge der erfindungsgemäßen Wirkstoffe. „Wirksame, aber nicht-phytotoxische Menge“ bedeutet eine Menge des erfindungsgemäßen Mittels, die ausreichend ist, um die

Pilzerkrankung der Pflanze ausreichend zu kontrollieren oder ganz abzutöten und die gleichzeitig keine nennenswerten Symptome von Phytotoxizität mit sich bringt. Diese Aufwandmenge kann im Allgemeinen in einem größeren Bereich variieren. Sie hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. vom zu bekämpfenden Pilz, der Pflanze, den

5 klimatischen Verhältnissen und den Inhaltsstoffen der erfindungsgemäßen Mittel.

Die gute Pflanzenverträglichkeit der Wirkstoffe in den zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten notwendigen Konzentrationen erlaubt eine Behandlung von oberirdischen Pflanzenteilen, von Pflanz- und Saatgut, und des Bodens.

Erfindungsgemäß können alle Pflanzen und Pflanzenteile behandelt werden. Unter

10 Pflanzen werden hierbei alle Pflanzen und Pflanzenpopulationen verstanden, wie erwünschte und unerwünschte Wildpflanzen oder Kulturpflanzen (einschließlich natürlich vorkommender Kulturpflanzen). Kulturpflanzen können Pflanzen sein, die durch konventionelle Züchtungs- und Optimierungsmethoden oder durch biotechnologische und gentechnologische Methoden oder Kombinationen dieser Methoden erhalten werden können, einschließlich der transgenen Pflanzen und einschließlich der durch Sortenschutzrechte schützba-

15 ren oder nicht schützba-

ren Pflanzensorten. Unter Pflanzenteilen sollen alle oberirdischen und unterirdischen Teile und Organe der Pflanzen, wie Spross, Blatt, Blüte und Wurzel verstanden werden, wobei beispielhaft Blätter, Nadeln, Stängel, Stämme, Blüten, Fruchtkörper, Früchte und Samen sowie Wurzeln, Knollen

20 und Rhizome aufgeführt werden. Zu den Pflanzenteilen gehört auch Erntegut sowie vegetatives und generatives Vermehrungsmaterial, beispielsweise Stecklinge, Knollen, Rhizome, Ableger und Samen.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe eignen sich bei guter Pflanzenverträglichkeit, günstiger Warmblüttoxizität und guter Umweltverträglichkeit zum Schutz von

25 Pflanzen und Pflanzenorganen, zur Steigerung der Ernteerträge, Verbesserung der Qualität des Erntegutes. Sie können vorzugsweise als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Sie sind gegen normal sensible und resistente Arten sowie gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien wirksam.

Als Pflanzen, welche erfindungsgemäß behandelt werden können, seien folgende

30 Hauptanbaupflanzen erwähnt: Mais, Sojabohne, Baumwolle, Brassica Ölsaaten wie Brassica napus (z.B. Canola), Brassica rapa, B. juncea (z.B. (Acker-)Senf) und Brassica carinata, Reis, Weizen Zuckerrübe, Zuckerrübe, Hafer, Roggen, Gerste, Hirse, Triticale, Flachs, Wein und verschiedene Früchte und Gemüse von verschiedenen botanischen Taxa wie z.B. Rosaceae sp. (beispielsweise Kernfrüchte

wie Apfel und Birne, aber auch Steinfrüchte wie Aprikosen, Kirschen, Mandeln und Pfirsiche und Beerenfrüchte wie Erdbeeren), Ribesioideae sp., Juglandaceae sp., Betulaceae sp., Anacardiaceae sp., Fagaceae sp., Moraceae sp., Oleaceae sp., Actinidaceae sp., Lauraceae sp., Musaceae sp. (beispielsweise Bananenbäume und -plantagen), Rubiaceae sp. (beispielsweise Kaffee), Theaceae sp., Sterculiaceae sp., Rutaceae sp. (beispielsweise Zitronen, Orangen und Grapefruit); Solanaceae sp. (beispielsweise Tomaten, Kartoffeln, Pfeffer, Auberginen), Liliaceae sp., Compositae sp. (beispielsweise Salat, Artischocke und Chicoree – einschließlich Wurzelchicoree, Endivie oder gemeinen Chicoree), Umbelliferae sp. (beispielsweise Karotte, Petersilie, Stangensellerie und Knollensellerie), Cucurbitaceae sp. (beispielsweise Gurke – einschließlich Gewürzgurke, Kürbis, Wassermelone, Flaschenkürbis und Melonen), Alliaceae sp. (beispielsweise Lauch und Zwiebel), Cruciferae sp. (beispielsweise Weißkohl, Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Pak Choi, Kohlrabi, Radieschen, Meerrettich, Kresse und Chinakohl), Leguminosae sp. (beispielsweise Erdnüsse, Erbsen, und Bohnen – wie z.B. Stangenbohne und Ackerbohne), Chenopodiaceae sp. (beispielsweise Mangold, Futterrübe, Spinat, Rote Rübe), Malvaceae (beispielsweise Okra), Asparagaceae (beispielsweise Spargel); Nutzpflanzen und Zierpflanzen in Garten und Wald; sowie jeweils genetisch modifizierte Arten dieser Pflanzen.

Wie oben erwähnt, können erfindungsgemäß alle Pflanzen und deren Teile behandelt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform werden wild vorkommende oder durch konventionelle biologische Zuchtmethoden, wie Kreuzung oder Protoplastenfusion erhaltenen Pflanzenarten und Pflanzensorten sowie deren Teile behandelt. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden transgene Pflanzen und Pflanzensorten, die durch gentechnologische Methoden gegebenenfalls in Kombination mit konventionellen Methoden erhalten wurden (Genetically Modified Organisms) und deren Teile behandelt. Der Begriff „Teile“ bzw. „Teile von Pflanzen“ oder „Pflanzenteile“ wurde oben erläutert. Besonders bevorzugt werden erfindungsgemäß Pflanzen der jeweils handelsüblichen oder in Gebrauch befindlichen Pflanzensorten behandelt. Unter Pflanzensorten versteht man Pflanzen mit neuen Eigenschaften („Traits“), die sowohl durch konventionelle Züchtung, durch Mutagenese oder durch rekombinante DNA-Techniken gezüchtet worden sind. Dies können Sorten, Rassen, Bio- und Genotypen sein.

Das erfindungsgemäße Behandlungsverfahren kann für die Behandlung von genetisch modifizierten Organismen (GMOs), z. B. Pflanzen oder Samen, verwendet werden.

Genetisch modifizierte Pflanzen (oder transgene Pflanzen) sind Pflanzen, bei denen ein heterologes Gen stabil in das Genom integriert worden ist. Der Begriff "heterologes Gen" bedeutet im wesentlichen ein Gen, das außerhalb der Pflanze bereitgestellt oder assembliert wird und das bei Einführung in das Zellkerngenom, das

- 5 Chloroplastengenom oder das Mitochondriengenom der transformierten Pflanze dadurch neue oder verbesserte agronomische oder sonstige Eigenschaften verleiht, dass es ein interessierendes Protein oder Polypeptid exprimiert oder dass es ein anderes Gen, das in der Pflanze vorliegt bzw. andere Gene, die in der Pflanze vorliegen, herunterreguliert oder abschaltet (zum Beispiel mittels Antisense-
10 Technologie, Cosuppressionstechnologie oder RNAi-Technologie [RNA Interference]). Ein heterologes Gen, das im Genom vorliegt, wird ebenfalls als Transgen bezeichnet. Ein Transgen, das durch sein spezifisches Vorliegen im Pflanzengenom definiert ist, wird als Transformations- bzw. transgenes Event bezeichnet.

- In Abhängigkeit von den Pflanzenarten oder Pflanzensorten, ihrem Standort und ihren
15 Wachstumsbedingungen (Böden, Klima, Vegetationsperiode, Ernährung) kann die erfindungsgemäße Behandlung auch zu überadditiven ("synergistischen") Effekten führen. So sind zum Beispiel die folgenden Effekte möglich, die über die eigentlich zu erwartenden Effekte hinausgehen: verringerte Aufwandmengen und/oder erweitertes Wirkungsspektrum und/oder erhöhte Wirksamkeit der Wirkstoffe und
20 Zusammensetzungen, die erfindungsgemäß eingesetzt werden können, besseres Pflanzenwachstum, erhöhte Toleranz gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen, erhöhte Toleranz gegenüber Trockenheit oder Wasser- oder Bodensalzgehalt, erhöhte Blühleistung, Ernteerleichterung, Reifebeschleunigung, höhere Erträge, größere Früchte, größere Pflanzenhöhe, intensiver grüne Farbe des Blatts, frühere Blüte,
25 höhere Qualität und/oder höherer Nährwert der Ernteprodukte, höhere Zuckerkonzentration in den Früchten, bessere Lagerfähigkeit und/oder Verarbeitbarkeit der Ernteprodukte.

- In gewissen Aufwandmengen können die erfindungsgemäßen Wirkstoffkombinationen auch eine stärkende Wirkung auf Pflanzen ausüben. Sie eignen sich daher für die
30 Mobilisierung des pflanzlichen Abwehrsystems gegen Angriff durch unerwünschte phytopathogene Pilze und/oder Mikroorganismen und/oder Viren. Dies kann gegebenenfalls einer der Gründe für die erhöhte Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Kombinationen sein, zum Beispiel gegen Pilze. Pflanzenstärkende (resistenzinduzierende) Substanzen sollen im vorliegenden Zusammenhang auch

solche Substanzen oder Substanzkombinationen bedeuten, die fähig sind, das pflanzliche Abwehrsystem so zu stimulieren, dass die behandelten Pflanzen, wenn sie im Anschluss daran mit unerwünschten phytopathogenen Pilzen inokuliert wurde, einen beträchtlichen Resistenzgrad gegen diese unerwünschten phytopathogenen Pilze aufweisen. Die erfindungsgemäßen Substanzen lassen sich daher zum Schutz von Pflanzen gegen Angriff durch die erwähnten Pathogene innerhalb eines gewissen Zeitraums nach der Behandlung einsetzen. Der Zeitraum, über den eine Schutzwirkung erzielt wird, erstreckt sich im Allgemeinen von 1 bis 10 Tagen, vorzugsweise 1 bis 7 Tagen, nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen.

- 10 Zu Pflanzen und Pflanzensorten, die vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, zählen alle Pflanzen, die über Erbgut verfügen, das diesen Pflanzen besonders vorteilhafte, nützliche Merkmale verleiht (egal, ob dies durch Züchtung und/oder Biotechnologie erzielt wurde).

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls vorzugsweise erfindungsgemäß behandelt werden, sind gegen einen oder mehrere biotische Stressfaktoren resistent, d.h. diese Pflanzen weisen eine verbesserte Abwehr gegen tierische und mikrobielle Schädlinge wie Nematoden, Insekten, Milben, phytopathogene Pilze, Bakterien, Viren und/oder Viroide auf.

Beispiele für Nematoden-resistente Pflanzen sind z.B. folgenden US

- 20 Patentanmeldungen beschrieben: 11/765,491, 11/765,494, 10/926,819, 10/782,020, 12/032,479, 10/783,417, 10/782,096, 11/657,964, 12/192,904, 11/396,808, 12/166,253, 12/166,239, 12/166,124, 12/166,209, 11/762,886, 12/364,335, 11/763,947, 12/252,453, 12/209,354, 12/491,396 und 12/497,221.

- Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die gegen einen oder mehrere abiotische Stressfaktoren resistent sind. Zu den abiotischen Stressbedingungen können zum Beispiel Dürre, Kälte- und Hitzebedingungen, osmotischer Stress, Staunässe, erhöhter Bodensalzgehalt, erhöhtes Ausgesetztsein an Mineralien, Ozonbedingungen, Starklichtbedingungen, beschränkte Verfügbarkeit von Stickstoffnährstoffen, 25 beschränkte Verfügbarkeit von Phosphornährstoffen oder Vermeidung von Schatten zählen.

Pflanzen und Pflanzensorten, die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind solche Pflanzen, die durch erhöhte Ertrageigenschaften gekennzeichnet sind. Ein erhöhter Ertrag kann bei diesen Pflanzen z. B. auf verbesserter

- Pflanzenphysiologie, verbessertem Pflanzenwuchs und verbesserter Pflanzenentwicklung, wie Wasserverwertungseffizienz, Wasserhalteeffizienz, verbesserter Stickstoffverwertung, erhöhter Kohlenstoffassimilation, verbesserter Photosynthese, verstärkter Keimkraft und beschleunigter Abreife beruhen. Der Ertrag
- 5 kann weiterhin durch eine verbesserte Pflanzenarchitektur (unter Stress- und Nicht-Stress-Bedingungen) beeinflusst werden, darunter frühe Blüte, Kontrolle der Blüte für die Produktion von Hybridsaatgut, Keimpflanzenwüchsigkeit, Pflanzengröße, Internodienzahl und -abstand, Wurzelwachstum, Samengröße, Fruchtgröße, Schotengröße, Schoten- oder Ährenzahl, Anzahl der Samen pro Schote oder Ähre,
- 10 Samenmasse, verstärkte Samenfüllung, verringerter Samenausfall, verringertes Schotenplatzen sowie Standfestigkeit. Zu weiteren Ertragsmerkmalen zählen Samenzusammensetzung wie Kohlenhydratgehalt, Proteingehalt, Ölgehalt und Ölzusammensetzung, Nährwert, Verringerung der nährwidrigen Verbindungen, verbesserte Verarbeitbarkeit und verbesserte Lagerfähigkeit.
- 15 Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Hybridpflanzen, die bereits die Eigenschaften der Heterosis bzw. des Hybrideffekts exprimieren, was im Allgemeinen zu höherem Ertrag, höherer Wüchsigkeit, besserer Gesundheit und besserer Resistenz gegen biotische und abiotische Stressfaktoren führt. Solche Pflanzen werden typischerweise dadurch erzeugt, dass man eine ingezüchtete
- 20 pollensterile Elternlinie (den weiblichen Kreuzungspartner) mit einer anderen ingezüchteten pollenfertilen Elternlinie (dem männlichen Kreuzungspartner) kreuzt. Das Hybridsaatgut wird typischerweise von den pollensterilen Pflanzen geerntet und an Vermehrter verkauft. Pollensterile Pflanzen können manchmal (z. B. beim Mais) durch Entfahnen (d.h. mechanischem Entfernen der männlichen Geschlechtsorgane
- 25 bzw. der männlichen Blüten), produziert werden; es ist jedoch üblicher, dass die Pollensterilität auf genetischen Determinanten im Pflanzengenom beruht. In diesem Fall, insbesondere dann, wenn es sich bei dem gewünschten Produkt, da man von den Hybridpflanzen ernten will, um die Samen handelt, ist es üblicherweise günstig, sicherzustellen, dass die Pollenfertilität in Hybridpflanzen, die die für die Pollensterilität
- 30 verantwortlichen genetischen Determinanten enthalten, völlig restoriert wird. Dies kann erreicht werden, indem sichergestellt wird, dass die männlichen Kreuzungspartner entsprechende Fertilitätsrestorergene besitzen, die in der Lage sind, die Pollenfertilität in Hybridpflanzen, die die genetischen Determinanten, die für die Pollensterilität verantwortlich sind, enthalten, zu restorieren. Genetische Determinanten für

Pollensterilität können im Cytoplasma lokalisiert sein. Beispiele für cytoplasmatische Pollensterilität (CMS) wurden zum Beispiel für Brassica-Arten beschrieben.

Genetische Determinanten für Pollensterilität können jedoch auch im Zellkerngenom lokalisiert sein. Pollensterile Pflanzen können auch mit Methoden der pflanzlichen

5 Biotechnologie, wie Gentechnik, erhalten werden. Ein besonders günstiges Mittel zur Erzeugung von pollensterilen Pflanzen ist in WO 89/10396 beschrieben, wobei zum Beispiel eine Ribonuklease wie eine Barnase selektiv in den Tapetumzellen in den Staubblättern exprimiert wird. Die Fertilität kann dann durch Expression eines Ribonukleasehemmers wie Barstar in den Tapetumzellen restoriert werden.

10 Pflanzen oder Pflanzensorten (die mit Methoden der Pflanzenbiotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten werden), die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind herbizidtolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen, die gegenüber einem oder mehreren vorgegebenen Herbiziden tolerant gemacht worden sind. Solche Pflanzen können entweder durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die
15 eine Mutation enthalten, die solch eine Herbizidtoleranz verleiht, erhalten werden. Herbizidtolerante Pflanzen sind zum Beispiel glyphosatetolerante Pflanzen, d. h. Pflanzen, die gegenüber dem Herbizid Glyphosate oder dessen Salzen tolerant gemacht worden sind. Pflanzen können mit verschiedenen Methoden tolerant gegenüber Glyphosate gemacht werden. So können zum Beispiel glyphosatetolerante
20 Pflanzen durch Transformation der Pflanze mit einem Gen, das für das Enzym 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphatsynthase (EPSPS) kodiert, erhalten werden. Beispiele für solche EPSPS-Gene sind das AroA-Gen (Mutante CT7) des Bakterium Salmonella typhimurium (Comai et al., 1983, Science 221, 370-371), das CP4-Gen des Bakteriums Agrobacterium sp. (Barry et al., 1992, Curr. Topics Plant Physiol. 7, 139-
25 145), die Gene, die für eine EPSPS aus der Petunie (Shah et al., 1986, Science 233, 478-481), für eine EPSPS aus der Tomate (Gasser et al., 1988, J. Biol. Chem. 263, 4280-4289) oder für eine EPSPS aus Eleusine (WO 01/66704) kodieren. Es kann sich auch um eine mutierte EPSPS handeln. Glyphosate-tolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, dass man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-
30 Oxidoreduktase-Enzym kodiert. Glyphosate-tolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, dass man ein Gen exprimiert, das für ein Glyphosate-acetyltransferase-Enzym kodiert. Glyphosatetolerante Pflanzen können auch dadurch erhalten werden, dass man Pflanzen, die natürlich vorkommende Mutationen der oben erwähnten Gene selektiert. Pflanzen, die EPSPS Gene, welche Glyphosate-Toleranz

verleihen, exprimieren, sind beschrieben. Pflanzen, welche andere Gene, die Glyphosate-Toleranz verleihen, z.B. Decarboxylase-Gene, sind beschrieben.

Sonstige herbizidresistente Pflanzen sind zum Beispiel Pflanzen, die gegenüber Herbiziden, die das Enzym Glutaminsynthase hemmen, wie Bialaphos,

- 5 Phosphinotricin oder Glufosinate, tolerant gemacht worden sind. Solche Pflanzen können dadurch erhalten werden, dass man ein Enzym exprimiert, das das Herbizid oder eine Mutante des Enzyms Glutaminsynthase, das gegenüber Hemmung resistent ist, entgiftet. Solch ein wirksames entgiftendes Enzym ist zum Beispiel ein Enzym, das für ein Phosphinotricin-acetyltransferase kodiert (wie zum Beispiel das bar- oder pat-Protein aus Streptomyces-Arten). Pflanzen, die eine exogene Phosphinotricin-acetyltransferase exprimieren, sind beschrieben.

Weitere herbizidtolerante Pflanzen sind auch Pflanzen, die gegenüber den Herbiziden, die das Enzym Hydroxyphenylpyruvatoxygenase (HPPD) hemmen, tolerant gemacht worden sind. Bei den Hydroxyphenylpyruvatoxygenasen handelt es sich um Enzyme,

- 15 die die Reaktion, in der para-Hydroxyphenylpyruvat (HPP) zu Homogentisat umgesetzt wird, katalysieren. Pflanzen, die gegenüber HPPD-Hemmern tolerant sind, können mit einem Gen, das für ein natürlich vorkommendes resistentes HPPD-Enzym kodiert, oder einem Gen, das für ein mutiertes oder chimäres HPPD-Enzym kodiert, transformiert werden, wie in WO 96/38567, WO 99/24585, WO 99/24586, WO 2009/144079, WO 2002/046387 oder US 6,768,044 beschrieben. Eine Toleranz gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch erzielt werden, dass man Pflanzen mit Genen transformiert, die für gewisse Enzyme kodieren, die die Bildung von Homogentisat trotz Hemmung des nativen HPPD-Enzyms durch den HPPD-Hemmer ermöglichen. Solche Pflanzen sind in WO 99/34008 und WO 02/36787 beschrieben.
- 25 Die Toleranz von Pflanzen gegenüber HPPD-Hemmern kann auch dadurch verbessert werden, dass man Pflanzen zusätzlich zu einem Gen, das für ein HPPD-tolerantes Enzym kodiert, mit einem Gen transformiert, das für ein Prephenatdehydrogenase-Enzym kodiert, wie in WO 2004/024928 beschrieben ist. Außerdem können Pflanzen noch toleranter gegen HPPD-Hemmern gemacht werden, indem man ein Gen in ihr
- 30 Genom einfügt, welches für ein Enzym kodiert, das HPPD-Hemmer metabolisiert oder abbaut, wie z.B. CYP450 Enzyme (siehe WO 2007/103567 und WO 2008/150473).

Weitere herbizidresistente Pflanzen sind Pflanzen, die gegenüber Acetolactatsynthase (ALS)-Hemmern tolerant gemacht worden sind. Zu bekannten ALS-Hemmern zählen zum Beispiel Sulfonylharnstoff, Imidazolinon, Triazolopyrimidine,

Pyrimidinyloxy(thio)benzoate und/oder Sulfonylaminocarbonyltriazolinon-Herbizide. Es ist bekannt, dass verschiedene Mutationen im Enzym ALS (auch als Acetohydroxysäure-Synthase, AHAS, bekannt) eine Toleranz gegenüber unterschiedlichen Herbiziden bzw. Gruppen von Herbiziden verleihen wie z.B. in

5 Tranel und Wright (Weed Science 2002, 50, 700-712) beschrieben ist. Die Herstellung von sulfonylharnstofftoleranten Pflanzen und imidazolinontoleranten Pflanzen ist beschrieben. Weitere sulfonylharnstoff- und imidazolinontolerante Pflanzen sind auch beschrieben.

Weitere Pflanzen, die gegenüber Imidazolinon und/oder Sulfonylharnstoff tolerant sind,

10 können durch induzierte Mutagenese, Selektion in Zellkulturen in Gegenwart des Herbizids oder durch Mutationszüchtung erhalten werden (vgl. z.B. für Sojabohne US 5,084,082, für Reis WO 97/41218, für Zuckerrübe US 5,773,702 und WO 99/057965, für Salat US 5,198,599 oder für Sonnenblume WO 01/065922).

15 Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind gegenüber abiotischen Stressfaktoren tolerant. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solch eine Stressresistenz verleiht, erhalten werden. Zu

20 besonders nützlichen Pflanzen mit Stresstoleranz zählen folgende:

a. Pflanzen, die ein Transgen enthalten, das die Expression und/oder Aktivität des Gens für die Poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) in den Pflanzenzellen oder Pflanzen zu reduzieren vermag.

b. Pflanzen, die ein stresstoleranzförderndes Transgen enthalten, das die

25 Expression und/oder Aktivität der für PARG kodierenden Gene der Pflanzen oder Pflanzenzellen zu reduzieren vermag;

c. Pflanzen, die ein stresstoleranzförderndes Transgen enthalten, das für ein in Pflanzen funktionelles Enzym des Nicotinamidadenindinukleotid-Salvage-Biosynthesewegs kodiert, darunter Nicotinamidase, Nicotinatphosphoribosyltransferase,

30 Nicotinsäuremononukleotidadenyltransferase, Nicotinamidadenindinukleotidsynthetase oder Nicotinamidphosphoribosyltransferase.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, weisen eine veränderte Menge, Qualität und/oder Lagerfähigkeit des

Ernteprodukts und/oder veränderte Eigenschaften von bestimmten Bestandteilen des Ernteprodukts auf, wie zum Beispiel:

- 1) Transgene Pflanzen, die eine modifizierte Stärke synthetisieren, die bezüglich ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften, insbesondere des Amylosegehalts oder des Amylose/Amylopektin-Verhältnisses, des Verzweigungsgrads, der durchschnittlichen Kettenlänge, der Verteilung der Seitenketten, des Viskositätsverhaltens, der Gelfestigkeit, der Stärkekorngröße und/oder Stärkekornmorphologie im Vergleich mit der synthetisierten Stärke in Wildtyppflanzenzellen oder -pflanzen verändert ist, so dass sich diese modifizierte Stärke besser für bestimmte Anwendungen eignet.
- 2) Transgene Pflanzen, die Nichtstärkekohlenhydratpolymere synthetisieren, oder Nichtstärkekohlenhydratpolymere, deren Eigenschaften im Vergleich zu Wildtyppflanzen ohne genetische Modifikation verändert sind. Beispiele sind Pflanzen, die Polyfructose, insbesondere des Inulin- und Levantyps, produzieren, Pflanzen, die alpha-1,4-Glucane produzieren, Pflanzen, die alpha-1,6-verzweigte alpha-1,4-Glucane produzieren und Pflanzen, die Alternan produzieren.
- 3) Transgene Pflanzen, die Hyaluronan produzieren.
- 4) Transgene Pflanzen oder Hybridpflanzen wie Zwiebeln mit bestimmten Eigenschaften wie „hohem Anteil an löslichen Feststoffen“ (‘high soluble solids content’), geringe Schärfe (‘low pungency’, LP) und/oder lange Lagerfähigkeit (‘long storage’, LS).
Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit veränderten Fasereigenschaften. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Fasereigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:
 - a) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von Cellulosesynthasegenen enthalten,
 - b) Pflanzen wie Baumwollpflanzen, die eine veränderte Form von rsw2- oder rsw3-homologen Nukleinsäuren enthalten, wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosephosphatsynthase;
 - c) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit einer erhöhten Expression der Saccharosesynthase;

d) Pflanzen wie Baumwollpflanzen bei denen der Zeitpunkt der Durchlaßsteuerung der Plasmodesmen an der Basis der Faserzelle verändert ist, z. B. durch Herunterregulieren der faserselektiven β -1,3-Glucanase;

- e) Pflanzen wie Baumwollpflanzen mit Fasern mit veränderter Reaktivität, z. B. durch Expression des N-Acetylglucosamintransferasegens, darunter auch nodC, und von Chitinsynthasegenen.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Raps oder verwandte Brassica-Pflanzen mit veränderten Eigenschaften der Ölzusammensetzung. Solche Pflanzen können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Öleigenschaften verleiht, erhalten werden; dazu zählen:

- a) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem hohen Ölsäuregehalt produziere;
b) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen Linolensäuregehalt

15 produzieren.

- c) Pflanzen wie Rapspflanzen, die Öl mit einem niedrigen gesättigten Fettsäuregehalt produzieren.

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten werden können), die ebenfalls erfindungsgemäß

- 20 behandelt werden können, sind Pflanzen wie Kartoffeln, welche Virus-resistent sind z.B. gegen den Kartoffelvirus Y (Event SY230 und SY233 von Tecnoplant,

Argentinien), oder welche resistent gegen Krankheiten wie die Kraut- und Knollenfäule (potato late blight) (z.B. RB Gen), oder welche eine verminderte kälteinduzierte Süße zeigen (welche die Gene Nt-Inh, II-INV tragen) oder welche den Zwerg-Phänotyp

25 zeigen (Gen A-20 Oxidase).

Pflanzen oder Pflanzensorten (die nach Methoden der pflanzlichen Biotechnologie, wie der Gentechnik, erhalten wurden), die ebenfalls erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen wie Raps oder verwandte Brassica-Pflanzen mit veränderten Eigenschaften im Samenausfall (seed shattering). Solche Pflanzen

- 30 können durch genetische Transformation oder durch Selektion von Pflanzen, die eine Mutation enthalten, die solche veränderten Eigenschaften verleihen, und umfassen Pflanzen wie Raps mit verzögertem oder vermindertem Samenausfall.

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen mit Transformationsevents oder Kombinationen von Transformationsevent, welche in den USA beim Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) of the United States Department of Agriculture (USDA) Gegenstand von erteilten oder anhängigen Petitionen für den nicht-regulierten Status sind. Die Information hierzu ist jederzeit beim APHIS (4700 River Road Riverdale, MD 20737, USA) erhältlich, z.B. über die Internetseite http://www.aphis.usda.gov/brs/not_reg.html. Am Anmeldetag dieser Anmeldung waren beim APHIS die Petitionen mit folgenden Informationen entweder erteilt oder anhängig:

- 10 – Petition: Identifikationsnummer der Petition. Die Technische Beschreibung des Transformationsevents kann im einzelnen Petitionsdokument erhältlich von APHIS auf der Website über die Petitionsnummer gefunden werden. Diese Beschreibungen sind hiermit per Referenz offenbart.
- Erweiterung einer Petition: Referenz zu einer frühere Petition, für die eine Erweiterung oder Verlängerung beantragt wird.
- 15 – Institution: Name der die Petition einreichenden Person.
- Regulierter Artikel: die betroffenen Pflanzenspecies.
- Transgener Phänotyp: die Eigenschaft („Trait“), die der Pflanze durch das Transformationsevent verliehen wird.
- 20 – Transformationsevent oder -linie: der Name des oder der Events (manchmal auch als Linie(n) bezeichnet), für die der nicht-regulierte Status beantragt ist.
- APHIS Dokumente: verschiedene Dokumente, die von APHIS bzgl. der Petition veröffentlicht worden oder von APHIS auf Anfrage erhalten werden können.

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen mit einem oder mehreren Genen, die für ein oder mehrere Toxine kodieren, sind die transgenen Pflanzen, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: YIELD GARD® (zum Beispiel Mais, Baumwolle, Sojabohnen), KnockOut® (zum Beispiel Mais), BiteGard® (zum Beispiel Mais), BT-Xtra® (zum Beispiel Mais), StarLink® (zum Beispiel Mais), Bollgard® (Baumwolle), Nucotn® (Baumwolle), Nucotn 33B® (Baumwolle), NatureGard® (zum Beispiel Mais), Protecta® und NewLeaf® (Kartoffel). Herbizidtolerante Pflanzen, die zu erwähnen sind, sind zum Beispiel Maissorten, Baumwollsorten und Sojabohnensorten, die unter den folgenden Handelsbezeichnungen angeboten werden: Roundup Ready® (Glyphosatetoleranz, zum Beispiel Mais,

Baumwolle, Sojabohne), Liberty Link® (Phosphinotricintoleranz, zum Beispiel Raps), IMI® (Imidazolinontoleranz) und SCS® (Sylfonylharnstofftoleranz), zum Beispiel Mais. Zu den herbizidresistenten Pflanzen (traditionell auf Herbizidtoleranz gezüchtete Pflanzen), die zu erwähnen sind, zählen die unter der Bezeichnung Clearfield® angebotenen Sorten (zum Beispiel Mais).

Besonders nützliche transgene Pflanzen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, sind Pflanzen, die Transformations-Events, oder eine Kombination von Transformations-Events, enthalten und die zum Beispiel in den Dateien von verschiedenen nationalen oder regionalen Behörden angeführt sind (siehe zum Beispiel

http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx und http://cera-gmc.org/index.php?action=gm_crop_database&mode=Submit).

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können außerdem im Materialschutz zum Schutz von technischen Materialien gegen Befall und Zerstörung durch unerwünschten Mikroorganismen, wie z.B. Pilzen und Insekten, eingesetzt werden.

Weiter können die erfindungsgemäßen Verbindungen allein oder in Kombinationen mit anderen Wirkstoffen als Antifouling-Mittel eingesetzt werden.

Unter technischen Materialien sind im vorliegenden Zusammenhang nichtlebende Materialien zu verstehen, die für die Verwendung in der Technik zubereitet worden sind.

Beispielsweise können technische Materialien, die durch erfindungsgemäße Wirkstoffe vor mikrobieller Veränderung oder Zerstörung geschützt werden sollen, Klebstoffe, Leime, Papier, Wandpappe und Karton, Textilien, Teppiche, Leder, Holz, Anstrichmittel und Kunststoffartikel, Kühlschmierstoffe und andere Materialien sein, die von Mikroorganismen befallen oder zersetzt werden können. Im Rahmen der zu schützenden Materialien seien auch Teile von Produktionsanlagen und Gebäuden, z.B. Kühlwasserkreisläufe, Kühl- und Heizsysteme und Belüftungs- und Klimaanlage, genannt, die durch Vermehrung von Mikroorganismen beeinträchtigt werden können. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung seien als technische Materialien vorzugsweise Klebstoffe, Leime, Papiere und Kartone, Leder, Holz, Anstrichmittel, Kühlschmiermittel und Wärmeübertragungsflüssigkeiten genannt, besonders bevorzugt Holz. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können nachteilige Effekte wie Vermodern, Verfall, Ver-, Entfärbung oder Verschimmeln verhindern. Außerdem können die erfindungsgemäßen Verbindungen zum Schutz vor Bewuchs von Gegenständen, insbesondere von

Schiffskörpern, Sieben, Netzen, Bauwerken, Kaianlagen und Signalanlagen, welche mit See- oder Brackwasser in Verbindung kommen, eingesetzt werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren zum Bekämpfen von unerwünschten Pilzen kann auch zum Schutz von so genannten Storage Goods verwendet werden. Unter „Storage

- 5 Goods“ werden dabei natürliche Substanzen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs oder deren Verarbeitungsprodukte, welche der Natur entnommen wurden und für die Langzeitschutz gewünscht ist, verstanden. Storage Goods pflanzlichen Ursprungs, wie z.B. Pflanzen oder Pflanzenteile, wie Stiele, Blätter, Knollen, Samen, Früchte, Körner, können in frisch geerntetem Zustand oder nach Verarbeitung durch (Vor-)Trocknen, 10 Befeuchten, Zerkleinern, Mahlen, Pressen oder Rösten, geschützt werden. Storage Goods umfasst auch Nutzholz, sei es unverarbeitet, wie Bauholz, Stromleitungsmasten und Schranken, oder in Form fertiger Produkte, wie Möbel. Storage Goods tierischen Ursprungs sind beispielsweise Felle, Leder, Pelze und Haare. Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können nachteilige Effekte wie Vermodern, Verfall, Ver-, Entfärbung oder 15 Verschimmeln verhindern.

Beispielhaft, aber nicht begrenzend, seien einige Erreger von pilzlichen Erkrankungen, die erfindungsgemäß behandelt werden können, genannt: Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger des Echten Mehltaus wie z.B. *Blumeria*-Arten, wie beispielsweise *Blumeria graminis*; *Podosphaera*-Arten, wie beispielsweise *Podosphaera leucotricha*;

- 20 *Sphaerotheca*-Arten, wie beispielsweise *Sphaerotheca fuliginea*; *Uncinula*-Arten, wie beispielsweise *Uncinula necator*; Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger von Rostkrankheiten wie z.B. *Gymnosporangium*-Arten, wie beispielsweise *Gymnosporangium sabinae*; *Hemileia*-Arten, wie beispielsweise *Hemileia vastatrix*; *Phakopsora*-Arten, wie beispielsweise *Phakopsora pachyrhizi* und *Phakopsora* 25 *meibomiae*; *Puccinia*-Arten, wie beispielsweise *Puccinia recondita* oder *Puccinia triticina*; *Uromyces*-Arten, wie beispielsweise *Uromyces appendiculatus*; Erkrankungen, hervorgerufen durch Erreger der Gruppe der Oomyceten wie z.B. *Bremia*-Arten, wie beispielsweise *Bremia lactucae*; *Peronospora*-Arten, wie beispielsweise *Peronospora pisi* oder *P. brassicae*; *Phytophthora*-Arten, wie beispielsweise *Phytophthora infestans*; 30 *Plasmopara*-Arten, wie beispielsweise *Plasmopara viticola*; *Pseudoperonospora*-Arten, wie beispielsweise *Pseudoperonospora humuli* oder *Pseudoperonospora cubensis*; *Pythium*-Arten, wie beispielsweise *Pythium ultimum*; Blattfleckenkrankheiten und Blattwelken, hervorgerufen durch z.B. *Alternaria*-Arten, wie beispielsweise *Alternaria solani*; *Cercospora*-Arten, wie beispielsweise *Cercospora beticola*; *Cladosporium*-Arten,

- wie beispielsweise *Cladosporium cucumerinum*; *Cochliobolus*-Arten, wie beispielsweise *Cochliobolus sativus* (Konidienform: *Drechslera*, Syn: *Helminthosporium*); *Colletotrichum*-Arten, wie beispielsweise *Colletotrichum lindemuthianum*; *Cycloconium*-Arten, wie beispielsweise *Cycloconium oleaginum*; *Diaporthe*-Arten, wie beispielsweise *Diaporthe citri*; *Elsinoe*-Arten, wie beispielsweise *Elsinoe fawcettii*; *Gloeosporium*-Arten, wie beispielsweise *Gloeosporium laeticolor*; *Glomerella*-Arten, wie beispielsweise *Glomerella cingulata*; *Guignardia*-Arten, wie beispielsweise *Guignardia bidwelli*; *Leptosphaeria*-Arten, wie beispielsweise *Leptosphaeria maculans*; *Magnaporthe*-Arten, wie beispielsweise *Magnaporthe grisea*; *Microdochium*-Arten, wie beispielsweise *Microdochium nivale*;
- 10 *Mycosphaerella*-Arten, wie beispielsweise *Mycosphaerella graminicola* und *M. fijiensis*; *Phaeosphaeria*-Arten, wie beispielsweise *Phaeosphaeria nodorum*; *Pyrenophora*-Arten, wie beispielsweise *Pyrenophora teres*; *Ramularia*-Arten, wie beispielsweise *Ramularia collo-cygni*; *Rhynchosporium*-Arten, wie beispielsweise *Rhynchosporium secalis*; *Septoria*-Arten, wie beispielsweise *Septoria apii*; *Typhula*-Arten, wie beispielsweise
- 15 *Typhula incarnata*; *Venturia*-Arten, wie beispielsweise *Venturia inaequalis*; Wurzel- und Stängelkrankheiten, hervorgerufen durch z.B. *Corticium*-Arten, wie beispielsweise *Corticium graminearum*; *Fusarium*-Arten, wie beispielsweise *Fusarium oxysporum*; *Gaeumannomyces*-Arten, wie beispielsweise *Gaeumannomyces graminis*; *Rhizoctonia*-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*; *Tapesia*-Arten, wie beispielsweise *Tapesia acuformis*; *Thielaviopsis*-Arten, wie beispielsweise *Thielaviopsis basicola*; Ähren- und Rispenkrankheiten (inklusive Maiskolben), hervorgerufen durch z.B. *Alternaria*-Arten, wie beispielsweise *Alternaria* spp.; *Aspergillus*-Arten, wie beispielsweise *Aspergillus flavus*; *Cladosporium*-Arten, wie beispielsweise *Cladosporium cladosporioides*; *Claviceps*-Arten, wie beispielsweise *Claviceps purpurea*; *Fusarium*-Arten, wie beispielsweise
- 25 *Fusarium culmorum*; *Gibberella*-Arten, wie beispielsweise *Gibberella zeae*; *Monographella*-Arten, wie beispielsweise *Monographella nivalis*; *Septoria*-Arten, wie beispielsweise *Septoria nodorum*; Erkrankungen, hervorgerufen durch Brandpilze wie z.B. *Sphacelotheca*-Arten, wie beispielsweise *Sphacelotheca reiliana*; *Tilletia*-Arten, wie beispielsweise *Tilletia caries*, *T. controversa*; *Urocystis*-Arten, wie beispielsweise
- 30 *Urocystis occulta*; *Ustilago*-Arten, wie beispielsweise *Ustilago nuda*, *U. nuda tritici*; Fruchtfäule hervorgerufen durch z.B. *Aspergillus*-Arten, wie beispielsweise *Aspergillus flavus*; *Botrytis*-Arten, wie beispielsweise *Botrytis cinerea*; *Penicillium*-Arten, wie beispielsweise *Penicillium expansum* und *P. purpurogenum*; *Sclerotinia*-Arten, wie beispielsweise *Sclerotinia sclerotiorum*; *Verticillium*-Arten, wie beispielsweise *Verticillium*

- alboatrum; Samen- und bodenbürtige Fäulen und Welken, sowie Sämlingserkrankungen, hervorgerufen durch z.B. *Fusarium*-Arten, wie beispielsweise *Fusarium culmorum*; *Phytophthora* Arten, wie beispielsweise *Phytophthora cactorum*; *Pythium*-Arten, wie beispielsweise *Pythium ultimum*; *Rhizoctonia*-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*;
- 5 *Sclerotium*-Arten, wie beispielsweise *Sclerotium rolfsii*; Krebserkrankungen, Gallen und Hexenbesen, hervorgerufen durch z.B. *Nectria*-Arten, wie beispielsweise *Nectria galligena*; Welkeerkrankungen hervorgerufen durch z.B. *Monilinia*-Arten, wie beispielsweise *Monilinia laxa*;
- Deformationen von Blättern, Blüten und Früchten, hervorgerufen durch z.B. *Taphrina*-
- 10 Arten, wie beispielsweise *Taphrina deformans*; Degenerationserkrankungen holziger Pflanzen, hervorgerufen durch z.B. *Esca*-Arten, wie beispielsweise *Phaemoniella clamydospora* und *Phaeoacremonium aleophilum* und *Fomitiporia mediterranea*; Blüten- und Samenerkrankungen, hervorgerufen durch z.B. *Botrytis*-Arten, wie beispielsweise *Botrytis cinerea*; Erkrankungen von Pflanzenknollen, hervorgerufen durch z.B.
- 15 *Rhizoctonia*-Arten, wie beispielsweise *Rhizoctonia solani*; *Helminthosporium*-Arten, wie beispielsweise *Helminthosporium solani*; Erkrankungen, hervorgerufen durch bakterielle Erreger wie z.B. *Xanthomonas*-Arten, wie beispielsweise *Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*; *Pseudomonas*-Arten, wie beispielsweise *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*; *Erwinia*-Arten, wie beispielsweise *Erwinia amylovora*;
- 20 Bevorzugt können die folgenden Krankheiten von Soja-Bohnen bekämpft werden: Pilzkrankheiten an Blättern, Stängeln, Schoten und Samen verursacht durch z.B. *Alternaria leaf spot* (*Alternaria spec. atrans tenuissima*), *Anthracnose* (*Colletotrichum gloeosporoides dematium* var. *truncatum*), *Brown spot* (*Septoria glycines*), *Cercospora leaf spot and blight* (*Cercospora kikuchii*), *Choanephora leaf blight* (*Choanephora*
- 25 *infundibulifera trispora* (Syn.)), *Dactuliophora leaf spot* (*Dactuliophora glycines*), *Downy Mildew* (*Peronospora manshurica*), *Drechslera blight* (*Drechslera glycini*), *Frogeye Leaf spot* (*Cercospora sojae*), *Leptosphaerulina Leaf Spot* (*Leptosphaerulina trifolii*), *Phyllosticta Leaf Spot* (*Phyllosticta sojaecola*), *Pod and Stem Blight* (*Phomopsis sojae*), *Powdery Mildew* (*Microsphaera diffusa*), *Pyrenochaeta Leaf Spot* (*Pyrenochaeta glycines*),
- 30 *Rhizoctonia Aerial, Foliage, and Web Blight* (*Rhizoctonia solani*), *Rust* (*Phakopsora pachyrhizi*, *Phakopsora meibomia*), *Scab* (*Sphaceloma glycines*), *Stemphylium Leaf Blight* (*Stemphylium botryosum*), *Target Spot* (*Corynespora cassiicola*).
- Pilzkrankheiten an Wurzeln und der Stängelbasis verursacht durch z.B. *Black Root Rot* (*Calonectria crotalariae*), *Charcoal Rot* (*Macrophomina phaseolina*), *Fusarium Blight* or

Wilt, Root Rot, and Pod and Collar Rot (*Fusarium oxysporum*, *Fusarium orthoceras*, *Fusarium semitectum*, *Fusarium equiseti*), *Mycoleptodiscus* Root Rot (*Mycoleptodiscus terrestris*), *Neocosmospora* (*Neocosmopora vasinfecta*), Pod and Stem Blight (*Diaporthe phaseolorum*), Stem Canker (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*),

5 *Phytophthora* Rot (*Phytophthora megasperma*), Brown Stem Rot (*Phialophora gregata*), *Pythium* Rot (*Pythium aphanidermatum*, *Pythium irregulare*, *Pythium debaryanum*, *Pythium myriotylum*, *Pythium ultimum*), *Rhizoctonia* Root Rot, Stem Decay, and Damping-Off (*Rhizoctonia solani*), *Sclerotinia* Stem Decay (*Sclerotinia sclerotiorum*), *Sclerotinia* Southern Blight (*Sclerotinia rolfsii*), *Thielaviopsis* Root Rot (*Thielaviopsis*

10 *basicola*).

Als Mikroorganismen, die einen Abbau oder eine Veränderung der technischen Materialien bewirken können, seien beispielsweise Bakterien, Pilze, Hefen, Algen und Schleimorganismen genannt. Vorzugsweise wirken die erfindungsgemäßen Wirkstoffe gegen Pilze, insbesondere Schimmelpilze, Holz verfärbende und Holz zerstörende Pilze

15 (Basidiomyceten) sowie gegen Schleimorganismen und Algen. Es seien beispielsweise Mikroorganismen der folgenden Gattungen genannt: *Alternaria*, wie *Alternaria tenuis*; *Aspergillus*, wie *Aspergillus niger*; *Chaetomium*, wie *Chaetomium globosum*; *Coniophora*, wie *Coniophora puetana*; *Lentinus*, wie *Lentinus tigrinus*; *Penicillium*, wie *Penicillium glaucum*; *Polyporus*, wie *Polyporus versicolor*; *Aureobasidium*, wie *Aureobasidium*

20 *pullulans*; *Sclerophoma*, wie *Sclerophoma pityophila*; *Trichoderma*, wie *Trichoderma viride*; *Escherichia*, wie *Escherichia coli*; *Pseudomonas*, wie *Pseudomonas aeruginosa*; *Staphylococcus*, wie *Staphylococcus aureus*.

Darüber hinaus weisen die erfindungsgemäßen Wirkstoffe auch sehr gute antimykotische Wirkungen auf. Sie besitzen ein sehr breites antimykotisches Wirkungsspektrum,

25 insbesondere gegen Dermatophyten und Sprosspilze, Schimmel und diphasische Pilze (z.B. gegen *Candida*-Spezies wie *Candida albicans*, *Candida glabrata*) sowie *Epidermophyton floccosum*, *Aspergillus*-Spezies wie *Aspergillus niger* und *Aspergillus fumigatus*, *Trichophyton*-Spezies wie *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporon*-Spezies wie *Microsporon canis* und *audouinii*. Die Aufzählung dieser Pilze stellt

30 keinesfalls eine Beschränkung des erfassbaren mykotischen Spektrums dar, sondern hat nur erläuternden Charakter.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe können daher sowohl in medizinischen als auch in nicht-medizinischen Anwendungen eingesetzt werden.

Beim Einsatz der erfindungsgemäßen Wirkstoffe als Fungizide können die Aufwandsmengen je nach Applikationsart innerhalb eines größeren Bereiches variiert werden. Die Aufwandsmenge der erfindungsgemäßen Wirkstoffe beträgt

- bei der Behandlung von Pflanzenteilen, z.B. Blättern: von 0,1 bis 10 000 g/ha, bevorzugt von 10 bis 1 000 g/ha, besonders bevorzugt von 50 bis 300g/ha (bei Anwendung durch Gießen oder Tropfen kann die Aufwandsmenge sogar verringert werden, vor allem wenn inerte Substrate wie Steinwolle oder Perlit verwendet werden);
 - bei der Saatgutbehandlung: von 2 bis 200 g pro 100 kg Saatgut, bevorzugt von 3 bis 150 g pro 100 kg Saatgut, besonders bevorzugt von 2,5 bis 25 g pro 100 kg Saatgut, ganz besonders bevorzugt von 2,5 bis 12,5 g pro 100 kg Saatgut;
 - bei der Bodenbehandlung: von 0,1 bis 10 000 g/ha, bevorzugt von 1 bis 5 000 g/ha.
- Diese Aufwandsmengen seien nur beispielhaft und nicht limitierend im Sinne der Erfindung genannt.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bzw. Mittel können also eingesetzt werden, um Pflanzen innerhalb eines gewissen Zeitraumes nach der Behandlung gegen den Befall durch die genannten Schaderreger zu schützen. Der Zeitraum, innerhalb dessen Schutz herbeigeführt wird, erstreckt sich im Allgemeinen auf 1 bis 28 Tage, bevorzugt auf 1 bis 14 Tage, besonders bevorzugt auf 1 bis 10 Tage, ganz besonders bevorzugt auf 1 bis 7 Tage nach der Behandlung der Pflanzen mit den Wirkstoffen bzw. auf bis zu 200 Tage nach einer Saatgutbehandlung.

Darüber hinaus kann durch die erfindungsgemäße Behandlung der Mykotoxingehalt im Erntegut und den daraus hergestellten Nahrungs- und Futtermitteln verringert werden.

Besonders, aber nicht ausschließlich sind hierbei folgende Mykotoxine zu nennen:

Deoxynivalenol (DON), Nivalenol, 15-Ac-DON, 3-Ac-DON, T2- und HT2- Toxin,

Fumonisine, Zearalenon, Moniliformin, Fusarin, Diaceotoxyscirpenol (DAS), Beauvericin, Enniatin, Fusaroproliferin, Fusarenol, Ochratoxine, Patulin, Mutterkornalkaloide und Aflatoxine, die beispielsweise von den folgenden Pilzen verursacht werden können:

Fusarium spec., wie *Fusarium acuminatum*, *F. avenaceum*, *F. crookwellense*, *F.*

culmorum, *F. graminearum* (*Gibberella zeae*), *F. equiseti*, *F. fujikoro*i, *F. musarum*, *F.*

oxysporum, *F. proliferatum*, *F. poae*, *F. pseudograminearum*, *F. sambucinum*, *F. scirpi*, *F.*

semitectum, *F. solani*, *F. sporotrichoides*, *F. langsethiae*, *F. subglutinans*, *F. tricinctum*, *F.*

verticillioides u.a. sowie auch von *Aspergillus spec.*, *Penicillium spec.*, *Claviceps purpurea*, *Stachybotrys spec.* u.a.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können gegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen bzw. Aufwandmengen auch als Herbizide, Safener, Wachstumsregulatoren oder Mittel zur Verbesserung der Pflanzeigenschaften, oder als Mikrobizide, beispielsweise als Fungizide, Antimykotika, Bakterizide, Virizide (einschließlich Mittel gegen Viroide) oder als Mittel gegen MLO (Mycoplasma-like-organism) und RLO (Rickettsia-like-organism) verwendet werden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als Zwischen- oder Vorprodukte für die Synthese weiterer Wirkstoffe einsetzen.

10 Die nachstehenden Beispiele erläutern die Erfindung näher.

A. Chemische Beispiele

1. Herstellung von 3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-N-isopropyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxamid (Beispiel 2.8)

Intermediat 1: 5-Chlornicotinaldehyd

15 (5-Chloropyridin-3-yl)methanol (6,3 g) wurde in Dimethylsulfoxid (12 mL) gelöst, Triethylamin (18,3 ml) wurde langsam zugetropft und der Schwefelttrioxid-Pyridin-Komplex (20,9 g) wurde portionsweise zugegeben (Exothermie: 50°C). Das Reaktionsgemisch wurde 3h gerührt, mit 2M Salzsäure auf pH 3 eingestellt und zweimal mit EtOAc ausgeschüttelt. Die organische Phase wurde mit gesättigter
20 NaHCO₃-Lösung gewaschen, über MgSO₄ getrocknet und bei 40°C eingeeengt. Ausbeute: 4,3 g 5-Chlornicotinaldehyd.

Intermediat 2: 5-Chlornicotinaldehydoxim

Hydroxylamin-Hydrochlorid (2,3 g) und Natriumacetat (2,7 g) wurden in Ethanol (50mL) unter Stickstoff vorgelegt (weiße Suspension). 5-Chlornicotinaldehyd (4,3 g) wurde in
25 Ethanol (120 mL) gelöst (30 °C, Ultraschallbad) und in 15 Minuten dazugetropft. Das Reaktionsgemisch wurde 2 Stunden gerührt und bei 40°C eingeeengt. Dichlormethan (550 mL) und Wasser (250 mL) wurden zugegeben und der resultierende Niederschlag wird abfiltriert und getrocknet. Ausbeute: 2,1 g 5-
30 Chlornicotinaldehydoxim

Intermediat 3: Ethyl-3-(5-chlorpyridin-3-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxylat

- 5-Chlornicotinaldehydoxim (2,1 g) wurden in N,N-Dimethylformamid (200 mL) unter Stickstoff vorgelegt und N-Chlorsuccinimid (1,9 g) wurde zugegeben (klare gelbe Lösung). Die Temperatur fällt zuerst auf 20°C und danach findet eine Temperaturerhöhung/Exothermie statt (nach 20 Minuten: 21°C, nach 40 Minuten: 24°C, nach 55 Minuten: 28°C) und die Lösung entfärbte sich wieder und wurde 4 h gerührt. Methacrylsäureethylester (2,3 g) wurde innerhalb von 12 Minuten zugetropft und das Reaktionsgemisch wurde gleichzeitig mit einem Eisbad auf 17°C gekühlt. Danach wurde Triethylamin (2,8 mL) zugetropft (Temperaturerhöhung findet statt; mittels Eisbad wurde das Reaktionsgemisch auf 17°C gehalten). Nach der Zugabe von Triethylamin wurde das Eisbad entfernt und das Reaktionsgemisch wurde 18 h nachgerührt und danach bei 55°C eingeeengt. Der Rückstand wurde mit Dichlormethan (200 mL) aufgenommen und dreimal mit gesättigter NaHCO₃ Lösung gewaschen. Die wässrigen Phasen wurden zweimal mit Dichlormethan gewaschen. Alle Organischen Phasen wurden gesammelt und mit gesättigter NaCl-Lösung gewaschen und über MgSO₄ getrocknet. Die organische Phase wurde bei 40°C eingeeengt. Ausbeute: 3,9 g Ethyl-3-(5-chlorpyridin-3-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxylat.

- Intermediat 4: 3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carbonsäure Ethyl-3-(5-chlorpyridin-3-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxylat (3,9 g) wurde in Methanol (24 mL) aufgenommen (braune Suspension) und Natronlauge (2M Lösung, 10,7 mL) wurde unter Eis-Wasserbad-Kühlung langsam zugetropft. Das Reaktionsgemisch wurde 10 Minuten mit Kühlung weitergerührt und danach 2 h bei RT nachgerührt. Das Methanol wurde bei 40°C abrotiert und der Rückstand wurde mit Wasser aufgenommen und im Schütteltrichter zweimal mit Dichlormethan gewaschen. Die wässrige Phase wurde mit 6M Salzsäure auf pH 1 eingestellt und danach zweimal mit EtOAc gewaschen. Die organische Phase wurde mit MgSO₄ getrocknet und bei 40 °C einrotiert. Der ölige Rückstand wurde nach einiger Zeit fest. Ausbeute: 2,6 g 3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carbonsäure
- Endstufe: 3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-N-isopropyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxamid
- 3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carbonsäure (100 mg) wurde in Dichlormethan (10 mL) vorgelegt und 1-Hydroxybenzotriazol (56 mg), Isopropylamin (49 mg), diisopropylethylamin (107 mg) und 1-(3-dimethylamino-propyl)-3-

ethylcarbodiimidhydrochloride (120 mg) wurden zugegeben und das Reaktionsgemisch wurde 16 h bei RT nachgerührt. Danach wurden H₂SO₄ (1M, 82 µL) und Wasser (1 mL) zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 10 Min nachgerührt und mit EtOAc gewaschen. Die organische Phase wurde mit NaHCO₃ Lösung gewaschen,
5 mit MgSO₄ getrocknet und bei 40 °C einrotiert. Das Rohprodukt wurde über Kieselgel chromatographiert. Ausbeute: 80 mg 3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-N-isopropyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxamid.

2. Herstelluung von: 3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-N-isopropyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carbothioamid (Beispiel 2.61)
10

3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-N-isopropyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxamid (105 mg) wurde in Toluol (17 ml) gelöst und mit 4-Methoxyphenyldithiophosphonsäureanhydrid (91 mg) versetzt. Das Reaktionsgemisch wurde im Ölbad auf 120°C für 5h erwärmt und danach bei 40°C eingeeengt. Das
15 Rohprodukt wurde über Kieselgel chromatographiert. Ausbeute: 76 mg 3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-N-isopropyl-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carbothioamid

3. Herstellung von : 3-(2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)-N-[(2-chlorpyridin-4-yl)methyl]-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxamid (Beispiel 7.13)

20 Intermediat 1: (2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)methanol

Methyl 2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-carboxylat (4,0g) wurde in Ethanol (46 mL) gelöst, mit Eis gekühlt und Natriumborohydrid (8,0g) wurde portionsweise zugegeben. Nach 30 Min. wurde das Eisbad entfernt und das Reaktionsgemisch wurde für 15 Min. nachgerührt. Das Reaktionsgemisch wurde mit Eis und Wasser versetzt, eingeeengt,
25 mit EtOAc extrahiert, über MgSO₄ getrocknet und bei 40°C eingeeengt. Das Rohproduct wurde mittels HPLC gereinigt. Ausbeute: 1,4g 2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)methanol

Intermediat 2: 2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-carbaldehyd

2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)methanol (1,6 g) wurde in Dimethylsulfoxid (150 mL)
30 gelöst, Triethylamin (4,2 mL) wurde langsam zugetropft und der Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex (4,9 g) wurde portionsweise zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 5h gerührt, mit 2M Salzsäure auf pH 3 eingestellt und zweimal mit EtOAc ausgeschüttelt. Die organische Phase wurde mit gesättigter NaHCO₃-Lösung

gewaschen, über MgSO_4 getrocknet und bei 40°C eingengt. Ausbeute: 2,0 g 2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-carboxaldehyd

Intermediat 3: 2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-carbaldehydoxim

- 5 Hydroxylamin-Hydrochlorid (0,72 g) und Natriumacetat (0,85 g) wurden in Ethanol (50mL) unter Stickstoff vorgelegt (weiße Suspension). 2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-carboxaldehyd (1,6 g) wurde in Ethanol (150 mL) gelöst und in 45 Minuten dazugetropft. Das Reaktionsgemisch wurde 20 Stunden gerührt und bei 40°C eingengt. Wasser (100 mL) wurde zugegeben und die Mischung wurde dreimal mit
- 10 EtOAc extrahiert. Die organische Phase wurde über MgSO_4 getrocknet und das Rohprodukt wurde über Säulechromatographie gereinigt. Ausbeute: 0,31 g 2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-carbaldehydoxim

Intermediat 4: 2-Chlor-N-hydroxy-6-methylpyrimidin-4-carboximidoylchlorid

- 15 2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-carbaldehydoxim (0,31 g) wurden in N,N-Dimethylformamid (12 mL) unter Stickstoff vorgelegt und N-Chlorsuccinimid (0,31 g) wurde zugegeben. Nach 2h wurde die Reaktionslösung auf Eiswasser (33ml) gegossen und dreimal mit Diethylether extrahiert. Die organische Phase wurde mit 0,5M HCl Lösung und mitges. NaCl Lösung gewaschen, über MgSO_4 getrocknet und
- 20 bei 40°C eingengt. Ausbeute: 0,37g 2-Chlor-N-hydroxy-6-methylpyrimidin-4-carboximidoylchlorid

Intermediat 5: Methyl-3-(2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxylat

- 25 2-Chlor-N-hydroxy-6-methylpyrimidin-4-carboximidoylchlorid (0,37g) wurde in 2-Propanol (15mL) gelöst und mit Methacrylsäuremethylester (1,9 g) versetzt. Natriumhydrogencarbonat (1,6g) wurde zugegeben und das Reaktionsgemisch wurde für 2h auf 40°C erwärmt. Das Reaktionsgemisch wurde filtriert und bei 40°C eingengt. Das Rohprodukt wurde über Säulechromatographie gereinigt. Ausbeute: 0,37g Methyl-3-(2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxylat
- 30

Intermediat 6: 3-(2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carbonsäure

Methyl-3-(2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxylat (0,37 g) wurde in THF (320 mL) und Wasser (14 mL) gelöst und mit wässrige 2M LiOH (0,66 mL) versetzt. Das Reaktionsgemisch wurde 3 h bei RT nachgerührt und danach bei 40°C eingengt. Der Rückstand wurde mit Wasser aufgenommen und im Schütteltrichter zweimal mit EtOAc gewaschen. Die wässrige Phase wurde mit 2M Salzsäure auf pH 1 eingestellt und danach zweimal mit EtOAc extrahiert. Die organische Phase wurde mit MgSO₄ getrocknet und bei 40 °C einrotiert. Ausbeute: 0,29g 3-(2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carbonsäure

Endstufe: 3-(2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)-N-[(2-chlorpyridin-4-yl)methyl]-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxamid

































3-(5-Chlorpyridin-3-yl)-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carbonsäure (87 mg) und N-Hydroxysuccinimid (41mg) wurden in Dichlormethan (5 mL) gelöst und mit 1-(3-

dimethylamino-propyl)-3-ethylcarbodiimidhydrochloride (71 mg) versetzt. Nach 2h, Triethylamin (0,2 mL) und 1-(2-Chlorpyridin-4-yl)methanaminhydrochlorid (73 mg) wurden zugegeben und das Reaktionsgemisch wurde 65 h bei RT nachgerührt. Das Reaktionsgemisch wurde mit EtOAc verdünnt und mit 2M HCl und ges. NaHCO₃ Lsg. Gewaschen. Die organische Phase wurde mit MgSO₄ getrocknet und bei 40 °C

einrotiert. Das Rohprodukt wurde über Kieselgel chromatographiert. Ausbeute: 34 mg 3-(2-Chlor-6-methylpyrimidin-4-yl)-N-[(2-chlorpyridin-4-yl)methyl]-5-methyl-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-carboxamid

Tabelle A: Definitionen der Reste „-A-X“ in Formel (I), die zur Darstellung der erfindungsgemäßen Verbindungen in Tabellen 1 bis 28 verwendet werden


































Nr.		Nr.		Nr.	
A.1		A.2		A.3	
A.4		A.5		A.6	

Nr.		Nr.		Nr.	
A.7		A.8		A.9	
A.10		A.11		A.12	
A.13		A.14		A.15	
A.16		A.17		A.18	
A.19		A.20		A.21	
A.22		A.23		A.24	
A.25		A.26		A.27	
A.28		A.29		A.30	
A.31		A.32		A.33	
A.34		A.35		A.36	
A.37		A.38		A.39	
A.40		A.41		A.42	

Nr.		Nr.		Nr.	
A.43		A.44		A.45	
A.46		A.47		A.48	
A.49		A.50		A.51	
A.52		A.53		A.54	
A.55		A.56		A.57	
A.58		A.59		A.60	
A.61		A.62		A.63	
A.64		A.65		A.66	
A.67		A.68		A.69	

Nr.		Nr.		Nr.	
A.70		A.71		A.72	
A.73		A.74		A.75	
A.76		A.77		A.78	
A.79		A.80		A.81	
A.82		A.83		A.84	
A.85		A.86		A.87	
A.88		A.89		A.90	
A.91		A.92		A.93	
A.94		A.95		A.96	

Nr.		Nr.		Nr.	
A.97		A.98		A.99	
A.100		A.101		A.102	
A.103		A.104		A.105	
A.106		A.107		A.108	
A.109		A.110		A.111	
A.112		A.113		A.114	
A.115		A.116		A.117	
A.118		A.119		A.120	
A.121		A.122		A.123	
A.124		A.125		A.126	

Nr.		Nr.		Nr.	
A.127		A.128		A.129	
A.130		A.131		A.132	
A.133		A.134		A.135	
A.136		A.137		A.138	
A.139		A.140		A.141	
A.142		A.143		A.144	
A.145		A.146		A.147	
A.148		A.149		A.150	
A.151		A.152		A.153	
A.154		A.155		A.156	

Nr.		Nr.		Nr.	
A.157		A.158		A.159	
A.160		A.161		A.162	
A.163		A.164		A.165	
A.166		A.167		A.168	
A.169		A.170		A.171	
A.172		A.173		A.174	
A.175		A.176		A.177	
A.178		A.179		A.180	
A.181		A.182		A.183	
A.184		A.185		A.186	


Nr.		Nr.		Nr.	
A.187		A.188		A.189	
A.190		A.191		A.192	
A.193		A.194		A.195	
A.196		A.197		A.198	
A.199		A.200		A.201	
A.202		A.203		A.204	
A.205		A.206		A.207	
A.208		A.209		A.210	
A.211		A.212		A.213	
A.214		A.215		A.216	

Nr.		Nr.		Nr.	
A.217		A.218		A.219	
A.220		A.221		A.222	
A.223		A.224		A.225	
A.226		A.227		A.228	
A.229		A.230		A.231	
A.232		A.233		A.234	
A.135		A.236		A.237	
A.238		A.239		A.240	

In Analogie zu der Herstellung der oben genannten Verbindungen und gemäß den allgemeinen Angaben zur Herstellung sind die in folgenden Tabellen genannten

5 Verbindungen erhältlich.


Tabelle 1



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	R ^D	Y	A-X
1.1	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.7
1.2	H	H	Me	H	CF ₃	H	H	H	O	A.7
1.3	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.13
1.4	H	H	Me	H	CF ₃	H	H	H	O	A.13
1.5	H	H	Me	H	Br	H	H	H	O	A.13
1.6	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.13
1.7	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.25
1.8	H	H	Me	H	CF ₃	H	H	H	O	A.25
1.9	H	H	Me	H	Cl	H	H	H	O	A.25
1.10	H	H	Me	H	Br	H	H	H	O	A.25
1.11	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.25
1.12	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.35
1.13	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.64
1.14	H	H	Me	H	CF ₃	H	H	H	O	A.64
1.15	H	H	Me	H	OMe	H	H	H	O	A.64
1.16	H	H	Me	H	Cl	H	H	H	O	A.64
1.17	H	H	Me	H	Br	H	H	H	O	A.64
1.18	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.64
1.19	H	H	Me	H	OMe	H	H	H	O	A.101
1.20	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.103
1.21	H	H	Me	H	OMe	H	H	H	O	A.103
1.22	H	H	Me	H	Cl	H	H	H	O	A.103
1.23	H	H	Me	H	Br	H	H	H	O	A.103
1.24	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.103
1.25	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.109
1.26	H	H	Me	H	Cl	H	H	H	O	A.109
1.27	H	H	Me	H	Br	H	H	H	O	A.109

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	R ^D	Y	A-X
1.28	H	H	Me	H	CF ₃	H	H	H	O	A.143
1.29	H	H	Me	H	OMe	H	H	H	O	A.143
1.30	H	H	Me	H	Cl	H	Cl	H	O	A.143
1.31	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.220
1.32	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.220
1.33	H	H	Me	H	CF ₃	H	H	H	O	A.220
1.34	H	H	Me	H	OMe	H	H	H	O	A.220
1.35	H	H	Me	H	Cl	H	H	H	O	A.220
1.36	H	H	Me	H	Br	H	H	H	O	A.220
1.37	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.220
1.38	H	H	Me	H	Cl	H	Cl	H	O	A.220
1.39	H	H	OMe	H	OMe	H	H	H	O	A.64
1.40	H	H	Vinyl	H	Me	H	H	H	O	A.64
1.41	H	H	Me	H	Me	H	H	H	S	A.103
1.42	H	H	Me	H	CF ₃	H	H	H	S	A.204

Tabelle 2



5


Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	R ^D	Y	A-X
2.1	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.2
2.2	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.4
2.3	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.4
2.4	H	H	Me	H	H	H	F	H	O	A.7
2.5	H	H	Me	H	H	H	Br	H	O	A.7
2.6	H	H	Me	H	H	H	OMe	H	O	A.13
2.7	H	H	Me	H	H	H	F	H	O	A.13
2.8	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.13
2.9	H	H	Me	H	H	H	Br	H	O	A.13

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	R ^D	Y	A-X
2.10	H	H	Me	H	H	OMe	H	H	O	A.25
2.11	H	H	Me	H	H	H	CN	H	O	A.25
2.12	H	H	Me	H	H	H	OMe	H	O	A.25
2.13	H	H	Me	H	H	H	F	H	O	A.25
2.14	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.25
2.15	H	H	Me	H	H	H	Br	H	O	A.25
2.16	H	H	Me	H	H	H	F	H	O	A.35
2.17	H	H	Me	H	H	H	Br	H	O	A.35
2.18	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.38
2.19	H	H	Me	H	H	H	F	H	O	A.59
2.20	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.64
2.21	H	H	Me	H	H	OMe	H	H	O	A.64
2.22	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.64
2.23	H	H	Me	H	H	H	Me	H	O	A.64
2.24	H	H	Me	H	H	H	CN	H	O	A.64
2.25	H	H	Me	H	H	H	F	H	O	A.64
2.26	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.64
2.27	H	H	Me	H	H	H	Br	H	O	A.64
2.28	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.74
2.29	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.101
2.30	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.103
2.31	H	H	Me	H	H	H	CN	H	O	A.103
2.32	H	H	Me	H	H	H	F	H	O	A.103
2.33	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.103
2.34	H	H	Me	H	H	H	Br	H	O	A.103
2.35	H	H	Me	H	H	OMe	H	H	O	A.106
2.36	H	H	Me	H	H	OMe	H	H	O	A.109
2.37	H	H	Me	H	H	H	Br	H	O	A.109
2.38	H	H	Me	H	H	OMe	H	H	O	A.112
2.39	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.112
2.40	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.132
2.41	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.143
2.42	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.146

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	R ^D	Y	A-X
2.43	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.202
2.44	H	H	Me	H	H	OMe	H	H	O	A.204
2.45	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.204
2.46	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.220
2.47	H	H	Me	H	H	OMe	H	H	O	A.220
2.48	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.220
2.49	H	H	Me	H	H	H	CN	H	O	A.220
2.50	H	H	Me	H	H	H	OMe	H	O	A.220
2.51	H	H	Me	H	H	H	F	H	O	A.220
2.52	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	O	A.220
2.53	H	H	Me	H	H	H	Br	H	O	A.220
2.54	H	H	Et	H	H	Cl	H	H	O	A.4
2.55	H	H	OMe	H	H	H	H	H	O	A.64
2.56	H	H	OMe	H	H	H	H	H	O	A.143
2.57	H	H	OMe	H	H	H	H	H	O	A.202
2.58	H	H	OMe	H	H	H	Cl	H	O	A.220
2.59	H	H	Vinyl	H	H	H	Cl	H	O	A.64
2.60	H	H	Vinyl	H	H	H	Cl	H	O	A.220
2.61	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	S	A.13
2.62	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	S	A.74
2.63	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	S	A.143
2.64	H	H	Me	H	H	H	Cl	H	S	A.220
2.65	H	H	Me	Me	H	Cl	H	H	O	A.4
2.66	H	H	Me	Me	H	H	Cl	H	O	A.220

75


Tabelle 3



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	R ^D	Y	A-X
3.1	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.13
3.2	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.25
3.3	H	H	Me	H	H	Cl	Cl	H	O	A.25
3.4	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.38
3.5	H	H	Me	H	H	Cl	Cl	H	O	A.38
3.6	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.64
3.7	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.64
3.8	H	H	Me	H	H	Cl	Cl	H	O	A.64
3.9	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.74
3.10	H	H	Me	H	H	Cl	Cl	H	O	A.74
3.11	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.112
3.12	H	H	Me	H	H	Cl	Cl	H	O	A.112
3.13	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.143
3.14	H	H	Me	H	H	Cl	Cl	H	O	A.143
3.15	H	H	Me	H	H	OMe	H	H	O	A.220
3.16	H	H	Me	H	H	Me	H	H	O	A.220
3.17	H	H	Me	H	H	CF ₃	H	H	O	A.220
3.18	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	O	A.220
3.19	H	H	Me	H	H	Cl	Cl	H	O	A.220
3.20	H	H	Me	H	H	Cl	H	H	S	A.220

76


Tabelle 4



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
4.1	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.13
4.2	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.64
4.3	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.64
4.4	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.64
4.5	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.64
4.6	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.220
4.7	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.220
4.8	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.220
4.9	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.220


5

Tabelle 5



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
5.1	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.13
5.2	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.64
5.3	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.64
5.4	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.64
5.5	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.220
5.6	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.220
5.7	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.220
5.8	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.64
5.9	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.220


Tabelle 6



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
6.1	H	H	Me	H	OMe	H	OMe	O	A.7
6.2	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.13
6.3	H	H	Me	H	OMe	H	OMe	O	A.13
6.4	H	H	Me	H	OMe	H	OMe	O	A.25
6.5	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.38
6.6	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.64
6.7	H	H	Me	H	OMe	H	OMe	O	A.64
6.8	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.74
6.9	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.103
6.10	H	H	Me	H	OMe	H	OMe	O	A.103
6.11	H	H	Me	H	OMe	H	OMe	O	A.109
6.12	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.112
6.13	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.143
6.14	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.146
6.15	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.204
6.16	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.220
6.17	H	H	Me	H	OMe	H	OMe	O	A.220
6.18	H	H	Me	H	Me	H	Me	O	A.223
6.19	H	H	Me	H	Me	H	Me	S	A.74
6.20	H	H	Me	H	Me	H	Me	S	A.220


78

Tabelle 7




Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
7.1	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.13
7.2	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.13
7.3	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.38
7.4	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.38
7.5	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.64
7.6	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.64
7.7	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.74
7.8	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.74
7.9	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.106
7.10	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.106
7.11	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.112
7.12	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.112
7.13	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.143
7.14	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.143
7.15	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.146
7.16	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.146
7.17	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.204
7.18	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.204
7.19	H	H	Me	H	Cl	Me	H	O	A.220
7.20	H	H	Me	H	OMe	Me	H	O	A.220
7.21	H	H	OMe	H	Cl	Me	H	O	A.64
7.22	H	H	OMe	H	OMe	Me	H	S	A.64

Tabelle 8



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
8.1	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.13
8.2	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.13
8.3	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.38
8.4	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.38
8.5	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.64
8.6	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.64
8.7	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.74
8.8	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.74
8.9	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.103
8.10	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.103
8.11	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.112
8.12	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.112
8.13	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.143
8.14	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.143
8.15	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.146
8.16	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.146
8.17	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.220
8.18	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.220
8.19	H	H	OMe	H	H	H	H	O	A.64
8.20	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.64


Tabelle 9



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
9.1	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.38
9.2	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.38
9.3	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.64
9.4	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.64
9.5	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.74
9.6	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.74
9.7	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.103
9.8	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.103
9.9	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.112
9.10	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.112
9.11	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.143
9.12	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.143
9.13	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.146
9.14	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.146
9.15	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.204
9.16	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.204
9.17	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.220
9.18	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.220
9.19	H	H	OMe	H	Cl	H	H	O	A.64
9.20	H	H	Me	H	Cl	H	H	S	A.204

81


Tabelle 10



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	A-X
10.1	H	H	Me	H	H	H	O	A.64
10.2	H	H	Me	H	H	Me	O	A.64
10.3	H	H	Me	H	H	H	O	A.74
10.4	H	H	Me	H	H	Me	O	A.74
10.5	H	H	Me	H	H	H	O	A.112
10.6	H	H	Me	H	H	Me	O	A.112
10.7	H	H	Me	H	H	H	O	A.220
10.8	H	H	Me	H	H	Me	O	A.220
10.9	H	H	Me	H	H	H	S	A.220

5

Tabelle 11



10


Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	A-X
11.1	H	H	Me	H	H	H	O	A.64
11.2	H	H	Me	H	Me	H	O	A.64
11.3	H	H	Me	H	H	H	O	A.74
11.4	H	H	Me	H	Me	H	O	A.74
11.5	H	H	Me	H	H	H	O	A.112
11.6	H	H	Me	H	Me	H	O	A.112
11.7	H	H	Me	H	H	H	O	A.143
11.8	H	H	Me	H	Me	H	O	A.143
11.9	H	H	Me	H	H	H	O	A.146

82

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	A-X
11.10	H	H	Me	H	Me	H	O	A.146
11.11	H	H	Me	H	H	H	O	A.204
11.12	H	H	Me	H	Me	H	O	A.204
11.13	H	H	Me	H	H	H	O	A.220
11.14	H	H	Me	H	Me	H	O	A.220
11.15	H	H	OMe	H	Me	H	O	A.13
11.16	H	H	Et	H	Me	H	O	A.64
11.17	H	H	Vinyl	H	Me	H	O	A.64
11.18	H	H	Vinyl	H	Me	H	O	A.220
11.19	H	H	Me	H	Me	H	S	A.64
11.20	H	H	Me	H	Me	H	S	A.220

5


Tabelle 12



10

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	A-X
12.1	H	H	Me	H	H	H	O	A.64
12.2	H	H	Me	H	H	Me	O	A.64
12.3	H	H	Me	H	H	H	O	A.74
12.4	H	H	Me	H	H	Me	O	A.74
12.5	H	H	Me	H	H	H	O	A.112
12.6	H	H	Me	H	H	Me	O	A.112
12.7	H	H	Me	H	H	H	O	A.220
12.8	H	H	Me	H	H	Me	O	A.220
12.9	H	H	Me	H	H	H	O	A.220


Tabelle 13



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	A-X
13.1	H	H	Me	H	H	H	O	A.64
13.2	H	H	Me	H	Me	H	O	A.64
13.3	H	H	Me	H	H	H	O	A.74
13.4	H	H	Me	H	Me	H	O	A.74
13.5	H	H	Me	H	H	H	O	A.112
13.6	H	H	Me	H	Me	H	O	A.112
13.7	H	H	Me	H	H	H	O	A.220
13.8	H	H	Me	H	Me	H	O	A.220
13.9	H	H	Me	H	H	H	S	A.220

5


Tabelle 14



10

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	R ^D	Y	A-X
14.1	H	H	Me	H	H	Me	H	H	O	A.64
14.2	H	H	Me	H	H	Et	H	H	O	A.64
14.3	H	H	Me	H	H	Me	H	H	O	A.74
14.4	H	H	Me	H	H	Et	H	H	O	A.74
14.5	H	H	Me	H	H	Me	H	H	O	A.112
14.6	H	H	Me	H	H	Et	H	H	O	A.112
14.7	H	H	Me	H	H	Me	H	H	O	A.220
14.8	H	H	Me	H	H	Et	H	H	O	A.220
14.9	H	H	Me	H	H	Me	H	H	S	A.220


Tabelle 15



5

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
15.1	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.13
15.2	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.13
15.3	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.25
15.4	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.25
15.5	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.35
15.6	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.35
15.7	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.59
15.8	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.59
15.9	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.64
15.10	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.64
15.11	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.103
15.12	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.103
15.13	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.143
15.14	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.143
15.15	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.220
15.16	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.220
15.17	H	H	Et	H	Cl	H	H	O	A.220
15.18	H	H	OMe	H	Cl	H	H	O	A.220
15.19	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.64
15.20	H	H	Me	H	Cl	H	H	S	A.64


Tabelle 16



5

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
16.1	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.13
16.2	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.13
16.3	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.13
16.4	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.35
16.5	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.35
16.6	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.35
16.7	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.64
16.8	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.64
16.9	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.64
16.10	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.103
16.11	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.103
16.12	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.103
16.13	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.143
16.14	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.143
16.15	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.143
16.16	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.220
16.17	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.220
16.18	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.220
16.19	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.64
16.20	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.220


Tabelle 17



5

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
17.1	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.13
17.2	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.13
17.3	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.13
17.4	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.59
17.5	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.59
17.6	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.59
17.7	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.64
17.8	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.64
17.9	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.64
17.10	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.103
17.11	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.103
17.12	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.103
17.13	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.132
17.14	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.132
17.15	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.132
17.16	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.220
17.17	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.220
17.18	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.220
17.19	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.64
17.20	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.220

Tabelle 18




5

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
18.1	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.25
18.2	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.25
18.3	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.25
18.4	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.35
18.5	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.35
18.6	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.35
18.7	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.64
18.8	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.64
18.9	H	H	Me	H	Br	H	H	O	A.64
18.10	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.64
18.11	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.64
18.12	H	H	Me	H	Br	Br	H	O	A.64
18.13	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.103
18.14	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.103
18.15	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.103
18.16	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.112
18.17	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.112
18.18	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.112
18.19	H	H	Me	H	Br	Br	H	O	A.112
18.20	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.143
18.21	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.143
18.22	H	H	Me	H	Br	H	H	O	A.143
18.23	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.143
18.24	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.143
18.25	H	H	Me	H	Br	Br	H	O	A.143

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
18.26	H	H	Me	H	H	Cl	H	O	A.220
18.27	H	H	Me	H	H	Br	H	O	A.220
18.28	H	H	Me	H	Cl	H	H	O	A.220
18.29	H	H	Me	H	Br	Br	H	O	A.220
18.30	H	H	Me	H	H	H	H	O	A.220
18.31	H	H	OMe	H	H	Br	H	O	A.220
18.32	H	H	Vinyl	H	H	Br	H	O	A.143
18.33	H	H	Vinyl	H	H	H	H	O	A.143
18.34	H	H	Me	H	H	Br	H	S	A.64
18.35	H	H	Me	H	H	Cl	H	S	A.64
18.36	H	H	Me	H	H	H	H	S	A.64

Tabelle 19




5

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
19.1	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.38
19.2	H	H	Me	H	Me	Me	H	O	A.38
19.3	H	H	Me	H	Et	H	H	O	A.38
19.4	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.64
19.5	H	H	Me	H	Me	Me	H	O	A.64
19.6	H	H	Me	H	Et	H	H	O	A.64
19.7	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.74
19.8	H	H	Me	H	Me	Me	H	O	A.74
19.9	H	H	Me	H	Et	H	H	O	A.74
19.10	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.112
19.11	H	H	Me	H	Me	Me	H	O	A.112
19.12	H	H	Me	H	Et	H	H	O	A.112
19.13	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.143

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
19.14	H	H	Me	H	Me	Me	H	O	A.143
19.15	H	H	Me	H	Et	H	H	O	A.143
19.16	H	H	Me	H	Me	H	H	O	A.220
19.17	H	H	Me	H	Me	Me	H	O	A.220
19.18	H	H	Me	H	Et	H	H	O	A.220
19.19	H	H	Me	H	Me	H	Cl	O	A.220
19.20	H	H	Me	H	Me	H	H	S	A.64

Tabelle 20



5


Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
20.1	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.13
20.2	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.13
20.3	H	H	Me	H	H	Me	Cl	O	A.13
20.4	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.64
20.5	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.64
20.6	H	H	Me	H	Me	Et	H	O	A.64
20.7	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.112
20.8	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.112
20.9	H	H	Me	H	Me	Et	H	O	A.112
20.10	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.143
20.11	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.143
20.12	H	H	Me	H	Me	Et	H	O	A.143
20.13	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.214
20.14	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.214
20.15	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.220
20.16	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.220
20.17	H	H	Me	H	Me	Et	H	O	A.220

90

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
20.18	H	H	Me	H	H	Me	H	S	A.220
20.19	H	H	Me	H	H	Et	H	S	A.220
20.20	H	H	Me	H	Me	Et	H	S	A.220


Tabelle 21

5



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	Y	A-X
21.1	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.13
21.2	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.13
21.3	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.38
21.4	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.38
21.5	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.64
21.6	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.64
21.7	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.74
21.8	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.74
21.9	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.112
21.10	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.112
21.11	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.132
21.12	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.132
21.13	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.143
21.14	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.143
21.15	H	H	Me	H	H	Me	H	O	A.220
21.16	H	H	Me	H	H	Et	H	O	A.220
21.17	H	H	Me	H	Me	Me	H	O	A.220
21.18	H	H	Me	H	Cl	Et	H	O	A.220
21.19	H	H	Me	H	H	Me	H	S	A.13
21.20	H	H	Me	H	H	Et	H	S	A.64


Tabelle 22



5

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	Z	A-X
22.1	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.64
22.2	H	H	Me	H	H	Me	O	O	A.64
22.3	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.112
22.4	H	H	Me	H	H	Me	O	O	A.112
22.5	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.143
22.6	H	H	Me	H	H	Me	O	O	A.143
22.7	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.220
22.8	H	H	Me	H	H	Me	O	O	A.220
22.9	H	H	Me	H	H	H	S	O	A.64
22.10	H	H	Me	H	H	Me	S	O	A.64
22.11	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.64
22.12	H	H	Me	H	H	Me	O	S	A.64
22.13	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.112
22.14	H	H	Me	H	H	Me	O	S	A.112
22.15	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.143
22.16	H	H	Me	H	H	Me	O	S	A.143
22.17	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.220
22.18	H	H	Me	H	H	Me	O	S	A.220
22.19	H	H	Me	H	H	H	S	S	A.64
22.20	H	H	Me	H	H	Me	S	S	A.64


Tabelle 23



5


Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	Z	A-X
23.1	H	H	Me	H	Cl	H	O	O	A.64
23.2	H	H	Me	H	Me	H	O	O	A.64
23.3	H	H	Me	H	Cl	H	O	O	A.74
23.4	H	H	Me	H	Me	H	O	O	A.74
23.5	H	H	Me	H	Cl	H	O	O	A.112
23.6	H	H	Me	H	Me	H	O	O	A.112
23.7	H	H	Me	H	Cl	H	O	O	A.220
23.8	H	H	Me	H	Me	H	O	O	A.220
23.9	H	H	Me	H	Me	H	S	O	A.220
23.10	H	H	OMe	H	Me	H	O	O	A.220
23.11	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.38
23.12	H	H	Me	H	Me	H	O	S	A.38
23.13	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.74
23.14	H	H	Me	H	Me	H	O	S	A.74
23.15	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.112
23.16	H	H	Me	H	Me	H	O	S	A.112
23.17	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.143
23.18	H	H	Me	H	Me	H	O	S	A.143
23.19	H	H	Me	H	Cl	H	O	S	A.143
23.20	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.204
23.21	H	H	Me	H	Me	H	O	S	A.204
23.22	H	H	Me	H	Cl	H	O	S	A.204
23.23	H	H	Me	H	H	H	S	S	A.204
23.24	H	H	Me	H	Me	H	S	S	A.204

Tabelle 24



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	Z	A-X
24.1	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.64
24.2	H	H	Me	H	H	Br	O	O	A.64
24.3	H	H	Me	H	Cl	Br	O	O	A.64
24.4	H	H	Me	H	H	Br	O	O	A.112
24.5	H	H	Me	H	Cl	Br	O	O	A.112
24.6	H	H	Me	H	H	Br	O	O	A.143
24.7	H	H	Me	H	Cl	Br	O	O	A.143
24.8	H	H	Me	H	H	Br	O	O	A.220
24.9	H	H	Me	H	Cl	Br	O	O	A.220
24.10	H	H	Me	H	H	H	S	O	A.64
24.11	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.64
24.12	H	H	Me	H	H	Br	O	S	A.64
24.13	H	H	Me	H	Cl	Br	O	S	A.64
24.14	H	H	Me	H	H	Br	O	S	A.112
24.15	H	H	Me	H	Cl	Br	O	S	A.112
24.16	H	H	Me	H	H	Br	O	S	A.143
24.17	H	H	Me	H	Cl	Br	O	S	A.143
24.18	H	H	Me	H	H	Br	O	S	A.220
24.19	H	H	Me	H	Cl	Br	O	S	A.220
24.20	H	H	OMe	H	H	Br	O	S	A.64
24.21	H	H	Et	H	H	Br	O	S	A.143
24.22	H	H	Vinyl	H	H	Br	O	S	A.220
24.23	H	H	Me	H	H	Br	S	S	A.64
24.24	H	H	OMe	H	H	Br	S	S	A.220


Tabelle 25



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	Z	A-X
25.1	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.64
25.2	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.74
25.3	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.112
25.4	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.220
25.5	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.64
25.6	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.74
25.7	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.112
25.8	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.220
25.9	H	H	Me	H	H	H	S	S	A.64

5


Tabelle 26



10

Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	Z	A-X
26.1	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.64
26.2	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.74
26.3	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.112
26.4	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.220
26.5	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.64
26.6	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.74
26.7	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.112
26.8	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.220
26.9	H	H	Me	H	H	H	S	S	A.64


Tabelle 27



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	Z	A-X
27.1	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.64
27.2	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.74
27.3	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.112
27.4	H	H	Me	H	H	H	O	O	A.220
27.5	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.64
27.6	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.74
27.7	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.112
27.8	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.220
27.9	H	H	Me	H	H	H	O	S	A.64


5

Tabelle 28




Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	Y	A-X
28.1	H	H	Me	H	Me	H	O	A.64
28.2	H	H	Me	H	Et	H	O	A.64
28.3	H	H	Me	H	Me	H	O	A.112
28.4	H	H	Me	H	Et	H	O	A.112
28.5	H	H	Me	H	Me	H	O	A.143
28.6	H	H	Me	H	Et	H	O	A.143
28.7	H	H	Me	H	Me	H	O	A.220
28.8	H	H	Me	H	Et	H	O	A.220
28.9	H	H	Me	H	Me	H	O	A.64

Tabelle 29



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	R ^D	Y	A-X
29.1	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.64
29.2	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.64
29.3	H	H	Me	H	Me	Me	H	H	O	A.64
29.4	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.112
29.5	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.112
29.6	H	H	Me	H	Me	Me	H	H	O	A.112
29.7	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.143
29.8	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.143
29.9	H	H	Me	H	Me	Me	H	H	O	A.143
29.10	H	H	Me	H	Me	Me	H	H	O	A.217
29.11	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.220
29.12	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.220
29.13	H	H	Me	H	Me	Me	H	H	O	A.220
29.14	H	H	Me	H	Me	Me	H	H	O	A.223
29.15	H	H	Me	H	Me	Me	H	H	O	A.240
29.16	H	H	OMe	H	Me	Me	H	H	O	A.64
29.17	H	H	Vinyl	H	Me	Me	H	H	O	A.143
29.18	H	H	Vinyl	H	Me	Me	H	H	O	A.220
29.19	H	H	Me	H	Me	Me	H	H	S	A.220
29.20	H	H	Vinyl	H	Me	Me	H	H	S	A.220

Tabelle 30



Nr.	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ^A	R ^B	R ^C	R ^D	Y	A-X
30.1	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.64
30.2	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.64
30.3	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.112
30.4	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.112
30.5	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.143
30.6	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.143
30.7	H	H	Me	H	H	H	H	H	O	A.220
30.8	H	H	Me	H	Me	H	H	H	O	A.220
30.9	H	H	Me	H	H	H	H	H	S	A.220
30.10	H	H	Me	H	Me	H	H	H	S	A.220

5

Die verwendeten Abkürzungen bedeuten:

Ac	Acetoxy	Bu	Butyl	Et	Ethyl	Me	Methyl
Pr	Propyl	Pen	Pentyl	Hex	Hexyl	Ph	Phenyl
c	cyclo	s	sekundär	i	iso	t	tertiär
THF	Tetrahydrofuran						

Die NMR-Daten für die offenbarten Beispiele in Tabellen 1.1 bis 1.28 sind in Tabelle B in der Form (δ -Werte, Anzahl der H-Atome, Multipliettauf-spaltung) notiert. Die δ -Wert - Signalintensitäts - Zahlenpaare von verschiedenen Signalpeaks werden durch

10 Semikolons voneinander getrennt aufgelistet.

Tabelle B: Analytische Daten

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl ₃ gemessen, sofern nicht anders angegeben
1.2	1.19 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 3.30 (m, 2H); 3.41 (d, 1H); 4.00 (d, 1H); 6.73 (bm, 1H); 7.68 (d, 1H); 7.91 (t, 1H); 8.15 (d, 1H)
1.4	1.13 (d, 3H); 1.18 (d, 3H); 1.70 (s, 3H); 3.41 (d, 1H); 3.97 (d, 1H); 4.04 (m, 1H); 6.59 (bd, 1H); 7.69 (d, 1H); 7.90 (t, 1H); 8.15 (d, 1H)

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl ₃ gemessen, sofern nicht anders angegeben
1.5	1.13 (d, 3H); 1.18 (d, 3H); 1.70 (s, 3H); 3.38 (d, 1H); 3.92 (d, 1H); 4.03 (m, 1H); 6.58 (bd, 1H); 7.49 (d, 1H); 7.58 (t, 1H); 7.89 (d, 1H)
1.7	1.74 (s, 3H); 2.54 (s, 3H); 3.43 (d, 1H); 3.80 (m, 1H); 3.96 (d, 1H); 4.03 (m, 1H); 7.15 (m, 2H); 7.61 (t, 1H); 7.70 (d, 1H)
1.9	1.72 (s, 3H); 3.42 (d, 1H); 3.81 (m, 1H); 3.95 (d, 1H); 4.02 (m, 1H); 7.10 (bt, 1H); 7.37 (d, 1H); 7.71 (t, 1H); 7.88 (d, 1H)
1.10	1.71 (s, 3H); 3.42 (d, 1H); 3.80 (m, 1H); 3.95 (d, 1H); 4.03 (m, 1H); 7.10 (bt, 1H); 7.51 (d, 1H); 7.60 (t, 1H); 7.90 (d, 1H)
1.11	1.75 (s, 3H); 3.40 (d, 1H); 3.81 (m, 1H); 3.93 (d, 1H); 4.00 (m, 1H); 7.10 (bt, 1H); 7.33 (dd, 1H); 7.97 (d, 1H); 8.51 (d, 1H)
1.14	0.51 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.71 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.41 (d, 1H); 4.00 (d, 1H); 6.80 (bs, 1H); 7.69 (d, 1H); 7.90 (t, 1H); 8.12 (d, 1H)
1.16	0.50 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.70 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.38 (d, 1H); 3.95 (d, 1H); 6.79 (bs, 1H); 7.35 (d, 1H); 7.70 (t, 1H); 7.86 (d, 1H)
1.17	[DMSO-d ₆] 0.53 (m, 2H); 0.59 (m, 2H); 1.54 (s, 3H); 2.69 (m, 1H); 3.33 (d, 1H); 3.75 (d, 1H); 7.72 (d, 1H); 7.85 (t, 1H); 7.90 (d, 1H); 8.13 (bd, 1H)
1.20	1.70 (s, 3H); 2.53 (s, 3H); 2.54 (t, 2H); 3.39 (d, 1H); 3.55 (m, 2H); 3.68 (s, 3H); 3.95 (d, 1H); 7.17 (d, 1H); 7.24 (bm, 1H); 7.60 (t, 1H); 7.70 (d, 1H)
1.21	1.70 (s, 3H); 2.55 (t, 2H); 3.37 (d, 1H); 3.56 (m, 2H); 3.69 (s, 3H); 3.91 (s, 3H); 3.94 (d, 1H); 6.76 (d, 1H); 7.25 (bm, 1H); 7.51 (d, 1H); 7.60 (t, 1H)
1.22	1.71 (s, 3H); 2.55 (t, 2H); 3.38 (d, 1H); 3.54 (m, 2H); 3.70 (s, 3H); 3.92 (d, 1H); 7.20 (bm, 1H); 7.33 (d, 1H); 7.70 (t, 1H); 7.89 (d, 1H)
1.23	1.70 (s, 3H); 2.53 (t, 2H); 3.37 (d, 1H); 3.53 (m, 2H); 3.69 (s, 3H); 3.92 (d, 1H); 7.20 (bm, 1H); 7.49 (d, 1H); 7.58 (t, 1H); 7.90 (d, 1H)
1.25	1.70 (s, 3H); 2.55 (s, 3H); 2.60 (m, 2H); 3.38 (d, 1H); 3.55 (m, 2H); 3.95 (d, 1H); 7.15 (d, 1H); 7.49 (bt, 1H); 7.60 (t, 1H); 7.66 (d, 1H)
1.26	[DMSO-d ₆] 1.55 (s, 3H); 2.41 (t, 2H); 3.30 (m, 2H); 3.36 (d, 1H); 3.70 (d, 1H); 7.61 (d, 1H); 7.88 (d, 1H); 7.95 (t, 1H); 8.11 (bt, 1H); 12.20 (bs, 1H)
1.27	1.70 (s, 3H); 2.61 (m, 2H); 3.38 (d, 1H); 3.56 (m, 2H); 3.93 (d, 1H); 7.25 (bm, 1H); 7.49 (d, 1H); 7.58 (t, 1H); 7.90 (d, 1H)
1.32	1.43 (t, 3H); 1.71 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 2.53 (s, 3H); 3.40 (d, 1H); 3.96 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.24 (m, 2H); 6.88 (bt, 1H); 7.16 (d, 1H); 7.24 (s, 1H); 7.60 (t, 1H); 7.77 (d, 1H)
1.33	[DMSO-d ₆] 1.26 (t, 3H); 1.59 (s, 3H); 2.05 (s, 3H); 3.40 (d, 1H); 3.79 (d, 1H); 3.95 (q, 2H); 4.07 (m, 2H); 7.40 (s, 1H); 7.99 (m, 1H); 8.19 (m, 2H); 8.38 (bt, 1H)
1.34	1.42 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 2.18 (s, 3H); 3.39 (d, 1H); 3.91 (s, 3H); 3.96 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.76 (d, 1H); 6.88 (bt, 1H); 7.22 (s, 1H); 7.49 (d, 1H); 7.59 (t, 1H)
1.35	1.45 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.39 (d, 1H); 3.95 (d, 1H); 4.06 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.81 (bt, 1H); 7.25 (s, 1H); 7.35 (d, 1H); 7.69 (t, 1H); 7.83 (d, 1H)

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl_3 gemessen, sofern nicht anders angegeben
1.36	1.45 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.39 (d, 1H); 3.95 (d, 1H); 4.06 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.80 (bt, 1H); 7.25 (s, 1H); 7.49 (d, 1H); 7.58 (t, 1H); 7.88 (d, 1H)
1.37	[DMSO- d_6] 1.26 (t, 3H); 1.57 (s, 3H); 2.04 (s, 3H); 3.36 (d, 1H); 3.76 (d, 1H); 3.95 (q, 2H); 4.06 (m, 2H); 7.40 (s, 1H); 7.63 (m, 1H); 7.91 (d, 1H); 8.31 (bt, 1H); 8.62 (d, 1H)
1.38	1.42 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.35 (d, 1H); 3.92 (d, 1H); 4.06 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.75 (bt, 1H); 7.26 (s, 1H); 7.38 (d, 1H); 7.85 (d, 1H)
2.1	1.76 (s, 3H); 3.26 (d, 1H); 3.59 (m, 1H); 3.73 (m, 1H); 3.83 (d, 1H); 5.85 (m, 1H); 7.06 (bm, 1H); 8.00 (m, 1H); 8.63 (d, 1H); 8.67 (d, 1H)
2.2	1.74 (s, 3H); 2.83 (d, 3H); 3.23 (d, 1H); 3.86 (d, 1H); 6.85 (bs, 1H); 7.36 (m, 1H); 7.98 (m, 1H); 8.66 (m, 1H); 8.82 (d, 1H)
2.4	1.18 (t, 3H); 1.74 (s, 3H); 3.21 (d, 1H); 3.30 (m, 2H); 3.85 (d, 1H); 6.77 (bs, 1H); 7.73 (m, 1H); 8.52 (m, 1H); 8.60 (m, 1H)
2.5	1.18 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 3.20 (d, 1H); 3.30 (m, 2H); 3.84 (d, 1H); 6.75 (bs, 1H); 8.14 (m, 1H); 8.71 (m, 2H)
2.7	1.13 (d, 3H); 1.19 (d, 3H); 1.72 (s, 3H); 3.21 (d, 1H); 3.83 (d, 1H); 4.02 (m, 1H); 6.60 (bd, 1H); 7.73 (m, 1H); 8.53 (m, 1H); 8.62 (m, 1H)
2.8	1.14 (d, 3H); 1.17 (d, 3H); 1.73 (s, 3H); 3.20 (d, 1H); 3.84 (d, 1H); 4.02 (m, 1H); 6.59 (bd, 1H); 8.00 (t, 1H); 8.62 (d, 1H); 8.68 (d, 1H)
2.9	1.13 (d, 3H); 1.19 (d, 3H); 1.72 (s, 3H); 3.20 (d, 1H); 3.82 (d, 1H); 4.02 (m, 1H); 6.60 (bd, 1H); 8.15 (m, 1H); 8.71 (m, 2H)
2.10	1.75 (s, 3H); 3.25 (d, 1H); 3.76 (m, 1H); 3.80 (d, 1H); 3.97 (s, 3H); 4.04 (m, 1H); 6.79 (d, 1H); 7.20 (bt, 1H); 7.96 (dd, 1H); 8.28 (d, 1H)
2.11	1.79 (s, 3H); 3.28 (d, 1H); 3.85 (m, 1H); 3.88 (d, 1H); 4.02 (m, 1H); 7.08 (bt, 1H); 8.25 (m, 1H); 8.92 (d, 1H); 9.00 (d, 1H)
2.13	1.78 (s, 3H); 3.28 (d, 1H); 3.81 (m, 1H); 3.84 (d, 1H); 4.03 (m, 1H); 7.11 (bt, 1H); 7.74 (m, 1H); 8.55 (m, 1H); 8.61 (m, 1H)
2.14	1.78 (s, 3H); 3.27 (d, 1H); 3.80 (m, 1H); 3.83 (d, 1H); 4.03 (m, 1H); 7.11 (bt, 1H); 7.98 (m, 1H); 8.64 (d, 1H); 8.69 (d, 1H)
2.15	1.78 (s, 3H); 3.26 (d, 1H); 3.80 (m, 1H); 3.82 (d, 1H); 4.02 (m, 1H); 7.11 (bt, 1H); 8.15 (m, 1H); 8.72 (d, 1H); 8.74 (d, 1H)
2.16	1.77 (s, 3H); 3.30 (d, 1H); 3.87 (d, 1H); 4.20 (m, 2H); 7.27 (bm, 1H); 7.75 (m, 1H); 8.57 (m, 1H); 8.61 (m, 1H)
2.17	1.78 (s, 3H); 3.28 (d, 1H); 3.82 (d, 1H); 4.21 (m, 2H); 7.23 (bm, 1H); 8.14 (m, 1H); 8.71 (d, 1H); 8.75 (d, 1H)
2.18	1.59 (m, 3H); 1.74 & 1.78 (2 x s, 3H); 3.26 & 3.28 (2 x d, 1H); 3.83 (d, 1H); 4.84 (m, 1H); 7.06 (bm, 1H); 8.00 (m, 1H); 8.64 (m, 1H); 8.68 (m, 1H)
2.19	1.75 (s, 3H); 3.24 (d, 1H); 3.81 (d, 1H); 4.53 (m, 2H); 4.92 (m, 2H); 5.03 (m, 1H); 7.33 (bd, 1H); 7.75 (m, 1H); 8.54 (m, 1H); 8.60 (m, 1H)

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl_3 gemessen, sofern nicht anders angegeben
2.21	0.53 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.71 (s, 3H); 2.74 (m, 1H); 3.20 (d, 1H); 3.81 (d, 1H); 3.97 (s, 3H); 6.78 (d, 1H); 6.89 (bs, 1H); 7.95 (dd, 1H); 8.27 (d, 1H)
2.23	0.51 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.71 (s, 3H); 2.37 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.22 (d, 1H); 3.85 (d, 1H); 6.85 (bs, 1H); 7.79 (m, 1H); 8.49 (d, 1H); 8.62 (d, 1H)
2.25	0.51 (m, 2H); 0.80 (m, 2H); 1.71 (s, 3H); 2.37 (s, 3H); 2.74 (m, 1H); 3.22 (d, 1H); 3.85 (d, 1H); 6.80 (bs, 1H); 7.71 (m, 1H); 8.51 (m, 1H); 8.60 (m, 1H)
2.27	0.51 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.71 (s, 3H); 2.72 (m, 1H); 3.20 (d, 1H); 3.84 (d, 1H); 6.79 (bs, 1H); 8.14 (m, 1H); 8.71 (m, 2H)
2.28	1.73 (s, 3H); 1.79 (m, 1H); 2.28 (m, 1H); 3.22 (2 x d, 1H); 3.67 (m, 1H); 3.81 (m, 3H); 3.95 (m, 1H); 4.47 (m, 1H); 6.92 (bs, 1H); 8.00 (m, 1H); 8.62 (m, 1H); 8.67 (m, 1H)
2.29	1.74 (s, 3H); 1.85 (m, 2H); 2.35 (t, 2H); 3.25 (1H, d); 3.32 (m, 2H); 3.67 (s, 3H); 3.86 (d, 1H); 6.96 (bt, 1H); 7.37 (m, 1H); 7.99 (m, 1H); 8.66 (m, 1H); 8.83 (d, 1H)
2.31	1.74 (s, 3H); 2.55 (t, 2H); 3.22 (d, 1H); 3.55 (m, 2H); 3.70 (s, 3H); 3.85 (d, 1H); 7.21 (bs, 1H); 8.25 (m, 1H); 8.90 (d, 1H); 9.00 (d, 1H)
2.32	1.72 (s, 3H); 2.55 (t, 2H); 3.22 (d, 1H); 3.65 (m, 2H); 3.69 (s, 3H); 3.83 (d, 1H); 7.24 (bs, 1H); 7.74 (m, 1H); 8.52 (m, 1H); 8.59 (m, 1H)
2.34	1.72 (s, 3H); 2.54 (t, 2H); 3.20 (d, 1H); 3.53 (m, 2H); 3.70 (s, 3H); 3.81 (d, 1H); 7.23 (bs, 1H); 8.15 (m, 1H); 8.71 (m, 2H)
2.37	1.70 (s, 3H); 2.55 (m, 2H); 3.20 (d, 1H); 3.55 (m, 2H); 3.85 (d, 1H); 7.40 (bs, 1H); 8.09 (m, 1H); 8.69 (m, 2H)
2.39	1.23 (m, 6H); 1.72 & 1.74 (2 x s, 3H); 2.47 & 2.53 (2 x d, 2H); 3.20 (d, 1H); 3.81 & 3.83 (2 x d, 1H); 4.07 & 4.15 (2 x q, 2H); 4.31 (m, 1H); 7.14 (bm, 1H); 8.00 (m, 1H); 8.61 (m, 1H); 8.68 (m, 1H)
2.40	1.80 (s, 3H); 3.26 (d, 1H); 3.87 (d, 1H); 3.90 (s, 3H); 4.42 (m, 2H); 6.56 (m, 1H); 6.72 (m, 1H); 7.19 (bm, 1H); 8.01 (m, 1H); 8.09 (d, 1H); 8.63 (m, 1H); 8.68 (m, 1H)
2.41	1.80 (s, 3H); 3.28 (d, 1H); 3.87 (d, 1H); 4.45 (m, 2H); 7.08 (m, 1H); 7.17 (s, 1H); 7.29 (bm, 1H); 8.01 (m, 1H); 8.32 (d, 1H); 8.64 (d, 1H); 8.69 (d, 1H)
2.42	1.80 (s, 3H); 3.28 (d, 1H); 3.87 (d, 1H); 4.49 (m, 2H); 6.78 (m, 1H); 7.03 (m, 1H); 7.33 (bt, 1H); 8.00 (m, 1H); 8.16 (d, 1H); 8.64 (d, 1H); 8.69 (d, 1H)
2.43	1.80 (s, 3H); 3.29 (d, 1H); 3.92 (d, 1H); 4.71 (m, 2H); 7.20 (m, 1H); 7.36 (m, 1H); 8.02 (m, 2H); 8.67 (m, 1H); 8.71 (m, 2H); 8.86 (m, 1H)
2.45	1.46 (t, 3H); 1.74 (s, 3H); 3.23 (d, 1H); 3.85 (d, 1H); 4.13 (q, 2H); 4.30 (m, 2H); 6.93 (bt, 1H); 7.34 (s, 1H); 7.42 (s, 1H); 7.98 (m, 1H); 8.62 (d, 1H); 8.67 (d, 1H)
2.46	1.47 (t, 3H); 1.75 (s, 3H); 2.28 (s, 3H); 3.29 (d, 1H); 3.38 (d, 1H); 4.18 (q, 2H); 4.27 (m, 2H); 6.96 (bt, 1H); 7.38 (s, 1H); 7.68 (m, 1H); 8.30 (m, 1H); 8.77 (m, 1H); 8.95 (s, 1H)
2.49	1.44 (t, 3H); 1.76 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.23 (d, 1H); 3.88 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.23 (m, 2H); 6.78 (bt, 1H); 7.27 (s, 1H); 8.24 (m, 1H); 8.91 (d, 1H); 9.00 (d, 1H)

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl ₃ gemessen, sofern nicht anders angegeben
2.50	[DMSO-d ₆] 1.25 (t, 3H); 1.56 (s, 3H); 2.04 (s, 3H); 3.40 (d, 1H); 3.80 (d, 1H); 3.87 (s, 3H); 3.95 (q, 2H); 4.07 (m, 2H); 7.40 (s, 1H); 7.58 (m, 1H); 8.31 (bt, 1H); 8.39 (d, 1H); 8.45 (d, 1H)
2.51	1.45 (t, 3H); 1.73 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.24 (d, 1H); 3.86 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.71 (bt, 1H); 7.27 (s, 1H); 7.72 (m, 1H); 8.53 (m, 1H); 8.60 (m, 1H)
2.53	1.44 (t, 3H); 1.74 (s, 3H); 2.20 (s, 3H); 3.23 (d, 1H); 3.85 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.81 (bt, 1H); 7.27 (s, 1H); 8.14 (m, 1H); 8.71 (m, 2H)
2.54	1.01 (t, 3H); 1.97 (m, 1H); 2.16 (m, 1H); 2.84 (d, 3H); 3.24 (d, 1H); 3.74 (d, 1H); 6.81 (bs, 1H); 7.39 (d, 1H); 7.97 (dd, 1H); 8.58 (d, 1H)
2.55	0.51 (m, 2H); 0.86 (m, 2H); 2.81 (m, 1H); 3.45 (d, 1H); 3.91 (d, 1H); 6.89 (bs, 1H); 7.46 (m, 1H); 8.16 (m, 1H); 8.68 (m, 1H); 8.85 (bs, 1H)
2.56	3.40 (s, 3H); 3.46 (d, 1H); 4.02 (d, 1H); 4.80 (m, 2H); 7.17 (m, 1H); 7.38 (m, 1H); 8.05 (m, 1H); 8.37 (m, 1H); 8.70 (m, 2H); 8.86 (m, 1H)
2.57	3.45 (s, 3H); 3.50 (d, 1H); 3.93 (d, 1H); 4.80 (m, 2H); 7.25 (m, 1H); 7.41 (m, 1H); 8.02 (bt, 1H); 8.11 (m, 1H); 8.68 (m, 1H); 8.74 (m, 2H); 8.86 (m, 1H)
2.61	1.25 (d, 3H); 1.30 (d, 3H); 1.88 s, 3H); 3.38 (d, 1H); 4.32 (d, 1H); 4.55 (m, 1H); 7.98 (d, 1H); 8.44 (bs, 1H); 8.62 (d, 1H); 8.70 (s, 1H)
3.1	1.14 (d, 3H); 1.20 (d, 3H); 1.73 (s, 3H); 3.17 (d, 1H); 3.80 (d, 1H); 4.04 (m, 1H); 6.57 (bd, 1H); 7.45 (d, 1H); 7.52 (s, 1H); 8.46 (d, 1H)
3.6	0.52 (m, "H); 0.79 (m, 2H); 1.72 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.20 (d, 1H); 3.82 (d, 1H); 6.81 (bs, 1H); 7.48 (d, 2H); 8.69 (d, 2H)
3.8	0.53 (m, 2H); 0.82 (m, 2H); 1.72 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.15 (d, 1H); 3.79 (d, 1H); 6.71 (bs, 1H); 7.46 (s, 2H)
3.18	1.47 (t, 3H); 1.74 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.19 (d, 1H); 3.81 (d, 1H); 4.07 (q, 2H); 4.25 (m, 1H); 6.78 (bt, 1H); 7.26 (s, 1H); 7.43 (d, 1H); 7.51 (s, 1H); 8.46 (d, 1H)
6.3	[DMSO-d ₆] 1.07 (m, 6H); 1.55 (s, 3H); 3.32 (d, 1H); 3.72 (d, 1H); 3.90 (m, 1H); 3.92 (s, 6H); 6.31 (s, 1H); 7.85 (bd, 1H)
6.4	[DMSO-d ₆] 1.60 (s, 3H); 3.42 (d, 1H); 3.73 (d, 1H); 3.89 (m, 2H); 3.92 (s, 6H); 6.31 (s, 1H); 8.82 (bt, 1H)
6.5	1.53 & 1.59 (2 x d, 3H); 1.74 & 1.78 (2 x s, 3H); 2.50 & 2.51 (2 x s, 6H); 3.43 & 3.48 (2 x d, 1H); 3.94 & 3.95 (2 x d, 1H); 4.82 (m, 1H); 7.04 (s, 1H); 7.11 (bd, 1H)
6.8	1.72 (s, 3H); 1.79 (m, 1H); 2.26 (m, 1H); 2.52 (s, 6H); 3.41 (2 x d, 1H); 3.61 (m, 1H); 3.88 (m, 4H); 4.45 (m, 1H); 6.99 (bs, 1H); 7.03 (s, 1H)
6.10	[DMSO-d ₆] 1.55 (s, 3H); 2.50 (m, 2H); 3.31 (m, 3H); 3.54 (s, 3H); 3.70 (d, 1H); 3.91 (s, 6H); 6.31 (s, 1H); 8.20 (bt, 1H)
6.14	1.78 (s, 3H); 2.51 (s, 6H); 3.46 (d, 1H); 3.97 (d, 1H); 4.47 (m, 2H); 6.78 (s, 1H); 7.04 (m, 2H); 7.36 (bt, 1H); 8.14 (d, 1H)
6.17	[DMSO-d ₆] 1.26 (t, 3H); 1.57 (s, 3H); 2.06 (s, 3H); 3.35 (d, 1H); 3.71 (d, 1H); 3.91 (s, 6H); 3.96 (q, 2H); 4.07 (m, 2H); 6.30 (s, 1H); 7.41 (s, 1H); 8.35 (bt, 1H)

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl ₃ gemessen, sofern nicht anders angegeben
6.19	1.89 & 1.90 (2 x s, 3H); 1.91 (m, 1H); 2.37 (m, 1H); 2.52 (s, 6H); 3.57 & 3.58 (2 x d, 1H); 3.61 (m, 1H); 3.80 (m, 2H); 3.96 (m, 2H); 4.32 & 4.36 (2 x d, 1H); 4.91 (m, 1H); 7.01 (s, 1H); 8.80 (bs, 1H)
7.5	0.52 (m, 2H); 0.80 (m, 2H); 1.71 (s, 3H); 2.58 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.32 (d, 1H); 3.90 (d, 1H); 6.70 (bs, 1H); 7.66 (s, 1H)
7.6	0.51 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.70 (s, 3H); 2.49 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.32 (d, 1H); 3.90 (d, 1H); 3.99 (s, 3H); 6.74 (bs, 1H); 7.36 (s, 1H)
7.7	1.72 (s, 3H); 1.80 (m, 1H); 2.29 (m, 1H); 2.58 (s, 3H); 3.34 & 3.35 (2 x d, 1H); 3.67 (m, 1H); 3.88 (m, 4H); 4.49 (m, 1H); 6.39 (bt, 1H); 7.68 (s, 1H)
7.13	1.78 (s, 3H); 2.58 (s, 3H); 3.38 (d, 1H); 3.94 (d, 1H); 4.45 (m, 2H); 7.08 (d, 1H); 7.17 (s, 1H); 7.68 (s, 1H); 8.33 (d, 1H)
7.16	1.78 (s, 3H); 2.51 (s, 3H); 3.39 (d, 1H); 3.94 (d, 1H); 4.01 (s, 3H); 4.49 (m, 2H); 6.78 (m, 1H); 7.04 (m, 1H); 7.22 (bm, 1H); 7.37 (s, 1H); 8.16 (d, 1H)
7.17	1.47 (t, 3H); 1.73 (s, 3H); 2.57 (s, 3H); 3.33 (d, 1H); 3.90 (d, 1H); 4.11 (q, 2H); 4.30 (m, 2H); 6.82 (bs, 1H); 7.35 (s, 1H); 7.41 (s, 1H); 7.65 (s, 1H)
7.20	1.44 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 2.49 (s, 3H); 3.34 (d, 1H); 3.92 (d, 1H); 4.00 (s, 3H); 4.05 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.77 (bt, 1H); 7.52 (s, 1H)
8.5	0.54 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.74 (s, 3H); 2.74 (m, 1H); 3.22 (d, 1H); 3.88 (d, 1H); 6.81 (bs, 1H); 8.98 (s, 2H); 9.25 (s, 1H)
8.9	[DMSO-d ₆] 1.57 (s, 3H); 2.50 (m, 2H); 3.31 (m, 2H); 3.42 (d, 1H); 3.54 (s, 3H); 3.79 (d, 1H); 8.18 (bt, 1H); 9.08 (s, 2H); 9.26 (s, 1H)
8.17	1.44 (t, 3H); 1.75 (s, 3H); 2.20 (s, 3H); 3.23 (d, 1H); 3.88 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.81 (bm, 1H); 7.26 (s, 1H); 8.96 (s, 2H); 9.25 (s, 1H)
9.1	1.57 & 1.62 (2 x d, 3H); 1.73 & 1.77 (2 x s, 3H); 2.57 & 2.58 (2 x s, 3H); 3.39 & 3.43 (2 x d, 1H); 3.95 & 3.96 (2 x d, 1H); 4.85 (m, 1H); 7.08 (bd, 1H); 8.46 & 8.47 (2 x s, 1H); 8.98 & 9.00 (2 x s, 1H)
9.2	1.58 & 1.62 (2 x d, 3H); 1.74 & 1.77 (2 x s, 3H); 3.38 & 3.42 (2 x d, 1H); 3.94 & 3.95 (2 x d, 1H); 4.85 (m, 1H); 7.02 (bd, 1H); 8.60 & 8.61 (2 x s, 1H); 9.10 & 9.12 (2 x s, 1H)
9.3	0.52 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.72 (s, 3H); 2.57 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.34 (d, 1H); 3.95 (d, 1H); 6.81 (bs, 1H); 8.44 (s, 1H); 8.96 (s, 1H)
9.4	0.53 (m, 2H); 0.80 (m, 2H); 1.72 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.33 (d, 1H); 3.94 (d, 1H); 6.75 (bs, 1H); 8.58 (s, 1H); 9.08 (s, 1H)
9.11	1.80 (s, 3H); 2.58 (s, 3H); 3.42 (d, 1H); 3.99 (d, 1H); 4.45 (m, 2H); 7.08 (dd, 1H); 7.17 (d, 1H); 7.30 (bt, 1H); 8.32 (d, 1H); 8.46 (s, 1H); 8.99 (s, 1H)
9.12	1.80 (s, 3H); 3.40 (d, 1H); 3.98 (d, 1H); 4.46 (m, 2H); 7.08 (dd, 1H); 7.17 (d, 1H); 7.24 (bt, 1H); 8.33 (d, 1H); 8.61 (s, 1H); 9.11 (s, 1H)
9.14	1.80 (s, 3H); 3.40 (d, 1H); 3.98 (d, 1H); 4.48 (m, 2H); 6.79 (m, 1H); 7.05 (m, 1H); 7.24 (bs, 1H); 8.17 (m, 1H); 8.61 (s, 1H); 9.11 (s, 1H)

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl ₃ gemessen, sofern nicht anders angegeben
9.16	1.47 (t, 3H); 1.74 (s, 3H); 3.35 (d, 1H); 3.94 (d, 1H); 4.13 (q, 2H); 4.30 (m, 2H); 6.90 (bt, 1H); 7.35 (s, 1H); 7.41 (s, 1H); 8.58 (s, 1H); 9.08 (s, 1H)
9.18	1.44 (t, 3H); 1.74 (s, 3H); 2.20 (s, 3H); 3.35 (d, 1H); 3.95 (d, 1H); 4.06 (q, 2H); 4.26 (m, 2H); 6.78 (bm, 1H); 8.59 (s, 1H); 9.08 (s, 1H)
9.20	1.49 (t, 3H); 1.91 (s, 3H); 3.53 (d, 1H); 4.16 (q, 2H); 4.36 (d, 1H); 4.64 (m, 2H); 7.45 (s, 1H); 7.49 (s, 1H); 8.58 (s, 1H); 9.06 (s, 1H)
11.2	0.54 (m, 2H); 0.81 (m, 2H); 1.74 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 2.89 (s, 3H); 3.31 (d, 1H); 3.94 (d, 1H); 6.70 (bs, 1H); 9.60 (s, 1H)
11.4	1.75 (s, 3H); 1.80 (m, 1H); 2.89 (s, 3H); 3.32 & 3.33 (2 x d, 1H); 3.66 (m, 1H); 3.87 (m, 4H); 4.48 (m, 1H); 6.82 (bm, 1H); 9.62 (s, 1H)
11.6	1.24 (m, 6H); 1.73 & 1.74 (2 x s, 3H); 2.47 (m, 1H); 2.53 (m, 1H); 2.88 (s, 3H); 3.30 (d, 1H); 3.90 & 3.91 (2 x d, 1H); 4.08 & 4.17 (2 x q, 2H); 4.31 (m, 1H); 7.10 (bm, 1H); 8.62 (s, 1H)
11.10	1.81 (s, 3H); 2.90 (s, 3H); 3.38 (d, 1H); 3.97 (d, 1H); 4.50 (m, 2H); 6.79 (m, 1H); 7.07 (m, 1H); 7.19 (bt, 1H); 8.17 (d, 1H); 9.63 (s, 1H)
11.12	1.47 (t, 3H); 1.76 (s, 3H); 2.89 (s, 3H); 3.33 (d, 1H); 3.94 (d, 1H); 4.13 (q, 2H); 4.31 (m, 2H); 6.82 (bt, 1H); 7.35 (s, 1H); 7.42 (s, 1H); 9.60 (s, 1H)
11.14	1.43 (t, 3H); 1.76 (s, 3H); 2.20 (s, 3H); 2.89 (s, 3H); 3.33 (d, 1H); 3.94 (d, 1H); 4.08 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.70 (bt, 1H); 7.25 (s, 1H); 9.60 (s, 1H)
15.1	1.13 (d, 3H); 1.19 (d, 3H); 1.69 (s, 3H); 3.18 (d, 1H); 3.75 (d, 1H); 4.01 (m, 1H); 6.50 (m, 1H); 6.67 (bd, 1H); 6.70 (d, 1H); 7.52 (d, 1H)
15.2	[DMSO-d ₆] 1.04 (d, 3H); 1.06 (d, 3H); 1.50 (s, 3H); 3.22 (d, 1H); 3.64 (d, 1H); 3.88 (m, 1H); 6.70 (d, 1H); 7.05 (d, 1H); 7.80 (bd, 1H)
15.3	1.71 (s, 3H); 3.25 (d, 1H); 3.74 (m, 1H); 3.75 (d, 1H); 4.04 (m, 1H); 6.49 (m, 1H); 6.73 (d, 1H); 7.19 (bt, 1H); 7.53 (d, 1H)
15.5	1.74 (s, 3H); 3.26 (d, 1H); 3.77 (d, 1H); 4.19 (m, 2H); 6.50 (m, 1H); 6.73 (d, 1H); 7.38 (bt, 1H); 7.56 (d, 1H)
15.9	0.51 (m, 2H); 0.78 (m, 2H); 1.69 (s, 3H); 2.72 (m, 1H); 3.18 (d, 1H); 3.77 (d, 1H); 6.48 (m, 1H); 6.69 (d, 1H); 6.85 (bs, 1H); 7.51 (d, 1H)
15.15	1.40 (t, 3H); 1.70 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.20 (d, 1H); 3.79 (d, 1H); 4.04 (q, 2H); 4.23 (m, 2H); 6.49 (m, 1H); 6.70 (d, 1H); 6.89 (bs, 1H); 7.24 (s, 1H); 7.52 (d, 1H)
15.16	[DMSO-d ₆] 1.25 (t, 3H); 1.52 (s, 3H); 2.05 (s, 3H); 3.25 (d, 1H); 3.63 (d, 1H); 3.96 (q, 2H); 4.04 (m, 2H); 6.69 (d, 1H); 7.04 (d, 1H); 7.38 (s, 1H); 8.29 (bt, 1H)
16.1	1.12 (d, 3H); 1.19 (d, 3H); 1.69 (s, 3H); 3.10 (d, 1H); 3.65 (d, 1H); 4.01 (m, 1H); 6.67 (bd, 1H); 6.72 (d, 1H); 7.46 (d, 1H); 7.61 (s, 1H)
16.4	1.72 (s, 3H); 3.19 (d, 1H); 3.67 (d, 1H); 4.19 (m, 2H); 6.71 (d, 1H); 7.29 (bm, 1H); 7.47 (m, 1H); 7.62 (s, 1H)
16.7	0.52 (m, 2H); 0.77 (m, 2H); 1.68 (s, 3H); 2.72 (m, 1H); 3.20 (d, 1H); 3.67 (d, 1H); 6.50 (d, 1H); 6.38 (bs, 1H); 6.46 (m, 1H); 7.62 (s, 1H)

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl ₃ gemessen, sofern nicht anders angegeben
16.10	1.69 (s, 3H); 2.53 (t, 2H); 3.10 (d, 1H); 3.54 (m, 2H); 3.63 (d, 1H); 3.69 (s, 3H); 6.72 (d, 1H); 7.24 (bm, 1H); 7.46 (d, 1H); 7.61 (s, 1H)
16.16	1.42 (t, 3H); 1.70 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.13 (d, 1H); 3.68 (d, 1H); 4.04 (q, 2H); 4.23 (m, 2H); 6.71 (d, 1H); 6.89 (bm, 1H); 7.23 (s, 1H); 7.45 (m, 1H); 7.52 (s, 1H)
17.2	1.14 (d, 3H); 1.19 (d, 3H); 1.69 (s, 3H); 3.16 (d, 1H); 3.76 (d, 1H); 4.01 (m, 1H); 6.63 (bd, 1H); 6.89 (d, 1H); 6.94 (d, 1H)
17.4	1.72 (s, 3H); 3.27 (d, 1H); 3.80 (d, 1H); 4.52 (m, 2H); 4.89 (m, 2H); 5.01 (m, 1H); 7.05 (m, 1H); 7.20 (d, 1H); 7.38 (bm, 1H); 7.44 (d, 1H)
17.9	0.52 (m, 2H); 0.78 (m, 2H); 1.69 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.19 (d, 1H); 3.79 (d, 1H); 6.81 (bs, 1H); 7.09 (s, 1H); 7.29 (s, 1H)
17.16	[DMSO-d ₆] 1.26 (t, 3H); 1.53 (s, 3H); 2.05 (s, 3H); 3.37 (d, 1H); 3.75 (d, 1H); 3.95 (q, 2H); 4.05 (m, 2H); 7.15 (m, 1H); 7.42 (d, 1H); 7.70 (d, 1H); 8.29 (bt, 1H)
17.17	1.42 (t, 3H); 1.70 (s, 3H); 2.18 (s, 3H); 3.19 (d, 1H); 3.79 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.24 (m, 2H); 6.85 (bm, 1H); 6.89 (d, 1H); 6.95 (d, 1H); 7.23 (s, 1H)
17.18	1.41 (t, 3H); 1.70 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.20 (d, 1H); 3.80 (d, 1H); 4.06 (q, 2H); 4.24 (m, 2H); 6.84 (bm, 1H); 7.10 (s, 1H); 7.24 (s, 1H); 7.29 (s, 1H)
18.11	0.51 (m, 2H); 0.78 (m, 2H); 1.68 (s, 3H); 2.72 (m, 1H); 3.14 (d, 1H); 3.73 (d, 1H); 6.85 (bs, 1H); 7.31 (s, 1H); 7.41 (s, 1H)
18.12	0.52 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.68 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.35 (d, 1H); 3.98 (d, 1H); 6.80 (bs, 1H); 7.29 (s, 1H)
18.18	1.20 (t, 3H); 1.69 (d, 3H); 2.46 & 2.52 (2 x d, 2H); 3.13 & 3.14 (2 x d, 1H); 3.69 & 3.72 (2 x d, 1H); 4.07 & 4.14 (2 x q, 2H); 4.29 (m, 1H); 7.13 (bm, 1H); 7.31 (m, 1H); 7.42 (m, 1H)
18.19	1.25 (m, 3H); 1.68 (d, 3H); 2.48 & 2.52 (2 x d, 2H); 3.32 & 3.37 (2 x d, 1H); 3.94 & 3.97 (2 x d, 1H); 4.12 & 4.15 (2 x q, 2H); 4.31 (m, 1H); 7.11 (bm, 1H); 7.27 (s, 1H)
18.21	1.77 (s, 3H); 3.42 (d, 1H); 4.02 (d, 1H); 4.45 (m, 2H); 7.08 (d, 1H); 7.14 (d, 1H); 7.19 (bm, 1H); 7.25 (m, 2H); 8.31 (d, 1H)
18.22	1.77 (s, 3H); 3.46 (d, 1H); 4.06 (d, 1H); 4.45 (m, 2H); 7.07 (m, 1H); 7.17 (m, 1H); 7.25 (m, 2H); 7.32 (bm, 1H); 8.31 (d, 1H)
18.24	1.76 (s, 3H); 3.21 (d, 1H); 3.75 (d, 1H); 4.43 (m, 2H); 7.06 (m, 1H); 7.16 (m, 1H); 7.35 (m, 1H); 7.43 (m, 1H); 8.31 (m, 1H)
18.25	1.76 (s, 3H); 3.41 (d, 1H); 4.01 (d, 1H); 4.45 (m, 2H); 7.07 (m, 1H); 7.17 (m, 1H); 7.25 (m, 2H); 8.33 (d, 1H)
18.27	1.42 (t, 3H); 1.70 (s, 3H); 2.18 (s, 3H); 3.16 (d, 1H); 3.74 (d, 1H); 4.04 (q, 2H); 4.23 (m, 2H); 6.87 (bm, 1H); 7.23 (s, 1H); 7.32 (d, 1H); 7.40 (d, 1H)
18.28	1.44 (t, 3H); 1.71 (s, 3H); 2.20 (s, 3H); 3.38 (d, 1H); 3.99 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.87 (bm, 1H); 7.11 (d, 1H); 7.26 (m, 2H)
18.29	1.45 (t, 3H); 1.71 (s, 3H); 2.20 (s, 3H); 3.36 (d, 1H); 3.99 (d, 1H); 4.08 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.81 (bm, 1H); 7.25 (s, 1H); 7.30 (s, 1H)

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl ₃ gemessen, sofern nicht anders angegeben
18.30	1.41 (t, 3H); 1.71 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.23 (d, 1H); 3.79 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.23 (m, 2H); 6.92 (bm, 1H); 7.25 (s, 1H); 7.38 (m, 1H); 7.44 (d, 1H); 7.48 (d, 1H)
19.19	1.43 (t, 3H); 1.71 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.31 (d, 1H); 3.89 (s + d, 4H); 4.05 (q, 2H); 4.23 (m, 2H); 6.91 (bt, 1H); 7.25 (s, 1H); 7.42 (s, 1H)
20.1	1.11 (d, 3H); 1.18 (d, 3H); 1.78 (s, 3H); 3.12 (d, 1H); 3.69 (d, 1H); 3.93 (s, 3H); 4.01 (m, 1H); 6.74 (bd, 1H); 7.62 (s, 1H); 7.72 (s, 1H)
20.3	1.11 (d, 3H); 1.18 (d, 3H); 1.76 (s, 3H); 3.20 (d, 1H); 3.81 (d, 1H); 3.87 (s, 3H); 4.02 (m, 1H); 6.69 (bd, 1H); 7.74 (s, 1H)
20.6	0.51 (m, 2H); 0.77 (m, 2H); 1.46 (t, 3H); 1.66 (s, 3H); 2.43 (s, 3H); 2.72 (m, 1H); 3.12 (d, 1H); 3.69 (d, 1H); 6.93 (bs, 1H); 7.44 (s, 1H)
20.12	1.48 (t, 3H); 1.75 (s, 3H); 2.44 (s, 3H); 3.19 (d, 1H); 3.70 (d, 1H); 4.11 (q, 2H); 4.44 (m, 2H); 7.06 (d, 1H); 7.15 (s, 1H); 7.42 (bt, 1H); 7.46 (s, 1H); 8.30 (d, 1H)
20,15	1.44 (m, 6H); 1.69 (s, 3H); 2.21 (s, 3H); 3.15 (d, 1H); 3.69 (d, 1H); 3.95 (s, 3H); 4.11 (q, 2H); 4.22 (m, 2H); 6.99 (bt, 1H); 7.29 (s, 1H); 7.52 (s, 1H); 7.70 (s, 2H)
20.17	1.45 (m, 6H); 1.69 (s, 3H); 2.20 (s, 3H); 2.41 (s, 3H); 3.15 (d, 1H); 3.70 (d, 1H); 4.09 (m, 4H); 4.24 (m, 2H); 6.96 (bt, 1H); 7.23 (s, 1H); 7.44 (s, 1H)
21.5	0.51 (m, 2H); 0.78 (m, 2H); 1.70 (s, 3H); 2.72 (m, 1H); 3.22 (d, 1H); 3.78 (d, 1H); 3.85 (s, 3H); 6.88 (bs, 1H); 7.28 (s, 1H); 8.19 (s, 1H)
22.11	[DMSO-d ₆] 0.52 (m, 2H); 0.59 (m, 2H); 1.56 (s, 3H); 2.68 (m, 1H); 3.41 (d, 1H); 3.82 (d, 1H); 7.93 (d, 1H); 8.01 (d, 1H); 8.15 (bs, 1H)
22.12	0.51 (m, 2H); 0.79 (m, 2H); 1.70 (s, 3H); 2.47 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.38 (d, 1H); 3.96 (d, 1H); 6.78 (bs, 1H); 6.98 (s, 1H)
22.13	1.23 (t, 3H); 1.71 (d, 3H); 2.48 & 2.54 (2 x d, 2H); 3.40 & 3.41 (2 x d, 1H); 3.95 & 3.99 (2 x d, 1H); 4.09 & 4.16 (2 x q, 2H); 4.31 (m, 1H); 7.11 (bm, 1H); 7.44 (d, 1H); 7.90 (d, 1H)
22.17	[DMSO-d ₆] 1.27 (t, 3H); 1.57 (s, 3H); 2.05 (s, 3H); 3.44 (d, 1H); 3.78 (d, 1H); 3.95 (q, 2H); 4.06 (m, 2H); 7.40 (s, 1H); 7.93 (d, 1H); 8.01 (d, 1H); 8.37 (bt, 1H)
23.2	0.50 (m, 2H); 0.77 (m, 2H); 1.69 (s, 3H); 2.50 (s, 3H); 2.71 (m, 1H); 3.15 (d, 1H); 3.71 (d, 1H); 6.85 (bs, 1H); 7.78 (s, 1H)
23.8	1.44 (t, 3H); 1.71 (s, 3H); 2.18 (s, 3H); 2.49 (s, 3H); 3.18 (d, 1H); 3.72 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.22 (m, 2H); 6.88 (bt, 1H); 7.24 (s, 1H); 7.79 (s, 1H)
23.12	1.55 & 1.61 (2 x d, 3H); 1.71 & 1.75 (2 x s, 3H); 2.74 & 2.75 (2 x s, 3H); 3.32 & 3.37 (2 x d, 1H); 3.83 & 3.84 (2 x d, 1H); 4.82 (m, 1H); 7.13 (bd, 1H); 7.49 & 7.51 (2 x s, 1H)
23.14	1.71 (s, 3H); 1.79 (m, 1H); 2.28 (m, 1H); 2.75 (s, 3H); 3.29 (2 x d, 1H); 3.62 (m, 1H); 3.83 (m, 4H); 4.46 (m, 1H); 7.00 (bd, 1H); 7.46 & 7.47 (2 x s, 1H)
23.16	1.22 (m, 6H); 1.69 & 1.70 (2 x s, 3H); 2.49 (m, 2H); 2.74 (s, 3H); 3.27 & 3.28 (2 x d, 1H); 3.81 & 3.84 (2 x d, 1H); 4.08 & 4.15 (2 x q, 2H); 4.30 (m, 1H); 7.10 & 7.15 (2 x bd, 1H); 7.45 & 7.46 (2 x s, 1H)

Beispiel Nr.	NMR (δ Werte): in CDCl_3 gemessen, sofern nicht anders angegeben
23.18	1.78 (s, 3H); 2.75 (s, 3H); 3.35 (d, 1H); 3.87 (d, 1H); 4.43 (m, 2H); 7.07 (dd, 1H); 7.16 (d, 1H); 7.36 (bt, 1H); 7.50 (s, 1H); 8.30 (d, 1H)
23.21	1.46 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 2.74 (s, 3H); 3.30 (d, 1H); 3.85 (d, 1H); 4.12 (q, 2H); 4.28 (m, 2H); 7.01 (bt, 1H); 7.33 (s, 1H); 7.40 (s, 1H); 7.45 (s, 1H)
24.12	0.52 (m, 2H); 0.78 (m, 2H); 1.70 (s, 3H); 2.72 (m, 1H); 3.28 (d, 1H); 3.86 (d, 1H); 6.82 (bs, 1H); 7.61 (s, 1H)
24.13	0.52 (m, 2H); 0.78 (m, 2H); 1.70 (s, 3H); 2.73 (m, 1H); 3.34 (d, 1H); 3.94 (d, 1H); 6.81 (bs, 1H)
24.14	1.26 (m, 6H); 1.69 & 1.70 (2 x s, 3H); 2.50 (m, 2H); 3.27 & 3.28 (2 x d, 1H); 3.82 & 3.85 (2 x d, 1H); 4.11 (m, 2H); 4.31 (m, 1H); 7.12 (bm, 1H); 7.63 (s, 1H)
24.15	1.27 (m, 6H); 1.69 & 1.70 (2 x s, 3H); 2.50 (m, 2H); 3.34 & 3.35 (2 x d, 1H); 3.89 & 3.92 (2 x d, 1H); 4.12 (m, 2H); 4.31 (m, 1H); 7.08 (bm, 1H)
24.16	1.77 (s, 3H); 3.35 (d, 1H); 3.89 (d, 1H); 7.07 (dd, 1H); 7.16 (d, 1H); 7.30 (bt, 1H); 7.67 (s, 1H); 8.31 (d, 1H)
24.18	1.44 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 2.19 (s, 3H); 3.30 (d, 1H); 3.86 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.24 (m, 2H); 6.84 (bt, 1H); 7.25 (s, 1H); 7.62 (s, 1H)
24.19	1.44 (t, 3H); 1.72 (s, 3H); 2.20 (s, 3H); 3.36 (d, 1H); 3.95 (d, 1H); 4.05 (q, 2H); 4.24 (m, 2H); 6.83 (bt, 1H); 7.25 (s, 1H)
29.13	1.45 (s, 6H); 1.46 (t, 3H); 1.68 (s, 3H); 2.20 (s, 3H); 2.97 (m, 2H); 3.18 (d, 1H); 3.74 (d, 1H); 4.07 (q, 2H); 4.25 (m, 2H); 6.71 (bt, 1H); 7.27 (s, 1H)
30.5	1.70 (s, 3H); 3.00 (d, 1H); 3.45 (d, 1H); 4.01 (m, 4H); 4.44 (d, 2H); 5.63 (s, 1H); 7.08 (d, 1H); 7.19 (s, 1H); 7.28 (bm, 1H); 8.34 (d, 1H)
30.8	1.31 (m, 3H); 1.46 (t, 3H); 1.65 & 1.66 (2 x s, 3H); 2.25 (s, 3H); 2.99 (m, 1H); 3.45 (m, 2H); 4.11 (m, 3H); 4.26 (m, 3H); 5.59, 5.60 & 5.72 (3 x s, 1H); 6.87 (bm, 1H); 7.29 (s, 1H)

B. Formulierungsbeispiele

1. Stäubemittel

Ein Stäubemittel wird erhalten, indem man 10 Gew.-Teile einer Verbindung der Formel (I) und 90 Gew.-Teile Talkum als Inertstoff mischt und in einer Schlagmühle zerkleinert.

2. Dispergierbares Pulver

Ein in Wasser leicht dispergierbares, benetzbares Pulver wird erhalten, indem man 25 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I), 64 Gewichtsteile kaolinhaltigen Quarz als Inertstoff, 10 Gewichtsteile ligninsulfonsaures Kalium und 1 Gew.-Teil oleoylmethyltaurinsaures Natrium als Netz- und Dispergiermittel mischt und in einer Stiftmühle mahlt.

3. Dispersionskonzentrat

Ein in Wasser leicht dispergierbares Dispersionskonzentrat wird erhalten, indem man 20 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel (I), 6 Gew.-Teile Alkylphenolpolyglykoether (@Triton X 207), 3 Gew.-Teile Isotridecanolpolyglykoether (8 EO) und 71 Gew.-Teile paraffinischem Mineralöl (Siedebereich z.B. ca. 255 bis über 277°C) mischt und in einer Reibkugelmühle auf eine Feinheit von unter 5 Mikron vermahlt.

4. Emulgierbares Konzentrat

Ein emulgierbares Konzentrat wird erhalten aus 15 Gew.-Teilen einer Verbindung der Formel (I), 75 Gew.-Teilen Cyclohexanon als Lösemittel und 10 Gew.-Teilen oxethyliertes Nonylphenol als Emulgator.

5. Wasserdispergierbares Granulat

Ein in Wasser dispergierbares Granulat wird erhalten, indem man 75 Gew.-Teile einer Verbindung der Formel (I),

10	"	ligninsulfonsaures Calcium,
5	"	Natriumlaurylsulfat,
3	"	Polyvinylalkohol und
7	"	Kaolin

mischt, auf einer Stiftmühle mahlt und das Pulver in einem Wirbelbett durch Aufsprühen von Wasser als Granulierflüssigkeit granuliert.

Ein in Wasser dispergierbares Granulat wird auch erhalten, indem man

5 25 Gew.-Teile einer Verbindung der Formel (I),

5 " 2,2'-dinaphthylmethan-6,6'-disulfonsaures Natrium,

2 " oleoymethyltaurinsaures Natrium,

1 " Polyvinylalkohol,

17 " Calciumcarbonat und

10 50 " Wasser

auf einer Kolloidmühle homogenisiert und vorzerkleinert, anschließend auf einer Perlmühle mahlt und die so erhaltene Suspension in einem Sprühturm mittels einer Einstoffdüse zerstäubt und trocknet.

15

C. Biologische Beispiele

1. Herbizide Wirkung gegen Schadpflanzen im Voraufbau

Samen beziehungsweise Rhizomstücke Mono- und dikotyler Schadpflanzen werden in Töpfen von 9 bis 13 cm Durchmesser in sandiger Lehmerde ausgelegt und mit Erde
 20 bedeckt. Die als emulgierbare Konzentrate oder Stäubemittel formulierten Herbizide werden in Form wäßriger Dispersionen oder Suspensionen bzw. Emulsionen mit einer Wasseraufwandmenge von umgerechnet 300 bis 800l/ha in unterschiedlichen Dosierungen auf die Oberfläche der Abdeckerde appliziert. Anschließend werden die Töpfe zur weiteren Kultivierung der Pflanzen im Gewächshaus unter optimalen
 25 Bedingungen gehalten. Nach 3 bis 4 Wochen Standzeit der Versuchspflanzen im Gewächshaus unter optimalen Wachstumsbedingungen wird die Wirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen durch optische Bonitur ermittelt. So zeigen beispielsweise die Verbindungen der Nr. 1.7, 1.38, 2.8, 2.9, 2.15, 2.16, 2.17, 2.27, 2.49, 2.53, 6.3, 6.17 und 17.18 bei einer Aufwandmenge von 320 Gramm pro Hektar
 30 jeweils eine mindestens 80%-ige Wirkung gegen *Polygonum convolvulus* und *Veronica persica*. Die Verbindungen der Nr. 1.33, 1.34, 1.36, 2.1, 2.8, 2.19, 2.26, 2.28, 2.41, 2.42, 2.45, 2.46, 2.49, 2.52, 3.8, 3.18, 15.16, 17.16 und 18.27 zeigen bei einer Aufwandmenge von 320 Gramm pro Hektar jeweils eine mindestens 80%-ige Wirkung gegen *Alopecurus myosuroides* und *Lolium multiflorum*.

2. Herbizide Wirkung gegen Schadpflanzen im Nachauflauf

Samen von mono- und dikotylen Schadpflanzen werden in Papptöpfen in sandigem Lehmboden ausgelegt, mit Erde abgedeckt und im Gewächshaus unter guten Wachstumsbedingungen angezogen. Zwei bis drei Wochen nach der Aussaat werden


5 die Versuchspflanzen im Dreiblattstudium behandelt. Die als Spritzpulver bzw. als Emulsionskonzentrate formulierten erfindungsgemäßen Verbindungen werden mit einer Wasseraufwandmenge von umgerechnet 600 bis 800 l/ha auf die Oberfläche der grünen Pflanzenteile gesprüht. Nach 3 bis 4 Wochen Standzeit der Versuchspflanzen im Gewächshaus unter optimalen Wachstumsbedingungen wird die Wirkung der

10 erfindungsgemäßen Verbindungen durch optische Bonitur ermittelt. So zeigen beispielsweise die Verbindungen der Nr. 1.34, 1.38, 2.1, 2.18, 2.28, 2.29, 2.33, 2.41, 2.46, 2.49, 2.51, 2.52, 2.53, 6.17 und 18.27 bei einer Aufwandmenge von 320 Gramm pro Hektar jeweils eine mindestens 80%-ige Wirkung gegen *Polygonum convolvulus* und *Veronica persica*. Die Verbindungen der Nr. 2.39, 3.8, 18.11, 18.25,

15 zeigen bei einer Aufwandmenge von 320 Gramm pro Hektar jeweils eine mindestens 80%-ige Wirkung gegen *Pharbitis purpureum*.

Patentansprüche

1. 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-Heteroarylisoaxazolin-5-thioamide der Formel (I) und deren N-Oxide



5

worin

R^1 und R^2 bedeuten unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod und Cyano substituiertes (C₁-C₄)-Alkyl oder (C₁-C₄)-Alkoxy, oder

R^1 und R^2 bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gesättigten, teilweise oder vollständig ungesättigten drei-, vier- oder fünfgliedrigen Ring, der aus q Kohlenstoffatomen und p Sauerstoffatomen aufgebaut ist;

15

R^3 bedeutet Fluor, Chlor, Cyano, (C₁-C₃)-Alkylcarbonyloxy oder S(O)_n R⁵, oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, (C₁-C₄)-Alkoxy und Hydroxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl oder (C₂-C₆)-Alkynyl,

20

oder durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und (C₁-C₆)-Alkoxy substituiertes (C₂-C₆)-Alkenylcarbonyl;

oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, (C₁-C₄)-Alkoxy und Hydroxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₃-C₆)-Cycloalkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkynyloxy,


25

R^4 bedeutet Wasserstoff, Cyano,

oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Hydroxy und (C₁-C₆)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₈)-Alkyl oder (C₃-C₈)-Cycloalkyl;

30

A bedeutet eine Bindung oder eine divalente Einheit aus der Gruppe bestehend aus



5

R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} und R^{15} bedeuten unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy, Cyano, CO_2R^8 , CONR^6R^8 , R^5 , oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy und Cyano substituiertes $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkyl, $(\text{C}_3\text{-C}_5)$ -Cycloalkyl, $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkenyl, $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkynyl, oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und $(\text{C}_1\text{-C}_2)$ -Alkoxy substituiertes $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkoxy, $(\text{C}_3\text{-C}_6)$ -Cycloalkoxy, $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkenyloxy oder $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkynyloxy;

15 Y bedeutet Sauerstoff oder Schwefel;

X bedeutet Wasserstoff, Cyano, Hydroxy, X^1 , oder

durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Hydroxy, OR^7 , X^1 , OX^1 , NHX^1 , $\text{S}(\text{O})_n\text{R}^5$, $\text{SO}_2\text{NR}^6\text{R}^7$, $\text{SO}_2\text{NR}^6\text{COR}^8$, CO_2R^8 , CONR^6R^8 , COR^6 , $\text{CONR}^8\text{SO}_2\text{R}^5$, NR^6R^8 , NR^6COR^8 , $\text{NR}^6\text{CONR}^8\text{R}^8$, $\text{NR}^6\text{CO}_2\text{R}^8$, $\text{NR}^6\text{SO}_2\text{R}^8$, $\text{NR}^6\text{SO}_2\text{NR}^6\text{R}^8$, OCONR^6R^8 , OCSNR^6R^8 , POR^9R^9 und $\text{C}(\text{R}^6)=\text{NOR}^8$ substituiertes $(\text{C}_1\text{-C}_{12})$ -Alkyl, $(\text{C}_3\text{-C}_8)$ -Cycloalkyl, $(\text{C}_2\text{-C}_{12})$ -Alkenyl oder $(\text{C}_2\text{-C}_{12})$ -Alkynyl, oder

25 X, A und R^4 bilden mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gesättigten, teilweise oder vollständig ungesättigten fünf-, sechs- oder siebengliedrigen Ring, der neben diesem Stickstoffatom k Kohlenstoffatome, n

Sauerstoffatome, p Schwefelatome und p Elemente aus der Gruppe bestehend aus NR^7 und NCOR^7 als Ringatome enthält, wobei ein Kohlenstoffatom p Oxogruppen trägt;

- 5 X^1 bedeutet einen drei-, vier-, fünf- oder sechsgliedrigen gesättigten, teilweise ungesättigten, vollständig ungesättigten oder aromatischen Ring, der aus r Kohlenstoffatomen, s Stickstoffatomen, n Schwefelatomen und n Sauerstoffatomen aufgebaut ist, und der durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus R^6 , R^{6a} , R^8 und R^9 substituiert ist, wobei die diesen Ring aufbauenden Schwefelatome und
- 10 Kohlenstoffatome jeweils n Oxogruppen tragen;

- Het bedeutet einen drei-, vier-, fünf- oder sechsgliedrigen gesättigten, teilweise ungesättigten, vollständig ungesättigten oder aromatischen Ring, der aus r Kohlenstoffatomen, s Stickstoffatomen, n Schwefelatomen und t Sauerstoffatomen
- 15 aufgebaut ist, wobei die Indices n, s und t nicht alle gleichzeitig null sein sollen, und wobei die diesen Ring aufbauenden Schwefelatome und Kohlenstoffatome jeweils n Oxogruppen tragen;

- R bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy, Cyano, Nitro, SF_5 , $\text{CONR}^8\text{SO}_2\text{R}^5$, CONR^6R^8 , COR^6 , CO_2R^8 , CONR^6R^8 , $\text{C}(\text{R}^6)=\text{NOR}^8$, NR^6COR^8 , $\text{NR}^6\text{CONR}^8\text{R}^8$, $\text{NR}^6\text{CO}_2\text{R}^8$, $\text{NR}^6\text{SO}_2\text{R}^8$, $\text{NR}^6\text{SO}_2\text{NR}^6\text{R}^8$, OCONR^6R^8 , OSO_2R^5 , $\text{S}(\text{O})_n\text{R}^5$, $\text{SO}_2\text{NR}^6\text{R}^8$, $\text{OSO}_2\text{NR}^6\text{R}^8$,
- 20 oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy und Cyano substituiertes $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkyl, $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkenyl, $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkynyl,
- 25 oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und $(\text{C}_1\text{-C}_2)$ -Alkoxy substituiertes $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkoxy, $(\text{C}_3\text{-C}_6)$ -Cycloalkoxy, $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkenyloxy oder $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkinyloxy;

- R^5 bedeutet durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und Hydroxy substituiertes $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkyl oder $(\text{C}_3\text{-C}_6)$ -Cycloalkyl;
- 30 R^6 bedeutet Wasserstoff oder R^5 ;

R^{6a} bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Jod, Cyano, Hydroxy, S(O)_nR⁵ oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₃-C₆)-Alkenyloxy oder (C₃-C₆)-Alkinyloxy;

5 R⁷ bedeutet Wasserstoff oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl oder (C₂-C₄)-Alkinyl;

R⁸ bedeutet R⁷,

10

R⁹ bedeutet (C₁-C₃)-Alkyl oder (C₁-C₃)-Alkoxy;

k bedeutet 3, 4, 5 oder 6;

15 m bedeutet 0, 1, 2, 3, 4 oder 5;

n bedeutet 0, 1 oder 2;

p bedeutet 0 oder 1;

20

q bedeutet 3, 4 oder 5;

r bedeutet 1, 2, 3, 4 oder 5;

25 s bedeutet 0, 1, 2, 3 oder 4;

t bedeutet 0, 1 oder 2,

wobei die Verbindungen, in denen A-X den Rest 5-Fluor-4-oxopentan-3-yl-säure bildet, ausgenommen sind.

30

2. 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-Heteroarylisoaxazolin-5-thioamide nach Anspruch 1, worin

R^1 und R^2 bedeuten unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod und Cyano substituiertes (C_1 - C_4)-Alkyl oder (C_1 - C_4)-Alkoxy, oder


- 5 R^1 und R^2 bilden gemeinsam mit dem Kohlenstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gesättigten, teilweise oder vollständig ungesättigten drei-, vier- oder fünfgliedrigen Ring, der aus q Kohlenstoffatomen und p Sauerstoffatomen aufgebaut ist;

- 10 R^3 bedeutet durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, (C_1 - C_4)-Alkoxy und Hydroxy substituiertes (C_1 - C_6)-Alkyl, (C_3 - C_6)-Cycloalkyl, (C_2 - C_6)-Alkenyl oder (C_2 - C_6)-Alkynyl,

R^4 bedeutet Wasserstoff, Cyano,

- 15 oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Hydroxy und (C_1 - C_6)-Alkoxy substituiertes (C_1 - C_8)-Alkyl, (C_3 - C_8)-Alkenyl, (C_3 - C_8)-Alkynyl oder (C_3 - C_8)-Cycloalkyl;

A bedeutet eine Bindung oder eine divalente Einheit aus der Gruppe bestehend aus



20

R^{10} , R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} und R^{15} bedeuten unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy, Cyano, CO_2R^8 , $CONR^6R^8$, R^5 , oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy und Cyano substituiertes (C_1 - C_6)-Alkyl, (C_3 - C_5)-Cycloalkyl, (C_2 - C_6)-Alkenyl, (C_2 - C_6)-Alkynyl,

25

oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₃-C₆)-Cycloalkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy;

5 Y bedeutet Sauerstoff oder Schwefel;

X bedeutet Wasserstoff, Cyano, Hydroxy, X¹,


oder

durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Hydroxy, OR⁷, X¹, OX¹, NHX¹, S(O)_nR⁵, SO₂NR⁶R⁷, SO₂NCOR⁶R⁸, CO₂R⁸, CONR⁶R⁸, COR⁶, CONR⁸SO₂R⁵, NR⁶R⁸, NR⁶COR⁸, NR⁶CONR⁸R⁸, NR⁶CO₂R⁸, NR⁶SO₂R⁸, NR⁶SO₂NR⁶R⁸, OCONR⁶R⁸, OCSNR⁶R⁸, POR⁹R⁹ und C(R⁶)=NOR⁸ substituiertes (C₁-C₁₂)-Alkyl, (C₃-C₈)-Cycloalkyl, (C₂-C₁₂)-Alkenyl oder (C₂-C₁₂)-Alkynyl, oder


15 X, A und R⁴ bilden mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gesättigten, teilweise oder vollständig ungesättigten fünf-, sechs- oder siebengliedrigen Ring, der neben diesem Stickstoffatom k Kohlenstoffatome, n Sauerstoffatome, p Schwefelatome und p Elemente aus der Gruppe bestehend aus NR⁷ und NCOR⁷ als Ringatome enthält, wobei ein Kohlenstoffatom p Oxogruppen trägt;

20

X¹ bedeutet einen durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus R⁶, R^{6a}, R⁸ und R⁹ substituierten Ring aus der Gruppe bestehend aus



116



- 5 oder X^1 bedeutet durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus R^6 , R^{6a} , R^8 und R^9 substituiertes Phenyl;

Het bedeutet Pyridin-2-yl, Pyridin-3-yl, Pyridin-4-yl, Pyridazin-3-yl, Pyridazin-4-yl, Pyrimidin-2-yl, Pyrimidin-4-yl, Pyrimidin-5-yl, Pyrazin-2-yl, 1,2,4-Triazin-3-yl, 1,2,4-Triazin-5-yl, 1,2,4-Triazin-6-yl, 1,3,5-Triazin-2-yl, 1,2,4,5-Tetrazin-3-yl, Pyrrol-2-yl, Pyrrol-3-yl, Furan-2-yl, Furan-3-yl, Thiophen-2-yl, Thiophen-3-yl, Pyrazol-1-yl, Pyrazol-3-yl, Pyrazol-4-yl, Pyrazol-5-yl, Imidazol-1-yl, Imidazol-2-yl, Imidazol-4-yl, Imidazol-5-yl, Oxazol-2-yl: Oxazol-4-yl, Oxazol-5-yl, Thiazol-2-yl, Thiazol-4-yl, Thiazol-5-yl, Isoxazol-3-yl, Isoxazol-4-yl, Isoxazol-5-yl, Isothiazol-3-yl, Isothiazol-4-yl, Isothiazol-5-yl, 1H-1,2,3-triazol-1-yl, 1H-1,2,3-triazol-4-yl, 1H-1,2,3-triazol-5-yl, 2H-1,2,3-triazol-2-yl, 2H-1,2,3-triazol-4-yl, 1H-1,2,4-Triazol-1-yl, 1H-1,2,4-Triazol-3-yl, 2H-1,2,4-Triazol-3-yl, 4H-1,2,4-

10

15

Triazol-3-yl, 4H-1,2,4-Triazol-4-yl, 1,2,3-Oxadiazol-4-yl, 1,2,3-Oxadiazol-5-yl, 1,2,3-Thiadiazol-4-yl, 1,2,3-Thiadiazol-5-yl, 1,2,4-Oxadiazol-3-yl, 1,2,4-Oxadiazol-5-yl, 1,2,4-Thiadiazol-3-yl, 1,2,4-Thiadiazol-5-yl, 1,2,5-Oxadiazol-3-yl, 1,2,5-Thiadiazol-3-yl, 1,3,4-Oxadiazol-2-yl, 1,3,4-Thiadiazol-2-yl, 1H-Tetrazol-5-yl, 2H-Tetrazol-5-yl, 1,4,5,6-Tetrahydropyrimidin-2-yl, 1,4,5,6-Tetrahydropyridazin-3-yl, 5,6-Dihydro-4H-1,3-oxazin-2-yl, 5,6-Dihydro-4H-1,2-oxazin-3-yl, 5,6-Dihydro-4H-1,3-thiazin-2-yl, 5,6-Dihydro-4H-1,2-thiazin-3-yl, 4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl, 4,5-Dihydro-1H-pyrazol-3-yl, 4,5-Dihydro-1,3-oxazol-2-yl, 4,5-Dihydro-1,2-oxazol-3-yl, 4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-yl, 4,5-Dihydro-1,2-thiazol-3-yl, Azetidin-1-yl, Azetidin-2-yl, Azetidin-3-yl, Pyrrolidin-1-yl, Pyrrolidin-2-yl, Pyrrolidin-3-yl, Piperidin-1-yl, Piperidin-2-yl, Piperidin-3-yl, Piperidin-4-yl, Piperazin-1-yl, Piperazin-2-yl, Piperazin-3-yl, Oxiran-2-yl, Oxetan-2-yl, Oxetan-3-yl, Tetrahydrofuran-2-yl, Tetrahydrofuran-3-yl, Tetrahydro-2H-pyran-2-yl, Tetrahydro-2H-pyran-3-yl, Tetrahydro-2H-pyran-4-yl, 1,3-Dioxolan-2-yl, 1,3-Dioxolan-4-yl, 1,3-Dioxan-2-yl, 1,3-Dioxan-4-yl, 1,3-Dioxan-5-yl, Morpholin-2-yl, Morpholin-3-yl oder Morpholin-4-yl;

15

R bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy, Cyano, Nitro, SF₅, CONR⁸SO₂R⁵, CONR⁶R⁸, COR⁶, CO₂R⁸, CONR⁶R⁸, C(R⁶)=NOR⁸, NR⁶COR⁸, NR⁶CONR⁸R⁸, NR⁶CO₂R⁸, NR⁶SO₂R⁸, NR⁶SO₂NR⁶R⁸, OCONR⁶R⁸, OSO₂R⁵, S(O)_nR⁵, SO₂NR⁶R⁸, OSO₂NR⁶R⁸,

20 oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Hydroxy und Cyano substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₂-C₆)-Alkenyl, (C₂-C₆)-Alkynyl, oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₃-C₆)-Cycloalkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy;

25

R⁵ bedeutet durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano und Hydroxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl oder (C₃-C₆)-Cycloalkyl;

R⁶ bedeutet Wasserstoff oder R⁵;

30

R^{6a} bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, Hydroxy, S(O)_nR⁵ oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy;

R⁷ bedeutet Wasserstoff oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl, (C₃-C₆)-Cycloalkyl, (C₂-C₄)-Alkenyl oder (C₂-C₄)-Alkinyl;

5 R⁸ bedeutet R⁷,

R⁹ bedeutet (C₁-C₃)-Alkyl oder (C₁-C₃)-Alkoxy;

k bedeutet 3, 4, 5 oder 6;

10

m bedeutet 0, 1, 2, 3, 4 oder 5;

n bedeutet 0, 1 oder 2;

15 p bedeutet 0 oder 1;

q bedeutet 3, 4 oder 5;

s bedeutet 0, 1, 2, 3 oder 4;

20

t bedeutet 0, 1 oder 2.

25 3. 3-Heteroarylisoaxazolin-5-carboxamide und 3-Heteroarylisoaxazolin-5-thioamide nach Anspruch 1 oder 2, worin

R¹ und R² bedeuten unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Iod, Cyano, oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Iod und Cyano substituiertes (C₁-C₄)-Alkyl;

30

R³ bedeutet durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano, (C₁-C₂)-Alkoxy-substituiertes (C₁-C₄)-Alkyl, (C₃-C₄)-Cycloalkyl, (C₂-C₃)-Alkenyl oder (C₂-C₃)-Alkinyl,


- A bedeutet eine Bindung oder eine divalente Einheit aus der Gruppe bestehend aus CH_2 , CH_2CH_2 , CHCH_3 , $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$, $\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_3)$, $\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2$, $\text{C}(\text{CH}_3)_2$, $\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2$, $\text{C}(\text{iPr})\text{CH}_3$, $\text{CH}(\text{CH}_2\text{iPr})\text{CH}_2$, $\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}$, $\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{C}\equiv\text{C}$, $\text{CH}(\text{CF}_3)\text{CH}_2$, $\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{O}$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}$, $\text{CH}(\text{cPr})\text{CH}_2\text{O}$, $\text{CH}(\text{CH}_2\text{OCH}_3)$, $\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_3)$,
 5 $\text{CH}(\text{COOH})$, $\text{CH}(\text{COOCH}_3)$, $\text{CH}(\text{COOH})\text{CH}_2$, $\text{CH}(\text{COOCH}_3)\text{CH}_2$, $\text{CH}_2\text{COH}(\text{CF}_3)$, $\text{CH}(\text{CONHCH}_3)$, $\text{CH}(\text{CONHCH}_3)\text{CH}_2$ und $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CONHCH}_2$;

R^4 bedeutet Wasserstoff oder $(\text{C}_1\text{-C}_8)$ -Alkyl;


- 10 Y bedeutet Sauerstoff oder Schwefel;

X bedeutet Wasserstoff, Cyano, Hydroxy, X^1 ,
 oder

- durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Cyano, Hydroxy,
 15 OR^7 , X^1 , OX^1 , NHX^1 , $\text{S}(\text{O})_n\text{R}^5$, CO_2R^8 , CONR^6R^8 , $\text{CONR}^8\text{SO}_2\text{R}^5$ und POR^9R^9
 substituiertes $(\text{C}_1\text{-C}_{12})$ -Alkyl, $(\text{C}_3\text{-C}_8)$ -Cycloalkyl, $(\text{C}_2\text{-C}_{12})$ -Alkenyl oder $(\text{C}_2\text{-C}_{12})$ -Alkynyl;
 X^1 bedeutet einen durch s Reste aus der Gruppe bestehend aus R^6 , R^{6a} , R^8 und
 R^9 substituierten Ring aus der Gruppe bestehend aus



120



oder X^1 bedeutet durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus R^6 , R^{6a} , R^8 und R^9 substituiertes Phenyl;

5

Het bedeutet Pyridin-2-yl, Pyridin-3-yl, Pyridin-4-yl, Pyridazin-3-yl, Pyridazin-4-yl, Pyrimidin-2-yl, Pyrimidin-4-yl, Pyrimidin-5-yl, Pyrazin-2-yl, 1,2,4-Triazin-3-yl, 1,2,4-Triazin-5-yl, 1,2,4-Triazin-6-yl, 1,3,5-Triazin-2-yl, Pyrrol-3-yl, Furan-2-yl, Furan-3-yl, Thiophen-2-yl, Thiophen-3-yl, Pyrazol-3-yl, Pyrazol-4-yl, Oxazol-2-yl, Oxazol-4-yl,

10

Oxazol-5-yl, Thiazol-2-yl, Thiazol-4-yl, Thiazol-5-yl, Isoxazol-3-yl, Isoxazol-4-yl, Isoxazol-5-yl, Isothiazol-3-yl, Isothiazol-4-yl, Isothiazol-5-yl, 1H-1,2,3-triazol-4-yl, 2H-1,2,3-triazol-4-yl, 1H-1,2,4-Triazol-3-yl, 1,2,4-Oxadiazol-3-yl, 1,2,4-Oxadiazol-5-yl, 1,2,4-Thiadiazol-3-yl, 1,2,4-Thiadiazol-5-yl, 1,3,4-Oxadiazol-2-yl, 1,3,4-Thiadiazol-2-yl, oder 2H-Tetrazol-5-yl.

15

R bedeutet, Fluor, Chlor, Brom, Cyano,

oder jeweils durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor und Chlor substituiertes (C_1 - C_6)-Alkyl,

oder durch m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor und Chlor substituiertes (C_1 -

20

C_6)-Alkoxy;

R^5 bedeutet Methyl oder Ethyl;

R^6 bedeutet Wasserstoff oder R^5 ;

R^{6a} bedeutet Fluor, Chlor, Brom, Jod, Cyano, Hydroxy, S(O)_nR⁵ oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor, Chlor, Brom, Cyano und (C₁-C₂)-Alkoxy substituiertes (C₁-C₆)-Alkoxy, (C₂-C₆)-Alkenyloxy oder (C₂-C₆)-Alkinyloxy;

5 R⁷ bedeutet Wasserstoff oder durch jeweils m Reste aus der Gruppe bestehend aus Fluor und Chlor substituiertes (C₁-C₆)-Alkyl;

R⁸ bedeutet R⁷,

10 R⁹ bedeutet (C₁-C₃)-Alkoxy;

m bedeutet 0, 1, 2 oder 3;

n bedeutet 0, 1 oder 2;

15

s bedeutet 0, 1, 2, 3 oder 4;

t bedeutet 0, 1 oder 2.

20

4. Herbizide Mittel, gekennzeichnet durch einen herbizid wirksamen Gehalt an mindestens einer Verbindung der Formel (I) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3.

5. Herbizide Mittel nach Anspruch 4 in Mischung mit Formulierungshilfsmitteln.

25

6. Herbizide Mittel nach Anspruch 4 oder 5 enthaltend mindestens einen weiteren pestizid wirksamen Stoff aus der Gruppe Insektizide, Akarizide, Herbizide, Fungizide, Safenern und Wachstumsregulatoren.

30

7. Herbizide Mittel nach Anspruch 6 enthaltend einen Safener.

8. Herbizide Mittel nach Anspruch 7, worin der Safener ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Mefenpyr-diethyl, Cyprosulfamid, Isoxadifen-ethyl, Cloquintocet-mexyl, Benoxacor und Dichlormid.

9. Herbizide Mittel nach einem der Ansprüche 6 bis 8 enthaltend ein weiteres Herbizid.

5 10. Verfahren zur Bekämpfung unerwünschter Pflanzen, dadurch gekennzeichnet, daß man eine wirksame Menge mindestens einer Verbindung der Formel (I) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 oder eines herbiziden Mittels nach einem der Ansprüche 4 bis 9 auf die Pflanzen oder auf den Ort des unerwünschten Pflanzenwachstums appliziert.

10

11. Verwendung von Verbindungen der Formel (I) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 oder von herbiziden Mitteln nach einem der Ansprüche 4 bis 9 zur Bekämpfung unerwünschter Pflanzen.

15 12. Verwendung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungen der Formel (I) zur Bekämpfung unerwünschter Pflanzen in Kulturen von Nutzpflanzen eingesetzt werden.

20 13. Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Nutzpflanzen transgene Nutzpflanzen sind.

14. Fungizide Mittel, gekennzeichnet durch einen fungizid wirksamen Gehalt an mindestens einer Verbindung der Formel (I) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3.

25 15. Fungizide Mittel nach Anspruch 14 in Mischung mit Formulierungshilfsmitteln.

16. Fungizide Mittel nach Anspruch 14 oder 15 enthaltend mindestens einen weiteren pestizid wirksamen Stoff aus der Gruppe Insektizide, Akarizide, Herbizide, Fungizide, Safenern und Wachstumsregulatoren.

30

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2013/069613

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER INV. C07D413/04 C07D413/14 C07D417/04 C07D417/14 C07F9/6558 A01N43/80 A01N57/24 ADD. According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC														
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07D C07F A01N Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, CHEM ABS Data														
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Category*</th> <th style="width: 70%;">Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages</th> <th style="width: 20%;">Relevant to claim No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">X</td> <td>WO 2005/021516 A1 (LG LIFE SCIENCES LTD [KR]; CHANG HYE-KYUNG [KR]; OH YEONG-SOO) 10 March 2005 (2005-03-10) cited in the application page 48 - page 50; examples 49-57 -----</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1,2,4,14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">Y</td> <td>JP 2005 314407 A (NIHON NOHYAKU CO LTD) 10 November 2005 (2005-11-10) page 32; compounds 1-222 -----</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1-16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">A</td> <td>GUCMA, MIROSLAW ET AL: "Synthesis and fungicidal activity of substituted isoxazolecarboxamides", PESTYCYDY, vol. 2010, no. 1-4, 2011, pages 21-31, XP008159982, ISSN: 0208-8703 the whole document ----- -/--</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">1-16</td> </tr> </tbody> </table>			Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	X	WO 2005/021516 A1 (LG LIFE SCIENCES LTD [KR]; CHANG HYE-KYUNG [KR]; OH YEONG-SOO) 10 March 2005 (2005-03-10) cited in the application page 48 - page 50; examples 49-57 -----	1,2,4,14	Y	JP 2005 314407 A (NIHON NOHYAKU CO LTD) 10 November 2005 (2005-11-10) page 32; compounds 1-222 -----	1-16	A	GUCMA, MIROSLAW ET AL: "Synthesis and fungicidal activity of substituted isoxazolecarboxamides", PESTYCYDY, vol. 2010, no. 1-4, 2011, pages 21-31, XP008159982, ISSN: 0208-8703 the whole document ----- -/--	1-16
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.												
X	WO 2005/021516 A1 (LG LIFE SCIENCES LTD [KR]; CHANG HYE-KYUNG [KR]; OH YEONG-SOO) 10 March 2005 (2005-03-10) cited in the application page 48 - page 50; examples 49-57 -----	1,2,4,14												
Y	JP 2005 314407 A (NIHON NOHYAKU CO LTD) 10 November 2005 (2005-11-10) page 32; compounds 1-222 -----	1-16												
A	GUCMA, MIROSLAW ET AL: "Synthesis and fungicidal activity of substituted isoxazolecarboxamides", PESTYCYDY, vol. 2010, no. 1-4, 2011, pages 21-31, XP008159982, ISSN: 0208-8703 the whole document ----- -/--	1-16												
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.														
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family														
Date of the actual completion of the international search 11 October 2013		Date of mailing of the international search report 23/10/2013												
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Duval, Eric												

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2013/069613

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y,P	WO 2012/130798 A1 (BAYER CROPS SCIENCE AG [DE]; WILLMS LOTHAR [DE]; SCHMITT MONIKA H [DE];) 4 October 2012 (2012-10-04) claim 1 -----	1-16
A	JOHN M. KNAPP ET AL: "Expedient Synthesis of a 72-Membered Isoxazolino-[beta]-ketoamide Library by a 2.3-Component Reaction", ACS COMBINATORIAL SCIENCE, vol. 14, no. 2, 13 February 2012 (2012-02-13), pages 85-88, XP055052436, ISSN: 2156-8952, DOI: 10.1021/co200199h page 87; table 1 page 86; figure 1 -----	1-16

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2013/069613

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2005021516	A1	10-03-2005	AP 2104 A 06-02-2010
		AR 045503 A1 02-11-2005	
		AU 2004268895 A1 10-03-2005	
		BR PI0413848 A 24-10-2006	
		CA 2535711 A1 10-03-2005	
		CN 1842521 A 04-10-2006	
		EC SP066378 A 30-08-2006	
		EG 25751 A 25-06-2012	
		EP 1660464 A1 31-05-2006	
		IL 173638 A 29-12-2011	
		JP 4503017 B2 14-07-2010	
		JP 2007503429 A 22-02-2007	
		KR 20050022364 A 07-03-2005	
		MA 27999 A1 03-07-2006	
		MX PA06002267 A 17-05-2006	
		NZ 545216 A 26-06-2009	
		OA 13244 A 31-01-2007	
		PE 03712005 A1 17-08-2005	
		TR 200600899 T2 21-09-2006	
		US 2006223848 A1 05-10-2006	
		UY 28494 A1 28-02-2005	
		WO 2005021516 A1 10-03-2005	
		ZA 200601586 A 30-05-2007	

JP 2005314407	A	10-11-2005	NONE

WO 2012130798	A1	04-10-2012	NONE

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES		
INV.	C07D413/04	C07D413/14
	A01N43/80	A01N57/24
ADD.	C07D417/04	C07D417/14
		C07F9/6558
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)		
C07D C07F A01N		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)		
EPO-Internal, WPI Data, CHEM ABS Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 2005/021516 A1 (LG LIFE SCIENCES LTD [KR]; CHANG HYE-KYUNG [KR]; OH YEONG-SOO) 10. März 2005 (2005-03-10) in der Anmeldung erwähnt Seite 48 - Seite 50; Beispiele 49-57 -----	1,2,4,14
Y	JP 2005 314407 A (NIHON NOHYAKU CO LTD) 10. November 2005 (2005-11-10) Seite 32; Verbindungen 1-222 -----	1-16
A	GUCMA, MIROSLAW ET AL: "Synthesis and fungicidal activity of substituted isoxazolecarboxamides", PESTICYDY, Bd. 2010, Nr. 1-4, 2011, Seiten 21-31, XP008159982, ISSN: 0208-8703 das ganze Dokument -----	1-16
	-/-	
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
11. Oktober 2013		23/10/2013
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Duval, Eric

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y,P	WO 2012/130798 A1 (BAYER CROPSCIENCE AG [DE]; WILLMS LOTHAR [DE]; SCHMITT MONIKA H [DE];) 4. Oktober 2012 (2012-10-04) Anspruch 1 -----	1-16
A	JOHN M. KNAPP ET AL: "Expedient Synthesis of a 72-Membered Isoxazolino-[beta]-ketoamide Library by a 2.3-Component Reaction", ACS COMBINATORIAL SCIENCE, Bd. 14, Nr. 2, 13. Februar 2012 (2012-02-13), Seiten 85-88, XP055052436, ISSN: 2156-8952, DOI: 10.1021/co200199h Seite 87; Tabelle 1 Seite 86; Abbildung 1 -----	1-16

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2013/069613

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2005021516 A1	10-03-2005	AP 2104 A	06-02-2010
		AR 045503 A1	02-11-2005
		AU 2004268895 A1	10-03-2005
		BR PI0413848 A	24-10-2006
		CA 2535711 A1	10-03-2005
		CN 1842521 A	04-10-2006
		EC SP066378 A	30-08-2006
		EG 25751 A	25-06-2012
		EP 1660464 A1	31-05-2006
		IL 173638 A	29-12-2011
		JP 4503017 B2	14-07-2010
		JP 2007503429 A	22-02-2007
		KR 20050022364 A	07-03-2005
		MA 27999 A1	03-07-2006
		MX PA06002267 A	17-05-2006
		NZ 545216 A	26-06-2009
		OA 13244 A	31-01-2007
		PE 03712005 A1	17-08-2005
		TR 200600899 T2	21-09-2006
		US 2006223848 A1	05-10-2006
		UY 28494 A1	28-02-2005
		WO 2005021516 A1	10-03-2005
		ZA 200601586 A	30-05-2007

JP 2005314407 A	10-11-2005	KEINE	

WO 2012130798 A1	04-10-2012	KEINE	
