



MD 4818 B1 2022.08.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **4818** (13) **B1**
(51) Int.Cl: A01N 47/28 (2006.01)
A01N 37/38 (2006.01)
A01N 37/10 (2006.01)
A01N 31/16 (2006.01)
A01N 55/02 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE

În termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărârea de acordare a brevetului de invenție, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului	
(21) Nr. depozit: a 2021 0024 (22) Data depozit: 2021.04.27	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2022.08.31, BOPI nr. 8/2022
(71) Solicitanți: INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR AL MEC, MD (72) Inventatori: BULHAC Ion, MD; ȘTEFÎRȚĂ Anastasia, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; ZUBAREVA Vera, MD (73) Titulari: INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR AL MEC, MD (74) Mandatar autorizat: JOVMIR Tudor	

(54) Compoziție pentru plantele de cultură

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la agricultură, și anume la compoziții chimice cu proprietăți de substanțe biologice active, care pot fi utilizate pentru reducerea impactului negativ al speciilor reactive de oxigen asupra plantelor de porumb și soia și pentru diminuarea destrucției oxidative a componentelor celulare.

Se propune o compoziție pentru plantele de cultură, denumită convențional Tiogalmet, ce conține 66,7% de tiouree și 33,3% de amestec de galați de potasiu, amoniu,

2

magneziu, molibdat de potasiu și paramolibdat de amoniu, luați în raport masic de 1:1:1:0,1:0,1, respectiv.

Rezultatul tehnic al invenției constă în asigurarea majorării proprietăților antioxidante ale plantelor de porumb și soia în condiții optime de umiditate cu 27% și 17% și în condiții de insuficiență de umiditate cu 43% și 19%, respectiv.

Revendicări: 1

MD 4818 B1 2022.08.31

(54) Composition for cultivated plants

(57) Abstract:

1

The invention relates to agriculture, namely to chemical compositions with properties of biologically active substances that can be used to reduce the negative impact of reactive oxygen species on corn and soybean plants and to reduce the oxidative degradation of cellular components.

A composition for cultivated plants is proposed, conditionally named Thiogalmet, comprising 66.7% of thiourea and 33.3% of a mixture of potassium, ammonium, magnesium

2

gallates, potassium molybdate and ammonium paramolybdate, taken in a mass ratio of 1:1:1:0.1:0.1, respectively.

The technical result of the invention consists in providing an increase in the antioxidant properties of corn and soybean plants under conditions of optimal humidity by 27% and 17% and under conditions of insufficient humidity by 43% and 19%, respectively.

Claims: 1

(54) Композиция для культурных растений

(57) Реферат:

1

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к химическим композициям со свойствами биологически активных веществ, которые могут быть использованы для снижения негативного воздействия активных форм кислорода на растения кукурузы и сои и для уменьшения окислительной деструкции клеточных компонентов.

Предлагается композиция для культурных растений, условно названная Тиогалмет, которая содержит 66,7%

2

тиомочевины и 33,3% смеси галлатов калия, аммония, магния, молибдата калия и парамолибдата аммония, взятых в массовом соотношении 1:1:1:0,1:0,1, соответственно.

Технический результат изобретения заключается в обеспечении повышения антиоксидантных свойств растений кукурузы и сои в условиях оптимальной влажности на 27% и 17% и в условиях недостаточного увлажнения на 43% и 19%, соответственно.

П. формулы: 1

Descriere:

Invenția se referă la agricultură, și anume la compoziții chimice cu proprietăți de substanțe biologice active, care pot fi utilizate pentru reducerea impactului negativ al speciilor reactive de oxigen asupra plantelor de porumb și soia și pentru diminuarea destrucției oxidative a componentelor celulare.

Este cunoscută utilizarea tioureei pentru protecția plantelor, care posedă proprietăți de diminuare a formării dialdehidei malonice și majorare a activității sistemelor de protecție antioxidantă a plantelor atât în condiții favorabile, cât și nefavorabile din mediul ambiant [1]. Dezavantajul soluției cunoscute constă în proprietățile antioxidante insuficient exprimate ale tioureei în diverse condiții de mediu.

Problema pe care o rezolvă invenția propusă este elaborarea unei compoziții pe bază de tiouree, utilizarea căreia să asigure proprietăți antioxidante sporite pentru protecția plantelor de la destrucțiile structurilor celulare cauzate de speciile reactive de oxigen în diverse condiții de mediu.

Problema se rezolvă prin compoziția pentru plantele de cultură, denumită convențional Tiogalmet, ce conține 66,7% de tiouree și 33,3% de amestec de galați de potasiu, amoniu, magneziu, molibdat de potasiu și paramolibdat de amoniu, luați în raport masic de 1:1:1:0,1:0,1, respectiv.

Amestecul de galați (săruri ale acidului 3,4,5-trihidroxibenzoic) de K^+ , NH_4^+ , Mg^{2+} și săruri de molibdat de potasiu și paramolibdat de amoniu este cunoscut sub denumirea de Galmet și posedă proprietăți de stimulare a creșterii plantelor (Șefiță A., Brînză L., Toma S., Bulhac I. și al. Opțiuni fiziologice de fortificare a plantelor în condiții de insuficiență de umiditate. În: Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură. Chișinău, 2008, p. 171-191).

Rezultatul tehnic al invenției constă în asigurarea majorării proprietăților antioxidante ale plantelor de porumb și soia în condiții optime de umiditate respectiv cu circa 27% și 17% comparativ cu martorul și cu 43% și 19% în condiții de insuficiență de umiditate. Rezultatul tehnic constă în intensificarea activității enzimelor de protecție antioxidantă, exprimată prin diminuarea conținutului dialdehidei malonice - produsul final al oxidării peroxidice a lipidelor de către speciile reactive de oxigen.

Avantajele invenției constau în efectul mai mare asupra gradului de majorare a proprietăților antioxidante ale plantelor comparativ cu cea mai apropiată soluție tehnică: cu 17% și 7,0 % respectiv la porumb și soia în condiții optime și cu 20,6% și 6,0% în condiții de secetă moderată.

Exemple de realizare a invenției

Exemplul I. Caracteristica compoziției

Tiogalmetul reprezintă o substanță solidă în formă de pulbere de culoare cafeniu-deschis, stabilă la temperatura camerei, bine solubilă în apă. S-a obținut prin amestecarea a două părți de masă de tiouree cu o parte de masă de Galmet, care, la rândul său, reprezintă un preparat ce constă din galați de potasiu, amoniu, magneziu, molibdat de potasiu și paramolibdat de amoniu luați într-un raport de masă respectiv de 1:1:1:0,1:0,1.

Spectrul IR al compoziției Tiogalmet se caracterizează prin prezența mai multor benzi de absorbție de diferită intensitate, cunoașterea cărora va permite folosirea spectrului în calitate de reper la obținerea repetată a compoziției respective. IR (i , cm^{-1}): 3623sl, 3361m, 3251i, 3163i, 3083m, 2989i, 2686m, 2647sl, 1680sl, 1607m, 1539f.i, 1456i, 1399f.i, 1366f.i, 1345f.i, 1317um, 1276i, 1262i, 1220sl, 1201i, 1096m, 1082m, 1055i, 1044i, 965sl, 890um, 876m, 836sl, 800m, 792m, 773m, 748m, 729i, 672m, 631i, 488f.i, 467i, 412sl (f.i – foarte intensivă, i – intensivă, m – medie, sl – slabă, f.sl – foarte slabă, um – umăr)

Exemplul II. Demonstrarea proprietăților antioxidante și argumentarea efectului major comparativ cu cea mai apropiată soluție tehnică.

În experiențe de vegetație s-a studiat efectul tratării plantelor conform celei mai apropiate soluții tehnice și cu soluție de Tiogalmet, asupra indicilor care caracterizează intensitatea destrucțiilor oxidative (conținutul dialdehidei malonice - DAM) și activității enzimelor de protecție antioxidantă (superoxiddismutazei – SOD, catalazei – CAT, ascorbatperoxidazei – APX, glutatinoxidazei – GLPX, glutatioreductazei - GLR), în frunzele plantelor de porumb și soia, crescute în condiții optime. Experiențele s-au realizat conform schemei: I-a variantă - plante din semințe tratate cu apă (martor); a II-a variantă – plante din semințe tratate cu soluție apoasă de tiouree în concentrație de 0,005 % (cea mai apropiată soluție tehnică); a III-a variantă – plante din semințe tratate cu soluție apoasă de Tiogalmet în concentrație de 0,005%. S-a studiat efectul pretratării plantelor asupra particularităților de protecție antioxidantă a plantelor în condiții de umiditate optimă și de stres oxidativ, creat prin reducerea umidității solului. Rezultatele sunt prezentate în tabelele 1-3.

Tabelul 1

Conținutul dialdehidei malonice și activitatea enzimelor de protecție antioxidantă în frunzele plantelor de porumb și soia, crescute în condiții de umiditate optimă

Indici	Variante	Martor	Tiouree		Tiogalmet	
		M ± m	M ± m	δ, %M*	M ± m	δ, %M*
<i>Zea mays</i> , L. cv. P458						
Conținutul DAM, $\mu\text{M} \cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		33,66±0,24	31,44±0,09	-6,59	24,91±0,04	-26,00
Activitatea SOD, un. conv. $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		17,44±1,17	19,87±0,83	13,93	22,08±0,57	26,60
Activitatea CAT, mM $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		7,98±0,02	8,60±0,11	7,78	10,73±0,47	34,46
Activitatea APX, mM $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		4,24±0,19	5,51±0,46	29,95	5,61±0,26	32,31
Activitatea GLPX, mM $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		46,36±0,47	52,83±0,25	13,95	62,45±4,98	34,70
Activitatea GLR, mM $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		69,41±6,57	82,16±4,32	18,37	85,00±3,67	22,46
<i>Glycine max</i> (Merr), L., cv. Nadejda						
Conținutul DAM, $\mu\text{M} \cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		32,87±0,04	25,38±0,06	-22,78	24,67±0,70	-24,95
Activitatea SOD, un. conv. $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		26,28±1,59	28,16±1,86	7,15	30,30±1,73	15,29
Activitatea CAT, mM $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		6,04±0,22	6,49±0,05	7,45	6,65±0,25	10,09
Activitatea APX, mM $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		5,26±0,24	6,02±0,09	14,44	6,51±0,27	23,76
Activitatea GLPX, mM $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		59,56±0,61	63,75±2,06	7,03	68,07±1,33	14,28
Activitatea GLR, mM $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		106,61±3,79	117,46±7,03	10,18	126,59±3,2	18,74

*- comparativ cu varianta martor; m.p. - masă proaspătă

- 5 În condiții satisfăcătoare de umiditate în sol plantele martor de porumb și soia se caracterizează prin conținut de dialdehidă malonică aproximativ egal, dar care indică existența unui stres oxidativ moderat, generat de temperatura ridicată și umiditatea relativă a aerului scăzută din timpul vegetației. Pretratarea plantelor cu remediile respective a condiționat o diminuare a conținutului DAM la reprezentanții ambelor culturi: la plantele de porumb și soia, pretratate cu tiouree s-a înregistrat o scădere
- 10 cu 6,59 la sută, la soia - cu 22,79%. La plantele de porumb și soia pretratate cu soluție de Tiogalmet gradul de diminuare a conținutului DAM a constituit respectiv 26,00% și 24,95% comparativ cu conținutul DAM în frunzele plantelor martor. Utilizarea noului produs în condiții normale de umiditate a asigurat o reducere a stresului oxidativ la plantele de porumb și soia cu 20,77% și 2,79% comparativ cu gradul de diminuare asigurat de pretratarea conform celei mai apropiate soluții tehnice. Efectul major de
- 15 diminuare a stresului oxidativ (conținutului DAM) la plantele pretratate cu soluție de Tiogalmet se datorează intensificării mai semnificative a activității enzimelor de protecție antioxidantă. Astfel noua combinație a asigurat la plantele de porumb o majorare a activității SOD, CAT, APX, GLPX și GLR cu, %: 11,12; 24,77; 1,81; 18,21 și 3,45 comparativ cu soluția tehnică cunoscută. La plantele de soia gradul de majorare a activității acestor enzime a constituit, respectiv, %: 7,60; 2,46; 8,13; 6,77 și 7,77.

- 20 Deci, compoziția propusă asigură obținerea unor proprietăți antioxidante și utilizarea ei pentru pretratarea plantelor în condiții optime de umiditate asigură o ameliorare a status-ului redox prin activarea enzimelor antioxidante și diminuarea conținutului de DAM.

- 25 Efect benefic al pretratării plantelor cu soluție de Tiogalmet a fost înregistrat și la determinarea proprietăților antioxidante ale plantelor în condiții de stres oxidativ cauzat de insuficiența moderată de umiditate (tabelul 2).

Tabelul 2

Conținutul dialdehidei malonice și activitatea enzimelor de protecție antioxidantă în frunzele plantelor de porumb și soia crescute în condiții de secetă moderată

Indici	Variante	Martor	Tiouree		Tiogalmet	
		M ± m	M ± m	δ, %M*	M ± m	δ, %M*
<i>Zea mays</i> , L. cv. P458						
Conținutul DAM, $\mu\text{M} \cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		47,07±0,91	43,40±0,03	-7,79	39,86±0,07	-15,31
Activitatea SOD, un. conv. $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		25,17±1,15	32,83±0,62	30,43	34,27±0,75	36,15
Activitatea CAT, mM $\cdot \text{g}^{-1}$ m.p.		10,53±0,32	11,45±0,30	8,73	12,22±0,33	16,05

Activitatea APX, mM · g ⁻¹ m.p.	7,04±0,28	8,45±0,78	20,02	8,55±0,30	21,45
Activitatea GLPX, mM · g ⁻¹ m.p.	69,82±1,80	81,22±0,24	16,33	87,15±1,90	24,83
Activitatea GLR, mM · g ⁻¹ m.p.	97,66±3,07	115,05±2,99	17,80	158,11±1,7	61,89
<i>Glycine max</i> (Merr), L. cv. Nadejda					
Conținutul DAM, μM · g ⁻¹ m. p.	49,90±0,40	42,71±0,04	-14,40	37,92±0,02	-24,00
Activitatea SOD, un. conv. · g ⁻¹ m.p.	39,87±1,04	47,71±2,42	19,66	50,82±0,58	27,46
Activitatea CAT, mM · g ⁻¹ m. p.	7,72±0,02	9,85±0,42	27,90	11,81±0,58	52,98
Activitatea APX, mM · g ⁻¹ m. p.	9,00±0,54	10,62±0,54	18,00	13,02±1,20	44,66
Activitatea GLPX, mM · g ⁻¹ m. p.	86,68±1,70	102,14±4,19	17,83	108,71±1,20	25,41
Activitatea GLR, mM · g ⁻¹ m. p.	147,95±1,9	156,22±2,72	5,59	161,90±8,02	9,43

*- comparativ cu varianta martor în aceleași condiții de umiditate insuficientă; m.p. - masă proaspătă

Rezultatele analizelor au demonstrat că seceta provoacă o majorare a conținutului DAM în frunzele plantelor netratate de porumb și soia cu 39,84% și 51,81% de la valoarea indicelui plantelor martor neexpuse acțiunii secetei. Conținutul DAM la plantele pretratate conform celei mai apropiate soluții tehnice și cu soluția Tiogalmet în condiții de secetă moderată se menținea la un nivel mai mic cu 7,79% și 15,31% la porumb și cu 14,40% și 24,00 % la soia comparativ cu valorile indicelui plantelor martor netratate și expuse secetei. Conținutul DAM la plantele pretratate cu soluții de tiouree și Tiogalmet pe fond de insuficiență de umiditate depășea nivelul DAM a plantelor martor din condiții optime de umiditate cu 28,93% și 18,42% la porumb și cu 29,93% și 15,36 % la plantele de soia, ceea ce reprezintă un grad de modificare a DAM semnificativ mai mic decât la plantele netratate, dar expuse acțiunii stresului oxidativ cauzat de secetă. Efectul pretratării cu soluție de Tiogalmet a constituit o reducere a DAM cu 8,88% și cu 12,63% comparativ cu efectul de la pretratarea conform celei mai apropiate soluții tehnice.

Efectul de menținere a stării red-ox a plantelor pretratate se datorează activizării sistemului enzimatic de protecție antioxidantă a plantelor atât în condiții optime, cât și de stres oxidativ (tabelul 3). În condiții optime de umiditate activitatea enzimelor antioxidante se majorează la plantele de porumb și soia cu 9,31 și 8,89 la sută sub influența tioureei și cu 27,51% și 16,87% respectiv la plantele de porumb și soia tratate cu soluție de Tiogalmet.

Tabelul 3

Conținutul DAM și activitatea enzimelor de protecție antioxidantă la plantele de porumb și soia în condiții optime de umiditate și secetă moderată

Variante		Martor		Tiouree		Tiogalmet	
		M ± m	δ, %M**	M ± m	δ, M**	M ± m	δ, %M**
<i>Zea mays</i> , L. cv. P458							
Conținutul DAM, μM · g ⁻¹ m.p.	optim	33,66±0,24		31,44±0,09	-6,59	24,91±0,04	-25,99
	secetă	47,07±0,91	39,84	43,40±0,16	-7,79	39,86±0,07	-15,31
Activitatea enzimatică sumară	optim	145,43±8,42		158,97±6,77	9,31	185,44±9,95	27,51
	secetă	210,22±6,62	44,50	249,00±6,71	18,44	300,30±4,98	42,85
<i>Glycine max</i> (Merr), L., cv. Nadejda							
Conținutul DAM, μM · g ⁻¹ m.p.	optim	32,87±0,04		25,38±0,06	-22,78	24,67±0,70	-24,95
	secetă	49,90±0,40	51,81	42,71±0,04	-14,40	37,92±0,02	-24,00
Activitatea enzimatică sumară	optim	203,75±6,45		221,88±6,52	8,89	238,12±6,81	16,87
	secetă	291,22±5,28		326,54±6,87	12,13	346,26±9,58	18,89

** - comparativ cu plantele martor în condițiile corespunzătoare; m.p. - masă proaspătă

În condiții de secetă intensificarea activității enzimelor antioxidante constituie corespunzător 18,44% și 12,13% la porumb și soia pretratate cu tiouree și cu 42,85% și 18,89 % la cele pretratate cu Tiogalmet. Gradul de modificare a activității enzimelor antioxidante asigurat de utilizarea invenției comparativ cu cea mai apropiată soluție tehnică constituie la porumb și soia în condiții optime de umiditate 16,65% și 7,32%, iar în condiții de secetă 20,60% și 6,04% corespunzător. Deci, compoziția propusă permite manifestarea unor proprietăți antioxidante semnificativ mai bune comparativ cu tioureea.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. Wahid A., Basra S.M.A., Farooq M. Thiourea: a molecule with immense biological significance for plants. International Journal of Agriculture & Biology, 2017, v. 19, nr. 4, p. 911-920

(57) Revendicări:

Compoziție pentru plantele de cultură, ce conține 66,7% de tiouree și 33,3% de amestec de galați de potasiu, amoniu, magneziu, molibdat de potasiu și paramolibdat de amoniu, luați în raport masic de 1:1:1:0,1:0,1, respectiv.

RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii

(21) Nr. depozit: a 2021 0024

(22) Data depozit: 2021.04.27

(71) Solicitant: **INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ȘI PROTECȚIE A PLANTELOR, MEC, MD**

(54) Titlu: **Compoziție cu proprietăți antioxidante pentru plantele de cultură**

II. Clasificarea obiectului invenției:

(51) **Int.Cl:** *A01N 47/28* (2006.01) *A01N 55/02* (2006.01)
A01N 37/38 (2006.01) *A01P 21/00* (2006.01)
A01N 37/10 (2006.01) *A01C 1/06* (2006.01)
A01N 31/16 (2006.01)

III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)

MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stânga/dreapta):

A01N 47/28, A01N 37/38, A01N 37/10, A01N 31/16, A01N 55/02, A01C 1/06, A01P 21/00
 tiogalmet, tiouree, galmet, galat, antioxidant

"Worldwide" (Espacenet):

A01N47/28, A01N37/38, A01N37/10, A01N31/16, A01N55/02, A01C1/06, A01P21/00
 thiourea, gallate, trihydroxybenzoic, antioxidant

EA, CIS (Eapatis):

A01N47/28, A01N37/38, A01N37/10, A01N31/16, A01N55/02, A01C1/06, A01P21/00
 тиомочевина, галлат, антиокислительн*

IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate

www.google.com
 www.ardi.wipo.int
 books.google.com
 Google Scholar

V. Documente considerate a fi relevante

Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D, C	Wahid A., Basra S.M.A., Farooq M. Thiourea: a molecule with immense biological significance for plants. International Journal of Agriculture & Biology, 2017, v. 19, nr. 4, p. 911-920	1
A	MD 4647 B1 2019.09.30	1
A	MD 1348 Y 2019.07.31	1

A	MD 1088 Y 2016.11.30	1
A	MD 1386 F1 2000.01.31	1
A	MD 2045 F1 2002.12.31	1
A	MD 2318 F1 2003.12.31	1
A	MD 3391 F1 2007.09.30	1
* categoriile speciale ale documentelor citate:		
A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidența principiul sau teoria pe care se bazează invenția	
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată	
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet	
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție	
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete	
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri	
Data finalizării documentării, 14.03.2022		
Examinator, GUȘAN Ala		