



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113164590 A

(43) 申请公布日 2021. 07. 23

(21) 申请号 201980059453.2

(22) 申请日 2019.07.11

(30) 优先权数据

62/696746 2018.07.11 US

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2021.03.11

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/US2019/041324 2019.07.11

(87) PCT国际申请的公布数据

W02020/014429 EN 2020.01.16

(71) 申请人 动量制药公司

地址 美国马萨诸塞州

(72) 发明人 E·库尔塔吉奇 L·鲁蒂茨基

D·奥尔蒂斯 J·C·兰辛

A·曼宁

(74) 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 72001

代理人 黄登高 黄希贵

(51) Int.Cl.

A61K 39/395 (2006.01)

A61K 47/68 (2006.01)

C07K 16/46 (2006.01)

C07K 16/28 (2006.01)

C07K 16/30 (2006.01)

A61P 35/04 (2006.01)


权利要求书47页 说明书107页 附图28页

(54) 发明名称

与靶向CCR4的工程化Fc-抗原结合结构域构建体有关的组合物和方法

(57) 摘要

描述了具有CCR4结合结构域和两个或更多个Fc结构域的Fc-抗原结合构建体以及使用此类构建体的方法。还描述了构成此类构建体的多肽。所述构建体中包括的Fc结构域单体可以包括促进同二聚化或异二聚化的氨基酸置换。



1.一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含CCR4结合结构域和通过接头与第二Fc结构域连接的第一Fc结构域,其中所述第一Fc结构域和所述第二Fc结构域中的每一者包含异二聚化选择性模块或同二聚化选择性模块。

2. 一种多肽,其包含CCR4结合结构域;接头;第一IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;第二接头;第二IgG1Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;任选的第三接头;以及任选的第三IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,其中至少两个Fc结构域单体包含异二聚化选择性模块或同二聚化选择性模块。

3. 如权利要求2所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含抗体重链可变结构域。

4.如权利要求2所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含抗体轻链可变结构域。

5. 如权利要求2所述的多肽, 其中所述第一IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变, 并且所述第二IgG1 Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变。

6. 如权利要求2所述的多肽,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变,并且所述第二IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

7.如权利要求2所述的多肽,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第二IgG恒定结构域单体均包含形成工程化突起的突变。

8.如权利要求2所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体、所述第二IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自包含形成工程化突起的突变。

9.如权利要求2所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第二IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且所述第三IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

10. 如权利要求2所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且所述第二IgG1结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

11. 如权利要求2所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第二IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且所述第一IgG1结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

12.如权利要求2-11中任一项所述的多肽,其中包含形成工程化突起的突变的所述IgG1 Fc结构域单体还包含一个、两个或三个反向电荷突变。

13.如权利要求2-12中任一项所述的多肽,其中所述形成工程化突起的突变和所述反向电荷突变在所述CH3结构域中。

14. 如权利要求13所述的多肽,其中所述突变在从EU位置G341到EU位置K447的序列内,包括端点。

15. 如权利要求2-13中任一项所述的多肽,其中所述突变是单一氨基酸变化。

16. 如权利要求2所述的多肽,其中所述第二接头和所述任选的第三接头包含选自由以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG、GGGS、GSGS、SGGG、GSGS、GSGSGS、GSGSGSGS、GSGSGSGSGS、
GSGSGSGSGSGS、GSGSGS、GSGSGSGS、GSGSGSGSGS、GSGS、GSGS、GSGSGSGS、GSGSGSGSGSGS

GGSGGGSGGGSGGGGS、GENLYFQSGG、SACYCELS、RSIAT、RPACKIPNDLKQKVMNH、GGSAGGSGSGSSG
GSSGASGTGTAGGTGSGSGTGSG、AAANSSIDLISVPVDSR、GSGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSGG
GS、GGGSGGGSGGGGS、SGGGSGGGSGGGSGGGSGGG、GSGGGSGGGSGGGSGGS、GGGG、GGGGGGGG、
GGGGGGGGGGGG和GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG。

17. 如权利要求2所述的多肽,其中所述第二接头和所述任选的第三接头是甘氨酸间隔物。

18. 如权利要求2所述的多肽,其中所述第二接头和所述任选的第三接头独立地由4至30、4至20、8至30、8至20、12至20或12至30个甘氨酸残基组成。

19. 如权利要求2所述的多肽,其中所述第二接头和所述任选的第三接头由20个甘氨酸残基组成。

20. 如权利要求2-19所述的多肽,其中至少一个所述Fc结构域单体在EU位置I253处包含单一氨基酸突变。

21. 如权利要求20所述的多肽,其中EU位置I253处的每个氨基酸突变独立地选自由以下项组成的组:I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y。

22. 如权利要求21所述的多肽,其中位置I253处的每个氨基酸突变是I253A。

23. 如权利要求2-22中任一项所述的多肽,其中至少一个所述Fc结构域单体在EU位置R292处包含单一氨基酸突变。

24. 如权利要求23所述的多肽,其中EU位置R292处的每个氨基酸突变独立地选自由以下项组成的组:R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y。

25. 如权利要求24所述的多肽,其中R292位置处的每个氨基酸突变是R292P。

26. 如权利要求2-25中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述铰链独立地包含选自由以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:EPKSCDKTHTCPPCPAPELL和DKTHTCPPCPAPELL。

27. 如权利要求26所述的多肽,其中所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的所述铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL。

28. 如权利要求26所述的多肽,其中所述第一Fc结构域单体的所述铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAPEL。

29. 如权利要求26所述的多肽,其中所述第一Fc结构域单体的所述铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAPEL,并且所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的所述铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL。

30. 如权利要求2-29中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域独立地包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换。

31. 如权利要求2-29中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换。

32. 如权利要求2-29中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGV EVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸置换。

33. 如权利要求2-29中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGV EVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK。

34. 如权利要求2-29中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKT TPPVLDSGSSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过10个单一氨基酸置换。

35. 如权利要求2-29中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKT TPPVLDSGSSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过8个单一氨基酸置换。

36. 如权利要求2-29中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKT TPPVLDSGSSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过6个单一氨基酸置换。

37. 如权利要求2-29中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKT TPPVLDSGSSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过5个单一氨基酸置换。

38. 如权利要求30-37中任一项所述的多肽,其中所述单一氨基酸置换选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、F405A、Y407A、S354C、Y349T、T394F、K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R。

39. 如权利要求2-29中任一项所述的多肽,其中每个所述Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

40. 如权利要求39所述的多肽,其中多至6个所述单一氨基酸置换是所述CH3结构域中的反向电荷突变或是形成工程化突起的突变。

41. 如权利要求39所述的多肽,其中所述单一氨基酸置换在从EU位置G341到EU位置K447的序列内,包括端点。

42. 如权利要求2所述的多肽,其中至少一个所述形成工程化突起的突变选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、S354C、Y349T和T394F。

43. 如权利要求5、6和9-29中任一项所述的多肽,其中所述两个或四个反向电荷突变选自:K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R。

44. 如权利要求2-43中任一项所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域是scFv。

45. 如权利要求2-43中任一项所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含VH结构域和CH1结构域。

46. 如权利要求43所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域还包含VL结构域。
47. 如权利要求45所述的多肽,其中所述VH结构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列。
48. 如权利要求45所述的多肽,其中所述VH结构域包含含有表2中列出的抗体的序列的VH结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3。
49. 如权利要求45所述的多肽,其中所述VH结构域包含表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且所述VH序列不包括所述CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的所述VH序列具有至少95%或98%的同一性。
50. 如权利要求45所述的多肽,其中所述VH结构域包含表2中列出的抗体的VH序列。
51. 如权利要求45所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列。
52. 如权利要求45所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含来自表2中列出的抗体的一组VH和VL序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列。
53. 如权利要求45所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含VH结构域和VL结构域,所述VH结构域包含表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且所述VL结构域包含表2中列出的抗体的VL序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3,其中所述VH结构域和所述VL结构域序列不包括所述CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的所述VH序列和所述VL序列具有至少95%或98%的同一性。
54. 如权利要求45所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含表2中列出的抗体的一组VH和VL序列。
55. 如权利要求2-43所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含IgG CL抗体恒定结构域和IgG CH1抗体恒定结构域。
56. 如权利要求2-43所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含VH结构域和CH1结构域,并且可以与包含VL结构域和CL结构域的多肽结合以形成Fab。
57. 一种多肽复合物,其包含如权利要求2-56中任一项所述的多肽的两个拷贝,所述两个拷贝通过第一IgG1 Fc结构域单体或第二IgG1 Fc结构域单体的铰链内的半胱氨酸残基之间的二硫键连接。
58. 一种多肽复合物,其包含与第二多肽连接的如权利要求2-56中任一项所述的多肽,所述第二多肽包含IgG1 Fc结构域单体,所述IgG1 Fc结构域单体包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,其中所述多肽和所述第二多肽通过所述多肽的第一IgG1 Fc结构域单体、第二IgG1 Fc结构域单体或第三IgG1 Fc结构域单体的所述铰链结构域内的半胱氨酸残基与所述第二多肽的所述铰链结构域内的半胱氨酸残基之间的二硫键连接。
59. 如权利要求58所述的多肽复合物,其中所述第二多肽单体包含形成工程化空腔的突变。
60. 如权利要求59所述的多肽复合物,其中所述形成工程化空腔的突变选自以下项组成的组:Y407T、Y407A、F405A、T394S、T394W/Y407A、T366W/T394S、T366S/L368A/Y407V/Y349C、S364H/F405A。
61. 如权利要求58-60中任一项所述的多肽复合物,其中所述第二多肽包含SEQ ID NO: 42、43、45和47中任一者具有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

62. 一种多肽,其包含:CCR4结合结构域;接头;第一IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;第二接头;第二IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;任选的第三接头;以及任选的第三IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,

其中至少一个Fc结构域单体包含一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

63. 如权利要求62所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含抗体重链可变结构域。

64. 如权利要求62所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含抗体轻链可变结构域。

65. 如权利要求62所述的多肽,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表4B中的突变的一组四个反向电荷突变,并且所述第二IgG1 Fc结构域单体包括选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

66. 如权利要求62所述的多肽,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且所述第二IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A和表4B和表4B中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表4B中的突变的一组四个反向电荷突变。

67. 如权利要求62所述的多肽,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第二IgG1 Fc结构域单体均包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

68. 如权利要求62所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体、所述第二IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

69. 如权利要求62所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第二IgG1 Fc结构域单体各自均包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且所述第三IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表4B中的突变的一组四个反向电荷突变。

70. 如权利要求62所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且所述第二IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表4B中的突变的一组四个反向电荷突变。

71. 如权利要求62所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第二IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且所述第一IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表4B中的突变的一组四个反向电荷突变。

72. 如权利要求62-71中任一项所述的多肽,其中包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变的所述IgG1 Fc结构域单体具有相同的CH3结构域。

73. 如权利要求62-72中任一项所述的多肽,其中选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变在所述CH3结构域中。

74. 如权利要求73所述的多肽,其中所述突变在从EU位置G341到EU位置K447的序列内,包括端点。

75. 如权利要求62-73中任一项所述的多肽,其中所述突变各自是单一氨基酸变化。

76. 如权利要求72所述的多肽,其中所述第二接头和所述任选的第三接头包含选自由

是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVD GVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换。

92. 如权利要求62-89中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVD GVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸置换。

93. 如权利要求62-89中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVD GVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK。

94. 如权利要求62-89中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNY KTTTPVLDSGSSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过10个单一氨基酸置换。

95. 如权利要求62-89中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNY KTTTPVLDSGSSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过8个单一氨基酸置换。

96. 如权利要求62-89中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNY KTTTPVLDSGSSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过6个单一氨基酸置换。

97. 如权利要求62-89中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNY KTTTPVLDSGSSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过5个单一氨基酸置换。

98. 如权利要求90-97中任一项所述的多肽,其中所述单一氨基酸置换选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、F405A、Y407A、S354C、Y349T、T394F、K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R。

99. 如权利要求62-89中任一项所述的多肽,其中每个所述Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

100. 如权利要求99所述的多肽,其中多至6个所述单一氨基酸置换是所述CH3结构域中的反向电荷突变。

101. 如权利要求99所述的多肽,其中所述单一氨基酸置换在从EU位置G341到EU位置K447的序列内,包括端点。

102. 如权利要求62所述的多肽,其中至少一个所述形成工程化突起的突变选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、S354C、Y349T和T394F。

103. 如权利要求65、66和69-89中任一项所述的多肽,其中所述两个或四个反向电荷突变选自:K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和

D356R。

104. 如权利要求62-103中任一项所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域是scFv。

105. 如权利要求62-103中任一项所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含VH结构域和CH1结构域。

106. 如权利要求103所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域还包含VL结构域。

107. 如权利要求105所述的多肽,其中所述VH结构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列。

108. 如权利要求105所述的多肽,其中所述VH结构域包含含有表2中列出的抗体的序列的VH结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3。

109. 如权利要求105所述的多肽,其中所述VH结构域包含表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且所述VH序列不包括所述CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的所述VH序列具有至少95%或98%的同一性。

110. 如权利要求105所述的多肽,其中所述VH结构域包含表2中列出的抗体的VH序列。

111. 如权利要求105所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列。

112. 如权利要求105所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含来自表2中列出的抗体的一组VH和VL序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列。

113. 如权利要求105所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含VH结构域和VL结构域,所述VH结构域包含表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且所述VL结构域包含表2中列出的抗体的VL序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3,其中所述VH结构域和所述VL结构域序列不包括所述CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的所述VH序列和所述VL序列具有至少95%或98%的同一性。

114. 如权利要求105所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含表2中列出的抗体的一组VH和VL序列。

115. 如权利要求62-103所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含IgG CL抗体恒定结构域和IgG CH1抗体恒定结构域。

116. 如权利要求62-103所述的多肽,其中所述CCR4结合结构域包含VH结构域和CH1结构域,并且可以与包含VL结构域和CL结构域的多肽结合以形成Fab。

117. 一种多肽复合物,其包含如权利要求2-56中任一项所述的多肽的两个拷贝,所述两个拷贝通过第一IgG1 Fc结构域单体或第二IgG1 Fc结构域单体的铰链内的半胱氨酸残基之间的二硫键连接。

118. 一种多肽复合物,其包含与第二多肽连接的如权利要求62-116中任一项所述的多肽,所述第二多肽包含IgG1 Fc结构域单体,所述IgG1 Fc结构域单体包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,其中所述多肽和所述第二多肽通过所述多肽的第一IgG1 Fc结构域单体、第二IgG1 Fc结构域单体或第三IgG1 Fc结构域单体的所述铰链结构域内的半胱氨酸残基与所述第二多肽的所述铰链结构域内的半胱氨酸残基之间的二硫键连接。

119. 如权利要求118所述的多肽复合物,其中所述第二多肽单体包含一个、两个或三个反向电荷突变。

120. 如权利要求119所述的多肽复合物,其中所述第二多肽单体包含选自表4A和表4B

的一个、两个或三个反向电荷突变,并且与所述多肽中选自表4A和表4B的所述一个、两个或三个反向电荷突变互补。

121.如权利要求118-120中任一项所述的多肽复合物,其中所述第二多肽包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

122.一种多肽,其包含:第一IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;第二接头;第二IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;任选的第三接头;以及任选的第三IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,

其中至少一个Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变。

123.如权利要求122所述的多肽,其还包含抗体重链可变结构域和所述第一IgG1单体的氨基末端的CH1结构域。

124.如权利要求122所述的多肽,其还包含所述第一IgG1单体的氨基末端的scFv。

125.如权利要求122所述的多肽,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变,并且所述第二IgG1 Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变。

126.如权利要求122所述的多肽,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变,并且所述第二IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

127.如权利要求122所述的多肽,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第二IgG恒定结构域单体均包含形成工程化突起的突变。

128.如权利要求2所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体、所述第二IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自包含形成工程化突起的突变。

129.如权利要求122所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第二IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且所述第三IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

130.如权利要求122所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且所述第二IgG1结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

131.如权利要求122所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第二IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且所述第一IgG1结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

132.如权利要求122-131中任一项所述的多肽,其中包含形成工程化突起的突变的所述IgG1 Fc结构域单体还包含一个、两个或三个反向电荷突变。

133.如权利要求122-131中任一项所述的多肽,其中所述形成工程化突起的突变和所述反向电荷突变在所述CH3结构域中。

134.一种多肽,其包含:第一IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;第二接头;第二IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;任选的第三接头;以及任选的第三IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,

其中至少一个Fc结构域单体包含一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

135. 如权利要求134所述的多肽,其还包含抗体重链可变结构域和所述第一IgG1 Fc结构域单体的氨基末端的CH1结构域。

136. 如权利要求134所述的多肽,其还包含所述第一IgG1 Fc结构域单体的氨基末端的scFv。

137. 如权利要求134所述的多肽,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表6中的突变的一组四个反向电荷突变,并且所述第二IgG1 Fc结构域单体包括选自表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

138. 如权利要求134所述的多肽, 其中所述第一IgG1 Fc结构域单体包含选自表4的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变, 并且所述第二IgG1Fc结构域单体包含选自表4A中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表4B中的突变的一组四个反向电荷突变。

139. 如权利要求134所述的多肽, 其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第二IgG恒定结构域单体均包含选自表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

140. 如权利要求134所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体、所述第二IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自包含选自表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

141. 如权利要求134所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第二IgG1 Fc结构域单体各自均包含选自表4A或表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且所述第三IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表4B中的突变的一组四个反向电荷突变。

142. 如权利要求134所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第一IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且所述第二IgG1结构域单体包含选自表4A中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表4B中的突变的一组四个反向电荷突变。

143. 如权利要求134所述的多肽,其包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中所述第二IgG1 Fc结构域单体和所述第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含选自表4A或表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且所述第一IgG1结构域单体包含选自表4A中的突变的一组两个反向电荷突变或选自表4B中的突变的一组四个反向电荷突变。

144. 如权利要求134-143中任一项所述的多肽,其中包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变的所述IgG1 Fc结构域单体具有相同的CH3结构域。

145. 如权利要求134-143中任一项所述的多肽,其中选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变在所述CH3结构域中。

146. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽, 其中所述突变在从EU位置G341到EU位置K447的序列内, 包括端点。

147. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中所述突变各自是单一氨基酸变化。

148. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽, 其中所述第二接头和所述任选的第三接头包含选自以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG,GGGGS,GGSG,SGGG,SGSG,SGSGSG,SGSGSGSG,SGSGSGSGSG,
SGSGSGSGSGSG,GGSGGS,GGSGGS,GGSGSGSGSG,GGSG,GGSG,GGSGGGSG,GGSGGGSGGGSGGG,
GGSGGGSGGGSGGGGS,GENLYFQSGG,SACYCELS,RSIAT,RPACKIPNDLKQKVMNH,GGSGGGSGSGSSG

GSSGASGTGTAGGTGSGSGTGSG、AAANSSIDLISVPVDSR、GSGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSGGGS、GGGSGGGSGGGS、SGGGSGGGSGGGSGGGSGGG、GSGGGSGGGSGGGSGGS、GGGG、GGGGGGGG、GGGGGGGGGGGG和GGGGGGGGGGGGGGGGGG。

149. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中所述第二接头和所述任选的第三接头独立地由4至30、4至20、8至30、8至20、12至20或12至30个甘氨酸残基组成。

150. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中所述第二接头和所述任选的第三接头由20个甘氨酸残基组成。

151. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中至少一个所述Fc结构域单体在EU位置I253处包含单一氨基酸突变。

152. 如权利要求151所述的多肽,其中EU位置I253处的每个氨基酸突变独立地选自以下项组成的组:I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y。

153. 如权利要求152所述的多肽,其中位置I253处的每个氨基酸突变是I253A。

154. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中至少一个所述Fc结构域单体在EU位置R292处包含单一氨基酸突变。

155. 如权利要求154中任一项所述的多肽,其中EU位置R292处的每个氨基酸突变独立地选自以下项组成的组:R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y。

156. 如权利要求155所述的多肽,其中R292位置处的每个氨基酸突变是R292P。

157. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述铰链独立地包含选自以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:EPKSCDKTHTCPPCPAPELL和DKTHTCPPCPAPELL。

158. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的所述铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL。

159. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中所述第一Fc结构域单体的所述铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAPEL。

160. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中所述第一Fc结构域单体的所述铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAPEL,并且所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的所述铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL。

161. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域独立地包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换。

162. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换。

165. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两

个单一氨基酸置换。

166. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK。

167. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过10个单一氨基酸置换。

168. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过8个单一氨基酸置换。

169. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过6个单一氨基酸置换。

170. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个Fc结构域单体的所述CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过5个单一氨基酸置换。

171. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中所述单一氨基酸置换选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、S354C、Y349T、T394F、K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R。

172. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中每个所述Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

173. 如权利要求99所述的多肽,其中多至6个所述单一氨基酸置换是所述CH3结构域中的反向电荷突变。

174. 如权利要求173所述的多肽,其中所述单一氨基酸置换在从EU位置G341到EU位置K447的序列内,包括端点。

175. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中至少一个所述形成工程化突起的突变选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、S354C、Y349T和T394F。

176. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其中所述两个或四个反向电荷突变选自:K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R。

178. 如权利要求123、124、135和136中任一项所述的多肽,其中所述VH结构域或所述scFv包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列。

179. 如权利要求123、124、135和136中任一项所述的多肽,其中所述VH结构域或所述scFv包含含有表2中列出的抗体的序列的VH结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3。

180. 如权利要求123、124、135和136中任一项所述的多肽,其中所述VH结构域或所述scFv包含表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且所述VH序列不包括所

述CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的所述VH序列具有至少95%或98%的同一性。

181. 如权利要求123、124、135和136中任一项所述的多肽,其中所述VH结构域或所述scFv包含表2中列出的抗体的VH序列。

182. 如权利要求123、124、135和136中任一项所述的多肽,其中所述VH结构域或所述scFv包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列。

183. 如权利要求123、124、135和136中任一项所述的多肽,其中所述VH结构域或所述scFv包含来自表2中列出的抗体的一组VH和VL序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列。

184. 如权利要求123、124、135和136中任一项所述的多肽,其中所述VH结构域或所述scFv包含含有表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的VH结构域以及含有表2中列出的抗体的VL序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3的VL结构域,其中所述VH结构域和所述VL结构域序列不包括所述CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的所述VH序列和所述VL序列具有至少95%或98%的同一性。

185. 如权利要求123、124、135和136中任一项所述的多肽,其中所述VH结构域或所述scFv包含表2中列出的抗体的一组VH和VL序列。

186. 如权利要求122-145中任一项所述的多肽,其还包含IgG CL抗体恒定结构域和IgG CH1抗体恒定结构域。

187. 一种核酸分子,其编码如权利要求2-187中任一项所述的多肽。

188. 一种表达载体,其包含如权利要求187所述的核酸分子。

189. 一种宿主细胞,其包含如权利要求187所述的核酸分子。

190. 一种宿主细胞,其包含如权利要求188所述的表达载体。

191. 一种产生如权利要求2-187中任一项所述的多肽的方法,其包括在表达所述多肽的条件下培养如权利要求189或权利要求190所述的宿主细胞。

192. 如权利要求189所述的宿主细胞,其还包含编码包含抗体VL结构域的多肽的核酸分子。

193. 如权利要求190所述的宿主细胞,其还包含编码包含抗体VL结构域的多肽的核酸分子。

194. 如权利要求189所述的宿主细胞,其还包含编码包含抗体VL结构域和抗体CL结构域的多肽的核酸分子。

195. 如权利要求190所述的宿主细胞,其还包含编码包含抗体VL结构域和抗体CL结构域的多肽的核酸分子。

196. 如权利要求189所述的宿主细胞,其还包含编码包含具有不超过10个单一氨基酸突变的IgG1 Fc结构域单体的多肽的核酸分子。

197. 如权利要求190所述的宿主细胞,其还包含编码包含具有不超过10个单一氨基酸突变的IgG1 Fc结构域单体的多肽的核酸分子。

199. 如权利要求196或197所述的宿主细胞,其中所述IgG1 Fc结构域单体在所述CH3结构域中包含SEQ ID No:42、43、45和47中任一者具有不超过10、8、6或4个单一氨基酸突变的氨基酸序列。

200. 一种药物组合物,其包含如权利要求2-186中任一项所述的多肽。

201. 如权利要求200所述的药物组合物,其中少于40%、30%、20%、10%、5%、2%的所述多肽在Fc结构域单体上具有至少一个岩藻糖修饰。

202. 如权利要求1的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;以及

d) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域。

203. 如权利要求1或202所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述单个Fc结构域构建体是抗体。

204. 一种组合物,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;以及

d) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域。

205. 如权利要求204所述的组合物,其中所述CCR4结合结构域与所述第一多肽和所述第二多肽或所述第三多肽连接,或与所述第二多肽和所述第三多肽连接。

206. 如权利要求204所述的组合物,其中所述CCR4结合结构域与所述第一多肽、所述第二多肽和所述第三多肽连接。

207. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;以及

d) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体包含具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

208.如权利要求207所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述生物活性是Fc受体介导的效应子功能。

209.如权利要求208所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述Fc受体介导的效应子功能是ADCC和ADCP和/或CDC活性。

210.一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的间隔物;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;以及

d) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域。

211.如权利要求202、207或210所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域与所述第一多肽和所述第二多肽或所述第三多肽连接,或与所述第二多肽和所述第三多肽连接。

212.如权利要求202、207或210所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域与所述第一多肽、所述第二多肽和所述第三多肽连接。

213.如权利要求1和202-212中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域是Fab。

214.如权利要求202-212中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域是所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽的氨基酸序列的一部分。

215.如权利要求214所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域是scFv。

216.如权利要求202-212中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域包含V_H结构域和C_H1结构域,并且其中所述V_H和所述C_H1结构域是所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽的氨基酸序列的一部分。

217.如权利要求216所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域还包含V_L结构域。

218.如权利要求217所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述Fc-抗原结合结构域构建体包含第四多肽,所述第四多肽包含所述V_L结构域。

219.如权利要求216所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述V_H结构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列。

220.如权利要求216所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述V_H结构域包含含有表2

中列出的抗体的序列的V_H结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3。

221. 如权利要求216所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述V_H结构域包含表2中列出的抗体的V_H序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且所述V_H序列不包括所述CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的所述V_H序列具有至少95%的同一性。

222. 如权利要求216所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述V_H结构域包含表2中列出的抗体的V_H序列。

223. 如权利要求1和202-215中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列。

224. 如权利要求1和202-215中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域包含来自表2中列出的抗体的一组V_H和V_L序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列。

225. 如权利要求1和202-215中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域包含含有表2中列出的抗体的V_H序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的V_H结构域,以及含有表2中列出的抗体的V_L序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3的V_L结构域,其中所述V_H结构域和所述V_L结构域序列不包括所述CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的所述V_H和所述V_L序列具有至少95%的同一性。

226. 如权利要求1和202-215中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域包含表2中列出的抗体的一组V_H和V_L序列。

227. 如权利要求1和202-212中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其还包含IgG C_L抗体恒定结构域和IgG C_H1抗体恒定结构域,其中所述IgG C_H1抗体恒定结构域通过接头附接到所述第一多肽或所述第二多肽的N末端。

228. 如权利要求202-227中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体之间的二聚化。

229. 如权利要求202-228中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的二聚化。

230. 如权利要求202-228中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二多肽和所述第三多肽具有相同的氨基酸序列。

231. 如权利要求228或229所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述二聚化选择性模块包括进入一个所述Fc结构域单体的所述C_H3结构域中的工程化空腔和进入另一个所述Fc结构域单体的所述C_H3结构域中的工程化突起,其中所述工程化空腔和所述工程化突起被定位成形成Fc结构域单体的突起-进入-空腔对。

232. 如权利要求231所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述工程化突起包含选自S354C、T366W、T366Y、T394W、T394F和F405W组成的组的至少一种修饰,并且所述工程化空腔包含选自Y349C、T366S、L368A、Y407V、Y407T、Y407A、F405A和T394S组成的组的至少一种修饰。

233. 如权利要求228或229所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中一个所述Fc结构域

单体包含Y407V和Y349C,并且另一个所述Fc结构域单体包含T366W和S354C。

234.如权利要求228或229所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述二聚化选择性模块包含进入一个所述结构域单体的所述C_H3结构域中的带负电的氨基酸和进入另一个所述Fc结构域单体的所述C_H3结构域中的带正电的氨基酸,其中所述带负电的氨基酸和所述带正电的氨基酸被定位成促进Fc结构域的形成。

235.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含D399K和K409D或K409E。

236.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含K392D和D399K。

237.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含E357K和K370E。

238.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含D356K和K439D。

239.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含K392E和D399K。

240.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含E357K和K370D。

241.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含D356K和K439E。

242.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体中的每一者包含S354C和T366W,并且所述第三多肽和所述第四多肽各自包含Y349C、T366S、L368A和Y407V。

243.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第三多肽和所述第四多肽中的每一者包含S354C和T366W,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体各自包含Y349C、T366S、L368A和Y407V。

244.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体中的每一者包含E357K或E357R,并且所述第三多肽和所述第四多肽各自包含K370D或K370E。

245.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含K370D或K370E,并且所述第三多肽和所述第四多肽各自包含E357K或E357R。

246.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体中的每一者包含K409D或K409E,并且所述第三多肽和所述第四多肽各自包含D399K或D399R。

247.如权利要求234所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含D399K或D399R,并且所述第三多肽和所述第四多肽各自包含K409D或K409E。

248.如权利要求1和202-247中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述Fc-抗原结合结构域构建体中的一个或多个接头是键。

249. 如权利要求1和202-247中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述Fc-抗原结合结构域构建体中的一个或多个接头是间隔物。

[illegible]

251. 如权利要求249所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述间隔物是甘氨酸间隔物。

252.如权利要求251所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述间隔物由4至30、8至30或12至30个甘氨酸残基组成。

253. 如权利要求252所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述间隔物由20个甘氨酸残基组成。

254.如权利要求1和202-212中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述CCR4结合结构域通过接头与所述Fc结构域单体连接。

255. 如权利要求254所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述接头是间隔物。

256. 如权利要求1和202-255中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中至少一个所述Fc结构域在位置I253处包含至少一个氨基酸修饰。

257. 如权利要求256所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中位置I253处的所述氨基酸修饰独立地选自以下项组成的组:I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y。

258. 如权利要求257所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中I253位置处的每个氨基酸修饰是I253A。

259. 如权利要求1和202-258中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中至少一个所述Fc结构域在位置R292处包含至少一个氨基酸修饰。

260. 如权利要求259所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中位置R292处的每个氨基酸修饰独立地选自由以下项组成的组:R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y。

261.如权利要求260所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中R292位置处的每个氨基酸修饰是R292P。

262. 如权利要求1和202-261中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体, 其中一个或多个所述Fc结构域单体包含IgG铰链结构域、IgG C_H2抗体恒定结构域和IgG C_H3抗体恒定结构域。

263. 如权利要求262所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体包含IgG较链结构域、IgG C_μ2抗体恒定结构域和IgG C_μ3抗体恒定结构域。

264. 如权利要求262或263所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述IgG是选自由以

下项组成的组的亚型：IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3和IgG4。

265. 如权利要求1和202-264中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体，其中所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽和所述第四多肽中的每一者中的N末端Asp突变为Gln。

266. 如权利要求1和202-265中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体，其中所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽和所述第四多肽中的一者或多者缺乏C末端赖氨酸。

267. 如权利要求266所述的Fc-抗原结合结构域构建体，其中所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽和所述第四多肽中的每一者缺乏C末端赖氨酸。

268. 如权利要求1和202-267中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体，其还包含通过接头与一个或多个所述多肽的N末端或C末端连接的白蛋白结合肽。

269. 一种细胞培养基，其包含Fc-抗原结合结构域构建体的群体，其中以摩尔为基础，至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体包含：

- a) 第一多肽，其包含
 - i) 第一Fc结构域单体；
 - ii) 第二Fc结构域单体；以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头；
- b) 第二多肽，其包含第三Fc结构域单体；
- c) 第三多肽，其包含第四Fc结构域单体；以及
- d) 抗原结合结构域，其与所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽连接；

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域，并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域。

270. 如权利要求269所述的细胞培养基，其中以摩尔为基础，至少75%的所述Fc-抗原结合结构域构建体包含所述第一Fc结构域、所述第二Fc结构域和所述CCR4结合结构域。

271. 一种细胞培养基，其包含Fc-抗原结合结构域构建体的群体，其中以摩尔为基础，至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的，并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体以至少0.1mg/L的浓度存在于所述培养基中。

272. 如权利要求271所述的细胞培养基，其中以摩尔为基础，至少75%的所述Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的。

273. 如权利要求269-272中任一项所述的细胞培养基，其中所述Fc-抗原结合结构域构建体以至少10mg/L的浓度存在于所述培养基中。

274. 如权利要求269-273中任一项所述的细胞培养基，其中所述Fc-抗原结合结构域构建体以至少100mg/L的浓度存在于所述培养基中。

275. 一种制造Fc-抗原结合结构域构建体的方法，所述方法包括：

- a) 培养表达以下项的宿主细胞：
 - (1) 第一多肽，其包含
 - i) 第一Fc结构域单体；
 - ii) 第二Fc结构域单体；以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头；
 - (2) 第二多肽，其包含第三Fc结构域单体；(3) 第三多肽，其包含第四Fc结构域单体；以

及(4)抗原结合结构域;其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域;其中所述CCR4结合结构域与所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽连接,从而形成Fc-抗原结合结构域构建体;并且其中以摩尔为基础,细胞培养上清液中至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的,并且

b) 从所述细胞培养上清液中纯化所述Fc-抗原结合结构域构建体。

276. 一种组合物,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;

d) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;以及

e) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽和/或所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述第一抗原结合结构域和所述第二抗原结合结构域结合不同的抗原。

277. 如权利要求276所述的组合物,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体之间的二聚化,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的二聚化,并且其中所述第二多肽和所述第三多肽具有不同的氨基酸序列。

278. 如权利要求277所述的组合物,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体中的每一者包含E357K和K370D,并且所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含K370D和E357K。

279. 一种组合物,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;

d) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;

e) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽连接;以及

f) 第三抗原结合结构域,其与所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述第一抗原结合结构域、所述第二抗原结合结构域和所述第三抗原结合结构域结合不同的抗原。

280. 如权利要求279所述的组合物,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体之间的二聚化,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的二聚化,并且其中所述第二多肽和所述第三多肽具有不同的氨基酸序列。

281. 如权利要求280所述的组合物,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体中的每一者包含E357K和K370D,并且所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含K370D和E357K。

282. 一种组合物,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
- b) 第二多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

283. 如权利要求282所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体之间的二聚化,

所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的二聚化;并且

所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体之间的二聚化。

284. 一种组合物,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
- b) 第二多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

285. 如权利要求284所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的二聚化,

所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的二聚化;并且

所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体之间的二聚化。

286. 一种组合物,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体,
 - iii) 第三Fc结构域单体,
 - iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
 - v) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的第二接头;
- b) 第二多肽,其包含
 - vi) 第四Fc结构域单体,
 - vii) 第五Fc结构域单体,
 - viii) 第六Fc结构域单体,
 - ix) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的第三接头;以及

x) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的第四接头；
c) 第三多肽，其包含第七Fc结构域单体；
d) 第四多肽，其包含第八Fc结构域单体；
e) 第五多肽，其包含第九Fc结构域单体；
f) 第六多肽，其包含第十Fc结构域单体；以及
g) 抗原结合结构域，其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽、所述第四多肽、所述第五多肽或所述第六多肽连接；

其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域，并且所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域，所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域，所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体组合以形成第四Fc结构域，并且所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体组合以形成第五Fc结构域。

287. 如权利要求286所述的Fc-抗原结合结构域构建体，其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块，所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的二聚化，

所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块，所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体之间的二聚化，

所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块，所述互补的二聚化选择性模块促进所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体之间的二聚化，

所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块，所述互补的二聚化选择性模块促进所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体之间的二聚化，并且

所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块，所述互补的二聚化选择性模块促进所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体之间的二聚化。

288. 一种Fc-抗原结合结构域构建体，其包含：

- a) 第一多肽，其包含
 - i) 第一Fc结构域单体；
 - ii) 第二Fc结构域单体；以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头；
- b) 第二多肽，其包含第三Fc结构域单体；
- c) 第三多肽，其包含第四Fc结构域单体；以及
- d) 第一抗原结合结构域，其与所述第一多肽连接；以及
- e) 第二抗原结合结构域，其与所述第二多肽和/或所述第三多肽连接；

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域，并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域，其中所述第一抗原结合结构域和所述第二抗原结合结构域结合不同的抗原，并且其中所述Fc-抗原结合

结构域构建体相对于具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体在抗体依赖性细胞毒性 (ADCC) 测定、抗体依赖性细胞吞噬作用 (ADCP) 和/或补体依赖性细胞毒性 (CDC) 测定中具有增强的效应子功能。

289. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;

d) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;以及

e) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽和/或所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述第一抗原结合结构域和所述第二抗原结合结构域结合不同的抗原,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体包含具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

290. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的间隔物;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;以及

d) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;以及

e) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽和/或所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述第一抗原结合结构域和所述第二抗原结合结构域结合不同的抗原。

291. 一种细胞培养基,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的群体,其中以摩尔为基础,至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;以及

d) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;以及

e) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽和/或所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述第一抗原结合结构域和所述第二抗原结合结构域结合不同的抗原。

292. 一种制造Fc-抗原结合结构域构建体的方法,所述方法包括:

a) 培养表达以下项的宿主细胞: (1) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

(2) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体; (3) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体; (4) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;以及 (5) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽和/或所述第三多肽连接;其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域;其中所述CCR4结合结构域与所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽连接,从而形成Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一抗原结合结构域和所述第二抗原结合结构域结合不同的抗原,并且其中以摩尔为基础,细胞培养上清液中至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的,并且

b) 从所述细胞培养上清液中纯化所述Fc-抗原结合结构域构建体。

293. 如权利要求288、289、290、291或292所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体之间的二聚化,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的二聚化,并且其中所述第二多肽和所述第三多肽具有不同的氨基酸序列。

294. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;

d) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;

e) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽连接;以及

f) 第三抗原结合结构域,其与所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述第一抗原结合结构域、所述第二抗原结合结构域和所述第三抗原结合结构域结合不同的抗原,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体相对于具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体在抗体依赖性细胞毒性 (ADCC) 测定、抗体依赖性细胞吞噬作用 (ADCP) 和/或补体依赖性细胞毒性 (CDC) 测定中具有增强的效应子功能。

295. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;

d) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;

e) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽连接;以及

f) 第三抗原结合结构域,其与所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述第一抗原结合结构域、所述第二抗原结合结构域和所述第三抗原结合结构域结合不同的抗原,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体包含具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

296. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的间隔物;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;

d) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;

e) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽连接;以及

f) 第三抗原结合结构域,其与所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述第一抗原结合结构域、所述第二抗原结合结构域和所述第三抗原结合结构域结合不同的抗原。

297. 一种细胞培养基,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的群体,其中以摩尔为基础,至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体;

c) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体;

d) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接;

e) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽连接;以及

f) 第三抗原结合结构域,其与所述第三多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中所述第一抗原结合结构域、所述第二抗原结合结构域和所述第三抗原结合结构域结合不同的抗原。

298. 一种制造Fc-抗原结合结构域构建体的方法,所述方法包括:

a) 培养表达以下项的宿主细胞: (1) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

(2) 第二多肽,其包含第三Fc结构域单体; (3) 第三多肽,其包含第四Fc结构域单体; (4) 第一抗原结合结构域,其与所述第一多肽连接; (5) 第二抗原结合结构域,其与所述第二多肽连接;以及 (6) 第三抗原结合结构域,其与所述第三多肽连接;其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域;其中所述CCR4结合结构域与所述第一多肽、所述第二多肽或所述第三多肽连接,从而形成Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一抗原结合结构域和所述第二抗原结合结构域结合不同的抗原,并且其中以摩尔为基础,细胞培养上清液中至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的,并且

b) 从所述细胞培养上清液中纯化所述Fc-抗原结合结构域构建体。

299. 如权利要求294、295、296、297或298所述的组合物,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体之间的二聚化,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的二聚化,并且其中所述第二多肽和所述第三多肽具有不同的氨基酸序列。

300. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体;以及

iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及

b) 第二多肽,其包含

iv) 第三Fc结构域单体,

v) 第四Fc结构域单体,以及

vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及

c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;

d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及

e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且

所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体相对于具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体在抗体依赖性细胞毒性 (ADCC) 测定、抗体依赖性细胞吞噬作用 (ADCP) 和/或补体依赖性细胞毒性 (CDC) 测定中具有增强的效应子功能。

301. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
- b) 第二多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体包含具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

302. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一间隔物;以及
- b) 第二多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二间隔物;以及
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

303. 一种细胞培养基,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的群体,其中以摩尔为基础,至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
- b) 第二多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

304. 一种制造Fc-抗原结合结构域构建体的方法,所述方法包括:

- a) 培养表达以下项的宿主细胞:(1) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
- (2) 第二种多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及
- (3) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- (4) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- (5) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,并且其中以摩尔为基础,细胞培养上清液中至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的,以及

- b) 从所述细胞培养上清液中纯化所述Fc-抗原结合结构域构建体。

305. 如权利要求300、301、302、303或304所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体之间的二聚化。

所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的二聚化;并且

所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体之间的二聚化。

306. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
- b) 第二多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体相对于具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体在抗体依赖性细胞毒性 (ADCC) 测定、抗体依赖性细胞吞噬作用 (ADCP) 和/或补体依赖性细胞毒性 (CDC) 测定中具有增强的效应子功能。

307. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
- b) 第二多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且

所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体包含具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

308. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一间隔物;以及
- b) 第二多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二间隔物;以及
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

309. 一种细胞培养基,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的群体,其中以摩尔为基础,至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

- a) 第一多肽,其包含
 - i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体;以及
 - iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
- b) 第二多肽,其包含
 - iv) 第三Fc结构域单体,
 - v) 第四Fc结构域单体,以及
 - vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- e) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

310. 一种制造Fc-抗原结合结构域构建体的方法,所述方法包括:

- a) 培养表达以下项的宿主细胞: (1) 第一多肽,其包含

- i) 第一Fc结构域单体;
- ii) 第二Fc结构域单体;以及
- iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
- (2) 第二种多肽,其包含
- iv) 第三Fc结构域单体,
- v) 第四Fc结构域单体,以及
- vi) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的第二接头;以及
- (3) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- (4) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;以及
- (5) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽或所述第四多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,并且其中以摩尔为基础,细胞培养上清液中至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的,以及

b) 从所述细胞培养上清液中纯化所述Fc-抗原结合结构域构建体。

311. 如权利要求306、307、308、309或310所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的二聚化。

所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的二聚化;并且

所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体之间的二聚化。

312. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

- i) 第一Fc结构域单体;
 - ii) 第二Fc结构域单体,
 - iii) 第三Fc结构域单体,
 - iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
 - v) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的第二接头;
- b) 第二多肽,其包含
- vii) 第四Fc结构域单体,
 - viii) 第五Fc结构域单体,
 - ix) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的第三接头;以及
 - x) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的第四接头;

c) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;
d) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;
e) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体;
f) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体;以及
g) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽、所述第四多肽、所述第五多肽或所述第六多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体组合以形成第四Fc结构域,并且所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体组合以形成第五Fc结构域,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体相对于具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体在抗体依赖性细胞毒性 (ADCC) 测定、抗体依赖性细胞吞噬作用 (ADCP) 和/或补体依赖性细胞毒性 (CDC) 测定中具有增强的效应子功能。

313. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含
i) 第一Fc结构域单体;
ii) 第二Fc结构域单体,
iii) 第三Fc结构域单体,
iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一接头;以及
v) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的第二接头;
b) 第二多肽,其包含
vi) 第四Fc结构域单体,
vii) 第五Fc结构域单体,
viii) 第六Fc结构域单体,
ix) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的第三接头;以及
x) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的第四接头;
c) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;
d) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;
e) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体;
f) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体;以及
g) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽、所述第四多肽、所述第五多肽或所述第六多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体组合以形成第四Fc结构域,并且所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体组合以形成第五Fc结构域,并且其中所述Fc-抗原结合结构域构建体包含具有单个Fc结构域和所述CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

314. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体,

iii) 第三Fc结构域单体,

iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一间隔物;以及

v) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的第二间隔物;

b) 第二多肽,其包含

vi) 第四Fc结构域单体,

vii) 第五Fc结构域单体,

viii) 第六Fc结构域单体,

ix) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的第三间隔物;以及

x) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的第四间隔物;

c) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;

d) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;

e) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体;

f) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体;以及

g) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽、所述第四多肽、所述第五多肽或所述第六多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体组合以形成第四Fc结构域,并且所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体组合以形成第五Fc结构域。

315. 一种细胞培养基,其包含Fc-抗原结合结构域构建体的群体,其中以摩尔为基础,至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体包含:

a) 第一多肽,其包含

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体,

iii) 第三Fc结构域单体,

iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一间隔物;以及

v) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的第二间隔物;

b) 第二多肽,其包含

vi) 第四Fc结构域单体,

vii) 第五Fc结构域单体,

viii) 第六Fc结构域单体,

ix) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的第三间隔物;以及

x) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的第四间隔物;

c) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;

d) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;
e) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体;
f) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体;以及
g) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽、所述第四多肽、所述第五多肽或所述第六多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体组合以形成第四Fc结构域,并且所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体组合以形成第五Fc结构域。

316. 一种制造Fc-抗原结合结构域构建体的方法,所述方法包括:

a) 培养表达以下项的宿主细胞: (1) 第一多肽,其包含
i) 第一Fc结构域单体;
ii) 第二Fc结构域单体,
iii) 第三Fc结构域单体,
iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的第一间隔物;以及
v) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的第二间隔物;
(2) 第二种多肽,其包含
vi) 第四Fc结构域单体,
vii) 第五Fc结构域单体,
viii) 第六Fc结构域单体,
ix) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的第三间隔物;以及
x) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的第四间隔物;
(3) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;
(4) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;
(5) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体;
(6) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体;以及
(7) 抗原结合结构域,其与所述第一多肽、所述第二多肽、所述第三多肽、所述第四多肽、所述第五多肽或所述第六多肽连接;

其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体组合以形成第四Fc结构域,并且所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体组合以形成第五Fc结构域,并且其中以摩尔为基础,细胞培养上清液中至少50%的所述Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的,以及

b) 从所述细胞培养上清液中纯化所述Fc-抗原结合结构域构建体。

317. 如权利要求312、313、314、315或316所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的

二聚化。

所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体之间的二聚化,

所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体之间的二聚化,

所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体之间的二聚化,并且

所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体中的每一者包含互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体之间的二聚化。

318. 一种治疗癌症的方法,其包括施用包含前述权利要求中任一项所述的构建体的组合物,其中所述癌症表达CCR4。

319. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含:

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体

iii) 第一CCR4重链结合结构域,以及

iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含:

i) 第三Fc结构域单体;

ii) 第四Fc结构域单体

iii) 第二CCR4重链结合结构域,以及

iv) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的接头;

c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;

d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;

e) 第五多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;以及

f) 第六多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;

其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第四Fc单体和第六Fc单体一起形成第三Fc结构域,第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

320. 如权利要求319所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同。

321. 如权利要求319所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同。

322. 如权利要求319所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第五多肽和所述第六多肽

在序列上相同。

323. 如权利要求319所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同,所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同,并且所述第五多肽和所述第六多肽在序列上相同。

324. 如权利要求319-323中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

325. 如权利要求319-323中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中与人IgG1的氨基酸序列相比,每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

326. 如权利要求319-323中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

327. 如权利要求324-326中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述单一氨基酸置换仅在所述CH3结构域中。

328. 如权利要求319-323中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第一Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体之间的同二聚化。

329. 如权利要求319-323中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的异二聚化,并且所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体之间的异二聚化。

330. 如权利要求328所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进同二聚化的所述置换选自表4A和表4B中的置换。

331. 如权利要求329所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进异二聚化的所述置换选自表3中的置换。

332. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含:

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体

iii) 第一CCR4重链结合结构域,以及

iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含:

i) 第三Fc结构域单体;

ii) 第四Fc结构域单体

iii) 第二CCR4重链结合结构域,以及

iv) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的接头;

c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体和第一CCR4轻链结合结构域;以及

d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体和第二CCR4轻链结合结构域;

其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第四Fc单体和第六Fc单体一起形成第三Fc结构域,第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

333. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含:

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体

iii) 第一CCR4重链结合结构域,以及

iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含:

i) 第三Fc结构域单体;

ii) 第四Fc结构域单体

iii) 第二CCR4重链结合结构域,以及

iv) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的接头;

c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;

d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;

e) 第五多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;以及

f) 第六多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;

其中第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第二Fc单体和第四Fc单体一起形成第三Fc结构域,第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

334. 如权利要求333所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同。

335. 如权利要求333所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同。

336. 如权利要求333所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第五多肽和所述第六多肽在序列上相同。

337. 如权利要求333所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同,所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同,并且所述第五多肽和所述第六多肽在序列上相同。

338. 如权利要求333-337中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

339. 如权利要求333-337中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中与人IgG1的氨基酸序列相比,每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

340. 如权利要求333-337中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单

一氨基酸置换的氨基酸序列。

341. 如权利要求333-337中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述单一氨基酸置换仅在所述CH3结构域中。

342. 如权利要求333-337中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的同二聚化。

343. 如权利要求333-337中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的异二聚化,并且所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第四Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体之间的异二聚化。

344. 如权利要求342所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进同二聚化的所述置换选自表4A和表4B中的置换。

345. 如权利要求343所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进异二聚化的所述置换选自表3中的置换。

346. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含:

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体,

iii) 第三Fc结构域单体,

iv) 第一CCR4重链结合结构域,

v) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头,以及

vi) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含:

i) 第四Fc结构域单体,

ii) 第五Fc结构域单体,

iii) 第六Fc结构域单体,

iv) 第二CCR4重链结合结构域,

v) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的接头,以及

vi) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的接头;

c) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;

d) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;

e) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体;

f) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体;

g) 第七多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;以及

h) 第八多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体一起形成第三Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结

构域单体一起形成第四Fc结构域,所述第六Fc单体和所述第十Fc单体一起形成第五Fc结构域,所述第一CCR4重链结合结构域和所述第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且所述第二CCR4重链结合结构域和所述第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

347.如权利要求346所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同。

348.如权利要求346所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同。

349.如权利要求346所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第五多肽和所述第六多肽在序列上相同。

350.如权利要求346所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第七多肽和所述第八多肽在序列上相同。

351.如权利要求346所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同,所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同,所述第五多肽和所述第六多肽在序列上相同,并且所述第七多肽和所述第八多肽在序列上相同。

352.如权利要求346-351中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

353.如权利要求346-351中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中与人IgG1的氨基酸序列相比,每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

354.如权利要求346-351中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

355.如权利要求346-351中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述单一氨基酸置换仅在所述CH3结构域中。

356.如权利要求346-351中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的同二聚化。

357.如权利要求346-351中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体之间的异二聚化,所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体之间的异二聚化,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体之间的异二聚化,并且所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体之间的异二聚化。

358.如权利要求357所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进同二聚化的所述置换选自表4A和表4B中的置换。

359.如权利要求358所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进异二聚化的所述置换选自

表3中的置换。

360. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含:

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体,

iii) 第三Fc结构域单体,

iv) 第一CCR4重链结合结构域,

v) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头,以及

vi) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含:

i) 第四Fc结构域单体,

ii) 第五Fc结构域单体,

iii) 第六Fc结构域单体,

iv) 第二CCR4重链结合结构域,

v) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的接头,以及

vi) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的接头;

c) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;

d) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;

e) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体和第一CCR4轻链结合结构域;以及

f) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体和第二CCR4轻链结合结构域其中所述第一Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,所述第四Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,所述第二Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体一起形成第三Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体一起形成第四Fc结构域,所述第六Fc单体和所述第十Fc单体一起形成第五Fc结构域,所述第一CCR4重链结合结构域和所述第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且所述第二CCR4重链结合结构域和所述第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

361. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含:

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体,

iii) 第三Fc结构域单体,

iv) 第一CCR4重链结合结构域,

v) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头,以及

vi) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含:

i) 第四Fc结构域单体,

ii) 第五Fc结构域单体,

iii) 第六Fc结构域单体,

iv) 第二CCR4重链结合结构域,

- v) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的接头,以及
- vi) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的接头;
- c) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;
- d) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;
- e) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体;
- f) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体;
- g) 第七多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;以及
- h) 第八多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,所述第二Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,所述第五Fc单体和所述第八Fc单体一起形成第三Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体一起形成第四Fc结构域,所述第六Fc单体和所述第十Fc单体一起形成第五Fc结构域,所述第一CCR4重链结合结构域和所述第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且所述第二CCR4重链结合结构域和所述第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

362. 如权利要求361所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同。

363. 如权利要求361所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同。

364. 如权利要求361所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第五多肽和所述第六多肽在序列上相同。

365. 如权利要求361所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第七多肽和所述第八多肽在序列上相同。

366. 如权利要求361所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同,所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同,所述第五多肽和所述第六多肽在序列上相同,并且所述第七多肽和所述第八多肽在序列上相同。

367. 如权利要求361-366中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

368. 如权利要求361-366中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中与人IgG1的氨基酸序列相比,每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

369. 如权利要求361-366中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

370. 如权利要求361-366中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述单一氨基酸置换仅在所述CH3结构域中。

371. 如权利要求361-366中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第一Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的同二聚化。

372. 如权利要求361-366中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第二Fc结构

域单体和所述第七Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第二Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体之间的异二聚化,所述第五Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第五Fc结构域单体和所述第八Fc结构域单体之间的异二聚化,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体之间的异二聚化,并且所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第六Fc结构域单体和所述第十Fc结构域单体之间的异二聚化。

373. 如权利要求371所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进同二聚化的所述置换选自表4A和表4B中的置换。

374. 如权利要求372所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进异二聚化的所述置换选自表3中的置换。

375. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含:

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体,

iii) 第三Fc结构域单体,

iv) 第一CCR4重链结合结构域,

v) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头,以及

vi) 连接所述第二Fc结构域单体和所述第三Fc结构域单体的接头;

b) 第二多肽,其包含:

i) 第四Fc结构域单体,

ii) 第五Fc结构域单体,

iii) 第六Fc结构域单体,

iv) 第二CCR4重链结合结构域,

v) 连接所述第四Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体的接头,以及

vi) 连接所述第五Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体的接头;

c) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;

d) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;

e) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体和第一CCR4轻链结合结构域;

f) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体和第二CCR4轻链结合结构域;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,所述第二Fc结构域单体和所述第七Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,所述第五Fc单体和所述第八Fc单体一起形成第三Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第九Fc结构域单体一起形成第四Fc结构域,所述第六Fc单体和所述第十Fc单体一起形成第五Fc结构域,所述第一CCR4重链结合结构域和所述第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且所述第二CCR4重链结合结构域和所述第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

376. 一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含:

- i) 第一Fc结构域单体;
- ii) 第二Fc结构域单体,
- iii) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头,以及
- b) 第二多肽,其包含:
 - i) 第三Fc结构域单体;
 - ii) 第四Fc结构域单体
 - iii) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的接头;
- c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体和第一CCR4重链结合结构域,以及
- d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体和第二CCR4重链结合结构域;
- e) 第五多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;以及
- f) 第六多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体一起形成第三Fc结构域,所述第一CCR4重链结合结构域和所述第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且所述第二CCR4重链结合结构域和所述第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

377. 如权利要求202所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同。

378. 如权利要求202所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同。

379. 如权利要求202所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第五多肽和所述第六多肽在序列上相同。

380. 如权利要求202所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同,所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同,并且所述第五多肽和所述第六多肽在序列上相同。

381. 如权利要求376-380中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

382. 如权利要求376-380中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中与人IgG1的氨基酸序列相比,每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

383. 如权利要求376-380中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

384. 如权利要求376-380中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述单一氨基酸置换仅在所述CH3结构域中。

385. 如权利要求376-380中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的同二聚化。

386. 如权利要求376-380中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一Fc结构

域单体和所述第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的异二聚化,并且所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体之间的异二聚化。

387.如权利要求385所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进同二聚化的所述置换选自表4A和表4B中的置换。

388.如权利要求386所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进异二聚化的所述置换选自表3中的置换。

389.一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

a) 第一多肽,其包含:

i) 第一Fc结构域单体;

ii) 第二Fc结构域单体,

iii) 第一CCR4重链结合结构域,以及

iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头,

b) 第二多肽,其包含:

i) 第三Fc结构域单体;

ii) 第四Fc结构域单体,

iii) 第二CCR4重链结合结构域,以及

iv) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的接头,

c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体和第三CCR4重链结合结构域;

d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体和第四CCR4轻链结合结构域;

e) 第五多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;

f) 第六多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;

g) 第七多肽,其包含第三CCR4轻链结合结构域;以及

h) 第八多肽,其包含第四CCR4轻链结合结构域;

其中所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,所述第二Fc单体和所述第四Fc单体一起形成第三Fc结构域,所述第一CCR4轻链结合结构域和所述第三CCR4重链结合结构域一起形成第一Fab,所述第二CCR4轻链结合结构域和所述第四CCR4重链结合结构域一起形成第二Fab,所述第三CCR4轻链结合结构域和所述第一CCR4重链结合结构域一起形成第三Fab;并且所述第四CCR4轻链结合结构域和所述第二CCR4重链结合结构域一起形成第二Fab

390.如权利要求389所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽在序列上相同。

391.如权利要求389所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同。

392.如权利要求389所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第五多肽、所述第六多肽、所述第七多肽和所述第八多肽在序列上相同。

393.如权利要求389所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一多肽和所述第二多肽

在序列上相同,所述第三多肽和所述第四多肽在序列上相同,并且所述第五多肽、所述第六多肽、所述第七多肽和所述第八多肽在序列上相同。

394. 如权利要求389-393中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

395. 如权利要求389-393中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中与人IgG1的氨基酸序列相比,每个所述Fc结构域单体的所述CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换。

396. 如权利要求389-393中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中每个所述Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

397. 如权利要求389-393中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述单一氨基酸置换仅在所述CH3结构域中。

398. 如权利要求389-393中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第二Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体之间的同二聚化。

399. 如权利要求389-393中任一项所述的Fc抗原结构域构建体,其中所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第一Fc结构域单体和所述第五Fc结构域单体之间的异二聚化,并且所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进所述第三Fc结构域单体和所述第六Fc结构域单体之间的异二聚化。

400. 如权利要求398所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进同二聚化的所述置换选自表4A和表4B中的置换。

401. 如权利要求399所述的Fc抗原结构域构建体,其中促进异二聚化的所述置换选自表3中的置换。

402. 如权利要求319-401中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中每个接头包含选自以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG、GGGS、GSG、SGG、SGS、SGSGS、SGSGSGS、SGSGSGSGS、
SGSGSGSGSGS、GSGGS、GSGGSGGS、GSGGSGGSGGS、GSG、GSG、GSGGGSG、GSGGGSGGGSGG
GSGGGSGGGSGGGGS、GENLYFQSGG、SACYCELS、RSIAT、RPACKIPNDLKQKVMNH、GGSAGGSGSGSSG
GSSGASGTGTAGGTGSGSGTSG、AAANSSIDLISVPVDSR、GSGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSGG
GS、GGGSGGGSGGGs、SGGGSGGGSGGGSGGGSGGG、GSGGGSGGGSGGGSGGS、GGGG、GGGGGGGG、
GGGGGGGGGGGG和GGGGGGGGGGGGGGGGGG。

403. 如权利要求319-401中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中至少一个所述Fc结构域单体在EU位置I253处包含置换。

404. 如权利要求403所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中EU位置I253处的每个氨基酸突变独立地选自以下项组成的组:I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y。

405. 如权利要求319-401中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中

至少一个所述Fc结构域单体在EU位置R292处包含置换。

406. 如权利要求45所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中EU位置R292处的每个氨基酸置换独立地选自由以下项组成的组:R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y。

405. 如权利要求319-401中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中至少一个所述Fc结构域单体包含选自由以下项组成的组的置换:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、F405A、Y407A、S354C、Y349T、T394F、K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R。

407. 如权利要求319-401中任一项所述的Fc-抗原结合结构域构建体,其中每个Fc结构域单体的所述铰链独立地包含选自由以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:EPKSCDKTHTCPPCPAPELL和DKTHTCPPCPAPELL。

与靶向CCR4的工程化Fc-抗原结合结构域构建体有关的组合 物和方法

背景技术

[0001] CC趋化因子受体4 (CCR4) 在调节性T细胞和Th2细胞上表达,并且被认为在恶性血液病和实体瘤(包括胃癌、乳腺癌、结肠癌和肺癌)中均发挥作用。**Poteligeo®** (莫加珠单抗) 是靶向CCR4的人源化抗体,用于治疗复发性或难治性成人T细胞白血病/淋巴瘤。

发明内容

[0002] 本公开的特征在于用于将CCR4结合结构域与至少两个Fc结构域组合以产生具有独特生物活性的新治疗剂的组合物和方法。

[0003] 在一些情况下,本公开设想将CCR4结合结构域与至少两个Fc结构域组合以产生新型治疗剂。在一些情况下,本公开设想将包含CCR4靶向的单个Fc结构域的治疗剂(例如,已知的治疗性CCR4抗体)的CCR4结合结构域与至少两个Fc结构域组合以产生具有比单个Fc结构域CCR4抗体更大的生物活性的新型治疗剂。为了产生此类构建体,本公开提供了用于组装具有至少两个(例如,多个)Fc结构域的构建体的各种方法,并且为了控制此类构建体的同二聚化和异二聚化,本公开提供了用于由有限数量的多肽组装不同大小的分子的各种方法。这些构建体的特性允许有效产生基本上同质的药物组合物。药物组合物中的此类同质性是期望的,以便确保药物组合物的安全性、功效、均匀性和可靠性。

[0004] 在第一方面,本公开的特征在于一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包括增强的效应子功能,其中该Fc-抗原结合结构域构建体包括CCR4结合结构域和通过接头与第二Fc结构域连接的第一Fc结构域,其中该Fc-抗原结合结构域构建体相对于具有单个Fc结构域和CCR4结合结构域的构建体在抗体依赖性细胞毒性(ADCC)测定、抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)和/或补体依赖性细胞毒性(CDC)测定中具有增强的效应子功能。

[0005] 在第二方面,本公开的特征在于一种组合物,其包括Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,该Fc-抗原结合结构域构建体包括CCR4结合结构域和通过接头与第二Fc结构域连接的第一Fc结构域。

[0006] 在第三方面,本公开的特征在于一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包括CCR4结合结构域和通过接头与第二Fc结构域连接的第一Fc结构域,其中该Fc-抗原结合结构域构建体包括具有单个Fc结构域和CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

[0007] 在第四方面,本公开的特征在于一种组合物,其包括Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,该Fc-抗原结合结构域构建体包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头;b) 第二多肽,其包括第三Fc结构域单体;c) 第三多肽,其包括第四Fc结构域单体;以及d) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽或第三多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域。

[0008] 在第四方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域与第一多肽和第二多肽或第三多

肽连接,或与第二多肽和第三多肽连接,或者CCR4结合结构域与第一多肽、第二多肽和第三多肽连接。

[0009] 在第五方面,本公开的特征在于一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包括增强的效应子功能,其中该Fc-抗原结合结构域构建体包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头;b) 第二多肽,其包括第三Fc结构域单体;c) 第三多肽,其包括第四Fc结构域单体;以及d) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽或第三多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中该Fc-抗原结合结构域构建体相对于具有单个Fc结构域和CCR4结合结构域的构建体在抗体依赖性细胞毒性(ADCC)测定、抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)和/或补体依赖性细胞毒性(CDC)测定中具有增强的效应子功能。

[0010] 在第五方面的一些实施方案中,单个Fc结构域构建体是抗体。

[0011] 在第六方面,本公开的特征在于一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头;b) 第二多肽,其包括第三Fc结构域单体;c) 第三多肽,其包括第四Fc结构域单体;以及d) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽或第三多肽连接;

[0012] 其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,并且其中该Fc-抗原结合结构域构建体包括具有单个Fc结构域和CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

[0013] 在第六方面的一些实施方案中,生物活性是Fc受体介导的效应子功能,诸如ADCC、ADCP和/或CDC活性(例如,ADCC和ADCP活性、ADCC和CDC活性、ADCP和CDC活性,或者ADCC、ADCP和CDC活性)。

[0014] 在第七方面,本公开的特征在于一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的间隔物;b) 第二多肽,其包括第三Fc结构域单体;c) 第三多肽,其包括第四Fc结构域单体;以及d) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽或第三多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域。

[0015] 在本公开的第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域与第一多肽和第二多肽或第三多肽连接,或与第二多肽和第三多肽连接,或者CCR4结合结构域与第一多肽、第二多肽和第三多肽连接。

[0016] 在本公开的第一方面、第二方面、第三方面和第四方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域是Fab或Fab的V_H。

[0017] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,结合结构域是第一多肽、第二多肽或第三多肽的氨基酸序列的一部分,并且在一些实施方案中,CCR4结合结构域是scFv。

[0018] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域包括V_H结构域和C_H1结构域,并且其中V_H和C_H1结构域是第一多肽、第二多肽或第三多肽的氨基酸序列的一部分。在一些实施方案中,CCR4结合结构域还包括V_L结构域,其中在

一些实施方案中, Fc-抗原结合结构域构建体包括第四多肽, 该第四多肽包括 V_L 结构域。在一些实施方案中, V_H 结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列, V_H 结构域包括包含表2中列出的抗体的序列的 V_H 结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3, V_H 结构域包括表2中列出的抗体的 V_H 序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3, 并且该 V_H 序列不包括CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的 V_H 序列具有至少95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性, 或者 V_H 结构域包括表2中列出的抗体的 V_H 序列。

[0019] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中, CCR4结合结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列, CCR4结合结构域包括来自表2中列出的抗体的一组 V_H 和 V_L 序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列, CCR4结合结构域包括包含表2中列出的抗体的 V_H 序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的 V_H 结构域以及包含表2中列出的抗体的 V_L 序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3的 V_L 结构域, 其中 V_H 和 V_L 结构域序列不包括CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的 V_H 和 V_L 序列具有至少有95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性, 或者CCR4结合结构域包括表2中列出的抗体的一组 V_H 和 V_L 序列。

[0020] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中, Fc-抗原结合结构域构建体还包括IgG C_L 抗体恒定结构域和IgG C_H1 抗体恒定结构域, 其中IgG C_H1 抗体恒定结构域通过接头附接到第一多肽或第二多肽的N末端。

[0021] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中, 第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体包括互补的二聚化选择性模块, 所述互补的二聚化选择性模块促进第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体之间的二聚化。

[0022] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中, 第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体包括互补的二聚化选择性模块, 所述互补的二聚化选择性模块促进第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体之间的二聚化。

[0023] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中, 二聚化选择性模块包括进入一个Fc结构域单体的 C_H3 结构域中的工程化空腔和进入另一个Fc结构域单体的 C_H3 结构域中的工程化突起, 其中工程化空腔和工程化突起被定位成形成Fc结构域单体的突起-进入-空腔对。在一些实施方案中, 工程化突起包括选自S354C、T366W、T366Y、T394W、T394F和F405W的至少一种修饰, 并且工程化空腔包括选自Y349C、T366S、L368A、Y407V、Y407T、Y407A、F405A和T394S的至少一种修饰。在一些实施方案中, 一个Fc结构域单体包括Y407V和Y349C, 而另一个Fc结构域单体包括T366W和S354C。

[0024] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中, 二聚化选择性模块包括进入一个结构域单体的 C_H3 结构域中的带负电的氨基酸和进入另一个Fc结构域单体的 C_H3 结构域中的带正电的氨基酸, 其中带负电的氨基酸和带正电的氨基酸被定位成促进Fc结构域的形成。在一些实施方案中, 第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括D399K和K409D或K409E, 第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括K392D和D399K, 第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括E357K和K370E, 第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括D356K和K439D, 第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括K392E和D399K, 第一Fc结构域单体和第三Fc结

构域单体中的每一者包括E357K和K370D,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括D356K和K439E,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括S354C和T366W,并且第三多肽和第四多肽各自包括Y349C、T366S、L368A和Y407V,第三多肽和第四多肽中的每一者包括S354C和T366W,并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体各自包括Y349C、T366S、L368A和Y407V,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括E357K或E357R,并且第三多肽和第四多肽各自包括K370D或K370E,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括K370D或K370E,并且第三多肽和第四多肽各自包括E357K或357R,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括K409D或K409E,第三多肽和第四多肽各自包括D399K或D399R,或者第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者结构域单体包括D399K或D399R,并且第三多肽和第四多肽各自包括K409D或K409E。

[0025] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,第二多肽和第三多肽具有相同的氨基酸序列。

[0026] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中, Fc-抗原结合结构域构建体中的一个或多个接头是键。

[0027] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中，Fc-抗原结合结构域构建体中的一个或多个接头是间隔物。在一些实施方案中，间隔物包括具有以下序列的多肽：GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG、GGGGS、GGSG、SGGG、GSGS、GSGSGS、GSGSGSGS、GSGSGSGSGS、GSGSGSGSGSGS、GGSGGS、GGSGGS、GGSGSGSGS、GGSGSGSGSGS、GGSG、GGSG、GGSGGGSG、GGSGGGSGGGSGGGSGGGSGGGSGGGSGGGGS、GENLYFQSGG、SACYCELS、RSIAT、RPACKIPNDLKQKVMNH、GG SAGGSGSGSSGGSSGASGTGTAGGTGSGSGTGSG、AAANSSIDLISVPVDSR、GGSGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSGGGG、GGGSGGGSGGGG、SGGGSGGGSGGGSGGGSGGG、GGSGGGSGGGSGGGSGGG、GGGG、GGGGGGGG、GGGGGGGGGGGG或GGGGGGGGGGGGGGGGGG。在一些实施方案中，间隔物是甘氨酸间隔物，例如由4至30、8至30或12至30个甘氨酸残基组成的间隔物，诸如由20个甘氨酸残基组成的间隔物。

[0028] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域通过接头与Fc结构域单体连接。在一些实施方案中,接头是间隔物。

[0029] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,至少一个Fc结构域在位置I253处包括至少一个氨基酸修饰。在一些实施方案中,位置I253处的每种氨基酸修饰独立地选自I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y。在一些实施方案中,位置I253处的每种氨基酸修饰是I253A。

[0030] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,至少一个Fc结构域在位置R292处包括至少一个氨基酸修饰。在一些实施方案中,位置R292处的每种氨基酸修饰独立地选自R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y。在一些实施方案中,位置R292处的每种氨基酸修饰是R292P。

[0031] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,一个或多个Fc结构域单体包括IgG铰链结构域、IgG C_H2抗体恒定结构域和IgG C_H3抗体恒定结构域。在一些实施方案中,每个Fc结构域单体包括IgG铰链结构域、IgG C_H2抗体恒定结构域和IgG C_H3抗体恒定结构域。在一些实施方案中,IgG是选自由以下项组成的组的亚型:IgG1、

IgG2a、IgG2b、IgG3和IgG4。

[0032] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,第四多肽、第五多肽、第六多肽和第七多肽中的每一者中的N末端Asp突变为Gln。

[0033] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,第四多肽、第五多肽、第六多肽和第七多肽中的一者或多者缺乏C末端赖氨酸。在一些实施方案中,第四多肽、第五多肽、第六多肽和第七多肽中的每一者缺乏C末端赖氨酸。

[0034] 在本公开的第四方面、第五方面、第六方面和第七方面的一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体还包括通过接头与一个或多个多肽的N末端或C末端连接的白蛋白结合肽。

[0035] 在第八方面,本公开的特征在于一种细胞培养基,其包括Fc-抗原结合结构域构建体的群体,其中以摩尔为基础,至少50%的Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的,并且其中Fc-抗原结合结构域构建体以至少0.1mg/L、10mg/L、25mg/L、50mg/L、75mg/L或100mg/L的浓度存在于培养基中。

[0036] 在本公开的第八方面的一些实施方案中,以摩尔为基础,至少75%、至少85%或至少95%的Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的。

[0037] 在第九方面,本公开的特征在于一种细胞培养基,其包括Fc-抗原结合结构域构建体的群体,其中以摩尔为基础,至少50%的Fc-抗原结合结构域构建体包括:a)第一多肽,其包括i)第一Fc结构域单体,ii)第二Fc结构域单体,以及iii)连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头;b)第二多肽,其包括第三Fc结构域单体;c)第三多肽,其包括第四Fc结构域单体;以及d)CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽或第三多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域。

[0038] 在本公开的第九方面的一些实施方案中,以摩尔为基础,至少75%、至少85%或至少95%的Fc-抗原结合结构域构建体包括第一Fc结构域、第二Fc结构域和CCR4结合结构域。

[0039] 在第十方面,本公开的特征在于一种制造Fc-抗原结合结构域构建体的方法,该方法包括:a)培养表达以下项的宿主细胞:(1)第一多肽,其包括i)第一Fc结构域单体,ii)第二Fc结构域单体,以及iii)连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头;(2)第二多肽,其包括第三Fc结构域单体;(3)第三多肽,其包括第四Fc结构域单体;以及(4)CCR4结合结构域;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域;其中CCR4结合结构域与第一多肽、第二多肽或第三多肽连接,从而形成Fc-抗原结合结构域构建体;并且其中以摩尔为基础,细胞培养上清液中至少50%的Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的,以及b)从细胞培养上清液中纯化Fc-抗原结合结构域构建体。

[0040] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域与第一多肽和第二多肽或第三多肽连接,或与第二多肽和第三多肽连接,或者CCR4结合结构域与第一多肽、第二多肽和第三多肽连接。

[0041] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域是Fab或V_H。

[0042] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域是第一多肽、第二多肽或第三多肽的氨基酸序列的一部分,并且在一些实施方案中,CCR4结合结构域

是scFv。

[0043] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域包括 V_H 结构域和 C_H1 结构域,并且其中 V_H 和 C_H1 结构域是第一多肽、第二多肽或第三多肽的氨基酸序列的一部分。在一些实施方案中,CCR4结合结构域还包括 V_L 结构域,其中在一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体包括第四多肽,该第四多肽包括 V_L 结构域。在一些实施方案中, V_H 结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列, V_H 结构域包括包含表2中列出的抗体的序列的 V_H 结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3, V_H 结构域包括表2中列出的抗体的 V_H 序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且该 V_H 序列不包括CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的 V_H 序列具有至少95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性,或者 V_H 结构域包括表2中列出的抗体的 V_H 序列。

[0044] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列,CCR4结合结构域包括来自表2中列出的抗体的一组 V_H 和 V_L 序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列,CCR4结合结构域包括包含表2中列出的抗体的 V_H 序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的 V_H 结构域以及包含表2中列出的抗体的 V_L 序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3的 V_L 结构域,其中 V_H 和 V_L 结构域序列不包括CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的 V_H 和 V_L 序列具有至少有95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性,或者CCR4结合结构域包括表2中列出的抗体的一组 V_H 和 V_L 序列。

[0045] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体还包括IgG C_L 抗体恒定结构域和IgG C_H1 抗体恒定结构域,其中IgG C_H1 抗体恒定结构域通过接头附接到第一多肽或第二多肽的N末端。

[0046] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体之间的二聚化。

[0047] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体之间的二聚化。

[0048] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,二聚化选择性模块包括进入一个Fc结构域单体的 C_H3 结构域中的工程化空腔和进入另一个Fc结构域单体的 C_H3 结构域中的工程化突起,其中工程化空腔和工程化突起被定位成形成Fc结构域单体的突起-进入-空腔对。在一些实施方案中,工程化突起包括选自S354C、T366W、T366Y、T394W、T394F和F405W的至少一种修饰,并且工程化空腔包括选自Y349C、T366S、L368A、Y407V、Y407T、Y407A、F405A和T394S的至少一种修饰。在一些实施方案中,一个Fc结构域单体包括Y407V和Y349C,而另一个Fc结构域单体包括T366W和S354C。

[0049] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,二聚化选择性模块包括进入一个结构域单体的 C_H3 结构域中的带负电的氨基酸和进入另一个Fc结构域单体的 C_H3 结构域中的带正电的氨基酸,其中带负电的氨基酸和带正电的氨基酸被定位成促进Fc结构域的形成。在一些实施方案中,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括D399K和K409D或K409E,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括K392D和D399K,第

一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括E357K和K370E,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括D356K和K439D,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括K392E和D399K,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括E357K和K370D,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括D356K和K439E,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括S354C和T366W,并且第三多肽和第四多肽各自包括Y349C、T366S、L368A和Y407V,第三多肽和第四多肽中的每一者包括S354C和T366W,并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体各自包括Y349C、T366S、L368A和Y407V,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括E357K或E357R,并且第三多肽和第四多肽各自包括K370D或K370E,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括K370D或K370E,并且第三多肽和第四多肽各自包括E357K或357R,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括K409D或K409E,第三多肽和第四多肽各自包括D399K或D399R,或者第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者结构域单体包括D399K或D399R,并且第三多肽和第四多肽各自包括K409D或K409E。

[0050] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,第二多肽和第三多肽具有相同的氨基酸序列。

[0051] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体中的一个或多个接头是键。

[0052] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中，Fc-抗原结合结构域构建体中的一个或多个接头是间隔物。在一些实施方案中，间隔物包括具有以下序列的多肽：GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG、GGGGS、GGSG、SGGG、GSGS、GSGSGS、GSGSGSGS、GSGSGSGSGS、GSGSGSGSGSGS、GGSGGS、GGSGGSGGS、GGSGGSGGSGGS、GGSG、GGSG、GGSGGGSG、GGSGGGSGGGSGGG、GGSGGGSGGGSGGGGS、GENLYFQSGG、SACYCELS、RSIAT、RPACKIPNDLKQKVMNH、GGSAGGSGSGSSGSSGASGTGTAGGTGSGSGTGSG、AAANSSIDLISVPVDSR、GGSGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSGGGS、GGGSGGGSGGGS、SGGGSGGGSGGGSGGGSGGG、GGSGGGSGGGSGGGSGGGS、GGGG、GGGGGGGG、GGGGGGGGGG或GGGGGGGGGGGGGGGG。在一些实施方案中，间隔物是甘氨酸间隔物，例如由4至30、8至30或12至30个甘氨酸残基组成的间隔物，诸如由20个甘氨酸残基组成的间隔物。

[0053] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域通过接头与Fc结构域单体连接。在一些实施方案中,接头是间隔物。

[0054] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,至少一个Fc结构域在位置I253处包括至少一个氨基酸修饰。在一些实施方案中,位置I253处的每种氨基酸修饰独立地选自I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y。在一些实施方案中,位置I253处的每种氨基酸修饰是I253A。

[0055] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,至少一个Fc结构域在位置R292处包括至少一个氨基酸修饰。在一些实施方案中,位置R292处的每种氨基酸修饰独立地选自R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y。在一些实施方案中,位置R292处的每种氨基酸修饰是R292P。

[0056] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中,一个或多个Fc结构域单体包括IgG铰链结构域、IgG C_H2抗体恒定结构域和IgG C_H3抗体恒定结构域。在一些实施方案中,

每个Fc结构域单体包括IgG铰链结构域、IgG C_H2抗体恒定结构域和IgG C_H3抗体恒定结构域。在一些实施方案中，IgG是选自由以下项组成的组的亚型：IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3和IgG4。

[0057] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中，第一多肽、第二多肽、第三多肽和第四多肽中的每一者中的N末端Asp突变为Gln。

[0058] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中，第一多肽、第二多肽、第三多肽和第四多肽中的一者或多者缺乏C末端赖氨酸。在一些实施方案中，第一多肽、第二多肽、第三多肽和第四多肽中的每一者缺乏C末端赖氨酸。

[0059] 在本公开的第九方面和第十方面的一些实施方案中，Fc-抗原结合结构域构建体还包括通过接头与一个或多个多肽的N末端或C末端连接的白蛋白结合肽。

[0060] 在本公开的第十一方面的一些实施方案中，第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体包括互补的二聚化选择性模块，所述互补的二聚化选择性模块促进第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体之间的二聚化，其中第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体包括互补的二聚化选择性模块，所述互补的二聚化选择性模块促进第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体之间的二聚化，并且其中第二多肽和第三多肽具有不同的氨基酸序列。

[0061] 在本公开的第十一方面的一些实施方案中，第一CCR4结合结构域与第一多肽连接，并且第二CCR4结合结构域与第二多肽和第三多肽连接。

[0062] 在本公开的第十一方面的一些实施方案中，第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括E357K和K370D，并且第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括K370D和E357K。

[0063] 在本公开的第十二方面的一些实施方案中，第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体包括互补的二聚化选择性模块，所述互补的二聚化选择性模块促进第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体之间的二聚化，其中第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体包括互补的二聚化选择性模块，所述互补的二聚化选择性模块促进第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体之间的二聚化，并且其中第二多肽和第三多肽具有不同的氨基酸序列。

[0064] 在本公开的第十二方面的一些实施方案中，第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括D399K和K409D，并且第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括E357K和K370D。

[0065] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中，第一CCR4结合结构域是Fab或V_H结构域。在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中，第一CCR4结合结构域和第二CCR4结合结构域是Fab。在本公开的第九方面的一些实施方案中，第一CCR4结合结构域、第二CCR4结合结构域和第三CCR4结合结构域是Fab或V_H结构域。

[0066] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中，第一CCR4结合结构域或第二CCR4结合结构域是scFv。在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中，第一CCR4结合结构域和第二CCR4结合结构域是scFv。在本公开的第九方面的一些实施方案中，第一CCR4结合结构域、第二CCR4结合结构域和第三CCR4结合结构域是scFv。

[0067] 在本公开的第十一方面的一些实施方案中，第一CCR4结构域或第二CCR4结构域包括V_H结构域和C_H1结构域，并且其中V_H和C_H1结构域是第一多肽、第二多肽或第三多肽的氨基酸序列的一部分。在一些实施方案中，CCR4结合结构域还包括V_L结构域，其中在一些实施方

案中, Fc-抗原结合结构域构建体包括第四多肽, 该第四多肽包括V_L结构域。在一些实施方案中, V_H结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列, V_H结构域包括包含表2中列出的抗体的序列的VH结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3, V_H结构域包括表2中列出的抗体的V_H序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3, 并且该V_H序列不包括CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的V_H序列具有至少95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性, 或者V_H结构域包括表2中列出的抗体的V_H序列。

[0068] 在本公开的第十二方面的一些实施方案中, 第一CCR4结合结构域、第二CCR4结合结构域或第三CCR4结合结构域包括V_H结构域和C_H1结构域, 并且其中V_H和C_H1结构域是第一多肽、第二多肽或第三多肽的氨基酸序列的一部分。在一些实施方案中, CCR4结合结构域还包括V_L结构域, 其中在一些实施方案中, Fc-抗原结合结构域构建体包括第四多肽, 该第四多肽包括V_L结构域。在一些实施方案中, V_H结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列, V_H结构域包括包含表2中列出的抗体的序列的VH结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3, V_H结构域包括表2中列出的抗体的V_H序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3, 并且该V_H序列不包括CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的V_H序列具有至少95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性, 或者V_H结构域包括表2中列出的抗体的V_H序列。

[0069] 在本公开的第十一方面的一些实施方案中, 第一CCR4结合结构域或第二CCR4结合结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列, CCR4结合结构域包括来自表2中列出的抗体的一组V_H和V_L序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列, CCR4结合结构域包括包含表2中列出的抗体的V_H序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的V_H结构域以及包含表2中列出的抗体的V_L序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3的V_L结构域, 其中V_H和V_L结构域序列不包括CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的V_H和V_L序列具有至少有95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性, 或者CCR4结合结构域包括表2中列出的抗体的一组V_H和V_L序列。

[0070] 在本公开的第十二方面的一些实施方案中, 第一CCR4结合结构域、第二CCR4结合结构域或第三CCR4结合结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列, CCR4结合结构域包括来自表2中列出的抗体的一组V_H和V_L序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列, CCR4结合结构域包括包含表2中列出的抗体的V_H序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的V_H结构域以及包含表2中列出的抗体的V_L序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3的V_L结构域, 其中V_H和V_L结构域序列不包括CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的V_H和V_L序列具有至少有95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性, 或者CCR4结合结构域包括表2中列出的抗体的一组V_H和V_L序列。

[0071] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中, Fc-抗原结合结构域构建体还包括IgG C_L抗体恒定结构域和IgG C_H1抗体恒定结构域, 其中IgG C_H1抗体恒定结构域通过接头附接到第一多肽或第二多肽的N末端。

[0072] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中, 第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体包括互补的二聚化选择性模块, 所述互补的二聚化选择性模块促进第一Fc

至30、8至30或12至30个甘氨酸残基组成的间隔物,诸如由20个甘氨酸残基组成的间隔物。

[0078] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中,一个或多个CCR4结合结构域通过接头与Fc结构域单体连接。在一些实施方案中,接头是间隔物。

[0079] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中,至少一个Fc结构域在位置I253处包括至少一个氨基酸修饰。在一些实施方案中,位置I253处的每种氨基酸修饰独立地选自I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y。在一些实施方案中,位置I253处的每种氨基酸修饰是I253A。

[0080] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中,至少一个Fc结构域在位置R292处包括至少一个氨基酸修饰。在一些实施方案中,位置R292处的每种氨基酸修饰独立地选自R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y。在一些实施方案中,位置R292处的每种氨基酸修饰是R292P。

[0081] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中,一个或多个Fc结构域单体包括IgG铰链结构域、IgG C_H2抗体恒定结构域和IgG C_H3抗体恒定结构域。在一些实施方案中,每个Fc结构域单体包括IgG铰链结构域、IgG C_H2抗体恒定结构域和IgG C_H3抗体恒定结构域。在一些实施方案中,IgG是选自由以下项组成的组的亚型:IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3和IgG4。

[0082] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中,第一多肽、第二多肽、第三多肽和第四多肽中的每一者中的N末端Asp突变为Gln。

[0083] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中,第一多肽、第二多肽、第三多肽和第四多肽中的一者或多者缺乏C末端赖氨酸。在一些实施方案中,第一多肽、第二多肽、第三多肽和第四多肽中的每一者缺乏C末端赖氨酸。

[0084] 在本公开的第十一方面和第十二方面的一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体还包括通过接头与一个或多个多肽的N末端或C末端连接的白蛋白结合肽。

[0085] 在第十三方面,本公开的特征在于一种组合物,其包括Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,该Fc-抗原结合结构域构建体包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的第一接头;以及b) 第二多肽,其包括i) 第三Fc结构域单体,ii) 第四Fc结构域单体,以及iv) 连接第三Fc结构域单体和第四Fc结构域单体的第二接头;以及c) 第三多肽,其包括第五Fc结构域单体;d) 第四多肽,其包括第六Fc结构域单体;以及d) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽、第三多肽或第四多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

[0086] 在本公开的第十三方面的一些实施方案中,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体之间的二聚化,第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体之间的二聚化,并且第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第四Fc结构域单体

和第六Fc结构域单体之间的二聚化。

[0087] 在第十四方面,本公开的特征在于一种组合物,其包括Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,该Fc-抗原结合结构域构建体包括:a)第一多肽,其包括i)第一Fc结构域单体,ii)第二Fc结构域单体,以及iii)连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的第一接头;以及b)第二多肽,其包括i)第三Fc结构域单体,ii)第四Fc结构域单体,以及iv)连接第三Fc结构域单体和第四Fc结构域单体的第二接头;以及c)第三多肽,其包括第五Fc结构域单体;d)第四多肽,其包括第六Fc结构域单体;以及e)CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽、第三多肽或第四多肽连接;其中第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

[0088] 在本公开的第十四方面的一些实施方案中,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体之间的二聚化,第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体之间的二聚化,并且第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体之间的二聚化。

[0089] 在第十五方面,本公开的特征在于一种组合物,其包括Fc-抗原结合结构域构建体的基本上同质的群体,该Fc-抗原结合结构域构建体包括:a)第一多肽,其包括i)第一Fc结构域单体,ii)第二Fc结构域单体,iii)第三Fc结构域单体,iv)连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的第一接头;以及v)连接第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的第二接头;b)第二多肽,其包括i)第四Fc结构域单体,ii)第五Fc结构域单体,iii)第六Fc结构域单体,iv)连接第四Fc结构域单体和第五Fc结构域单体的第三接头;以及v)连接第五Fc结构域单体和第六Fc结构域单体的第四接头;c)第三多肽,其包括第七Fc结构域单体;d)第四多肽,其包括第八Fc结构域单体;e)第五多肽,其包括第九Fc结构域单体;f)第六多肽,其包括第十Fc结构域单体;以及g)CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽、第三多肽、第四多肽、第五多肽或第六多肽连接;其中第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第一Fc结构域单体和第七Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,第四Fc结构域单体和第八Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体组合以形成第四Fc结构域,并且第六Fc结构域单体和第十Fc结构域单体组合以形成第五Fc结构域。

[0090] 在本公开的第十五方面的一些实施方案中,第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体之间的二聚化,第一Fc结构域单体和第七Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第一Fc结构域单体和第七Fc结构域单体之间的二聚化,第四Fc结构域单体和第八Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第四Fc结构域单体和第八Fc结构域单体之间的二聚化,第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第三Fc结构域单体和第九Fc结

构域单体之间的二聚化,并且第六Fc结构域单体和第十Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第六Fc结构域单体和第十Fc结构域单体之间的二聚化。

[0091] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域是Fab或V_H结构域。

[0092] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域是一种或多种多肽的氨基酸序列的一部分,并且在一些实施方案中,CCR4结合结构域是scFv。

[0093] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域包括V_H结构域和C_H1结构域,并且其中V_H和C_H1结构域是第一多肽、第二多肽或第三多肽的氨基酸序列的一部分。在一些实施方案中,CCR4结合结构域还包括V_L结构域,其中在一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体包括第四多肽,该第四多肽包括V_L结构域。在一些实施方案中,V_H结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列,V_H结构域包括包含表2中列出的抗体的序列的V_H结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,V_H结构域包括表2中列出的抗体的V_H序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且该V_H序列不包括CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的V_H序列具有至少95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性,或者V_H结构域包括表2中列出的抗体的V_H序列。

[0094] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域包括表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列,CCR4结合结构域包括来自表2中列出的抗体的一组V_H和V_L序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列,CCR4结合结构域包括包含表2中列出的抗体的V_H序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的V_H结构域以及包含表2中列出的抗体的V_L序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3的V_L结构域,其中V_H和V_L结构域序列不包括CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的V_H和V_L序列具有至少有95%的同一性、至少97%的同一性、至少99%的同一性或至少99.5%的同一性,或者CCR4结合结构域包括表2中列出的抗体的一组V_H和V_L序列。

[0095] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体还包括IgG C_L抗体恒定结构域和IgG C_H1抗体恒定结构域,其中IgG C_H1抗体恒定结构域通过接头附接到第一多肽或第二多肽的N末端。

[0096] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,二聚化选择性模块包括进入一个Fc结构域单体的C_H3结构域中的工程化空腔和进入另一个Fc结构域单体的C_H3结构域中的工程化突起,其中工程化空腔和工程化突起被定位成形成Fc结构域单体的突起-进入-空腔对。在一些实施方案中,工程化突起包括选自S354C、T366W、T366Y、T394W、T394F和F405W的至少一种修饰,并且工程化空腔包括选自Y349C、T366S、L368A、Y407V、Y407T、Y407A、F405A和T394S的至少一种修饰。在一些实施方案中,一个Fc结构域单体包括Y407V和Y349C,而另一个Fc结构域单体包括T366W和S354C。

[0097] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,二聚化选择性模块包括进入一个结构域单体的C_H3结构域中的带负电的氨基酸和进入另一个Fc结构域单体的C_H3结构域中的带正电的氨基酸,其中带负电的氨基酸和带正电的氨基酸被定位

成促进Fc结构域的形成。在一些实施方案中，第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括D399K和K409D或K409E，第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括K392D和D399K，第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括E357K和K370E，第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括D356K和K439D，第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括K392E和D399K，第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括E357K和K370D，第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括D356K和K439E，第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括S354C和T366W，并且第三多肽和第四多肽各自包括Y349C、T366S、L368A和Y407V，第三多肽和第四多肽中的每一者包括S354C和T366W，并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体各自包括Y349C、T366S、L368A和Y407V，第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括E357K或E357R，并且第三多肽和第四多肽各自包括K370D或K370E，第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括K370D或K370E，并且第三多肽和第四多肽各自包括E357K或E357R，第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者包括K409D或K409E，第三多肽和第四多肽各自包括D399K或D399R，或者第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体中的每一者结构域单体包括D399K或D399R，并且第三多肽和第四多肽各自包括K409D或K409E。

[0098] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体中的一个或多个接头是键。

[illegible]

[0100] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,CCR4结合结构域通过接头与Fc结构域单体连接。在一些实施方案中,接头是间隔物。

[1010] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,至少一个Fc结构域在位置I253处包括至少一个氨基酸修饰。在一些实施方案中,位置I253处的每种氨基酸修饰独立地选自I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y。在一些实施方案中,位置I253处的每种氨基酸修饰是I253A。

[0102] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,至少一个Fc结构域在位置R292处包括至少一个氨基酸修饰。在一些实施方案中,位置R292处的每种氨基酸修饰独立地选自R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y。在一些实施方案中,位置R292处的每种氨基酸修饰是R292P。

[0103] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,一个或多

个Fc结构域单体包括IgG铰链结构域、IgG C_H2抗体恒定结构域和IgG C_H3抗体恒定结构域。在一些实施方案中,每个Fc结构域单体包括IgG铰链结构域、IgG C_H2抗体恒定结构域和IgG C_H3抗体恒定结构域。在一些实施方案中,IgG是选自由以下项组成的组的亚型:IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3和IgG4。

[0104] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,多肽中的每一者中的N末端Asp突变为Gln。

[0105] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,多肽中的一者或者多者缺乏C末端赖氨酸。在一些实施方案中,多肽中的每一者缺乏C末端赖氨酸。

[0106] 在本公开的第十三方面、第十四方面和第十五方面的一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体还包括通过接头与一个或多个多肽的N末端或C末端连接的白蛋白结合肽。

[0107] 在第十六方面,本公开的特征在于一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头;b) 第二多肽,其包括第三Fc结构域单体;c) 第三多肽,其包括第四Fc结构域单体;以及d) 第一CCR4结合结构域,其与第一多肽连接;以及e) 第二CCR4结合结构域,其与第二多肽和/或第三多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,其中第一CCR4结合结构域和第二CCR4结合结构域结合不同的抗原,并且其中该Fc-抗原结合结构域构建体相对于具有单个Fc结构域和CCR4结合结构域的构建体在抗体依赖性细胞毒性(ADCC)测定、抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)和/或补体依赖性细胞毒性(CDC)测定中具有增强的效应子功能。

[0108] 在第二十六方面,本公开的特征在于一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的第一接头;以及b) 第二多肽,其包括iv) 第三Fc结构域单体,v) 第四Fc结构域单体,以及vi) 连接第三Fc结构域单体和第四Fc结构域单体的第二接头;以及c) 第三多肽,其包括第五Fc结构域单体;d) 第四多肽,其包括第六Fc结构域单体;以及d) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽、第三多肽或第四多肽连接,其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,并且其中该Fc-抗原结合结构域构建体相对于具有单个Fc结构域和CCR4结合结构域的构建体在抗体依赖性细胞毒性(ADCC)测定、抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)和/或补体依赖性细胞毒性(CDC)测定中具有增强的效应子功能。

[0109] 在第二十七方面,本公开的特征在于一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的第一接头;以及b) 第二多肽,其包括iv) 第三Fc结构域单体,v) 第四Fc结构域单体,以及vi) 连接第三Fc结构域单体和第四Fc结构域单体的第二接头;以及c) 第三多肽,其包括第五Fc结构域单体;d) 第四多肽,其包括第六Fc结构域单体;以及e) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽、第三多肽或第四多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体组合以形成第三

Fc结构域,并且其中该Fc-抗原结合结构域构建体包括具有单个Fc结构域和CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

[0110] 在第二十八方面,本公开的特征在于一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的第一间隔物;以及b) 第二多肽,其包括iv) 第三Fc结构域单体,v) 第四Fc结构域单体,以及vi) 连接第三Fc结构域单体和第四Fc结构域单体的第二间隔物;以及c) 第三多肽,其包括第五Fc结构域单体;d) 第四多肽,其包括第六Fc结构域单体;以及e) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽、第三多肽或第四多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

[0111] 在第二十九方面,本公开的特征在于一种细胞培养基,其包括Fc-抗原结合结构域构建体的群体,其中以摩尔为基础,至少50%的Fc-抗原结合结构域构建体包括:a) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的第一接头;以及b) 第二多肽,其包括iv) 第三Fc结构域单体,v) 第四Fc结构域单体,以及vi) 连接第三Fc结构域单体和第四Fc结构域单体的第二接头;以及c) 第三多肽,其包括第五Fc结构域单体;d) 第四多肽,其包括第六Fc结构域单体;以及e) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽、第三多肽或第四多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域。

[0112] 在第三十方面,本公开的特征在于一种制造Fc-抗原结合结构域构建体的方法,该方法包括:a) 培养表达以下项的宿主细胞:(1) 第一多肽,其包括i) 第一Fc结构域单体,ii) 第二Fc结构域单体,以及iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的第一接头;以及(2) 第二多肽,其包括iv) 第三Fc结构域单体,v) 第四Fc结构域单体,以及vi) 连接第三Fc结构域单体和第四Fc结构域单体的第二接头;以及(3) 第三多肽,其包括第五Fc结构域单体;(4) 第四多肽,其包括第六Fc结构域单体;以及(5) CCR4结合结构域,其与第一多肽、第二多肽、第三多肽或第四多肽连接;其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体组合以形成第一Fc结构域,并且第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体组合以形成第二Fc结构域,第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体组合以形成第三Fc结构域,并且其中以摩尔为基础,细胞培养上清液中至少50%的Fc-抗原结合结构域构建体在结构上是相同的,以及b) 从细胞培养上清液中纯化Fc-抗原结合结构域构建体。

[0113] 在本公开的第二十六方面、第二十七方面、第二十八方面、第二十九方面和第三十方面的一些实施方案中,第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体之间的二聚化,第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体之间的二聚化,并且第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体中的每一者包括互补的二聚化选择性模块,所述互补的二聚化选择性模块促进第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体之间的

二聚化。

[0114] 在本公开的所有方面的一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体具有减少的岩藻糖基化。因此,在一些实施方案中,包含Fc-抗原结合结构域构建体的组合物中少于40%、30%、20%、15%、10%或5%的Fc结构域单体被岩藻糖基化。

[0115] 在本公开的所有方面的一些实施方案中,Fc结构域单体在CH3结构域中包含图53A (SEQ ID NO:43)的具有多至10(9、8、7、6、5、4、3、2或1)个单一氨基酸变化的氨基酸序列。

[0116] 在本公开的所有方面的一些实施方案中,Fc结构域单体在CH3结构域中包含图53B (SEQ ID NO:45)的具有多至10(9、8、7、6、5、4、3、2或1)个单一氨基酸变化的氨基酸序列。

[0117] 在本公开的所有方面的一些实施方案中,Fc结构域单体在CH3结构域中包含图53C (SEQ ID NO:47)的具有多至10(9、8、7、6、5、4、3、2或1)个单一氨基酸变化的氨基酸序列。

[0118] 在本公开的所有方面的一些实施方案中,Fc结构域单体在CH3结构域中包含图53D (SEQ ID NO:42)的具有多至10(9、8、7、6、5、4、3、2或1)个单一氨基酸变化的氨基酸序列。

[0119] 在本公开的所有方面的一些实施方案中,例如,当Fc结构域单体在多肽的羧基末端时,Fc结构域单体不包括K447。在其他实施方案中,例如,当Fc结构域单体不在多肽的羧基末端时,Fc结构域单体包括K447。

[0120] 在本公开的所有方面的一些实施方案中,例如,当Fc结构域单体在接头的氨基末端时,Fc结构域单体不包括从E216到C220(包括端点)的铰链部分,而是包括从D221到L235(包括端点)的铰链部分。在其他实施方案中,例如,当Fc结构域单体在CH1结构域的羧基末端时,Fc结构域单体包括从E216到L235(包括端点)的铰链部分。在本公开的所有方面的一些实施方案中,铰链结构域(例如,在多肽的氨基末端的铰链结构域)在EU位置221处具有从Asp到Gln的突变。

[0121] 如上所述,本公开的Fc-抗原结合结构域构建体由多肽组装而成,所述多肽包括包含两个或更多个IgG1 Fc结构域单体的多肽,并且此类多肽是本公开的一个方面。

[0122] 在第四十一方面,本公开的特征在于一种多肽,其包含:CCR4结合结构域;接头;第一IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;第二接头;第二IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;任选的第三接头;以及任选的第三IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,其中至少一个Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变。

[0123] 在第四十一方面的各个实施方案中:CCR4结合结构域包含抗体重链可变结构域;CCR4结合结构域包含抗体轻链可变域;第一IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变,并且第二IgG1 Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变;第一IgG1 Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变,并且第二IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变;第一IgG1 Fc结构域单体和第二IgG1恒定结构域单体均包含形成工程化突起的突变;该多肽包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第一IgG1 Fc结构域单体、第二IgG1 Fc结构域单体和第三IgG1 Fc结构域单体各自包含形成工程化突起的突变;该多肽包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第一IgG1 Fc结构域单体和第二IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且第三IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变;该多肽包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第一IgG1 Fc结构域单体和第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且第二IgG1结构域单体包含两个或四

个反向电荷突变;该多肽包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第二IgG1 Fc结构域单体和第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且第一IgG1结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

[illegible]

[0125] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSPG,其具有不超过10个单一氨基酸置换;

每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVS
LTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0126] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过8个单一氨基酸置换;
每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVS
LTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0127] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过6个单一氨基酸置换;
其中每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTK
NQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0128] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过5个单一氨基酸置换;
单一氨基酸置换选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、F405A、Y407A、
S354C、Y349T、T394F、K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、
E357R、D356K和D356R;每个Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具
有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列;多至6个单一氨基酸置换是CH3结构域中的反向
电荷突变或是形成工程化突起的突变;单一氨基酸置换在从EU位置G341到EU位置K447的序
列内,包括端点;至少一个形成工程化突起的突变选自以下项组成的组:T366Y、T366W、
T394W、T394Y、F405W、S354C、Y349T和T394F;两个或四个反向电荷突变选自:K409D、K409E、
K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R;CCR4结合结构域是
scFv;CCR4结合结构域包含VH结构域和CH1结构域;CCR4结合结构域还包含VL结构域;VH结
构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列;VH结构域包含含有表2中列出的
抗体的序列的VH结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3;VH结构域包含表2中列出的抗体的VH序
列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且该VH序列不包括CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2
中列出的抗体的VH序列具有至少95%或98%的同一性;VH结构域包含表2中列出的抗体的
VH序列;CCR4结合结构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和
CDR-L3序列;CCR4结合结构域包含来自表2中列出的抗体的一组VH和VL序列的CDR-H1、CDR-
H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列;CCR4结合结构域包含含有表2中列出的抗体的VH
序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的VH结构域以及含有表2中列出的抗体的VL序列的CDR-L1、
CDR-L2和CDR-L3的VL结构域,其中VH结构域和VL结构域序列不包括CDR-H1、CDR-H2、CDR-
H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的VH和VL序列具有至少95%或98%
的同一性;CCR4结合结构域包含表2中列出的抗体的一组VH和VL序列;CCR4结合结构域包含
IgG CL抗体恒定结构域和IgG CH1抗体恒定结构域;CCR4结合结构域包含VH结构域和CH1结
构域,并且可以与包含VL结构域和CL结构域的多肽结合以形成Fab。

[0129] 还描述了一种多肽复合物,其包含上述多肽的两个拷贝,所述两个拷贝通过第一
IgG1 Fc结构域单体或第二IgG1 Fc结构域单体的铰链内的半胱氨酸残基之间的二硫键连
接。

[0130] 还描述了一种多肽复合物,其包含

[0131] 与第二多肽连接的上述多肽,该第二多肽包含IgG1 Fc结构域单体,该IgG1 Fc结
构域单体包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,其中多肽和第二多肽通过多肽的第一
IgG1 Fc结构域单体、第二IgG1 Fc结构域单体或第三IgG1 Fc结构域单体的铰链结构域内
的半胱氨酸残基与第二多肽的铰链结构域内的半胱氨酸残基之间的二硫键连接。

[0132] 在复合物的各种实施方案中：第二多肽单体包含形成工程化空腔的突变；形成工程化空腔的突变选自以下项组成的组：Y407T、Y407A、F405A、T394S、T394W/Y407A、T366W/T394S、T366S/L368A/Y407V/Y349C、S364H/F405A；第二多肽包含SEQ ID NO: 42、43、45和47中任一者具有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

[0133] 在第四十二方面,本公开的特征在于:一种多肽,其包含:CCR4结合结构域;接头;第一IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;第二接头;第二IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;任选的第三接头;以及任选的第三IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,其中至少一个Fc结构域单体包含一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

[illegible]

GGGGGGGGGGGGGGGGGG;第二接头和任选的第三接头是甘氨酸间隔物;第二接头和任选的第三接头独立地由4至30、4至20、8至30、8至20、12至20或12至30个甘氨酸残基组成;第二接头和任选的第三接头由20个甘氨酸残基组成;至少一个Fc结构域单体在EU位置I253处包含单一氨基酸突变,EU位置I253处的每个氨基酸突变独立地选自以下项组成的组:I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y;I253位置处的每个氨基酸突变是I253A;至少一个Fc结构域单体在EU位置R292处包含单一氨基酸突变;EU位置R292处的每个氨基酸突变独立地选自以下项组成的组:R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y;R292位置处的每个氨基酸突变是R292P;每个Fc结构域单体独立地包含选自以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:EPKSCDKTHTCPPCPAPELL和DKTHTCPPCPAPELL;第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL;第一Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAPEL;第一Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAPEL,并且第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL;每个Fc结构域单体的CH2结构域独立地包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换;每个Fc结构域单体的CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换;每个Fc结构域单体的CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体的CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK;每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0135] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过10个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0136] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过8个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0137] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过6个单一氨基酸置换;其中每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0138] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过5个单一氨基酸置换;单一氨基酸置换选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、F405A、Y407A、S354C、Y349T、T394F、K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R;每个Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具

有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列;多至6个单一氨基酸置换是CH3结构域中的反向电荷突变或是形成工程化突起的突变;单一氨基酸置换在从EU位置G341到EU位置K447的序列内,包括端点;至少一个形成工程化突起的突变选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、S354C、Y349T和T394F;两个或四个反向电荷突变选自:K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R;CCR4结合结构域是scFv;CCR4结合结构域包含VH结构域和CH1结构域;CCR4结合结构域还包含VL结构域;VH结构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列;VH结构域包含含有表2中列出的抗体的序列的VH结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3;VH结构域包含表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3,并且该VH序列不包括CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的VH序列具有至少95%或98%的同一性;VH结构域包含表2中列出的抗体的VH序列;CCR4结合结构域包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列;CCR4结合结构域包含来自表2中列出的抗体的一组VH和VL序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列;CCR4结合结构域包含含有表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的VH结构域以及含有表2中列出的抗体的VL序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3的VL结构域,其中VH结构域和VL结构域序列不包括CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的VH和VL序列具有至少95%或98%的同一性;CCR4结合结构域包含表2中列出的抗体的一组VH和VL序列;CCR4结合结构域包含IgG CL抗体恒定结构域和IgG CH1抗体恒定结构域;CCR4结合结构域包含VH结构域和CH1结构域,并且可以与包含VL结构域和CL结构域的多肽结合以形成Fab。

[0139] 还描述了一种多肽复合物,其包含任何上述多肽的两个拷贝,所述两个拷贝通过第一IgG1 Fc结构域单体或第二IgG1 Fc结构域单体的铰链内的半胱氨酸残基之间的二硫键连接。

[0140] 还描述了一种多肽复合物,其包含与第二多肽连接的上述多肽,该第二多肽包含IgG1 Fc结构域单体,该IgG1 Fc结构域单体包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,其中多肽和第二多肽通过多肽的第一IgG1 Fc结构域单体、第二IgG1 Fc结构域单体或第三IgG1 Fc结构域单体的铰链结构域内的半胱氨酸残基与第二多肽的铰链结构域内的半胱氨酸残基之间的二硫键连接。在各种实施方案中:第二多肽单体包含一个、两个或三个反向电荷突变;第二多肽单体包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷突变,并且与该多肽中选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷突变互补;第二多肽包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列。

[0141] 在第四十三方面,本公开的特征在于一种多肽,该多肽包含:第一IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;第二接头;第二IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;任选的第三接头;以及任选的第三IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,其中至少一个Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变。

[0142] 在第四十三方面的各种实施方案中:该多肽还包含:抗体重链可变结构域和第一IgG1单体的氨基末端的CH1结构域或第一IgG1单体的scFv氨基末端的scFv;第一IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变,并且第二IgG1 Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变;第一IgG1 Fc结构域单体包含形成工程化突起的突变,并且第二IgG1 Fc结构域

单体包含两个或四个反向电荷突变;第一IgG1 Fc结构域单体和第二IgG恒定结构域单体均包含形成工程化突起的突变;该多肽包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第一IgG1 Fc结构域单体、第二IgG1 Fc结构域单体和第三IgG1Fc结构域单体各自包含形成工程化突起的突变;该多肽包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第一IgG1 Fc结构域单体和第二IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且第三IgG1 Fc结构域单体包含两个或四个反向电荷突变;该多肽包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第一IgG1 Fc结构域单体和第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且第二IgG1结构域单体包含两个或四个反向电荷突变;该多肽包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第二IgG1 Fc结构域单体和第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含形成工程化突起的突变,并且第一IgG1结构域单体包含两个或四个反向电荷突变。

[0143] 在第四十三方面的各个实施方案中:包含形成工程化突起的突变的IgG1 Fc结构域单体还包含一个、两个或三个反向电荷突变:

[0144] 形成工程化突起的突变和反向电荷突变在CH3结构域中;突变在从EU位置G341到EU位置K447的序列内,包括端点;突变是单一氨基酸变化;第二接头和任选的第三接头包含选自以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG、GGGGS、GGSG、SGGG、GSGS、GSGSGS、GSGSGSGS、GSGSGSGSGS、GSGSGSGSGSGS、GGS GGS、GGS GGSGGS、GGS GGSGSGGS、GG SG、GG SG、GG SGGGSG、GGS GGSGSGGS GGG GSGGG GSGGG GSGGG GS GENLYFQSGG、SACYCELS、RSIAT、RPACKIPNDLKQKV MNH、GGSAGGSGSGSSGSSGASGTGTAGGTGSGSG TSGS、AAANSSIDLISVPVDSR、GGS GGGSEGGGSEG GGGSEG GGGSEG GGGSEG GGGSGGGGS、GGGS GGGSGGGGS、SGGGSGGGSGGGSGGGSGGG、GGS GGGSGGGSGGGSGGGSGGS、GGGG、GGGGGGGGG、GGGGGGGGGGGGG和GGGGGGGGGGGGGGGGGG;第二接头和任选的第三接头是甘氨酸间隔物;第二接头和任选的第三接头独立地由4至30、4至20、8至30、8至20、12至20或12至30个甘氨酸残基组成;第二接头和任选的第三接头由20个甘氨酸残基组成;至少一个Fc结构域单体在EU位置I253处包含单一氨基酸突变,EU位置I253处的每个氨基酸突变独立地选自以下项组成的组:I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y;I253位置处的每个氨基酸突变是I253A;至少一个Fc结构域单体在EU位置R292处包含单一氨基酸突变;EU位置R292处的每个氨基酸突变独立地选自以下项组成的组:R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y;R292位置处的每个氨基酸突变是R292P;每个Fc结构域单体独立地包含选自以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:EPKSCDKTHTCPPCPAPELL和DKTHTCPPCPAPELL;第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL;第一Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAP E L ;第一Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAP E L ,并且第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL;每个Fc结构域单体的CH₂结构域独立地包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPKP K DTL MISRTPEVT CV V DVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHN A KTKPREEQYNSTYRVVS VLTV LH QDWLN GKEYKCKVSNKALPAPIEKTI SKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换;每个Fc结构域单体的CH₂结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPKP K DTL MISRTPEVT CV V DVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHN A KTKPREEQYNSTYRVVS VLTV LH QDWLN GKEYKCKVSNKALPAPIEKTI SKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置

换;每个Fc结构域单体的CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体的CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK;每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0145] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过10个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0146] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过8个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0147] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过6个单一氨基酸置换;其中每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0148] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG,其具有不超过5个单一氨基酸置换;单一氨基酸置换选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、F405A、Y407A、S354C、Y349T、T394F、K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R;每个Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列;多至6个单一氨基酸置换是CH3结构域中的反向电荷突变或是形成工程化突起的突变;单一氨基酸置换在从EU位置G341到EU位置K447的序列内,包括端点;至少一个形成工程化突起的突变选自以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、S354C、Y349T和T394F;两个或四个反向电荷突变选自:K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R。

[0149] 在第四十四方面,本公开的特征在于一种多肽,该多肽包含:第一IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;第二接头;第二IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域;任选的第三接头;以及任选的第三IgG1 Fc结构域单体,其包含铰链结构域、CH2结构域和CH3结构域,其中至少一个Fc结构域单体包含一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变。

[0150] 在第四十四方面的各种实施方案中:该多肽还包含抗体重链可变结构域和第一IgG1 Fc结构域单体的氨基末端的CH1结构域或第一IgG1 Fc结构域单体的氨基末端的scFv。第一IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A和表4B的一组两个反向电荷突变或选自表4A和表4B的一组四个反向电荷突变,并且第二IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变;第一IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且第二IgG1 Fc结构域单体包含选自表4a和表4b的一组两个反向电荷突变或选自表4A和表4B的一组四个反向电荷突变;第一IgG1 Fc结构域单体和第二IgG恒定结构域单体均包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变;该多肽还包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第一IgG1 Fc结构域单体、

第二IgG1 Fc结构域单体和第三IgG1 Fc结构域单体各自包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变;该多肽还包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第一IgG1 Fc结构域单体和第二IgG1 Fc结构域单体各自均包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且第三IgG1 Fc结构域单体包含选自表4A和表4B的一组两个反向电荷突变或选自表4A和表4B的一组四个反向电荷突变;该多肽还包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第一IgG1 Fc结构域单体和第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且第二IgG1结构域单体包含选自表4A和表4B的一组两个反向电荷突变或选自表4A和表4B的一组四个反向电荷突变;该多肽还包含第三接头和第三IgG1 Fc结构域单体,其中第二IgG1 Fc结构域单体和第三IgG1 Fc结构域单体各自均包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变,并且第一IgG1结构域单体包含选自表4A和表4B的一组两个反向电荷突变或选自表4A和表4BB的一组四个反向电荷突变;包含选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变的IgG1 Fc结构域单体具有相同的CH3结构域;选自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷氨基酸突变在CH3结构域中;突变在从EU位置G341到EU位置K447的序列内,包括端点;突变各自是单一氨基酸变化;突变在从EU位置G341到EU位置K446的序列内,包括端点;突变是单一氨基酸变化;第二接头和任选的第三接头包含选自自由以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG、GGGGS、GGSG、SGGG、GSGS、GSGSGS、GSGSGSGS、GSGSGSGSGS、GSGSGSGSGSGS、GGSGGS、GGS GGS GGS、GGS GGS GGS GGS、GGSG、GGSG、GGS GGS GSG、GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS GGS、GENLYFQSGG、SACYCELS、RSIAT、RPACKIPNDLKQKVMNH、GG SAGSGSGSSGSSGASGTGTAGGTGSGSGTGS G、AAANSSIDLISVPVDSR、GGS GGS GSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSGGGS、GGGSGGGS GGS、SGGSGGGS GGS GGS GGS GGS GGS、GGS GGS GGS GGS GGS GGS、GGGG、GGGGGGGG、GGGGGGGGGGGG和GGGGGGGGGGGGGGGGGG;第二接头和任选的第三接头是甘氨酸间隔物;第二接头和任选的第三接头独立地由4至30、4至20、8至30、8至20、12至20或12至30个甘氨酸残基组成;第二接头和任选的第三接头由20个甘氨酸残基组成;至少一个Fc结构域单体在EU位置I253处包含单一氨基酸突变,EU位置I253处的每个氨基酸突变独立地选自自由以下项组成的组:I253A、I253C、I253D、I253E、I253F、I253G、I253H、I253I、I253K、I253L、I253M、I253N、I253P、I253Q、I253R、I253S、I253T、I253V、I253W和I253Y;I253位置处的每个氨基酸突变是I253A;至少一个Fc结构域单体在EU位置R292处包含单一氨基酸突变;EU位置R292处的每个氨基酸突变独立地选自自由以下项组成的组:R292D、R292E、R292L、R292P、R292Q、R292R、R292T和R292Y;R292位置处的每个氨基酸突变是R292P;每个Fc结构域单体独立地包含选自自由以下项组成的组的氨基酸序列或由这些氨基酸序列组成:EPKSCDKTHTCPPCPAPELL和DKTHTCPPCPAPELL;第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL;第一Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAPELL;第一Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列EPKSCDKTHTCPPCPAPELL,并且第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的铰链部分具有氨基酸序列DKTHTCPPCPAPELL;每个Fc结构域单体的CH2结构域独立地包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK,其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换;每个Fc结构域单体的CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDV

VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK, 其具有不超过两个单一氨基酸缺失或置换;每个Fc结构域单体的CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK, 其具有不超过两个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体的CH2结构域是相同的并且包含以下氨基酸序列:GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAK;每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0151] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG, 其具有不超过10个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0152] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG, 其具有不超过8个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0153] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG, 其具有不超过6个单一氨基酸置换;其中每个Fc结构域单体的CH3结构域独立地包含以下氨基酸序列:GQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK

[0154] LTVDKSRWQQGNVFSCSVMEALHNHYTQKSLSLSPG, 其具有不超过5个单一氨基酸置换;单一氨基酸置换选自自由以下项组成的组:T366Y、T366W、T394W、T394Y、F405W、F405A、Y407A、S354C、Y349T、T394F、K409D、K409E、K392D、K392E、K370D、K370E、D399K、D399R、E357K、E357R、D356K和D356R;每个Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO: 42、43、45和47中任一者具有多至10个单一氨基酸置换的氨基酸序列;多至6个单一氨基酸置换是CH3结构域中的反向电荷突变或是形成工程化突起的突变;单一氨基酸置换在从EU位置G341到EU位置K447的序列内, 包括端点;VH结构域或scFv包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列;VH结构域或scFv包含含有表2中列出的抗体的序列的VH结构域的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3;VH结构域或scFv包含表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3, 并且该VH序列不包括CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3序列时与表2中列出的抗体的VH序列具有至少95%或98%的同一性;VH结构域或scFv包含表2中列出的抗体的VH序列;VH结构域或scFv包含表1中列出的一组CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列;VH结构域或scFv包含来自表2中列出的抗体的一组VH和VL序列的CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列;VH结构域或scFv包含含有表2中列出的抗体的VH序列的CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3的VH结构域以及含有表2中列出的抗体的VL序列的CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3的VL结构域, 其中VH结构域和VL结构域序列不包括CDR-H1、CDR-H2、CDR-H3、CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3序列时与表2中列出的抗体的VH和VL序列具有至少95%或98%的同一性;VH结构域或scFv包含表2中列出的抗体的一组VH和VL序列。

[0155] 还描述了编码第四十一方面、第四十二方面、第四十三方面和第四十四方面的任何前述多肽的核酸分子。

[0156] 还描述了:表达载体, 其包括编码任何前述多肽的核酸;以及宿主细胞, 其包含核酸或表达载体;宿主细胞, 其还包含编码包含抗体VL结构域的多肽的核酸分子(例如, 编码

包含抗体VL结构域和抗体CL结构域的多肽的核酸分子);宿主细胞,其还包含编码包含抗体VL结构域和抗体CL结构域的多肽的核酸分子;宿主细胞,其还包含编码包含具有不超过10个单一氨基酸突变的IgG1 Fc结构域单体的多肽的核酸分子;宿主细胞,其还包含编码包含具有不超过10个单一氨基酸突变的IgG1 Fc结构域单体的多肽的核酸分子。在各个实施方案中:IgG1 Fc结构域单体在CH3结构域中包含SEQ ID No:42、43、45和47中任一者具有不超过10、8、6或4个单一氨基酸突变的氨基酸序列。

[0157] 还描述了一种药物组合物,其包含本文所述的任何多肽或多肽复合物。在各种实施方案中,少于40%、30%、20%、10%、5%、2%的多肽具有至少一种岩藻糖。

[0158] 本公开的第四十一方面、第四十二方面、第四十三方面和第四十四方面的多肽可用作本文所述的各种Fc-抗原结合结构域构建体的组分。因此,第一方面至第四十方面中任一项的多肽(例如,那些可以包含CCR4结合结构域的多肽)可以包含本公开的第四十一方面、第四十二方面、第四十三方面和第四十四方面中任一项的多肽或由这些多肽组成。

[0159] 用于本公开的所有方面的其他有用的多肽包括包含具有一个、两个或三个形成空腔的突变(例如,选自Y407T、Y407A、F405A、T394S、T394W:Y407T、T394S:Y407A、T366W:T394S、F405T、T366S:L368A:Y407V:Y349C、S364H:F405A)的Fc结构域单体(例如,包含SEQ ID No:42、43、45和47中任一者具有不超过8、6、5、4或3个单一氨基酸置换的氨基酸序列或由这些序列组成)的多肽。这些多肽可以任选地包括来自表4A和表4B的一个、两个或三个反向电荷突变。

[0160] 在本公开的所有方面,一些或全部Fc结构域单体(例如,包含SEQ ID No:42、43、45和47中任一者具有不超过10、8、6或4个单一氨基酸置换(例如,仅在CH3域中)的氨基酸序列的Fc结构域单体)除了具有其他氨基酸置换或修饰之外,还可以具有E345K和E430G氨基酸置换中的一者或两者。E345K和E430G氨基酸置换可以增加Fc结构域多聚化。

[0161] 本文还描述了一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

[0162] a) 第一多肽,其包含:

[0163] i) 第一Fc结构域单体;

[0164] ii) 第二Fc结构域单体

[0165] iii) 第一CCR4重链结合结构域,以及

[0166] iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

[0167] b) 第二多肽,其包含:

[0168] i) 第三Fc结构域单体;

[0169] ii) 第四Fc结构域单体

[0170] iii) 第二CCR4重链结合结构域,以及

[0171] iv) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的接头;

[0172] c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;

[0173] d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;

[0174] e) 第五多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;以及

[0175] f) 第六多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;

[0176] 其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第四Fc单体和第六Fc单体一起形成第

三Fc结构域,第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

[0177] 在各种实施方案中:第一多肽和第二多肽在序列上相同;第三多肽和第四多肽在序列上相同;第五多肽和第六多肽在序列上相同;第一多肽和第二多肽在序列上相同,第三多肽和第四多肽在序列上相同,并且第五多肽和第六多肽在序列上相同;每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;与人IgG的氨基酸序列相比,每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列;单一氨基酸置换仅在CH3结构域中;第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体之间的同二聚化;第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体之间的异二聚化,并且第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体之间的异二聚化;促进同二聚化的置换选自表4A和表4B中的置换;并且

[0178] 促进异二聚化的置换选自表3中的置换。

[0179] 还描述了一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

[0180] a) 第一多肽,其包含:

[0181] i) 第一Fc结构域单体;

[0182] ii) 第二Fc结构域单体

[0183] iii) 第一CCR4重链结合结构域,以及

[0184] iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

[0185] b) 第二多肽,其包含:

[0186] i) 第三Fc结构域单体;

[0187] ii) 第四Fc结构域单体

[0188] iii) 第二CCR4重链结合结构域,以及

[0189] iv) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的接头;

[0190] c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体和第一CCR4轻链结合结构域;以及

[0191] d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体和第二CCR4轻链结合结构域;

[0192] 其中第一Fc结构域单体和第三Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第四Fc单体和第六Fc单体一起形成第三Fc结构域,第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

[0193] 还描述了一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

[0194] a) 第一多肽,其包含:

[0195] i) 第一Fc结构域单体;

[0196] ii) 第二Fc结构域单体

[0197] iii) 第一CCR4重链结合结构域,以及

[0198] iv) 连接所述第一Fc结构域单体和所述第二Fc结构域单体的接头;

- [0199] b) 第二多肽,其包含:
- [0200] i) 第三Fc结构域单体;
- [0201] ii) 第四Fc结构域单体
- [0202] iii) 第二CCR4重链结合结构域,以及
- [0203] iv) 连接所述第三Fc结构域单体和所述第四Fc结构域单体的接头;
- [0204] c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体;
- [0205] d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体;
- [0206] e) 第五多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;以及
- [0207] f) 第六多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;
- [0208] 其中第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第二Fc单体和第四Fc单体一起形成第三Fc结构域,第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。
- [0209] 在各种实施方案中:第一多肽和第二多肽在序列上相同;第三多肽和第四多肽在序列上相同;第五多肽和第六多肽在序列上相同;第一多肽和第二多肽在序列上相同,第三多肽和第四多肽在序列上相同,并且第五多肽和第六多肽在序列上相同;每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;与人IgG1的氨基酸序列相比,每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列;单一氨基酸置换仅在CH3结构域中;第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体之间的同二聚化;第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体之间的异二聚化,并且第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第四Fc结构域单体和第六Fc结构域单体之间的异二聚化;促进同二聚化的置换选自表4A和表4B中的置换;并且促进异二聚化的置换选自表3中的置换。
- [0210] 还描述了一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:
- [0211] a) 第一多肽,其包含:
- [0212] i) 第一Fc结构域单体;
- [0213] ii) 第二Fc结构域单体,
- [0214] iii) 第三Fc结构域单体,
- [0215] iv) 第一CCR4重链结合结构域,
- [0216] v) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头,以及
- [0217] vi) 连接第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的接头;
- [0218] b) 第二多肽,其包含:
- [0219] i) 第四Fc结构域单体,
- [0220] ii) 第五Fc结构域单体,
- [0221] iii) 第六Fc结构域单体,

- [0222] iv) 第二CCR4重链结合结构域,
- [0223] v) 连接第四Fc结构域单体和第五Fc结构域单体的接头, 以及
- [0224] vi) 连接第五Fc结构域单体和第六Fc结构域单体的接头;
- [0225] c) 第三多肽, 其包含第七Fc结构域单体;
- [0226] d) 第四多肽, 其包含第八Fc结构域单体;
- [0227] e) 第五多肽, 其包含第九Fc结构域单体;
- [0228] f) 第六多肽, 其包含第十Fc结构域单体;
- [0229] g) 第七多肽, 其包含第一CCR4轻链结合结构域; 以及
- [0230] h) 第八多肽, 其包含第二CCR4轻链结合结构域;
- [0231] 其中第一Fc结构域单体和第七Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域, 第四Fc结构域单体和第八Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域, 第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第三Fc结构域, 第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体一起形成第四Fc结构域, 第六Fc单体和第十Fc单体一起形成第五Fc结构域, 第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab; 并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。
- [0232] 在各种实施方案中: 第一多肽和第二多肽在序列上相同; 第三多肽和第四多肽在序列上相同; 第五多肽和第六多肽在序列上相同; 第七多肽和第八多肽在序列上相同; 第一多肽和第二多肽在序列上相同, 第三多肽和第四多肽在序列上相同, 第五多肽和第六多肽在序列上相同, 并且第七多肽和第八多肽在序列上相同。每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换; 与人IgG1的氨基酸序列相比, 每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换; Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO: 42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列; 单一氨基酸置换仅在CH3结构域中; 第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换, 所述置换促进第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体之间的同二聚化; 第一Fc结构域单体和第七Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换, 所述置换促进第一Fc结构域单体和第七Fc结构域单体之间的异二聚化, 第四Fc结构域单体和第八Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换, 所述置换促进第四Fc结构域单体和第八Fc结构域单体之间的异二聚化; 第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换, 所述置换促进第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体之间的异二聚化; 并且第六Fc结构域单体和第十Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换, 所述置换促进第六Fc结构域单体和第十Fc结构域单体之间的异二聚化; 促进同二聚化的置换选自表4A和表4B中的置换; 促进异二聚化的置换选自表3中的置换。
- [0233] 还描述了一种Fc-抗原结合结构域构建体, 其包含:
- [0234] a) 第一多肽, 其包含:
- [0235] i) 第一Fc结构域单体;
- [0236] ii) 第二Fc结构域单体,
- [0237] iii) 第三Fc结构域单体,
- [0238] iv) 第一CCR4重链结合结构域,

- [0239] v) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头, 以及
- [0240] vi) 连接第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的接头;
- [0241] b) 第二多肽, 其包含:
- [0242] i) 第四Fc结构域单体,
- [0243] ii) 第五Fc结构域单体,
- [0244] iii) 第六Fc结构域单体,
- [0245] iv) 第二CCR4重链结合结构域,
- [0246] v) 连接第四Fc结构域单体和第五Fc结构域单体的接头, 以及
- [0247] vi) 连接第五Fc结构域单体和第六Fc结构域单体的接头;
- [0248] c) 第三多肽, 其包含第七Fc结构域单体;
- [0249] d) 第四多肽, 其包含第八Fc结构域单体;
- [0250] e) 第五多肽, 其包含第九Fc结构域单体和第一CCR4轻链结合结构域; 以及
- [0251] f) 第六多肽, 其包含第十Fc结构域单体和第二CCR4轻链结合结构域
- [0252] 其中第一Fc结构域单体和第七Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域, 第四Fc结构域单体和第八Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域, 第二Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第三Fc结构域, 第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体一起形成第四Fc结构域, 第六Fc单体和第十Fc单体一起形成第五Fc结构域, 第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab; 并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。
- [0253] 还描述了一种Fc-抗原结合结构域构建体, 其包含:
- [0254] a) 第一多肽, 其包含:
- [0255] i) 第一Fc结构域单体;
- [0256] ii) 第二Fc结构域单体,
- [0257] iii) 第三Fc结构域单体,
- [0258] iv) 第一CCR4重链结合结构域,
- [0259] v) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头, 以及
- [0260] vi) 连接第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的接头;
- [0261] b) 第二多肽, 其包含:
- [0262] i) 第四Fc结构域单体,
- [0263] ii) 第五Fc结构域单体,
- [0264] iii) 第六Fc结构域单体,
- [0265] iv) 第二CCR4重链结合结构域,
- [0266] v) 连接第四Fc结构域单体和第五Fc结构域单体的接头, 以及
- [0267] vi) 连接第五Fc结构域单体和第六Fc结构域单体的接头;
- [0268] c) 第三多肽, 其包含第七Fc结构域单体;
- [0269] d) 第四多肽, 其包含第八Fc结构域单体;
- [0270] e) 第五多肽, 其包含第九Fc结构域单体;
- [0271] f) 第六多肽, 其包含第十Fc结构域单体;
- [0272] g) 第七多肽, 其包含第一CCR4轻链结合结构域; 以及

[0273] h) 第八多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;

[0274] 其中第一Fc结构域单体和第四Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第二Fc结构域单体和第七Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第五Fc单体和第八Fc单体一起形成第三Fc结构域,第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体一起形成第四Fc结构域,第六Fc单体和第十Fc单体一起形成第五Fc结构域,第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。

[0275] 在各种实施方案中:第一多肽和第二多肽在序列上相同;第三多肽和第四多肽在序列上相同;第五多肽和第六多肽在序列上相同;第七多肽和第八多肽在序列上相同;第一多肽和第二多肽在序列上相同,第三多肽和第四多肽在序列上相同,第五多肽和第六多肽在序列上相同,并且第七多肽和第八多肽在序列上相同。每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;与人IgG1的氨基酸序列相比,每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列;单一氨基酸置换仅在CH3结构域中;第一Fc结构域单体和第四Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第一Fc结构域单体和第四Fc结构域单体之间的同二聚化;第二Fc结构域单体和第七Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第二Fc结构域单体和第七Fc结构域单体之间的异二聚化,第五Fc结构域单体和第八Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第五Fc结构域单体和第八Fc结构域单体之间的异二聚化,第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体之间的异二聚化,并且第六Fc结构域单体和第十Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第六Fc结构域单体和第十Fc结构域单体之间的异二聚化;促进同二聚化的置换选自表4A和表4B中的置换;并且促进异二聚化的置换选自表3中的置换。

[0276] 还描述了一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

[0277] a) 第一多肽,其包含:

[0278] i) 第一Fc结构域单体;

[0279] ii) 第二Fc结构域单体,

[0280] iii) 第三Fc结构域单体,

[0281] iv) 第一CCR4重链结合结构域,

[0282] v) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头,以及

[0283] vi) 连接第二Fc结构域单体和第三Fc结构域单体的接头;

[0284] b) 第二多肽,其包含:

[0285] i) 第四Fc结构域单体,

[0286] ii) 第五Fc结构域单体,

[0287] iii) 第六Fc结构域单体,

[0288] iv) 第二CCR4重链结合结构域,

[0289] v) 连接第四Fc结构域单体和第五Fc结构域单体的接头,以及

- [0290] vi) 连接第五Fc结构域单体和第六Fc结构域单体的接头;
- [0291] c) 第三多肽,其包含第七Fc结构域单体;
- [0292] d) 第四多肽,其包含第八Fc结构域单体;
- [0293] e) 第五多肽,其包含第九Fc结构域单体和第一CCR4轻链结合结构域;
- [0294] f) 第六多肽,其包含第十Fc结构域单体和第二CCR4轻链结合结构域;
- [0295] 其中第一Fc结构域单体和第四Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第二Fc结构域单体和第七Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第五Fc单体和第八Fc单体一起形成第三Fc结构域,第三Fc结构域单体和第九Fc结构域单体一起形成第四Fc结构域,第六Fc单体和第十Fc单体一起形成第五Fc结构域,第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。
- [0296] 还描述了一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:
- [0297] a) 第一多肽,其包含:
- [0298] i) 第一Fc结构域单体;
- [0299] ii) 第二Fc结构域单体,
- [0300] iii) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头,以及
- [0301] b) 第二多肽,其包含:
- [0302] i) 第三Fc结构域单体;
- [0303] ii) 第四Fc结构域单体
- [0304] iii) 连接第三Fc结构域单体和第四Fc结构域单体的接头;
- [0305] c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体和第一CCR4重链结合结构域,以及
- [0306] d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体和第二CCR4重链结合结构域;
- [0307] e) 第五多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;以及
- [0308] f) 第六多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;
- [0309] 其中第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体一起形成第三Fc结构域,第一CCR4重链结合结构域和第一CCR4轻链结合结构域一起形成第一Fab;并且第二CCR4重链结合结构域和第二CCR4轻链结合结构域一起形成第二Fab。
- [0310] 在各种实施方案中:第一多肽和第二多肽在序列上相同;第三多肽和第四多肽在序列上相同;第五多肽和第六多肽在序列上相同;第一多肽和第二多肽在序列上相同,第三多肽和第四多肽在序列上相同,并且第五多肽和第六多肽在序列上相同;每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;与人IgG1的氨基酸序列相比,每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列;单一氨基酸置换仅在CH3结构域中;第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体之间的同二聚化;第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体之间的异二聚化,并且第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、

4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体之间的异二聚化;促进同二聚化的置换选自表4A和表4B中的置换;促进异二聚化的置换选自表3中的置换。

[0311] 还描述了一种Fc-抗原结合结构域构建体,其包含:

[0312] a) 第一多肽,其包含:

[0313] i) 第一Fc结构域单体;

[0314] ii) 第二Fc结构域单体,

[0315] iii) 第一CCR4重链结合结构域,以及

[0316] iv) 连接第一Fc结构域单体和第二Fc结构域单体的接头,

[0317] b) 第二多肽,其包含:

[0318] i) 第三Fc结构域单体;

[0319] ii) 第四Fc结构域单体,

[0320] iii) 第二CCR4重链结合结构域,以及

[0321] iv) 连接第三Fc结构域单体和第四Fc结构域单体的接头,

[0322] c) 第三多肽,其包含第五Fc结构域单体和第三CCR4重链结合结构域;

[0323] d) 第四多肽,其包含第六Fc结构域单体和第四CCR4轻链结合结构域;

[0324] e) 第五多肽,其包含第一CCR4轻链结合结构域;

[0325] f) 第六多肽,其包含第二CCR4轻链结合结构域;

[0326] g) 第七多肽,其包含第三CCR4轻链结合结构域;以及

[0327] h) 第八多肽,其包含第四CCR4轻链结合结构域;

[0328] 其中第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体一起形成第一Fc结构域,第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体一起形成第二Fc结构域,第二Fc单体和第四Fc单体一起形成第三Fc结构域,第一CCR4轻链结合结构域和第三CCR4重链结合结构域一起形成第一Fab,第二CCR4轻链结合结构域和第四CCR4重链结合结构域一起形成第二Fab,第三CCR4轻链结合结构域和第一CCR4重链结合结构域一起形成第三Fab;并且第四CCR4轻链结合结构域和第二CCR4重链结合结构域一起形成第二Fab

[0329] 在各种实施方案中:第一多肽和第二多肽在序列上相同;第三多肽和第四多肽在序列上相同;第五多肽、第六多肽、第七多肽和第八多肽在序列上相同;第一多肽和第二多肽在序列上相同,第三多肽和第四多肽在序列上相同,并且第五多肽、第六多肽、第七多肽和第八多肽在序列上相同;每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;与人IgG1的氨基酸序列相比,每个Fc结构域单体的CH3结构域包括多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换;每个Fc结构域单体独立地包含SEQ ID NO:42、43、45和47中任一者具有多至10、8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换的氨基酸序列;单一氨基酸置换仅在CH3结构域中;第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第二Fc结构域单体和第四Fc结构域单体之间的同二聚化;其中第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第一Fc结构域单体和第五Fc结构域单体之间的异二聚化,并且第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体包含多至8、7、6、5、4、3、2或1个单一氨基酸置换,所述置换促进第三Fc结构域单体和第六Fc结构域单体之间的异二聚化;促进同二聚化的置换选自表

作用。Fc结构域单体可以包含来自野生型Fc结构域单体序列的多达十个变化(例如,单一氨基酸变化)(例如,1-10、1-8、1-6、1-4个氨基酸置换、添加或缺失),这些变化改变Fc结构域单体之间的相互作用。在某些实施方案中,与以下人IgG1 CH3结构域序列相比,CH3结构域上有多至10、8、6或5个单一氨基酸置换:GQPREPQVYITLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG。合适变化的实例是本领域已知的。

[0333] 如本文所用,术语“Fc结构域”是指能够结合Fc受体的两个Fc结构域单体的二聚体。在野生型Fc结构域中,两个Fc结构域单体通过两个C_H3抗体恒定结构域之间的相互作用以及在两个二聚化Fc结构域单体的铰链结构域之间形成的一个或多个二硫键而二聚化。

[0334] 在本公开中,术语“Fc-抗原结合结构域构建体”是指形成至少两个如本文所述的Fc结构域并且包括至少一个“抗原结合结构域”的缔合多肽链。本文所述的Fc-抗原结合结构域构建体可以包括具有相同或不同序列的Fc结构域单体。例如,Fc-抗原结合结构域构建体可以具有三个Fc结构域,其中两个包括IgG1或IgG1衍生的Fc结构域单体,并且第三个包括IgG2或IgG2衍生的Fc结构域单体。在另一个实例中,Fc-抗原结合结构域构建体可以具有三个Fc结构域,其中两个包括“突起-进入-空腔对”,并且第三个不包括“突起-进入-空腔对”。Fc结构域形成与Fc受体(例如,Fc γ RI、Fc γ RIIa、Fc γ RIIb、Fc γ RIIIa、Fc γ RIIIb或Fc γ RIV)结合的最小结构。

[0335] 如本文所用,术语“抗原结合结构域”是指能够特异性结合靶分子的肽、多肽或一组缔合多肽。在一些实施方案中,“抗原结合结构域”是抗体的与抗体所结合的抗原特异性结合的最小序列。表面等离子共振 (SPR) 或本领域已知的各种免疫测定(例如,Western印迹或ELISA)可以用于评估抗体对抗原的特异性。在一些实施方案中,“抗原结合结构域”包括抗体的可变结构域或互补决定区(CDR),例如表1中列出的抗体的一个或多个CDR、表2中列出的抗体的一个或多个CDR或者表2中列出的抗体的VH和/或VL结构域。在一些实施方案中,CCR4结合结构域可以包括VH结构域和CH1结构域,任选地具有VL结构域。在其他实施方案中,抗原(例如,CCR4)结合结构域是抗体或scFv的Fab片段。因此,CCR4结合结构域可以包括包含VH结构域和CH1结构域或由这些结构域组成的“CCR4重链结合结构域”以及包含VL结构域和C_L结构域或由这些结构域组成的“CCR4轻链结合结构域”。CCR4结合结构域也可以是特异性结合靶标的合成工程化肽,诸如基于纤连蛋白的结合蛋白(例如,纤连蛋白III型结构域(FN3)单体)。

[0336] 如本文所用,术语“互补决定区”(CDR)是指抗体可变结构域的氨基酸残基,其存在对于CCR4结合是必需的。每个可变结构域通常具有三个CDR区,被标识为CDR-L1、CDR-L2和CDR-L3,以及CDR-H1、CDR-H2和CDR-H3。每个互补决定区可包括来自Kabat定义的“互补决定区”的氨基酸残基(即,大约轻链可变结构域中的残基24-34(CDR-L1)、50-56(CDR-L2)和89-97(CDR-L3)以及重链可变结构域中的残基31-35(CDR-H1)、50-65(CDR-H2)和95-102(CDR-H3);Kabat等人,Sequences of Proteins of Immunological Interest,第5版,Public Health Service,National Institutes of Health,Bethesda,Md.(1991))和/或来自“高变环”的那些残基(即,大约轻链可变结构域中的残基26-32(CDR-L1)、50-52(CDR-L2)和91-96(CDR-L3)以及重链可变结构域中的残基26-32(CDR-H1)、53-55(CDR-H2)和96-101(CDR-H3);Chothia和Lesk,J.Mol.Biol.196:901-917(1987))。在一些情况下,互补决定

区可以包括来自根据Kabat定义的CDR区以及高变环两者的氨基酸。

[0337] “骨架区”(下文称为FR)是除CDR残基以外的那些可变结构域残基。每个可变结构域通常具有四个FR,被标识为FR1、FR2、FR3和FR4。如果CDR是根据Kabat定义的,则轻链FR残基位于大约残基1-23(LCFR1)、35-49(LCFR2)、57-88(LCFR3)和98-107(LCFR4)处,并且重链FR残基位于大约重链残基中的残基1-30(HCFR1)、36-49(HCFR2)、66-94(HCFR3)和103-113(HCFR4)处。如果CDR包含来自高变环的氨基酸残基,则轻链FR残基位于大约轻链中的残基1-25(LCFR1)、33-49(LCFR2)、53-90(LCFR3)和97-107(LCFR4)处,并且重链FR残基位于大约重链残基中的残基1-25(HCFR1)、33-52(HCFR2)、56-95(HCFR3)和102-113(HCFR4)处。在一些情况下,当CDR包括来自如由Kabat定义的CDR以及高变环的CDR两者的氨基酸时,将相应地调节FR残基。

[0338] “Fv”片段是包含完整抗原识别和结合位点的抗体片段。该区域由紧密缔合的一个重链可变结构域和一个轻链可变结构域的二聚体组成,该二聚体在性质上可以是共价的,例如在scFv中。在这种构型中,每个可变结构域的三个CDR相互作用以在 V_H - V_L 二聚体的表面上限定CCR4结合位点。

[0339] “Fab”片段包含轻链的可变结构域和恒定结构域以及重链的可变结构域和第一恒定结构域(C_{H1})。F(ab')₂抗体片段包括一对Fab片段,它们通常在其羧基末端附近通过铰链半胱氨酸共价连接。

[0340] “单链Fv”或“scFv”抗体片段在单个多肽链中包括抗体的 V_H 和 V_L 结构域。通常,scFv多肽还包括在 V_H 与 V_L 结构域之间的多肽接头,该接头使得scFv能够形成CCR4结合所需的结构。

[0341] 如本文所用,术语“抗体恒定结构域”是指对应于抗体的恒定区结构域的多肽(例如, C_L 抗体恒定结构域、 C_{H1} 抗体恒定结构域、 C_{H2} 抗体恒定结构域或 C_{H3} 抗体恒定结构域)。

[0342] 如本文所用,术语“促进”意指支持且有利于,例如有利于由彼此的结合亲和力比其他不同的Fc结构域单体更高的两个Fc结构域单体形成Fc结构域。如本文所述,组合以形成Fc结构域的两个Fc结构域单体可以在其各自的 C_{H3} 抗体恒定结构域的界面处具有相容氨基酸修饰(例如,工程化突起和工程化空腔,以及/或者静电转向突变)。相容氨基酸修饰促进或有利于此类Fc结构域单体相对于与缺乏此类氨基酸修饰或具有不相容氨基酸修饰的其他Fc结构域单体彼此的选择性相互作用。这是因为,由于两个相互作用的 C_{H3} 抗体恒定结构域的界面处的氨基酸修饰,Fc结构域单体对彼此的亲和力比对缺乏氨基酸修饰的其他Fc结构域单体更高。

[0343] 如本文所用,术语“二聚化选择性模块”是指Fc结构域单体的促进两个Fc结构域单体之间的有利配对的序列。“互补”二聚化选择性模块是促进或有利于两个Fc结构域单体彼此的选择性相互作用的二聚化选择性模块。互补二聚化选择性模块可以具有相同或不同的序列。本文描述了示例性的互补的二聚化选择性模块。

[0344] 如本文所用,术语“工程化空腔”是指用侧链体积比原始氨基酸残基更小的不同氨基酸残基置换 C_{H3} 抗体恒定结构域中的至少一个原始氨基酸残基,从而在 C_{H3} 抗体恒定结构域中产生三维空腔。术语“原始氨基酸残基”是指由野生型 C_{H3} 抗体恒定结构域的遗传密码编码的天然存在的氨基酸残基。

[0345] 如本文所用,术语“工程化突起”是指用侧链体积比原始氨基酸残基更大的不同氨

氨基酸残基置换 C_H3 抗体恒定结构域中的至少一个原始氨基酸残基,从而在 C_H3 抗体恒定结构域中产生三维突起。术语“原始氨基酸残基”是指由野生型 C_H3 抗体恒定结构域的遗传密码编码的天然存在的氨基酸残基。

[0346] 如本文所用,术语“突起-进入-空腔对”描述了包括两个Fc结构域单体的Fc结构域,其中第一Fc结构域单体在其 C_H3 抗体恒定结构域中包括工程化空腔,而第二Fc结构域单体在其 C_H3 抗体恒定结构域中包括工程化突起。在突起-进入-空腔对中,第一Fc结构域单体的 C_H3 抗体恒定结构域中的工程化突起被定位成使得其与第二Fc结构域单体的 C_H3 抗体恒定结构域的工程化空腔相互作用,而不显著扰乱二聚体在 C_H3 抗体恒定结构域间界面处的正常缔合。

[0347] 如本文所用,术语“异二聚体Fc结构域”是指通过两个Fc结构域单体的异二聚化形成的Fc结构域,其中所述两个Fc结构域单体含有促进这两个Fc结构域单体的有利形成的不同反向电荷突变(参见例如,表4A和表4B中的突变)。在具有三个Fc结构域的一个羧基末端“茎”Fc结构域和两个氨基末端“分支”Fc结构域)Fc构建体中,每个氨基末端“分支”Fc结构域都可以是异二聚体Fc结构域(也称为“分支异二聚体Fc结构域”)。

[0348] 如本文所用,关于Fc-抗原结合结构域构建体群体的术语“在结构上相同”是指以相同比率和构型组装相同多肽序列的构建体,但不指任何翻译后修饰,诸如糖基化。

[0349] 如本文所用,术语“同二聚体Fc结构域”指通过两个Fc结构域单体的同二聚化形成的Fc结构域,其中所述两个Fc结构域单体含有相同的反向电荷突变(参见例如,表5和表6中的突变)。在具有三个Fc结构域(一个羧基末端“茎”Fc结构域和两个氨基末端“分支”Fc结构域)的Fc构建体中,羧基末端“茎”Fc结构域可以是同二聚体Fc结构域(也称为“茎同二聚体Fc结构域”)。

[0350] 如本文所用,术语“异二聚化选择性模块”是指可以在Fc结构域单体的 C_H3 抗体恒定结构域中产生的工程化突起、工程化空腔和某些反向电荷氨基酸置换,以便促进具有相容异二聚化选择性模块的两个Fc结构域单体的有利异二聚化。含有异二聚化选择性模块的Fc结构域单体可组合以形成异二聚体Fc结构域。异二聚化选择性模块的实例在表3和表4中示出。

[0351] 如本文所用,术语“同二聚化选择性模块”是指 C_H3 结构域之间的界面处的带电残基环内至少两个位置中的Fc结构域单体中的促进Fc结构域单体的同二聚化以形成同二聚体Fc结构域的反向电荷突变。同二聚化选择性模块的实例在表4和表5中示出。

[0352] 如本文所用,术语“连接”用于描述通过包括化学缀合、重组手段和化学键(例如,肽键、二硫键和酰胺键)在内的手段来组合或附接两种或更多种元件、组分或蛋白质结构域(例如,多肽)。例如,可以通过化学缀合、化学键、肽接头或任何其他共价键合手段来连接两种单个多肽以形成一个连续的蛋白质结构。在一些实施方案中,通过从编码CCR4结合结构域和Fc结构域单体两者的连续核酸序列表达来将CCR4结合结构域与Fc结构域单体连接。在其他实施方案中,通过肽接头将CCR4结合结构域与Fc结构域单体连接,其中通过化学键(例如,肽键)将肽接头的N末端与CCR4结合结构域的C末端连接,并且通过化学键(例如,肽键)将肽接头的C末端与Fc结构域单体的N末端连接。

[0353] 如本文所用,术语“缔合”用于描述多肽(或一种单一多肽内的序列)之间的相互作用,例如氢键合、疏水相互作用或离子相互作用,使得多肽(或一种单一多肽内的序列)被定

位为形成本文所述的Fc-抗原结合结构域构建体(例如,具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体)。例如,在一些实施方案中,四种多肽(例如,各自包括两个Fc结构域单体的两种多肽和各自包括一个Fc结构域单体的两种多肽)缔合以形成具有三个Fc结构域的Fc构建体(例如,如图50和图51所描绘)。四种多肽可以通过其各自的Fc结构域单体缔合。多肽之间的缔合不包括共价相互作用。

[0354] 如本文所用,术语“接头”是指两个元件(例如,蛋白质结构域)之间的键合。接头可以是共价键或间隔物。术语“键”是指化学键(例如,酰胺键或二硫键)或由化学反应产生(例如,化学缀合)的任何种类的键。术语“间隔物”是指存在于两个多肽或多肽结构域之间以在两个多肽或多肽结构域之间提供空间和/或灵活性的部分(例如,聚乙二醇(PEG)聚合物)或氨基酸序列(例如,3-200个氨基酸、3-150个氨基酸或3-100个氨基酸序列)。氨基酸间隔物是多肽一级序列的部分(例如,经由多肽主链与间隔的多肽或多肽结构域连接)。例如在两个铰链区或形成Fc结构域的两个Fc结构域单体之间形成的二硫键不被认为是接头。

[0355] 如本文所用,术语“甘氨酸间隔物”是指串联连接两个Fc结构域单体的仅含有甘氨酸的接头。甘氨酸间隔物可含有至少4、8或12个甘氨酸(例如,4-30、8-30或12-30个甘氨酸;例如,12-30、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29或30个甘氨酸)。在一些实施方案中,甘氨酸间隔物具有序列GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG (SEQ ID NO:27)。

[0356] 如本文所用,术语“白蛋白结合肽”是指对血清白蛋白具有亲和力并且具有结合血清白蛋白的功能的12至16个氨基酸的氨基酸序列。白蛋白结合肽可以具有不同起源,例如人、小鼠或大鼠。在本公开的一些实施方案中,将白蛋白结合肽与Fc结构域单体的C末端融合,以增加Fc-抗原结合结构域构建体的血清半衰期。可以直接或通过接头将白蛋白结合肽与Fc结构域单体的N末端或C末端融合。

[0357] 如本文所用,术语“纯化肽”是指可以用于纯化、分离或鉴定多肽的任何长度的肽。可以将纯化肽与多肽连接以帮助从例如细胞裂解产物混合物中纯化多肽和/或分离多肽。在一些实施方案中,纯化肽结合对纯化肽具有特异性亲和力的另一部分。在一些实施方案中,将与纯化肽特异性结合的此类部分附接到固体支持物,诸如基质、树脂或琼脂糖珠。可与Fc-抗原结合结构域构建体连接的纯化肽的实例在本文中进一步详细描述。

[0358] 如本文所用,术语“多聚体”是指包括至少两个本文所述的缔合Fc构建体或Fc-抗原结合结构域构建体的分子。

[0359] 如本文所用,术语“多核苷酸”是指寡核苷酸或核苷酸以及它们的片段或部分,并且是指基因组或合成起源的DNA或RNA,它们可以是单链或双链的,并且代表有义链或反义链。单个多核苷酸被翻译成单个多肽。

[0360] 如本文所用,术语“多肽”描述了其中单体是通过酰胺键连接在一起的氨基酸残基的单个聚合物。多肽旨在涵盖天然存在、重组或合成产生的任何氨基酸序列。

[0361] 如本文所用,术语“氨基酸位置”是指蛋白质或蛋白质结构域中氨基酸的位置编号。在标出地方(例如,对于CDR和FR区)使用Kabat编号系统(Kabat等人,Sequences of Proteins of Immunological Interest,National Institutes of Health,Bethesda,Md.,第5版,1991)对氨基酸位置进行编号,否则使用EU编号。

[0362] 图24A-24D描绘了使用EU编号系统编号的人IgG1 Fc结构域。

[0363] 如本文所用,术语“氨基酸修饰”是指与参考序列(例如,野生型、未突变或未修饰Fc序列)相比可对以下项有影响并且可促进改善治疗免疫和炎症疾病的功效的Fc结构域多肽序列的改变:Fc构建体的药代动力学(PK)和/或药效动力学(PD)特性、血清半衰期、效应子功能(例如,细胞裂解(例如,抗体依赖性细胞介导的毒性(ADCC)和/或补体依赖性细胞毒性活性(CDC))、吞噬作用(例如,抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)和/或补体依赖性细胞毒性(CDCC))、免疫激活和T细胞激活)、对Fc受体(例如,Fc- γ 受体(Fc γ R)(例如,Fc γ RI(CD64)、Fc γ RIIa(CD32)、Fc γ RIIb(CD32)、Fc γ RIIIa(CD16a)和/或Fc γ RIIIb(CD16b))、Fc- α 受体(Fc α R)、Fc- ϵ 受体(Fc ϵ R)和/或新生儿Fc受体(FcRn))的亲和力、对参与补体级联的蛋白质(例如,C1q)的亲和力、翻译后修饰(例如,糖基化、唾液酸化)、聚合特性(例如,形成二聚体(例如,同二聚体和/或异二聚体)和/或多聚体的能力)以及生物物理特性(例如,改变C_H1与C_L之间的相互作用、改变稳定性和/或改变对温度和/或pH的敏感性)。氨基酸修饰包括氨基酸置换、缺失和/或插入。在一些实施方案中,氨基酸修饰是单一氨基酸的修饰。在其他实施方案中,氨基酸修饰是多个(例如,多于一个)氨基酸的修饰。氨基酸修饰可包括氨基酸置换、缺失和/或插入的组合。包括在氨基酸修饰的描述中的是编码Fc多肽的核苷酸序列的遗传(即DNA和RNA)改变,诸如点突变(例如,单个核苷酸与另一个核苷酸的交换)、插入和缺失(例如,一个或多个核苷酸的添加和/或移除)。

[0364] 在某些实施方案中,Fc构建体或Fc-抗原结合结构域构建体内的至少一个(例如,一个、两个或三个)Fc结构域单体包括氨基酸修饰(例如,置换)。在一些情况下,至少一个Fc结构域单体包括一个或多个(例如,不超过两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个或二十个)氨基酸修饰(例如,置换)。

[0365] 如本文所用,术语“同一性百分比(%)”是指在比对序列并引入缺口(如有需要)以实现最大同一性百分比(即,可以在候选序列和参考序列中的一者或两者中引入缺口以用于最佳比对,并且可以忽略非同源序列以用于比较目的)之后,候选序列(例如,本文所述的Fc-抗原结合结构域构建体中的Fc结构域单体的序列)的氨基酸(或核酸)残基与参考序列(例如,野生型Fc结构域单体的序列)的氨基酸(或核酸)残基相同的百分比。比对以用于确定同一性百分比的目的可以在本领域技术范围内的各种方式实现,例如使用可公开获得的计算机软件,诸如BLAST、ALIGN或Megalign(DNASTAR)软件。本领域技术人员可以确定用于测量比对的适当参数,包括在待比较的序列的全长上实现最大比对所需的任何算法。在一些实施方案中,如下计算给定候选序列和、与或相对于给定参考序列的氨基酸(或核酸)序列同一性百分比(其可以另选地表达为给定候选序列和、与或相对于给定参考序列具有或包括一定氨基酸(或核酸)序列同一性百分比):

[0366] $100 \times (A/B \text{ 的分数})$

[0367] 其中A是在候选序列和参考序列的比对中评分为相同的氨基酸(或核酸)残基的数目,并且其中B是参考序列中氨基酸(或核酸)残基的总数。在其中候选序列的长度不等于参考序列的长度的一些实施方案中,候选序列与参考序列的氨基酸(或核酸)序列同一性百分比不等于参考序列与候选序列的氨基酸(或核酸)序列同一性百分比。

[0368] 在特定实施方案中,用于与候选序列比较而进行比对的参考序列可显示,跨越候选序列的全长或候选序列的连续氨基酸(或核酸)残基的选定部分,候选序列显示出50%至100%的同一性(例如,50%至100%、60%至100%、70%至100%、80%至100%、90%至

100%、92%至100%、95%至100%、97%至100%、99%至100%或99.5%至100%的同一性)。用于比较目的而比对的候选序列的长度为参考序列长度的至少30%，例如至少40%，例如至少50%、60%、70%、80%、90%或100%。当候选序列中的位置被与参考序列中的相应位置相同的氨基酸(或核酸)残基占据时，则该分子在该位置处是相同的。

[0369] 在一些实施方案中，本文所述的Fc构建体(例如，具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体)中的Fc结构域单体可具有与野生型Fc结构域单体的序列(例如，SEQ ID NO:42)具有至少95%同一性(至少97%、99%或99.5%同一性)的序列。在一些实施方案中，本文所述的Fc构建体(例如，具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体)中的Fc结构域单体可具有与SEQ ID NO:44、46、48和50-53中任一者的序列具有至少95%同一性(至少97%、99%或99.5%同一性)的序列。在某些实施方案中，Fc构建体中的Fc结构域单体可具有与SEQ ID NO:48、52和53的序列具有至少95%同一性(至少97%、99%或99.5%同一性)的序列。

[0370] 在一些实施方案中，两个Fc结构域单体之间的间隔物可具有与本文进一步描述的SEQ ID NO:1-36(例如，SEQ ID NO:17、18、26和27)中任一者的序列具有至少75%同一性(至少75%、77%、79%、81%、83%、85%、87%、89%、91%、93%、95%、97%、99%、99.5%或100%同一性)的序列。

[0371] 如本文所用，术语“宿主细胞”是指包括从其对应的核酸表达蛋白质所需的必要细胞组分(例如，细胞器)的媒介物。核酸通常包括在核酸载体中，可以通过本领域已知的常规技术(转化、转染、电穿孔、磷酸钙沉淀、直接显微注射等)将所述核酸载体引入宿主细胞中。宿主细胞可以是原核细胞(例如，细菌细胞)或真核细胞(例如，哺乳动物细胞(例如，CHO细胞))。如本文所述，宿主细胞用于表达编码所需结构域的一种或多种多肽，然后将所述结构域组合以形成所需Fc-抗原结合结构域构建体。

[0372] 如本文所用，术语“药物组合物”是指含有活性成分以及一种或多种赋形剂和稀释剂以使活性成分能够适合于施用方法的医学或药物制剂。本公开的药物组合物包括与Fc-抗原结合结构域构建体相容的药理学上可接受的组分。药物组合物通常为用于静脉内或皮下施用的水性形式。

[0373] 如本文所用，多肽或Fc构建体的“基本上同质的群体”是指组合物(例如，细胞培养基或药物组合物)中至少50%的多肽或Fc构建体具有相同数量的Fc结构域，如通过非还原SDS凝胶电泳或尺寸排阻色谱测定的。多肽或Fc构建体的基本上同质的群体可在纯化之前或者在蛋白A或蛋白G纯化之后或者在只进行任何Fab或Fc特异性亲和色谱之后获得。在各种实施方案中，组合物中至少55%、60%、65%、70%、75%、80%或85%的多肽或Fc构建体具有相同数量的Fc结构域。在其他实施方案中，组合物中至多85%、90%、92%或95%的多肽或Fc构建体具有相同数量的Fc结构域。

[0374] 如本文所用，术语“药学可接受的载体”是指药物组合物中的赋形剂或稀释剂。药学可接受的载体必须与制剂的其他成分相容并且对接受者无害。在本公开中，药学上可接受的载体必须为Fc-抗原结合结构域构建体提供足够的药物稳定性。载体的性质因施用模式而异。例如，对于经口施用，固体载体是优选的；对于静脉内施用，一般使用水性溶液载体(例如，WFI和/或缓冲溶液)。

[0375] 如本文所用，“治疗有效量”是指有效诱导受试者或患者中的所需生物效应或者有

效治疗患有本文所述病症或障碍的患者的量,例如药物剂量。本文还应理解,“治疗有效量”可被解释为以一个剂量或以任何剂量或途径服用、单独或与其他治疗剂组合服用的给予所需治疗效果的量。

[0376] 如本文所用,术语“片段”和术语“部分”可以互换使用。

附图说明

[0377] 图1是包含两个Fc结构域和一个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体1)的图示。每个Fc结构域是两个Fc结构域单体的二聚体。两个Fc结构域单体(106和108)在其 C_H3 抗体恒定结构域中包含突起,而其他两个Fc结构域单体(112和114)在其 C_H3 抗体恒定结构域的并列位置中包含空腔。该构建体由三个包含Fc结构域单体的多肽形成。第一多肽(102)包含两个包含突起的Fc结构域单体(106和108),这两个Fc结构域单体通过间隔物与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(110)串联连接。包含 V_L 的结构域(104)与 V_H 结构域连接。第二多肽和第三多肽(112和114)中的每一者包含含空腔的Fc结构域单体。

[0378] 图2是包含三个Fc结构域和一个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体2)的图示。该构建体由四个包含Fc结构域单体的多肽形成。第一多肽(202)包含三个包含突起的Fc结构域(206、208和210),这些Fc结构域通过间隔物与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(212)串联连接。包含 V_L 的结构域(204)与 V_H 结构域连接。第二多肽、第三多肽和第四多肽(214、216和218)中的每一者包含含空腔的Fc结构域单体。

[0379] 图3是包含两个Fc结构域和两个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体3)的图示。该构建体由三个包含Fc结构域单体的多肽形成。第一多肽(302)包含两个含突起的Fc结构域单体(304和306),这两个Fc结构域单体通过间隔物串联连接。第二多肽和第三多肽(320和322)中的每一者包含含有空腔的Fc结构域单体(310和314),这两个Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(316和318)串联连接。包含 V_L 的结构域(308和312)与每个 V_H 结构域连接。

[0380] 图4是包含三个Fc结构域和三个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体4)的图示。该构建体由四个包含Fc结构域单体的多肽形成。第一多肽(402)包含三个含突起的Fc结构域单体(404、406和408),这些Fc结构域单体通过间隔物串联连接。第二多肽、第三多肽和第四多肽(428、430和432)中的每一者包含含有空腔的Fc结构域单体(426、420和414),这些Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(422、416和410)串联连接。包含 V_L 的结构域(424、418和412)与每个 V_H 结构域连接。

[0381] 图5是包含两个Fc结构域和三个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体5)的图示。该构建体由三个包含Fc结构域单体的多肽形成。第一多肽(502)包含两个包含突起的Fc结构域单体(508和506),这两个Fc结构域单体通过间隔物与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(510)串联连接。第二多肽和第三多肽(524和526)中的每一者包含含有空腔的Fc结构域单体(516和522),这两个Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(512和518)串联连接。包含 V_L 的结构域(504、514和520)与每个 V_H 结构域连接。

[0382] 图6是包含三个Fc结构域和四个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体6)的图示。该构建体由四个包含Fc单体的多肽形成。第一多肽(602)包含三个包含突起

的Fc结构域单体(606、608和610),这些Fc结构域单体通过间隔物与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(612)串联连接。第二多肽、第三多肽和第四多肽(632、634和636)中的每一者包含含有空腔的Fc结构域单体(618、624和630),这些Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(616、622和628)串联连接。包含 V_L 的结构域(604、616、622和628)与每个 V_H 结构域连接。

[0383] 图7是包含三个Fc结构域和两个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体7)的图示。该Fc-抗原结合结构域构建体包含两个Fc结构域单体(706和718)的二聚体,其中两个Fc结构域单体在它们的 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电荷氨基酸以促进这两个Fc结构域单体之间的有利静电相互作用。该构建体由四个包含Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(702和724)各自包含含有突起的Fc结构域单体(710和720),这两个Fc结构域单体通过间隔物与在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体(706和718)和在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(712和714)串联连接。第三多肽和第四多肽(708和722)各自包含含有空腔的Fc结构域单体。包含 V_L 的结构域(704和716)与每个 V_H 结构域连接。

[0384] 图8是包含三个Fc结构域和两个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体8)的图示。该构建体由四个含有Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(802和828)各自包含含有突起的Fc结构域单体(814和820),这两个Fc结构域单体通过间隔物与在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体(810和816)串联连接。第三多肽和第四多肽(804和826)各自包含含有空腔的Fc结构域单体(808和824),这两个Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(812和818)串联连接。包含 V_L 的结构域(806和822)与每个 V_H 结构域连接。

[0385] 图9是包含三个Fc结构域和四个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体9)的图示。该构建体由四个含有Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(902和936)各自包含含有突起的Fc结构域单体(918和928),这两个Fc结构域单体通过间隔物与在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体(910和924)和在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(908和920)串联连接。第三多肽和第四多肽(904和934)包含含有空腔的Fc结构域单体(916和932),这两个Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(912和926)串联连接。包含 V_L 的结构域(906、914、922和930)与每个 V_H 结构域连接。

[0386] 图10是包含五个Fc结构域和两个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体10)的图示。该构建体由六个包含Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(1002和1032)各自包含含有突起的Fc结构域单体(1016和1030),这两个Fc结构域单体通过间隔物与另一个包含突起的Fc结构域单体(1014和1028)、在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体(1008和1022)和在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(1006和1018)串联连接。第三多肽、第四多肽、第五多肽和第六多肽(1012、1010、1026和1024)各自包含含有空腔的Fc结构域单体。包含 V_L 的结构域(1004和1020)与每个 V_H 结构域连接。

[0387] 图11是包含五个Fc结构域和四个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体11)的图示。该构建体由六个包含Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(1102和1148)包含含有突起的Fc结构域单体(1118和1132),这两个Fc结构域单体通过间隔物与另一个含突起的Fc结构域单体(1120和1130)以及在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨

基酸的Fc结构域单体(1124和1126)串联连接。第三多肽、第四多肽、第五多肽和第六多肽(1106、1104、1144和1146)各自包含含有空腔的Fc结构域单体(1116、1110、1134和1140),这些Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(1112、1122、1138和1128)串联连接。包含 V_L 的结构域(1108、1114、1135和1142)与每个 V_H 结构域连接。

[0388] 图12是包含五个Fc结构域和六个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体12)的图示。该构建体由六个包含Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(1202和1256)包含含有突起的Fc结构域单体(1224和1230),这两个Fc结构域单体通过间隔物与另一个包含突起的Fc结构域单体(1226和1228)、在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体(1210和1244)和在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(1250和1248)串联连接。第三多肽、第四多肽、第五多肽和第六多肽(1206、1204、1254和1252)各自包含含有空腔的Fc结构域单体(1222、1216、1232和1238),这些Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(1218、1212、1236和1242)串联连接。包含 V_L 的结构域(1208、1214、1220、1234、1240和1246)与每个 V_H 结构域连接。

[0389] 图13是包含三个Fc结构域和两个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体13)的图示。该构建体由四个含有Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(1302和1324)包含在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体(1308和1318),这两个Fc结构域单体通过间隔物与包含突起的Fc结构域单体(1312和1316)和在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(1310和1314)串联连接。第三多肽和第四多肽(1306和1320)包含含空腔的Fc结构域单体。包含 V_L 的结构域(1304和1322)与每个 V_H 结构域连接。

[0390] 图14是包含三个Fc结构域和两个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体14)的图示。该构建体由四个含有Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(1404和1426)包含在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体(1308和1318),这两个Fc结构域单体通过间隔物与含突起的Fc结构域单体(1414和1418)串联连接。第三多肽和第四多肽(1402和1428)各自包含含有空腔的Fc结构域单体(1410和1422),这两个Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(1408和1416)串联连接。包含 V_L 的结构域(1406和1424)与每个 V_H 结构域连接。

[0391] 图15是包含三个Fc结构域和四个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体15)的图示。该构建体由四个含有Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(1502和1536)包含在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体(1512和1524),这两个Fc结构域单体通过间隔物与包含突起的Fc结构域单体(1518和1522)和在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(1514和1532)串联连接。第三多肽和第四多肽(1504和1534)包含含有空腔的Fc结构域单体(1510和1526),这两个Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(1508和1530)串联连接。包含 V_L 的结构域(1506、1516、1520和1528)与每个 V_H 结构域连接。

[0392] 图16是包含五个Fc结构域和两个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体(构建体16)的图示。该构建体由六个包含Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽(1602和1632)包含在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体(1610和1624),这两个Fc结构域单体通过间隔物与包含突起的Fc结构域单体(1612和1622)、第二包含突起的Fc结构域单体(1614和1620)和在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域(1616和

1618) 串联连接。第三多肽、第四多肽、第五多肽和第六多肽 (1608、1606、1626和1628) 各自包含含空腔的Fc结构域。包含 V_L 的结构域 (1604和1630) 与每个 V_H 结构域连接。

[0393] 图17是包含五个Fc结构域和四个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体 (构建体17) 的图示。该构建体由六个包含Fc单体的多肽形成。两个多肽 (1702和1748) 包含在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体 (1718和1732), 这两个Fc结构域单体通过间隔物与含突起的Fc结构域单体 (1720和1730) 和N末端处含突起的Fc结构域单体 (1722和1728) 串联连接。第三多肽、第四多肽、第五多肽和第六多肽 (1706、1704、1746和1744) 包含含有空腔的Fc结构域单体 (1716、1710、1734和1740), 这些Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域 (1712、1724、1738和1726) 串联连接。包含 V_L 的结构域 (1708、1714、1736和1742) 与每个 V_H 结构域连接。

[0394] 图18是包含五个Fc结构域和六个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体 (构建体18) 的图示。该构建体由六个包含Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽 (1802和1856) 包含在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体 (1818和1838), 这两个Fc结构域单体通过间隔物与包含突起的Fc结构域单体 (1820和1836)、第二包含突起的Fc结构域单体 (1822和1834) 和在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域 (1826和1830) 串联连接。第三多肽、第四多肽、第五多肽和第六多肽 (1806、1804、1854和1852) 各自包含含有空腔的Fc结构域单体 (1816、1810、1840和1846), 这些Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域 (1812、1828、1844和1850) 串联连接。包含 V_L 的结构域 (1808、1814、1824、1832、1842和1848) 与每个 V_H 结构域连接。

[0395] 图19是包含五个Fc结构域和两个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体 (构建体19) 的图示。该构建体由六个包含Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽 (1902和1932) 包含含有突起的Fc结构域单体 (1912和1930), 这两个Fc结构域单体通过间隔物与在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体 (1908和1926)、包含突起的Fc结构域单体 (1916和1918) 和在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域 (1914和1920) 串联连接。第三多肽和第四多肽 (1910和1928) 包含含有空腔的Fc结构域单体, 并且第五多肽和第六多肽 (1906和1924) 包含含有空腔的Fc结构域单体。包含 V_L 的结构域 (1904和1922) 与每个 V_H 结构域连接。

[0396] 图20是包含五个Fc结构域和四个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体 (构建体20) 的图示。该构建体由六个包含Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽 (2002和2048) 包含含突起的Fc结构域单体 (2020和2022), 这两个Fc结构域单体通过间隔物与在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体 (2012和2030) 和N末端处含突起的Fc结构域单体 (2040和2038) 串联连接。第三多肽、第四多肽、第五多肽和第六多肽 (2006、2004、2046和2044) 各自包含含有空腔的Fc结构域单体 (2018、2010、2024和2032), 这些Fc结构域单体与在N末端包含 V_H 结构域的CCR4结合结构域 (2014、2042、2028和2036) 串联连接。包含 V_L 的结构域 (2008、2016、2026和2034) 与每个 V_H 结构域连接。

[0397] 图21是包含五个Fc结构域和六个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体 (构建体21) 的图示。该构建体由六个包含Fc结构域单体的多肽形成。两个多肽 (2102和2156) 包含含有突起的Fc结构域单体 (2120和2122), 这两个Fc结构域单体通过间隔物与在 C_H3-C_H3 界面处包含与WT序列不同的带电氨基酸的Fc结构域单体 (2112和2130)、另一个包含

突起的Fc结构域单体(2144和2142)和在N末端包含V_H结构域的CCR4结合结构域(2148和2138)串联连接。第三多肽、第四多肽、第五多肽和第六多肽(2106、2104、2154和2152)各自包含含有空腔的Fc结构域单体(2118、2110、2124和2132),这些Fc结构域单体与在N末端包含V_H结构域的CCR4结合结构域(2114、2150、2128和2136)串联连接。包含V_L的结构域(2108、2116、2126、2134、2140和2146)与每个V_H结构域连接。

[0398] 图22是示出利用靶向B细胞的各种抗CD20构建体的CDC、ADCP和ADCC测定的结果的三个图。第一个图表明,S3Y Fc-抗原结合结构域构建体可以介导CDC。中间图表明,SAI和S3Y Fc-抗原结合结构域构建体在ADCP Fc γ RIIa报告基因测定中均表现出>100倍的增强效力。第三个图表明,SAI和S3Y Fc-抗原结合结构域构建体表现出相对于岩藻糖基化mAb增强的ADCC活性,以及与无岩藻糖基化mAb相似的活性。

[0399] 图23A-23C是可以将CCR4结合结构域与Fc构建体的Fc结构域连接的三种示例性方式的示意性表示。小图A示出了CCR4结合结构域的重链组分可以表达为Fc链的融合蛋白,并且轻链组分可以表达为单独的多肽。小图B示出了表达为长Fc链的融合蛋白的scFv。小图C示出了单独表达并且外源添加到Fc-抗原结合结构域构建体中并利用化学键与Fc-抗原结合结构域构建体连接的重链和轻链组C

[0400] 图24A描绘了具有EU编号的人IgG1的氨基酸序列(SEQ ID NO:43)。铰链区用双下划线标出,CH2结构域未用下划线标出,而CH3区用下划线标出。

[0401] 图24B描绘了具有EU编号的人IgG1的氨基酸序列(SEQ ID NO:45)。缺少E216-C220(包括端点)的铰链区用双下划线标出,CH2结构域未用下划线标出,而CH3区用下划线标出并且缺少K447。

[0402] 图24C描绘了具有EU编号的人IgG1的氨基酸序列(SEQ ID NO:47)。铰链区用双下划线标出,CH2结构域未用下划线标出,而CH3区用下划线标出并且缺少447K。

[0403] 图24D描绘了具有EU编号的人IgG1的氨基酸序列(SEQ ID NO:42)。缺少E216-C220(包括端点)的铰链区用双下划线标出,CH2结构域未用下划线标出,而CH3区用下划线标出。

[0404] 图25描绘了利用抗CCR4构建体进行ADCC测定的结果。

具体实施方式

[0405] 许多治疗性抗体通过Fc结构域的效应子功能(诸如抗体依赖性细胞毒性(ADCC)、抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)和补体依赖性细胞毒性(CDC))募集先天免疫系统的元件而发挥作用。在一些情况下,本公开设想将已知含单个Fc结构域的治疗剂(例如,已知治疗性抗体)的CCR4结合结构域与至少两个Fc结构域组合以产生具有独特生物活性的新型治疗剂。在一些情况下,本文公开的新型治疗剂具有比已知含Fc结构域的治疗剂(例如,已知治疗性抗体)更大的生物活性。至少两个Fc结构域的存在可以增强效应子功能并激活多种效应子功能,诸如ADCC结合ADCP和/或CDC,从而提高治疗性分子的功效。为了产生具有一致生物功能的产物,控制Fc结构域的数量是至关重要的。本公开的特征在于一组Fc工程化工具,以控制编码Fc结构域的肽的同二聚化和异二聚化,以由有限数量的多肽链组装离散大小的分子。国际公开号W0/2015/168643、W02017/151971、W0 2017/205436和W0 2017/205434公开了用于组装具有两个或更多个Fc结构域的分子的Fc工程化工具和方法,并且通过引用整体并入本文。这些工程化工具包括可显著改善制造结果的结构特征(例如,甘氨酸接头)。这

些构建体的特性允许有效产生基本上同质的药物组合物。药物组合物中的此类同质性是期望的,以便确保药物组合物的安全性、功效、均匀性和可靠性。在药物组合物中具有高度同质性还使由不需要的材料(例如,降解产物和/或聚集产物或多聚体)引起的药物产品的潜在聚集或降解降到最低,以及限制由不需要的材料引起的脱靶效应和不良副作用。

[0406] 如本文详细描述,我们通过使用以下方法来工程化Fc-抗原结合结构域构建体的Fc结构域组分改善了组合物的同质性:包括使用仅包含甘氨酸残基的间隔物串联连接两个Fc结构域单体,使用移除末端赖氨酸残基的多肽序列,以及使用两组异二聚化选择性模块:(i)具有不同反向电荷突变的异二聚化选择性模块,以及(ii)具有工程化空腔和突起的异二聚化选择性模块。

[0407] 我们使用一条包含多个被接头分开的Fc序列的长肽链以及包含单个Fc序列的短链的多个拷贝设计了一系列其中Fc结构域串联连接的Fc-抗原结合结构域构建体(Fc-抗原结合域构建体1-6;图1至图6)。将异二聚体化突变引入每个Fc序列中,以确保组装成所需的串联构型,而最小化形成较小或较大复合物。可以以这种方式串联连接任意数量的Fc结构域,从而允许创建具有2、3、4、5、6、7、8、9、10个或更多个Fc结构域的构建体。对于具有N个Fc结构域的肽,可以将此类构建体制备成具有1至N+1个CCR4结合结构域,这分别取决于将CCR4结合结构域引入长肽链、短肽链还是两者中。

[0408] 在Fc-抗原结合结构域构建体1-6(图1至图6)中,Fc结构域与Fc结构域之间的单个分支点连接。这些构建体包括包含多个被接头分开的Fc序列的长肽链的两个拷贝,其中分支Fc序列包含同二聚化突变,并且非分支Fc结构域包含异二聚化突变。包含单个Fc序列且具有与长链中异二聚化突变互补的突变的短链的多个拷贝用于完成多聚体Fc支架。异二聚化Fc结构域可以与C末端(例如,Fc-抗原结合结构域构建体7-12;图7至图12)、N末端(例如,Fc-抗原结合结构域构建体13-18;图13至图18)或分支Fc结构域的两端(例如,Fc-抗原结合结构域构建体19-21;图19至图21)连接。串联的多个Fc结构域可以与分支Fc结构域的任一端连接。可将CCR4结合结构域引入长肽链中,使得每个组装蛋白质分子有两个CCR4结合结构域。另选地,可以将CCR4结合结构域引入短肽链中,使得每个组装蛋白质分子有N-1个CCR4结合结构域,其中N是组装蛋白质分子中Fc结构域的数量。如果将CCR4结合结构域引入短肽链和长肽链两者中,则所得的组装蛋白分子包含N+1个CCR4结合结构域。

[0409] 过去针对单克隆抗体(mAb)和Fc结构域进行的工程化工作包括在Fc结构域中进行突变以增强与Fc γ RIIIa的结合,从而增强抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)反应,以及对Fc结构域进行无岩藻糖基化以增强与Fc γ RIIIa的结合,从而增强ADCC反应。

[0410] 本公开中所公开的Fc-抗原结合结构域构建体与在Fc结构域中具有突变以增强与Fc γ RIIIa的结合或Fc结构域的无岩藻糖基化的抗体相比,出乎意料地能够增强与多种类型的Fc γ 受体的结合以及多种细胞毒性途径的活性。本公开的Fc-抗原结合结构域构建体与它们对应的岩藻糖基化和无岩藻糖基化亲本单克隆抗体相比,可以增强与Fc γ RIIa和Fc γ RIIIa的结合(参见实施例46)。此外,本公开的Fc-抗原结合结构域构建体除了增强ADCC途径应答之外,出乎意料地能够介导补体依赖性细胞毒性(CDC)途径和/或抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)途径(参见实施例47)。

[0411] I.Fc结构域单体

[0412] Fc结构域单体包括铰链结构域、C_H2抗体恒定结构域和C_H3抗体恒定结构域(例如,

人IgG1铰链、C_H2抗体恒定结构域和具有任选氨基酸置换的C_H3抗体恒定结构域)的至少一部分。Fc结构域单体可以是免疫球蛋白抗体同种型IgG、IgE、IgM、IgA或IgD。Fc结构域单体也可以是任何免疫球蛋白抗体同种型(例如,IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3或IgG4)。Fc结构域单体也可以是杂合体,例如具有来自IgG1的铰链和C_H2以及来自IgA的C_H3或者具有来自IgG1的铰链和C_H2以及来自IgG3的C_H3。Fc结构域单体的二聚体是可以结合Fc受体(例如,Fc γ RIIa,一种位于白细胞的表面上的受体)的Fc结构域(本文进一步定义)。在本公开中,Fc结构域单体的C_H3抗体恒定结构域可在C_H3-C_H3抗体恒定结构域的界面处含有氨基酸置换,以促进它们彼此的缔合。在其他实施方案中,Fc结构域单体包括附接到N末端或C末端的附加部分,例如白蛋白结合肽或纯化肽。在本公开中,Fc结构域单体不含有任何类型的抗体可变区,例如V_H、V_L、互补决定区(CDR)或高变区(HVR)。

[0413] 在一些实施方案中,本文所述的Fc-抗原结合结构域构建体(例如,具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体)中的Fc结构域单体可具有与SEQ ID NO:42的序列具有至少95%同一性(至少97%、99%或99.5%同一性)的序列。在一些实施方案中,本文所述的Fc-抗原结合结构域构建体(例如,具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体)中的Fc结构域单体可具有与SEQ ID NO:44、46、48和50-53中任一者的序列具有至少95%同一性(至少97%、99%或99.5%同一性)的序列。在某些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体中的Fc结构域单体可具有与SEQ ID NO:48、52和53中任一者的序列具有至少95%同一性(至少97%、99%或99.5%同一性)的序列。

[0414] SEQ ID NO:42

[0415] DKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVSCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK

[0416] SEQ ID NO:44

[0417] DKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVCTLPSPRDELTKNQVSLSCAVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLVSKLTVDKSRWQQGNVSCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK

[0418] SEQ ID NO:46

[0419] DKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVCTLPSPRDELTKNQVSLSCAVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLVSKLTVDKSRWQQGNVSCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG

[0420] SEQ ID NO:48

[0421] DKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVCTLPSPRDELTKNQVSLSCAVDGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLVSKLTVDKSRWQQGNVSCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG

[0422] SEQ ID NO:50

[0423] DKHTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKT
KPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLW
CLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSL
SPGK

[0424] SEQ ID NO:51

[0425] DKHTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKT
KPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLT
CLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSDLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSL
SPGK

[0426] SEQ ID NO:52

[0427] DKHTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKT
KPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKNQVSLT
CLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSDLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSL
SPG

[0428] SEQ ID NO:53

[0429] DKHTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKT
KPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPCRDKLTKNQVSLW
CLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSL
SPGK

[0430] II.Fc结构域

[0431] 如本文所定义,Fc结构域包括两个Fc结构域单体,它们通过 C_H3 抗体恒定结构域之间的相互作用而二聚化。Fc结构域形成与Fc受体(例如,Fc- γ 受体(即Fc γ 受体(Fc γ R))、Fc- α 受体(即Fc α 受体(Fc α R))、Fc- ϵ 受体(即Fc ϵ 受体(Fc ϵ R))和/或新生儿Fc受体(FcRn))结合的最小结构。在一些实施方案中,本公开的Fc结构域与Fc γ 受体(例如,Fc γ RI(CD64)、Fc γ RIIa(CD32)、Fc γ RIIb(CD32)、Fc γ RIIIa(CD16a)、Fc γ RIIIb(CD16b))和/或Fc γ RIV和/或新生儿Fc受体(FcRn)结合。

[0432] III.CCR4结合结构域

[0433] 抗原结合结构域包括特异性结合靶分子的一种或多种肽或多肽。CCR4结合结构域可包括抗体的CCR4结合结构域。在一些实施方案中,CCR4结合结构域可以是抗体或抗体构建体的片段,例如抗体的与靶抗原结合的最小部分。CCR4结合结构域也可以是特异性结合靶标的合成工程化肽,例如基于纤连蛋白的结合蛋白(例如,Fn3单体)。

[0434] 片段抗原结合(Fab)片段是抗体上与靶抗原结合的区域。它由重链和轻链中每一者的一个恒定结构域和一个可变结构域构成。Fab片段包括 V_H 、 V_L 、 C_H1 和 C_L 结构域。可变结构域 V_H 和 V_L 各自在单体的氨基末端处包含一组3个互补决定区(CDR)。Fab片段可以是免疫球蛋白抗体同种型IgG、IgE、IgM、IgA或IgD。Fab片段单体也可以是任何免疫球蛋白抗体同种型(例如,IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3或IgG4)。在一些实施方案中,在对免疫球蛋白进行蛋白酶(例如,胃蛋白酶)处理之后,Fab片段可共价附接到第二相同的Fab片段,从而形成 $F(ab')_2$ 片段。在一些实施方案中,Fab可表达为单个多肽,该单个多肽包括例如与结构域之间的接头融合的可变结构域和恒定结构域。

[0435] 在一些实施方案中, 可仅使用Fab片段的一部分作为CCR4结合结构域。在一些实施方案中, 可仅使用Fab的轻链组分 (V_L+C_L), 或者可仅使用Fab的重链组分 (V_H+C_H)。在一些实施方案中, 可使用单链可变片段 (scFv), 该单链可变片段是Fab可变区的 V_H 和 V_L 链的融合蛋白。在其他实施方案中, 可使用线性抗体, 该线性抗体包括一对串联Fd区段 ($V_H-C_H1-V_H-C_H1$), 该对串联Fd区段与互补轻链多肽一起形成一对CCR4结合区。

[0436] 在一些实施方案中, 本公开的CCR4结合结构域包括表1中列出的靶标或抗原, 以及表1中针对所列出的靶标或抗原列出的一个、两个、三个、四个、五个或全部六个CDR序列, 如下表1进一步详细提供。

[0437] 表1: CDR序列

	抗体名称	CDR1- IMGT (重)	CDR2- IMGT (重)	CDR3-IMGT (重)	CDR1- IMGT (轻)	CDR2- IMGT (轻)	CDR3- IMGT (轻)
[0438]	莫加珠单抗 (Mogamulizumab)	GFIFSNY G (SEQ ID NO: xxx)	ISSASTYS (SEQ ID NO: xxx)	GRHSDGNF AFGY (SEQ ID NO: xxx)	RNIVHING DTY (SEQ ID NO: xxx)	KVS	FQGSLLPW T (SEQ ID NO: xxx)

[0439] 表2: VH和VL序列

	抗体名称	VH	VL
[0440]	莫加珠单抗 (Mogamulizumab)		

[0441] Fc-抗原结合结构域构建体1的CCR4结合结构域(图1中的110/104)可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0442] Fc-抗原结合结构域构建体2的CCR4结合结构域(图2中的212/204)可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0443] Fc-抗原结合结构域构建体3的CCR4结合结构域(图3中的308/316和312/318)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0444] Fc-抗原结合结构域构建体4的CCR4结合结构域(图4中的410/412、416/418和422/424)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0445] Fc-抗原结合结构域构建体5的CCR4结合结构域(图5中的510/504、512/514和518/520)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0446] Fc-抗原结合结构域构建体6的CCR4结合结构域(图6中的612/604、614/616、620/622和626/628)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0447] Fc-抗原结合结构域构建体7的CCR4结合结构域(图7中的712/714和714/716)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0448] Fc-抗原结合结构域构建体8的CCR4结合结构域(图8中的812/806和818/822)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0449] Fc-抗原结合结构域构建体9的CCR4结合结构域(图9中的908/906、920/922、912/914和926/930)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0450] Fc-抗原结合结构域构建体10的CCR4结合结构域(图10中的1006/1004和1018/1020)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0451] Fc-抗原结合结构域构建体11的CCR4结合结构域(图11中的1112/1114、1122/1108、1128/1142和1138/1136)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0452] Fc-抗原结合结构域构建体12的CCR4结合结构域(图12中的1218/1220、1212/1214、1250/1208、1248/1246、1242/1240和1236/1234)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0453] Fc-抗原结合结构域构建体13的CCR4结合结构域(图13中的1310/1304和1314/1322)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0454] Fc-抗原结合结构域构建体14的CCR4结合结构域(图14中的1408/1406和1416/1424)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0455] Fc-抗原结合结构域构建体15的CCR4结合结构域(图15中的1508/1506、1514/1516、1532/1520和1530/1528)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0456] Fc-抗原结合结构域构建体16的CCR4结合结构域(图16中的1616/1604和1618/1630)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0457] Fc-抗原结合结构域构建体17的CCR4结合结构域(图17中的1712/1714、1724/1708、1726/1742和1738/1736)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0458] Fc-抗原结合结构域构建体18的CCR4结合结构域(图18中的1812/1814、1828/1808、1826/1824、1830/1832、1850/1848和1844/1842)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0459] Fc-抗原结合结构域构建体19的CCR4结合结构域(图19中的1914/1904和1920/1922)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0460] Fc-抗原结合结构域构建体20的CCR4结合结构域(图20中的2014/2016、2042/2008、2036/2034和2028/2026)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0461] Fc-抗原结合结构域构建体21的CCR4结合结构域(图21中的2114/2116、2150/2108、2148/2146、2138/2140、2136/2134和2128/2126)各自可以包括表1中列出的抗体中的任何一种的三个重链和三个轻链CDR序列。

[0462] IV. 二聚化选择性模块

[0463] 在本公开中,二聚化选择性模块包括Fc结构域单体内的组分或选择性氨基酸,所述组分或选择性氨基酸促进两个Fc结构域单体的优选配对以形成Fc结构域。具体地,二聚化选择性模块是Fc结构域单体的C_H3抗体恒定结构域的部分,该部分包括位于两个Fc结构域单体的相互作用的C_H3抗体恒定结构域之间的界面处的氨基酸置换。在二聚化选择性模块中,由于针对氨基酸置换选择的氨基酸的相容性,那些置换使得两个C_H3抗体恒定结构域的二聚化变得有利。有利的Fc结构域的最终形成选择性超过其他Fc结构域,所述其他Fc结构域由缺少二聚化选择性模块的Fc结构域单体形成或在二聚化选择性模块中具有不相容

的氨基酸置换。这种类型的氨基酸置换可以使用本领域众所周知的常规分子克隆技术(诸如QuikChange[®]诱变)产生。

[0464] 在一些实施方案中,二聚化选择性模块在C_H3抗体恒定结构域中包括工程化空腔(或本文进一步描述的“孔洞”)。在其他实施方案中,二聚化选择性模块在C_H3抗体恒定结构域中包括工程化突起(或本文进一步描述的“旋钮”)。为了选择性地形成Fc结构域,具有相容二聚化选择性模块的两个Fc结构域单体(例如,含有工程化空腔的一个C_H3抗体恒定结构域和含有工程化突起的另一个C_H3抗体恒定结构域)组合以形成Fc结构域单体的突起-进入-空腔(或“旋钮和孔洞”)对。工程化突起和工程化空腔是异二聚化选择性模块的实例,它们可以在Fc结构域单体的C_H3抗体恒定结构域中产生,以便促进具有相容异二聚化选择性模块的两个Fc结构域单体的有利异二聚化。表3列出了合适的突变。

[0465] 在其他实施方案中,通过使用具有包含带正电荷的氨基酸置换的二聚化选择性模块的Fc结构域单体和具有包含带负电荷的氨基酸置换的二聚化选择性模块的Fc结构域单体而实现的异二聚化可通过带电氨基酸的有利静电转向(本文进一步描述)选择性地组合以形成Fc结构域。在一些实施方案中,Fc结构域单体可以包括下述带正电荷和带负电荷的氨基酸置换之一:K392D、K392E、D399K、K409D、K409E、K439D和K439E。在一个实例中,包含带正电荷的氨基酸置换(例如,D356K或E357K)的Fc结构域单体和包含带负电荷的氨基酸置换(例如,K370D或K370E)的Fc结构域单体可通过带电氨基酸的有利静电转向选择性地组合以形成Fc结构域。在另一个实例中,包含E357K的Fc结构域单体和包含K370D的Fc结构域单体可通过带电氨基酸的有利静电转向选择性地组合以形成Fc结构域。在一些实施方案中,可将反向电荷氨基酸置换用作异二聚化选择性模块,其中包含不同但相容的反向电荷氨基酸置换的两个Fc结构域单体组合以形成异二聚体Fc结构域。表3列出了用于促进异二聚化的各种带相反电荷的二聚化选择性模块。

[0466] 除了旋钮和孔洞突变以及静电转向突变之外,还存在可以用于促进异二聚化的其他类型的突变。这些突变也在表3中列出。

[0467] 在其他实施方案中,两个Fc结构域单体包括在C_H3结构域之间的界面处的带电残基环内至少两个位置中包含相同的反向电荷突变的同二聚化选择性模块。同二聚体选择性模块是促进Fc结构域单体的同二聚化以形成同二聚体Fc结构域的反向电荷氨基酸置换。通过逆转两个Fc结构域单体中的两个或更多个互补残基对的两个成员的电荷,突变的Fc结构域单体保持与相同突变序列的Fc结构域单体互补,但与不含那些突变的Fc结构域单体具有更低的互补性。在一个实施方案中,Fc结构域包括Fc结构域单体,其包括双重突变体K409D/D399K、K392D/D399K、E357K/K370E、D356K/K439D、K409E/D399K、K392E/D399K、E357K/K370D或D356K/K439E。在另一个实施方案中,Fc结构域包括Fc结构域单体,其包括组合任何一对双重突变体的四重突变体,例如K409D/D399K/E357K/K370E。表4A和表4B列出了促进同二聚化的各种选择性。

[0468] 在其他实施方案中,含有(i)至少一个反向电荷突变和(ii)至少一个工程化空腔或至少一个工程化突起的Fc结构域单体可与另一个含有(i)至少一个反向电荷突变和(ii)至少一个工程化突起或至少一个工程化空腔的Fc结构域单体选择性地组合以形成Fc结构域。例如,含有反向电荷突变K370D和工程化空腔Y349C、T366S、L368A和Y407V的Fc结构域单体以及另一个含有反向电荷突变E357K和工程化突起S354C和T366W的Fc结构域单体可选

择性地组合以形成Fc结构域。

[0469] 此类Fc结构域的形成通过 C_H3 抗体恒定结构域中的相容氨基酸置换来促进。含有不相容氨基酸置换的两个二聚化选择性模块(例如,两者均含有工程化空腔,两者均含有工程化突起,或两者均在 C_H3 - C_H3 界面处含有相同的带电氨基酸)不会促进异二聚体Fc结构域的形成。

[0470] 此外,用于促进具有明确的Fc结构域单体的Fc结构域的形成其他方法包括但不限于:LUZ-Y方法(美国专利申请公开号W02011034605),该方法包括使亮氨酸拉链的单体 α -螺旋与每个Fc结构域单体进行C末端融合,以允许异二聚体形成;以及链交换工程化结构域(SEED)主体方法(Davis等人,Protein Eng Des Sel.23:195-202,2010),该方法生成具有异二聚体Fc结构域单体的Fc结构域,这些异二聚体Fc结构域单体各自包括IgA和IgG C_H3 序列的交替区段。

[0471] V. 工程化空腔和工程化突起

[0472] Carter和同事(Ridgway等人,Protein Eng.9:617-612,1996;Atwell等人,J Mol Biol.270:26-35,1997;Merchant等人,Nat Biotechnol.16:677-681,1998)描述了工程化空腔和工程化突起(或“旋钮-进入-孔洞”策略)的用途。旋钮和孔洞相互作用有利于异二聚体形成,而旋钮-旋钮和孔洞-孔洞相互作用由于空间冲突和有利相互作用的缺失会阻碍同二聚体形成。“旋钮-进入-孔洞”技术也在美国专利号5,731,168中公开。

[0473] 在本公开中,工程化空腔和工程化突起用于制备本文所述的Fc-抗原结合结构域构建体。工程化空腔是当用具有较小侧链体积的不同氨基酸替换蛋白质中的原始氨基酸时产生的空隙。工程化突起是当用具有较大侧链体积的不同氨基酸替换蛋白质中的原始氨基酸时产生的突起。具体地,被替换的氨基酸位于Fc结构域单体的 C_H3 抗体恒定结构域中,并且涉及两个Fc结构域单体的二聚化。在一些实施方案中,产生一个 C_H3 抗体恒定结构域中的工程化空腔,以容纳另一个 C_H3 抗体恒定结构域中的工程化突起,使得两个 C_H3 抗体恒定结构域均充当促进或有利于两个Fc结构域单体的二聚化的二聚化选择性模块(例如,异二聚化选择性模块)(上文描述)。在其他实施方案中,产生一个 C_H3 抗体恒定结构域中的工程化空腔,以更好地容纳另一个 C_H3 抗体恒定结构域中的原始氨基酸。在另外其他实施方案中,产生一个 C_H3 抗体恒定结构域中的工程化突起,以与另一个 C_H3 抗体恒定结构域中的原始氨基酸形成另外的相互作用。

[0474] 可以通过用含有较小侧链的氨基酸(诸如丙氨酸、缬氨酸或苏氨酸)替换含有较大侧链(诸如酪氨酸或色氨酸)的氨基酸来构建工程化空腔。具体地,一些二聚化选择性模块(例如,异二聚化选择性模块)(上文进一步描述)含有工程化空腔,诸如 C_H3 抗体恒定结构域中的Y407V突变。类似地,可以通过用含有较大侧链的氨基酸替换含有较小侧链的氨基酸来构建工程化突起。具体地,一些二聚化选择性模块(例如,异二聚化选择性模块)(上文进一步描述)含有工程化突起,诸如 C_H3 抗体恒定结构域中的T366W突变。在本公开中,还将工程化空腔和工程化突起与 C_H3 结构域间二硫键工程化组合,以增强异二聚体形成。在一个实例中,含有工程化空腔Y349C、T366S、L368A和Y407V的Fc结构域单体可与含有工程化突起S354C和T366W的另一个Fc结构域单体选择性地组合以形成Fc结构域。在另一个实例中,含有添加有Y349C的工程化空腔的Fc结构域单体和含有添加有S354C的工程化突起的Fc结构域单体可选择性地组合以形成Fc结构域。与二硫键工程化或结构计算(混合HA-TF)组合的

其他工程化空腔和工程化突起包括在表3中,但不限于此。

[0475] 用不同的氨基酸残基替换 C_H3 抗体恒定结构域中的原始氨基酸残基可以通过改变编码原始氨基酸残基的核酸来实现。可以被替换的原始氨基酸残基的数量上限是 C_H3 抗体恒定结构域的界面中的残基总数,只要仍维持界面处充分的相互作用。

[0476] 将工程化空腔和工程化突起与静电转向组合

[0477] 可以将静电转向与旋钮-进入-孔洞调节技术组合,以有利于例如两个不同多肽中的Fc结构域单体之间的异二聚化作用。下文更详细描述静电转向利用肽、蛋白质结构域和蛋白质中带相反电荷的氨基酸之间的有利静电相互作用来控制更高级蛋白质分子的形成。可以使用静电转向来促进同二聚化或异二聚化,可以将后者有效地与旋钮-进入-孔洞技术组合。在异二聚化的情况下,将不同但相容的突变引入要异二聚化的每个Fc结构域单体中。因此,可以修饰Fc结构域单体以包括以下带正电荷和带负电荷的氨基酸置换中的一者:D356K、D356R、E357K、E357R、K370D、K370E、K392D、K392E、D399K、K409D、K409E、K439D和K439E。例如,一个Fc结构域单体(例如,具有空腔(Y349C、T366S、L368A和Y407V)的Fc结构域单体)还可以包括K370D突变,并且另一个Fc结构域单体(例如,具有突起(S354C和T366W)的Fc结构域单体)可以包括E357K。

[0478] 更一般地,可以将以下任何空腔突变(或突变组合)与表3中的静电转向突变组合:Y407T、Y407A、F405A、Y407T、T394S、T394W:Y407A、T366W:T394S、T366S:L368A:Y407V:Y349C和S3364H:F405,并且可以将以下任何突起突变(或突变组合)与表3中的静电转向突变组合:T366Y、T366W、T394W、F405W、T366Y:F405A、T366W:Y407A、T366W:S354C和Y349T:T394F。

[0479] VI. 静电转向

[0480] 静电转向是利用肽、蛋白质结构域和蛋白质中带相反电荷的氨基酸之间的有利静电相互作用来控制更高级蛋白质分子的形成。在美国专利申请公开号2014-0024111中公开了使用静电转向效应来改变抗体结构域的相互作用以减少同二聚体形成的方法,有利于在双特异性抗体的生成中的异二聚体形成。

[0481] 在本公开中,使用静电转向来控制Fc结构域单体的二聚化和Fc-抗原结合结构域构建体的形成。具体地,为了使用静电转向来控制Fc结构域单体的二聚化,用带正电荷或带负电的氨基酸残基替换构成 C_H3 - C_H3 界面的一个或多个氨基酸残基,使得相互作用取决于引入的具体带电氨基酸而变得具有静电有利或不利。在一些实施方案中,用带负电荷的氨基酸(诸如天冬氨酸或谷氨酸)替换界面中带正电荷的氨基酸(诸如赖氨酸、精氨酸或组氨酸)。在其他实施方案中,用带正电荷的氨基酸替换界面中带负电荷的氨基酸。可将带电氨基酸引入相互作用的 C_H3 抗体恒定结构域中的一者或两者。通过将带电氨基酸引入相互作用的 C_H3 抗体恒定结构域,产生二聚化选择性模块(上文进一步描述),这些二聚化选择性模块可以选择性地形成Fc结构域单体的二聚体,如由来源于带电氨基酸之间的相互作用的静电转向效应控制。

[0482] 在一些实施方案中,为了产生包括反向电荷的二聚化选择性模块(该二聚化选择性模块可以选择性地形成Fc结构域单体的二聚体,如由静电转向效应控制),可通过异二聚化或同二聚化选择性地形成两个Fc结构域单体。

[0483] Fc结构域单体的异二聚化

[0484] 可以通过在两个Fc结构域单体中引入不同但相容的突变(诸如表3中包括的电荷

残基对,但不限于此)来促进Fc结构域单体的异二聚化。在一些实施方案中,Fc结构域单体可以包括下述带正电荷和带负电荷的氨基酸置换之一:D356K、D356R、E357K、E357R、K370D、K370E、K392D、K392E、D399K、K409D、K409E、K439D和K439E。在一个实例中,包含带正电荷的氨基酸置换(例如,D356K或E357K)的Fc结构域单体和包含带负电荷的氨基酸置换(例如,K370D或K370E)的Fc结构域单体可通过带电氨基酸的有利静电转向选择性地组合以形成Fc结构域。在另一个实例中,包含E357K的Fc结构域单体和包含K370D的Fc结构域单体可通过带电氨基酸的有利静电转向选择性地组合以形成Fc结构域。

[0485] 例如,在具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体中,三个Fc结构域中的两个可通过两个Fc结构域单体的异二聚化形成,如通过静电转向效应促进。“异二聚体Fc结构域”是指通过两个Fc结构域单体的异二聚化形成的Fc结构域,其中两个Fc结构域单体含有促进这两个Fc结构域单体的有利形成的不同反向电荷突变(异二聚化选择性模块)(参见例如,表4A和表4B中的突变)。在具有三个Fc结构域(一个羧基末端“茎”Fc结构域和两个氨基末端“分支”Fc结构域)的Fc-抗原结合结构域构建体中,每个氨基末端“分支”Fc结构域可以是异二聚体Fc结构域(也称为“分支异二聚体Fc结构域”)(例如,由图1中的Fc结构域单体106和114或Fc结构域单体112和116形成的异二聚体Fc结构域;由图2中的Fc结构域单体206和214或Fc结构域单体212和216形成的异二聚体Fc结构域)。分支异二聚体Fc结构域可以由含有E357K的Fc结构域单体和另一个含有K370D的Fc结构域单体形成。

[0486] 表3.Fc异二聚化方法

[0487]

方法	突变 (链 A)	突变 (链 B)	参考文献
旋钮-进入-孔洞 (Y-T)	Y407T	T336Y	美国专利号 8,216,805
旋钮-进入-孔洞	Y407A	T336W	美国专利号 8,216,805
旋钮-进入-孔洞	F405A	T394W	美国专利号 8,216,805
旋钮-进入-孔洞	Y407T	T366Y	美国专利号 8,216,805
旋钮-进入-孔洞	T394S	F405W	美国专利号 8,216,805
旋钮-进入-孔洞	T394W, Y407T	T366Y, F406A	美国专利号 8,216,805
旋钮-进入-孔洞	T394S, Y407A	T366W, F405W	美国专利号 8,216,805
旋钮-进入-孔洞	T366W, T394S	F405W, T407A	美国专利号 8,216,805
旋钮-进入-孔洞	S354C, T366W	Y349C, T366S, L368A, Y407V	
旋钮-进入-孔洞 (CW-CSAV)	Y349C, T366S, L368A, Y407V	S354C, T366W	Zeidler 等人, <i>J Immunol.</i> 163: 1246-52, 1999
HA-TF	S364H, F405A	Y349T, T394F	WO2011028952
静电转向	K409D	D399K	US 2014/0024111

[0488] 表3.Fc异二聚化方法

[0489]

方法	突变 (链 A)	突变 (链 B)	参考文献
静电转向	K409D	D399R	US 2014/0024111
静电转向	K409E	D399K	US 2014/0024111
静电转向	K409E	D399R	US 2014/0024111
静电转向	K392D	D399K	US 2014/0024111
静电转向	K392D	D399R	US 2014/0024111
静电转向	K392E	D399K	US 2014/0024111
静电转向	K392E	D399R	US 2014/0024111
静电转向 (DD-KK)	K392D, K409D	E356K, D399K	Gunasekaran 等 人, <i>J Biol Chem.</i> 285: 19637-46, 2010
静电转向	K370E, K409D, K439E	E356K, E357K, D399K	WO 2006/106905
旋钮-进入- 孔洞加静电 转向	S354C, E357K, T366W	Y349C, T366S, L368A, K370D, Y407V	WO 2015/168643
VYAV- VLLW	T350V, L351Y, F405A, Y407V	T350V, T366L, K392L, T394W	Von Kreudenstein 等 人, <i>MAbs</i> , 5:646-54, 2013
EEE-RRR	D221E, P228E, L368E	D221R, P228R, K409R	Strop 等人, <i>J Mol Biol</i> , 420:204-19, 2012
EW-RVT	K360E, K409W	Q347R, D399V, F405T	Choi 等人, <i>Mol Cancer Ther</i> , 12:2748-59, 2013

[0490] 表3.Fc异二聚化方法

[0491]

方法	突变 (链 A)	突变 (链 B)	参考文献
EW-RVT _{s-s}	K360E, K409W, Y349C	Q347R, D399V, F405T, S354C	Choi 等人, Mol Immunol, 65:377-83, 2015
电荷引入 (DK)	L351D	T366K	De Nardis, J Biol Chem, 292:14706-17, 2017
电荷引入 (DEKK)	L351D, L368E	L351K, T366K	De Nardis, J Biol Chem, 292:14706-17, 2017
L-R	F405L	K409R	Labriijn 等人, Proc Natl Acad Sci USA, 110:5145-50, 2013
	IgG/A 嵌合体	IgG/A 嵌合体	Davis 等人, Protein Eng Des Sel, 23:195-202, 2010
	S364K, T366V, K370T, K392Y, F405S, Y407V, K409W, T411N	Q347E, Y349A, L351F, S364T, T366V, K370T, T394D, V397L, D399E, F405A, Y407S, K409R, T411R	Skegro 等人, J Biol Chem, 292:9745-59, 2017
	S364K, T366V, K370T, K392Y, K409W, T411N	F405A, Y407S	Skegro 等人, J Biol Chem, 292:9745-59, 2017
	Q347A, S364K, T366V, K370T, K392Y, F405S, Y407V, K409W, T411N	Q347E, Y349A, L351F, S364T, T366V, K370T, T394D, V397L, D399E, F405A, Y407S, K409R, T411R	Skegro 等人, J Biol Chem, 292:9745-59, 2017

[0492] 表3.Fc异二聚化方法

方法	突变 (链 A)	突变 (链 B)	参考文献
BEAT (A/B-T)	S364K, T366V, K370T, K392Y, F405S, Y407V, K409W, T411N	Q347E, Y349A, L351F, S364T, T366V, K370T, T394D, V397L, D399E, F405A, Y407S, K409R	Skegro 等人, J Biol Chem, 292:9745-59, 2017
DMA-RRVV	K360D, D399M, Y407A	E345R, Q347R, T366V, K409V	Leaver-Fay 等人, Structure, 24:641-51, 2016
[0493] SYMV-GDQA	Y349S, K370Y, T366M, K409V	E356G, E357D, S364Q, Y407A	Leaver-Fay 等人, Structure, 24:641-51, 2016
静电转向	K370D	E357K	
静电转向	K370D	E357R	
静电转向	K370E	E357K	
静电转向	K370E	E357R	
静电转向	K370D	D356K	
静电转向	K370D	D356R	
静电转向	K370E	D356K	
静电转向	K370E	D356R	

[0494] 注意:所有残基均按EU编号方案 (Edelman等人, Proc Natl Acad Sci USA, 63:78-85, 1969) 进行编号

[0495] Fc结构域单体的同二聚化

[0496] 可以通过以对称方式在两个Fc结构域单体中引入相同的静电转向突变(同二聚化选择性模块)来促进Fc结构域单体的同二聚化。在一些实施方案中,两个Fc结构域单体包括在C_H3结构域之间的界面处的带电残基环内至少两个位置中包含相同的反向电荷突变的同二聚化选择性模块。通过逆转两个Fc结构域单体中的两个或更多个互补残基对的两个成员的电荷,突变的Fc结构域单体保持与相同突变序列的Fc结构域单体互补,但与不含那些突变的Fc结构域单体具有更低的互补性。可被引入Fc结构域单体中以促进其同二聚化的静电转向突变在表4A和表4B中示出,但不限于此。在一个实施方案中,Fc结构域包括两个Fc结构域单体,每个单体包括双重反向电荷突变体(表4A和表4B),例如K409D/D399K。在另一个实施方案中,Fc结构域包括两个Fc结构域单体,每个Fc结构域单体包括四重反向突变体(表4A和表4B),例如K409D/D399K/K370D/E357K。

[0497] 例如,在具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体中,三个Fc结构域中的一个可通过两个Fc结构域单体的同二聚化形成,如通过静电转向效应促进。“同二聚体Fc结构域”是指通过两个Fc结构域单体的同二聚化形成的Fc结构域,其中两个Fc结构域单体包含相同的反向电荷突变(参见例如,表4A和表4B中的突变)。在具有三个Fc结构域(一个羧基末端“茎”Fc结构域和两个氨基末端“分支”Fc结构域)的Fc-抗原结合结构域构建体中,羧基末

端“茎”Fc结构域可以是同二聚体Fc结构域(也称为“茎同二聚体Fc结构域”)。茎同二聚体Fc结构域可由两个Fc结构域单体形成,每个Fc结构域单体含有双重突变体K409D/D399K。

[0498] 表4A.Fc同二聚化方法—每条链中两个突变

[0499]

方法	突变 (链 A 和 B)	参考文献
野生型	无	美国专利 号 8,216,805
静电转向 (KD)	D399K/K409D	Gunasekaran 等人, J Biol Chem. 285: 19637-46, 2010, WO 2015/168643
静电转向	D399K/K409E	Gunasekaran 等人, J Biol Chem. 285: 19637-46, 2010, WO 2015/168643
静电转向	E357K/ K370D	Gunasekaran 等人, J Biol Chem. 285: 19637-46, 2010, WO 2015/168643
静电转向	E357K/ K370E	Gunasekaran 等人, J Biol Chem. 285: 19637-46, 2010, WO 2015/168643
静电转向	D356K/K439D	Gunasekaran 等人, J Biol Chem. 285: 19637-46, 2010, WO 2015/168643

[0500] 表4A.Fc同二聚化方法—每条链中两个突变

[0501]

方法	突变 (链 A 和 B)	参考文献
静电转向	D356K/K439E	Gunasekaran 等人, J Biol Chem. 285: 19637-46, 2010, WO 2015/168643
静电转向	K392D/D399K	Gunasekaran 等人, J Biol Chem. 285: 19637-46, 2010, WO 2015/168643
静电转向	K392E/D399K	Gunasekaran 等人, J Biol Chem. 285: 19637-46, 2010, WO 2015/168643
静电转向	K409D/D399R	
静电转向	K409E/D399R	
静电转向	K392D/D399R	

[0502] 表4B.Fc同二聚化方法—每条链中四个突变

[0503]

同二聚体 Fc 结构域中两个 Fc 结构域单体中的每一者的 C _H 3 抗体恒定结构域中的反向电荷突变	同二聚体 Fc 结构域中两个 Fc 结构域单体中的每一者的 C _H 3 抗体恒定结构域中的反向电荷突变
K409D/D399K/K370D/E357K	K392D/D399K/K370D/E357K
K409D/D399K/K370D/E357R	K392D/D399K/K370D/E357R
K409D/D399K/K370E/E357K	K392D/D399K/K370E/E357K
K409D/D399K/K370E/E357R	K392D/D399K/K370E/E357R
K409D/D399K/K370D/D356K	K392D/D399K/K370D/D356K
K409D/D399K/K370D/D356R	K392D/D399K/K370D/D356R
K409D/D399K/K370E/D356K	K392D/D399K/K370E/D356K
K409D/D399K/K370E/D356R	K392D/D399K/K370E/D356R
K409D/D399R/K370D/E357K	K392D/D399R/K370D/E357K
K409D/D399R/K370D/E357R	K392D/D399R/K370D/E357R
K409D/D399R/K370E/E357K	K392D/D399R/K370E/E357K

[0504]

同二聚体 Fc 结构域中两个 Fc 结构域单体中的每一者的 C _H 3 抗体恒定结构域中的反向电荷突变	同二聚体 Fc 结构域中两个 Fc 结构域单体中的每一者的 C _H 3 抗体恒定结构域中的反向电荷突变
K409D/D399R/K370E/E357R	K392D/D399R/K370E/E357R
K409D/D399R/K370D/D356K	K392D/D399R/K370D/D356K
K409D/D399R/K370D/D356R	K392D/D399R/K370D/D356R
K409D/D399R/K370E/D356K	K392D/D399R/K370E/D356K
K409D/D399R/K370E/D356R	K392D/D399R/K370E/D356R
K409E/D399K/K370D/E357K	K392E/D399K/K370D/E357K
K409E/D399K/K370D/E357R	K392E/D399K/K370D/E357R
K409E/D399K/K370E/E357K	K392E/D399K/K370E/E357K
K409E/D399K/K370E/E357R	K392E/D399K/K370E/E357R
K409E/D399K/K370D/D356K	K392E/D399K/K370D/D356K
K409E/D399K/K370D/D356R	K392E/D399K/K370D/D356R
K409E/D399K/K370E/D356K	K392E/D399K/K370E/D356K
K409E/D399K/K370E/D356R	K392E/D399K/K370E/D356R
K409E/D399R/K370D/E357K	K392E/D399R/K370D/E357K
K409E/D399R/K370D/E357R	K392E/D399R/K370D/E357R
K409E/D399R/K370E/E357K	K392E/D399R/K370E/E357K
K409E/D399R/K370E/E357R	K392E/D399R/K370E/E357R
K409E/D399R/K370D/D356K	K392E/D399R/K370D/D356K
K409E/D399R/K370D/D356R	K392E/D399R/K370D/D356R
K409E/D399R/K370E/D356K	K392E/D399R/K370E/D356K
K409E/D399R/K370E/D356R	K392E/D399R/K370E/D356R

[0505] VII. 接头

[0506] 在本公开中,接头用于描述多肽或蛋白质结构域和/或结合的非蛋白质部分之间的键合或连接。在一些实施方案中,接头是至少两个Fc结构域单体之间的键合或连接,接头将第一Fc结构域单体的C_H3抗体恒定结构域的C末端与第二Fc结构域单体的铰链结构域的N末端连接,使得两个Fc结构域单体彼此串联连接。在其他实施方案中,接头是Fc结构域单体与附接到其上的任何其他蛋白质结构域之间的键合。例如,接头可以将Fc结构域单体的C_H3抗体恒定结构域的C末端附接到白蛋白结合肽的N末端。

[0507] 接头可以是简单的共价键(例如,肽键)、合成聚合物(例如,聚乙二醇(PEG)聚合物)或由化学反应(例如,化学缀合)产生的任何种类的键。在接头是肽键的情况下,在一个蛋白质结构域的C末端处的羧酸基团可以在缩合反应中与另一个蛋白质结构域的N末端的氨基反应,以形成肽键。具体地,肽键可以通过本领域众所周知的常规有机化学反应由合成手段形成,或通过天然产生由宿主细胞形成,其中编码以串联系列的两种蛋白质的DNA序列

的多核苷酸序列,例如两个Fc结构域的单体,可以通过宿主细胞中的必需分子机器,例如DNA聚合酶和核糖体,直接转录且翻译成编码两种蛋白质的连续多肽。

[0508] 在接头是合成聚合物例如PEG聚合物的情况下,聚合物可以在每个末端处用反应性化学官能团官能化,以与在两个蛋白质的连接末端处的末端氨基酸反应。

[0509] 在接头(除了上述肽键之外)由化学反应制成的情况下,可以分别将化学官能团(例如,胺、羧酸、酯、叠氮化物或本领域常用的其他官能团)合成地附接到一种蛋白质的C末端和另一种蛋白质的N末端。然后两个官能团可以通过合成化学手段反应,以形成化学键,因此将两种蛋白质连接在一起。此类化学缀合程序对于本领域技术人员是常规的。

[0510] 间隔物

[0511] 在本公开中,两个Fc结构域单体之间的接头可以是包括3-200个氨基酸的氨基酸间隔物(例如,3-200、3-180、3-160、3-140、3-120、3-100、3-90、3-80、3-70、3-60、3-50、3-45、3-40、3-35、3-30、3-25、3-20、3-15、3-10、3-9、3-8、3-7、3-6、3-5、3-4、4-200、5-200、6-200、7-200、8-200、9-200、10-200、15-200、20-200、25-200、30-200、35-200、40-200、45-200、50-200、60-200、70-200、80-200、90-200、100-200、120-200、140-200、160-200或180-200个氨基酸)。在一些实施方案中,两个Fc结构域单体之间的接头是含有至少12个氨基酸(诸如12-200个氨基酸(例如,12-200、12-180、12-160、12-140、12-120、12-100、12-90、12-80、12-70、12-60、12-50、12-40、12-30、12-20、12-19、12-18、12-17、12-16、12-15、12-14或12-13个氨基酸)(例如,14-200、16-200、18-200、20-200、30-200、40-200、50-200、60-200、70-200、80-200、90-200、100-200、120-200、140-200、160-200、180-200或190-200个氨基酸))的氨基酸间隔物。在一些实施方案中,两个Fc结构域单体之间的接头是含有12-30个氨基酸(例如,12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29或30个氨基酸)的氨基酸间隔物。合适的肽间隔物是本领域已知的,并且包括例如含有柔性氨基酸残基(诸如甘氨酸和丝氨酸)的肽接头。在某些实施方案中,间隔物可以含有GS、GGS、GGGS (SEQ ID NO:1)、GGSG (SEQ ID NO:2)或SGGG (SEQ ID NO:3)的基序,例如多个或重复基序。在某些实施方案中,间隔物可以含有2至12个氨基酸,包括GS的基序,例如GS、GSGS (SEQ ID NO:4)、GSGSGS (SEQ ID NO:5)、GSGSGSGS (SEQ ID NO:6)、GSGSGSGSGS (SEQ ID NO:7)或GSGSGSGSGSGS (SEQ ID NO:8)。在某些其他实施方案中,间隔物可以含有3至12个氨基酸,包括GGS的基序,例如GGS、GGS GGS (SEQ ID NO:9)、GGS GGS GGS (SEQ ID NO:10)和GGS GGS GGS GGS (SEQ ID NO:11)。在另外其他实施方案中,间隔物可以含有4至20个氨基酸,包括GGSG (SEQ ID NO:2)的基序,例如GGS GGS GGS (SEQ ID NO:12)、GGS GGS GGS GGS (SEQ ID NO:13)、GGS GGS GGS GGS GGS (SEQ ID NO:14)或GGS GGS GGS GGS GGS GGS (SEQ ID NO:15)。在其他实施方案中,间隔物可以含有GGGGS (SEQ ID NO:1)的基序,例如GGGGS GGS (SEQ ID NO:16)或GGGGS GGS GGS (SEQ ID NO:17)。在某些实施方案中,间隔物是SGGGS GGS GGS GGS GGS (SEQ ID NO:18)。

[0512] 在一些实施方案中,两个Fc结构域单体之间的间隔物仅含有甘氨酸残基,例如至少4个甘氨酸残基(例如,4-200、4-180、4-160、4-140、4-40、4-100、4-90、4-80、4-70、4-60、4-50、4-40、4-30、4-20、4-19、4-18、4-17、4-16、4-15、4-14、4-13、4-12、4-11、4-10、4-9、4-8、4-7、4-6或4-5个甘氨酸残基)(例如,4-200、6-200、8-200、10-200、12-200、14-200、16-200、18-200、20-200、30-200、40-200、50-200、60-200、70-200、80-200、90-200、100-200、

120-200、140-200、160-200、180-200或190-200个甘氨酸残基)。在某些实施方案中,间隔物具有4-30个甘氨酸残基(例如,4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29或30个甘氨酸残基)。在一些实施方案中,仅含有甘氨酸残基的间隔物可不被糖基化(例如,0-连接糖基化,也称为0-糖基化),或与例如含有一个或多个丝氨酸残基的间隔物(例如,SGGSGGGSGGSGGGSGGG (SEQ ID NO:18))相比,可具有降低水平的糖基化(例如,降低水平的0-糖基化)(例如,降低水平的用聚糖(诸如木糖、甘露糖、唾液酸、岩藻糖(Fuc)和/或半乳糖(Gal)(例如,木糖))进行的0-糖基化)。

[0513] 在一些实施方案中,仅含有甘氨酸残基的间隔物可不被0-糖基化(例如,0-木糖基化),或与例如含有一个或多个丝氨酸残基的间隔物(例如,SGGSGGGSGGSGGGSGGG (SEQ ID NO:18))相比,可具有降低水平的0-糖基化水平(例如,降低水平的0-木糖基化)。

[0514] 在一些实施方案中,仅含有甘氨酸残基的间隔物可不经蛋白水解,或与例如含有一个或多个丝氨酸残基的间隔物(例如,SGGSGGGSGGSGGGSGGG (SEQ ID NO:18))相比,可具有降低速率的蛋白水解。

[0515] 在某些实施方案中,间隔物可以含有GGGG (SEQ ID NO:19)的基序,例如GGGGGGGG (SEQ ID NO:20)、GGGGGGGGGGGG (SEQ ID NO:21)、GGGGGGGGGGGGGGGGGG (SEQ ID NO:22)或GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG (SEQ ID NO:23)。在某些实施方案中,间隔物可以含有GGGGG (SEQ ID NO:24)的基序,例如GGGGGGGGGG (SEQ ID NO:25)或GGGGGGGGGGGGGGGGGG (SEQ ID NO:26)。在某些实施方案中,间隔物是GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG (SEQ ID NO:27)。

[0516] 在其他实施方案中,间隔物还可以含有除甘氨酸和丝氨酸外的氨基酸,例如GENLYFQSGG (SEQ ID NO:28)、SACYCELS (SEQ ID NO:29)、RSIAT (SEQ ID NO:30)、RPACKIPNDLKQKVMNH (SEQ ID NO:31)、GGSAGGSGSGSSGSSGASGTGTAGGTGSGSGTGSG (SEQ ID NO:32)、AAANSSIDLISVPVDSR (SEQ ID NO:33)或GGSGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSEGGGSGGGS (SEQ ID NO:34)。

[0517] 在本公开的某些实施方案中,使用12或20个氨基酸肽间隔物串联连接两个Fc结构域单体,所述12和20个氨基酸的肽间隔物由序列GGGSGGGSGGGS (SEQ ID NO:35)和SGGSGGGSGGSGGGSGGGSGGG (SEQ ID NO:18)组成。在其他实施方案中,可使用由序列GGSGGGSGGSGGGSGGGS (SEQ ID NO:36)组成的18个氨基酸肽间隔物。

[0518] 在一些实施方案中,两个Fc结构域单体之间的间隔物可具有与上文所述的SEQ ID NO:1-36中任一者的序列具有至少75%同一性(例如,至少77%、79%、81%、83%、85%、87%、89%、91%、93%、95%、97%、99%或99.5%同一性)的序列。在某些实施方案中,两个Fc结构域单体之间的间隔物可具有与SEQ ID NO:17、18、26和27中任一者的序列具有至少80%同一性(例如,至少82%、85%、87%、90%、92%、95%、97%、99%或99.5%同一性)的序列。在某些实施方案中,两个Fc结构域单体之间的间隔物可具有与SEQ ID NO:18或27的序列具有至少80%同一性(例如,至少82%、85%、87%、90%、92%、95%、97%、99%或99.5%同一性)的序列。

[0519] 在某些实施方案中,Fc结构域单体的铰链的氨基末端与同一多肽中的Fc单体的羧基末端之间的接头(即,该接头将第一Fc结构域单体的C_H3抗体恒定结构域的C-末端与第二Fc结构域单体的铰链结构域的N-末端连接,使得两个Fc结构域单体彼此串联连接)是具有3个或更多个氨基酸(例如,3-200个氨基酸(例如,3-200、3-180、3-160、3-140、3-120、3-100、

3-90、3-80、3-70、3-60、3-50、3-45、3-40、3-35、3-30、3-25、3-20、3-15、3-10、3-9、3-8、3-7、3-6、3-5、3-4、4-200、5-200、6-200、7-200、8-200、9-200、10-200、15-200、20-200、25-200、30-200、35-200、40-200、45-200、50-200、60-200、70-200、80-200、90-200、100-200、120-200、140-200、160-200或180-200个氨基酸))的间隔物而不是共价键或含有至少12个氨基酸(诸如12-200个氨基酸,例如12-200、12-180、12-160、12-140、12-120、12-100、12-90、12-80、12-70、12-60、12-50、12-40、12-30、12-20、12-19、12-18、12-17、12-16、12-15、12-14或12-13个氨基酸)(例如14-200、16-200、18-200、20-200、30-200、40-200、50-200、60-200、70-200、80-200、90-200、100-200、120-200、140-200、160-200、180-200或190-200个氨基酸)的氨基酸间隔物。

[0520] 间隔物也可以存在于Fc结构域单体的铰链结构域的N-末端与CCR4结合结构域(例如,CCR4重链结合结构域的CH1结构域或CCR4轻链结合结构域的CL结构域)的羧基末端之间,使得这些结构域通过3个或更多个氨基酸(例如,3-200个氨基酸(例如,3-200、3-180、3-160、3-140、3-120、3-100、3-90、3-80、3-70、3-60、3-50、3-45、3-40、3-35、3-30、3-25、3-20、3-15、3-10、3-9、3-8、3-7、3-6、3-5、3-4、4-200、5-200、6-200、7-200、8-200、9-200、10-200、15-200、20-200、25-200、30-200、35-200、40-200、45-200、50-200、60-200、70-200、80-200、90-200、100-200、120-200、140-200、160-200或180-200个氨基酸))的间隔物或含有至少12个氨基酸(诸如12-200个氨基酸,例如12-200、12-180、12-160、12-140、12-120、12-100、12-90、12-80、12-70、12-60、12-50、12-40、12-30、12-20、12-19、12-18、12-17、12-16、12-15、12-14或12-13个氨基酸)(例如14-200、16-200、18-200、20-200、30-200、40-200、50-200、60-200、70-200、80-200、90-200、100-200、120-200、140-200、160-200、180-200或190-200个氨基酸)的氨基酸间隔物连接。

[0521] VIII. 血清蛋白结合肽

[0522] 与血清蛋白肽结合可以改善蛋白质药物的药代动力学,并且具体地,可将本文描述的Fc-抗原结合结构域构建体与血清蛋白结合肽融合。

[0523] 作为一个实例,可以用于本文所述的方法和组合物中的白蛋白结合肽是本领域一般已知的。在一个实施方案中,白蛋白结合肽包括序列DICLPRWGCLW(SEQ ID NO:37)。在一些实施方案中,白蛋白结合肽具有与SEQ ID NO:37的序列至少80%同一性(例如,80%、90%或100%同一性)的序列。

[0524] 在本公开中,可将白蛋白结合肽附接到Fc-抗原结合结构域构建体中的某些多肽的N末端或C末端。在一个实施方案中,可将白蛋白结合肽附接到包含CCR4结合结构域的Fc构建体中的一个或多个多肽的C末端。在另一个实施方案中,可以将白蛋白结合肽融合到包含CCR4结合结构域的Fc构建体中的编码串联连接的两个Fc结构域单体的多肽的C末端。在又一个实施方案中,可以将白蛋白结合肽附接到与编码串联连接的两个Fc结构域单体的多肽中的第二Fc结构域单体连接的Fc结构域单体(例如,图1中的Fc结构域单体114和116;图2中的Fc结构域单体214和216)的C末端。可以将白蛋白结合肽遗传融合到Fc-抗原结合结构域构建体或通过化学手段(例如,化学缀合)附接到Fc-抗原结合结构域构建体。如果需要,可以在Fc-抗原结合结构域构建体与白蛋白结合肽之间插入间隔物。不受理论束缚,预期在本公开的Fc-抗原结合结构域构建体中包括白蛋白结合肽可通过其与血清白蛋白结合延长治疗性蛋白质的保留。

[0525] IX.Fc-抗原结合结构域构建体

[0526] 一般来讲,本公开的特征在于具有2-10个Fc结构域以及附接的一个或多个CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体。这些Fc结构域对于Fc受体(例如,Fc γ RIIIa)可具有比单个野生型Fc结构域更高的结合亲和力和/或亲合力。本公开公开了工程化两个相互作用的C_H3抗体恒定结构域的界面处的氨基酸的方法,使得Fc结构域的两个Fc结构域单体彼此选择性地形成二聚体,从而防止形成不需要的多聚体或聚集体。Fc-抗原结合结构域构建体包括偶数数量的Fc结构域单体,其中每对Fc结构域单体形成Fc结构域。Fc-抗原结合结构域构建体至少包括由四个Fc结构域单体和一个CCR4结合结构域的二聚体形成的两个功能性Fc结构域。可例如用接头、间隔物、肽键、化学键或化学部分将CCR4结合结构域与Fc结构域连接。

[0527] Fc-抗原结合结构域构建体可以以许多方式组装。Fc-抗原结合结构域构建体可以由不对称串联Fc结构域组装而成(图1至图6)。Fc-抗原结合结构域构建体可以由单分支的Fc结构域组装而成,其中分支点在N末端Fc结构域(图7至图12)。Fc-抗原结合结构域构建体可以由单分支的Fc结构域组装而成,其中分支点在C末端Fc结构域(图13至图18)。Fc-抗原结合结构域构建体可以由单分支的Fc结构域组装而成,其中分支点在N末端或C末端Fc结构域(图19至图21)。

[0528] 可以以许多方式将CCR4结合结构域与Fc-抗原结合结构域构建体连接。可以将CCR4结合结构域表达为Fc链的融合蛋白。可以将CCR4结合Fab的重链组分表达为Fc链的融合蛋白,并且可以将轻链组分表达为单独的多肽(图50,小图A)。在一些实施方案中,将scFv用作CCR4结合结构域。可以将scFv表达为长Fc链的融合蛋白(图50,小图B)。在一些实施方案中,单独表达重链和轻链组分并将其外源添加到Fc-抗原结合结构域构建体中。在一些实施方案中,单独表达CCR4结合结构域,稍后利用化学键将其与Fc-抗原结合结构域构建体连接(图50,小图C)。

[0529] 在一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体中的一个或多个Fc多肽缺乏C末端赖氨酸残基。在一些实施方案中,Fc-抗原结合结构域构建体中的所有Fc多肽缺乏C末端赖氨酸残基。在一些实施方案中,在Fc-抗原结合结构域构建体中的一个或多个Fc多肽中不存在C末端赖氨酸可改善Fc-抗原结合结构域构建体(例如,具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体)(例如,具有至少85%、90%、95%、98%或99%同质性的具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体群体)的同质性。

[0530] 在一些实施方案中,可将本文所述的Fc-抗原结合结构域构建体中的第一多肽、第二多肽、第三多肽、第四多肽、第五多肽或第六多肽(例如,图1中的多肽102、112和114,图2中的202、214、216和218,图3中的302、320和322,图4中的402、428、430和432,图5中的502、524和526,图6中的602、632、634和636,图7中的702、708、722和724,图8中的802、804、826和828,图9中的902、904、934和936,图10中的1002、1010、1012、1024、1026和1032,图11中的1102、1104、1106、1144、1146和1148,图12中的1202、1204、1206、1252、1254和1256,图13中的1302、1306、1320和1324,图14中的1402、1404、1426和1428,图15中的1502、1504、1534和1536,图16中的1602、1606、1608、1626、1628和1632,图17中的1702、1704、1706、1744、1746和1748,图18中的1802、1804、1806、1852、1854和1856,图19中的1902、1906、1910、1924、1928和1932,图20中的2002、2004、2006、2044、2046和2048,图21中的2102、2104、2106、

2152、2154和2156)中的一者或多者中的N末端Asp突变为Gln。

[0531] 对于本文实施例中描述的示例性Fc-抗原结合结构域构建体,Fc-抗原结合结构域构建体1-21可分别在旋钮和孔洞亚基中包含E357K和K370D电荷对。

[0532] 本文所述的示例性Fc-抗原结合结构域构建体(例如,Fc-抗原结合结构域构建体1-21)中的任何一种相对于具有单个Fc结构域和CCR4结合结构域的构建体可以在抗体依赖性细胞毒性(ADCC)测定、抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)和/或补体依赖性细胞毒性(CDC)测定中具有增强的效应子功能,或可以包括具有单个Fc结构域和CCR4结合结构域的构建体未表现出的生物活性。

[0533] X. 宿主细胞和蛋白质产生

[0534] 在本公开中,宿主细胞指包括从其对应的核酸表达本文所述多肽和构建体所需的必要细胞组分(例如,细胞器)的媒介物。核酸可包括在核酸载体中,可以通过本领域已知的常规技术(转化、转染、电穿孔、磷酸钙沉淀、直接显微注射等)将所述核酸载体引入宿主细胞中。宿主细胞可以是哺乳动物、细菌、真菌或昆虫起源。哺乳动物宿主细胞包括但不限于CHO(或CHO衍生的细胞株,例如CHO-K1、CHO-DXB11 CHO-DG44)、鼠宿主细胞(例如NS0、Sp2/0)、VERY、HEK(例如HEK293)、BHK、HeLa、COS、MDCK、293、3T3、W138、BT483、Hs578T、HTB2、BT20和T47D、CRL7030和HsS78Bst细胞。还可以选择宿主细胞,其调节蛋白质构建体的表达,或以所需的特定方式修饰且加工蛋白质产物。不同的宿主细胞具有蛋白质产物的翻译后加工和修饰的特征和特异性机制。可以选择合适的细胞系或宿主系统,以确保表达的蛋白质的正确修饰和加工。

[0535] 为了从其相应的DNA质粒构建体表达和分泌蛋白质产物,可以用通过本领域已知的适当表达控制元件控制的DNA转染或转化宿主细胞,所述表达控制元件包括启动子、增强子、序列、转录终止子、多腺苷酸化位点和可选择标记物。用于表达治疗性蛋白质的方法是本领域已知的。参见例如,Paulina Balbas,Argelia Lorence(编辑)Recombinant Gene Expression:Reviews and Protocols(Methods in Molecular Biology),Humana Press;2004版本第2版(2004年7月20日);Vladimir Voynov和Justin A.Caravella(编辑)Therapeutic Proteins:Methods and Protocols(Methods in Molecular Biology)Humana Press;2012版本第2版(2012年6月28日)。

[0536] XI. 无岩藻糖基化

[0537] 每个Fc单体在Asn 297处包括N-糖基化位点。聚糖可以以多种不同形式存在于给定的Fc单体上。在含有抗体或本文所述的抗原结合Fc构建体的组合物中,聚糖可以是非常异质的,并且存在的聚糖的性质尤其取决于用于产生抗体或抗原结合Fc构建体的细胞的类型、细胞的生长条件(包括生长培养基)和产生后纯化。在各种情况下,包含本文所述的构建体或多肽复合物或多肽的组合物被无岩藻糖基化至少某种程度。例如,至少5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、60%、70%、80%、90%或95%存在于组合物中的聚糖(例如,Fc聚糖)缺乏岩藻糖残基。因此,5%-60%、5%-50%、5%-40%、10%-50%、10%-50%、10%-40%、20%-50%或20%-40%的聚糖缺乏岩藻糖残基。可以通过在1,3,4-三-O-乙酰基-2-脱氧基-2-氟-L-岩藻糖抑制剂存在下培养产生抗体的细胞来产生无岩藻糖基化至少某种程度的组合物。可以使用多种其他方法来产生本文所述的构建体和多肽的相对无岩藻糖基化形式,包括:在FUT8表达降低或不表达的细胞中表达(例如,通过

敲除FUT8或用RNAi (siRNA、miRNA或shRNA)降低表达),以及在过表达 β -1,4-甘露糖基-糖蛋白4 β -N-乙酰氨基葡萄糖转移酶(GnT-III)的细胞中表达。

[0538] XIII. 药物组合物/制剂

[0539] 本公开的特征在于包括一种或多种本文所述的Fc-抗原结合结构域构建体的药物组合物。在一个实施方案中,药物组合物包括在结构上相同或基本相同的基本上同质的Fc-抗原结合结构域构建体群体。在各种实例中,药物组合物包括Fc-抗原结合结构域构建体1-42中的任何一种的基本上同质的群体。

[0540] 可以将本公开的治疗性蛋白质构建体(例如,本文所述的Fc-抗原结合结构域构建体(例如,具有三个Fc结构域的Fc-抗原结合结构域构建体))结合到药物组合物中。包括治疗性蛋白质的药物组合物可以通过本领域技术人员已知的方法进行配制。药物组合物可以以可注射制剂的形式肠胃外施用,所述可注射制剂包括在水或另一种药学可接受的液体中的无菌溶液或悬浮液。例如,药物组合物可以通过以下过程进行配制:将Fc-抗原结合结构域构建体与药学可接受的媒介物或介质(诸如无菌注射用水(WFI)、生理盐水、乳化剂、悬浮剂、表面活性剂、稳定剂、稀释剂、粘合剂、赋形剂)适当组合,随后以普遍接受的药学实践所需的单位剂量形式混合。在药物制剂中包括的活性成分的量使得提供在指定范围内的合适剂量。

[0541] 用于注射的无菌组合物可以根据常规药学实践使用注射用蒸馏水作为媒介物进行配制。例如,生理盐水或含有葡萄糖和其他补充剂(诸如D-山梨糖醇、D-甘露糖、D-甘露糖醇和氯化钠)的等渗溶液可用作注射用水溶液,任选与本领域普遍已知的合适的增溶剂(例如,醇诸如乙醇和多元醇诸如丙二醇或聚乙二醇)和非离子表面活性剂(诸如聚山梨醇酯80TM、HCO-50)等组合。用于治疗性蛋白质产物的配制方法是本领域已知的,参见例如Banga (编辑)Therapeutic Peptides and Proteins:Formulation,Processing and Delivery Systems (第2版)Taylor&Francis Group,CRC Press (2006)。

[0542] XIV. 治疗方法和剂量

[0543] 这些构建体可以用于治疗癌症,例如恶性血液病和实体瘤。可以治疗的癌症包括:复发性或难治性成人T细胞白血病/淋巴瘤、成人T细胞白血病淋巴瘤、皮肤T细胞淋巴瘤、外周T细胞淋巴瘤、蕈样真菌病、Sezary综合征、卵巢癌、成胶质细胞瘤、肝细胞癌、乳腺癌、胃腺癌。

[0544] 药物组合物以与剂量制剂相容的方式施用,并且以治疗有效的量施用,以导致症状的改善或纠正。药物组合物以各种剂型施用,例如静脉内剂型、皮下剂型、经口剂型如可摄取溶液、药物释放胶囊等等。用于各个受试者的适当剂量取决于治疗目标、施用途径和患者的状况。一般地,重组蛋白以1-200mg/kg (例如1-100mg/kg,例如20-100mg/kg)给药。相应地,医疗保健提供者有必要根据需要定制且和滴定剂量且修改施用途径,以获得最佳疗效。

[0545] 除了治疗人类之外,构建体还可以用于治疗伴侣动物,诸如狗和猫以及其他兽医对象。

[0546] XV. 补体依赖性细胞毒性(CDC)

[0547] 本公开中描述的Fc-抗原结合结构域构建体能够激活各种Fc受体介导的效应子功能。免疫系统的一个组分是补体依赖性细胞毒性(CDC)系统,它是先天免疫系统的一部分,可增强抗体和吞噬细胞清除外源病原体的能力。三种生化途径激活补体系统:经典补体途

径、替代补体途径和凝集素途径,这些途径都需要一组复杂的激活和信号级联。

[0548] 在经典补体途径中,IgG或IgM触发补体激活。C1q蛋白与抗原结合后与这些抗体结合,从而形成C1复合物。该复合物产生C1s酯酶,该酯酶将C4和C2蛋白裂解并激活为C4a和C4b以及C2a和C2b。然后,C2a和C4b片段形成称为C3转化酶的蛋白复合物,该蛋白复合物将C3裂解为C3a和C3b,从而使信号放大并形成膜攻击复合物。

[0549] 本公开的Fc-抗原结合结构域构建体能够通过免疫系统增强CDC活性。

[0550] 可通过使用比色测定来评估CDC,在该比色测定中,将Raji细胞(ATCC)用连续稀释的抗体、Fc-抗原结合结构域构建体或IVIg包被。可以将人血清补体(Quidel)以25%v/v添加到所有孔中,并且在37℃下温育2小时。在添加WST-1细胞增殖试剂(Roche Applied Science)后,可以将细胞在37℃下温育12小时。然后将板放置在振荡器上2分钟,并且可以测量450nm处的吸光度。

[0551] XVI. 抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)

[0552] 本公开的Fc-抗原结合结构域构建体还能够通过免疫系统增强抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)活性。ADCC是适应性免疫系统的一部分,在该系统中,抗体与外源病原体的表面抗原结合并靶向它们以致死亡。ADCC涉及通过抗体激活自然杀伤(NK)细胞。NK细胞表达Fc受体,这些受体与抗体(诸如IgG和IgM)的Fc部分结合。当抗体与病原体感染的靶细胞表面结合后,它们随后会结合NK细胞并激活它们。NK细胞释放细胞因子(诸如IFN- γ)和蛋白质(诸如穿孔素和颗粒酶)。穿孔素是在钙存在下低聚的成孔溶细胞素。颗粒酶是在靶细胞中诱导程序性细胞死亡的丝氨酸蛋白酶。除NK细胞外,巨噬细胞、嗜中性粒细胞和嗜酸性粒细胞也可以介导ADCC。

[0553] 可使用发光测定来评估ADCC。将人原代NK效应细胞(Hemacare)解冻,并使其在淋巴细胞生长培养基-3(Lonza)中以 5×10^5 个/mL在37℃下静息过夜。第二天,收获人淋巴母细胞系Raji靶细胞(ATCC CCL-86),将其重悬于测定培养基(无酚红RPMI,10%FBS Δ , GlutaMAXTM)中,并在37℃下在各种浓度的每种目的探针存在下铺板30分钟。然后收获静息NK细胞,将其重悬于测定培养基中,并添加到含有抗CD20包被的Raji细胞的板中。将板在37℃下温育6小时,其中效应子与靶细胞的最终比例为5:1(5×10^4 个NK细胞: 1×10^4 个Raji)。

[0554] 使用CytoTox-GloTM细胞毒性测定试剂盒(Promega)来确定ADCC活性。CytoTox-GloTM测定使用发光肽底物来测量死细胞蛋白酶活性,该蛋白酶活性由已经丧失膜完整性的细胞(例如,裂解的Raji细胞)释放。温育6小时后,将制备的试剂(底物)添加到板的每个孔中,并在室温下置于定轨板振荡器上15分钟。使用PHERAstar F5读板仪(BMG Labtech)测量发光。从测试条件中减去对照条件(仅NK细胞+Raji)的读数以消除背景后,分析数据。

[0555] XV. 抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)

[0556] 本公开的Fc-抗原结合结构域构建体还能够通过免疫系统增强抗体依赖性细胞吞噬作用(ADCP)活性。ADCP(也称为抗体调理作用)是吞噬细胞标记病原体摄入和清除的过程。吞噬细胞是通过摄入有害的外源病原体以及死亡或垂死的细胞来保护人体的细胞。该过程被病原体相关分子模式(PAMPS)激活,从而引起NF- κ B激活。然后,调理素(诸如C3b)和抗体可以附着到目标病原体上。当靶标被调理素包被时,Fc结构域经由其Fc受体吸引吞噬细胞。然后吞噬细胞吞噬细胞,并且摄入物质的吞噬体与溶酶体融合。然后,随后的吞噬溶酶体蛋白水解消化细胞物质。

[0557] 可使用生物发光测定来评估ADCP。抗体依赖性细胞介导的吞噬作用(ADCP)是治疗性抗体的重要作用机制。ADCP可以由单核细胞、巨噬细胞、嗜中性粒细胞和树突细胞经由Fc γ RIIa(CD32a)、Fc γ RI(CD64)和Fc γ RIIIa(CD16a)介导。三种受体都可以参与抗体识别、免疫受体聚簇和导致ADCP的信号事件;但是,阻断研究表明,Fc γ RIIa是参与该过程的主要Fc γ 受体。

[0558] Fc γ RIIa-H ADCP报告基因生物测定是一种基于生物发光细胞的测定,可以用于测量抗体和具有Fc结构域(特异性结合和激活Fc γ RIIa)的其他生物制剂的效力和稳定性。该测定由表达高亲和力人Fc γ RIIa-H变体的遗传工程化Jurkat T细胞系组成,该变体在氨基酸131处含有组氨酸(H)并且含有由NFAT响应元件(NFAT-RE)驱动的荧光素酶报告基因。

[0559] 当与靶细胞和相关抗体共培养时,Fc γ RIIa-H效应细胞结合抗体的Fc结构域,从而引起Fc γ RIIa信号传导和NFAT-RE介导的荧光素酶活性。检测生物发光信号并用荧光素酶测定和标准发光计进行定量。

[0560] 实施例

[0561] 提出以下实施例以向本领域普通技术人员提供完整的公开内容以及对如何执行、制备和评估本文所要求保护的方法和化合物的描述,并且这些实施例旨在仅是本公开的示例,并非旨在限制发明人视为其公开的内容的范围。

[0562] 实施例1.具有CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体7的设计和纯化

[0563] 蛋白质表达

[0564] Fc-抗原结合结构域构建体被设计成提高折叠效率,以最小化不受控制的亚基缔合(不受控制的亚基缔合可产生不必要的高分子量低聚体和多聚体),并产生基本上同质(例如,至少85%、90%、95%、98%或99%同质)的用于药物用途的组合物。考虑到这些目标,如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体7(CCR4)各自包含两个不同的含Fc结构域单体的多肽(抗CCR4长Fc链(SEQ ID NO:ZZ1)的两个拷贝以及短Fc链(SEQ ID NO:ZZ2)的两个拷贝)和抗CCR4轻链多肽(SEQ ID NO:49)的两个拷贝。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的抗CCR4 VH和CH1结构域(EU位置1-220)(构建体7(CCR4)),该Fc结构域单体具有E357K电荷突变以及S354C和T366W突起形成突变(以促进异二聚化),并与电荷突变(K409D/D399K突变)Fc结构域单体(以促进同二聚化)串联。短Fc链包含具有K370D电荷突变和Y349C、T366S、L368A和Y407V空腔形成突变(以促进异二聚化)的Fc结构域单体。也可以将抗CCR4轻链表达为作为scFv的一部分与长Fc链的N末端融合。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。表4A和表4BA和表4B中的氨基酸序列由三个单独的质粒(一个质粒编码轻链(抗CCR4),一个质粒编码长Fc链(抗CCR4),并且一个质粒编码短Fc链)编码。

[0565] 表5.构建体7(CCR4)序列

[0566]

构建体	轻链	长 Fc 链 (具有抗 CCR4 VH 和 CH1)	短 Fc 链
构建体 7 S3I (CCR4)	SEQ ID NO: DVLMTQSPLSLP VTPGEPASISCRS SRNIVHINGDTY LEWYLQKPGQS PQLLIYKVSNR SGVPDRFSGSGS GTDFTLKISRVE AEDVGVYYCFQ GSLLPWTFGQG TKVEIKRTVAAP SVFIFPPSDEQLK	SEQ ID NO: EVQLVESGGDL VQPGRSLRLSCA ASGFIFSNYGMS WVRQAPGKGLE WVATISSASTYS YYPDSVKGRFTI SRDNAKNSLYL QMNSLRVEDTA LYYCGRHSDGN FAFGYWGQGTL VTVSSASTKGPS	SEQ ID NO: DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR VVSVELTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ

[0567]

SGTASVVCLLN NFYPREAKVQW KVDNALQSGNS QESVTEQDSKDS TYSLSSTLTLSK ADYEKHKVYAC EVTHQGLSSPVT KSFNRGEC	VFPLAPSSKSTS GGTAALGCLVK DYFPEPVTVSW NSGALTSGVHTF PAVLQSSGLYSL SSVVTVPSSSLG TQTYICNVNHKP SNTKVDKKVEP KSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVF LFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQYN STYRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALPA PIEKTISKAKGQP REPQVYTLPPSR DELTKNQVSLTC LVKGFYPSDIAV EWESNGQPENN YKTTTPVLKSDG SFFLYSDLTVDK SRWQQGNVFSC SVMHEALHNHY TQKSLSLSPGKG GGGGGGGGGG GGGGGGGGGD KTHTCPPCPAPE LLGGPSVFLFPP KPKDTLMISRTP EVTCTVVVDVSH EDPEVKFNWYV DGVEVHNAKTK PREEQYNSTYRV VSVLTVLHQDW LNGKEYKCKVS NKALPAPIEKTIS KAKGQPREPQV YTLPPCRDKLTK NQVSLWCLVKG	VCTLPPSRDEL KNQVSLSCAVD GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLDSDGSFF LVSKLTVDKSR WQQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPG
--	---	--

[0568]		FYPSDIAVEWES NGQPENNYKTT PPVLDSDGSEFL YSKLTVDKSRW QQGNVFSCSVM HEALHNHYTQK SLSLSPG	
--------	--	---	--

[0569] 使用Poros MabCapture A (LifeTechnologies) 柱,通过基于蛋白A的亲和柱色谱法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。将捕获的Fc-抗原结合结构域构建体用磷酸盐缓冲盐水(低盐洗涤液)洗涤,并用100mM甘氨酸(pH 3)洗脱。洗脱物通过加入1M TRIS pH 7.4快速中和,并且通过0.2 μ m过滤器无菌过滤。使用Poros XS树脂(Applied Biosciences),通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES (pH 6,缓冲液A)预平衡柱,并且使用50mM MES、400mM氯化钠(pH 6,缓冲液B)作为洗脱缓冲液用步进梯度洗脱样品。在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用10kDa截止聚醚砜(PES)膜滤筒将目标级分缓冲交换到PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约30mg/mL,并且通过0.2 μ m过滤器无菌过滤。

[0570] 非还原性十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)

[0571] 将样品在95℃的Laemmli样品缓冲液(4%SDS,Bio-Rad)中变性10分钟。使样品在Criterion TGX无染色凝胶(4-15%聚丙烯酰胺,Bio-Rad)上运行。通过UV照射或考马斯蓝染色对蛋白质条带进行可视化。通过ChemiDoc MP Imaging System (Bio-Rad)对凝胶进行成像。使用Imagelab4.0.1软件(Bio-Rad)执行条带的定量。

[0572] 实施例2.具有CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体13

[0573] 的设计和纯化

[0574] 蛋白质表达

[0575] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体13(CCR4)各自包含两个不同的含Fc结构域单体的多肽(抗CCR4长Fc链(SEQ ID NO:ZZ中的任一者)的两个拷贝以及短Fc链(SEQ ID NO:ZZ)的两个拷贝)和抗CCR4轻链多肽(SEQ ID NO:ZZ)的两个拷贝。长Fc链包含电荷突变(K409D/D399K突变)Fc结构域单体(以促进同二聚化)和N末端处的抗CCR4 VH和CH1结构域(EU位置1-220)(构建体13(CCR4)),该Fc结构域单体与具有E357K电荷突变以及S354C和T366W突起形成突变(以促进异二聚化)的Fc结构域单体串联。短Fc链包含具有K370D电荷突变和Y349C、T366S、L368A和Y407V空腔形成突变(以促进异二聚化)的Fc结构域单体。抗CCR4轻链和抗CCR4 VH和CH1取自莫加珠单抗。也可以将CCR4轻链表达为作为scFv的一部分与长Fc链的N末端融合。可以用抗CCR4重链制备构建体13的其他版本,其中每个版本在长Fc链多肽的Fc结构域单体之间携带不同大小的甘氨酸间隔物(G4、G10、G15或G20接头)。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。以下构建体中的每一个的氨基酸序列由三个单独的质粒(一个质粒编码轻链(抗CCR4),一个质粒编码长Fc链(抗CCR4),并且一个质粒编码短Fc链)编码:

[0576] 表6. 构建体13(CCR4)序列

[0577]

构建体	轻链	长 Fc 链 (抗 CCR4 VH 和 CH1)	短 Fc 链
构建体 13 (CCR4) , G ₂₀ 接头	SEQ ID NO: DVLMTQSPLSLP VTPGEPASISCRS SRNIVHINGDTY LEWYLQKPGQS PQLLIYKVSNR SGVPDRFSGSGS GTDFTLKISRVE AEDVGVYYCFQ GSLLPWTFGQG TKVEIKRTVAAP SVFIFPPSDEQLK SGTASVVCLLN NFYPREAKVQW KVDNALQSGNS QESVTEQDSKDS TYSLSSTLTLSK ADYEKHKVYAC	EVQLVESGGDL VQGRSLRLSCA ASGFIFSNYGMS WVRQAPGKGLE WVATISSASTYS YYPDSVKGRFTI SRDNAKNSLYL QMNSLRVEDTA LYYCGRHSDGN FAFGYWGQGT LTVSSASTKGPS VFPLAPSSKSTS GGTAALGCLVK DYFPEPVTVSW NSGALTSGVHTF PAVLQSSGLYSL SSVVTVPSSSLG TQTYICNVNHKP SNTKVDKKVEP	DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR VVSVELTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ VCTLPSSRDEL KNQVSLSCAVD GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLDSDGSFF LVSKLTVDKSR WQQGNVFSCSV

[0578]

EVTHQGLSSPVT KSFNRGEC	KSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVF LFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQYN STYRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALPA PIEKTISKAKGQP REPQVYTLPPCR DKLTKNQVSLW CLVKGFYPSDIA VEWESNGQPEN NYKTTTPVLDSD GSFFLYSKLTVD KSRWQQGNVFS CSVMHEALHNH YTQKSLSLSPGK GGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGG DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR VVSVLTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ VYTLPPSRDELT KNQVSLTCLVK GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLKSDGSFF LYSDLTVDKSR WQQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPG	MHEALHNHYTQ KSLSLSPG
--------------------------	--	-------------------------

[0579] 使用Poros MabCapture A柱,通过基于蛋白A的亲和柱色谱法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。上样后,用磷酸盐缓冲盐水(PBS,pH7.0)洗涤捕获的SIF-抗体构建

体,并进一步用中间洗涤缓冲液50mM柠檬酸盐缓冲液(pH 5.5)洗涤,以除去其他与工艺有关的杂质。用100mM甘氨酸(pH 3)洗脱结合的SIF-抗体物质,并通过添加1M TRIS(pH 7.4)快速中和洗脱液,然后离心并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0580] 使用Poros XS树脂,通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES(pH 6,缓冲液A)预平衡柱,并且在平衡缓冲液中稀释(1:3)样品以便上样。使用12-15CV线性梯度(50mM MES(100%A)至400mM氯化钠(pH 6,100%B))作为洗脱缓冲液洗脱样品。通过分析尺寸排阻色谱法(SEC)分析洗脱期间收集的所有级分,并合并目标级分以产生纯化的SIF-抗体物质。

[0581] 在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用30kDa截止聚醚砜(PES)膜滤筒将合并物质缓冲交换到1X-PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约10-15mg/mL,并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0582] 将分析尺寸排阻色谱法用于后蛋白A、合并的离子交换级分和最终的纯化物质的纯度评估。使用1X-PBS将纯化物质稀释至1mg/mL,并在具有UV&FLD检测器的Agilent 1200系统上使用Zenix SEC-300(4.6x300mm,3 μ m,300Å,Sepax,目录号213300-4630)作为分析柱进行分析。在分析前,将柱以0.3mL/min用100mM磷酸钠、200mM精氨酸、300mM氯化钠(pH=6.7)和0.05%w/v叠氮化钠缓冲液平衡一小时。进样量为大约10-15 μ L,柱温:300C,在280nm处进行UV检测,通过在280nm处激发并且在330nm处发射进行FLD,总运行时间为15分钟。

[0583] 使用Charles Rivers Labs的Endosafe®-PTS内毒素测试系统测量内毒素水平。在纯化探针之前,在洗涤和平衡后检查AKTA纯化系统和柱的内毒素水平,以确保不存在内毒素污染。通常在每个纯化步骤结束时通过0.22 μ m过滤器过滤探针,以过滤出颗粒和细菌,然后检查内毒素。将缓冲液和探针用LAL试剂水(Charles River Labs,目录号W130)稀释10至20倍,并使用Charles River Labs Endosafe®-PTS滤筒(0.005EU/mL,目录号PTS20005F或0.01EU/mL,目录号PTS2001F)进行测试。

[0584] 实施例3.Fc-抗原结合结构域构建体1的设计和纯化

[0585] 如下所述制备由不对称串联Fc结构域形成的无支链构建体。Fc-抗原结合结构域构建体1(图1)包括两个不同的含Fc结构域单体的多肽(长Fc链以及短Fc链的两个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含两个串联的Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,其中每个Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任意的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)(以促进异二聚化)而产生的工程化突起。可将CCR4结合结构域表达为与长Fc链相同的氨基酸序列的一部分(例如,以形成scFv)。短Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任意的选自表4A和表4B的反向电荷突变(例如,K370D)(以促进异二聚化)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。在该实施例中,以及在Fc-抗原结合结构域构建体2-42的以下每个实施例中,细胞可包含表达抗体可变轻链的第三质粒。

[0586] 使用Poros MabCapture A(LifeTechnologies)柱,通过基于蛋白A的亲合柱色谱

法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。将捕获的Fc-抗原结合结构域构建体用磷酸盐缓冲盐水(低盐洗涤液)洗涤,并用100mM甘氨酸(pH 3)洗脱。洗脱物通过加入1M TRIS pH 7.4快速中和,并且通过0.2 μ m过滤器无菌过滤。使用Poros XS树脂(Applied Biosciences),通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES(pH 6,缓冲液A)预平衡柱,并且使用50mM MES、400mM氯化钠(pH 6,缓冲液B)作为洗脱缓冲液用步进梯度洗脱样品。在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用10kDa截止聚醚砜(PES)膜滤筒将目标级分缓冲液交换到PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约30mg/mL,并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0587] 将样品在95℃的Laemmli样品缓冲液(4%SDS,Bio-Rad)中变性10分钟。使样品在Criterion TGX无染色凝胶(4-15%聚丙烯酰胺,Bio-Rad)上运行。通过UV照射或考马斯蓝染色对蛋白质条带进行可视化。通过ChemiDoc MP Imaging System(Bio-Rad)对凝胶进行成像。使用Imagelab4.0.1软件(Bio-Rad)执行条带的定量。

[0588] 实施例4.Fc-抗原结合结构域构建体2的设计和纯化

[0589] 如下所述制备由不对称串联Fc结构域形成的无支链构建体。Fc-抗原结合结构域构建体2(图2)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链以及短Fc链的三个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含三个与N末端处的CCR4结合结构域串联的Fc结构域单体,其中每个Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起。短Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0590] 实施例5.Fc-抗原结合结构域构建体3的设计和纯化

[0591] 如下所述制备由不对称串联Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体3(图3)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链以及短Fc链的两个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含两个串联的Fc结构域单体,其中每个Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0592] 实施例6.Fc-抗原结合结构域构建体4的设计和纯化

[0593] 如下所述制备由不对称串联Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体4(图4)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链以及短Fc链的三个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含三个串联的Fc结构域单体,其中每个Fc结构域单体具有通过引入选自表3的

至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK) 293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0594] 实施例7.Fc-抗原结合结构域构建体5的设计和纯化

[0595] 如下所述制备由不对称串联Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体5(图5)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链以及短Fc链的两个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含两个与N末端处的CCR4结合结构域串联的Fc结构域单体,其中每个Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK) 293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0596] 实施例8.Fc-抗原结合结构域构建体6的设计和纯化

[0597] 如下所述制备由不对称串联Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体6(图6)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链以及短Fc链的三个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含三个与N末端处的CCR4结合结构域串联的Fc结构域单体,其中每个Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK) 293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0598] 实施例9.Fc-抗原结合结构域构建体7的设计和纯化

[0599] 如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体7(图7)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的两个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起,并与具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变)的Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有

通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0600] 实施例10.Fc-抗原结合结构域构建体8的设计和纯化

[0601] 如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体8(图8)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的两个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起,并与具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变)的Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0602] 实施例11.Fc-抗原结合结构域构建体9的设计和纯化

[0603] 如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体9(图9)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的两个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起,并与具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变)的Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0604] 实施例12.Fc-抗原结合结构域构建体10的设计和纯化

[0605] 如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体10(图10)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的四个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含两个串联的Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,其中每个Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起,并与具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变)的Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体,该

Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0606] 实施例13.Fc-抗原结合结构域构建体11的设计和纯化

[0607] 如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体11(图11)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的四个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含两个串联的Fc结构域单体,其中每个Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起,并在N末端与具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变)的Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的抗原结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0608] 实施例14.Fc-抗原结合结构域构建体12的设计和纯化

[0609] 如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体12(图12)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的四个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含两个串联的Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,其中每个Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起,并与具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变)的Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的抗原结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0610] 实施例15.Fc-抗原结合结构域构建体13的设计和纯化

[0611] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体13(图13)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的两个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变),并与具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生

生的工程化突起的Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0612] 实施例16.Fc-抗原结合结构域构建体14的设计和纯化

[0613] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体14(图14)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的两个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变),并与N末端处的具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起的Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0614] 实施例17.Fc-抗原结合结构域构建体15的设计和纯化

[0615] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体15(图15)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的两个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变),并与具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起的Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0616] 实施例18.Fc-抗原结合结构域构建体16的设计和纯化

[0617] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体16(图16)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的四个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变),并与各自具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)

而产生的工程化突起的两个Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0618] 实施例19.Fc-抗原结合结构域构建体17的设计和纯化

[0619] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体17(图17)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的四个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变),并在N末端与各自具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起的两个Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0620] 实施例20.Fc-抗原结合结构域构建体18的设计和纯化

[0621] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体18(图18)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的四个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变),并与各自具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起的两个Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0622] 实施例21.Fc-抗原结合结构域构建体19的设计和纯化

[0623] 如下所述制备由其中分支点既不在N末端也不在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体19(图19)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的四个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起,并与具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电

荷突变(例如,K409D/D399K突变)的Fc结构域单体和具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起的另一个Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK) 293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0624] 实施例22.Fc-抗原结合结构域构建体20的设计和纯化

[0625] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体20(图20)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的四个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起,并在N末端与具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变)的Fc结构域单体和具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起的另一个Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK) 293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0626] 实施例23.Fc-抗原结合结构域构建体21的设计和纯化

[0627] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体21(图21)包括两个不同的含Fc单体的多肽(长Fc链的两个拷贝以及短Fc链的四个拷贝)以及一个轻链多肽。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起,并与具有选自表4A和表4B或表4A和表4BA和表4B的反向电荷突变(例如,K409D/D399K突变)的Fc结构域单体、具有通过引入选自表3的至少一个突起形成突变(例如,S354C和T366W突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,E357K)而产生的工程化突起的另一个Fc结构域单体串联。短Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的CCR4结合结构域,该Fc结构域单体具有通过引入选自表3的至少一个空腔形成突变(例如,Y349C、T366S、L368A和Y407V突变)以及任选的选自表4A和表4B的一个或多个反向电荷突变(例如,K370D)而产生的工程化空腔。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK) 293细胞中。短Fc链和长Fc链的氨基酸序列由两个单独的质粒编码。按实施例3纯化表达的蛋白质。

[0628] 实施例24.Fc-抗原结合结构域构建体对CDC、ADCP和ADCC的激活

[0629] 使用三种测定来测试亲本mAb和各种Fc-抗原结合结构域构建体对CDC、ADCP和ADCC途径的激活。创建了四个构建体,它们包含来自Gazyva(奥滨尤妥珠单抗)(抗CD20单克隆抗体)的CDR。制备了岩藻糖基化和无岩藻糖基化mAb以及S3Y(实施例2中所述的构建体13的结构,图13)和SAI(实施例1中所述的构建体7的结构,图7)Fc-抗原结合结构域构建体。CDC测定如下进行:

[0630] 1.抗CD20 CDC测定中使用的靶细胞是Raji淋巴母细胞人B细胞系(ATCC CCL-86)。通过离心从悬浮培养物中除去Raji细胞,并将其以 6×10^5 个细胞/ml重悬于X-VIVO 15培养基中。

[0631] 2.将Raji细胞以每孔100 μ l的体积(6×10^4 个细胞/孔)转移到96孔平底测定板中。

[0632] 3.将每种抗CD20单克隆抗体(mAb)和SIF抗体在X-VIVO 15培养基中稀释至3.33 μ M。然后在1.5ml聚丙烯管中分别用抗CD20 mAb和SIF抗体进行1:3连续稀释,得到11点稀释系列。

[0633] 4.将抗CD20 mAb和SIF抗体的每种稀释液以50 μ l/孔转移到测定板上的适当孔中。

[0634] 5.转移抗CD20 mAb和SIF抗体后,立即将50 μ l正常人血清补体转移到测定板的每个孔中。

[0635] 6.将测定板在37 $^{\circ}$ C和5%CO₂下温育2小时。

[0636] 7.温育2小时后,将20 μ l的WST-1增殖试剂添加到测定板的每个孔中。

[0637] 8.将该板放回到37 $^{\circ}$ C、5%CO₂的温育箱保持14小时。

[0638] 9.温育14小时后,将板在板振荡器上振荡1分钟,并立即使用分光光度计以600nm校正正在450nm处测定孔的吸光度。

[0639] 在靶细胞为Raji的CDC测定中(图47,左图),S3Y(构建体13(CD20))构建体能够介导细胞毒性,而其他构建体则不能。

[0640] ADCP测定如下进行:

[0641] Fc γ RIIa-H ADCP报告基因生物测定完整试剂盒(Promega,目录号G9901)是一种基于生物发光细胞的测定,可以用于测量抗体和具有Fc结构域(特异性结合和激活Fc γ RIIa)的其他生物制剂的效力和稳定性。该测定由表达高亲和力人Fc γ RIIa-H变体的遗传工程化Jurkat T细胞系组成,该变体在氨基酸131处含有组氨酸(H)并且含有由NFAT响应元件(NFAT-RE)驱动的荧光素酶报告基因。当与靶细胞和相关抗体共培养时,Fc γ RIIa-H效应细胞结合抗体的Fc结构域,从而引起Fc γ RIIa信号传导和NFAT-RE介导的荧光素酶活性。使用Bio-GloTM荧光素酶测定系统和标准发光计检测并定量生物发光信号。在图47中图中指定的浓度下将递增浓度的抗CD20 Ab和构建体7(CD20)或构建体13(CD20)与Raji(CD20+)靶细胞和Fc一起温育,将递增浓度的抗CD20 Ab和构建体与Raji(CD20+)靶细胞和Fc γ RIIa-H效应细胞(2:1E:T比;大约35,000个效应子:15,000个靶细胞)一起温育。在37 $^{\circ}$ C下温育6小时。添加Bio-GloTM试剂,并在PHERAstar FS仪器中测量发光。使用GraphPad Prism软件RIIa-H效应细胞(2:1E:T比;大约35,000个效应子:15,000个靶细胞)在图47中图中指定的浓度下将数据拟合为4PL曲线。在37 $^{\circ}$ C下温育6小时。添加Bio-GloTM试剂,并在PHERAstar FS仪器中测量发光。使用GraphPad Prism软件将数据拟合为4PL曲线(图47,中图)。SAI(构建体7(CD20))和S3Y(构建体13(CD20))构建体均显示出相对于mAb增强>100倍的效力。

[0642] ADCC测定如下进行:

[0643] 将人原代NK效应细胞 (Hemacare) 解冻, 并使其在淋巴细胞生长培养基-3 (Lonza) 中以 5×10^5 个/mL在37℃下静息过夜。第二天, 收获人淋巴母细胞系Raji靶细胞 (ATCC CCL-86), 将其重悬于测定培养基 (无酚红RPMI, 10%FBS Δ , GlutaMAX™) 中, 并在37℃下在各种浓度的每种目的探针存在下铺板30分钟。然后收获静息NK细胞, 将其重悬于测定培养基中, 并添加到含有抗CD20包被的Raji细胞的板中。将板在37℃下温育6小时, 其中效应子与靶细胞的最终比例为5:1 (5×10^4 个NK细胞: 1×10^4 个Raji)。

[0644] 使用CytoTox-Glo™细胞毒性测定试剂盒 (Promega) 来确定ADCC活性。CytoTox-Glo™测定使用发光肽底物来测量死细胞蛋白酶活性, 该蛋白酶活性由已经丧失膜完整性的细胞 (例如, 裂解的Raji细胞) 释放。温育6小时后, 将制备的试剂 (底物) 添加到板的每个孔中, 并在室温下置于定轨板振荡器上15分钟。使用PHERAstar F5读板仪 (BMG Labtech) 测量发光。从测试条件中减去对照条件 (仅NK细胞+Raji) 的读数以消除背景后, 分析数据 (图47, 右图)。SAI (构建体7 (CD20)) 和S3Y (构建体13 (CD20)) 构建体均显示出相对于岩藻糖基化mAb增强的细胞毒性, 以及相对于无岩藻糖基化mAb相似的细胞毒性。

[0645] 实施例25. 用于表征Fc-抗原结合结构域构建体的实验分析

[0646] 肽和糖肽液相色谱-MS/MS

[0647] 将蛋白质在6M胍 (Sigma) 中稀释至 $1 \mu\text{g}/\mu\text{L}$ 。添加二硫苏糖醇 (DTT), 使浓度为10mM, 以在65℃的变性条件下还原二硫键30分钟。在冰上冷却后, 将样品与30mM碘乙酰胺 (IAM) 一起在黑暗中温育1小时, 以使游离巯醇烷基化 (氨甲酰甲基化)。然后将蛋白质通过10-kDa膜透析到25mM碳酸氢铵缓冲液 (pH 7.8) 中, 以除去IAM、DTT和胍。在Barocycler (NEP 2320; Pressure Biosciences, Inc.) 中用胰蛋白酶消化蛋白质。使压力在37℃下在20,000psi与环境压力之间循环, 1小时内总共进行30次循环。在Ultimate 3000 (Dionex) 色谱系统和Q-Exactive (Thermo Fisher Scientific) 质谱仪上进行肽的LC-MS/MS分析。使用0.1%FA的水溶液和0.1%FA的乙腈溶液作为流动相, 在BEH PepMap (Waters) 柱上分离肽。基于双重荷电离子 ($z=2$) m/z 842.5与 $\pm 1.5\text{Da}$ 的四极分离宽度, 靶向单个木糖基化的接头肽。

[0648] 完整的质谱分析

[0649] 在由78.98%水、20%乙腈、1%甲酸 (FA) 和0.02%三氟乙酸组成的运行缓冲液中将蛋白质稀释至 $2 \mu\text{g}/\mu\text{L}$ 的浓度。尺寸排阻层析分离在串联的两个Zenix-C SEC-300 (Sepax Technologies, Newark, DE) $2.1 \times 350\text{mm}$ 上执行, 总柱长度为700mm。使用上述运行缓冲液以 $80 \mu\text{L}/\text{min}$ 的流速从SEC柱中洗脱蛋白质。在以正模式操作的QSTAR Elite (Applied Biosystems) Q-ToF质谱仪上获得质谱。通过对跨越层析峰的整个宽度的光谱求和, 使用贝叶斯峰解卷积, 将在各个尺寸级分下的中性质量解卷积。

[0650] 毛细管电泳-十二烷基硫酸钠 (CE-SDS) 测定

[0651] 将样品稀释至 $1 \text{mg}/\text{mL}$, 并与HT Protein Express变性缓冲液 (PerkinElmer) 混合。将混合物在40℃下温育20分钟。将样品用 $70 \mu\text{L}$ 水稀释且转移至96孔板。通过配备有HT Protein Express LabChip (PerkinElmer) 的Caliper GXII仪器 (PerkinElmer) 分析样品。使用荧光强度来计算每种尺寸变体的相对丰度。

[0652] 非还原性SDS-PAGE

[0653] 将样品在95℃的Laemmli样品缓冲液 (4%SDS, Bio-Rad) 中变性10分钟。使样品在

Criterion TGX无染色凝胶(4-15%聚丙烯酰胺,Bio-Rad)上运行。通过UV照射或考马斯蓝染色对蛋白质条带进行可视化。通过ChemiDoc MP Imaging System(Bio-Rad)对凝胶进行成像。使用Imagelab 4.0.1软件(Bio-Rad)执行条带的定量。

[0654] 补体依赖性细胞毒性(CDC)

[0655] 通过比色测定评估CDC,在该比色测定中,将Raji细胞(ATCC)用连续稀释的利妥昔单抗、Fc构建体4或IVIg包被。将人血清补体(Quidel)以25%v/v添加到所有孔中,并且在37℃下温育2小时。在添加WST-1细胞增殖试剂(Roche Applied Science)后,将细胞在37℃下温育12小时。将板放置在振荡器上2分钟,并且测量450nm处的吸光度。

[0656] 实施例26.具有CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体4的设计和纯化

[0657] 蛋白质表达

[0658] 如下所述制备由不对称串联Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体4(CCR4)各自包括两个不同的含Fc结构域单体的多肽(长Fc链(SEQ ID NO:66),以及抗CCR4 Fc链(SEQ ID NO:68)的三个拷贝)和抗CCR4轻链多肽(SEQ ID NO:49)的三个拷贝。长Fc链包含三个串联的Fc结构域单体,其中每个Fc结构域单体具有E357K电荷突变以及S354C和T366W突起形成突变(以促进异二聚化)。短Fc链包含具有K370D电荷突变和Y349C、T366S、L368A和Y407V空腔形成突变(以促进异二聚化)的Fc结构域单体,以及N末端处的抗CCR4 VH和CH1结构域(EU位置1-220)(构建体4(CCR4))。也可以将CCR4轻链表达为作为scFv的一部分与短Fc链的N末端融合。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。表7中每个构建体的以下氨基酸序列由三个单独的质粒(一个质粒编码轻链(抗CCR4),一个质粒编码长Fc链,并且一个质粒编码短Fc链(抗CCR4))编码:

[0659] 表7.构建体4(CCR4)序列

构建体	轻链	长 Fc 链	短 Fc 链 (具有抗 CCR4 VH 和 CH1)
[0660] 构建体 4 (CCR4)	SEQ ID NO: DVLMTQSPLSLP VTPGEPASISCRS SRNIVHINGDTY LEWYLQKPGQS PQLLIYKVSNR SGVPDRFSGSGS GTDFTLKISRVE	SEQ ID NO: 66 DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR	SEQ ID NO: 68 EVQLVESGGDL VQPGRSLRLSCA ASGFIFSNYGMS WVRQAPGKGLE WVATISSASTYS YYPDSVKGRFTI SRDNAKNSLYL

[0661]

AEDVG VYYCFQ GSLLPWTFGQG TKVEIKRTVAAP SVFIFPPSDEQLK SGTASVVCLLN NFYPREAKVQW KVDNALQSGNS QESVTEQDSKDS TYSLSSTLTLSK ADYEKHKVYAC EVTHQGLSSPVT KSFNRGEC	VVSVLTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ VYTLPPCRDKLT KNQVSLWCLVK GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLDSDGSFF LYSKLTVDKSR WQQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPGKGGG GGGGGGGGGGG GGGGGGGGDKTH TCPPCPAPELLG GPSVFLFPPKPK DTLMISRTPEVT CVVVDVSHEDP EVKFNWYVDGV EVHNAKTKPRE EQYNSTYRVVS VLTVLHQDWLN GKEYKCKVSNK ALPAPIEKTISKA KGQPREPQVYT LPPCRDKLTKNQ VSLWCLVKGFY PSDIAVEWESNG QPENNYKTTPPV LDSDGSFFLYSK LTVDKSRWQQG NVFSCSVMHEA LHNHYTQKSLSL SPGKGGGGGGG GGGGGGGGGGG GGGDKTHTCPP CPAPELLGGPSV FLFPPKPKDTLM ISRTPEVTCVVV DVSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQY	QMNSLRVEDTA LYYCGRHSDGN FAFGYWQGQTL VTVSSASTKGPS VFPLAPSSKSTS GGTAALGCLVK DYFPEPVTVSW NSGALTSGVHTF PAVLQSSGLYSL SSVVTVPSSSLG TQTYICNVNHKP SNTKVDKKVEP KSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVF LFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQYN STYRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALPA PIEKTISKAKGQP REPQVCTLPSPR DELTKNQVSLSC AVDGFYPSDIAV EWESNGQPENN YKTTTPPVLDSDG SFFLVSKLTVDK SRWQQGNVFSC SVMHEALHNHY TQKSLSLSPG
--	--	--

[0662]		NSTYRVVSVLT VLHQDWLNGKE YKCKVSNKALP APIEKTISKAKG QPREPQVYTLPP CRDKLTKNQVS LWCLVKGFYPS DIAVEWESNGQ PENNYKTTTPVL DSDGSFFLYSKL TVDKSRWQQGN VFSCSVMHEAL HNHYTQKSLSLS PG
--------	--	--

[0663] 使用Poros MabCapture A (Life Technologies) 柱,通过基于蛋白A的亲和柱色谱法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。将捕获的Fc-抗原结合结构域构建体用磷酸盐缓冲盐水(低盐洗涤液)洗涤,并用100mM甘氨酸(pH 3)洗脱。洗脱物通过加入1M TRIS pH 7.4快速中和,并且通过0.2 μ m过滤器无菌过滤。使用Poros XS树脂(Applied Biosciences),通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES (pH 6,缓冲液A)预平衡柱,并且使用50mM MES、400mM氯化钠(pH 6,缓冲液B)作为洗脱缓冲液用步进梯度洗脱样品。在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用10kDa截止聚醚砜(PES)膜滤筒将目标级分缓冲液交换到PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约30mg/mL,并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0664] 实施例27.具有CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体8的设计和纯化

[0665] 蛋白质表达

[0666] 如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体8 (CCR4) 各自包括两个不同的含Fc结构域单体的多肽(长Fc链 (SEQ ID NO:69) 的两个拷贝以及抗CCR4短Fc链 (SEQ ID NO:68) 的两个拷贝) 和抗CCR4轻链多肽 (SEQ ID NO:49) 的拷贝。长Fc链包含具有E357K电荷突变以及S354C和T366W突起形成突变(以促进异二聚化) 并与具有反向电荷突变K409D和D399K(以促进同二聚化) 的Fc结构域单体串联的Fc结构域单体。短Fc链包含具有K370D电荷突变和Y349C、T366S、L368A和Y407V空腔形成突变(以促进异二聚化) 的Fc结构域单体,以及N末端处的抗CCR4 VH和CH1结构域(EU位置1-220) (构建体8 (CCR4))。也可以将CCR4轻链表达为作为scFv的一部分与短Fc链的N末端融合。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK) 293细胞中。表8中每个构建体的以下氨基酸序列由三个单独的质粒(一个质粒编码轻链(抗CCR4),一个质粒编码长Fc链,并且一个质粒编码短Fc链(抗CCR4)) 编码:

[0667] 表8. 构建体8 (CCR4) 序列

[0668]

构建体	轻链	长 Fc 链	短 Fc 链 (具有抗 CCR4 VH 和 CH1)
构建体 8 (CCR4)	SEQ ID NO: DVLMTQSPLSLP VTPGEPASISCRS SRNIVHINGDTY LEWYLQKPGQS PQLLIYKVSNR SGVPDRFSGSGS GTDFTLKISRVE AEDVGVYYCFQ GSLLPWTFGQG TKVEIKRTVAAP SVFIFPPSDEQLK SGTASVVCLLN NFYPREAKVQW KVDNALQSGNS QESVTEQDSKDS TYSLSSTLTLSK ADYEKHKVYAC EVTHQGLSSPVT KSFNRGEC	SEQ ID NO: 69 DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR VVSVELTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ VYTLPPSRDELT KNQVSLTCLVK GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLKSDGSFF LYSDLTVDKSR WQQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPPGKGGG GGGGGGGGGGG GGGGGGGGDKTH TCPPCPAPELLG GPSVFLFPPKPK DTLMISRTPEVT CVVVDVSHEDP	SEQ ID NO: 68 EVQLVESGGDL VQPGRSLRLSC AASGFIFSNYG MSWVRQAPGK GLEWVATISSA STYSYYPDSVK GRFTISRDNAL NSLYLQMNSLR VEDTALYYCGR HSDGNFAFGY WGQGTLLTVSS ASTKGPSVFPL APSSKSTSGGT AALGCLVKDYF PEPVTVSWNSG ALTSGVHTFPA VLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGT QTYICNVNHKP SNTKVDKKVEP KSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVF LFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFN WYVDGVEVHN

[0669]			EVKFNWYVDGV EVHNAKTKPRE EQYNSTYRVVS VLTVLHQDWLN GKEYKCKVSNK ALPAPIEKTISKA KGQPREPQVYT LPPCRDKLTKNQ VSLWCLVKGFY PSDIAVEWESNG QPENNYKTTPPV LDSDGSFFLYSK LTVDKSRWQQG NVFSCSVMHEA LHNHYTQKSLSL SPG	AKTKPREEQYN STYRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALPA PIEKTISKAKGQP REPQVCTLPSPR DELTKNQVSLSC AVDGFYPSDIAV EWESNGQPENN YKTTTPVLDSGD SFFLVSKLTVDK SRWQQGNVFSC SVMHEALHNHY TQKSLSLSPG
--------	--	--	---	--

[0670] 使用Poros MabCapture A (LifeTechnologies) 柱,通过基于蛋白A的亲合柱色谱法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。将捕获的Fc-抗原结合结构域构建体用磷酸盐缓冲盐水(低盐洗涤液)洗涤,并用100mM甘氨酸(pH 3)洗脱。洗脱物通过加入1M TRIS pH 7.4快速中和,并且通过0.2 μ m过滤器无菌过滤。使用Poros XS树脂(Applied Biosciences),通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES (pH 6,缓冲液A)预平衡柱,并且使用50mM MES、400mM氯化钠(pH 6,缓冲液B)作为洗脱缓冲液用步进梯度洗脱样品。在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用10kDa截止聚醚砜(PES)膜滤筒将目标级分缓冲交换到PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约30mg/mL,并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0671] 实施例28.具有CCR4 CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体9的设计和纯化

[0672] 蛋白质表达

[0673] 如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体9 (CCR4) 包括两个不同的含Fc结构域单体的多肽(抗CCR4长Fc链 (SEQ ID NO:54) 的两个拷贝以及抗CCR4短Fc链 (SEQ ID NO:68) 的两个拷贝) 和抗CCR4轻链多肽 (SEQ ID NO:49) 的拷贝。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的抗CCR4 VH和CH1结构域 (EU位置1-220) (构建体9 (CCR4)), 该Fc结构域单体具有E357K电荷突变以及S354C和T366W突起形成突变 (以促进异二聚化), 并与具有反向电荷突变K409D和D399K (以促进同二聚化) 的Fc结构域单体串联。短Fc链包含具有K370D电荷突变和Y349C、T366S、L368A和Y407V空腔形成突变 (以促进异二聚化) 的Fc结构域单体, 以及N末端处的抗CCR4重链 (构建体9 (CCR4))。也可以将CCR4轻链表达为作为scFv的一部分与长Fc链和/或短Fc链的N末端融合。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾 (HEK) 293细胞中。表9中每个构建体的以下氨基酸序列由三个单独的质粒(一个质粒编码轻链 (抗CCR4), 一个质粒编码长Fc链 (抗CCR4), 并且一个质粒编码短Fc链 (抗CCR4)) 编码:

[0674] 表9. 构建体9 (CCR4) 序列

[0675]

构建体	轻链	长 Fc 链 (具有抗 CCR4 VH 和 CH1)	短 Fc 链 (具有抗 CCR4 VH 和 CH1)
构建体 9 (CCR4)	SEQ ID NO: 49 DVLMTQSPLSLP VTPGEPASISCRS SRNIVHINGDTY LEWYLQKPGQS PQLLIYKVSNR SGVPDRFSGSGS GTDFTLKISRVE AEDVGVYYCFQ GSLLPWTFGQG TKVEIKRTVAAP SVFIFPPSDEQLK SGTASVVCLLN NFYPREAKVQW KVDNALQSGNS QESVTEQDSKDS TYSLSSTLTLSK ADYEKHKVYAC EVTHQGLSSPVT KSFNRGEC	SEQ ID NO: 54 EVQLVESGGDL VQPGRSLRLSC AASGFIFSNYG MSWVRQAPGK GLEWVATISSA STYSYYPDSVK GRFTISRDNAL NSLYLQMNSLR VEDTALYYCGR HSDGNFAFGY WGQGTLVTVSS ASTKGPSVFPL APSSKSTSGGT AALGCLVKDYF PEPVTVSWNSG ALTSGVHTFPA VLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGT QTYICNVNHKP SNTKVDKKVEP	SEQ ID NO: 68 EVQLVESGGDL VQPGRSLRLSC AASGFIFSNYG MSWVRQAPGK GLEWVATISSA STYSYYPDSVK GRFTISRDNAL NSLYLQMNSLR VEDTALYYCGR HSDGNFAFGY WGQGTLVTVSS ASTKGPSVFPL APSSKSTSGGT AALGCLVKDYF PEPVTVSWNSG ALTSGVHTFPA VLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGT QTYICNVNHKP SNTKVDKKVEP

[0676]

		KSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVF LFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVD VSIEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQYN STYRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALPA PIEKTISKAKGQP REPQVYTLPPSR DELTKNQVSLTC LVKGFYPSDIAV EWESNGQPENN YKTTTPVLKSDG SFFLYSDLTVDK SRWQQGNVFSC SVMHEALHNHY TQKSLSLSPGKG GGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGD KTHTCPPCPAPE LLGGPSVFLFPP KPKDTLMISRTP EVTCVVVDVSH EDPEVKFNWYV DGVEVHNAKTK PREEQYNSTYRV VSVLTVLHQDW LNGKEYKCKVS NKALPAPIEKTIS KAKGQPREPQV YTLPPCRDKLTK NQVSLWCLVKG FYPSDIAVEWES NGQPENNYKTT PPVLDSDG SFFL YSKLTVDKSRW QQGNVFSCSVM HEALHNHYTQK SLSLSPG	KSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVF LFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVD VSIEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQYN STYRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALPA PIEKTISKAKGQP REPQVCTLPPSR DELTKNQVSLSC AVDGFYPSDIAV EWESNGQPENN YKTTTPVLDSDG SFFLVSKLTVDK SRWQQGNVFSC SVMHEALHNHY TQKSLSLSPG
--	--	---	---

[0677] 使用Poros MabCapture A (LifeTechnologies) 柱,通过基于蛋白A的亲和柱色谱法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。将捕获的Fc-抗原结合结构域构建体用磷酸盐缓冲盐水(低盐洗涤液)洗涤,并用100mM甘氨酸(pH 3)洗脱。洗脱物通过加入1M TRIS pH

7.4快速中和,并且通过0.2 μ m过滤器无菌过滤。使用Poros XS树脂(Applied Biosciences),通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES(pH 6,缓冲液A)预平衡柱,并且使用50mM MES、400mM氯化钠(pH 6,缓冲液B)作为洗脱缓冲液用步进梯度洗脱样品。在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用10kDa截止聚醚砜(PES)膜滤筒将目标级分缓冲液交换到PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约30mg/mL,并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0678] 实施例29.具有CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体10的设计和纯化

[0679] 蛋白质表达

[0680] 如下所述制备由其中分支点在N末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体10(CCR4)各自分别包括两个不同的含Fc结构域单体的多肽(抗CCR4长Fc链(SEQ ID NO:71)的两个拷贝以及短Fc链(SEQ ID NO:63)的四个拷贝)和抗CCR4轻链多肽(SEQ ID NO:49)的拷贝。长Fc链包含两个串联的Fc结构域单体和N末端处的抗CCR4 VH和CH1结构域(EU位置1-220)(构建体10(CCR4)),其中每个Fc结构域单体具有E357K电荷突变以及S354C和T366W突起形成突变(以促进异二聚化),并与具有反向电荷突变K409D和D399K(以促进同二聚化)的Fc结构域单体串联。短Fc链包含具有K370D电荷突变和Y349C、T366S、L368A和Y407V空腔形成突变(以促进异二聚化)的Fc结构域单体。也可以将抗CCR4轻链表达为作为scFv的一部分与长Fc链的N末端融合。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。表10中每个构建体的以下氨基酸序列由三个单独的质粒(一个质粒编码轻链(抗CCR4),一个质粒编码长Fc链(抗CCR4),并且一个质粒编码短Fc链)编码:

[0681] 表10.构建体10(CCR4)序列

[0682]

构建体	轻链	长 Fc 链 (抗 CCR4 VH 和 CH1)	短 Fc 链
构建体 10 (CCR4)	SEQ ID NO: DVLMTQSPLSLP VTPGEPASISCRS SRNIVHINGDTY LEWYLQKPGQS PQLLIYKVSNR SGVPDRFSGSGS GTDFTLKISRVE AEDVGVYYCFQ GSLLPWTFGQG TKVEIKRTVAAP SVFIFPPSDEQLK SGTASVVCLLN NFYPREAKVQW KVDNALQSGNS QESVTEQDSKDS TYSLSSTLTLSK ADYEKHKVYAC EVTHQGLSSPVT KSFNRGEC	SEQ ID NO: 71 EVQLVESGGDL VQPGRSLRLSC AASGFIFSNYG MSWVRQAPGK GLEWVATISSA STYSYYPDSVK GRFTISRDNAL NSLYLQMNSLR VEDTALYYCGR HSDGNFAFGY WGQGTLVTVSS ASTKGPSVFPL APSSKSTSGGT AALGCLVKDYF PEPVTWSWNSG ALTSGVHTFPA VLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGT QTYICNVNHKP SNTKVDKKVEP KSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVF LFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQYN STYRVVSVLTVL HQDNLNGKEY KCKVSNKALPA PIEKTISKAKGQP REPQVYTLPPSR DELTKNQVSLTC LVKGFYPSDIAV EWESNGQPENN YKTTTPVLKSDG SFFLYSDLTVDK SRWQQGNVFSC	SEQ ID NO: 63 DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR VVSVELTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ VCTLPPSRDEL KNQVSLSCAVD GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLDSDGSFF LVSKLTVDKSR WQQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPG

[0683]

		SVMHEALHNHY TQKSLSLSPGKG GGGGGGGGGG GGGGGGGGGD KTHTCPPCPAPE LLGGPSVFLFPP KPKDTLMIS RTP EVTCVVVDVSH EDPEVKFNWYV DGVEVHNAKTK PREEQYNSTYRV VSVLTVLHQDW LNGKEYKCKVS NKALPAPIEKTIS KAKGQPREPQV YTLPPCRDKLTK NQVSLWCLVKG FYPSDIAVEWES NGQPENNYKTT PPVLDS DGSFFL YSKLTVDKSRW QQGNVFSCSVM HEALHNHYTQK SLSLSPGKGGGG GGGGGGGGGG GGGGGGDKTHT CPPCPAPELLGG PSVFLFPPKPKD TLMISRTPEVTC VVVDVSHEDPE VKFNWYVDGVE VHNAKTKPREE QYNSTYRVVSV LTVLHQDWLNG KEYKCKVSNKA LPAPIEKTISKAK GQPREPQVY TLP PCRDKLTKNQV SLWCLVKG FYP SDIAVEWESNG QPENNYKTTPPV LDS DGSFFLYSK LTVDKSRWQQG	
--	--	--	--

[0684]		NVFSCSVMHEA LHNHYTQKSLSL SPG	
--------	--	------------------------------------	--

[0685] 使用Poros MabCapture A (LifeTechnologies) 柱,通过基于蛋白A的亲和柱色谱法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。将捕获的Fc-抗原结合结构域构建体用磷酸盐缓冲盐水(低盐洗涤液)洗涤,并用100mM甘氨酸(pH 3)洗脱。洗脱物通过加入1M TRIS pH 7.4快速中和,并且通过0.2 μ m过滤器无菌过滤。使用Poros XS树脂(Applied Biosciences),通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES(pH 6,缓冲液A)预平衡柱,并且使用50mM MES、400mM氯化钠(pH 6,缓冲液B)作为洗脱缓冲液用步进梯度洗脱样品。在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用10kDa截止聚醚砜(PES)膜滤筒将目标级分缓冲液交换到PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约30mg/mL,并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0686] 实施例30.具有CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体16的设计和纯化

[0687] 蛋白质表达

[0688] 如下所述制备由其中分支点在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体16(CCR4)各自分别包括两个不同的含Fc结构域单体的多肽(抗CCR4长Fc链(SEQ ID NO:73)的两个拷贝以及短Fc链(SEQ ID NO:63)的四个拷贝)和抗CCR4轻链多肽(SEQ ID NO:49)的三个拷贝。长Fc链包含具有反向电荷突变K409D和D399K(以促进同二聚化)的Fc结构域单体和N末端处的抗CCR4 VH和CH1结构域(EU位置1-220)(构建体10(CCR4)),该Fc结构域单体与各自具有E357K电荷突变以及S354C和T366W突起形成突变(以促进异二聚化)的两个串联的Fc结构域单体串联。短Fc链包含具有K370D电荷突变和Y349C、T366S、L368A和Y407V空腔形成突变(以促进异二聚化)的Fc结构域单体。也可以将抗CCR4轻链表达为作为scFv的一部分与长Fc链的N末端融合。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。表11中每个构建体的以下氨基酸序列由三个单独的质粒(一个质粒编码轻链(抗CCR4),一个质粒编码长Fc链(抗CCR4),并且一个质粒编码短Fc链)编码:

[0689] 表11.构建体16(CCR4)序列

[0690]

构建体	轻链	长 Fc 链 (具有抗 CCR4 VH 和 CH1)	短 Fc 链
构建体 16 (CCR4)	SEQ ID NO: DVLMTQSPLSLP VTPGEPASISCRS SRNIVHINGDTY LEWYLQKPGQS PQLLIYKVSNR SGVPDRFSGSGS GTDFTLKISRVE AEDVGVYYCFQ GSLLPWTFGQG TKVEIKRTVAAP SVFIFPPSDEQLK SGTASVVCLLN NFYPREAKVQW KVDNALQSGNS QESVTEQDSKDS TYSLSSTLTLSK ADYEKHKVYAC EVTHQGLSSPVT KSFNRGEC	SEQ ID NO: 73 EVQLVESGGDL VQPGRSLRLSC AASGFIFSNYG MSWVRQAPGK GLEWVATISSA STYSYYPDSVK GRFTISRDNAL NSLYLQMNSLR VEDTALYYCGR HSDGNFAFGY WGQGTLLTVSS ASTKGPSVFPL APSSKSTSGGT AALGCLVKDYF PEPVTWSWNSG ALTSGVHTFPA VLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGT QTYICNVNHKP SNTKVDKKVEP KSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVF LFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQYN STYRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALPA PIEKTISKAKGQP REPQVYTLPPCR DKLTKNQVSLW CLVKGFYPSDIA	SEQ ID NO: 63 DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR VVSVELTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ VCTLPPSRDEL TNQVSLSCAVD GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLDSDGSFF LVSKLTVDKSR WQQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPG

[0691]

		VEWESNGQPEN NYKTTTPVLDS GSFFLYSKLTVD KSRWQQGNVFS CSVMHEALHNH YTQKSLSLSPGK GGGGGGGGGG GGGGGGGGGG DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR VVSVLTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ VYTLPPCRDKLT KNQVSLWCLVK GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLDSGDSFF LYSKLTVDKSR WQQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPGKGGG GGGGGGGGGG GGGGGGGDKTH TCPPCPAPPELLG GPSVFLFPPKPK DTLMISRTPEVT CVVVDVSHEDP EVKFNWYVDGV EVHNAKTKPRE EQYNSTYRVVS VLTVLHQDWLN GKEYKCKVSNK ALPAPIEKTISKA KGQPREPQVYT LPPSRDELTKNQ VSLTCLVKGFYP	
--	--	--	--

[0692]		SDIAVEWESNG QPENNYKTTPPV LKSDGSFFLYSD LTVDKSRWQQG NVFSCSVMHEA LHNHYTQKSLSL SPG	
--------	--	--	--

[0693] 使用Poros MabCapture A (LifeTechnologies) 柱,通过基于蛋白A的亲和柱色谱法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。将捕获的Fc-抗原结合结构域构建体用磷酸盐缓冲盐水(低盐洗涤液)洗涤,并用100mM甘氨酸(pH 3)洗脱。洗脱物通过加入1M TRIS pH 7.4快速中和,并且通过0.2 μ m过滤器无菌过滤。使用Poros XS树脂(Applied Biosciences),通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES(pH 6,缓冲液A)预平衡柱,并且使用50mM MES、400mM氯化钠(pH 6,缓冲液B)作为洗脱缓冲液用步进梯度洗脱样品。在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用10kDa截止聚醚砜(PES)膜滤筒将目标级分缓冲交换到PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约30mg/mL,并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0694] 实施例31.具有CCR4结合结构域的Fc-抗原结合结构域构建体19的设计和纯化

[0695] 蛋白质表达

[0696] 如下所述制备由其中分支点既不在N末端也不在C末端Fc结构域的单分支Fc结构域形成的构建体。Fc-抗原结合结构域构建体19(CCR4)分别包括两个不同的含Fc结构域单体的多肽(抗CCR4长Fc链(SEQ ID NO:75)的两个拷贝以及短Fc链(SEQ ID NO:63)的四个拷贝)和抗CCR4轻链多肽(SEQ ID NO:49)的拷贝。长Fc链包含Fc结构域单体和N末端处的抗CCR4 VH和CH1结构域(EU位置1-220)(构建体19(CCR4)),该Fc结构域单体具有E357K电荷突变以及S354C和T366W突起形成突变(以促进异二聚化),并与具有反向电荷突变K409D和D399K(以促进同二聚化)的Fc结构域单体串联,并与具有E357K电荷突变以及S354C和T366W突起形成突变(以促进异二聚化)的Fc结构域单体串联。短Fc链包含具有K370D电荷突变和Y349C、T366S、L368A和Y407V空腔形成突变(以促进异二聚化)的Fc结构域单体。也可以将抗CCR4轻链表达为作为scFv的一部分与长Fc链的N末端融合。将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾(HEK)293细胞中。表12中每个构建体的以下氨基酸序列由三个单独的质粒(一个质粒编码轻链(抗CCR4),一个质粒编码长Fc链(抗CCR4),并且一个质粒编码短Fc链)编码:

[0697] 表12.构建体19(CCR4)序列

[0698]

构建体	轻链	长 Fc 链 (具有抗 CCR4 VH 和 CH1)	短 Fc 链
构建体 19 (CCR4)	SEQ ID NO: DVLMTQSPLSLP VTPGEPASISCRS SRNIVHINGDTY LEWYLQKPGQS PQLLIYKVSNR SGVPDRFSGSGS GTDFTLKISRVE AEDVGVYYCFQ GSLLPWTFGQG TKVEIKRTVAAP SVFIFPPSDEQLK SGTASVVCLLN NFYPREAKVQW KVDNALQSGNS QESVTEQDSKDS TYSLSSTLTLSK ADYEKHKVYAC EVTHQGLSSPVT KSFNRGEC	SEQ ID NO: 75 EVQLVESGGDL VQPGRSLRLSC AASGFIFSNYG MSWVRQAPGK GLEWVATISSA STYSYYPDSVK GRFTISRDNAL NSLYLQMNSLR VEDTALYYCGR HSDGNFAFGY WGQGTLLTVSS ASTKGPSVFPL APSSKSTSGGT AALGCLVKDYF PEPVTWSWNSG ALTSGVHTFPA VLQSSGLYSLSS VVTVPSSSLGT QTYICNVNHKP SNTKVDKKVEP KSCDKTHTCPPC PAPELLGGPSVF LFPPKPKDTLMI SRTPEVTCVVVD VSHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQYN STYRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALPA	SEQ ID NO: 63 DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR VVSVELTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ VCTLPSPRDEL KNQVSLSCAVD GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLDSDGSFF LVSKLTVDKSR WQQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPG

[0699]

		PIEKTISKAKGQP REPQVYTLPPCR DKLTKNQVSLW CLVKGFYPSDIA VEWESNGQPEN NYKTTTPVLDS GSFFLYSKLTV KSRWQQGNVFS CSVMHEALHNH YTQKSLSLSPGK GGGGGGGGGG GGGGGGGGGG DKTHTCPPCPAP ELLGGPSVFLFP PKPKDTLMISRT PEVTCVVVDVS HEDPEVKFNWY VDGVEVHNAKT KPREEQYNSTYR VVSVELTVLHQD WLNGKEYKCKV SNKALPAPIEKTI SKAKGQPREPQ VYTLPPSRDELT KNQVSLTCLVK GFYPSDIAVEWE SNGQPENNYKT TPPVLKSDGSFF LYSDLTVDKSR WQQGNVFSCSV MHEALHNHYTQ KSLSLSPGGKGG GGGGGGGGGG GGGGGGGGDKT HTCPPCPAPELL GGPSVFLFPPKP KDTLMISRTPEV TCVVVDVSHED PEVKFNWYVDG VEVHNAKTKPR EEQYNSTYRVV SVLTVLHQDWL NGKEYKCKVSN	
--	--	---	--

[0700]	KALPAPIEKTISK AKGQPREPQVY TLPPCRDKLTKN QVSLWCLVKGF YPSDIAVEWESN GQPENNYKTTPP VLDSGDGSFFLYS KLTVDKSRWQQ GNVFSCSVMHE ALHNHYTQKSL SLSPG	
--------	---	--

[0701] 使用Poros MabCapture A (LifeTechnologies) 柱,通过基于蛋白A的亲和柱色谱法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。将捕获的Fc-抗原结合结构域构建体用磷酸盐缓冲盐水(低盐洗涤液)洗涤,并用100mM甘氨酸(pH 3)洗脱。洗脱物通过加入1M TRIS pH 7.4快速中和,并且通过0.2μm过滤器无菌过滤。使用Poros XS树脂(Applied Biosciences),通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES(pH 6,缓冲液A)预平衡柱,并且使用50mM MES、400mM氯化钠(pH 6,缓冲液B)作为洗脱缓冲液用步进梯度洗脱样品。在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用10kDa截止聚醚砜(PES)膜滤筒将目标级分缓冲液交换到PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约30mg/mL,并通过0.2μm过滤器进行无菌过滤。

[0702] 实施例32.抗CCR4 Fc构建体对抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)的激活

[0703] 将CCRF-CEM细胞(ATCC)用作靶细胞,并在包含10%热灭活的FBS(Hyclone)的RPMI 1640培养基中培养。将50 • 1细胞(100x10³个细胞/ml)重悬于包含10%超低IgG FBS的无酚红的RPMI中,并接种到平底白色96孔板中。将抗CCR4构建体从6nM稀释3倍,并制备成浓度为测定所需的最终浓度的11倍。将10 • 1每种构建体稀释液添加到靶细胞中,并在室温下温育至少15分钟,然后添加效应细胞。将冷藏保存的NK细胞(Hemacare)用作效应细胞,并将其在经组织培养处理的烧瓶(Falcon)中在AIM-V培养基中静置24小时。每个孔添加25000个效应细胞,以使效应子与靶标(E:T)的比例为5:1。将板在37℃下温育5小时,然后在添加50μL CytoTox Glo试剂(Promega),之后在37 • C下温育15分钟。使用PHERAstar FS(BMG Labtech)读取发光。结果在图25和表13中示出。

[0704] 表13.抗CCR4 Fc构建体诱导ADCC的效力

构造体编号 ¹	n	EC50 (nM)		
		范围	平均值	SD
[0705] 构建体 13 (抗 CCR4) , G ₂₀ 接头	1	17165 to 125449	1.062	+/- 6176.5

[0706] 实施例33:构建体中的Fc结构域保持与抗体中的Fc结构域相似的与Fc γ 受体的结合

[0707] 使用抗CD20和抗CCR4构建体来评估同二聚化突变、异二聚化突变、多肽接头和Fab

结构域的各种组合是否影响与Fc γ 受体的结合。利用表面等离子体共振 (SPR) 来评估与CD64 (Fc γ 受体I) 的1:1结合。将构建体捕获在芯片表面上,并测量与可溶性受体的结合以确保1:1结合。在这种格式下,结合价是对Fc功能改变最敏感的读数;动力学常数和平衡常数对Fc结构域的子集改变不敏感。

[0708] 细胞培养

[0709] 将DNA序列优化以在哺乳动物细胞中表达,并克隆到pcDNA3.4哺乳动物表达载体中。将DNA质粒构建体经由脂质体转染到人胚肾 (HEK) 293细胞中。抗体由两种不同的质粒表达:一种编码重链,并且第二种编码轻链。SIF抗体由三种单独的质粒表达:在大多数情况下,一种质粒编码抗体轻链,一种质粒编码包含附接到氨基末端Fc的CH1-VH FAB部分的长Fc链,并且第三种质粒编码短Fc链。S3A和S3W Sif抗体除外。对于S3W,一种质粒编码抗体轻链,第二种质粒编码包含两个Fc结构域的长链,并且第三种质粒编码包含CH1-VH FAB部分的单条Fc链。对于S3A,一种质粒编码抗体轻链,第二种质粒编码包含附接到氨基末端Fc的CH1-VH FAB部分的长Fc链,并且一种质粒编码也包含CH1-VH FAB部分的短Fc链。

[0710] 蛋白质纯化

[0711] 使用Poros MabCapture A柱,通过基于蛋白A的亲合柱色谱法从细胞培养上清液中纯化表达的蛋白质。上样后,用磷酸盐缓冲盐水 (PBS, pH7.0) 洗涤捕获的SIF-抗体构建体,并进一步用中间洗涤缓冲液50mM柠檬酸盐缓冲液 (pH 5.5) 洗涤,以除去其他与工艺有关的杂质。用100mM甘氨酸 (pH 3) 洗脱结合的SIF抗体物质,并通过添加1M TRIS (pH 7.4) 快速中和洗脱液,然后离心并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0712] 使用Poros XS树脂,通过离子交换色谱法进一步分离蛋白质。用50mM MES (pH 6, 缓冲液A) 预平衡柱,并且在平衡缓冲液中稀释 (1:3) 样品以便上样。使用12-15CV线性梯度 (50mM MES (100%A) 至400mM氯化钠 (pH 6, 100%B)) 作为洗脱缓冲液洗脱样品。通过分析尺寸排阻色谱法 (SEC) 分析洗脱期间收集的所有级分,并合并目标级分以产生纯化的SIF-抗体物质。

[0713] 在离子交换后,在切向流过滤系统上,使用30kDa截止聚醚砜 (PES) 膜滤筒将合并物质缓冲交换到1X-PBS缓冲液中。将样品浓缩至大约10-15mg/mL,并通过0.2 μ m过滤器进行无菌过滤。

[0714] 物理化学分析

[0715] 将分析尺寸排阻色谱法 (SEC) 用于后蛋白A、合并的离子交换级分和最终的纯化物质的纯度评估。

[0716] 使用1X-PBS将纯化物质稀释至1mg/mL,并在具有UV&FLD检测器的Agilent 1200系统上使用Zenix SEC-300 (4.6x300mm, 3 μ m, **300Å**, Sepax, 目录号213300-4630) 作为分析柱进行分析。

[0717] 在分析前,将柱以0.3mL/min用100mM磷酸钠、200mM精氨酸、300mM氯化钠 (pH=6.7) 和0.05%w/v叠氮化钠缓冲液平衡一小时。进样量为大约10-15 μ L,柱温:300C,在280nm处进行UV检测,通过在280nm处激发并且在330nm处发射进行FLD,总运行时间为15分钟。

[0718] 尺寸纯度结果在表14中示出。所有材料仅显示出低水平的更高级物质 (HOS)。

[0719] 表14:Fc结合测定中使用的构建体的尺寸纯度

[0720]

构建体	抗原	通过 SEC 得到的尺寸纯度 (目标物质%)	通过 SEC 得到的尺寸纯度 (HOS %)
mAb	CD20	97.0%	1.7%

[0721]

构建体	抗原	通过 SEC 得到的尺寸纯度 (目标物质%)	通过 SEC 得到的尺寸纯度 (HOS %)
构建体 13 (S3Y)	CD20	89.6%	0.0%
构建体 7 (S3I)	CD20	89.0%	1.7%
构建体 8 (S3W)	CD20	83.4%	0.0%
构建体 9 (S3A)	CD20	92.4%	1.5%
构建体 10 (S5I)	CD20	98.4%	1.6%
构建体 19 (S5X)	CD20	90.0%	0.4%
构建体 16 (S5Y)	CD20	73.8%	1.6%
mAb	CD20	97.0%	1.7%

[0722] 结合分析

[0723] 使用CM3 Series S传感器芯片在Biacore T200仪器 (GE Healthcare) 上进行结合实验。为了进行FcγR结合的价分析,经由直接胺偶联固定天然蛋白A。在运行缓冲液中稀释配体并将其捕获。使人重组CD32a或CD64 (R&D Systems) 的6点稀释系列流经捕获的配体。如下计算每种配体的价:

[0724] 配体价 = $R_{max} / [(MW_{分析物} / MW_{配体}) * 配体捕获水平]$ 。

[0725] CD64与抗CD20构建体结合的分析结果在Error!Reference source not found.中示出。在所有情况下,CD64结合价均等于Fc结构域的数量,表明所有Fc结构域均具有结合CD64的功能。在序列上与S3Y-AA-0BI和S3Y-AA-AVE相同但缺少Fab结构域的对照化合物与那些构建体相当地结合CD64,表明包含Fab结构域不会改变与Fc受体的结合。

[0726] 表15:某些抗CD20构建体的价

[0727]

构建体	抗原	Fc 结构域的数量	通过 SPR 得到的 CD64 价
mAb	CD20	1	1.5
构建体 13 (S3Y)	CD20	3	3.4

[0728]

构建体 7 (S3I)	CD20	3	3.0
构建体 8 (S3W)	CD20	3	2.9
构建体 9 (S3A)	CD20	3	3.1
构建体 10 (S5I)	CD20	5	5.5
构建体 19 (S5X)	CD20	5	4.9
构建体 16 (S5Y)	CD20	5	5.5
对 照 (S3Y)	没有抗原结合 结构域	3	3.

[0729] 实施例34:构建体与细胞表面Fc γ 受体更紧密地结合

[0730] 使用抗CD20构建体在时间分辨荧光共振能量转移(TR-FRET)测定(CisBio)中评估构建体与细胞表面CD32a的相对结合。测定试剂根据制造商的说明来制备。使用Freedom EVOware 150自动化液体处理机(Tecan)为每个样品生成10点、3倍连续稀释系列,将其添加到带有标记受体的细胞中。然后添加标记的竞争抗体,并将板在室温下温育。使用PHERAstar荧光读取器(BMG Labtech GmbH)在665和620nm处读取测定板。将对数转换的样品浓度相对于对应的HTRF信号比(665nm/620nm)进行绘图。在XY-绘图上进行四参数非线性回归分析(最小二乘拟合),以计算未标记样品的EC50,其中EC50与样品对Fc γ 受体的亲和力成反比。

[0731] 通过TR-FRET测定的与CD32a的竞争性结合测量结果。Fc结构域的数量增加极大地提高了构建体与免疫球蛋白竞争CD32a的能力,如降低的IC50值所反映。在序列上与S3Y-AA-OBI和S3Y-AA-AVE相同但缺少Fab结构域的对照化合物与那些构建体相当地竞争细胞表面CD32a,表明包含Fab结构域不会改变与Fc受体的结合。

[0732] 表16:某些抗CD20构建体的Fc受体结合

[0733]

构建体	抗原	FcγRIIIaV158 IC50 (nM)	FcγRIIIaH131 IC50 (nM)	FcγRIIb IC50 (nM)
mAb	CD20	428	1273	3291
构建体 13 (S3Y)	CD20	0.076	0.009	2.146
构建体 7 (S3I)	CD20	0.230	0.014	29.220
构建体 8 (S3W)	CD20	0.476	0.026	34.925
构建体 9 (S3A)	CD20	0.539	0.018	17.361
构建体 10 (S5I)	CD20	0.045	0.002	4.427
构建体 15 (S5X)	CD20	0.055	0.012	0.086
构建体 1 (S5Y)	CD20	0.017	0.014	1.231
对 照 (S3Y)	没有抗原 结合结构 域	0.097	0.025	3.297

[0734] 实施例35:抗原结合保留在抗CCR4构建体中

[0735] 使用SPR评估抗原结合。使用先前固定的抗6X His抗体在传感器上捕获带有组氨酸标签的CCR4 (9049-B7 R&D Systems) 重组蛋白。使稀释系列的同族抗体和SIF抗体通过传感器,在分析物进样之间用低pH甘氨酸溶液对所述传感器进行再生。使用1:1Langmuir相互作用模型计算结合。

[0736] 抗CCR4构建体的结合在表17中示出。通过SEC,所有测试的化合物的纯度不低于96%。在有利于1:1结合的测定中,构建体具有与对应单克隆抗体相当的抗原结合。

[0737] 表17:某些抗CCR4构建体的CCR4结合

[0738]

构建体	KD (nM)
mAb	7.38
构建体 13 (S3Y)	9.44

[0739]

构建体	KD (nM)
构建体 7 (S3I)	0.013

[0740] 实施例36:抗CCR4 Fc构建体结合Fc受体。

[0741] Fc受体结合的分析发现抗CCR4 Fc构建体13(实施例2;表6)结合Fc受体。

[0742] 其他实施方案

[0743] 本说明书中提及的所有出版物、专利和专利申请都以引用的方式并入本文,其程度如同每个独立的出版物或专利申请具体地且个别地指出以引用的方式并入。

[0744] 虽然本公开已结合其具体实施方案进行描述,但应理解,进一步的修改是可能的,并且本专利申请预期覆盖一般而言遵循本公开的原理的本公开的任何变化、用途或适应,并且包括与本公开的此类偏离,所述偏离在本公开所属领域内的已知或惯常实践内,并且可以应用于上文所述的基本特征,并且落入权利要求的范围内。

[0745] 其他实施方案在权利要求内。






图1



构建体 2

图2



构建体 3

图3






图4



构建体 5

图5



构建体 6

图6




图7




图8




图9




图10




图11




图12




图13




图14




图15




图16




图17




图18




图19




图20




图21

初步数据




图22




图23A




图23B




图23C

216 EPKSCDKTHICPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVD 280
281 GVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYCKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPR 344
345 EPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSK 409
410 LTVDKSRWQQGNVFCSCVMHEALHNNHYTQKSLSLSPGK 447

(SEQ ID NO: 43)

图24A

221 DKTHICPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVD 280
281 GVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYCKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPR 344
345 EPOQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPPVLDSDGSFFLYSK 409
410 LTVDKSRWQQGNVFCSCVMHEALHNNHYTQKSLSLSPG 446

(SEQ ID NO: 45)

图24B

216 EPKSCDKTHICPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVD 280
281 GVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPR 344
345 EPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTTPVLDSDGSFFLYSK 409
410 LTVDKSRWQQGNVFCSCVMHEALHNNHYTQKSLSLSPG 446

(SEQ ID NO: 47)

图24C

221 DKTHICPPCPAPELLGGPSVFLFPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVD 280
281 GVEVHNAKTPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYCKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPR 344
345 EPQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSK 409
410 LTVDKSRWQQGNVFCFSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK 447

(SEQ ID NO: 42)

图24D




图25