

【公報種別】特許公報の訂正

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】令和4年12月20日(2022.12.20)

【特許番号】特許第7184756号(P7184756)

【登録日】令和4年11月28日(2022.11.28)

【特許公報発行日】令和4年12月6日(2022.12.6)

【年通号数】登録公報(特許)2022-222

【出願番号】特願2019-511658(P2019-511658)

【訂正要旨】特許権者の住所の誤載により、下記のとおり全文を訂正する。

10

【国際特許分類】

A 6 1 K 31/65(2006.01)

A 6 1 P 35/02(2006.01)

A 6 1 K 45/00(2006.01)

A 6 1 K 31/7068(2006.01)

A 6 1 K 31/7076(2006.01)

A 6 1 K 31/704(2006.01)

【F I】

A 6 1 K 31/65

A 6 1 P 35/02

A 6 1 K 45/00

A 6 1 K 31/7068

A 6 1 K 31/7076

A 6 1 K 31/704

20

【記】別紙のとおり

30

40

50

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7184756号
(P7184756)

(45)発行日 令和4年12月6日(2022.12.6)

(24)登録日 令和4年11月28日(2022.11.28)

(51)国際特許分類

F I

A 6 1 K	31/65	(2006.01)	A 6 1 K	31/65
A 6 1 P	35/02	(2006.01)	A 6 1 P	35/02
A 6 1 K	45/00	(2006.01)	A 6 1 K	45/00
A 6 1 K	31/7068	(2006.01)	A 6 1 K	31/7068
A 6 1 K	31/7076	(2006.01)	A 6 1 K	31/7076

請求項の数 8 (全411頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2019-511658(P2019-511658)
 (86)(22)出願日 平成29年8月30日(2017.8.30)
 (65)公表番号 特表2019-532031(P2019-532031 A)
 (43)公表日 令和1年11月7日(2019.11.7)
 (86)国際出願番号 PCT/US2017/049462
 (87)国際公開番号 WO2018/045084
 (87)国際公開日 平成30年3月8日(2018.3.8)
 審査請求日 令和2年8月28日(2020.8.28)
 (31)優先権主張番号 62/381,383
 (32)優先日 平成28年8月30日(2016.8.30)
 (33)優先権主張国・地域又は機関 米国(US)
 (31)優先権主張番号 62/437,533
 (32)優先日 平成28年12月21日(2016.12.21)

最終頁に続く

(73)特許権者 511032017
 テトラフェース ファーマシューティカルズ、インコーポレイテッド
 アメリカ合衆国 マサチューセッツ 02451 ウォルサム、スイート 400、ジョーンズ ロード 201
 (74)代理人 100095832
 弁理士 細田 芳徳
 (74)代理人 100187850
 弁理士 細田 芳弘
 (72)発明者 シアオ、シアオーイー
 アメリカ合衆国 マサチューセッツ 02421 レキシントン、スティムソン アベニュー 15
 (72)発明者 デュマ、ジェイクス、ピー。

最終頁に続く


(54)【発明の名称】 テトラサイクリン化合物および処置方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

急性骨髄性白血病を治療する方法において使用するための医薬組成物であって、該医薬組成物は、以下の構造式 (XX) を有する化合物またはその薬学的に許容できる塩を含み、該方法は、治療を必要とする対象に、構造式 (XX) :

【化1】



を有する化合物、またはその薬学的に許容できる塩の有効量を投与することを含み、式中、
 R^{803} が、H、 $C_1 \sim 6$ アルキル、 $C_1 \sim 6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 6$ ヒドロキシアルキル、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリル ($C_0 \sim 3$) アルキレニル、アミノ ($C_1 \sim C_4$) アルキル、モノもしくはジ ($C_1 \sim C_4$ アルキル) アミノ ($C_1 \sim C_4$) アルキル、または (4~13員) ヘテロシクリル ($C_0 \sim C_3$) アルキレニルであり、ここで、ヘテロシクリル部分が、 $C_1 \sim 3$ アルキルで任意に置換され;

R^{701} が、H、 $C_1 \sim 4$ アルキルオキシ、 $-OH$ 、 $C_1 \sim 4$ アルキル、 $C_1 \sim 4$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアルキル、または $C_1 \sim 4$ ハロアルコキシであり；


R^{403} および $R^{403'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1 \sim 4$ アルキル； $C_1 \sim 4$ ハロアルキル；カルボシクリル部分がヒドロシル基で任意に置換される $C_3 \sim 12$ カルボシクリルー（ $C_0 \sim C_3$ ）アルキレニルー；または $H_2NC(O) - (C_1 \sim C_3)$ アルキレニルーである；

医薬組成物。

【請求項 2】

前記化合物またはその薬学的に許容できる塩が、

【化 2】




またはその薬学的に許容できる塩から選択される、請求項 1 に記載の医薬組成物。

【請求項 3】

前記化合物またはその薬学的に許容できる塩が、

【化 3】



またはその薬学的に許容できる塩から選択される、請求項 1 または 2 に記載の医薬組成物。

【請求項 4】

(a) R^{701} が $-OCH_3$ であり、 R^{803} がエチルである、

(b) R^{701} が $-OCH_3$ であり、 R^{403} および $R^{403'}$ の各々が水素である、

(c) R^{803} がエチルであり、 R^{403} および $R^{403'}$ の各々が水素である、

(d) R^{701} が $-OCF_3$ であり、 R^{803} がメチルである、又は

(e) R^{701} が $-CF_3$ であり、 R^{803} が、 $C_1 \sim 4$ アルキルまたは（ $C_3 \sim C_6$ ）カルボシクリルー（ $C_0 \sim C_3$ ）アルキレニルである、

請求項 1 に記載の医薬組成物。

【請求項 5】

前記化合物またはその薬学的に許容できる塩が、以下の構造式：

10


20

30

40

50

【化 4】



10


20

30

40

50

【化 5】



10


20

30

40

50

【化 6】



10


20

30

40

50

【化 7】




10

のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、請求項 1 又は 4 に記載の医薬組成物。

【請求項 6】

前記化合物またはその薬学的に許容できる塩が、以下の構造式：

【化 8】



20

30

40

のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、請求項 1 に記載の医薬組成物。

【請求項 7】

前記方法が、1 つ以上のさらなる治療剤の投与を含む、請求項 1 ～ 6 のいずれか一項に記載の医薬組成物。

50

【請求項 8】

(a)前記さらなる治療剤が、シタラビンおよびアンスラサイクリン薬物であり、例えば、前記アンスラサイクリン薬物が、ダウノルビシンまたはイダルビシンから選択され、または

(b)前記方法はクラドリビンの投与をさらに含む、

請求項 7 に記載の医薬組成物。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願

本出願は、2016年8月30日に出願された米国仮特許出願第62/381,383号明細書および2016年12月21日に出願された米国仮特許出願第62/437,533号明細書の利益を主張するものである。上記出願の全教示内容が参照により本明細書に援用される。

【背景技術】

【0002】

血液悪性腫瘍は、血液系およびリンパ系を襲う癌である。血液悪性腫瘍の一部のタイプとして、多発性骨髄腫、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫および白血病が挙げられる。癌は、造血組織（例えば、骨髄）または免疫系の細胞から始まり得る。例えば、白血病は、造血組織から始まる。白血病は、骨髄における血球、通常、白血球の制御不能な増殖によって特徴付けられる。白血球は、体の免疫応答の基本的な構成要素である。白血病細胞は、正常な血液および骨髄細胞を押し退けて、これらに取って代わる。

【0003】

4つの主要なタイプの白血病：急性骨髄性白血病（AML）；慢性骨髄性白血病（CML）；急性リンパ性白血病（ALL）；および慢性リンパ性白血病（CLL）がある。4つの主要なタイプの白血病の主な差異は、進行速度および癌が発症する場所と関係がある。急性骨髄性白血病（AML）（急性骨髄性白血病、急性骨髄芽球性白血病、急性顆粒球性白血病または急性非リンパ球性白血病としても知られている）は、血液および骨髄の癌の増殖の早い形態である。AMLは、急性白血病の最も一般的なタイプである。これは、骨髄が芽球（依然として完全に成熟していない細胞）を形成し始めたときに起こる。これらの芽球は、通常、白血球に発達する。しかしながら、AMLにおいて、これらの細胞は、発達せず、伝染を防ぐことはできない。AMLにおいて、骨髄は、異常な赤血球および血小板も形成し得る。これらの異常な細胞の数は、迅速に増大して、異常な（白血病）細胞は、体が必要とする正常な白血球、赤血球および血小板を押し退け始める。

【0004】

AMLの標準的な処置として、化学療法剤シタラビンおよびダウノルビシン（7+3）の投与からなる寛解－誘導処置が挙げられる。この処置は、数十年間、治療基準であった。悪性疾患のための他のごく少数の治療アプローチも、そのような長い期間にわたって不変のままであった。また、共罹患率および処置関連毒性に対する高い感受性がなお処置の奏功を制限している。血液癌に対する処置ストラテジの進歩にもかかわらず、特に白血病、例えばAMLの処置のための新規の強力で良好な忍容性のある単剤として、または他の抗悪性腫瘍薬と組み合わせて用いられるテトラサイクリンを同定する必要があり、かつ治療利益を最大にし、かつ処置関連毒性を最小にする必要がある。

【発明の概要】

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明の第1の実施形態は、血液癌の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、構造式（I）もしくは（I'）：

10


20

30


40

50

【化 1】





10



構造式 (I I) もしくは (I I') :

【化 2】

20





30

または構造式 (I I I) もしくは (I I I') :

40

50

【化 3】



によって表される化合物あるいはその薬学的に許容できる塩の有効量を投与することを含み、式中、変数は、本明細書中で規定かつ記載されるとおりである、方法に関する。

【0006】

本発明の別の実施形態は、血液癌を処置するための医薬の製造のための、構造式 (I)、(I')、(II)、(II')、(III) もしくは (III') によって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩の使用である。一態様において、血液悪性腫瘍は、白血病である。特定の態様において、白血病は、AML である。



【0007】

本発明の別の実施形態は、血液癌の処置に用いられる、構造式 (I)、(I')、(II)、(II')、(III) もしくは (III') によって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩である。一態様において、血液悪性腫瘍は、白血病である。特定の態様において、白血病は、AML である。

【0008】

本発明の別の実施形態は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (X) もしくは (X-1)

【化 4】




のいずれか 1 つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0009】

本発明の別の実施形態は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (XI)

【化 5】




のいずれか 1 つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

10

【0010】

本発明の別の実施形態は、構造式 (XII)

【化 6】



20

によって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩である。


【0011】

本発明の別の実施形態は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (XII) によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0012】

本発明の別の実施形態は、血液癌であり、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化 7】




30

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む。

【0013】

本発明の別の実施形態は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式：

【化 8】




50

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0014】

本発明の別の実施形態は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、
構造式

【化9】




10

のいずれか1つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0015】

本発明の別の実施形態は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、
以下の構造式

【化10】




20

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0016】

本発明の別の実施形態は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、
以下の構造式

【化11】



30

40


によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0017】

本発明の別の実施形態は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、
以下の構造式

50

【化 1 2】




10

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0018】

本発明の別の実施形態は、構造式 (X I I I) :

【化 1 3】



20

によって表される任意の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物である。

【0019】



本発明の別の実施形態は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (X I I I) によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む。

【0020】

本発明の別の実施形態は、構造式 (X I V) もしくは (X V) :

30

【化 1 4】



40

のいずれか 1 つによって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩である。

【0021】

本発明の別の実施形態は、薬学的に許容できるキャリアまたは希釈剤と、上述の実施形態のいずれかの化合物とを含む医薬組成物である。

【0022】

本発明の別の実施形態は、血液腫瘍を患う対象を処置する方法であって、対象に、上述

50

の実施形態の医薬組成物のいずれかの化合物の治療的に有効な量を投与することを含む方法である。

【0023】

本発明の別の実施形態は、細菌感染の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、構造式X I VもしくはX Vのいずれか1つによって表される化合物または式X I I IもしくはX I Iの化合物の治療的に有効な量を投与することを含む方法である。

【図面の簡単な説明】

【0024】

【図1】実施例2に記載する化合物1で処理したMV4-11細胞における、COX1、COX4およびアクチンのレベルを示すウエスタンブロットを示す。

10

【図2】実施例2に記載する化合物2で処理したMV4-11細胞における、COX1、COX4およびアクチンのレベルを示すウエスタンブロットを示す。

【図3】実施例2に記載する化合物3aで処理したMV4-11細胞における、COX1、COX4およびアクチンのレベルを示すウエスタンブロットを示す。

【図4】実施例2に記載する化合物4aで処理したMV4-11細胞における、COX1、COX4およびアクチンのレベルを示すウエスタンブロットを示す。

【図5】実施例2に記載する化合物5で処理したMV4-11細胞における、COX1、COX4およびアクチンのレベルを示すウエスタンブロットを示す。

【図6】シタラビン（上部パネル）および化合物3a（下部パネル）についての用量反応あてはめ関数を示すグラフである。X軸は、試験した化合物の濃度であり、Y軸は、標準化した作用-生存%（数/E0）である。標準化は、推定した基礎（E0）パラメータに関するモデル化後に行った。

20

【図7A】MV4-11白血病モデルを用いた、異種移植片モデルにおけるCB17 SCIDマウス試験の、腫瘍容量対処理（表1Cの用量1および用量2の化合物3a）の開始後の日数のグラフである。

【図7B】MV4-11白血病モデルを用いた、異種移植片モデルにおけるCB17 SCIDマウス試験の、体重変化（%）対処理（表1Cの用量1および用量2の化合物3a）の開始後の日数のグラフである。

【図7C】MV4-11白血病モデルを用いた、異種移植片モデルにおけるCB17 SCIDマウス試験の、腫瘍容量対処理（表1Cの用量1および用量2の化合物4a）の開始後の日数のグラフである。

30

【図7D】MV4-11白血病モデルを用いた、異種移植片モデルにおけるCB17 SCIDマウス試験の、体重変化（%）対処理（表1Cの用量1および用量2の化合物4a）の開始後の日数のグラフである。

【図7E】MV4-11白血病モデルを用いた、異種移植片モデルにおけるCB17 SCIDマウス試験の、腫瘍容量対処理（表1Cの用量1および用量2の化合物5）の開始後の日数のグラフである。

【図7F】MV4-11白血病モデルを用いた、異種移植片モデルにおけるCB17 SCIDマウス試験の、体重変化（%）対処理（表1Cの用量1および用量2の化合物5）の開始後の日数のグラフである。

40

【図8】ラット心臓のミトコンドリア翻訳アッセイにおける化合物3aについての用量-反応結果を示す。

【図9】MV411 MT-COX1発現（シトクロムオキシダーゼサブユニット1、ミトコンドリアにおいて発現される）についての結果を示す。X軸（薬物濃度）は、ページ上で左から右に以下の結果を示す：化合物3a、チゲサイクリンおよびシタラビン。

【図10】MV411 COX-IV発現（シトクロムオキシダーゼサブユニット4、核内で発現される）についての結果を示す。X軸（薬物濃度）は、ページ上で左から右に以下の結果を示す：化合物3a、チゲサイクリンおよびシタラビン。

【図11】MV411 PIG3発現（TP53I3-a p53応答タンパク質、p53

50

活性化に応じて誘導される発現、酸化ストレスに対する応答に関連した役割) についての結果を示す。X軸(薬物濃度)は、ページ上で左から右に以下の結果を示す: 化合物3a、チゲサイクリンおよびシタラビン。

【図12】MV411 BAX発現(p53活性化によるアポトーシス促進性タンパク質発現誘導、BCL2とヘテロダイマーを形成してアポトーシスを誘導する)についての結果を示す。X軸(薬物濃度)は、ページ上で左から右に以下の結果を示す: 化合物3a、チゲサイクリンおよびシタラビン。

【図13】CDKN2A発現(p14^{ARF}またはARF-核遺伝子としても知られており、翻訳がcMy cによって調節され、Mdm2に結合してこれを封鎖することにより、p53を安定化/活性化するように機能する)の結果を示す。X軸(薬物濃度)は、ページ上で左から右に以下の結果を示す: 化合物3a、チゲサイクリンおよびシタラビン。

10

【図14A-E】本出願で開示した例示の化合物の最小阻止濃度(MIC)の値をμg/mLで図14A~図14Eの表にまとめて示す。

【図15A-M】本出願で開示した例示の化合物の、示した血液癌細胞株に対して測定した「阻止濃度50%」(IC₅₀)の値を図15A~図15Mの表にまとめて示す。

【図16A-F】本出願で開示した例示の化合物の、示した血液癌細胞株に対して測定した「阻止濃度50%」(IC₅₀)の値を図16A~図16Fの表にまとめて示す。

【図17A-D】本出願で開示した例示の化合物の、示した血液癌細胞株に対して測定した「阻止濃度50%」(IC₅₀)の値を図17A~図17Dの表にまとめて示す。

20

【発明を実施するための形態】

【0025】


本発明は、血液癌の処置を、それを必要とする対象において行う方法に関する。本方法は、構造式(I)、(I')、(II)、(II')、(III)もしくは(III')のいずれか1つによって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩の有効量を対象に投与することを含む。構造式(I)、(I')、(II)、(II')、(III)または(III')の変数は、本明細書中で以下の段落において記載される。本発明が、本明細書中で定義される置換基変数(すなわちR¹、R²、R³、その他)の全ての組合せを包含することが理解される。

【0026】


本発明の第1の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、構造式(I)または(I'):

30

【化15】



40



で表される化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、

Xが、NおよびC(R²)から選択され;

50

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 および R^6 の各々が、独立して、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-OR^A$ 、 $-C(O)NR^B R^B'$ 、 $NR^B R^B'$ 、 $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリルから選択され；または

R^1 および R^2 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、カルボシクリルまたはヘテロシクリル環を形成し；または

R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、カルボシクリルまたはヘテロシクリル環を形成し；

R^4 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリルから選択され；

R^4 が、水素、 $-(C_2 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $S(O)_{1 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-$ $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、および $-C(O)-$ $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})-NR^D R^E$ から選択され；または

R^4 および R^4' が、それらが共通して結合される窒素原子と任意選択的に一緒になって、N、OおよびSから独立して選択される1～2つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む4～8員環を形成し；

R^6 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ および $-(C_3 \sim C_6 \text{シクロアルキル})$ から選択され；

各 R^A が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-$ $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-$ $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-C(O)-$ $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から選択され；

各 R^B および各 R^B' が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ハロアルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-$ $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-$ $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-$ $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-$ $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-$ $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-$ $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)-$ $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-N(R^D)(R^E)$ から選択され；

各 R^C が、独立して、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリルおよび $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリルから選択され；

各 R^D および各 R^E が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリルから選択され、

ここで、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 、 R^6' 、 R^A 、 R^B 、 R^B' 、 R^C 、 R^D 、または R^E の任意のアルキル、アルキレン、カルボシクリルまたはヘテロシクリル部分、あるいは R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 、または R^4 および R^4' を合わせることで形成されるものが、任意選択的かつ独立して置換される。

【0027】

第1の実施形態の第1の態様において、

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 の任意のアルキル、またはアルキレン部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^B'$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的かつ独立して置換され；

R^6' 、 R^A 、または R^C の任意のアルキルまたはアルキレン部分が、1つ以上のフルオロで任意選択的かつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のカルボシクリルまたはヘテロシクリル部分、あるいは R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 または R^4 および R^4' を合わ

せることによって形成される任意の環が、ハロ、=O、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(C_3 \sim C_{10} \text{カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^B'$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的かつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、あるいは R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 または R^4 および R^4' を合わせることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的かつ独立して置換され；

各 R^F が、独立して、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ハロアルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ヒドロキシアルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -ヘテロシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-C(O)_2-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^B'$ および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から選択され；

R^A 、 R^B 、 R^B' 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルまたはヘテロシクリル部分、 R^6 の任意のシクロアルキル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4 \text{アルキル}$ 、 $-O-C_1 \sim C_4 \text{フルオロアルキル}$ 、=O、-OH、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ 、および $-N(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})_2$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^A 、 R^B 、 R^B' 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、あるいは R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、または R^6 の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1 \sim C_4 \text{アルキル}$ 、または $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される。残りの変数は、第1の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

【0028】

第1の実施形態の第2の態様において、化合物は、

10


20

30

40

50

【化 16】



10

20

30

または上記のいずれかの塩以外である。残りの変数は、第1の実施形態またはその第1の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0029】

40

第1の実施形態の第3の態様において、 R^5 、 R^6 および R^6' の各々が水素である。残りの変数は、第1の実施形態またはその第1または第2の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0030】

第1の実施形態の第4の態様において、 X が $C(R^2)$ である。残りの変数は、第1の実施形態またはその第1、第2または第3の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0031】

第1の実施形態の第5の態様において、

X が、 N および $C(R^2)$ から選択され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 および R^6 の各々が、独立して、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6$ ア

50

ルキル)、 $-OR^A$ 、 $NR^B R^{B'}$ 、 $-C(O)NR^B R^{B'}$ 、 $S(O)_{0\sim 2}R^C$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリル、および $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリルから選択され；または

R^1 および R^2 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、カルボシクリルまたはヘテロシクリル環を形成し；または

R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、カルボシクリルまたはヘテロシクリル環を形成し；

R^4 が、水素、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリル、および $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリルから選択され；

R^4 が、水素、 $-(C_2\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $S(O)_{1\sim 2}R^C$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-$ $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、および $-C(O)-$ $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})-NR^D R^E$ から選択され；または

R^4 および $R^{4'}$ が、それらが共通して結合される窒素原子と任意選択的に一緒になって、N、OおよびSから独立して選択される1～2つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む4～8員環を形成し；

R^6 が、水素、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ および $-(C_3\sim C_6\text{シクロアルキル})$ から選択され；

各 R^A が、独立して、水素、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-$ $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-C(O)-$ $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-C(O)-$ $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から選択され；

各 R^B および各 $R^{B'}$ が、独立して、水素、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1\sim 2}-$ $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1\sim 2}-$ $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1\sim 2}-$ $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-$ $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-C(O)-$ $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-$ $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から選択され；

各 R^C が、独立して、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリルおよび $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリルから選択され；

各 R^D および各 R^E が、独立して、水素、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ カルボシクリル、および $-(C_0\sim C_6\text{アルキレン})$ ヘテロシクリルから選択され；

ここで、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 、 $R^{6'}$ 、 R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、または R^E の任意のアルキル、アルキレン、カルボシクリルまたはヘテロシクリル部分、あるいは R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 、または R^4 および $R^{4'}$ を合わせることで形成されるものが、任意選択的かつ独立して置換される。残りの変数は、第1の実施形態またはその第1、第2、第3または第4の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0032】

第1の実施形態の第6の態様において、

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、または R^6 の任意のアルキルまたはアルキレン部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0\sim 2}R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的かつ独立して置換され；

$R^{6'}$ 、 R^A 、または R^C の任意のアルキルまたはアルキレン部分が、1つ以上のフルオロで任意選択的かつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、または R^6 のいずれかの任意のカルボシクリルまたはヘテロシクリル部分、あるいは R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 、または R^4 および R

4 を合わせることによって形成される任意の環が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $4 \sim 13$ 員ヘテロシクリル、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的かつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、または R^6 のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、あるいは R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 、または R^4 および $R^{4'}$ を合わせることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的かつ独立して置換され；

各 R^F が、独立して、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ $-$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ $-$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ $-$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ $-$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ $-$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ $-$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から選択され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルまたはヘテロシクリル部分、 R^6 の任意のシクロアルキル部分、あるいは R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、または R^6 の任意の置換基が、ハロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ 、および $-N(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})_2$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、あるいは R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、または R^6 の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1 \sim C_4$ アルキル、または $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される。残りの変数は、第1の実施形態またはその第1、第2、第3、第4または第5の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0033】

第1の実施形態の第7の態様において、 X が N である。残りの変数は、第1の実施形態またはその第1、第2、第3、第4、第5または第6の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0034】

第1の実施形態の第8の態様において、 R^1 が、水素、ハロ、1つ以上のハロ、 $-NR^B R^{B'}$ 、 $-C(O)NR^B R^{B'}$ 、 $-OR^A$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ $-$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ $-$ ヘテロシクリルで任意選択的に置換される $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ から選択され、ここで、 R^A が、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換される $C_1 \sim C_6$ アルキルである。残りの変数は、第1の実施形態またはその第1、第2、第3、第4、第5、第6または第7の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0035】

第1の実施形態の第9の態様において、 R^3 が、水素および $-N(R^B)(R^{B'})$ から選択され、ここで、 R^B が水素である。残りの変数は、第1の実施形態またはその第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7または第8の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0036】

第1の実施形態の第10の態様において、血液癌を処置するのに用いられる化合物は、以下の表中の化合物のいずれかまたはその薬学的に許容できる塩から選択される。

【0037】

10

20

30

40

50

【表 1】

化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造
SS-7-1-A (ジアステロイマー-A) SS-7-1-B (ジアステロイマー-B)		SS-7-2		SS-7-3-A (ジアステロイマー-A) SS-7-3-B (ジアステロイマー-B)	
SS-7-4-A (ジアステロイマー-A) SS-7-4-B (ジアステロイマー-B)		SS-7-5		SS-7-6-A (ジアステロイマー-A) SS-7-6-B (ジアステロイマー-B)	
SS-7-7-A (ジアステロイマー-A) SS-7-7-B (ジアステロイマー-B)		SS-7-8-A (ジアステロイマー-A) SS-7-8-B (ジアステロイマー-B)		SS-7-9-A (ジアステロイマー-A) SS-7-9-B (ジアステロイマー-B)	
SS-7-10-A (ジアステロイマー-A) SS-7-10-B (ジアステロイマー-B)		SS-7-11		SS-7-12	
SS-7-13-A (ジアステロイマー-A) SS-7-13-B (ジアステロイマー-B)		S4-14-1 (ジアステロイマー-A)		S4-14-2 (ジアステロイマー-A)	
S4-14-3 (ジアステロイマー-A)		S4-14-4 (ジアステロイマー-A)		S4-14-5-A (ジアステロイマー-A) S4-14-5-B (ジアステロイマー-B)	
S4-14-7 (ジアステロイマー-A)		S4-14-8 (ジアステロイマー-A)		S4-14-8 (ジアステロイマー-A)	
S4-14-10 (ジアステロイマー-A)		S4-14-11 (ジアステロイマー-A)		S4-14-12 (ジアステロイマー-A)	
S4-14-15 (ジアステロイマー-A)		S4-14-16-A (ジアステロイマー-A) S4-14-16-B (ジアステロイマー-B)		S4-14-16 (ジアステロイマー-A)	
S4-14-17 (ジアステロイマー-A)		S4-14-18 (ジアステロイマー-A)		SS-10-1-A (ジアステロイマー-A) SS-10-1-B (ジアステロイマー-B)	
SS-10-2-A (ジアステロイマー-A) SS-10-2-B (ジアステロイマー-B)		SS-10-3-A (ジアステロイマー-A) SS-10-3-B (ジアステロイマー-B)		SS-10-4-A (ジアステロイマー-A) SS-10-4-B (ジアステロイマー-B)	
SS-6-1 (第一の ジアステロイマー)		SS-6-2 (第一の ジアステロイマー)		SS-6-3 (第一の ジアステロイマー)	
S7-24-2-A (ジアステロイマー-A) S7-24-2-B (ジアステロイマー-B)		S7-24-3-A (ジアステロイマー-A)		S7-24-3-A (ジアステロイマー-A)	
SS-4-1		SS-4-2		SS-4-3	

【 0 0 3 8 】

10

20

30

40

50

【表 2】

化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造
S9-4-1		S9-5-1		S9-5-2	
S9-5-3		S9-5-4		S9-5-5	
S9-5-6		S10-4-1 (第一のジステレオマー)		S10-4-2 (第一のジステレオマー)	
S10-4-3 (第一のジステレオマー)		S11-3-1		S11-3-2	
S11-3-3		S12-8-3-A (ジステレオマー-A) S12-8-3-B (ジステレオマー-B)		S12-8-3-A (ジステレオマー-A)	
S12-8-3-A (ジステレオマー-A) S12-8-3-B (ジステレオマー-B)		S12-8-4-A (ジステレオマー-A)		S12-8-5-A (ジステレオマー-A)	
S12-8-5-A (ジステレオマー-A) S12-8-5-B (ジステレオマー-B)		S12-8-7-A (ジステレオマー-A)		S12-8-8-A (ジステレオマー-A)	
S13-5-1		S13-5-2		S14-5-1	
S14-5-2		S14-5-3-A (ジステレオマー-A) S14-5-3-B (ジステレオマー-B)		S15-10-1	
S15-10-2		S15-10-3-A (ジステレオマー-A) S15-10-3-B (ジステレオマー-B)		S16-3-1 (第一のジステレオマー)	
S16-7-2 (第一のジステレオマー)		S16-7-3 (第一のジステレオマー)		S16-7-4 (第一のジステレオマー)	
S16-7-5 (第一のジステレオマー)		S16-7-6 (第一のジステレオマー)		S17-3-1	
S17-3-2		S17-3-3		S17-3-4	
S17-3-5		S17-3-6		S17-3-7	

【 0 0 3 9 】

10

20

30

40

50

【表 3】

化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造
S17-3-8		S17-3-9		S17-3-10	
S17-3-11		S18-3-1-1		S18-3-1-2	
S18-3-2-1		S18-3-2-2		S18-3-3-5 (ジアステロマー-B)	
S18-7-2		S19-7-3-A (ジアステロマー-A) S19-7-3-B (ジアステロマー-B)		S19-7-4-A (ジアステロマー-A) S19-7-4-B (ジアステロマー-B)	
S19-7-5-A (ジアステロマー-A) S19-7-5-B (ジアステロマー-B)		S19-7-6		S19-7-7-A (ジアステロマー-A) S19-7-7-B (ジアステロマー-B)	
S20-4-3 (単一の ジアステロマー)		S20-4-3 (単一の ジアステロマー)		S20-4-3 (単一の ジアステロマー)	
S20-4-4 (単一の ジアステロマー)		S21-5-1		S21-5-2	
S25-5-3		S25-5-4			

10

20

【0040】

上述の表中に示される化合物は、国際公開第2014/036502号に記載される合成手順に従って調製しており、この出願の全教示内容が参照により本明細書に援用される。国際公開第2014/03650号における上述の参照合成スキームに示される表中の化合物番号は、全て米国特許第9,573,895号に見出され、この出願の全教示内容が参照により本明細書に援用される。

30

【0041】

本発明の第2の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、構造式(I)または(I')の化合物であり、式中、 R^4 が、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から選択され； $R^{4'}$ が、水素；ヒドロキシおよびハロから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される $-(C_2 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_3 \sim C_6 \text{ シクロアルキル})$ 、 $-C(O)- (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)- (C_1 \sim C_6 \text{ アルキレン})-N(R^D)(R^E)$ 、および $S(O)_1 \sim 2 R^C$ から選択され；または R^4 および $R^{4'}$ が、それらが共通して結合される窒素原子と一緒に、N、OおよびSから独立して選択される1~2つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む4~6員環を形成し； R^C が $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ であり； R^D および R^E の各々が、独立して、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から選択される。残りの変数は、第1の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

40

【0042】

第2の実施形態の第1の態様において、 R^4 が、水素、メチル、エチルおよびプロピルから選択され； $R^{4'}$ が、水素、エチル、プロピル、シクロプロピル、 $-C(O)CH_3$ 、 $-C(O)CH_2N(CH_3)_2$ 、および $-S(O)_2CH_3$ から選択される。残りの変数は、第1の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第2の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

50

【0043】

第2の実施形態の第2の態様において、 R^4 が、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ から選択され； $R^{4'}$ が、水素、 $-(C_2 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_3 \sim C_6 \text{シクロアルキル})$ 、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキレン})-N(R^D)(R^E)$ 、および $S(O)_{1 \sim 2}R^C$ から選択され； R^C が $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ であり； R^D および R^E の各々が、独立して、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ から選択される。残りの変数は、第1の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第2の実施形態またはその第1の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0044】

第2の実施形態の第3の態様において、 R^4 および $R^{4'}$ が両方とも水素である。

10

【0045】

第2の実施形態の第4の態様において、 R^4 が $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ であり、 $R^{4'}$ が $-(C_2 \sim C_6 \text{アルキル})$ である。

【0046】

第2の実施形態の第5の態様において、 R^4 が水素であり、 $R^{4'}$ が $-(C_2 \sim C_6 \text{アルキル})$ である。

【0047】

本発明の第3の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、構造式(I)または(I')の化合物であり、式中、 R^1 が、水素、ハロ、ならびにハロ、 $-NR^B R^B$ 、 $-C(O)NR^B R^B$ 、 $-OR^A$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ から選択され、ここで、 R^A が、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換される $C_1 \sim C_6 \text{アルキル}$ である。残りの変数は、第1または第2の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

20

【0048】

第3の実施形態の第1の態様において、 X が $C(R^2)$ である。残りの変数は、第1または第2の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第3の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

【0049】

第3の実施形態の第2の態様において、 R^1 が、水素、フルオロ、クロロ、 CF_3 および OCF_3 から選択される。残りの変数は、第1または第2の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第3の実施形態またはその第1の態様に記載され、規定されたとおりである。

30

【0050】

第3の実施形態の第3の態様において、 R^1 が、水素、ハロ、ならびにハロおよび OR^A から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ から選択され、ここで、 R^A が、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換される $C_1 \sim C_6 \text{アルキル}$ である。残りの変数は、第1または第2の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第3の実施形態またはその第1または第2の態様に記載され、規定されたとおりである。

40

【0051】

第3の実施形態の第4の態様において、 R^1 が、水素、フルオロ、クロロ、 CF_3 、 OCH_3 、 OCF_3 、 $-N(CH_3)_2$ および $NHCH_3$ から選択される。残りの変数は、第1または第2の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第3の実施形態またはその第1、第2または第3の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0052】

本発明の第4の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、構造式(I)または(I')の化合物であり、式中、 R^1 および R^2 が、それらが結合される原子と一緒にあって、窒素含有ヘテロシクリル環を形成し、ここで、 R^1 および R^2


50

を含む環が、 $C_1 \sim C_4$ アルキルで任意の置換可能な窒素原子において任意選択的に置換され； $NR^B R^{B'}$ で炭素原子において任意選択的に置換され、 R^B および $R^{B'}$ の各々が、独立して、水素および $C_1 \sim C_6$ アルキルから選択される。残りの変数は、第 1、第 2 または第 3 の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0053】

第 4 の実施形態の第 1 の態様において、 R^1 および R^2 が、それらが結合される炭素原子と一緒に：

【化 17】



10

を形成し、ここで、

【化 18】

“ ~ 1 ”

が、 R^1 に結合される炭素原子の結合点を表し、

【化 19】

“ ~ 2 ”

20

が、 R^2 に結合される炭素原子の結合点を表す。残りの変数は、第 1、第 2 または第 3 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 4 の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

【0054】


第 4 の実施形態の第 2 の態様において、 X が $C(R^2)$ である。残りの変数は、第 1、第 2 または第 3 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 4 の実施形態またはその第 1 の態様に記載され、規定されたとおりである。

30

【0055】

第 4 の実施形態の第 3 の態様において、 X が $C(R^2)$ であり； R^1 および R^2 が、それらが結合される炭素原子と一緒に：

【化 20】



40

を形成し、ここで、

【化 21】

“ ~ 1 ”

が、 R^1 に結合される炭素原子の結合点を表し；

【化 22】

“ ~ 2 ”

50

が、 R^2 に結合される炭素原子の結合点を表し； f が、0または1である。残りの変数は、第1、第2または第3の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第4の実施形態またはその第1または第2の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0056】

本発明の第5の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、構造式(I)または(I')の化合物であり、式中、 R^2 が、存在する場合、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ で窒素原子において任意選択的に置換される $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリル； $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリル；または $NR^B R^B$ で置換される $-(C_1 \sim C_6)$ アルキルである。残りの変数は、第1、第2、第3または第4の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

10

【0057】

第5の実施形態の第1の態様において、 R^2 が、 $C_1 \sim C_4$ アルキルまたはベンジルで窒素原子において任意選択的に置換されるピロリジニルである。残りの変数は、第1、第2、第3または第4の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第5の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

【0058】

第5の実施形態の第3の態様において、 R^2 が、存在する場合、窒素原子において、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ または $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ カルボシクリルで任意選択的に置換される $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ ヘテロシクリルである。残りの変数は、第1、第2、第3もしくは第4の実施形態またはそのいずれかの態様、あるいは第5の実施形態またはその第1もしくは第2の態様に記載され、規定されたとおりである。

20

【0059】


本発明の第6の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、構造式(I)または(I')の化合物であり、式中、 R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と一緒にあって、ヘテロシクリル、例えば、窒素含有ヘテロシクリル環を形成し、ここで、 R^2 および R^3 を含む環が、 $C_1 \sim C_4$ アルキルで任意の置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換される。残りの変数は、第1、第2、第3、第4または第5の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0060】

第6の実施形態の第1の態様において、 R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と一緒にあって、

30

【化23】



を形成し、ここで、

40

【化24】



が、 R^2 に結合される炭素原子の結合点を表し、

【化25】



が、 R^3 に結合される炭素原子の結合点を表す。残りの変数は、第1、第2、第3、第4


50

または第5の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第6の実施形態に記載され、規定されるとおりである。

【0061】

第6の実施形態の第2の態様において、 R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と一緒にあって、

【化26】



10

を形成し、ここで、

【化27】



が、 R^2 に結合される炭素原子の結合点を表し；

【化28】



20

が、 R^3 に結合される炭素原子の結合点を表し； f が、0または1である。残りの変数は、第1、第2、第3、第4または第5の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第6の実施形態またはその第1の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0062】


本発明の第7の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、構造式(I)または(I')の化合物であり、式中、 R^B が、水素および $-N(R^B)$ (R^B)から選択され、ここで、 R^B が水素であり、 $R^{B'}$ が、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ —ヘテロシクリルまたは $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-N(R^D)$ (R^E)である。残りの変数は、第1、第2、第3、第4、第5または第6の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されるとおりである。

30

【0063】

第7の実施形態の第1の態様において、 R^3 が、水素および

【化29】



40

から選択される。残りの変数は、第1、第2、第3、第4、第5または第6の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第7の実施形態に記載され、規定されるとおりである。

【0064】

第7の実施形態の第2の態様において、 X が $C(R^2)$ である。残りの変数は、第1、第2、第3、第4、第5または第6の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第7の実施形態またはその第1の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0065】


50

第 7 の実施形態の第 3 の態様において、 R^3 が、水素および $-N(R^B)(R^B)$ から選択され、ここで、 R^B が水素であり、 R^B が、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリルである。残りの変数は、第 1、第 2、第 3、第 4、第 5 または第 6 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 7 の実施形態またはその第 1 または第 2 の態様に記載され、規定されるとおりである。


【0066】

本発明の第 8 の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、式 II I :

【化 30】



10



20

の化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、

R^1 および R^2 が、それらが結合される原子と一緒に、カルボシクリルまたはヘテロシクリル環を形成し、 R^3 が、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-OR^A$ 、 $-C(O)NR^B R^B$ 、 $NR^B R^B$ 、 $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリルから選択され；または

R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と一緒に、カルボシクリルまたはヘテロシクリル環を形成し、 R^1 が、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-OR^A$ 、 $-C(O)NR^B R^B$ 、 $NR^B R^B$ 、 $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリルから選択され；

30

R^5 および R^6 の各々が、独立して、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-OR^A$ 、 $-C(O)NR^B R^B$ 、 $NR^B R^B$ 、 $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリルから選択され；

R^6 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ および $-(C_3 \sim C_6 \text{ シクロアルキル})$ から選択され；

各 R^A が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から選択され；

40

各 R^B および各 R^B が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリル、および $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-N(R^D)(R^E)$ から選択され；

各 R^C が、独立して、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -カルボシクリルおよび $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ -ヘテロシクリルから選択され；



50

各 R^D および各 R^E が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ 、 $-\text{カルボシクリル}$ 、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ 、 $-\text{ヘテロシクリル}$ から選択され、ここで、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、 R^6 、 $R^{6'}$ 、 R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、あるいは R^E の任意のアルキル、アルキレン、カルボシクリルまたはヘテロシクリル部分または R^1 および R^2 または R^2 および R^3 を合わせることによって形成されるものが、任意選択的にかつ独立して置換される。式 II 中の変数の代替値は、第 1～第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0067】

第 8 の実施形態の第 1 の態様において、化合物は、式 II a :

【化 31】



によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、

各 R^7 が、存在する場合、独立して、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ 、 $-(C_3 \sim C_{10} \text{ カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ 、 $-(4 \sim 13 \text{ 員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ 、 $-NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_0 \sim 2 R^C$ から選択され；

p が、0、1、2、3 または 4 であり；

Y が、 $C(O)$ または $C(R^8)_2$ であり、ここで、各 R^8 が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ および $-(C_3 \sim C_6 \text{ シクロアルキル})$ から選択され；

f が、0 または 1 である。残りの変数は、第 1～第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態に記載され、規定されるとおりである。

【0068】

第 8 の実施形態の第 1 の態様のさらなる態様において、 p が 0 である。残りの変数は、第 1～第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態またはその第 1 の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0069】

第 8 の実施形態の第 2 の態様において、化合物は、式 II b :

10



20

30

40

50

【化 3 2】



10


によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^7 が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(C_3 \sim C_{10} \text{カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から選択され； Y が、 $C(O)$ または $C(R^8)_2$ であり、ここで、各 R^8 が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6)$ アルキルおよび $-(C_3 \sim C_6 \text{シクロアルキル})$ から選択される。残りの変数は、第1～第7の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第8の実施形態またはその第1の態様に記載され、規定されるとおりである。

20


【0070】

第8の実施形態の第3の態様において、化合物は、式IIb-1：

【化 3 3】



30



によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^7 が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(C_3 \sim C_{10} \text{カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から選択される。残りの変数は、第1～第7の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第8の実施形態またはその第1または第2の態様に記載され、規定されるとおりである。



40

【0071】

第8の実施形態の第4の態様において、化合物は、式II d：

50

【化 3 4】



によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、

各 R^7 および R^8 が、存在する場合、独立して、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $4 \sim 13$ 員ヘテロシクリル、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_0 \sim 2 R^C$ から選択され；

p が、0、1、2、3 または 4 であり；

q が、0、1 または 2 であり；

各 f が、独立して、0 または 1 である。残りの変数は、第 1～第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態またはその第 1～第 3 の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0072】

第 8 の実施形態の第 4 の態様のさらなる態様において、 p および q がそれぞれ 0 である。残りの変数は、第 1～第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態またはその第 1～第 4 の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0073】

第 8 の実施形態の第 5 の態様において、各 R^F が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ ハロアルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ ヒドロキシアルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ - カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ - ヘテロシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ - $C(O)_2$ - $(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、および $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキレン})$ - $NR^B R^{B'}$ から独立して選択される。残りの変数は、第 1～第 7 の実施形態もしくはそのいずれかの態様、または第 8 の実施形態もしくはその第 1～第 4 の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0074】

第 8 の実施形態の第 6 の態様において、各 f が 0 である。残りの変数は、第 1～第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態またはその第 1～第 5 の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0075】

第 8 の実施形態の第 7 の態様において、各 f が 1 である。残りの変数は、第 1～第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態またはその第 1～第 6 の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0076】

第 8 の実施形態の第 8 の態様において、 R^1 および R^2 または R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と一緒に形成する環は、N、S および O から独立して選択される 1～2 つのヘテロ原子を任意選択的に含有する 4～7 員非芳香族複素環である。残りの変数は、第 1～第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態またはその

第1～第7の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0077】

第8の実施形態の第9の態様において、

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、 R^6 の任意のアルキル、またはアルキレン部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0\sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；

R^6 、 R^A 、または R^C の任意のアルキルまたはアルキレン部分が、1つ以上のフルオロで任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のカルボシクリルまたはヘテロシクリル部分、あるいは R^1 および R^2 または R^2 および R^3 を合わせることによって形成される任意の環が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1\sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1\sim C_4$ アルキル、 $-(C_0\sim C_6$ アルキレン) $-(C_3\sim C_{10}$ カルボシクリル)、 $-(C_0\sim C_6$ アルキレン) $-(4\sim 13$ 員ヘテロシクリル)、 OR^A 、 $-(C_0\sim C_6$ アルキレン) $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0\sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、あるいは R^1 および R^2 または R^2 および R^3 を合わせることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

各 R^F が、独立して、 $-(C_1\sim C_6$ アルキル)、 $-(C_1\sim C_6$ ハロアルキル)、 $-(C_1\sim C_6$ ヒドロキシアルキル)、 $-(C_0\sim C_6$ アルキレン) $-$ カルボシクリル、 $-(C_0\sim C_6$ アルキレン) $-$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1\sim 2}-(C_1\sim C_6$ アルキル)、 $-S(O)_{1\sim 2}-(C_0\sim C_6$ アルキレン) $-$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1\sim C_6$ アルキル)、 $-C(O)-(C_0\sim C_6$ アルキレン) $-$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0\sim C_6$ アルキレン) $-$ ヘテロシクリル、 $-(C_0\sim C_6$ アルキレン) $-C(O)_2-(C_1\sim C_6$ アルキル)、 $-(C_1\sim C_6$ アルキレン) $NR^B R^{B'}$ および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から選択され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルまたはヘテロシクリル部分、 R^6 の任意のシクロアルキル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、 R^6 の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1\sim C_4$ アルキル、 $C_1\sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1\sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1\sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1\sim C_4$ アルキル)、および $-N(C_1\sim C_4$ アルキル) $_2$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、あるいは R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、または R^6 の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1\sim C_4$ アルキル、または $-S(O)_{1\sim 2}-(C_1\sim C_4$ アルキル)で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される。残りの変数は、第1～第7の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第8の実施形態またはその第1～第8の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0078】

第8の実施形態の第10の態様において、化合物は、式IIa-1：

10



20

30

40

50

【化 3 5】



10



によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 p が、0 または 1 であり、 R^7 が、存在する場合、 $-C_1 \sim C_6$ アルキルである。残りの変数は、第 1 ～ 第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態またはその第 1 ～ 第 9 の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0079】

第 8 の実施形態の第 11 の態様において、化合物は、式 IIb-2 :

20

【化 3 6】



30

によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^7 が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-$ ($C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル)、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-(4 \sim 13 \text{ 員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-NR^B R^B$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から選択される。残りの変数は、第 1 ～ 第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態またはその第 1 ～ 第 10 の態様に記載され、規定されたとおりである。

40

【0080】


第 8 の実施形態の第 12 の態様において、 R^1 および R^2 または R^2 および R^3 を合わせるによって形成される任意の環の任意のカルボシクリルまたはヘテロシクリル部分が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-(C_3 \sim C_{10} \text{ カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-(4 \sim 13 \text{ 員ヘテロシクリル})$ および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-NR^B R^B$ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換される。残りの変数は、第 1 ～ 第 7 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 8 の実施形態またはその第 1 ～ 第 11 の態様に記載され、規定されたとおりである。

50


【 0 0 8 1 】

本発明の第 9 の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、式 I I c :

【化 3 7】



10



によって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^7 が、存在する場合、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル)、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^B$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から選択され； p が、0 または 1 であり； f が、0 または 1 である。残りの変数の値および代替値は、第 1 ～ 第 8 の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

20

【 0 0 8 2 】


第 9 の実施形態の第 1 の態様において、 p が 1 である。残りの変数は、第 1 ～ 第 8 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 9 の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

30


【 0 0 8 3 】

第 9 の実施形態の第 2 の態様において、化合物は、式 I I c - 1 :

【化 3 8】



40



によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。変数は、第 1 ～ 第 8 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 9 の実施形態またはその第 1 の態様に記載され、規定されたとおりである。

【 0 0 8 4 】

50

第9の実施形態の第3の態様において、 R^7 が、存在する場合、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(C_3 \sim C_{10} \text{カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^B$ から選択される。残りの変数は、第1～第8の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第9の実施形態またはその第1または第2の態様に記載され、規定されたとおりである。



【0085】

第9の実施形態の第4の態様において、 R^7 が、存在する場合、 $NR^B R^B$ である。残りの変数は、第1～第8の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第9の実施形態またはその第1～第3の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0086】

本発明の第10の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、式Ia：

【化39】



の化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、

各 R^7 が、存在する場合、独立して、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(C_3 \sim C_{10} \text{カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^B$ 、および $S(O)_0 \sim 2 R^C$ から選択され；

p が、0、1、2、3または4であり；

Y が、 $C(O)$ または $C(R^8)_2$ であり、ここで、各 R^8 が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ および $-(C_3 \sim C_6 \text{シクロアルキル})$ から選択され；

f が、0または1である。変数の値および代替値は、第1～第9の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0087】

第10の実施形態の第1の態様において、 p が0である。残りの変数は、第1～第9の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第10の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

【0088】

第10の実施形態の第2の態様において、各 R^8 が水素である。残りの変数は、第1～第9の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第10の実施形態またはその第1の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0089】

本発明の第11の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、式Iの化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 X が $C(R^2)$ であり； R^2 が、任意選択的に置換される $-(C_0 \sim C_1 \text{アルキレン})-(4 \sim 6 \text{員ヘテロシクリル})$ である。変数の値および代替値は、第1～第10の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0090】

第11の実施形態の第1の態様において、 R^3 が水素である。残りの変数は、第1～第10の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第11の実施形態に記載され、規定されるとおりである。

【0091】

第11の実施形態の第2の態様において、 R^2 が、任意選択的に置換される $-(C_0 \sim C_1 \text{アルキレン})$ -ピロリジニルである。残りの変数は、第1～第10の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第11の実施形態またはその第1の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0092】

第11の実施形態の第3の態様において、 R^2 が、任意選択的に置換されるピロリジン-2-イルである。残りの変数は、第1～第10の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第11の実施形態またはその第1または第2の態様に記載され、規定されるとおりである。


【0093】

第11の実施形態の第4の態様において、 R^2 が、任意選択的に置換される $-(C_1 \text{アルキレン})$ -(ピロリジン-1-イル)である。残りの変数は、第1～第10の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第11の実施形態またはその第1～第3の態様に記載され、規定されるとおりである。


【0094】

本発明の第12の実施形態において、血液を処置する方法において投与される化合物は、式Ib：

【化40】



(Ib)



(Ib')

の化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、

各 R^7 および R^8 が、存在する場合、独立して、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、4～13員ヘテロシクリル、OR^A、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_0 \sim 2 R^C$ から選択され；

p が、0、1、2、3または4であり；

q が、0、1または2であり；

各 f が、独立して、0または1である。変数の値および代替値は、第1～第11の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0095】

第12の実施形態の第1の態様において、 p および q がそれぞれ0である。残りの変数は、第1～第11の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第12の実施形態に記載され、規定されるとおりである。


【0096】

第 12 の実施形態の第 2 の態様において、 R^3 が水素である。残りの変数は、第 1 ～ 第 11 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 12 の実施形態またはその第 1 の態様に記載され、規定されたとおりである。


【0097】

本発明の第 13 の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、式 Ic :

【化 41】



10



20

によって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^7 が、存在する場合、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-(C_3 \sim C_{10} \text{ カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-(4 \sim 13 \text{ 員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレン})-NR^B R^B$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から選択され； p が、0 または 1 であり； f が、0 または 1 である。残りの変数の値および代替値は、第 1 ～ 第 12 の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0098】


第 13 の実施形態の第 1 の態様において、 p が 1 である。残りの変数は、第 1 ～ 第 12 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 13 の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

30


【0099】

第 13 の実施形態の第 2 の態様において、化合物は、式 Ic-1 :

【化 42】



40



によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。変数は、第 1 ～ 第 12 の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第 13 の実施形態またはその第 1 の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0100】

50

第13の実施形態の第3の態様において、 R^7 が、存在する場合、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(C_3 \sim C_{10} \text{カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^B$ から選択される。残りの変数は、第1～第12の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第13の実施形態またはその第1または第2の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0101】

第13の実施形態の第4の態様において、 R^7 が、存在する場合、 $NR^B R^B$ である。残りの変数は、第1～第12の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第13の実施形態またはその第1～第3の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0102】

本発明の第14の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、式Iによって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、XがNであり、 R^3 が水素である。残りの変数の値および代替値は、第1～第13の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。

【0103】

第14の実施形態の第1の態様において、 R^1 が、水素および $NR^B R^B$ から選択される。残りの変数は、第1～第13の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第14の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

【0104】

本発明の第15の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、式Iの化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、XがC(R^2)であり、 R^2 が $(C_1 \text{アルキレン})-NR^B R^B$ である。残りの変数の値および代替値は、第1～第14の実施形態、またはそれらの任意の態様に記載され、規定されたとおりである。



【0105】

第15の実施形態の第1の態様において、 R^B および R^B がそれぞれ、独立して、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ から選択される。残りの変数は、第1～第14の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第15の実施形態に記載され、規定されたとおりである。

【0106】

本発明の第16の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、式Id:

【化43】



によって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^7 が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(C_3 \sim C_{10} \text{カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^B$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から選択される。変数の値および代替値は、第1～第15の実施形態、またはそれらの任意

10

20

30

40

50

の態様において規定されるとおりである。


【0107】

第16の実施形態の第1の態様において、 R^7 が、4～6員ヘテロシクリルまたは $-N R^B R^B$ である。残りの変数は、第1～第15の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第16の実施形態に記載され、規定されるとおりである。


【0108】

本発明の第17の実施形態において、血液癌を処置する方法において投与される化合物は、式I e：

【化44】



10



20

によって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^7 が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-$ ($C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル)、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})-NR^B R^B$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から選択される。変数の値および代替値は、第1～第16の実施形態、またはそれらの任意の態様において規定されるとおりである。

【0109】

第17の実施形態の第1の態様において、 R^7 が、4～6員ヘテロシクリルまたは $-N R^B R^B$ である。残りの変数は、第1～第16の実施形態、またはそれらの任意の態様、あるいは第17の実施形態に記載され、規定されるとおりである。

30

【0110】

上記の実施形態、またはそれらの任意の態様のいずれかのさらなる態様において、各 R^A が、独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -ヘテロシクリル、 $-S-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-S-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-S-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -カルボシクリル、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレン})$ -ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から選択される。 $-N(R^F)_f$ 中の f が、本明細書中に記載される構造式中で0であるときに示される化学部分は、 $-N(H)-$ である。同様に、 $-(R^8)_q$ 中の q が0であるとき、それは、 $-(R^8)_q$ に結合される炭素原子が2つの水素原子に結合されることを意味する。



40

【0111】

本発明の第18の実施形態は、式(III)：

50

【化 4 5】



の化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、

R^1 が、水素、ブロモ、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-O-C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-S(O)_m-C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-CN$ 、 $-NR^G R^G$ 、および $-NH-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキレン})-NR^G R^G$ から選択され、ここで、 R^1 によって表される基中のアルキル、アルキレン、またはシクロアルキルの各々が、フルオロで任意選択的に置換され；

R^2 が、フルオロ、 $-C_1 \sim C_6$ アルキル、および $-[C(R^H)(R^H)]_m-NR^I R^I$ から選択され；

R^3 が、水素、フルオロ、ブロモ、 $-CN$ 、 $-[C(R^H)(R^H)]_n-NR^I R^I$ 、 $-NR^G R^G$ 、 NO_2 、 $-NH-C(O)-C_1 \sim C_4$ アルキレン $-NR^G R^G$ 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-NH-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-NH-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-NH-S(O)_m-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-NH-S(O)_m-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリルから選択され；

R^G および R^G の各々が、水素および $C_1 \sim C_4$ アルキルから独立して選択され；または

R^G および R^G が、それらが結合される窒素原子と一緒に、 N 、 O 、および S から選択される 1 つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む ($4 \sim 7$ 員) 複素環を形成し、ここで、($4 \sim 7$ 員) 複素環は、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、フルオロ置換 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-C_1 \sim C_4$ アルキルもしくは $-C_1 \sim C_4$ アルキレン $-O-C_1 \sim C_4$ アルキルで任意選択的に置換され、かつ任意選択的にベンゾ縮合され；

R^H および R^H の各々が、水素、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、および $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリルから独立して選択され；

R^I の各々が、水素、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン $-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および $-C_0 \sim C_6$ アルキレン ($4 \sim 13$ 員) ヘテロシクリルから選択され；

R^I の各々が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン $-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン ($4 \sim 13$ 員) ヘテロシクリル、 $-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン $-C(O)-NR^G R^G$ 、 $-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキレン $-NR^G R^G$ 、 $-C_2 \sim C_6$ アルキレン $-NR^G R^G$ 、 $-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-S(O)_m-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および $-S(O)_m-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリルから選択され、ここで、 R^I または R^I によって表される基中のアルキル、カルボシクリル、アルキレン、またはヘテロシクリルの各々が、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、フルオロ置換 $-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-NR^G R^G$ 、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および ($4 \sim 13$ 員) ヘテロシクリルから独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；あるいは

R^I および R^I が、それらが結合される窒素原子と一緒にあって、(4～7員) 単環式複素環、または(6～13員) 二環、スピロ環もしくは架橋複素環を形成し、ここで、(4～7員) 単環式複素環、または(6～13員) 二環、スピロ環もしくは架橋複素環が、N、S、およびOから独立して選択される1～4つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含み；(4～7員) 単環式複素環、または(6～13員) 二環、スピロ環もしくは架橋複素環が、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、(4～13員) ヘテロシクリル、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-O-$ (4～13員) ヘテロシクリル、 $-C_0 \sim C_4$ アルキル- $O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-C_0 \sim C_4$ アルキル- $O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-C(O)-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-C(O)NR^GR^G$ 、 $-N(R^G)-C(O)-C_1 \sim C_4$ アルキル、および $-C_0 \sim C_4$ アルキレン- NR^GR^G から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換され、カルボシクリルまたはヘテロシクリル置換基が各々、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4$ アルキル)、または $-N(C_1 \sim C_4$ アルキル) $_2$ で任意選択的に置換され；

m が、0、1、または2であり；

n が、1または2である。

[0112]

第18の実施形態の第1の態様において、 R^1 が、水素、ブromo、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-O-C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-S(O)_m-C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-CN$ 、 $-NR^GR^G$ 、または $-NH-C(O)-(C_1 \sim C_6$ アルキレン)- NR^GR^G である。一部の実施形態において、 R^1 によって表される基中のアルキル、アルキレン、またはシクロアルキルの各々が、フルオロで任意選択的に置換される。他の実施形態において、 R^1 が、フルオロ、クロロ、 $-CN$ 、または $-N(CH_3)_2$ である。他の実施形態において、 R^1 が、フルオロ、クロロ、または $-N(CH_3)_2$ である。他の実施形態において、 R^1 がフルオロである。他の実施形態において、 R^1 がクロロである。他の実施形態において、 R^1 が $-N(CH_3)_2$ である。他の実施形態において、 R^1 が水素である。残りの変数は、第18の実施形態に記載され、規定されるとおりである。

[0113]

第18の実施形態の第2の態様において、 R^2 が、フルオロ、 $-C_1 \sim C_6$ アルキル、または $-[C(R^H)(R^H)]_m-N(R^I)(R^I)$ である。他の実施形態において、 R^2 が、フルオロ、メチル、 $-CH(R^H)-N(R^I)(R^I)$ 、 $-(CH_2)_2-N(R^I)(R^I)$ 、 $-NH$ (ピリジル)、 $-NH(C_1 \sim C_8$ アルキル)、 $-NHC(O)-C_1 \sim C_3$ アルキレンピペリジン、 $-NHC(O)-C_1 \sim C_3$ アルキレンピロリジン、または $-NHS(O)_2$ -フェニルであり、ここで、 R^2 によって表される基中のピペリジンの各々およびピロリジンの各々が、1つ以上の $-C_1 \sim C_6$ アルキルで任意選択的に置換される。他の実施形態において、 R^2 が、フルオロ、メチル、または $-CH(R^H)-N(R^I)(R^I)$ である。他の実施形態において、 R^2 が $-CH(R^H)-N(R^I)(R^I)$ である。他の実施形態において、 R^2 がフルオロである。他の実施形態において、 R^2 が $-NHR^I$ である。残りの変数は、第18の実施形態またはその第1の態様に記載され、規定されるとおりである。

[0114]

第18の実施形態の第3の態様において、 R^3 が、水素、フルオロ、ブromo、 $-CN$ 、 $-[C(R^H)(R^H)]_n-N(R^I)(R^I)$ 、 $-NR^GR^G$ 、 NO_2 、 $-NH-C(O)-C_1 \sim C_4$ アルキレン- $N(R^I)(R^I)$ 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-NH-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-NH-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-NH-S(O)_m-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、または $-NH-S(O)_m$ (4～13員) ヘテロシクリルである。他の実施形態において、 R^3 が、水素、 NH_2 、または $-CH_2-NH-CH_2-C(CH_3)_3$ である。他の実施形態において、 R^3 が水素である。他の実施形態において

、 R^3 が、 $-[C(R^H)(R^H)]_n-N(R^I)(R^I)$ または $-NR^GR^G$ である。残りの変数は、第18の実施形態またはその第1もしくは第2の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0115】

第18の実施形態の第4の態様において、 R^H および $R^{H'}$ の各々が、水素、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、および $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリルから独立して選択される。他の実施形態において、 R^H が、水素またはメチルである。残りの変数は、第18の実施形態またはその第1、第2もしくは第3の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0116】

第18の実施形態の第5の態様において、 R^I が、水素、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン- $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、または $-C_0 \sim C_6$ アルキレン(4~13員)ヘテロシクリルである。一部の実施形態において、 R^I によって表される基中のアルキル、カルボシクリル、アルキレン、またはヘテロシクリルの各々が、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、フルオロ置換 $-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-NR^GR^G$ 、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および(4~13員)ヘテロシクリルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換される。他の実施形態において、 R^I が、水素、 $C_1 \sim C_3$ 直鎖状アルキル、 $C_1 \sim C_3$ 直鎖状フルオロアルキル、シクロプロピル、または $-CH_2-$ シクロプロピルである。他の実施形態において、 R^I が、水素、 $C_1 \sim C_3$ 直鎖状アルキル、または $-CH_2-$ シクロプロピルである。残りの変数は、第18の実施形態またはその第1~第4の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0117】

第18の実施形態の第6の態様において、 R^I が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン- $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン-(4~13員)ヘテロシクリル、 $-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン- $C(O)NR^GR^G$ 、 $-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキレン- NR^GR^G 、 $-C_2 \sim C_6$ アルキレン- NR^GR^G 、 $-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-S(O)_m-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、または $-S(O)_m$ (4~13員)ヘテロシクリルである。一部の実施形態において、 R^2 が、水素または $C_1 \sim C_2$ アルキルであるとき、 R^3 がさらにベンジルである。他の実施形態において、 R^I によって表される基中のアルキル、カルボシクリル、アルキレン、またはヘテロシクリルの各々が、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、フルオロ置換 $-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-NR^GR^G$ 、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および(4~13員)ヘテロシクリルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換される。他の実施形態において、 R^I が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-CH_2-CHF_2$ 、 $-C_2 \sim C_6$ アルキレン- $O-C_1 \sim C_3$ アルキル、 $-C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $-C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル置換 $C_1 \sim C_3$ アルキル、シクロプロピル置換シクロプロピル、 $-(CH_2)_2$ -フェニル、または $-S(O)_2$ -フェニルである。他の実施形態において、 R^I が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-CH_2-CHF_2$ 、 $-C_1 \sim C_6$ アルキレン- $O-C_1 \sim C_3$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル置換 $C_1 \sim C_3$ アルキル、または $-(CH_2)_2$ -フェニルであり、ここで、 R^I が、水素または $-C_1 \sim C_2$ アルキルであるとき、 R^I がさらにベンジルである。他の実施形態において、 R^I が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-CH_2-CHF_2$ 、 $-C_1 \sim C_6$ アルキレン- $O-C_1 \sim C_3$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $-(CH_2)_2$ -フェニル、および $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル置換 $C_1 \sim C_3$ アルキルから選択され、ここで、 R^I によって表される基中のシクロアルキルの各々が、 $-C_1 \sim C_3$ アルキルで任意選択的に置換され、または任意選択的にベンゾ縮合される。残りの変数は、第18の実施形態またはその第1~第5の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0118】

第18の実施形態の第7の態様において、 R^I および $R^{I'}$ が、それらが結合される窒素

原子と一緒に、(4～7員)単環式複素環、または(6～13員)二環、スピロ環もしくは架橋複素環を形成し、ここで、(4～7員)単環式複素環、または(6～13員)二環、スピロ環もしくは架橋複素環が、N、S、およびOから独立して選択される1～4つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む。一部の実施形態において、(4～7員)単環式複素環、または(6～13員)二環、スピロ環もしくは架橋複素環が、C₃～C₁₀カルボシクリル、(4～13員)ヘテロシクリル、フルオロ、クロロ、-OH、C₁～C₄フルオロアルキル、C₁～C₄アルキル、-O-C₃～C₁₀カルボシクリル、-O-(4～13員)ヘテロシクリル、-C₀～C₄アルキル-O-C₁～C₄アルキル、-C₀～C₄アルキル-O-C₁～C₄フルオロアルキル、=O、-C(O)-C₁～C₄アルキル、-C(O)N R^GR^G、-N(R^G)-C(O)-C₁～C₄アルキル、および-C₀～C₄アルキレン-N R^GR^Gから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換され、ここで、カルボシクリルまたはヘテロシクリル置換基の各々が、フルオロ、クロロ、-OH、C₁～C₄フルオロアルキル、C₁～C₄アルキル、-O-C₁～C₄アルキル、-O-C₁～C₄フルオロアルキル、-NH₂、-NH(C₁～C₄アルキル)、または-N(C₁～C₄アルキル)₂で任意選択的に置換される。他の実施形態において、R^IおよびR^Iが、それらが結合される窒素原子と一緒に、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、およびモルホリンから選択される環を形成し、ここで、環が、-OH、-C₁～C₃アルキル、および-C₁～C₃アルキレン-O-C₁～C₃アルキルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換され、環が、シクロプロピルに任意選択的にベンゾ縮合またはスピロ縮合される。他の実施形態において、R^IおよびR^Iが、それらが結合される窒素原子と一緒に、ピロリジンおよびピペリジンから選択される環を形成し、環が、フルオロ、C₁～C₃アルキル、および-C₁～C₃アルキレン-O-C₁～C₃アルキルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換され、環が、シクロプロピルに任意選択的にベンゾ縮合またはスピロ縮合される。残りの変数は、第18の実施形態またはその第1～第6の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0119】

第18の実施形態の第8の態様において、R^GおよびR^Gが、独立して、水素またはC₁～C₄アルキルである。他の実施形態において、R^GおよびR^Gが、それらが結合される窒素原子と一緒に、N、S、およびOから選択される1つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む(4～7員)複素環を形成し、ここで、(4～7員)複素環が、フルオロ、クロロ、-OH、フルオロ置換C₁～C₄アルキル、-C₁～C₄アルキル、または-C₁～C₄アルキレン-O-C₁～C₄アルキルで任意選択的に置換され、かつ任意選択的にベンゾ縮合される。残りの変数は、第18の実施形態またはその第1～第7の態様に記載され、規定されるとおりである。

【0120】

本発明の第19の実施形態は、構造式(III)または(III')の化合物であり、式中、R²が、フルオロ、メチル、-CH(R^H)-N(R^I)(R^I)、-(CH₂)₂-N(R^I)(R^I)、-NH(ピリジル)、-NH(C₁～C₈アルキル)、-NHC(O)-C₁～C₃アルキレン-ピペリジン、-NHC(O)-C₁～C₃アルキレン-ピロリジン、または-NHS(O)₂-フェニルであり、R²によって表される基中のピペリジンの各々およびピロリジンの各々が、1つ以上の-C₁～C₆アルキルで任意選択的に置換され；R^Hが、水素またはメチルであり；R^Iが、水素、C₁～C₃直鎖状アルキル、C₁～C₃直鎖状フルオロアルキル、シクロプロピルもしくは-CH₂-シクロプロピルであり；R^Iが、水素、C₁～C₈アルキル、-CH₂-CHF₂、-C₂～C₆アルキレン-O-C₁～C₃アルキル、-C₃～C₁₀シクロアルキル、-C₃～C₁₀シクロアルキル置換C₁～C₃アルキル、シクロプロピル置換シクロプロピル、-(CH₂)₂-フェニルもしくは-S(O)₂-フェニルであり、R^Iが水素もしくはC₁～C₂アルキルであるとき、R^Iがさらにベンジルであり；またはR^IおよびR^Iが、それらが結合される窒素原子と一緒に、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジンもしくはモルホリンから選択される環を形成し、ここで、環が、-OH、-C₁～C₃アルキル、および-C₁～C₃ア

ルキレン- $O-C_1 \sim C_3$ アルキルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換され、環が、シクロプロピルに任意選択的にベンゾ縮合またはスピロ縮合される。残りの変数は、第18の実施形態またはそのいずれかの態様に記載され、規定されたとおりである。

【0121】

本発明の第20の実施形態は、構造式(III)または(III')の化合物であり、式中、 R^2 が、フルオロ、メチル、または $-CH(R^H)-N(R^I)(R^I)$ であり； R^H が、水素またはメチルであり； R^I が、水素、 $C_1 \sim C_3$ 直鎖状アルキルもしくは $-CH_2-$ シクロプロピルであり； R^I が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-CH_2-CHF_2$ 、 $-C_1 \sim C_6$ アルキレン- $O-C_1 \sim C_3$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキルもしくは $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル置換 $C_1 \sim C_3$ アルキルであり、ここで、 R^I によって表される基中のシクロアルキルの各々が、 $-C_1 \sim C_3$ アルキルで任意選択的に置換されるか、もしくは任意選択的にベンゾ縮合されるか、もしくは $-(CH_2)_2$ -フェニルであり； R^I が水素もしくは $-C_1 \sim C_2$ アルキルであるとき、 R^I がさらにベンジルであり；または R^I および R^I が、それらが結合される窒素原子と一緒にあって、ピロリジンおよびピペリジンから選択される環を形成し、ここで、環が、フルオロ、 $-C_1 \sim C_3$ アルキル、および $-C_1 \sim C_3$ アルキレン- $O-C_1 \sim C_3$ アルキルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換され、環が、シクロプロピルに任意選択的にベンゾ縮合またはスピロ縮合される。残りの変数は、第18もしくは第19の実施形態またはそのいずれかの態様に記載され、規定されたとおりである。

【0122】

本発明の第21の実施形態は、構造式(III)または(III')の化合物であり、式中、 X が、フルオロ、クロロ、 $-CN$ 、または $-N(CH_3)_2$ であり； Z が、水素、 NH_2 、または $-CH_2-NH-CH_2-C(CH_3)_3$ である。残りの変数は、第18～第20の実施形態またはそのいずれかの態様に記載され、規定されたとおりである。

【0123】

本発明の第22の実施形態は、構造式(III)または(III')の化合物であり、式中、

R^1 が、 $-OCH_3$ 、 $-CF_3$ 、 Cl 、 F 、および $-N(CH_3)_2$ から選択され；

Z が水素であり、 R^1 が F であるとき、 Z が、水素、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_2$ アルキル)、および $-N(C_1 \sim C_2$ アルキル) $_2$ からさらに選択され；

R^2 が $-CH_2-NR^I R^I$ であり；

ここで、

R^I が、水素および $C_1 \sim C_3$ アルキルから選択され；

R^I が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $C_0 \sim C_6$ アルキレン $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $C_0 \sim C_6$ アルキレン-(4～13員)ヘテロシクリル、および $C_2 \sim C_6$ アルキレン- $N(R^G)(R^G)$ から選択され、ここで、 R^I によって表される基中のカルボシクリルまたはヘテロシクリルの各々が、フルオロ、 $-OH$ 、 $-O-C_1 \sim C_3$ アルキル、 $C_1 \sim C_3$ アルキル、フルオロ置換 $C_1 \sim C_3$ アルキル、 $-N(R^G)(R^G)$ 、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、または(4～13員)ヘテロシクリルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換され；あるいは

R^I および R^I が、それらが結合される窒素原子と一緒にあって、(4～7員)飽和単環式複素環、または(6～13員)飽和二環、スピロ環もしくは架橋複素環を形成し、ここで、(4～7員)単環式複素環、または(6～13員)二環、スピロ環もしくは架橋複素環が、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、(4～13員)ヘテロシクリル、フルオロ、 $-OH$ 、 $-C_1 \sim C_3$ フルオロアルキル、 $-C_1 \sim C_3$ アルキル、 $-O-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-O$ -(4～13員)ヘテロシクリル、 $C_0 \sim C_2$ アルキレン- $O-C_1 \sim C_3$ アルキル、 $C_0 \sim C_2$ アルキレン- $O-C_1 \sim C_3$ フルオロアルキル、 $=O$ 、および $C_0 \sim C_4$ アルキレン- $N(R^G)(R^G)$ から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換され、カルボシクリルまたはヘテロシクリル置換基の各々が、フルオロ、 $-OH$ 、

C₁～C₃フルオロアルキル、C₁～C₃アルキル、-O-C₁～C₃アルキル、-O-C₁～C₃フルオロアルキル、-NH₂ -NH(C₁～C₄アルキル)、または-N(C₁～C₄アルキル)₂で任意選択的に置換され；

R^GおよびR^{G'}の各々が、水素およびC₁～C₄アルキルから独立して選択される。残りの変数は、第18～第21の実施形態またはそのいずれかの態様に記載され、規定されるとおりである。





【0124】

本発明の第23の実施形態は、構造式(III)または(III')の化合物であり、式中、R¹が-OCH₃である。他の実施形態において、R¹が-CF₃である。他の実施形態において、R¹が-C₁H₃である。他の実施形態において、R¹が-Fであり、R³が水素である。他の実施形態において、R¹が-Fであり、R³が、-NH₂、-NH(C₁～C₂アルキル)、および-N(C₁～C₂アルキル)₂から選択される。他の実施形態において、R¹が-N(CH₃)₂である。他の実施形態において、R²が-NH^Iであり；R^Iが、ピリジル、C₁～C₈アルキル、-C(O)-C₁～C₃アルキレン-ピペリジン、または-C(O)-C₁～C₃アルキレン-ピロリジンである。R^Iによって表される基中のピペリジンまたはピロリジンの各々が、1つ以上のC₁～C₃アルキルで任意選択的に置換される。残りの変数は、第18～第22の実施形態またはそのいずれかの態様に記載され、規定されるとおりである。







【0125】

本発明の第24の実施形態は、構造式(IV)、(IV')、(V)、(V')、(Va)、(Va')、(VI)、(VI')、(VII)もしくは(VII')：

【化46】



【化 4 7】



の化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、変数の値および代替値は、本発明の第 18～第 23 の実施形態中に見出される。

【0126】

本発明の第 25 の実施形態は、構造式 (IV) もしくは (IV')

10



20

30

40

50

【化 48】



の化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、

R^1 が、ブロモ、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_6$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-O-C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-S(O)_m-C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-CN$ 、および $-NH-C(O)-(C_1 \sim C_6$ アルキレン) $-NR^G R^G$ から選択され、ここで、 R^1 によって表される基中のアルキル、アルキレン、またはシクロアルキルの各々が、フルオロで任意選択的に置換され；

R^G および R^G 'の各々が、水素および $C_1 \sim C_4$ アルキルから独立して選択され；または

R^G および R^G 'が、それらが結合される窒素原子と一緒に、 N 、 S 、および O から選択される1つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む（4～7員）複素環を形成し、ここで、（4～7員）複素環は、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、フルオロ置換 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-C_1 \sim C_4$ アルキルもしくは $-C_1 \sim C_4$ アルキレン $-O-C_1 \sim C_4$ アルキルで任意選択的に置換され、かつ任意選択的にベンゾ縮合され；

R^H および R^H 'の各々が、水素、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、および $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリルから独立して選択され；

R^I の各々が、水素、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン $-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および $-C_0 \sim C_6$ アルキレン（4～13員）ヘテロシクリルから選択され；

R^I 'の各々が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン $-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン（4～13員）ヘテロシクリル、 $-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレン $-C(O)-NR^G R^G$ '、 $-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキレン $-NR^G R^G$ '、 $-C_2 \sim C_6$ アルキレン $-NR^G R^G$ '、 $-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-S(O)_m-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および $-S(O)_m-(4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリルから選択され、ここで、 R^I または R^I 'によって表される基中のアルキル、カルボシクリル、アルキレン、またはヘテロシクリルの各々が、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、フルオロ置換 $-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-NR^G R^G$ '、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および（4～13員）ヘテロシクリルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；あるいは

R^I および R^I 'が、それらが結合される窒素原子と一緒に、（4～7員）単環式複素環、または（6～13員）二環、スピロ環もしくは架橋複素環を形成し、ここで、（4～7員）単環式複素環、または（6～13員）二環、スピロ環もしくは架橋複素環が、 N 、 S 、および O から独立して選択される1～4つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に

含み；（４～７員）単環式複素環、または（６～１３員）二環、スピロ環もしくは架橋複素環が、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、（４～１３員）ヘテロシクリル、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-O-$ （４～１３員）ヘテロシクリル、 $-C_0 \sim C_4$ アルキル $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-C_0 \sim C_4$ アルキル $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-C(O)-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-C(O)NR^G R^G$ 、 $-N(R^G)-C(O)-C_1 \sim C_4$ アルキル、および $-C_0 \sim C_4$ アルキレン $-NR^G R^G$ から独立して選択される１つ以上の置換基で任意選択的に置換され、カルボシクリルまたはヘテロシクリル置換基が各々、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4$ アルキル)、または $-N(C_1 \sim C_4$ アルキル) $_2$ で任意選択的に置換され；

m が、０、１、または２である。

【０１２７】

第２５の実施形態の第１の態様において、

R^H が、水素およびメチルから選択され；

R^I が、水素、 $C_1 \sim C_3$ 直鎖状アルキル、 $C_1 \sim C_3$ 直鎖状フルオロアルキル、シクロプロピル、および $-CH_2-$ シクロプロピルから選択され；

R^I が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-CH_2-CHF_2$ 、 $-C_2 \sim C_6$ アルキレン $-O-C_1 \sim C_3$ アルキル、 $-C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $-C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル置換 $C_1 \sim C_3$ アルキル、シクロプロピル置換シクロプロピル、 $-(CH_2)_2$ -フェニル、および $-S(O)_2$ -フェニルから選択され、 R^2 が、水素もしくは $C_1 \sim C_2$ アルキルであるとき、 R^3 がベンジルからさらに選択され；または

R^I および R^I が、それらが結合される窒素原子と一緒にあって、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジンもしくはモルホリンから選択される環を形成し、ここで、環が、 $-OH$ 、 $-C_1 \sim C_3$ アルキル、および $-C_1 \sim C_3$ アルキレン $-O-C_1 \sim C_3$ アルキルから独立して選択される１つ以上の置換基で任意選択的に置換され、環が、任意選択的に、フェニルに縮合されるかもしくはシクロプロピルにスピロ縮合される。

【０１２８】

第２５の実施形態の第２の態様において、

R^H が、水素およびメチルから選択され；

R^I が、水素、 $C_1 \sim C_3$ 直鎖状アルキル、および $-CH_2-$ シクロプロピルから選択され；

R^I が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-CH_2-CHF_2$ 、 $-C_1 \sim C_6$ アルキレン $-O-C_1 \sim C_3$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル、 $-(CH_2)_2$ -フェニル、および $C_3 \sim C_{10}$ シクロアルキル置換 $C_1 \sim C_3$ アルキルから選択され、ここで、 R^3 によって表される基中のシクロアルキルの各々が、 $-C_1 \sim C_3$ アルキルで任意選択的に置換されるかもしくは任意選択的にベンゾ縮合され、 R^2 が水素もしくは $-C_1 \sim C_2$ アルキルであるとき、 R^3 がベンジルからさらに選択され；または

R^I および R^I が、それらが結合される窒素原子と一緒にあって、ピロリジンおよびピペリジンから選択される環を形成し、ここで、環が、フルオロ、 $-C_1 \sim C_3$ アルキル、および $-C_1 \sim C_3$ アルキレン $-O-C_1 \sim C_3$ アルキルから独立して選択される１つ以上の置換基で任意選択的に置換され、環が、任意選択的に、フェニルに縮合されるかもしくはシクロプロピルにスピロ縮合される。

【０１２９】

第２５の実施形態の第３の態様において、 R^1 が、フルオロまたはクロロである。

【０１３０】

第２５の実施形態の第４の態様において、血液悪性腫瘍を処置する方法に用いられる化合物が、以下のいずれか１つから選択される。

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

10


20

30

40

50


【化 4 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 5 0】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 5 1】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 5 2】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 5 3】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 5 4】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

10


20

30

40

50


【化 5 5】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 5 6】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 5 7】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 5 8】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 5 9】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 6 0】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

50


【化 6 1】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 6 2】




10

であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 6 3】




20

であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 6 4】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 6 5】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 6 6】




40

であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 6 7】



50


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化68】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化69】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化70】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化71】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化72】



であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化73】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 7 4】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 7 5】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 7 6】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 7 7】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 7 8】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 7 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

10


20

30

40

50


【化 8 0】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 8 1】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 8 2】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 8 3】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 8 4】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 8 5】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

10


20

30

40

50

【化 8 6】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 8 7】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 8 8】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 8 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 9 0】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 9 1】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 9 2】



50


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化93】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化94】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化95】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化96】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化97】



であり；


R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化98】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、


【化 9 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 0 0】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 0 1】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 0 2】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 1 0 3】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 0 4】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

50


【化 1 0 5】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

【化 1 0 6】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

【化 1 0 7】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

【化 1 0 8】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、


【化 1 0 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

【化 1 1 0】




であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

50


【化 1 1 1】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 1 2】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 1 3】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 1 1 4】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 1 1 5】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 1 6】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

50

【化 1 1 7】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 1 1 8】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 1 1 9】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 1 2 0】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 1 2 1】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 1 2 2】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

50


【化 1 2 3】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 2 4】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 2 5】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 1 2 6】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 2 7】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 2 8】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

50


【化 1 2 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

【化 1 3 0】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

【化 1 3 1】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

【化 1 3 2】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、


【化 1 3 3】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

【化 1 3 4】




であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、

50


【化 1 3 5】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 3 6】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 3 7】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 1 3 8】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 1 3 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 1 4 0】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

50


【化 1 4 1】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 1 4 2】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 1 4 3】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 1 4 4】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 1 4 5】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 1 4 6】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

50


【化 1 4 7】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 1 4 8】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 1 4 9】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 1 5 0】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 1 5 1】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 1 5 2】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

50


【化 1 5 3】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 1 5 4】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 1 5 5】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 1 5 6】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 1 5 7】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、


【化 1 5 8】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(\text{R}^H) - \text{NR}^I \text{R}^I$ が、

【化 1 5 9】



10

20


30

40

50


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化160】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化161】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化162】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化163】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化164】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-\text{CH}(R^H)-\text{NR}^I\text{R}^I$ が、
【化165】



10

20


30

40

50


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化166】



であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化167】



10

であり；


R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化168】



20

であり；


R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化169】



30

であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化170】



40

であり；


R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化171】



であり；


50

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化172】



であり；


R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化173】



10

であり；


R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化174】



20


であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化175】



であり；


R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化176】



30

であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化177】




40

であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

50


【化 1 7 8】



であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 1 7 9】



10

であり、または前述のもののいずれかの薬学的に許容できる塩である。上述の一覧にされた化合物は、米国特許第 9, 315, 451 号に詳述される合成手順に従って調製され、この出願の全教示内容が参照により本明細書に援用される。



【0 1 3 1】

第 25 の実施形態の第 5 の態様において、 R^1 が、 $-OCH_3$ 、 $-CF_3$ 、 Cl 、または F である。



【0 1 3 2】

本発明の第 26 の実施形態は、

【化 1 8 0】




30




40

50


化合物 3b




化合物 4



化合物 4a




化合物 4b



： および

化合物 5




【 0 1 3 3 】

更なる実施形態において、本発明は、血液癌の処置を、それを必要とする対象において行う方法およびそのような癌を処置するのに用いられる化合物に関する。本方法は、対象に、以下に記載される構造式のいずれか1つによって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩の有効量を投与することを含む。

【 0 1 3 4 】

第 27 の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (I) もしくは (I') :



R^Aの各々が、－(C₁～C₆アルキル)、水素、－(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～C₁₂)カルボシクリル、－(C₀～C₆アルキレニル)－(4～13員)ヘテロシクリル

ル、 $-C(O)-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^B の各々および R^B の各々が、水素、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_1\sim C_6\text{ハロアルキル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1\sim 2}-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1\sim 2}(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim 12)$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1\sim 2}(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-N(R^D)(R^E)$ 、および $-N^+(R^F)_3$ から独立して選択され、ここで、 R^F が、各々の存在について独立して、 H 、 $C_1\sim 6$ アルキル、 $C_1\sim 6$ ハロアルキル、 $(C_1\sim 4\text{アルコキシ})-(C_1\sim 6)$ アルキル、アミノ $(C_1\sim 6)$ アルキル、モノ-もしくはジ $(C_1\sim 4\text{アルキル})$ アミノ $-(C_1\sim 6)$ アルキル、 $(C_3\sim 12)$ カルボシクリル $-(C_0\sim 3)$ アルキレニル、または $4\sim 13$ 員ヘテロシクリルについて、 O 、 N もしくは S から選択される1つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む任意の2つの R^F であって、それらが結合される窒素原子と一緒にされる任意の2つの R^F であり；

R^C の各々が、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され；

R^D の各々および R^E の各々が、水素、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され、

ここで、

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^B'$ 、および $S(O)_{0\sim 2}R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；

R^6' 、 R^A 、または R^C の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、1つ以上のフルオロで任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および R^4' を一緒にすることによって形成される任意の環が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1\sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1\sim C_4$ アルキル、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim C_{10}\text{カルボシクリル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-NR^B R^B'$ 、および $S(O)_{0\sim 2}R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および R^4' を一緒にすることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^F の各々が、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_1\sim C_6\text{ハロアルキル})$ 、 $-(C_1\sim C_6\text{ヒドロキシアルキル})$ 、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1\sim 2}-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1\sim 2}-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim 12)$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1\sim 2}-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(C_3\sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-(4\sim 13\text{員})$ ヘテロシクリル、 $-(C_0\sim C_6\text{アルキレニル})-C(O)_2-(C_1\sim C_6\text{アルキル})$ 、 $-(C_1\sim C_6\text{アルキレニル})-NR^B R^B'$ 、および $-C(O)N$

R^D) (R^E) から独立して選択され;

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、 R^6 の任意のシクロアルキル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ 、および $-N(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})_2$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され;

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 もしくは R^6 の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1 \sim C_4$ アルキルまたは $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される。

10

【0135】

第26の実施形態の第2の態様において、

X が、 N および $C(R^2)$ から選択され;

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、および R^6 の各々が、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-OR^A$ 、 $-C(O)NR^B R^{B'}$ 、 $NR^B R^{B'}$ 、 $S(O)_{0 \sim 2}R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され; または

R^1 および R^2 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリルもしくは $4 \sim 13$ 員ヘテロシクリル環を形成し; または

20

R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリルもしくは $4 \sim 13$ 員ヘテロシクリル環を形成し;

R^4 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリルから選択され;

$R^{4'}$ が、水素、 $-(C_2 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $S(O)_{1 \sim 2}R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、および $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})-NR^D R^E$ から選択され; または

R^4 および $R^{4'}$ が、それらが共通して結合される窒素原子と任意選択的に一緒になって、 N 、 O 、および S から独立して選択される1~2つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む4~8員環を形成し;

30

R^6 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、および $-(C_3 \sim C_6 \text{シクロアルキル})$ から選択され;

R^A の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され;

R^B の各々および $R^{B'}$ の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され;

40

R^C の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され;

50

R^D の各々および R^E の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ 、 $-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ 、 $-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され、

ここで、

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；

$R^{6'}$ 、 R^A 、または R^C の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、1つ以上のフルオロで任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および $R^{4'}$ を一緒にすることによって形成される任意の環が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $4 \sim 13$ 員ヘテロシクリル、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および $R^{4'}$ を一緒にすることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^F の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ 、 $-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ 、 $-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ 、 $-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ 、 $-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ 、 $-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ 、 $-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、 $R^{6'}$ の任意のシクロアルキル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ 、および $-N(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})_2$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 もしくは R^6 の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1 \sim C_4$ アルキルまたは $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される。第26の実施形態の構造式(I)および(I')中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0136】

第26の実施形態の第3の態様において、 R^5 、 R^6 、および $R^{6'}$ の各々が水素である。第26の実施形態の構造式(I)および(I')中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1および第2の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0137】

第26の実施形態の第4の態様において、 R^4 が、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ から選択され； $R^{4'}$ が、水素、ヒドロキシおよびハロから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される $-(C_2 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_3 \sim C_6 \text{シクロアルキル})$ 、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ 、 $-N(R^D)(R^E)$ 、および $S(O)_{1 \sim 2} R^C$ から選択され；または R^4 および $R^{4'}$ が、それらが共通して結合される窒素原子と一緒にあって、N、O、およびSから独立して選

択される1～2つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む4～6員環を形成し； R^C が－（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）であり； R^D および R^E の各々が、水素および－（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）から独立して選択される。第26の実施形態の構造式（I）および（I'）中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第3の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0138】

第26の実施形態の第5の態様において、 R^4 が、水素および－（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）から選択され； $R^{4'}$ が、水素、－（ $C_2 \sim C_6$ アルキル）、－（ $C_3 \sim C_6$ シクロアルキル）、－C（O）－（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）、－C（O）－（ $C_1 \sim C_6$ アルキレニル）－N（ R^D ）（ R^E ）、およびS（O）_{1~2} R^C から選択され； R^C が－（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）であり； R^D および R^E の各々が、水素および－（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）から独立して選択される。第26の実施形態の構造式（I）および（I'）中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第4の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0139】

第26の実施形態の第6の態様において、 R^4 が、水素、メチル、エチル、およびプロピルから選択され； $R^{4'}$ が、水素、エチル、プロピル、シクロプロピル、－C（O）CH₃、－C（O）CH₂N（CH₃）₂、および－S（O）₂CH₃から選択される。第26の実施形態の構造式（I）および（I'）中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第5の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0140】

第26の実施形態の第7の態様において、 R^1 が、水素、ハロ、ハロ、－NR^BR^{B'}、－C（O）NR^BR^{B'}、－OR^A、－（ $C_0 \sim C_6$ アルキレニル）－（ $C_3 \sim 12$ ）カルボシクリル、および－（ $C_0 \sim C_6$ アルキレニル）－（4～13員）ヘテロシクリルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される－（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）から選択され、ここで、 R^A が、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換される $C_1 \sim C_6$ アルキルである。第26の実施形態の構造式（I）および（I'）中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第6の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0141】

第26の実施形態の第8の態様において、 R^3 が、水素および－N（ R^B ）（ R^B ）から選択され、ここで、 R^B が水素である。第26の実施形態の構造式（I）および（I'）中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第7の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0142】

第26の実施形態の第9の態様において、XがC（ R^2 ）である。第26の実施形態の構造式（I）および（I'）中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第8の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0143】

第26の実施形態の第10の態様において、XがC（ R^2 ）であり； R^1 が、水素、ハロ、ハロ、－NR^BR^{B'}、－C（O）NR^BR^{B'}、－OR^A、－（ $C_0 \sim C_6$ アルキレニル）－（ $C_3 \sim 12$ ）カルボシクリル、および－（ $C_0 \sim C_6$ アルキレニル）－（4～13員）ヘテロシクリルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される－（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）から選択され、ここで、 R^A が、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換される $C_1 \sim C_6$ アルキルである。第26の実施形態の構造式（I）および（I'）中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第8の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0144】

第26の実施形態の第10の態様において、 R^1 が、水素、ハロ、ハロおよびOR^Aから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される－（ $C_1 \sim C_6$ アルキル）から選択され、ここで、 R^A が、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換される C_1

10

20

30

40

50

～C₆アルキルである。第26の実施形態の構造式(I)および(I')中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第9の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0145】

第26の実施形態の第11の態様において、R¹が、水素、フルオロ、クロロ、CF₃、OCH₃、OCF₃、N(CH₃)₂、およびNHCH₃から選択され、例えば、R¹が、水素、フルオロ、クロロ、CF₃、およびOCF₃から選択される。第26の実施形態の構造式(I)および(I')中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第10の態様に関して先に規定されたとおりである。


【0146】

第26の実施形態の第12の態様において、XがC(R²)であり；R¹およびR²が、それらが結合される原子と一緒に、4～13員の窒素含有ヘテロシクリル環を形成し、ここで、R¹およびR²を含む環が、C₁～C₄アルキルで任意の置換可能な窒素原子において任意選択的に置換され、かつNR^BR^{B'}で炭素原子において任意選択的に置換され、R^BおよびR^{B'}の各々が、水素およびC₁～C₆アルキルから独立して選択される。第26の実施形態の構造式(I)および(I')中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第11の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0147】

第26の実施形態の第13の態様において、XがC(R²)であり；R¹およびR²が、それらが結合される炭素原子と一緒に、

【化183】



を形成し、式中、

【化184】

“1”


が、R¹に結合される炭素原子への結合点を表し；

【化185】

“2”


が、R²に結合される炭素原子への結合点を表し；fが0または1である。例えば、R¹およびR²が、それらが結合される炭素原子と一緒に、

【化186】



を形成し、式中、

【化187】

“1”

10

20

30

40

50

が、 R^1 に結合される炭素原子への結合点を表し、
【化188】



が、 R^2 に結合される炭素原子への結合点を表す。第26の実施形態の構造式(I)および(I')中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第12の態様に関して先に規定されるとおりである。


【0148】

第26の実施形態の第14の態様において、XがC(R^2)であり； R^2 が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ で窒素原子において任意選択的に置換される $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ $-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル； $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ $-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル；または $NR^B R^{B'}$ で置換される $-(C_1 \sim C_6)$ アルキルである。例えば、 R^2 が、 $C_1 \sim C_4$ アルキルまたはベンジルで窒素原子において任意選択的に置換されるピロリジニルである。第26の実施形態の構造式(I)および(I')中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第11の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0149】

第26の実施形態の第15の態様において、XがC(R^2)であり； R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と一緒に、窒素含有4～13員ヘテロシクリルを形成する。例えば、 R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と一緒に、

【化189】



を形成し、式中、

【化190】



が、 R^2 に結合される炭素原子への結合点を表し；

【化191】



が、 R^3 に結合される炭素原子への結合点を表し；fが0または1である。第26の実施形態の構造式(I)および(I')中の残りの値、および変数の値の例は、第26の実施形態の第1～第11の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0150】

第26の実施形態の第16の態様において、XがC(R^2)であり； R^3 が、水素および $-N(R^B)(R^{B'})$ から選択され、ここで、 R^B が水素であり、 $R^{B'}$ が、 $-C(O)$ $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ $-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリルまたは $-C(O)$ $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ $-N(R^D)(R^E)$ である。例えば、 R^3 が、水素および

10


20

30

40

50

【化 1 9 2】



から選択される。第 2 6 の実施形態の構造式 (I) および (I') 中の残りの値、および変数の値の例は、第 2 6 の実施形態の第 1 ~ 第 1 4 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0 1 5 1】

第 2 6 の実施形態の第 1 7 の態様において、X が C (R²) である。第 2 6 の実施形態の構造式 (I) および (I') 中の残りの値、および変数の値の例は、第 2 6 の実施形態の第 1 ~ 第 9 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0 1 5 2】

第 2 6 の実施形態の第 1 8 の態様において、化合物が、以下の構造式のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【0 1 5 3】

10

20

30

40

50

【表 4】

化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造
S3-7-3-A (ジステレオマー-A) S3-7-3-B (ジステレオマー-B)		S3-7-3		S3-7-3-A (ジステレオマー-A) S3-7-3-B (ジステレオマー-B)	
S3-7-4-A (ジステレオマー-A) S3-7-4-B (ジステレオマー-B)		S3-7-5		S3-7-6-A (ジステレオマー-A) S3-7-6-B (ジステレオマー-B)	
S3-7-7-A (ジステレオマー-A) S3-7-7-B (ジステレオマー-B)		S3-7-8-A (ジステレオマー-A) S3-7-8-B (ジステレオマー-B)		S3-7-9-A (ジステレオマー-A) S3-7-9-B (ジステレオマー-B)	
S3-7-10-A (ジステレオマー-A) S3-7-10-B (ジステレオマー-B)		S3-7-11		S3-7-12	
S3-7-13-A (ジステレオマー-A) S3-7-13-B (ジステレオマー-B)		S4-16-1 (ジステレオマー-A)		S4-16-2 (ジステレオマー-A)	
S4-16-3 (ジステレオマー-A)		S4-16-4 (ジステレオマー-A)		S4-16-5-A (ジステレオマー-A) S4-16-5-B (ジステレオマー-B)	
S4-16-7 (ジステレオマー-A)		S4-16-8 (ジステレオマー-A)		S4-16-9 (ジステレオマー-A)	
S4-16-10 (ジステレオマー-A)		S4-16-11 (ジステレオマー-A)		S4-16-12 (ジステレオマー-A)	
S4-16-13 (ジステレオマー-A)		S4-16-14-A (ジステレオマー-A) S4-16-14-B (ジステレオマー-B)		S4-16-15 (ジステレオマー-A)	
S4-16-17 (ジステレオマー-A)		S4-16-18 (ジステレオマー-A)		S5-10-1-A (ジステレオマー-A) S5-10-1-B (ジステレオマー-B)	
S5-10-1-3-A (ジステレオマー-A) S5-10-1-3-B (ジステレオマー-B)		S5-10-2-A (ジステレオマー-A) S5-10-2-B (ジステレオマー-B)		S5-10-3-A (ジステレオマー-A) S5-10-3-B (ジステレオマー-B)	
S6-6-1 (単一の ジステレオマー)		S6-6-2 (単一の ジステレオマー)		S6-6-3 (単一の ジステレオマー)	
S7-14-3-A (ジステレオマー-A) S7-14-3-B (ジステレオマー-B)		S7-14-2-A (ジステレオマー-A)		S7-14-3-A (ジステレオマー-A)	
S8-4-1		S8-4-2		S8-4-3	

【 0 1 5 4 】

10

20

30

40

50

【表 5】

化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造
S5-4-1		S9-5-1		S9-5-2	
S9-5-3		S9-5-4		S9-5-5	
S9-5-6		S10-4-1 (第一のジステレオマー)		S10-4-2 (第一のジステレオマー)	
S10-4-3 (第一のジステレオマー)		S11-3-1		S11-3-2	
S11-3-3		S12-8-1-A (ジステレオマー-A) S12-8-1-B (ジステレオマー-B)		S12-8-2-A (ジステレオマー-A)	
S12-8-3-A (ジステレオマー-A) S12-8-3-B (ジステレオマー-B)		S12-8-4-A (ジステレオマー-A)		S12-8-5-A (ジステレオマー-A)	
S12-8-5-A (ジステレオマー-A) S12-8-5-B (ジステレオマー-B)		S12-8-7-A (ジステレオマー-A)		S12-8-8-A (ジステレオマー-A)	
S13-5-1		S13-5-2		S14-8-1	
S14-8-2		S14-8-3-A (ジステレオマー-A) S14-8-3-B (ジステレオマー-B)		S15-10-1	
S15-10-2		S15-10-3-A (ジステレオマー-A) S15-10-3-B (ジステレオマー-B)		S16-7-1 (第一のジステレオマー)	
S16-7-2 (第一のジステレオマー)		S16-7-3 (第一のジステレオマー)		S16-7-4 (第一のジステレオマー)	
S16-7-5 (第一のジステレオマー)		S16-7-6 (第一のジステレオマー)		S17-3-1	
S17-3-2		S17-3-3		S17-3-4	
S17-3-5		S17-3-6		S17-3-7	

【 0 1 5 5 】

10

20

30

40

50

【表 6】

化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造	化合物No.	化合物構造
S17-3-8		S17-3-9		S17-3-10	
S18-3-11		S18-3-1		S18-3-2	
S18-3-2		S18-3-3		S18-3-3 (ジアステロマー-B)	
S19-3-2		S19-3-3-A (ジアステロマー-A) S19-3-3-B (ジアステロマー-B)		S19-3-3-A (ジアステロマー-A) S19-3-3-B (ジアステロマー-B)	
S19-3-5-A (ジアステロマー-A) S19-3-5-B (ジアステロマー-B)		S19-3-6		S19-3-7-A (ジアステロマー-A) S19-3-7-B (ジアステロマー-B)	
S20-4-1 (単一のジアステロマー)		S20-4-2 (単一のジアステロマー)		S20-4-3 (単一のジアステロマー)	
S20-4-4 (単一のジアステロマー)		S21-5-1		S21-5-2	
S21-5-3		S21-5-4			


【0156】

国際公開第2014/03650号における上述の参照合成スキームに示される表中の化合物番号は、全て米国特許第9,573,895号に見出され、これらの出願の全教示内容が参照により本明細書に援用される。

【0157】

第26の実施形態の第19の態様において、化合物が、以下の構造式：

【化193】



のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【0158】

第27の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式(X)もしくは(X-1)

10


20

30

40

50

【化 1 9 4】



10


のいずれか 1 つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0 1 5 9】

第 27 の実施形態の第 1 の態様において、 R^{700} が、各々の存在について独立して、ハロゲンであり； R^{901a} が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり； R^{401} および $R^{401'}$ が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ ヒドロキシアルキル、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}) C(O)-$ 、 $C_3 \sim C_{12}$ カルボシクリル- $C(O)-$ であり、ここで、カルボシクリル部分が、ヒドロキシ基、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}) S(O)_{1 \sim 2}-$ 、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}) C(O)NH(C_1 \sim C_4 \text{ アルキレニル})-$ 、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}) S(O)_{1 \sim 2}NH(C_1 \sim C_4 \text{ アルキレニル})-$ 、または以下の構造式：

20

【化 1 9 5】



30

によって表される部分で任意選択的に置換され、式中、

【化 1 9 6】



が、窒素原子への結合点を表し、 R^{4a} および $R^{4a'}$ が、各々の存在について独立して、H もしくは $C_1 \sim C_4$ アルキルであり、またはそれらが結合される窒素原子と一緒にあって、4～13 員ヘテロシクリルを形成し； R^{901} 、 $R^{901'}$ 、および $R^{901''}$ が、各々の存在について独立して、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ ヒドロキシアルキル、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルコキシ})-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、アミノ- $(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、モノ-もしくはジ- $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})$ アミノ- $(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $C_3 \sim C_{12}$ カルボシクリル- $(C_0 \sim C_3 \text{ アルキレニル})$ 、(4～13 員)ヘテロシクリル- $(C_0 \sim C_3 \text{ アルキレニル})$ 、または R^{901} 、 $R^{901'}$ 、および $R^{901''}$ のいずれか 2 つであって、それらが結合される窒素原子と一緒にあって、4～13 員ヘテロシクリルを形成するいずれか 2 つである。

40

【0 1 6 0】

第 27 の実施形態の第 2 の態様において、 R^{700} が F であり； R^{901} 、 $R^{901'}$ 、および $R^{901''}$ が、各々の存在について独立して、H、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ ヒドロキシアルキル、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルコキシ})-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、アミノ- $(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、モノ-またはジ- $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})$ アミノ-

50

－（ $C_1 \sim C_6$ ）アルキル、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリル－（ $C_0 \sim C_3$ ）アルキレニル、（4～13員）ヘテロシクリル－（ $C_0 \sim C_3$ ）アルキレニルである。第27の実施形態の構造式（X）および（X-1）中の残りの値、および変数の値の例は、第27の実施形態の第1の態様に関して先に規定されるとおりである。


【0161】

第27の実施形態の第3の態様において、化合物が、構造式（X）によって表され； R^{900} がFであり； R^{901} および R^{901} が、それらが結合される窒素原子と一緒にあって、4～13員ヘテロシクリルを形成する。第27の実施形態の構造式（X）および（X-1）中の残りの値、および変数の値の例は、第27の実施形態の第1～第2の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0162】

第27の実施形態の第4の態様において、化合物が、以下の構造式

【化197】



10


20

30

40

50

【化 1 9 8】



10

20

30

40

50

S16-6-36


S16-6-37

S16-6-38


, および

【 0 1 6 3 】


【化 2 0 0】



【化 2 0 1】



【化 2 0 2】




のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【 0 1 6 4 】

第 28 の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (X I)


【 化 2 0 3 】



10

のいずれか 1 つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、 R^{902} 、 $R^{902'}$ 、 R^{402} 、および $R^{402'}$ が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_6$ アルキルである。例えば、構造式 (X I) の化合物が、以下の構造式

【 化 2 0 4 】




20

によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である方法である。

【 0 1 6 5 】

第 29 の実施形態において、本発明は、構造式 (X I I) :

【 化 2 0 5 】



30

によって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、以下のとおりである。

【 0 1 6 6 】

40

50

【表 7】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-5				CH
S17-3				CH
S16-6-4				CH
S16-6-2				CH
S16-6-31				CH
S16-6-32				CH
S16-6-33				CH
S16-6-34				CH

【 0 1 6 7 】

【表 8】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-6-35				CH
S16-6-3				CH
S16-6-4				CH
S16-6-5				CH
S16-6-15				CH
S16-6-13				CH
S16-6-14				CH
S16-6-16				CH
S16-6-17				CH
S16-6-27				CH

【 0 1 6 8 】

10

20

30

40

50

【表 9】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-6-29				CH
S16-6-23				CH
S16-6-24				CH
S16-6-25				CH
S16-6-30				CH
S16-6-6				CH
S16-6-7				CH
S16-6-8				CH
S16-6-9				CH
S16-6-10				CH

10

20

30

40

【 0 1 6 9 】

50

【表 10】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-6-36				CH
S16-6-37				CH
S16-6-38				CH
S16-6-11				CH
S16-6-12				CH
S16-6-18				CH
S16-6-39				CH
S17-5				CH
S17-6				CH
S16-6-29				CH

【0170】

10

20

30

40

50

【表 1 1】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-6-19				CH
S16-6-28				CH
S16-6-20				CH
S16-6-21				CH
S16-6-22				CH
S20-6-1				CH
S20-6-4				CH
S20-6-2				CH
S20-6-3				CH
S20-6-5				CH

10

20











30

40

【 0 1 7 1 】

50

【表 1 2】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S20-6-7				CH
S20-6-16				CH
S20-6-8				CH
S20-6-14				CH
S20-6-6				CH
S20-6-15				CH
S20-6-11				CH
S20-6-12				CH
S20-6-13				CH
S20-6-9				CH

【0 1 7 2】

10



20

30

40

50

【表 1 3】


化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S20-6-10				CH
S19-4				N

10

【0 1 7 3】

第 3 0 の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化 2 0 6】




20

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、以下のとおりである方法である。

【0 1 7 4】

【表 1 4】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
K43				CH
K44				CH
K45				N
K46				N




















30

40

【0 1 7 5】

50

【表 15】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
K47				CH
K48				CH
K49				CH
K50				CH
K51				CH
K52				CH
K53				CH
K54				CH
K55				CH
K56				CH
K57				CH

【0176】

10












20

30

40

50


【表 16】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
K58				CH
K59				CH
K60				CH
K61				CH
K62				CH
K63				CH
K64				CH
K65				CH

【0177】

第31の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化207】



によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0178】

第31の実施形態の第1の態様において、 R^{803} が、H、 $C_1 \sim 6$ アルキル、 $C_1 \sim 6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 6$ ヒドロキシアルキル、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリル- ($C_0 \sim 3$) アルキレニル、アミノ- ($C_1 \sim C_4$) アルキル、モノ-またはジ- ($C_1 \sim C_4$ アルキル) アミノ- ($C_1 \sim 4$) アルキル、(4~13員)ヘテロシクリル- ($C_0 \sim C_3$) アルキレニルであり、ここで、ヘテロシクリル部分が、 $C_1 \sim 3$ アルキルで任意選択的に置換され； R^{701} が、H、 $C_1 \sim 4$ アルキルオキシ、-OH、 $C_1 \sim 4$ アルキル、 $C_1 \sim 4$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアルキル、 $C_1 \sim 4$ ハロアルコキシであり； R^{403} および $R^{403'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1 \sim 4$ アルキル； $C_1 \sim C_4$ ハロアルキル； $C_1 \sim C_4$ ヒドロキシアルキル；($C_1 \sim C_4$ アルコキシ)- ($C_1 \sim 4$) アルキル；アミノ- ($C_1 \sim C_4$) アルキル；モノ-またはジ- ($C_1 \sim C_4$ アルキル) アミノ- ($C_1 \sim 4$) アルキル； $C_3 \sim 12$ カルボシクリル- ($C_0 \sim C_3$) アルキレニル (カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される)；($C_1 \sim 4$ アルキル) C(O)-、($C_1 \sim 4$ アルキル) S(O)_{1~2}；($C_1 \sim 4$ アルキル) C(O)NH ($C_1 \sim 4$ アルキレニル)-；($C_1 \sim 4$ アルキル) S(O)_{1~2}NH ($C_1 \sim 4$ アルキレニル)-；HOC(O)- ($C_1 \sim C_3$) アルキレニル； $H_2NC(O)-$ ($C_1 \sim C_3$) アルキレニル；($C_1 \sim 4$ アルキルオキシ) C(O)- ($C_1 \sim C_3$) アルキレニルである。

【0179】

第31の実施形態の第2の態様において、 R^{701} が-OCH₃であり、 R^{803} がエチルである。第31の実施形態の構造式 (XX) 中の残りの値、および変数の値の例は、第31の実施形態の第1の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0180】

第31の実施形態の第3の態様において、 R^{701} が-OCH₃であり、 R^{403} および $R^{403'}$ の各々が水素である。第31の実施形態の構造式 (XX) 中の残りの値、および変数の値の例は、第31の実施形態の第1または第2の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0181】

第31の実施形態の第4の態様において、 R^{803} がエチルであり、 R^{403} および $R^{403'}$ の各々が水素である。第31の実施形態の構造式 (XX) 中の残りの値、および変数の値の例は、第31の実施形態の第1~第3の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0182】

第31の実施形態の第5の態様において、 R^{701} が-OCF₃であり、 R^{803} がメチルである。第31の実施形態の構造式 (XX) 中の残りの値、および変数の値の例は、第31の実施形態の第1~第4の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0183】

第31の実施形態の第6の態様において、化合物が、以下の構造式

10







20

30

40

50

【化 2 0 8】



10


20

30

40

50

【化 2 0 9】



のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【0184】

第31の実施形態の第7の態様において、化合物が、以下の構造式

10


20

30

40

50

【化 2 1 0】



10

20


30

40

50


のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

第 3 1 の実施形態の第 8 の態様において、化合物が、以下の構造式



30

【化 2 1 2】



10


20

のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【 0 1 8 6】

第 3 1 の実施形態の第 9 の態様において、化合物が、以下の構造式

【化 2 1 3】



30

のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。


【 0 1 8 7】

第 3 1 の実施形態の第 1 0 の態様において、化合物が、以下の構造式

40

50

【化 2 1 4】



10


のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

20

【0188】

第32の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式：

【化 2 1 5】



30

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。第32の実施形態の第1の態様において、 R^{702} が、H、ハロゲン、 $C_1\sim 4$ アルキルオキシ、 $-OH$ 、 $C_1\sim 4$ アルキル、 $C_1\sim 4$ ハロアルキル、 $C_1\sim 4$ ヒドロキシアルキル、 $C_1\sim 4$ ハロアルコキシであり； R^{404} および $R^{404'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1\sim 4$ アルキル； $C_1\sim 4$ ハロアルキル； $C_1\sim 4$ ヒドロキシアルキル；($C_1\sim 4$ アルコキシ)-($C_1\sim 4$)アルキル；アミノ-($C_1\sim 4$)アルキル；モノ-またはジ-($C_1\sim 4$ アルキル)アミノ-($C_1\sim 4$)アルキル； $C_3\sim 12$ カルボシクリル-($C_0\sim C_3$)アルキレニル(カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される)；($C_1\sim 4$ アルキル) $C(O)-$ 、($C_1\sim 4$ アルキル) $S(O)_{1\sim 2}-$ ；($C_1\sim 4$ アルキル) $C(O)NH-C_1\sim 4$ アルキレニル；($C_1\sim 4$ アルキル) $S(O)_{1\sim 2}NH-C_1\sim 4$ アルキレニル； $HO-C(O)-$ ($C_1\sim C_3$)アルキレニル； $H_2N-C(O)-$ ($C_1\sim C_3$)アルキレニル；($C_1\sim 4$ アルキルオキシ) $C(O)-$ ($C_1\sim C_3$)アルキレニルである。

40

【0189】

第32の実施形態の第2の態様において、 R^{702} が $C_1\sim 4$ ハロアルキルである。第32の実施形態の構造式(XXI)中の残りの値、および変数の値の例は、第32の実施形態の第1の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0190】

50

第32の実施形態の第3の態様において、 R^{702} が、Hまたはハロゲンである。第32の実施形態の構造式(XXI)中の残りの値、および変数の値の例は、第32の実施形態の第1または第2の態様に関して先に規定されるとおりである。


【0191】

第32の実施形態の第4の態様において、 R^{702} が $-OCH_3$ である。第32の実施形態の構造式(XXI)中の残りの値、および変数の値の例は、第32の実施形態の第1～第3の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0192】

第32の実施形態の第5の態様において、化合物が、以下の構造式

【化216】



のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【0193】

第32の実施形態の第6の態様において、化合物が、以下の構造式

10


20

30

40

50

【化 2 1 7】



のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【0 1 9 4】

第32の実施形態の第7の態様において、化合物が、以下の構造式

10


20

30

40

50

【化 2 1 8】



10


20

のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【 0 1 9 5】

第33の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式

【化 2 1 9】



30

のいずれか1つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。第33の実施形態の第1の態様において、 R^{703} が、H、ハロゲン、 $C_1\sim 4$ アルキルオキシ、 $-OH$ 、 $C_1\sim 4$ アルキル、 $C_1\sim 4$ ハロアルキル、 $C_1\sim 4$ ヒドロキシアルキル、 $C_1\sim 4$ ハロアルコキシであり、 R^{601} および $R^{601'}$ が、それぞれ独立して、H、 $C_1\sim 6$ アルキル、 $C_3\sim 12$ カルボシクリル（ $C_0\sim 3$ ）アルキレニルであり； R^{405} および $R^{405'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1\sim 4$ アルキル； $C_1\sim 4$ ハロアルキル； $C_1\sim 4$ ヒドロキシアルキル；（ $C_1\sim 4$ アルコキシ）-（ $C_1\sim 4$ ）アルキル；アミノ-（ $C_1\sim 4$ ）アルキル；モノ-またはジ-（ $C_1\sim 4$ アルキル）アミノ-（ $C_1\sim 4$ ）アルキル； $C_3\sim 12$ カルボシクリル（ $C_0\sim 3$ ）アルキレニル（カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される）；（ $C_1\sim 4$ アルキル） $C(O)-$ 、（ $C_1\sim 4$ アルキル） $S(O)_1\sim 2-$ ；（ $C_1\sim 4$ アルキル） $C(O)NH(C_1\sim 4$ アルキレニル)-；（ $C_1\sim$

40


50

4 アルキル) S (O) _{1~2} NH (C_{1~4} アルキレニル) - ; HO C (O) - (C_{1~C₃}) アルキレニル; H₂ N C (O) - (C_{1~C₃}) アルキレニル; (C_{1~4} アルキルオキシ) C (O) - (C_{1~C₃}) アルキレニルである。

【0196】

第33の実施形態の第2の態様において、R⁷⁰³がC_{1~4}アルキルオキシであり、R⁴⁰⁵およびR⁴⁰⁵が、それぞれ独立して、HまたはC_{1~4}アルキルである。第33の実施形態の構造式 (XXII) 中の残りの値、および変数の値の例は、第33の実施形態の第1の態様に関して先に規定されるとおりである。第33の実施形態の化合物の例として、以下の構造式：

【化220】




のいずれか1つによって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩が挙げられる。

【0197】

第34の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化221】



によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。第34の実施形態の第1の態様において、R⁷⁰⁴が、H、ハロゲン、C_{1~4}アルキルオキシ、-OH、C_{1~4}アルキル、C_{1~4}ハロアルキル、C_{1~4}ヒドロキシアルキル、C_{1~4}ハロアルコキシであり；R⁸⁰²およびR⁸⁰²が、それらが結合される窒素原子と一緒に、4~13員単環式または7~13員二環式ヘテロシクリルを形成し；R⁴⁰⁶およびR⁴⁰⁶が、それぞれ独立して、H；C_{1~4}アルキル；C_{1~4}ハロアルキル；C_{1~4}ヒドロキシアルキル；(C_{1~4}アルコキシ)-(C_{1~4})アルキル；アミノ-(C_{1~4})アルキル；モノ-またはジ-(C_{1~4}アルキル)アミノ-(C_{1~4})アルキル；C_{3~12}カルボシクリル-(C_{0~C₃})アルキレニル(カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意

選択的に置換される) ; (C₁~4アルキル) C(O) -、(C₁~4アルキル) S(O)₁~2 - ; (C₁~4アルキル) C(O) NH(C₁~4アルキレニル) - ; (C₁~4アルキル) S(O)₁~2 NH(C₁~4アルキレニル) - ; HOC(O) - (C₁~C₃) アルキレニル ; H₂NC(O) - (C₁~C₃) アルキレニル ; (C₁~4アルキルオキシ) C(O) - (C₁~C₃) アルキレニルである。

【0198】


第34の実施形態の第2の態様において、R⁷⁰⁴がハロゲンであり ; R⁸⁰²およびR^{802'}が、それらが結合される窒素原子と一緒に、1, 2, 3, 4-テトラヒドロイソキノリンを形成する。第34の実施形態の構造式(XXIII)中の残りの値、および変数の値の例は、第34の実施形態の第1の態様に関して先に規定されるとおりである。

10

【0199】

第34の実施形態の化合物の例として、以下の構造式 :

【化222】



20

30

40


のいずれか1つによって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩が挙げられる。

【0200】

第35の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

50

【化 2 2 3】



によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。第35の実施形態の第1の態様において、 R^{705} が、H、ハロゲン、 $C_1\sim 4$ アルキルオキシ、 $-OH$ 、 $C_1\sim 4$ アルキル、 $C_1\sim 4$ ハロアルキル、 $C_1\sim 4$ ヒドロキシアルキル、または $C_1\sim 4$ ハロアルコキシであり； R^{804} が、アミノ- $C_1\sim 6$ アルキル、モノ-もしくはジ- ($C_1\sim C_4$ アルキル) アミノ ($C_1\sim 6$) アルキル、またはC結合4~13単環式ヘテロシクリル (ヘテロシクリルが任意選択的に $C_1\sim 4$ アルキルでN置換される) であり、； R^{407} および $R^{407'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1\sim 4$ アルキル； $C_1\sim C_4$ ハロアルキル； $C_1\sim C_4$ ヒドロキシアルキル；($C_1\sim C_4$ アルコキシ)- ($C_1\sim 4$) アルキル；アミノ- ($C_1\sim C_4$) アルキル；モノ-またはジ- ($C_1\sim C_4$ アルキル) アミノ- ($C_1\sim 4$) アルキル； $C_3\sim 12$ カルボシクリル- ($C_0\sim C_3$) アルキレニル (カルボシクリル部分がヒドロキシシル基で任意選択的に置換される)；($C_1\sim 4$ アルキル) $C(O)-$ 、($C_1\sim 4$ アルキル) $S(O)_{1\sim 2}-$ ；($C_1\sim 4$ アルキル) $C(O)NH(C_1\sim 4$ アルキレニル)-；($C_1\sim 4$ アルキル) $S(O)_{1\sim 2}NH(C_1\sim 4$ アルキレニル)-； $HOC(O)-$ ($C_1\sim C_3$) アルキレニル； $H_2NC(O)-$ ($C_1\sim C_3$) アルキレニル；($C_1\sim 4$ アルキルオキシ) $C(O)-$ ($C_1\sim C_3$) アルキレニルである。

【0201】

第35の実施形態の第2の態様において、 R^{705} が $C_1\sim 4$ ハロアルキルであり； R^{804} が、モノ-またはジ- ($C_1\sim C_2$ アルキル) アミノ ($C_1\sim 6$) アルキルである。第35の実施形態の構造式 (XXIV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第35の実施形態の第1の態様に関して先に規定されたとおりである。


【0202】

第35の実施形態の第3の態様において、 R^{705} が $C_1\sim 4$ ハロアルキルであり； R^{804} が、メチルまたはエチルでN置換される4~5単環式ヘテロシクリルである。第35の実施形態の構造式 (XXIV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第35の実施形態の第1の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0203】

第35の実施形態の第4の態様において、化合物が、以下の構造式

【化 2 2 4】



のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【0204】

第35の実施形態の第5の態様において、化合物が、以下の構造式

10


20

30

40

50

【化 2 2 5】




のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【0 2 0 5】

第36の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化 2 2 6】



によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。第36の実施形態の第1の態様において、 R^{706} が、H、ハロゲン、 $C_1\sim 4$ アルキルオキシ、 $-OH$ 、 $C_1\sim 4$ アルキル、 $C_1\sim 4$ ハロアルキル、 $C_1\sim 4$ ヒドロキシアルキル、または $C_1\sim 4$ ハロアルコキシであり； R^{805} および $R^{805'}$ が、それらが結合される窒素原子と一緒に、 $C_3\sim 12$ カルボシクリルで任意選択的に置換される4～13単環式ヘテロシクリルを形成し； R^{408} および $R^{408'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1\sim 4$ アルキル； $C_1\sim 4$ ハロアルキル； $C_1\sim 4$ ヒドロキシアルキル； $(C_1\sim 4)$ アルコキシ- $(C_1\sim 4)$ アルキル；アミノ- $(C_1\sim 4)$ アルキル；モノ-またはジ- $(C_1\sim 4)$ アルキル)アミノ- $(C_1\sim 4)$ アルキル； $C_3\sim 12$ カルボシクリル- $(C_0\sim 3)$ アルキレニル（カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される）； $(C_1\sim 4)$ アルキル) $C(O)-$ 、 $(C_1\sim 4)$ アルキル) $S(O)_{1\sim 2}-$ ； $(C_1\sim 4)$ アルキル) $C(O)NH(C_1\sim 4)$ アルキレニル-； $(C_1\sim 4)$ アルキル) $S(O)_{1\sim 2}NH(C_1\sim 4)$ アルキレニル-； $HOC(O)-$ ； $H_2NC(O)-$ ； $(C_1\sim 4)$ アルキルオキシ) $C(O)-$ ； $(C_1\sim 4)$ アルキレニルである。

【0 2 0 6】

第36の実施形態の第2の態様において、 R^{706} がハロゲンであり、 R^{805} および $R^{805'}$ が、それらが結合される窒素原子と一緒に、フェニルで任意選択的に置換される5～6単環式ヘテロシクリルを形成する。第36の実施形態の構造式(XXV)中の残りの値、および変数の値の例は、第36の実施形態の第1の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0 2 0 7】

第36の実施形態の化合物の例として、以下の構造式：

10


20

30

40

50

【化 2 2 7】



10


20

のいずれか 1 つによって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩が挙げられる。

【 0 2 0 8】

第 3 7 の実施形態において、本発明は、構造式 (X I I I)

【化 2 2 8】



30






によって表される任意の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物である。第 3 7 の実施形態の第 1 の態様において、以下のとおりである。

【 0 2 0 9】

40

50

【表 17】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S8-7-2			
S8-7-4			
S15-6-1			
S15-6-4			
S15-6-6			
S15-6-2			
S15-6-7			
S15-6-8			
S15-6-5			
S15-6-3			
S15-6-9			

【0210】

10

20

30

40

50

【表 18】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S15-6-10			
S2-9-6			
S2-9-5			
S1-7-3			
S1-7-1			
S1-7-2			
S1-6-2			
S2-9-3			
S2-9-1			
S2-9-9			
S2-9-16			

【0211】

10




20

30

40

50

【表 19】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S2-9-7			
S2-9-10			
S2-9-8			
S2-9-13			
S2-9-14			
S2-9-11			
S2-9-15			
S2-9-18			
S2-9-19			
S2-9-20			

【0212】

10

20

30

40

50

【表 20】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S2-9-21			
S2-9-2			
S2-9-12			
S2-9-17			
S2-9-22			
S2-9-28			
S2-9-29			
S2-9-23			
S2-9-24			
S2-9-25			
S2-9-26			

【0213】

10

20

30

40

50

【表 2 1】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S2-9-4			
S2-9-27			
S1-5-9			
S1-6-1			
S1-5-1			
S1-5-2			
S1-5-8			
S1-5-4			
S1-5-6			
S1-5-5			
S1-5-3			

【0 2 1 4】

10

20

30

40

50

【表 2 2】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S1-5-7			
S1-5-14			
S1-5-15			
S1-5-18			
S1-5-17			
S1-5-16			
S1-5-10			
S1-5-12			
S1-5-11			
S1-5-13			
S4-7-1			

【0 2 1 5】

10

20

30

40

50

【表 2 3】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S4-7-3			
S4-7-4			
S4-7-5			
S4-7-6			
S4-7-2			
S3-7-1			
S3-7-2			
S9-5-1			
S9-5-2			
S9-5-3			
S9-5-4			

【0 2 1 6】

10


20

30

40

50

【表 2 4】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S10-5-1			
S10-5-2			
S10-5-3			
S10-5-4			
S8-7-1			
S8-7-7			
S8-7-5			
S8-7-8			
S8-7-9			
S8-7-3			
S8-7-6			

【0 2 1 7】

10







20

30

40

50

【表 2 5】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S8-7-10			
S8-7-11			
S7-6-1			
S7-6-2			
S7-6-6			
S7-6-4			
S7-6-7			
S7-6-8			
S7-6-3			
S7-6-5			
S7-6-9			

【0 2 1 8】

10

20

30

40

50

【表 2 6】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S7-6-10			
S6-6-1			
S6-6-2			
S6-6-6			
S6-6-7			
S6-6-3			
S6-6-8			
S6-6-5			
S6-6-4			
S6-6-9			
S6-6-10			

【0 2 1 9】

10

20

30

40

50

【表 2 7】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S11-4-1			
S11-4-2			
S11-5-1			 ジアステレオマー-A
S11-5-2			 ジアステレオマー-A
S12-2-1			
S12-2-2			
S12-2-3			
S12-2-4			
S14-6-1			
S14-6-3			
S14-6-5			

【 0 2 2 0 】

10

















20

30

40

50

【表 2 8】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S14-6-2			
S14-6-6			
S14-6-4			
S14-6-7			
S14-6-8			
S14-6-9			
S21-6-1			
S21-6-3			
S21-6-4			
S21-6-2			
S21-6-5			

【0 2 2 1】

10

20

30

40

50

【表 2 9】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S21-6-6			
S21-6-7			
S21-6-8			


10

【 0 2 2 2 】

第 38 の実施形態において、本発明は、血液癌を処置する方法であり、処置を必要とする対象に、構造式：

【化 2 2 9】

20



のいずれか1つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、以下のとおりである方法である。

【 0 2 2 3 】

【表 3 0】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{V8}	R ^{V8i}
K1			
K2			
K3			
K4 (化合物3A)			

40

50

【 0 2 2 4 】

【 表 3 1 】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
K5			
K6			
K7			
K8			
K9			
K10			
K11			
K12			
K13			
K14			
K15			
K16			

【 0 2 2 5 】

10

20

30

40

50

【表 3 2】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
K17			
K18			
K19			
K20			
K21			
K22			
K23			
K24			
K25			
K26			
K27			
K28			

【0 2 2 6】

10

















20

30

40

50

【表 3 3】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
K29			
K30			
K31			
K32			
K33			
K34			
K35			
K36			
K37			
K38			
K39			
K40			

【0 2 2 7】

10

20

30

40

50



【表 3 4】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
K41			
K42			

【0 2 2 8】


第 4 0 の実施形態において、本発明は、構造式 (X I V) もしくは (X V) :

【化 2 3 0】



のいずれか 1 つによって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩である。第 4 0 の実施形態の第 1 の態様において、環 E が、4 または 5 員カルボシクリルであり；環 F が、少なくとも 1 つの窒素原子を含む 5 または 6 員ヘテロシクリルであり；環 G が、以下の構造式

【化 2 3 1】



のいずれか 1 つによって表され、式中、

【化 2 3 2】

“~~~~~”

が、環 G の環 D への結合点を表し、

【化 2 3 3】

“-----”
“-----”

が、単結合または二重結合であり、 G^1 、 G^2 、および G^3 が、それぞれ独立して、原子価が許容するように、 $-CH=$ 、 $-CH_2-$ 、 $-N=$ 、または $-NH-$ であるが、

【化 2 3 4】

“-----”
“-----”

が単結合であるとき、 G^1 、 G^2 、および G^3 の少なくとも2つが $-NH-$ である場合に限り；

R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-OR^A$ 、 $-(C)(O)NR^B R^B$ 、 $NR^B R^B$ 、 $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_{3 \sim 12})$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリルから選択され；

R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、および $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $S(O)_{1 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_{3 \sim 12})$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-$
 $(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、および $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})-NR^D R^E$ から選択され；または

R^{41} および $R^{41'}$ 、ならびに別々に R^{42} および $R^{42'}$ が、それらが共通して結合される窒素原子と一緒にあって、N、O、およびSから独立して選択される1～2つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む4～8員環を形成し；

R^A の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_{3 \sim 12})$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_{3 \sim 12})$ カルボシクリル、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^B の各々および R^B の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ ハロアルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_{3 \sim 12})$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_{3 \sim 12})$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_{3 \sim 12})$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^C の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_{3 \sim 12})$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され；

R^D の各々および R^E の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_{3 \sim 12})$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され；

ここで、

R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^B$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；

R^A または R^C の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、1つ以上のフルオロで任意選択的にかつ独立して置換され；

10

20

30

40

50

環 E、F、および G、または R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} もしくは $R^{42'}$ のいずれかの任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、または R^{41} および $R^{41'}$ もしくは R^{42} および $R^{42'}$ を一緒にすることによって形成される任意の環が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_3 \sim 12 \text{ カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-NR^B R^B'$ 、および $S(O)_0 \sim 2 R^C$ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

環 F および G、または R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} もしくは $R^{42'}$ のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、または R^{41} および $R^{41'}$ もしくは R^{42} および $R^{42'}$ を一緒にすることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；


R^F の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ ハロアルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ ヒドロキシアルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_3 \sim 12 \text{ カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員ヘテロシクリル})$ 、 $-S(O)_1 \sim 2 (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-S(O)_1 \sim 2 -(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_3 \sim 12 \text{ カルボシクリル})$ 、 $-S(O)_1 \sim 2 -(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員ヘテロシクリル})$ 、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_3 \sim 12 \text{ カルボシクリル})$ 、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員ヘテロシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-C(O)_2-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-NR^B R^B'$ 、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^A 、 R^B 、 R^B' 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、または R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} もしくは $R^{42'}$ の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}$ 、 $-O-C_1 \sim C_4 \text{ フルオロアルキル}$ 、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})$ 、および $-N(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})_2$ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^A 、 R^B 、 R^B' 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、または R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} もしくは $R^{42'}$ の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}$ または $-S(O)_1 \sim 2 -(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})$ で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される。

【0229】

第 40 の実施形態の第 2 の態様において、環 E および環 F が、一緒に、以下の構造式：【化 235】



のいずれか 1 つによって表され、式中、 F^1 および F^2 が、各々の存在について独立して、 $-CH_2-$ または $-NR^0-$ から選択され、ここで、 R^0 が、各々の存在について独立して、 H または $C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}$ であり、

【化 236】

“~~~~~”

10

20

30

40

50

が、環 E の環 D への結合点を表す。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0230】

第 40 の実施形態の第 3 の態様において、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} もしくは $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、水素；ヒドロキシおよびハロから独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的に置換される $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ ； $-(C_3 \sim C_6 \text{ シクロアルキル})$ ； $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ ； $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキレニル}) - N(R^D)(R^E)$ ；ならびに $S(O)_1 \sim 2 R^C$ から選択され；または R^{41} および $R^{41'}$ もしくは R^{42} および $R^{42'}$ が、それらが共通して結合される窒素原子と一緒にあって、N、O、および S から独立して選択される 1 ~ 2 つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む 4 ~ 6 員環を形成し； R^C が $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ であり； R^D および R^E の各々が、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から独立して選択される。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 および第 2 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0231】

第 40 の実施形態の第 4 の態様において、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_3 \sim C_6 \text{ シクロアルキル})$ 、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキレニル}) - N(R^D)(R^E)$ 、および $S(O)_1 \sim 2 R^C$ から選択され； R^C が $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ であり； R^D および R^E の各々が、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から独立して選択される。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ~ 第 3 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0232】

第 40 の実施形態の第 5 の態様において、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、水素、メチル、エチル、プロピル、シクロプロピル、 $-C(O)CH_3$ 、 $-C(O)CH_2N(CH_3)_2$ 、および $-S(O)_2CH_3$ から選択される。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ~ 第 4 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0233】

第 40 の実施形態の第 6 の態様において、 R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、水素；ハロ；ヒドロキシル、ハロ、および $-NR^B R^B$ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的に置換される $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ ； $-NR^B R^B$ ； $-C(O)NR^B R^B$ 、 $-OR^A$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル}) - (C_3 \sim C_8 \text{ カルボシクリル})$ 、ならびに $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル}) - (4 \sim 8 \text{ 員})$ ヘテロシクリルから選択され、ここで、 R^A が、1 つ以上のフルオロで任意選択的に置換される $C_1 \sim C_6 \text{ アルキル}$ である。例えば、 R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、水素；ハロ；1 つ以上のハロで任意選択的に置換される $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ ；および $-OR^A$ から選択され、ここで、 R^A が、1 つ以上のフルオロで任意選択的に置換される $C_1 \sim C_6 \text{ アルキル}$ である。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ~ 第 5 の態様に関して先に規定されるとおりである。


【0234】

第 40 の実施形態の第 7 の態様において、 R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、水素、フルオロ、クロロ、 $-CF_3$ 、 $-OCH_3$ 、 $-OCF_3$ 、 $-N(CH_3)_2$ 、および $-NHCH_3$ から選択される。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ~ 第 7 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0235】

第 40 の実施形態の第 8 の態様において、環 E が、以下の構造式

【化 2 3 7】



によって表され、式中、

【化 2 3 8】

“ ”


10

の各々が、環 E の環 D への結合点を表す。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ～ 第 7 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0 2 3 6】

第 40 の実施形態の第 9 の態様において、環 E が、以下の構造式

【化 2 3 9】



20

によって表され、式中、

【化 2 4 0】

“ ”


の各々が、環 E の環 D への結合点を表す。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ～ 第 8 の態様に関して先に規定されるとおりである。

30

【0 2 3 7】

第 40 の実施形態の第 10 の態様において、環 F が、以下の構造式

【化 2 4 1】



40

のいずれか 1 つによって表され、式中、

【化 2 4 2】

“ ”

の各々が、環 F の環 E への結合点を表し、 R^0 が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルである。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ～ 第 9 の態様に関して先に規


50

定されるとおりである。

【0238】

第40の実施形態の第11の態様において、環Gが、以下の構造式

【化243】



のいずれか1つによって表され、式中、

【化244】



の各々が、環Gの環Dへの結合点を表し、 R^{00} が、各々の存在について独立して、Hまたは $C_1 \sim C_4$ アルキルである。第40の実施形態の構造式(XIV)および(XV)中の残りの値、および変数の値の例は、第40の実施形態の第1～第10の態様に関して先に規定されるとおりである。


【0239】

第40の実施形態の第12の態様において、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、Hまたは $C_1 \sim C_4$ アルキルであり； R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、Fまたは $-CF_3$ である。第40の実施形態の構造式(XIV)および(XV)中の残りの値、および変数の値の例は、第40の実施形態の第1～第11の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0240】

第40の実施形態の第13の態様において、環Eが、以下の構造式

【化245】




によって表され、式中、

【化246】



の各々が、環Eの環Dへの結合点を表し、環Fが、以下の構造式

【化247】



のいずれか1つによって表され、式中、

【化 2 4 8】

“2”


の各々が、環 F の環 E への結合点を表し、 R^0 が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり； R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり； R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、F または $-CF_3$ である。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ～ 第 12 の態様に関して先に規定されるとおりである。

10

【0 2 4 1】

第 40 の実施形態の第 14 の態様において、環 E が、以下の構造式

【化 2 4 9】



20


によって表され、式中、

【化 2 5 0】

“1”

の各々が、環 E の環 D への結合点を表し、環 F が、以下の構造式

【化 2 5 1】



30

のいずれか 1 つによって表され、式中、

【化 2 5 2】

“2”

の各々が、環 F の環 E への結合点を表し、 R^0 が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり； R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり； R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、F または $-CF_3$ である。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ～ 第 13 の態様に関して先に規定されるとおりである。


40

【0 2 4 2】

第 40 の実施形態の第 15 の態様において、環 G が、以下の構造式：

50

【化 2 5 3】



のいずれか 1 つによって表され、式中、

【化 2 5 4】




10

の各々が、環 G の環 D への結合点を表し； R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり； R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、F または $-CF_3$ である。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ～ 第 15 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0 2 4 3】

第 40 の実施形態の第 16 の態様において、化合物が、以下の構造式：


【化 2 5 5】



S5-9-7

S5-9-2, ジアステレオマー A および B


20



S5-9-3, ジアステレオマー A および B

S5-9-4, ジアステレオマー A および B

30




S5-9-5, ジアステレオマー A および B


40

50


【化 2 5 6】




S5-9-10, ジアステロマーAおよびB




S5-9-9, ジアステロマーAおよびB




S5-9-11, ジアステロマーAおよびB




S5-9-8, ジアステロマーB




S5-9-6, ジアステロマーAおよびB




S5-9-12, ジアステロマーAおよびB




S5-9-13, ジアステロマーAおよびB



S5-9-1, ジアステロマーAおよびB




S13-9-1, ジアステロマーAおよびB




S13-9-2, ジアステロマーAおよびB

【化 2 5 7】



S18-3-1



S18-3-2

10

20

30

40


50

のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であるか、または前述のもののいずれかの薬学的に許容できる塩である。

【0244】

第 40 の実施形態の第 17 の態様において、化合物が、以下の構造式

【化 258】



10

によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^{g1} 、 R^{n1} 、および R^{n2} が、それぞれ独立して、フェニルで任意選択的に置換される H または $C_1 \sim C_4$ アルキルである。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ～ 第 15 の態様に関して先に規定されたとおりである。

【0245】

第 40 の実施形態の第 18 の態様において、化合物は、以下の構造式：


20

30

40

50

【化 2 5 9】



のいずれか1つによって表されるか、または前述のもののいずれかの薬学的に許容できる塩である。

【0 2 4 6】

第40の実施形態の第19の態様において、化合物が、以下の構造式


10

20

30

40

【化 2 6 0】




によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^{g2} 、 R^{n3} 、および R^{n4} が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルである。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ～ 第 15 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0 2 4 7】

第 40 の実施形態の第 20 の態様において、化合物が、以下の構造式：

【化 2 6 1】




のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である。

【0 2 4 8】

第 40 の実施形態の第 21 の態様において、化合物が、以下の構造式

【化 2 6 2】




によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩であり、式中、 R^{n5} および R^{n6} が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルである。第 40 の実施形態の構造式 (XIV) および (XV) 中の残りの値、および変数の値の例は、第 40 の実施形態の第 1 ～ 第 15 の態様に関して先に規定されるとおりである。

【0 2 4 9】

第 40 の実施形態の第 22 の態様において、化合物が、以下の構造式：

【化 2 6 3】



のいずれか 1 つによって表されるか、または前述のもののいずれかの薬学的に許容できる塩である。

【0 2 5 0】

第41の実施形態において、本発明は、薬学的に許容できるキャリアまたは希釈剤、ならびに実施形態1～40、特に実施形態37～40、およびそれらの種々の態様に関して本明細書中に記載される任意の化合物の化合物を含む医薬組成物である。

【0251】

第42の実施形態において、本発明は、血液腫瘍を患う対象を処置する方法であって、対象に、実施形態1～40、およびそれらの種々の態様に関して本明細書中に記載される任意の化合物もしくはその薬学的に許容できる塩、または実施形態41の医薬組成物の治療的に有効な量を投与することを含む方法である。

【0252】

第42の実施形態の第1の態様において、血液癌は白血病である。白血病の例として、急性骨髄性白血病、急性リンパ芽球性白血病、慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、慢性骨髄単球性白血病、急性単球白血病が挙げられる。

10

【0253】

第42の実施形態の第2の態様において、白血病は急性骨髄性白血病である。

【0254】

第42の実施形態の第3の態様において、血液癌はリンパ腫である。リンパ腫の例として、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群または脊髄増殖性症候群、マントル細胞リンパ腫、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)、バーキットリンパ腫／白血病、およびB細胞リンパ腫が挙げられる。

【0255】

第42の実施形態の第4の態様において、方法は1つ以上のさらなる治療剤の投与を含む。さらなる治療剤の例として、シタラビン薬物およびアンスラサイクリン薬物が挙げられる。アンスラサイクリン薬物の例として、ダウノルビシンまたはイダルビシンが挙げられる。

20

【0256】

第42の実施形態の第5の態様において、方法は、クラドリビンの投与をさらに含む。

【0257】

第42の実施形態の種々の態様において、対象はヒトである。

【0258】

第43の実施形態において、本発明は、細菌感染の処置を、それを必要とする対象において行う(対象において感染またはコロニー形成を予防することを含む)方法であって、対象に、実施形態1～40、特に実施形態37～40、およびそれらの種々の態様に関して本明細書中に記載される任意の化合物、およびそれらの種々の態様に関して本明細書中に記載される任意の化合物もしくはその薬学的に許容できる塩、または実施形態41の医薬組成物の治療的に有効な量を投与することを含む方法である。

30

【0259】

第43の実施形態の第1の態様において、感染は、グラム陽性菌によって引き起こされる。グラム陽性菌の例として、バシラス(*Bacilli*)綱;アクチノバクテリア(*Actinobacteria*)門;およびクロストリジウム(*Clostridia*)綱から選択される生物が挙げられる。

40

【0260】

第43の実施形態の第2の態様において、感染は、グラム陰性菌によって引き起こされる。グラム陰性菌の例として、腸内細菌(*Enterobacteriaceae*)科、バクテロイデス(*Bacteroidetes*)門、ビブリオ(*Vibrionaceae*)科、パストレラ(*Pasteurellaceae*)科、シュドモナス(*Pseudomonadaceae*)科、ナイセリア(*Neisseriaceae*)科、リケッチア(*Rickettsiae*)属、モラクセラ(*Moraxellaceae*)科、プロテアエ(*Proteaeae*)族のあらゆる種、アシネトバクター(*Acinetobacter*)属種、ヘリコバクター(*Helicobacter*)属種、およびカンピロバクター(*Campylobacter*)属種からなる群から選択される生物が挙げられる。

50

【0261】

第43の実施形態の第3の態様において、感染は、リケッチア (*Rickettsiales*) 目およびクラミジア (*Chlamydiales*) 目から選択される生物によって引き起こされる。

【0262】

第43の実施形態の第4の態様において、感染は、クラミジア (*Chlamydiae*) 門およびスピロヘータ門 (*Spirochaetes*) 門から選択される生物によって引き起こされる。

【0263】

第43の実施形態の第5の態様において、感染は、モリクト (*Molluscites*) 綱から選択される生物によって引き起こされる。

10

【0264】

第43の実施形態の第6の態様において、感染は、複数の生物によって引き起こされる。

【0265】

第43の実施形態の第7の態様において、感染は、複数の抗生物質に対して耐性を示す生物によって引き起こされる。

【0266】

第43の実施形態の第8の態様において、感染は、グラム陽性菌によって引き起こされ、グラム陽性菌は、黄色ブドウ球菌 (*S. aureus*)、*C. NS*、肺炎球菌 (*S. pneumoniae*)、化膿連鎖球菌 (*S. pyogenes*)、*S. アガラクティアエ* (*S. agalactiae*)、*E. フェカーリス* (*E. faecalis*)、および *E. フェシウム* (*E. faecium*) から選択される。

20

【0267】

第43の実施形態の第9の態様において、感染は、グラム陰性菌によって引き起こされ、グラム陰性菌は、インフルエンザ菌 (*H. influenzae*)、*M. カタラーリス* (*M. catarrhalis*)、およびレジオネラ・ニューモフィラ (*Legionella pneumophila*) から選択される。

【0268】

定義

「アルキル」は、指定数の炭素原子を有する任意選択的に置換される飽和脂肪族の分枝状または直鎖状の一価炭化水素基を意味する。したがって、「($C_1 \sim C_6$) アルキル」は、直鎖状または分枝状の配置で1~6つの炭素原子を有する基を意味する。「($C_1 \sim C_6$) アルキル」には、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチルおよびヘキシルが含まれる。「($C_1 \sim C_{12}$) アルキル」として、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、およびドデシルが挙げられる。特に明記しない限り、「置換アルキル」に適した置換基として、ハロゲン、 $-OH$ 、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、フルオロ置換 $-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4$ アルキル)、 $-N(C_1 \sim C_4$ アルキル) $_2$ 、 $C_3 \sim C_{12}$ カルボシクリル (例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、フェニル、またはナフタレニル)、(4~13員) ヘテロシクリル (例えば、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、またはモルホリン)、または $-N(R^X)(R^X)$ が挙げられ、式中、 R^X および R^X が、独立して、水素もしくは $C_1 \sim C_4$ アルキルであり、またはそれらが結合される窒素原子と一緒に、 N 、 S 、および O から選択される1つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む (4~7員) 複素環を形成し、(4~7員) 複素環が、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、フルオロ置換 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-C_1 \sim C_4$ アルキル、または $-C_0 \sim C_4$ アルキレン $-O-C_1 \sim C_4$ アルキルで任意選択的に置換され、かつ任意選択的にベンゾ縮合される。

30

40

【0269】

環系を指すときの「ベンゾ縮合される」は、フェニル環に縮合されて、縮合二環が形成


50

されることを意味する。

【0270】


「アルキレン」または「アルキレニル」（互換的に用いられる）は、指定数の炭素原子を有する任意選択的に置換される飽和脂肪族の分枝状または直鎖状の二価炭化水素ラジカルを意味する。アルキレン基のアルキル部分は、より大きい部分の一部、例えばアルコキシ、アルキルアンモニウムであり得る。したがって、「 $(C_1 \sim C_6)$ アルキレン」は、直鎖状の配置で1～6つの炭素原子を有する二価の飽和脂肪族ラジカル、例えば、 $-(CH_2)_n-$ を意味し、式中、 n は1～6の整数である。「 $(C_1 \sim C_6)$ アルキレン」として、メチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ペンチレン、およびヘキシレンが挙げられる。あるいは、「 $(C_1 \sim C_6)$ アルキレン」は、分枝状の配置で1～6つの炭素原子を有する二価の飽和ラジカル、例えば： $-(CH_2CH_2CH_2CH_2CH(CH_3))-$ 、 $-(CH_2CH_2CH_2CH_2C(CH_3)_2)-$ 、 $-(CH_2C(CH_3)_2CH(CH_3))-$ などを意味する。「 $(C_1 \sim C_{12})$ アルキレン」として、メチル、エチル、 n -プロピル、イソプロピル、 n -ブチル、 sec -ブチル、 $tert$ -ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、またはオクチルが挙げられる。具体的な分枝状の C_3 -アルキレンとして、

【化264】



があり、具体的な C_4 -アルキレンとして、

【化265】



がある。二価 $C_1 \sim 6$ アルキル基の他の例として、メチレン基、エチレン基、エチリデン基、 n -プロピレン基、イソプロピレン基、イソブチレン基、 s -ブチレン基、 n -ブチレン基、および $tert$ -ブチレン基が挙げられる。

【0271】

「 C_0 アルキレニル」は、共有結合である。

【0272】

「アルコキシ」は、酸素連結原子を介して結合されたアルキルラジカルを意味する。「 $(C_1 \sim C_4)$ -アルコキシ」として、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、およびブトキシが挙げられる。

【0273】

「アルキルチオ」は、硫黄連結原子を介して結合されたアルキルラジカルを意味する。「 $(C_1 \sim C_4)$ アルキルチオ」として、メチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ、およびブチルチオが挙げられる。

【0274】

「アルキルスルフィニル」は、 $-S(O)-$ 連結基を介して結合されたアルキルラジカルを意味する。「 $(C_1 \sim C_4)$ アルキルスルフィニル」として、メチルスルフィニル、エチルスルフィニル、プロピルスルフィニル、およびブチルスルフィニルが挙げられる。

【0275】

「アルキルスルホニル」は、 $-S(O)_2-$ 連結基を介して結合されたアルキルラジカ

ルを意味する。「(C₁~C₄) アルキルスルホニル」として、メチルスルホニル、エチルスルホニル、プロピルスルホニル、およびブチルスルホニルが挙げられる。

【0276】

「アリール」または「芳香族」は、芳香族の6~18員単環式または多環式（例えば、二環式または三環式）炭素環系を意味する。一実施形態において、「アリール」は、6~18員の単環系または二環系である。アリール系には、以下に限定はされないが、フェニル、ナフタレニル、フルオレニル、インデニル、アズレニル、およびアントラセニルが含まれる。

【0277】

「アリールオキシ」は、酸素連結原子を介して結合されたアリール部分を意味する。アリールオキシとして、以下に限定されないが、フェノキシが挙げられる。

【0278】

「アリールチオ」は、硫黄連結原子を介して結合されたアリール部分を意味する。アリールチオとして、以下に限定されないが、フェニルチオが挙げられる。

【0279】

「アリールスルフィニル」は、-S(O)-連結基を介して結合されたアリール部分を意味する。アリールスルフィニルとして、以下に限定されないが、フェニルスルフィニルが挙げられる。

【0280】

「アリールスルホニル」は、-S(O)₂-連結基を介して結合されたアリール部分を意味する。アリールスルホニルとして、以下に限定されないが、フェニルスルホニルが挙げられる。

【0281】

「アミン」はH₂N-を意味し、アミニウム基H₃N⁺を指すのに用いられ得る。

【0282】

用語「アルキルアミン」は、モノー、ジアルキルアミンを含み、アミニウム（正電荷を帯びている）を指すのに用いられ得る。「モノアルキルアミン」は、H（アルキル）N-を意味し、「ジアルキルアミン」は、（アルキル）（アルキル）N-を意味し、「アミニウム」は、（アルキル）（アルキル）（アルキル）N⁺、H（アルキル）（アルキル）N⁺、またはH₂（アルキル）N⁺を意味し、ここで、「アルキル」の各々の例が、独立して、指定数の原子を有するアルキルを指す。

【0283】

「カルボシクリル」は、指定数の原子を有する環状の基を意味し、ここで、残りの化合物に結合される環（「第1の環」としても知られている）中の全ての環原子が炭素原子である。「カルボシクリル」の例として、3~18（例えば、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、1、14、15、16、17もしくは17、またはそれらの中の任意の範囲、例えば3~12もしくは3~10）員の飽和または不飽和の脂肪族環状炭化水素環、または6~18員のアリール環が挙げられる。カルボシクリル部分は、単環式、縮合二環式、架橋二環式、スピロ二環式、または多環式であり得る。

【0284】

「シクロアルキル」は、完全飽和カルボシクリルの例である。

【0285】

単環式カルボシクリルは、指定数の炭素原子、例えば3~7つの炭素原子を有する飽和または不飽和の脂肪族環状炭化水素環または芳香族炭化水素環である。単環式カルボシクリルとして、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シクロアルケニル、シクロアルキニル、およびフェニルが挙げられる。

【0286】

縮合二環式カルボシクリルは、2つの隣接する環原子を共有する2つの環を有し、例えば、（6~13員）縮合二環であり得る。親分子群に結合される第1の環は、単環式カルボシクリルであり、第1の環に縮合される環（「第2の環」としても知られている）も単

10

20

30

40

50

環式カルボシクリルである。

【0287】

架橋二環式カルボシクリルは、3つ以上の隣接する環原子を共有する2つの環を有し、例えば、(4～13員)架橋二環または(6～13員)架橋三環、例えばアダマンチルであり得る。親分子群に結合される第1の環は、単環式カルボシクリルであり、第2の環も単環式カルボシクリルである。

【0288】

スピロ二環式カルボシクリルは、1つの環原子のみを共有する2つの環を有し、例えば、(6～13員)スピロ二環であり得る。親分子群に結合される第1の環は、単環式カルボシクリルであり、第2の環も単環式カルボシクリルである。

【0289】

多環式カルボシクリルは、3つ以上の環（例えば、三環系をもたらす3つの環）を有し、隣接する環は、少なくとも1つの環原子を共有する。第1の環は、単環式カルボシクリルであり、環構造の残りが、単環式カルボシクリルである。多環系には、縮合環系、架橋環系およびスピロ環系が含まれる。縮合多環系は、2つの隣接する環原子を共有する少なくとも2つの環を有する。スピロ多環系は、1つのみの環原子を共有する少なくとも2つの環を有する。架橋多環系は、3つ以上の隣接する環原子を共有する少なくとも2つの環を有する。

【0290】

「置換カルボシクリル」に適した置換基として、以下に限定されないが、ハロゲン、 $-OH$ 、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、フルオロ置換 $-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_3 \sim C_{18}$ カルボシクリル（例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル）フェニル、ナフタレニル、(4～13員)ヘテロシクリル（例えば、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、またはモルホリン）、または $-N(R^X)(R^Y)$ が挙げられ、式中、 R^X および R^Y は、先に記載されるとおりである。

【0291】

「シクロアルコキシ」は、酸素連結原子を介して結合されたシクロアルキルラジカルを意味する。「(C₃～C₆)シクロアルコキシ」として、シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、シクロペンチルオキシ、およびシクロヘキシルオキシが挙げられる。

【0292】

「シクロアルケン」は、環中に1つ以上の二重結合を有する脂肪族環状炭化水素環を意味する。

【0293】

「シクロアルキン」は、環中に1つ以上の三重結合を有する脂肪族環状炭化水素環を意味する。

【0294】

「ヘテロ」は、環系における少なくとも1つの炭素原子員が、N、S、およびOから選択される少なくとも1つのヘテロ原子で置換されていることを指す。「ヘテロ」は、非環系における少なくとも1つの炭素原子員の置換も指す。1つのヘテロ原子がSである場合、それは任意選択的に一酸素化状態または二酸素化状態であり得る（すなわち $-S(O)-$ または $-S(O)_2-$ ）。ヘテロ環系またはヘテロ非環系は、ヘテロ原子で置換された1つ、2つ、3つまたは4つの炭素原子を有し得る。

【0295】

「ヘテロシクリル」は、N、O、およびSから独立して選択される1つ、2つ、3つ、4つ、または5つのヘテロ原子を含有する環状の3～18員、例えば3～13、3～15、5～18、5～12、3～12、5～6、または5～7員の飽和または不飽和の脂肪族環系または芳香環系を意味する。1つのヘテロ原子がSであるとき、それは任意選択的に一酸素化状態または二酸素化状態であり得る（すなわち、 $-S(O)-$ または $-S(O)_2-$ ）。ヘテロシクリルは、単環式、縮合二環式、架橋二環式、スピロ二環式、または多

10

20

30

40

50

環式であり得る。非限定的な例として、(4～7員)単環式、(6～13員)縮合二環式、(6～13員)架橋二環式、または(6～13員)スピロ二環式が挙げられる。

【0296】

「飽和ヘテロシクリル」は、いかなる程度の不飽和も含まない(すなわち、二重結合または三重結合がない)脂肪族ヘテロシクリル基を意味する。飽和ヘテロシクリルは、単環式、縮合二環式、架橋二環式、スピロ二環式または多環式であり得る。

【0297】

単環式飽和ヘテロシクリルの例には、以下に限定はされないが、アゼチジン、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、アゼパン、ヘキサヒドロピリミジン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、モルホリン、チオモルホリン、チオモルホリン1,1-ジオキシド、テトラヒドロ-2H-1,2-チアジン、テトラヒドロ-2H-1,2-チアジン1,1-ジオキシド、イソチアゾリジン、イソチアゾリジン1,1-ジオキシドが含まれる。

【0298】

「ヘテロシクリル」のタイプは「ヘテロアリール」または「芳香族複素環」であり、これは、5～18員の一価の複素環式芳香族の単環ラジカルまたは二環ラジカルを指す。ヘテロアリールは、N、O、およびSから独立して選択される1つ、2つ、3つ、または4つのヘテロ原子を含有する。

【0299】

縮合二環式ヘテロシクリルは、2つの隣接する環原子を共有する2つの環を有する。第1の環は、単環式ヘテロシクリルであり、第2の環は、単環式炭素環または単環式ヘテロシクリルである。例えば、第2の環は、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチルおよびシクロヘキシルなどの(C₃～C₆)シクロアルキルである。縮合二環式ヘテロシクリルの例には、以下に限定はされないが、オクタヒドロシクロペンタ[c]ピロリル、インドリン、イソインドリン、2,3-ジヒドロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール、2,3-ジヒドロベンゾ[d]オキサゾール、2,3-ジヒドロベンゾ[d]チアゾール、オクタヒドロベンゾ[d]オキサゾール、オクタヒドロ-1H-ベンゾ[d]イミダゾール、オクタヒドロベンゾ[d]チアゾール、オクタヒドロシクロペンタ[c]ピロール、3-アザビシクロ[3.1.0]ヘキサン、および3-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタンが含まれる。

【0300】

スピロ二環式ヘテロシクリルは、1つのみの環原子を共有する2つの環を有する。第1の環は、単環式ヘテロシクリルであり、第2の環は、単環式炭素環または単環式ヘテロシクリルである。例えば、第2の環は、(C₃～C₆)シクロアルキルである。スピロ二環式ヘテロシクリルの例には、以下に限定はされないが、アザスピロ[4.4]ノナン、7-アザスピロ[4.4]ノナン、アザスピロ[4.5]デカン、8-アザスピロ[4.5]デカン、アザスピロ[5.5]ウンデカン、3-アザスピロ[5.5]ウンデカンおよび3,9-ジアザスピロ[5.5]ウンデカンが含まれる。

【0301】

架橋二環式ヘテロシクリルは、3つ以上の隣接する環原子を共有する2つの環を有する。第1の環は、単環式ヘテロシクリルであり、他方の環は、単環式炭素環または単環式ヘテロシクリルである。架橋二環式ヘテロシクリルの例には、以下に限定はされないが、アザビシクロ[3.3.1]ノナン、3-アザビシクロ[3.3.1]ノナン、アザビシクロ[3.2.1]オクタン、3-アザビシクロ[3.2.1]オクタン、6-アザビシクロ[3.2.1]オクタンおよびアザビシクロ[2.2.2]オクタン、2-アザビシクロ[2.2.2]オクタンが含まれる。

【0302】

多環式ヘテロシクリルは、3つ以上の環を有し、第1の環は、ヘテロシクリル(例えば、三環系をもたらす3つの環)であり得、隣接する環は、少なくとも1つの環原子を共有し、ヘテロシクリルまたはカルボシクリルである。多環系には、縮合環系、架橋環系およびスピロ環系が含まれる。縮合多環系は、2つの隣接する環原子を共有する少なくとも2

10

20


30

40

50

つの環を有する。スピロ多環系は、1つのみの環原子を共有する少なくとも2つの環を有する。架橋多環系は、3つ以上の隣接する環原子を共有する少なくとも2つの環を有する。多環式ヘテロシクリルの例には、以下のものが含まれる。

【化266】



10

【0303】

「ヘテロアリール」または「複素芳香環」は、5～18員の一価の複素環式芳香族単環基または二環基を意味する。ヘテロアリールは、N、O、およびSから独立して選択される1つ、2つ、3つまたは4つのヘテロ原子を含有する。ヘテロアリールには、以下に限定はされないが、フラン、オキサゾール、チオフェン、1,2,3-トリアゾール、1,2,4-トリアジン、1,2,4-トリアゾール、1,2,5-チアジアゾール、1,1-ジオキシド、1,2,5-チアジアゾール-1-オキシド、1,2,5-チアジアゾール、1,3,4-オキサジアゾール、1,3,4-チアジアゾール、1,3,5-トリアジン、イミダゾール、イソチアゾール、イソオキサゾール、ピラゾール、ピリダジン、ピリジン、ピリジン-N-オキシド、ピラジン、ピリミジン、ピロール、テトラゾール、およびチアゾールが含まれる。二環式ヘテロアリール環には、以下に限定はされないが、インドリジン、インドール、イソインドール、インダゾール、ベンズイミダゾール、ベンズチアゾール、プリン、キノリン、イソキノリン、シンノリン、フタラジン、キナゾリン、キノキサリン、1,8-ナフチリジン、およびプテリジンなどの、ビシクロ[4.4.0]およびビシクロ[4.3.0]縮合環系が含まれる。

20

【0304】

「ハロゲン」および「ハロ」は、本明細書中で互換的に用いられ、フッ素、塩素、臭素、またはヨウ素を指す。

30

【0305】

「ハロアルキル」および「ハロシクロアルキル」として、モノ、ポリ、およびパーハロアルキル基が挙げられ、ハロゲンの各々が、フッ素、塩素、および臭素から独立して選択される。

【0306】

「フルオロ」は、-Fを意味する。

【0307】

「クロロ」は、-Clを意味する。

【0308】

本明細書中で用いられる「フルオロ置換アルキル」または「フルオロアルキル」は、指定数の原子を有し、かつ1つ以上の-F基で置換されたアルキルを意味する。フルオロ置換アルキルの例として、以下に限定はされないが、-CF₃、-CH₂CF₃、-CH₂CF₂H、-CH₂CH₂F、および-CH₂CH₂CF₃が挙げられる。

40

【0309】

本明細書中で用いられる「ヒドロキシアリール」は、1つ以上のヒドロキシルで置換されたアルキル基を指す。ヒドロキシアリールとして、モノ、ポリ、およびパーヒドロキシアリール基が挙げられる。ヒドロキシアリールの例として、-CH₂CH₂OHおよび-CH₂CH(OH)CH₂OHが挙げられる。

【0310】

「オキシ」は、=Oで置換されたものを意味する。

50

【0311】

本明細書に記載される際、本発明の化合物は、「任意選択的に置換される」部分を含有し得る。一般に、「置換される」という用語は、「任意選択的に」という用語が前にあるか否かにかかわらず、指定された部分の1つ以上の水素が好適な置換基で置換されることを意味する。特に示されない限り、「任意選択的に置換される」基は、基の各置換可能な位置における好適な置換基を有し得、所与の構造中の2つ以上の位置が、特定の基から選択される2つ以上の置換基で置換され得る場合、置換基は、全ての位置で同じであるかまたは異なり得る。本発明によって想定される置換基の組合せは、好ましくは、安定したまたは化学的に実現可能な化合物を形成するものである。本明細書において使用される際の「安定した」という用語は、化合物の生成、検出、および特定の実施形態において、それらの回収、精製、および本明細書に開示される目的の1つ以上のための使用を可能にする条件に曝されるときに実質的に変化されない化合物を指す。

10

【0312】

以下の段落において、「Ph」はフェニルである。

【0313】

「任意選択的に置換される」基の置換可能な炭素原子における好適な一価の置換基は、独立して、ハロゲン； $-(CH_2)_{0\sim4}R^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}OR^\circ$ ； $-O(CH_2)_{0\sim4}R^\circ$ 、 $-O-(CH_2)_{0\sim4}C(O)OR^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}CH(OR^\circ)_2$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}SR^\circ$ ； R° で置換され得る $-(CH_2)_{0\sim4}Ph$ ； R° で置換され得る $-(CH_2)_{0\sim4}O(CH_2)_{0\sim1}Ph$ ； R° で置換され得る $-CH=CHPh$ ； R° で置換され得る $-(CH_2)_{0\sim4}O(CH_2)_{0\sim1}$ -ピリジル； $-NO_2$ ； $-CN$ ； $-N_3$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}N(R^\circ)_2$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}N(R^\circ)C(O)R^\circ$ ； $-N(R^\circ)C(S)R^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}N(R^\circ)C(O)NR^\circ_2$ ； $-N(R^\circ)C(S)NR^\circ_2$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}N(R^\circ)C(O)OR^\circ$ ； $-N(R^\circ)N(R^\circ)C(O)R^\circ$ ； $-N(R^\circ)N(R^\circ)C(O)NR^\circ_2$ ； $-N(R^\circ)N(R^\circ)C(O)OR^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}C(O)R^\circ$ ； $-C(S)R^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}C(O)OR^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}C(O)SR^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}C(O)OSiR^\circ_3$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}OC(O)R^\circ$ ； $-OC(O)(CH_2)_{0\sim4}SR-$ 、 $SC(S)SR^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}SC(O)R^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}C(O)NR^\circ_2$ ； $-C(S)NR^\circ_2$ ； $-C(S)SR^\circ$ ； $-SC(S)SR^\circ$ 、 $-(CH_2)_{0\sim4}OC(O)NR^\circ_2$ ； $-C(O)N(OR^\circ)R^\circ$ ； $-C(O)C(O)R^\circ$ ； $-C(O)CH_2C(O)R^\circ$ ； $-C(NOR^\circ)R^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}SSR^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}S(O)_2R^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}S(O)_2OR^\circ$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}OS(O)_2R^\circ$ ； $-S(O)_2NR^\circ_2$ ； $-(CH_2)_{0\sim4}S(O)R^\circ$ ； $-N(R^\circ)S(O)_2NR^\circ_2$ ； $-N(R^\circ)S(O)_2R^\circ$ ； $-N(OR^\circ)R^\circ$ ； $-C(NH)NR^\circ_2$ ； $-P(O)_2R^\circ$ ； $-P(O)R^\circ_2$ ； $-OP(O)R^\circ_2$ ； $-OP(O)(OR^\circ)_2$ ； SiR°_3 ； $-(C_{1\sim4}$ の直鎖状または分枝状アルキレン) $-N(R^\circ)_2$ ；または $-(C_{1\sim4}$ の直鎖状または分枝状アルキレン) $C(O)O-N(R^\circ)_2$ であり、ここで、各 R° が、以下に規定されるように置換され得、独立して、水素、 $C_{1\sim6}$ 脂肪族、 $-CH_2Ph$ 、 $-O(CH_2)_{0\sim1}Ph$ 、 $-CH_2-$ (5～6員ヘテロアリール環)、または5～6員の飽和、部分的に不飽和の、または窒素、酸素、または硫黄から独立して選択される0～4つのヘテロ原子を有するアリール環であり、または上記の定義にかかわらず、 R° の2つの独立した出現が、それらの介在原子と一緒に、以下に定義されるように置換され得る、3～12員の飽和、部分的に不飽和の、または窒素、酸素、または硫黄から独立して選択される0～4つのヘテロ原子を有するアリール単環または二環を形成する。

20

30

40

【0314】

R° （または R° の2つの独立した出現をそれらの介在原子と合わせることによって形成される環）における好適な一価の置換基は、独立して、ハロゲン、 $-(CH_2)_{0\sim2}R^\bullet$ 、 $-(ハロR^\bullet)$ 、 $-(CH_2)_{0\sim2}OH$ 、 $-(CH_2)_{0\sim2}OR^\bullet$ 、 $-(CH_2)_0$

50

$\sim_2 \text{CH}(\text{OR}^\bullet)_2$; $-\text{O}(\text{ハ口R}^\bullet)$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{N}_3$ 、 $-(\text{CH}_2)_{0\sim 2}\text{C}(\text{O})\text{R}^\bullet$ 、 $-(\text{CH}_2)_{0\sim 2}\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-(\text{CH}_2)_{0\sim 2}\text{C}(\text{O})\text{OR}^\bullet$ 、 $-(\text{CH}_2)_{0\sim 2}\text{SR}^\bullet$ 、 $-(\text{CH}_2)_{0\sim 2}\text{SH}$ 、 $-(\text{CH}_2)_{0\sim 2}\text{NH}_2$ 、 $-(\text{CH}_2)_{0\sim 2}\text{NHR}^\bullet$ 、 $-(\text{CH}_2)_{0\sim 2}\text{NR}^\bullet_2$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{SiR}^\bullet_3$ 、 $-\text{OSiR}^\bullet_3$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{SR}^\bullet$ 、 $-(\text{C}_{1\sim 4}\text{の直鎖状または分枝状アルキレン})\text{C}(\text{O})\text{OR}^\bullet$ 、または $-\text{SSR}^\bullet$ であり、ここで、各 $\text{R}^\bullet$ が、非置換であるか、または「ハ口」が前にある場合、1つ以上のハ口ゲンのみで置換され、独立して、 $\text{C}_{1\sim 4}$ 脂肪族、 $-\text{CH}_2\text{Ph}$ 、 $-\text{O}(\text{CH}_2)_{0\sim 1}\text{Ph}$ 、または5～6員の飽和、部分的に不飽和の、または窒素、酸素、または硫黄から独立して選択される0～4つのヘテロ原子を有するアリール環から選択される。 R° の飽和炭素原子における好適な二価の置換基は、 $=\text{O}$ および $=\text{S}$ を含む。

10

【0315】

「任意選択的に置換される」基の飽和炭素原子における好適な二価の置換基には、以下のもの： $=\text{O}$ 、 $=\text{S}$ 、 $=\text{NNR}^*_2$ 、 $=\text{NNHC}(\text{O})\text{R}^*$ 、 $=\text{NNHC}(\text{O})\text{OR}^*$ 、 $=\text{NNHS}(\text{O})_2\text{R}^*$ 、 $=\text{NR}^*$ 、 $=\text{NOR}^*$ 、 $-\text{O}(\text{C}(\text{R}^*_2))_{2\sim 3}\text{O}-$ 、または $-\text{S}(\text{C}(\text{R}^*_2))_{2\sim 3}\text{S}-$ が含まれ、ここで、 R^* の各独立した出現が、水素、以下に定義されるように置換され得る $\text{C}_{1\sim 6}$ 脂肪族、または非置換の5～6員の飽和、部分的に不飽和の、または窒素、酸素、または硫黄から独立して選択される0～4つのヘテロ原子を有するアリール環から選択される。「任意選択的に置換される」基の隣接する置換可能な炭素に結合される好適な二価の置換基には、 $-\text{O}(\text{C}(\text{R}^*_2))_{2\sim 3}\text{O}-$ が含まれ、ここで、 R^* の各独立した出現が、水素、以下に定義されるように置換され得る $\text{C}_{1\sim 6}$ 脂肪族、または非置換の5～6員の飽和、部分的に不飽和の、または窒素、酸素、または硫黄から独立して選択される0～4つのヘテロ原子を有するアリール環から選択される。

20

【0316】

R^* の脂肪族基における好適な置換基には、ハ口ゲン、 $-\text{R}^\bullet$ 、 $-(\text{ハ口R}^\bullet)$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^\bullet$ 、 $-\text{O}(\text{ハ口R}^\bullet)$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^\bullet$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{NHR}^\bullet$ 、 $-\text{NR}^\bullet_2$ 、または $-\text{NO}_2$ が含まれ、ここで、各 $\text{R}^\bullet$ が、非置換であるか、または「ハ口」が前にある場合、1つ以上のハ口ゲンのみで置換され、独立して、 $\text{C}_{1\sim 4}$ 脂肪族、 $-\text{CH}_2\text{Ph}$ 、 $-\text{O}(\text{CH}_2)_{0\sim 1}\text{Ph}$ 、または5～6員の飽和、部分的に不飽和の、または窒素、酸素、または硫黄から独立して選択される0～4つのヘテロ原子を有するアリール環である。

30

【0317】

「任意選択的に置換される」基の置換可能な窒素における好適な置換基には、 $-\text{R}^\dagger$ 、 $-\text{NR}^\dagger_2$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{R}^\dagger$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^\dagger$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{C}(\text{O})\text{R}^\dagger$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{R}^\dagger$ 、 $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^\dagger$ 、 $-\text{S}(\text{O})_2\text{NR}^\dagger_2$ 、 $-\text{C}(\text{S})\text{NR}^\dagger_2$ 、 $-\text{C}(\text{NH})\text{NR}^\dagger_2$ 、または $-\text{N}(\text{R}^\dagger)\text{S}(\text{O})_2\text{R}^\dagger$ が含まれ；ここで、各 $\text{R}^\dagger$ が、独立して、水素、以下に定義されるように置換され得る $\text{C}_{1\sim 6}$ 脂肪族、非置換の $-\text{OPh}$ 、または非置換の5～6員の飽和、部分的に不飽和の、または窒素、酸素、または硫黄から独立して選択される0～4つのヘテロ原子を有するアリール環であり、または上記の定義にかかわらず、 $\text{R}^\dagger$ の2つの独立した出現が、それらの介在原子と一緒に、非置換の3～12員の飽和、部分的に不飽和の、または窒素、酸素、または硫黄から独立して選択される0～4つのヘテロ原子を有するアリール単環または二環を形成する。

40

【0318】

$\text{R}^\dagger$ の脂肪族基における好適な置換基は、独立して、ハ口ゲン、 $-\text{R}^\bullet$ 、 $-(\text{ハ口R}^\bullet)$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}^\bullet$ 、 $-\text{O}(\text{ハ口R}^\bullet)$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$ 、 $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^\bullet$ 、 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{NHR}^\bullet$ 、 $-\text{NR}^\bullet_2$ 、または $-\text{NO}_2$ であり、ここで、各 $\text{R}^\bullet$ が、非置換であるか、または「ハ口」が前にある場合、1つ以上のハ口ゲンのみで置換され、独立して、 $\text{C}_{1\sim 4}$ 脂肪族、 $-\text{CH}_2\text{Ph}$ 、 $-\text{O}(\text{CH}_2)_{0\sim 1}\text{Ph}$ 、または5～6員の飽和、部分的に不飽和の、または窒素、酸素、または硫黄から独立して選択される0～4つのヘテロ原子を有するアリール環である。

【0319】

50

本発明の別の実施形態は、1種以上の薬学的に許容できる担体および／または希釈剤と、本明細書に開示される化合物またはその薬学的に許容できる塩とを含む医薬組成物である。

【0320】

「薬学的に許容できる担体」および「薬学的に許容できる希釈剤」は、動物またはヒトに適切に投与されるとき、通常、有害反応を生じず、薬剤物質（すなわち、本発明の化合物）の媒体として用いられる、本発明の組成物の製剤に使用するのに十分な純度および品質を有する非治療的成分を意味する。

【0321】

本発明の化合物の薬学的に許容できる塩も含まれる。例えば、アミンまたは他の塩基性基を含む本発明の化合物の酸塩は、本化合物を好適な有機または無機酸と反応させ、薬学的に許容できる陰イオン塩形態をもたらすことによって得ることができる。陰イオン塩の例には、酢酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、安息香酸塩、重炭酸塩、重酒石酸塩、臭化物、エデト酸カルシウム、カンシル酸塩、炭酸塩、塩化物、クエン酸塩、二塩酸塩、エデト酸塩、エジシル酸塩、エストル酸塩（*estolate*）、エシル酸塩（*esylate*）、フマル酸塩、グルセプト酸塩、グルコン酸塩、グルタミン酸塩、グリコリルアルサニル酸塩（*glycollylarsanilate*）、ヘキシルレゾルシン酸塩、臭化水素酸塩、塩酸塩、ヒドロキシナフトエ酸塩、ヨウ化物、イセチオン酸塩、乳酸塩、ラクトビオン酸塩、リンゴ酸塩、マレイン酸塩、マンデル酸塩、メシル酸塩、硫酸メチル、ムチン酸塩（*mucate*）、ナプシル酸塩（*napsylate*）、硝酸塩、パモ酸塩、パントテン酸塩、リン酸塩／ニリン酸塩、ポリガラクトロン酸塩、サリチル酸塩、ステアリン酸塩、塩基性酢酸塩、コハク酸塩、硫酸塩、タンニン酸塩、酒石酸塩、テオクル酸塩、トシル酸塩、およびトリエチオジド（*triethiodide*）塩が含まれる。

【0322】

カルボン酸または他の酸性官能基を含む本発明の化合物の塩は、好適な塩基と反応させることによって調製することができる。このような薬学的に許容できる塩は、薬学的に許容できる陽イオンを与える塩基で作製され得、アルカリ金属塩（特にナトリウムおよびカリウム）、アルカリ土類金属塩（特にカルシウムおよびマグネシウム）、アルミニウム塩およびアンモニウム塩、ならびにトリメチルアミン、トリエチルアミン、モルホリン、ピリジン、ピペリジン、ピコリン、ジシクロヘキシルアミン、N, N'-ジベンジルエチレンジアミン、2-ヒドロキシエチルアミン、ビス（2-ヒドロキシエチル）アミン、トリ（2-ヒドロキシエチル）アミン、プロカイン、ジベンジルピペリジン、デヒドロアビエチルアミン、N, N'-ビスデヒドロアビエチルアミン、グルカミン、N-メチルグルカミン、コリジン、キニーネ、キノリン、ならびにリジンおよびアルギニンなどの塩基性アミノ酸などの生理学的に許容できる有機塩基から作製される塩を含む。

【0323】

本発明は、様々な異性体およびその混合物も含む。本発明の特定の化合物は、様々な立体異性体で存在し得る。立体異性体は、その空間配置のみが異なる化合物である。エナンチオマーは、最も一般的にはキラル中心として機能する非対称に置換された炭素原子を含有することにより、鏡像が重なり合わない立体異性体対である。「エナンチオマー」は、互いに鏡像であり、重なり合わない分子対の1つを意味する。ジアステレオマーは、最も一般的には2つ以上の非対称に置換された炭素原子を含有することにより、鏡像として関連しない立体異性体である。「R」および「S」は、1つ以上のキラル炭素原子の周りの置換基の配置を表す。キラル中心がRまたはSと定義されていないとき、純粋なエナンチオマーまたは両方の配置が混ざったもののいずれかが存在する。

【0324】

「ラセミ化合物」または「ラセミ混合物」は、等モル量の2つのエナンチオマーの化合物を意味し、このような混合物は、光学活性を示さない；すなわち、偏光面を回転しない。

【0325】

本発明の化合物は、異性体に特異的な合成により個々の異性体として調製されるか、ま

たは異性体混合物から分解され得る。従来の分解技術は、光学活性酸を用いて、異性体対の各異性体の遊離塩基の塩を形成し（その後、分別結晶化および遊離塩基の再生が続く）、光学活性アミンを用いて、異性体対の各異性体の酸形態の塩を形成し（その後、分別結晶化および遊離酸の再生が続く）、光学的に純粋な酸、アミンまたはアルコールを用いて、異性体対の異性体の各々のエステルまたはアミドを形成し（その後、クロマトグラフィー分離およびキラル補助基の除去が続く）、あるいは様々な周知のクロマトグラフィー法を用いて、出発材料または最終生成物のいずれかの異性体混合物を分解することを含む。


【0326】

開示される化合物の立体化学が、構造によって命名または表現されるとき、命名または表現される立体異性体は、他の立体異性体に対して、少なくとも約60重量%、約70重量%、約80重量%、約90重量%、約99重量%または約99.9重量%の純度である。単一のエナンチオマーが、構造によって命名または表現されるとき、命名または表現されるエナンチオマーは、少なくとも約60重量%、約70重量%、約80重量%、約90重量%、約99重量%または約99.9重量%光学的に純粋である。重量基準での光学純度パーセントは、存在するエナンチオマーの重量を、存在するエナンチオマーとその光学異性体の重量を合わせた重量で除算した比率である。

【0327】


「シス」は、同じ側を意味する。「トランス」は、反対側を意味する。「シス」という表記は、2つの置換基が、「上-上 (up-up)」または「下-下 (down-down)」の関係を有する場合に使用される。「トランス」という表記は、2つの置換基が、「上-下 (up-down)」または「下-上 (down-up)」の関係を有する場合に使用される。通常、互いに「シス」である2つの置換基は、分子の同じ側に配置される。「シス」という用語が、縮合、飽和または部分的に飽和した環系に関して使用される場合、この用語は、共通の環原子に結合される2つの原子がシス置換基であることを示すことが意図される。例えば、

【化267】



は、以下の構造式

【化268】



で表される部分のシスジアステレオマーである。

【0328】

本明細書中で用いられる用語「対象」は、処置または予防が必要な哺乳類、例えば、ヒト、ペット（例えば、イヌおよびネコ）、家畜（例えば、ウシ、ブタ、ウマ、ヒツジ、およびヤギ）、およびラボ動物（例えば、ラット、マウス、およびモルモット）を意味する。典型例として、対象は、特定の処置を必要とするヒトである。

【0329】

本明細書中で用いられる用語「処置すること」または「処置」は、所望の薬理学的効果および／または生理学的効果を得ることを指す。効果として、以下の結果の1つ以上を部分的に、または実質的に達成することが挙げられ得る：疾患、障害、または症候群の程度を部分的に、または全体として減輕すること；障害と関連した臨床の徴候または指標を改善し、または向上させること；疾患、障害、または症候群の進行の可能性を遅延させ、阻害し、または引き下げること。

【0330】

本明細書中で用いられる「予防すること」または「予防」は、疾患、障害、または症候群の発症または進行の可能性を引き下げることを指す。

【0331】

「有効量」は、対象において所望の生物反応を誘発する活性化合物剤の量を意味する。一実施形態において、本発明の化合物の有効量は、約0.01mg/kg/日から約1000mg/kg/日、約0.1mg/kg/日から約100mg/kg/日、または約0.5mg/kg/日から約50mg/kg/日である。

【0332】

本明細書中で用いられる用語「血液悪性腫瘍」および「血液癌」は、互換的に用いられ、血液の癌（白血病）またはリンパ系の癌（リンパ腫）を指す。白血病として、急性骨髄性白血病（AML）（急性骨髄性白血病、急性骨髄芽球性白血病、急性顆粒球性白血病、または急性非リンパ球性白血病としても知られている）、急性リンパ芽球性白血病（ALL）、慢性リンパ性白血病（CLL）、慢性骨髄性白血病（CML）、慢性骨髄単球性白血病（CMML）、急性単球白血病（AMoL）が挙げられ得る。リンパ腫として、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群または脊髄増殖性症候群、マンツル細胞リンパ腫、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫（DLBCL）、バーキットリンパ腫／白血病、およびB細胞リンパ腫が挙げられ得る。

【0333】

指標

血液悪性腫瘍は、血液系およびリンパ系を襲う癌である。血液悪性腫瘍の一部のタイプとして、多発性骨髄腫、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、および白血病が挙げられる。癌は、造血組織（例えば、骨髄）、または免疫系の細胞から始まり得る。例えば、白血病は、造血組織から始まる。白血病は、骨髄における血球、通常白血球の制御不能な増殖によって特徴付けられる。白血球は、体の免疫応答の基本的な構成要素である。白血病細胞は、正常な血液および骨髄細胞を押し退けて、これらに取って代わる。

【0334】

4つの主要なタイプの白血病：急性骨髄性白血病（AML）；慢性骨髄性白血病（CML）；急性リンパ性白血病（ALL）；および慢性リンパ性白血病（CLL）がある。4つの主要なタイプの白血病の主な差異は、進行速度および癌が発症する場所と関係がある。急性骨髄性白血病（AML）（急性骨髄性白血病、急性骨髄芽球性白血病、急性顆粒球性白血病または急性非リンパ球性白血病としても知られている）は、血液および骨髄の癌の増殖の早い形態である。AMLは、急性白血病の最も一般的なタイプである。これは、骨髄が芽球（依然として完全に成熟していない細胞）を形成し始めたときに起こる。これらの芽球は、通常、白血球に発達する。しかしながら、AMLにおいて、これらの細胞は、発達せず、伝染を防ぐことはできない。AMLにおいて、骨髄は、異常な赤血球および血小板も形成し得る。これらの異常な細胞の数は迅速に増大して、異常な（白血病）細胞は、体が必要とする正常な白血球、赤血球および血小板を押し退け始める。

【0335】

特定の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、血液癌の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、処置を必要とする対象に、式（I）、式（I'）、式（II）、式（II'）、式（III）、式（III'）、式（IV）、式（IV'）、式（V）、式（V'）、式（VI）、式（VI'）、式（VII）もしくは式（VII'）の化合物が挙げられる、本明細書中で開示されるいずれかの化合物、またはその薬学的に許容

10

20

30

40

50

できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。更なる実施形態において、本明細書中で提供されるのは、処置を必要とする対象において血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、式 (X)、(X-1)、(XI)、(XII)、(XX)、(XXI)、(XXII)、(XXIII)、(XXIV)、(XXV)、(XIIII)、(XIV)、または(XV)の化合物が挙げられる、本明細書中で開示されるいずれかの化合物の有効量を投与することを含む方法である。

【0336】

一態様において、血液癌は、急性骨髄性白血病、多発性骨髄腫、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、および白血病から選択される。

【0337】

特定の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、白血病の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、処置を必要とする対象に、式 (I)、式 (I')、式 (II)、式 (II')、式 (III)、式 (III')、式 (IV)、式 (IV')、式 (V)、式 (V')、式 (VI)、式 (VI')、式 (VII) もしくは式 (VII') の化合物が挙げられる、本明細書中で開示されるいずれかの化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。更なる実施形態において、本明細書中で提供されるのは、処置を必要とする対象において白血病を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、式 (X)、(X-1)、(XI)、(XII)、(XX)、(XXI)、(XXII)、(XXIII)、(XXIV)、(XXV)、(XIIII)、(XIV)、または(XV)の化合物が挙げられる、本明細書中で開示されるいずれかの化合物の有効量を投与することを含む方法である。

【0338】

一部の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、急性骨髄性白血病の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、式 (I)、式 (I')、式 (II)、式 (II')、式 (III)、式 (III')、式 (IV)、式 (IV')、式 (V)、式 (V')、式 (VI)、式 (VI')、式 (VII) もしくは式 (VII') の化合物が挙げられる、本明細書中で開示されるいずれかの化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。一部の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、急性骨髄性白血病の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、式 (X)、(X-1)、(XI)、(XII)、(XX)、(XXI)、(XXII)、(XXIII)、(XXIV)、(XXV)、(XIIII)、(XIV)、または(XV)の化合物が挙げられる、本明細書中で開示されるいずれかの化合物の有効量を投与することを含む方法である。

【0339】

特定の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、急性骨髄性白血病を処置する方法であって、対象に、式 (I)、式 (I') の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。この実施形態の一態様において、化合物は、本明細書中で規定される化合物 3、化合物 3 a、化合物 3 b、化合物 4、化合物 4 a、化合物 4 b、および化合物 5、またはそれらの薬学的に許容できる塩から選択される。特定の態様において、化合物は化合物 3 a である。

【0340】

特定の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、急性骨髄性白血病の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、式 (II)、式 (II') の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む。

【0341】

特定の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、急性骨髄性白血病の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、式 (III)、式 (III') の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。この実施形態の一態様において、化合物は、本明

10

20

30

40

50

細書中に記載される化合物 1 および化合物 2、またはそれらの薬学的に許容できる塩から選択される。

【0342】

特定の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、急性骨髄性白血病の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、式 (IV)、式 (IV') の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0343】

他の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、急性骨髄性白血病の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、式 (V)、式 (V') の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

10

【0344】

特定の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、急性骨髄性白血病の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、式 (VI)、式 (VI') の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

【0345】

特定の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、急性骨髄性白血病の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、対象に、式 (VII)、式 (VII') の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含む方法である。

20

【0346】

一部の実施形態において、式 (I) の化合物は、式 (Ia)、(Ia')、(Ib)、(Ib')、(Ic)、(Ic')、(Ic-1)、(Ic'-1)、(Id)、(Id')、(Ie)、および (Ie') から選択される化合物である。一部の実施形態において、式 (II) の化合物は、式 (IIa)、(IIa')、(IIa-1)、(IIa'-1)、(IIb)、(IIb')、(IIb-1)、(IIb'-1)、(IIb-2)、(IIb'-2)、(IIc)、(IIc')、(IIc-1)、(IIc'-1)、(IId)、および (IId') から選択される化合物である。一部の実施形態において、化合物は、式 (III)、式 (III')、式 (IV)、式 (IV')、式 (V)、式 (V')、式 (VI)、式 (VI')、式 (VII)、および式 (VII') から選択される。

30

【0347】

一部の実施形態において、本明細書中に記載される方法は、処置を必要とする対象に、化合物 1、化合物 2、化合物 3、化合物 3a、化合物 3b、化合物 4、化合物 4a、化合物 4b、および化合物 5 から選択される化合物の有効量を投与することを含む。

【0348】

特定の実施形態において、化合物は化合物 1 である。特定の実施形態において、化合物は化合物 2 である。特定の実施形態において、化合物は化合物 3a である。特定の実施形態において、化合物は化合物 4a である。特定の実施形態において、化合物は化合物 5 である。

40

【0349】

他の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、血液癌の処置のための医薬の製造における、式 (I)、式 (I')、式 (II)、式 (II')、式 (III)、式 (III')、式 (IV)、式 (IV')、式 (V)、式 (V')、式 (VI)、式 (VI')、式 (VII) もしくは式 (VII') の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量での使用である。一態様において、血液癌は、多発性骨髄腫、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、および白血病である。特定の態様において、血液癌は白血病である。より特定の態様において、白血病は急性骨髄性白血病である。先に記載される全ての化合物および式の実施形態が、これらの使用に意図される。

50

【0350】

他の実施形態において、本明細書中で提供されるのは、血液癌の処置のための、式(I)、式(I')、式(II)、式(II')、式(III)、式(III')、式(IV)、式(IV')、式(V)、式(V')、式(VI)、式(VI')、式(VII)、式(VII')、式(X)、式(X-1)、式(XI)、式(XII)、式(XX)、式(XXI)、式(XXII)、式(XXIII)、式(XXIV)、式(XXV)、式(XIII)、式(XIV)もしくは式(XV)の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量での使用である。一態様において、血液癌は、多発性骨髄腫、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、および白血病である。特定の態様において、血液癌は白血病である。より特定の態様において、白血病は急性骨髄性白血病である。

10

【0351】

先に記載される全ての化合物および式がこれらの使用に意図される。

【0352】

細菌感染

本発明の化合物、特に構造式XVもしくはXIVのいずれか1つによって表される化合物、または式XIIIもしくはXIIの化合物が、重要な哺乳類疾患および獣医学的疾患、例えば下痢、尿路感染症、皮膚および皮膚構造の感染症(創傷、蜂巣炎、および膿瘍が挙げられる)、耳、鼻、および喉の感染症、ならびに乳腺炎を予防または処置するのに用いられ得る。さらに、本発明のテトラサイクリン化合物を用いて膿瘍を治療するための方法も含まれる(van der Bozert et al., Cancer Res., 48:6686-6690(1988))。

20

【0353】

本発明の化合物またはその薬学的に許容できる塩を用いて治療可能な感染症には、以下に限定はされないが、皮膚感染症、胃腸感染症、尿路感染症、泌尿生殖器感染症、呼吸器感染症、鼻腔感染症、中耳炎、全身感染症、腹腔内感染症、腎盂腎炎、肺炎、細菌性膈炎、連鎖球菌性咽喉痛、慢性細菌性前立腺炎、婦人科感染症および骨盤内感染症、細菌性の性感染症、眼および耳の感染症、コレラ、インフルエンザ、気管支炎、にきび、乾癬、酒さ、膿疱疹、マラリヤ、梅毒および淋病を含む性感染症、レジオネラ症、ライム病、ロッキーマウンテン紅斑熱、Q熱、発疹チフス、腺ペスト、ガス壊疽、院内感染、レプトスピラ症、百日咳、鼠径リンパ肉芽腫に關与する薬剤により引き起こされる炭疽および感染症、封入体結膜炎、またはオウム病が含まれる。感染症は、細菌性、真菌性、寄生性およびウイルス性感染症(他のテトラサイクリン化合物に耐性があるものを含む)であり得る。

30

【0354】

一実施形態において、感染症は、呼吸器感染症である。特定の態様において、呼吸器感染症は、市中細菌性肺炎(CABP)である。より特定の実施形態において、呼吸器感染症、例えば、CABPは、黄色ブドウ球菌(*S. aureus*)、肺炎連鎖球菌(*S. pneumoniae*)、化膿連鎖球菌(*S. pyogenes*)、インフルエンザ菌(*H. influenza*)、M.カタラーリス(*M. catarrhalis*)およびレジオネラ・ニューモフィラ(*Legionella pneumophila*)から選択される細菌によって引き起こされる。

40

【0355】

別の実施形態において、感染症は、皮膚感染症である。特定の態様において、皮膚感染症は、急性細菌性皮膚および皮膚組織感染症(ABSSSI)である。より特定の実施形態において、皮膚感染症、例えばABSSSIは、黄色ブドウ球菌(*S. aureus*)、コアグラエゼ陰性ブドウ球菌(*C. coagulans*)、化膿連鎖球菌(*S. pyogenes*)、*S. アガラクタ*(*S. agalactiae*)、大便連鎖球菌(*E. faecalis*)およびフェシウム菌(*E. faecium*)から選択される細菌によって引き起こされる。

【0356】

50

一実施形態において、感染症は、細菌（例えば、嫌気性菌または好気性菌）によって引き起こされ得る。

【0357】

別の実施形態において、感染症は、グラム陽性菌によって引き起こされる。この実施形態の特定の態様において、感染症は、以下に限定はされないが、ブドウ球菌属 (*Staphylococcus* spp.)、連鎖球菌属 (*Streptococcus* spp.)、腸球菌属 (*Enterococcus* spp.)、バチルス属 (*Bacillus* spp.)、リステリア属 (*Listeria* spp.) を含むバチルス綱 (*Bacilli*)；以下に限定はされないが、プロピオニバクテリウム属 (*Propionibacterium* spp.)、コリネバクテリウム属 (*Corynebacterium* spp.)、ノカルジア属 (*Nocardia* spp.)、アクチノバクテリア属 (*Actinobacteria* spp.) を含むアクチノバクテリア門 (*Actinobacteria*)、および以下に限定はされないが、クロストリジウム属 (*Clostridium* spp.) を含むクロストリジウム綱 (*Clostridia*) から選択されるグラム陽性菌によって引き起こされる。

【0358】

別の実施形態において、感染症は、黄色ブドウ球菌 (*S. aureus*)、コアグラージェ陰性ブドウ球菌 (CONS)、肺炎連鎖球菌 (*S. pneumoniae*)、化膿連鎖球菌 (*S. pyogenes*)、*S. アガラクタ* (*S. agalactiae*)、大便連鎖球菌 (*E. faecalis*) およびフェシウム菌 (*E. faecium*) から選択されるグラム陽性菌によって引き起こされる。

【0359】

別の実施形態において、感染症は、グラム陰性菌によって引き起こされる。この実施形態の一態様において、感染症は、大腸菌 (*Escherichia coli*)、サルモネラ (*Salmonella*)、赤痢菌 (*Shigella*)、他の腸内細菌科 (*Enterobacteriaceae*)、シュードモナス (*Pseudomonas*)、モラクセラ (*Moraxella*)、ヘリコバクター (*Helicobacter*)、ステノトロフォモナス (*Stenotrophomonas*)、ブデロビブリオ (*Bdellovibrio*)、酢酸菌、レジオネラ (*Legionella*) またはボルバキア (*Wolbachia*) などのアルファプロテオバクテリアを含む、プロテオバクテリア門 (*Proteobacteria*) (例えば、ベータプロテオバクテリア (*Betaproteobacteria*) およびガンマプロテオバクテリア (*Gamma proteobacteria*)) によって引き起こされる。別の態様において、感染症は、シアノバクテリア、スピロヘータ、緑色硫黄細菌または緑色非硫黄細菌から選択されるグラム陰性菌によって引き起こされる。この実施形態の特定の態様において、感染症は、腸内細菌科 (*Enterobacteriaceae*) (例えば、広域スペクトルβ-ラクタマーゼおよび／またはカルバペネマーゼを含むものを含む、大腸菌 (*E. coli*)、肺炎桿菌 (*Klebsiella pneumoniae*))、バクテロイデス門 (*Bacteroidetes*) (例えば、バクテロイデス・フラギリス (*Bacteroides fragilis*))、ビブリオ科 (*Vibrionaceae*) (コレラ菌 (*Vibrio cholerae*))、パストツレラ科 (*Pasteurellaceae*) (例えば、インフルエンザ菌 (*Haemophilus influenzae*))、シュードモナス科 (*Pseudomonadaceae*) (例えば、緑膿菌 (*Pseudomonas aeruginosa*))、ナイセリア科 (*Neisseriaceae*) (例えば、髄膜炎菌 (*Neisseria meningitidis*))、リケッチア (*Rickettsiae*)、モラクセラ科 (*Moraxellaceae*) (例えば、モラクセラ・カタラーリス (*Moraxella catarrhalis*))、プロテアエ (*Proteaeae*) の任意の種、アシネトバクター属 (*Acinetobacter* spp.)、ヘリコバクター属 (*Helicobacter* spp.)、およびカンピロバクター属 (*Campylobacter* spp.) から選択されるグラム陰性菌によって引

き起こされる。特定の実施形態において、感染症は、腸内細菌科 (*Enterobacteriaceae*) (例えば、大腸菌 (*E. coli*)、肺炎桿菌 (*Klebsiella pneumoniae*))、シュードモナス (*Pseudomonas*)、およびアシネトバクテリウム属 (*Acinetobacter spp.*) からなる群から選択されるグラム陰性菌によって引き起こされる。別の実施形態において、感染症は、肺炎桿菌 (*K. pneumoniae*)、サルモネラ (*Salmonella*)、腸内連鎖球菌 (*E. hirae*)、*A. バウマニ* (*A. baumani*)、*M. カタラーリス* (*M. catarrhalis*)、インフルエンザ菌 (*H. influenzae*)、緑膿菌 (*P. aeruginosa*)、フェシウム菌 (*E. faecium*)、大腸菌 (*E. coli*)、黄色ブドウ球菌 (*S. aureus*)、および大便連鎖球菌 (*E. faecalis*) からなる群から選択される生物によって引き起こされる。

10

【0360】

別の実施形態において、感染症は、インフルエンザ菌 (*H. influenza*)、*M. カタラーリス* (*M. catarrhalis*) およびレジオネラ・ニューモフィラ (*Legionella pneumophila*) から選択されるグラム陰性菌によって引き起こされる。

【0361】

一実施形態において、感染症は、その感染過程の一環として細胞内に増殖する生物によって引き起こされる。

【0362】

別の実施形態において、感染症は、リケッチア目 (*Rickettsiales*)；クラミジア門 (*Chlamydiae*)；クラミジア目 (*Chlamydiales*)；レジオネラ属 (*Legionella spp.*)；以下に限定はされないが、マイコプラズマ属 (*Mycoplasma spp.*) (例えば、肺炎マイコプラズマ (*Mycoplasma pneumoniae*))；マイコバクテリウム属 (*Mycobacterium spp.*) (例えば、結核菌 (*Mycobacterium tuberculosis*))を含むモリクテス綱 (*Mollicutes*)；およびスピロヘータ門 (*Spiriochaetales*) (例えば、ボレリア属 (*Borrelia spp.*) およびトレポネマ属 (*Treponema spp.*)) からなる群から選択される生物によって引き起こされる。

20

【0363】

別の実施形態において、感染症は、全教示内容が参照により本明細書に援用される <http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp> に記載される生物兵器防衛カテゴリーA (Category A Bio defense) の生物によって引き起こされる。カテゴリーAの生物の例には、以下に限定はされないが、炭疽菌 (*Bacillus anthracis*) (炭疽)、ペスト菌 (*Yersinia pestis*) (ペスト)、ボツリヌス菌 (*Clostridium botulinum*) (ボツリヌス中毒症) または野兎病菌 (*Francisella tularensis*) (野兎病) が含まれる。別の実施形態において、感染症は、炭疽菌 (*Bacillus anthracis*) 感染症である。「炭疽菌 (*Bacillus anthracis*) 感染症」には、炭疽菌 (*Bacillus anthracis*) またはセレウス菌 (*Bacillus cereus*) 群の細菌の他のメンバーへの露出または露出の疑いから引き起こされるかまたはそれから生じる任意の状態、疾病、または疾患が含まれる。

30

40

【0364】

本発明の化合物またはその薬学的に許容できる塩を用いて治療可能なさらなる感染症には、以下に限定はされないが、炭疽、ボツリヌス中毒症、腺ペスト、および野兎病が含まれる。

【0365】

別の実施形態において、感染症は、全教示内容が参照により本明細書に援用される <http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp> に記載される生物兵器防衛カテゴリーA (Category A Bio defense) の生物によって引き起こされる。

50

tp://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.aspに記載される生物兵器防衛カテゴリーB (Category B Bio defense) の生物によって引き起こされる。カテゴリーBの生物の例には、以下に限定はされないが、ブルセラ属 (*Brucella* spp)、ウェルシュ菌 (*Clostridium perfringens*)、サルモネラ属 (*Salmonella* spp.)、大腸菌 (*Escherichia coli*) O157:H7、赤痢菌属 (*Shigella* spp.)、鼻疽菌 (*Burkholderia mallei*)、類鼻疽菌 (*Burkholderia pseudomallei*)、オウム病クラミジア (*Chlamydia psittaci*)、コクシエラ・バーネッティ (*Coxiella burnetii*)、ブドウ球菌エンテロトキシン (*Staphylococcal enterotoxin*) B、リケッチア・プロワツェキ (*Rickettsia prowazekii*)、コレラ菌 (*Vibrio cholerae*)、およびクリプトスポリジウム・パルバム (*Cryptosporidium parvum*) が含まれる。

【0366】

本発明の化合物またはその薬学的に許容できる塩を用いて治療可能なさらなる感染症には、以下に限定はされないが、ブルセラ症、ウェルシュ菌 (*Clostridium perfringens*)、食中毒、鼻疽、類鼻疽、オウム病、Q熱、および水系感染症が含まれる。

【0367】

さらに別の実施形態において、感染症は、上記の1種または2種以上の生物によって引き起こされ得る。このような感染症の例には、以下に限定はされないが、腹腔内感染症 (大腸菌 (*E. coli*) のようなグラム陰性種と *B. fragilis* のような嫌気性菌との混合物であることが多い)、糖尿病足病変 (連鎖球菌属 (*Streptococcus*)、セラシア属 (*Serratia*)、ブドウ球菌属 (*Staphylococcus*) および腸球菌属 (*Enterococcus* spp.)、嫌気性菌の様々な組合せ) (*S. E. Dowd, et al., PLoS one 2008; 3: e3326*、その全教示内容が参照により本明細書に援用される) および呼吸器疾患 (特に、嚢胞性線維症のような慢性的感染症の患者—例えば、黄色ブドウ球菌 (*S. aureus*) プラス緑膿菌 (*P. aeruginosa*) またはインフルエンザ菌 (*H. influenzae*)、非定型病原体)、創傷および膿瘍 (様々なグラム陰性およびグラム陽性菌、特に *MSSA/MRSA*、コアグラゼ陰性ブドウ球菌、腸球菌 (*enterococci*)、アシネトバクター (*Acinetobacter*)、緑膿菌 (*P. aeruginosa*)、大腸菌 (*E. coli*)、*B. fragilis*)、および血流感染症 (13%が多菌性であった (*H. Wisplinghoff, et al., Clin. Infect. Dis. 2004; 39: 311-317*、全教示内容が参照により本明細書に援用される)) が含まれる。

【0368】

一実施形態において、感染症は、1種以上の抗生物質に耐性がある生物によって引き起こされる。

【0369】

別の実施形態において、感染症は、テトラサイクリンまたは第1および第2世代のテトラサイクリン抗生物質 (例えば、ドキシサイクリンまたはミノサイクリン) の任意のメンバーに耐性がある生物によって引き起こされる。

【0370】

別の実施形態において、感染症は、メチシリンに耐性がある生物によって引き起こされる。

【0371】

別の実施形態において、感染症は、バンコマイシンに耐性がある生物によって引き起こされる。

【0372】

10

20

30

40

50

別の実施形態において、感染症は、キノロンまたはフルオロキノロンに耐性がある生物によって引き起こされる。

【0373】

別の実施形態において、感染症は、チゲサイクリンまたは任意の他のテトラサイクリン誘導体に耐性がある生物によって引き起こされる。特定の実施形態において、感染症は、チゲサイクリンに耐性がある生物によって引き起こされる。

【0374】

別の実施形態において、感染症は、 β -ラクタムまたはセファロスポリン抗生物質に耐性がある生物あるいはペネムまたはカルバペネムに耐性がある生物によって引き起こされる。

【0375】

別の実施形態において、感染症は、抗菌ペプチドまたはバイオシミラー治療処置に耐性がある生物によって引き起こされる。抗菌ペプチド（宿主防御ペプチドとも呼ばれる）は、自然免疫応答の進化的に保存された要素であり、全ての生物種に見られる。この場合、抗菌ペプチドは、陰イオン性ペプチド、直鎖陽イオン性 α -ヘリカルペプチド、特定のアミノ酸に富んだ（すなわち、プロリン、アルギニン、フェニルアラニン、グリシン、トリプトファンに富んだ）陽イオン性ペプチド、ならびにシステインを含有し、ジスルフィド結合を形成する陰イオン性および陽イオン性ペプチドの類似体である任意の天然分子または任意の半／合成分子を指す。

【0376】

別の実施形態において、感染症は、マクロライド、リンコサミド、ストレプトグラミン抗生物質、オキサゾリジノン、およびプレウロムチリンに耐性がある生物によって引き起こされる。

【0377】

別の実施形態において、感染症は、PTK0796（7-ジメチルアミノ、9-（2，2-ジメチルプロピル）-アミノメチルサイクリン）に耐性がある生物によって引き起こされる。

【0378】

別の実施形態において、感染症は、多剤耐性病原体（任意の2種以上の抗生物質に対して中程度または完全耐性を有する）によって引き起こされる。

【0379】

癌併用療法

一部の実施形態において、本明細書中に記載される化合物が、さらなる癌処置と一緒に施される。例示的な癌処置として、例えば、化学療法、標的療法、例えば抗体療法、キナーゼインヒビタ、免疫療法、およびホルモン療法、ならびに抗血管形成療法が挙げられる。これらの処置の各々の例が、以下に記載される。

【0380】

本明細書中で用いられる用語「併用」、「併用される」、および関連用語は、本発明に従う治療剤の同時投与または逐次的投与を指す。例えば、本発明の化合物は、別の治療剤と、別個の単位剤形で同時にもしくは逐次的に、または単一の単位剤形で一緒に投与され得る。したがって、本発明は、本発明の化合物、さらなる治療剤、および薬学的に許容できるキャリア、アジュバント、またはビヒクルを含む単一の単位剤形を提供する。

【0381】

単一の剤形を作製するためにキャリア材料と組み合わせられ得る本発明の化合物およびさらなる治療剤（先に記載されるように、さらなる治療剤を含む組成物）の両方の量は、処置される宿主および特定の投与様式に応じて変わることとなる。例えば、本発明の組成物は、本発明の化合物の0.01～100mg／体重kg／日の投薬量が投与され得るように製剤化されるべきである。

【0382】

化学療法

一部の実施形態において、本明細書中に記載される化合物は、化学療法と共に施される。化学療法は、癌細胞を破壊することができる薬物による癌の処置である。「化学療法」は通常、標的療法と対照的に、一般に、迅速に分割する細胞に作用する細胞毒性薬物を指す。化学療法薬物は、可能性のある種々の方法で細胞分裂に、例えば、DNAの重複または新たに形成される染色体の分離に干渉する。化学療法のほとんどの形態は、迅速に分割する全細胞を標的化し、癌細胞に特異的でないが、ある程度の特異性が、正常な細胞が概して可能である、多くの癌細胞のDNA損傷修復の能力欠如に由来し得る。

【0383】

癌療法に用いられる化学療法剤の例として、代謝拮抗薬（例えば、葉酸誘導体、プリン誘導体、およびピリミジン誘導体）およびアルキル化剤（例えば、窒素マスタード、ニトロソウレア、白金、アルキルスルホナート、ヒドラジン、トリアゼン、アジリジン、紡錘体毒、細胞毒性剤、トポイソメラーゼインヒビタその他）が挙げられる。例示的な剤として、アクリルビシン、アクチノマイシン、アリトレチノイン、アルトレタミン、アミノプテリン、アミノレブリン酸、アムルビシン、アムサクリン、アナグレリド、三酸化ヒ素、アスパラギナーゼ、アトラセンタン、ベロテカン、ベキサロテン、ベンダムスチン、ブレオマイシン、ボルテゾミブ、ブスルファン、カンプトセシン、カペシタビン、カルボプラチン、カルボコン、カルモフル、カルムスチン、セレコキシブ、クロラムブシル、クロルメチン、シスプラチン、クラドリビン、クロファラビン、クリサントスパーゼ、シクロホスファミド、シタラビン、ダカルバジン、ダクチノマイシン、ダウノルビシン、デシタビン、デメコルシン、ドセタキセル、ドキソルビシン、エファブロキシラル、エレスクロモル、エルサミトルシン、エノシタビン、エピルビシン、エストラムスチン、エトグルシド、エトポシド、フロキシウリジン、フルダラビン、フルオロウラシル（5FU）、ホテムスチン、ゲムシタビン、ギリアデルインプラント、ヒドロキシカルバミド、ヒドロキシウレア、イダルビシン、イホスファミド、イリノテカン、イロフルベン、イクサベピロン、ラロタキセル、ロイコボリン、リボソームドキソルビシン、リボソームダウノルビシン、ロニダミン、ロムスチン、ルカントン、マンノスルファン、マソプロコール、メルファラン、メルカプトプリン、メスナ、メトトレキサート、メチルアミノレブリン酸、ミトブロニトール、ミトグアゾン、ミトタン、マイトマイシン、ミトキサントロン、ネダプラチン、ニムスチン、オブリメルセン、オマセタキシン、オルタタキセル、オキサリプラチン、パクリタキセル、ペガスパルガーゼ、ペメトレキセド、ペントスタチン、ピラルビシン、ピキサントロン、プリカマイシン、ポルフィマーナトリウム、プレドニマスチン、プロカルバジン、ラルチトレキセド、ラニムスチン、ルビテカン、サパシタビン、セムスチン、シチマジンセラデノベック、ストラタプラチン、ストレプトゾシン、タラポルフィン、テガフル・ウラシル、テモポルフィン、テモゾロミド、テニポシド、テセタキセル、テストラクトン、テトラニトラート、チオテパ、チアゾフリン、チオグアニン、チピファルニブ、トポテカン、トラベクテジン、トリアジクオン、トリエチレンメラミン、トリプラチン、トレチノイン、トレオスルファン、トロホスファミド、ウラムスチン、バルルビシン、ベルテポルフィン、ビンブラスチン、ビンクリスチン、ビンデシン、ビンフルニン、ビノレルビン、ボリノスタット、ゾルビシン、および本明細書中で記載される他の細胞増殖抑制剤または細胞毒性剤が挙げられる。

【0384】

一部の薬物は、単独よりも一緒の方が適切に作用するため、多くの場合、2つ以上の薬物が同時に与えられる。多くの場合、2つ以上の化学療法剤が、併用化学療法として用いられる。一部の実施形態において、化学療法剤（併用化学療法が挙げられる）は、本明細書中で記載される化合物と併用され得る。

【0385】

特定の実施形態において、本発明の化合物と併用される2つのさらなる治療剤として、シタラビン（ara-C）およびアントラサイクリン薬物、例えばダウノルビシン（ダウノマイシン）またはイダルビシンが挙げられる。特定の例において、第3のさらなる剤、クラドリビンが用いられる。

【0386】

標的療法

標的療法は、癌細胞の脱調節タンパク質に特異的な剤の使用を構成する。小分子標的療法薬物は、一般に、癌細胞内の突然変異した、過剰発現された、または普通であれば重要なタンパク質上の酵素ドメインのインヒビタである。顕著な例として、チロシンキナーゼインヒビタ、例えば、アキシチニブ、ボスチニブ、セジラニブ、ダサチニブ、エルロチニブ、イマチニブ、ゲフィチニブ、ラパチニブ、レストールチニブ、ニロチニブ、セマキサニブ、ソラフェニブ、スニチニブ、およびバンデタニブ、ならびにサイクリン依存性キナーゼインヒビタ、例えばアルボシジブおよびセリシクリブがある。治療剤が、癌細胞の表面上のタンパク質に特異的に結合する抗体であるモノクローナル抗体療法が、別のストラ

10 テジである。例として、乳癌に典型的に用いられる抗HER2/neu抗体トラスツズマブ（ハーセプチン（登録商標））、ならびに種々のB細胞悪性腫瘍に典型的に用いられる抗CD20抗体リツキシマブおよびトシツモマブが挙げられる。他の例示的な抗体として、セツキシマブ、パニツムマブ、トラスツズマブ、アレムツズマブ、ベバシズマブ、エドレコロマブ、およびゲムツズマブが挙げられる。例示的な融合タンパク質として、アフリベルセプトおよびデニロイキンディフィトックスが挙げられる。一部の実施形態において、標的療法は、本明細書中で記載される化合物、例えばグリベックと併用され得る（Vignari and Wang 2001）。

【0387】

標的療法は、細胞表面受容体または腫瘍を取り囲む罹患細胞外マトリックスに結合することができる「ホーミング装置」として小ペプチドも含み得る。これらのペプチド（例えば、RGD）に取り付けられる放射性核種が、最終的に、核種が細胞の近くで崩壊すれば、癌細胞を死滅させる。そのような療法の例として、BEXXAR（登録商標）が挙げられる。

20

【0388】

医薬製剤

本発明の組成物は、閉塞、静脈内（ボラスと注入の両方）、吸入、および注射（腹腔内、皮下、筋肉内、腫瘍内、または非経口）を用いるかまたは用いない眼内、経口、経鼻、経皮、局所製剤を含む。本組成物は、眼内、経口、鼻腔内、舌下、非経口、または直腸内、あるいは吸入または吹送投与のための錠剤、丸薬、カプセル、粉末、顆粒、リポソーム、イオン交換樹脂、滅菌点眼剤、または眼内送達器具（即時放出、徐放、または持続放出を促進するコンタクトレンズなど）、非経口溶液または懸濁液、計量エアロゾルまたは液体スプレー、点滴薬、アンプル、自動注入器具、または坐薬などの投薬単位であり得る。

30

【0389】

経口投与に好適な本発明の組成物には、丸薬、錠剤、カプレット、カプセル（それぞれ即時放出、徐放、および持続放出製剤を含む）、顆粒および粉末などの固体形態；ならびに溶液、シロップ、エリキシル剤、乳剤、および懸濁液などの液体形態が含まれる。眼内投与に有用な形態には、滅菌溶液または眼内送達器具が含まれる。非経口投与に有用な形態には、滅菌溶液、乳剤、および懸濁液が含まれる。

【0390】

本発明の組成物は、1週間に1回または1カ月に1回の投与に好適な形態で投与され得る。例えば、活性化合物の不溶性塩を、筋肉内注射のためのデボー製剤（例えば、デカン酸塩）を提供するかまたは点眼投与用溶液を提供するように適合され得る。

40

【0391】

本発明の組成物を含有する剤形は、治療効果を与えるのに必要な有効量の活性成分を含有する。本組成物は、約5,000mg～約0.5mg（好ましくは、約1,000mg～約0.5mg）の本発明の化合物またはその塩形態を含有し得、選択される投与形態に好適な任意の形態へと構成され得る。本組成物は、1日あたり約1～約5回投与され得る。連日投与または後の周期的投与（post-periodic dosing）が用いられ得る。

50

【0392】

経口投与について、本組成物は、例えば、約500～約0.5ミリグラムの活性化合物を含有する錠剤またはカプセルの形態であるのが好ましい。用量は、治療される特定の患者に関連する因子（例えば、年齢、体重、食事、および投与時間）、治療される病態の重症度、用いられる化合物、投与形態、および製剤の濃度に応じて異なる。

【0393】

経口組成物は、均質な組成物として配合されるのが好ましく、活性成分は、混合物全体に均一に分散され、等量の本発明の化合物を含有する投薬単位へと容易に細かく分けることができる。好ましくは、本組成物は、本発明の化合物（またはその薬学的に許容できる塩）を、1種以上の任意選択的に存在する医薬担体（でんぷん、糖、希釈剤、造粒剤、潤滑剤、流動促進剤、結合剤、および崩壊剤など）、1種以上の任意選択的に存在する不活性医薬賦形剤（水、グリコール、油、アルコール、香料添加剤、防腐剤、着色剤、およびシロップなど）、1種以上の任意選択的に存在する従来の錠剤化成分（コーンスターチ、ラクトース、スクロース、ソルビトール、タルク、ステアリン酸、ステアリン酸マグネシウム、リン酸ニカルシウム、および様々なゴムのいずれかなど）、および任意選択の希釈剤（水など）と混合することによって調製される。

【0394】

結合剤には、でんぷん、ゼラチン、天然糖（例えば、グルコースおよびベクターラクトース）、コーンシロップならびに天然および合成ゴム（例えば、アカシアおよびトラガカント）が含まれる。崩壊剤には、でんぷん、メチルセルロース、寒天、およびベントナイトが含まれる。

【0395】

錠剤およびカプセルは、有利な経口投薬単位形態である。錠剤は、標準的な技術を用いて、糖衣をかけられるかまたはフィルムコートされ得る。錠剤は、長期間の制御放出治療効果を与えるためにコートまたは他の方法で複合され得る。剤形は、内側投薬および外側投薬成分を含み得、外側成分は、内側成分を覆う外皮の形態である。2つの成分は、胃中での分解に耐性があり（例えば、腸溶性層）、内側成分が十二指腸中に無傷で通過することが可能な層あるいは放出を遅延または持続させる層によってさらに分離され得る。様々な腸溶性および非腸溶性層またはコーティング材料（ポリマー酸、シェラック、アセチルアルコール、および酢酸セルロースまたはそれらの組合せなど）が用いられ得る。

【0396】

本発明の化合物は、徐放組成物を介して投与され得；本組成物は、本発明の化合物および生物分解性徐放担体（例えば、ポリマー担体）または薬学的に許容できる非生物分解性徐放担体（例えば、イオン交換担体）を含む。

【0397】

生物分解性および非生物分解性徐放担体は、当該技術分野において周知である。生物分解性担体を用いて、活性剤を保持し、好適な環境（例えば、水性、酸性、塩基性など）において徐々に分解／溶解して、活性剤を放出する粒子またはマトリックスを形成する。このような粒子は、体液中で分解／溶解して、活性化合物を中に放出する。粒子は、好ましくは、ナノ粒子またはナノ乳剤（例えば、直径が約1～約500nmの範囲、好ましくは直径が約50～約200nm、最も好ましくは直径が約100nm）である。徐放組成物を調製する方法において、徐放担体および本発明の化合物をまず有機溶媒に溶解または分散させる。得られた混合物を、任意選択の表面活性剤を含有する水溶液に添加して、乳剤を生成する。次に、有機溶媒を乳剤から蒸発させて、徐放担体と本発明の化合物とを含有する粒子のコロイド懸濁液を得る。

【0398】

本明細書に開示される化合物は、水溶液、好適に風味付けしたシロップ、水性または油懸濁液、綿実油、ゴマ油、ヤシ油またはラッカセイ油などの食用油により風味付けした乳剤などの液体形態、あるいはエリキシル剤または同様の医薬品媒体で、経口投与または注射のために組み込まれ得る。水性懸濁液のための好適な分散剤または懸濁化剤には、トラ

10

20

30

40

50

ガカント、アカシア、アルギン酸塩、デキストラン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、メチルセルロース、ポリビニルピロリドン、およびゼラチンなどの合成および天然ゴムが含まれる。好適に風味付けした懸濁化剤または分散剤の液体形態には、合成および天然ゴムも含まれ得る。非経口投与について、滅菌懸濁液および溶液が望ましい。静脈内投与が望ましいとき、一般に好適な防腐剤を含有する等張製剤が用いられる。

【0399】

化合物は、注射によって非経口投与され得る。非経口製剤は、適切な不活性液体担体に溶解されるかまたはそれと混合された活性成分からなり得る。許容できる液体担体は、通常、水性溶媒および溶解または防腐を助けるための他の任意選択の成分を含む。このような水性溶媒には、滅菌水、リンゲル液、または等張食塩水が含まれる。他の任意選択の成分には、植物油（ラッカセイ油、綿実油、およびゴマ油など）、および有機溶媒（ソルケタール、グリセロール、およびホルミルなど）が含まれる。滅菌不揮発性油が、溶媒または懸濁化剤として用いられ得る。非経口製剤は、活性成分を液体担体に溶解または懸濁させることによって調製され、それにより、最終的な投薬単位が約0.005～約10重量%の活性成分を含有する。他の添加剤には、防腐剤、等張化剤、可溶化剤、安定剤、および鎮痛剤が含まれる。注射可能な懸濁液が調製され得、その場合、適切な液体担体、懸濁化剤などが用いられ得る。

【0400】

本発明の化合物は、好適な鼻腔内媒体を用いて鼻腔内投与され得る。

【0401】

別の実施形態において、本発明の化合物は、吸入によって肺に直接投与され得る。

【0402】

本発明の化合物は、好適な局所経皮媒体または経皮パッチを用いることによって局所投与または強化され得る。

【0403】

眼内投与について、本組成物は、眼科用組成物の形態であるのが好ましい。眼科用組成物は、好ましくは、点眼製剤として配合され、眼への投与を容易にするために適切な容器（例えば、好適なピペットを備えたスポイト）に充填される。好ましくは、本組成物は、精製水を用いて、滅菌されており、かつ水性である。本発明の化合物に加えて、眼科用組成物は、a) ポリオキシエチレン脂肪酸エステルなどの界面活性剤；b) 通常、約0.05～約5.0%（重量／体積）の濃度の、セルロース、セルロース誘導体などの増粘剤、カルボキシビニルポリマー、ポリビニルポリマー、およびポリビニルピロリドン；c) （窒素を含み、かつFeなどの酸素を含まない吸収剤を任意選択的に含む容器に本組成物を貯蔵する代わりにまたはそれに加えて）、約0.00005～約0.1%（重量／体積）の濃度の、ブチル化ヒドロキシアニソール、アスコルビン酸、チオ硫酸ナトリウム、またはブチル化ヒドロキシトルエンなどの酸化防止剤；d) 約0.01～0.5%（重量／体積）の濃度のエタノール；およびe) 等張剤、緩衝液、防腐剤、および／またはpH調整剤などの他の賦形剤のうちの1つ以上を含有し得る。眼科用組成物のpHは、4～8の範囲内であるのが望ましい。

【0404】

本発明を、その実施形態の例を参照して特に示し説明してきたが、当業者には、添付の特許請求の範囲に包含される本発明の範囲から逸脱せずに、形態および詳細の様々な変更を行うことができることが理解されよう。

【実施例】

【0405】

例示

本明細書中に記載される化合物およびその合成前駆体を合成するさらなる方法は、当業者の手段の範囲内である。応用可能な化合物を合成するのに有用な合成化学の変換操作および保護基の方法論（保護および脱保護）が当該技術分野において知られており、例として、Larock R, Comprehensive Organic Transfor

10

20

30

40


50

mations, VCH Publishers (1989); Greene, TW et al., Protective Groups in Organic Synthesis, 3rd Ed., John Wiley and Sons (1999); Fieser, L et al., Fieser and Fieser's Reagents for Organic Synthesis, John Wiley and Sons (1994); および Paquette, L, ed., Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, John Wiley and Sons (1995)、ならびにそれらの後続版に記載されるものが挙げられる。

【0406】

実施例 1：化合物 1～5 の合成

【化 269】




化合物 1:

化合物 1 を、国際公開第 2010/129057 号第 69～70 頁に記載される合成 (S15-13-190) に従って調製した。この出願の全教示内容が参照により本明細書に援用される。

^1H NMR (400 MHz, CD_3OD) δ 7.34–7.24 (comp, 4H), 7.21–7.17 (m, 1H), 4.69 (s, 2H), 4.54 (s, 2H), 4.11 (s, 1H), 3.90–3.53 (m, 2H), 3.47–3.39 (m, 2H), 3.04 (s, 3H), 2.96 (s, 3H), 3.28–2.94 (comp, 3H), 2.50–2.40 (m, 1H), 2.29–2.22 (m, 1H), 1.72–1.61 (m, 1H); MS (ESI) m/z 594.15 ($M+H$).

【化 270】




化合物 2:

化合物 2 を、国際公開第 2010/129057 号第 248～249 頁に記載される合成 (S1-14-60) に従って調製した。

^1H NMR (400 MHz, CD_3OD) δ 7.24–7.11 (m, 5H), 7.07 (d, $J=4.8$ Hz, 1H), 4.35 (s, 2H), 4.04 (s, 1H), 3.60–3.57 (m, 3H), 3.16–2.80 (m, 11H), 2.31–2.17 (m, 2H), 2.06–1.96 (s, 4H), 1.63–1.52 (m, 1H); MS (ESI) m/z 606.2 ($M+H$).

【化 2 7 1】




化合物 3 a を、国際公開第 2 0 1 4 / 0 3 6 5 0 2 号第 1 4 2 頁に記載される合成 (S 1 0 - 4 - 1) に従って調製した。この出願の全教示内容が参照により本明細書に援用される。

10

^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.09 (s, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.86–3.80 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.37–3.30 (m, 1H), 3.28–3.07 (m, 3H), 3.00–2.91 (m, 1H), 2.67–2.54 (m, 2H), 2.41 (t, $J=14.2$ Hz, 1H), 2.34–2.21 (m, 5H), 1.66–1.57 (m, 1H), 1.25 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 514.28 ($M+H$).

【化 2 7 2】




20

化合物 4 a を、国際公開第 2 0 1 4 / 0 3 6 5 0 2 号第 1 4 2 ~ 1 4 3 頁に記載される合成 (S 1 0 - 4 - 2) に従って調製した。

(単一のジアステレオマー): ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.10 (s, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.85–3.80 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.46–3.31 (m, 3H), 3.27–3.07 (m, 3H), 3.01–2.92 (m, 1H), 2.86–2.83 (m, 1H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.39 (t, $J=14.2$ Hz, 1H), 2.34–2.22 (m, 5H), 1.64–1.55 (m, 1H), 1.36 (t, $J=7.3$ Hz, 3H), 1.25 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 542.35 ($M+H$).

30

【化 2 7 3】



40

化合物 5 を、国際公開第 2 0 1 4 / 0 3 6 5 0 2 号第 1 4 0 頁に記載される合成 (S 9 - 5 - 4) に従って調製した。

^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.33 (s, 2H), 3.89 (s, 1H), 3.82–3.76 (m, 2H), 3.23–3.12 (m, 3H), 3.02–2.94 (m, 1H), 2.67–2.64 (m, 1H), 2.32–2.14 (m, 4H), 2.12–2.02 (m, 2

50

H), 1.63-1.54 (m, 1H); MS (ESI) m/z 531.31 (M+H).

化合物1、2、3a、4a、および5を本明細書中で化合物K11、K31、K4、K5、およびK43とも呼ぶ。

【0407】

実施例2：化合物1～5の抗癌活性

化合物1、2、3a、4a、および5、ならびに図15A～図15M、図16A～図16F、および図17A～図17Dの化合物を、AML癌細胞株THP-1およびMV4-11を用いて腫瘍細胞増殖についてアッセイした。MV4-11細胞におけるシトクロムオキシダーゼ1 (COX-1) 発現の阻害を化合物1、2、3a、4a、および5についても測定した。

10

【0408】

A. THP-1 抗増殖アッセイ

真核細胞培養増殖の阻害を、THP-1細胞 (ATCC Cat. # TIB-202) (ヒト急性単球白血病細胞株) を用いて確立した。これは、懸濁液細胞である。真核生物培養増殖阻害についてのこれらの細胞ベースのアッセイを384ウェルプレートフォーマットで実行して、試験化合物のインビトロ細胞毒性を判定した。

【0409】

化合物を水中に可溶化した。化合物をアッセイ培地中に1:2に希釈して、1:2の連続希釈を50:50の培地:水混合液中で実行した。高用量は、40 μ M、最終10%水であった。最終濃度の5 $\times$ の化合物5 μ Lを384アッセイプレートに分配した。20 μ LのTHP-1細胞を加えた。

20

【0410】

化合物を用量応答フォーマット (10%の水最終濃度) で入れてから細胞を加えた。細胞をRPMI-1640培地/pen/strep/L-グルタミン/10%FBS/2-メルカプトエタノール中で化合物と共に5%CO₂で37℃において72時間、増殖させてインキュベートした。インキュベーション時間の終わりに、細胞を、Cell Titer Glo (Promega) を用いて生存度についてアッセイした。細胞毒性であると考えられる化合物は、発光シグナルを引き下げた。

【0411】

30

B. MV4-11 抗増殖アッセイ

MV4-11細胞株 (MV-4-11, CRL-9591 (商標)) を American Type Culture Collection (ATCC) から得た。細胞を、加湿した5%CO₂インキュベータ内で37℃において、T-75フラスコ内の10%胎仔ウシ血清 (ATCC、カタログNo. 30-2020) およびペニシリン-ストレプトマイシン (ATCC、カタログNo. 30-2300) を含有するRPMI培地 (GIBCO、カタログNo. 11875-093) 中で増殖させた。

【0412】

50 μ Lの細胞 (10,000細胞/ウェル) を96ウェルプレート内に入れて、加湿した5%CO₂インキュベータ内で37℃において一晩インキュベートした。その翌日、3倍で連続希釈した化合物を2反復で含有する培地50 μ Lをウェルに加えて、ウェルの第1の対における化合物の出発濃度が10 μ Mとなるようにした。化合物との72時間のインキュベーション後、細胞生存度を、メーカーによって推奨される100 μ L/ウェル Cell Titer Glo 試薬 (Promega) の付加後、ルミノメータで測定した。化合物のIC₅₀値を、SoftMaxソフトウェアを用いて算出した。

40

【0413】

C. 抗増殖作用

表1A中のデータが示すように、化合物1、2、3a、4a、および5は、強力な抗増殖活性を実証し、IC₅₀値が、2つのAML癌細胞株、THP-1およびMV4-11に対して、0.10~1.05 μ Mであった。

50

【0414】

【表35】

表1A

化合物 ID	IC50 (μM)	
	THP-1	MV4-11
1	0.57	0.22
2	1.05	0.41
3a	0.75	0.10
4a	0.90	0.13
5	0.64	0.17
チゲサイクリン	29.13	4.64

10

【0415】

THP-1細胞株およびMV4-11細胞株における、本明細書中に記載される特定の化合物の試験のさらなる結果を図15A～図15M、図16A～図16F、および図17A～図17D中に報告する。

20

【0416】

D-1. さらなる細胞株における化合物の抗増殖活性

化合物1、2、3a、4a、および5、ならびに図15A～図15M、図16A～図16F、および図17A～図17Dに上げられる特定の化合物を以下の細胞株：MOLT4およびK562において試験した。化合物1、2、3a、4a、および5は、細胞株HL60においても試験した。

【0417】

細胞株および培養：

MOLT4細胞株（CRL-1582（商標））およびK562細胞株（CCL-243（商標））をAmerican Type Culture Collection（ATCC）から得た。これらを、加湿した5%CO₂インキュベータ内で37℃において、T-75フラスコ内の10%胎仔ウシ血清（ATCC、カタログNo. 30-2020）およびペニシリンーストレプトマイシン（ATCC、カタログNo. 30-2300）を含有するRPMI培地（GIBCO、カタログNo. 11875-093）中で増殖させた。HL60細胞株（CCL-240（商標））をAmerican Type Culture Collection（ATCC）から得た。これらを、加湿した5%CO₂インキュベータ内で37℃において、T-75フラスコ内の20%胎仔ウシ血清（ATCC、カタログNo. 30-2020）およびペニシリンーストレプトマイシン（ATCC、カタログNo. 30-2300）を含有するDMEM培地（GIBCO、カタログNo. 11965-092）中で増殖させた。

30

【0418】

増殖アッセイ：

50μLの細胞（8,500細胞／ウェル）を96ウェルプレート内に入れて、加湿した5%CO₂インキュベータ内で37℃において一晩インキュベートした。その翌日、3倍で連続希釈した化合物を2反復で含有する培地50μLをウェルに加えて、ウェルの第1の対における化合物の出発濃度が10μMとなるようにした。化合物との72時間のインキュベーション後、細胞生存度を、メーカーによって推奨される100μL／ウェルCellTiter Glo試薬（Promega）の付加後、ルミノメータで測定した。化合物のIC₅₀値を、SoftMaxソフトウェアを用いて算出した。

40

50

【0419】

【表36】

表1B

化合物 ID	IC50 (μM)		
	MOLT4	K562	HL60
1	0.19	0.43	0.36
2	0.31	0.48	不活性
3a	0.12	0.11	0.37
4a	0.13	0.13	0.41
5	0.13	0.16	0.51
チゲサイクリン	5.1	7.2	15.4

【0420】

MOLT4細胞株およびK562細胞株における、本明細書中に記載されるさらなる化合物の試験結果を図15A～図15M、図16A～図16F、および図17A～図17D中に報告する。

【0421】

D-2、KG-1、KU812、およびMEG-01細胞株における化合物の抗増殖活性
化合物を以下の細胞株：KG-1急性骨髄性白血病ATCC CCL-246、KU812ヒト慢性骨髄性白血病（CML）ATCC CRL-2099、およびMEG-01ヒト慢性骨髄性白血病（CML）ATCC CRL-2021において、以下の条件および手順：

増殖培地：RPMI培地1640 Gibco#11875-093

補助剤：胎仔ウシ血清（FB）Gibco#10437-028

に従って試験した。

【0422】

50mL FBS（10%の最終濃度）をRPMI培地1640（RPMI）の各500mLボトルに加えることによって完全細胞培地を調製した。培地は、使用前、水浴内で37℃に平衡させた。

【0423】

完全細胞培地中の初期濃度（20μMまたは100μM）の2×の1ミリメートル容量を、試験する各化合物用に調製した。50μlを、3反復で、50μlの完全細胞培地を希釈剤として含有する96ウェルプレートのレーン2のウェルおよびレーン3のウェルに加えた。化合物の2倍連続希釈を4～10レーンにおいて続けた。最終容量は50μlであった。化合物なしの50μl培地を11レーンに加えて、100μl培地をレーン1、12、および行A、Hに加えて、実験ウェル中での熱勾配の形成を防止し、または最小にした。

【0424】

1～4×10⁵/mLに増殖した細胞を遠心分離して、フレッシュな培地中に2×10⁵/mLにおいて再懸濁し、50μl（10,000細胞）を、化合物を含有する各ウェル（レーン2～10）および培地のみを含有する6ウェル（レーン11）に加えた。細胞を加えて、化合物を、意図した1×濃度に希釈した。

【0425】

プレートを5%CO₂中で37℃において72時間インキュベートした。

【0426】

10

20

30

40

50

72時間のインキュベーション後、プレートを30分間室温に平衡させて、ATPを間接的に測定するPromega CellTiter-Gloキット (Promega # G7572) を用いて、細胞増殖についてアッセイした。CellTiter-Gloバッファで再構成したCellTiter-Glo基質100μlを、細胞を含有する各ウェル、および培地のみを含有する6ウェルに加えた。プレートを光から保護して室温において10分間インキュベートして、発光シグナルを安定化させた。MARSデータ分析ソフトウェア (BMG LABTECH) を用いるLUMIstar OPTIMA発光マイクロプレートリーダーで発光を読んで、記録した。

【0427】

化合物含有ウェルの発光値 (3反復) を、Prism GraphPadを用いて、化合物なし対照対濃度の平均%としてプロットした。IC₅₀ (化合物が増殖を (ATPで測定して) 50%引き下げた濃度) をグラフから得た。

【数1】

$$\% \text{化合物なし対照} = \frac{\text{蛍光値(細胞プラス化合物)} \times 100}{\text{蛍光値(細胞、化合物なし)、平均}}$$

【0428】

【表37】

プレートフォーマット

培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地
培地	TP-化合物(10 μM)	S	2.5	1.25	0.63	0.31	0.16	0.08	0.04	細胞	培地	培地
培地	TP-化合物(10 μM)	S	2.5	1.25	0.63	0.31	0.16	0.08	0.04	細胞	培地	培地
培地	TP-化合物(10 μM)	S	2.5	1.25	0.63	0.31	0.16	0.08	0.04	細胞	培地	培地
培地	チゲサイクリン(50 μM)	25	12.5	6.25	3.12	1.56	0.78	0.39	0.20	細胞	培地	培地
培地	チゲサイクリン(50 μM)	25	12.5	6.25	3.12	1.56	0.78	0.39	0.20	細胞	培地	培地
培地	チゲサイクリン(50 μM)	25	12.5	6.25	3.12	1.56	0.78	0.39	0.20	細胞	培地	培地
培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地	培地

上述の表中のTP-化合物は、試験した、本明細書中に記載する化合物を指す。

【0429】

KG-1細胞株、KU812細胞株、およびMEG-01細胞株における試験結果を表15A～表15M、表16A～表16F、および表17A～表17D中に報告する。

【0430】

E. 15 AMLエキソピボ骨髓サンプルに対する抗増殖活性

化合物3aおよびシタラビンの抗増殖活性を15 AMLエキソピボ骨髓サンプル (2つのシタラビン耐性サンプルを含む) に対して測定した。用いたアッセイは、Vivia's Native Environment細胞枯渴アッセイであった。研究の概略は、以下のとおりである。

- － 各薬物を5つの異なる濃度で単剤療法として用いた
- － 測定のインキュベーション時点は、薬物曝露後48時間であった

【0431】

結果を図6に視覚的に示す。化合物3aは、AML患者の凍結骨髓由来の腫瘍細胞に対して、強力なイクスピボ活性をもたらした。化合物C3aの活性は、シタラビンよりも良好であり、効力がより強く、かつ有効性がより高かった。観察した活性プロファイルに従えば、化合物3aは、平均EC₅₀値が170 nMであった。

【0432】

F. MV4-11異種移植片

CB17 SCIDマウスの皮下MV4-11白血病モデルにおける化合物3a、4a、および5のインピボ抗腫瘍有効性を試験した。

【0433】

細胞培養：

MV4-11細胞（ATCC-CRL-9591）を10%熱不活化胎仔ウシ血清、100U/mlペニシリン、および100μg/mlストレプトマイシンを補充したRPMI 1640培地中での0.2~1.5×10⁶細胞/mlの密度の懸濁培養体として、空气中5%CO₂の雰囲気内で37℃においてインビトロで維持した。腫瘍細胞を週に2回、ルーチンの継代培養した。指数増殖相で増殖している細胞を収穫して、腫瘍接種をカウントした。

【0434】

動物：

CB17 SCID、雌、6~8週、秤量およそ18~22g。

【0435】

腫瘍接種：

各マウスに0.2mlのPBS（マトリゲル1：1入り）中MV4-11腫瘍細胞（10×10⁶個）を右側腹部において皮下接種して、腫瘍を発生させた。動物を無作為化して、平均腫瘍容量が有効性研究用におよそ150~200mm³に達したときに処置を始めた。被験物質投与および各群の動物数を以下に示す。

【0436】

【表38】

表 1C: 群および処置

群	N ^a	処置	用量 (mg/kg)	投薬 経路	スケジュール
1	10	ビヒクル対照	--	I.P.	QD ^b , 4日オン, 6日オフ, 0-14日
2	10	シタラビン	100	I.P.	QD, 5日オン, 2日オフ, 0-14日
3	10	チゲサイクリン	50	I.P.	BID ^c , 0-14日
4	10	化合物 3a -用量 1	12.5	I.P.	QD, 4日オン, 6日オフ, 0-14日
5	10	化合物 3a -用量 2	12.5	I.P.	QD, 2日オン, 6日オフ, 0-14日
6	10	化合物 4a -用量 1	12.5	I.P.	QD, 4日オン, 6日オフ, 0-14日
7	10	化合物 4a -用量 2	12.5	I.P.	QD, 2日オン, 6日オフ, 0-14日
8	10	化合物 5 -用量 1	12.5	I.P.	QD, 4日オン, 6日オフ, 0-14日
9	10	化合物 5 -用量 2	12.5	I.P.	QD, 2日オン, 6日オフ, 0-14日

注釈:

- a. N: 群あたりの動物数;
b. QD: 1日あたり1回;
c. BID: 1日あたり2回。BID投薬は、8時間間隔をあける。

【0437】

エンドポイント：

監視した主なエンドポイントは、腫瘍増殖の遅滞または治癒であった。腫瘍サイズを、キャリパを用いて週に2回、二次元で測定して、容量を、式： $V = 0.5 a \times b^2$ を用いて、mm³で表した。式中、aおよびbは、それぞれ腫瘍の長径および短径である。次に、腫瘍サイズをT-C値およびT/C値の両方の計算に用いた。T-Cは、Tを、処置群の腫瘍が所定のサイズ（例えば、1,000mm³）に達するのに必要とされる時間の中央値（日）として、およびCを、対照群腫瘍が同サイズに達する時間の中央値（日）として算出する。T/C値（パーセント）は、抗腫瘍有効性の指標であり、TおよびCは、そ

れぞれ処置した群および対照群の所定の日の平均容量である。

【0438】

TGIを、式： $TGI(\%) = [1 - (Ti / T0)] / (Vi / V0)] \times 100$ を用いて各群について算出した；Tiは、所定の日の処置群の平均腫瘍容量であり、T0は、処置の第1日目の処置群の平均腫瘍容量であり、Viは、Tiと同じ日のビヒクル対照群の平均腫瘍容量であり、V0は、処置の第1日目のビヒクル群の平均腫瘍容量である。

【0439】

腫瘍容量対処置開始後の時間、および体重対処置開始後の日数の結果を図7A～図7Fに示す。図7から分かるように、化合物3aで処置した全動物は、 $\geq 70\%$ の腫瘍縮小を達成した。最大耐量(MTD)において投薬したシタラピン(標準治療)およびチゲサイクリンのみが、いずれの群においても中程度の作用(腫瘍なし応答)を実証した。

【0440】

G. 化合物3aの、ラット心臓のミトコンドリアタンパク質合成に及ぼす作用

化合物3aの、ミトコンドリアタンパク質合成に及ぼす作用を、以前に記載した[以下の1、2参照]、単離した無傷ラット心臓のミトコンドリアタンパク質合成アッセイを用いて、判定した。正常なラット心臓から単離した無傷の、高度に結合したミトコンドリア(highly coupled mitochondria)を、 $[S^{35}]$ -メチオニンを含むインキュベーション培地中でインキュベートした。化合物を希釈して、0.15から40 μM の最終用量反応曲線を作成した。タンパク質中への $[S^{35}]$ -メチオニンの組み込みの速度を、各サンプルについて、濾紙ディスクアッセイを用いて、インキュベーションの20、40および60分時点において測定して、記載されるように[以下の1、2、3]、ミトコンドリアタンパク質1mgあたりの組み込まれたメチオニンpmolとして表した。対照および全ての薬物濃度についての時間経過データは、ほぼ直線的であった。各時間経過データプロットの傾きを、各サンプルについて、ゼロおよび3時点を通る最小二乗最適直線として算出する。タンパク質合成の速度は、各ミトコンドリア調製物によってやや変動する(平均およびSEM=20.3 $\pm$ 2.4 pm/タンパク質mg)。この変動に対して標準化するために、速度を、ミトコンドリアの各調製物について、対照線(control line)の速度のパーセントとして表した。各実験を3回反復した。

【0441】

化合物3aの濃度に対して、化合物3aの各濃度について得た対照のパーセントを表すことにより、用量-反応曲線を得た。全3実験の用量-反応曲線を一緒にプロットして、式 $y = ab / (b + x)$ (Sigma Plot 10.0)を用いて適合させて、50%最大阻止濃度(IC₅₀)を各薬物について報告する。

【0442】

結果の要約：

図8は、化合物3aについての用量-反応結果を示す。用量-反応曲線IC₅₀は、0.7 μM であった。したがって、データは、化合物3aの、ミトコンドリア膜を横切る能力、およびミトコンドリア翻訳を阻害する能力の両方を表す。

【0443】

1. McKee, E. E., Ferguson, M., Bentley, A. T. and Marks, T. A. (2006) Inhibition of mammalian mitochondrial protein synthesis by oxazolidinones. *Antimicrob Agents Chemother* 50, 2042-2049.

2. McKee, E. E., Grier, B. L., Thompson, G. S. and McCourt, J. D. (1990) Isolation and incubation conditions to study heart mitochondrial protein synthesis. *Am J Physiol* 258, E492-502.

10

20

30

40

50

3. Flanagan, S., McKee, E. e., Das, D., Tulken, P. M., Hosako, H., Fiedler-Kelly, J., Passarel, J., Rodovsky, A., and Prokocimer, P. Nonclinical and pharmacokinetic assessments to evaluate the potential of tedizolid and linezolid to affect mitochondrial function (2014) Antimicrobial Agents and Chemo 59:178-185, doi 10.1128/AAC03684, PMID 25331703. 【0444】

H. MV4-11細胞中のCOX1およびCOX4タンパク質レベル

10

材料:

1) MV4-11細胞株: MV411細胞株(MV-4-11、CRL-9591(商標))をAmerican Type Culture Collection(ATCC)から得た。

2) 抗体: 以下の抗体を、表2において以下に示すように購入して、希釈物を、メーカーによって推奨されるようにウエスタンブロット分析に用いた。

【0445】

【表39】

表2

20

抗体	会社	カタログ番号
ウサギの抗ヒトCOX1	BosterBio	PA1317
マウスの抗ヒトCOX4	Santa Cruz Laboratories	SC376831
HRP 結合抗マウス	Bio-Rad	170-5047
HRP 結合抗ウサギ	Bio-Rad	170-5046
HRP 抗ヒトβ-アクチン	Cell Signal Technologies	12262S

30

【0446】

方法:

1) 細胞株および培養条件: MV4-11細胞を、加湿した5%CO₂インキュベータ内で37℃において、T-75フラスコ内の10%胎仔ウシ血清(ATCC、カタログNo. 30-2020)およびペニシリン-ストレプトマイシン(ATCC、カタログNo. 30-2300)を含有するRPMI培地(GIBCO、カタログNo. 11875-093)中で増殖させた。

40

2) 化合物処理: 2mLの細胞(500,000細胞)を6ウェルプレートの各ウェルに入れて、加湿した5%CO₂インキュベータ内で37℃においてインキュベートした。その翌日、400μMの化合物の2.5μL、6.25μL、12.5μL、25μL、および50μLを各ウェルに加えた。これらの付加により、化合物の0.5μM、1.25μM、2.5μM、5μM、および10μMの最終濃度となった。一ウェルには、いかなる化合物も入れず、未処理の対照として用いた。化合物との18時間のインキュベーション後、細胞を2000gにおいて1分間の遠心分離によって収集して、1mLのPBSで洗浄した。細胞ペレットを50μLの溶解バッファ中で溶解して、さらなる使用まで-20℃において保管した。

3) タンパク質の評価: 細胞溶解液を12,000rpmにおいて1分間スピンして、

50

上清 3 μL を用いて、推奨されるプロトコルに従ってクーマシーブルー試薬を用いて、タンパク質濃度をチェックした。電気泳動について、等量のタンパク質抽出物を各化合物に用いた。ロードするタンパク質抽出物の量をそれぞれの化合物について 1 サンプルあたり 7.5 から 15 μg まで変えた。

4) ウェスタンブロッティング:

サンプル調製

x μL の細胞溶解液 (等しいタンパク質濃度に調整した容量)

0.1 μL DTT (1M)

15 - x μL の溶解バッファ

5 μL の 4 × Laemmle サンプルバッファ

サンプルを 95 °C において 5 分間加熱した。

【0447】

ゲル電気泳動:

a) NuPAGE 4-12% Bis-Tris ゲル (Novex、カタログ No. NP0322BOX) を XCell II プロットモジュール (Invitrogen、カタログ No. EI9051) 内にアSEMBルして、ランニングバッファを加えた。

b) 20 μL のサンプルおよび 5 μL のプレ染色した分子量マーカーをウェル内に別々にロードした。

c) ゲルを、青色色素が底部に達するまで 150 V において約 1.5 時間ランした。

【0448】

ゲルからニトロセルロース膜へのタンパク質転写:

a) ラン後、ゲルを取り出して、タンパク質転写を、メーカーの推奨に従って iBlot (Invitrogen、カタログ No. IB301002) を用いて実行した。

【0449】

主な抗体インキュベーション:

a) ニトロセルロース膜を取り出して、20 mL のブロッキング溶液 (5% 乳を含有する 5% TBST) 中に室温において 1 時間置いた。

b) プロットを TBST で 3 回、5 分間洗浄した。

c) プロットを、0.5% BSA、0.02% アジ化ナトリウム、および 15 μL の抗 COX1 抗体または 37.5 μL の抗 COX4 抗体を含有する 15 mL の TBST 中で、室温において一晩インキュベートした。

d) プロットを TBST で 3 回、各々 5 分間洗浄した。

【0450】

二次抗体インキュベーション:

a) プロットを、0.5% BSA および 1.5 μL の HRP 結合二次抗ウサギ抗体 (COX1 プロット用) 溶液または抗マウス抗体 (COX4 プロット用) 溶液を含有する 15 mL の TBST 中で、室温において 1 時間インキュベートした。

b) プロットを TBST で 3 回、各々 5 分間洗浄した。

【0451】

撮像

a) プロットをプラスチックラップ上に置いた。

b) 基質 A および基質 B を 40:1 の比率で混合することにより、基質の使用液を調製して (Thermo Scientific、カタログ No. 32132)、1 mL / プロットを加えて、プロットが基質溶液で均等に覆われるようにした。これを室温において 4 分間インキュベートした。

c) プロットを別のプラスチックラップ層で覆って、カセット内に入れて、安全な明暗室内で X 線フィルムに曝露した。

d) 1 分後にフィルムをカセットから取り出して、現像した。

【0452】

ベータアクチンのプロービング:

a) ベータアクチンレベルを監視するために、プロットをTBS T中で3回、各々5分間洗浄して、0.5%BSAおよび3μLのHRP結合ベータアクチン抗体を含有する15mLのTBS T中で、室温において1時間インキュベートした。

b) プロットを15mLのTBS Tで3回、各々5分間洗浄して、先に記載するように撮像した。

【0453】

試薬およびバッファ:

- 1×細胞溶解／タンパク質抽出試薬 (Cell Signal Technology、Cat. no: 9803)

- 20mM トリスHCl (pH 7.5)

- 150mM NaCl

- 1mM Na₂EDTA

- 1mM EGTA

- 1%トリトン

- 2.5mM ピロリン酸ナトリウム

- 1mM β-グリセロホスファート

- 1mM Na₃VO₄

- 1μg/mL ロイペプチン

- プロテアーゼインヒビタ (Roche、カタログno. 11873580001)

- タンパク質評価: クーマシータンパク質アッセイ試薬 (ThermoScientific、Cat. No. 1856209)

- 電気泳動のためのサンプルローディングバッファ

- 4×Laemmli サンプルバッファ (Novex、カタログNo. NP0007)

- 電気泳動ランニングバッファ

- NuPAGE MOPS / SDS ランニングバッファ (Novex、カタログno. NP0001)

- ウェスタンブロット用洗浄バッファ

- Tween 20入りトリス緩衝生理食塩水 (TBS Tバッファ)

- 20mM トリス-HCl (pH 7.5)

- 150mM NaCl

- 0.1% Tween 20

- ウェスタンブロット用ブロッキングバッファ

- TBS T中5%脱脂粉乳

- シグナル検出キット: Pierce ECL Plus Substrate (Thermoscientific、カタログno. 32132)

- 電気泳動ゲル: NuPAGE 4-12% Bis-Trisゲル (Novex、カタログno. NP0322BOX)

【0454】

5) MV4-11細胞中のCOX1およびCOX4タンパク質レベルに及ぼす影響

図1～図5中のウェスタンブロットにおいて示すように、5つの化合物の全ては、化合物濃度が増大するにつれ、ミトコンドリア翻訳されるCOX1タンパク質の発現を引き下げた一方、COX4およびアクチンレベルは、比較的不变のままであった。

【0455】

化合物3a、チゲサイクリン、およびシタラビンで処理したときの、MV4-11の遺伝子発現変化

MV411細胞を24ウェルプレート内に約 1×10^5 / mlにおいて入れて、RPMI 1640 / 10% FBS中で37℃ / 5% CO₂において一晚増殖させて、ウェルから、Qiagen RNeasyキットを用いて、RNA調製用に収穫した。サンプルを3反復でプレップして、約100ngの全インプットRNAを用いて、cDNAを作製した。qPCRアッセイを、市販のプライマー／プローブ設計を用いて、Applie

10

20

30

40

50

d Biosystems Step One Plus 機器でランした。MV411 M
T-COX1 発現（シトクロムオキシダーゼサブユニット1、ミトコンドリア内で発現さ
れる）についての結果を図9に示す。MV411 COX-IV 発現（シトクロムオキシ
ダーゼサブユニット4、核内で発現される）についての結果を図10に示す。MV411
PIG3 発現（TP53I3-a p53 応答タンパク質、p53 活性化に応じて誘導され
る発現、酸化ストレスに対する応答に関連した役割）についての結果を図11に示す。M
V411 BAX 発現（p53 活性化によるアポトーシス促進性タンパク質発現誘導、B
CL2 とヘテロダイマーを形成してアポトーシスを誘導する）についての結果を図12に
示す。CDKN2A 発現（p14^{ARF} または ARF-核遺伝子としても知られており、翻
訳が、cMy c によって調節され、Mdm2 に結合してこれを封鎖することにより、p5
3 を安定化／活性化するように機能する）の結果を図13に示す。

10

【0456】

実施例3：実施例の化合物の合成

以下の略語を以下の段落で用いる。

Ac アセチル

aq 水溶液

9-BBN 9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン

BHT t-ブチルヒドロキシトルエン

Bn ベンジル

Boc tert-ブトキシカルボニル

20

Bu ブチル

dba ジベンジリデンアセトン

DCE 1,2-ジクロロエタン

DCM ジクロロメタン

DEM ジエトキシメタン

DIBAL-H 水素化ジイソブチルアルミニウム

DIEA ジイソプロピルエチルアミン

DMAP 4-(ジメチルアミノ)ピリジン

DME ジメトキシエタン

DMF N,N-ジメチルホルムアミド

30

DMPU 1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミドン

DMSO ジメチルスルホキシド

DPPB 1,4-ビス(ジフェニルホスフィンブタン)

ESI ESIイオン化

Et エチル

eq 当量

h 時間

HPLC 高性能液体クロマトグラフィー

i イソ

IBX 2-ヨードキシ安息香酸

40

LDA リチウムジイソプロピルアミド

LHMDS リチウムビス(トリメチルシリル)アミド

M-D Michael-Dieckmann アンヌレーション

MHz メガヘルツ

Ms メチルスルホニル

MS 質量分析法

MTBE メチル t-ブチルエーテル

m/z 質量/電荷比

MW 分子量

NCS N-クロロスクシンイミド

50

NDMBA 1,3-ジメチルバルビツール酸

NMO N-メチルモルホリンN-オキシド

NMR 核磁気共鳴分析法

Ph フェニル

Pr プロピル

s 第2級

t 第3級

TBAF テトラブチルアンモニウムフルオリド

TEA トリエチルアミン

Tf トリフルオロメタンスルホニル

TFA トリフルオロ酢酸

TFAA 無水トリフルオロ酢酸

THF テトラヒドロフラン

TLC 薄層クロマトグラフィー

TMEDA N,N,N',N'-テトラメチルエチレンジアミン

TMP 2,2,6,6-テトラメチルピペリジン

STAB ナトリウムトリアセトキシボロヒドリド








【0457】

本明細書中で「K-数字」（例えば、K1、K2、K43、K44その他）と呼ぶ化合物は、以下の表3Aおよび表3Bに記載する手順に従って調製したものである。

【0458】

【表40】

表3A

化合物番号					合成手順
	R ⁴	R ⁷	R ⁹	X	
K43				CH	脚注1参照
K44				CH	脚注1参照
K45				N	脚注3参照
K46				N	脚注3参照

【0459】

10






















20

30

40

50

【表 4 1】

化合物番号					合成手順 脚注1参照
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	X	
K47				CH	脚注1参照
K48				CH	脚注4参照
K49				CH	脚注4参照
K50				CH	脚注4参照
K51				CH	脚注4参照
K52				CH	脚注4参照
K53				CH	脚注4参照
K54				CH	脚注4参照
K55				CH	脚注4参照
K56				CH	脚注3参照

【0 4 6 0】

10
















20

30

40

50

【表 4 2】

化合物番号					合成手順 脚注3参照
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	X	
K57				CH	脚注3参照
K58				CH	脚注3参照
K59				CH	脚注3参照
K60				CH	脚注3参照
K61				CH	脚注3参照
K62				CH	脚注3参照
K63				CH	脚注3参照

【 0 4 6 1 】

10





20

30

40

50

【表 4 3】

K64				CH	脚注3参照
K65				CH	脚注3参照

¹ 米国特許第9,573,895B2号明細書に記載される手順に従って製造される化合物であり、この出願の全教示内容が、参照により本明細書に援用される。

10

² 米国特許第9,315,451B2号明細書に記載される手順に従って製造される化合物であり、この出願の全教示内容が、参照により本明細書に援用される。

³ 米国特許第9,624,166B2号明細書に記載される手順に従って製造される化合物であり、この出願の全教示内容が、参照により本明細書に援用される。

⁴ 米国特許第8,906,887B2号明細書に記載される手順に従って製造される化合物であり、この出願の全教示内容が、参照により本明細書に援用される。

【 0 4 6 2 】

20








30

40

50

【表 4 4】

表3B

化合物No.				合成法
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	
	K1			
K2				脚注5参照
K3				脚注6参照
K4				脚注5参照
K5				脚注5参照
K6				脚注7参照

10

20



















30

【 0 4 6 3 】

40

50

【表 4 5】

化合物No.				合成法
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	
K7				脚注6参照
K8				脚注7参照
K9				脚注6参照
K10				脚注6参照
K11				脚注6参照
K12				脚注6参照
K13				脚注6参照
K14				脚注6参照
K15				脚注6参照

【0 4 6 4】

10



















20

30

40

50

【表 4 6】

化合物No.				合成法
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	
K16				脚注6参照
K17				脚注6参照
K18				脚注6参照
K19				脚注6参照
K20				脚注5参照
K21				脚注5参照
K22				脚注7参照
K23				脚注6参照
K24				脚注6参照

【 0 4 6 5 】

10

















20

30

40

50

【表 4 7】

化合物No.				合成法
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	
K25				脚注5参照
K26				脚注5参照
K27				脚注6参照
K28				脚注6参照
K29				脚注6参照
K30				脚注8参照
K31				脚注6参照
K32				脚注6参照
K33				脚注6参照

【 0 4 6 6 】

10















20

30

40

50

【表 4 8】

化合物No.				合成法
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	
K34				脚注6参照
K35				脚注6参照
K36				脚注6参照
K37				脚注5参照
K38				脚注5参照
K39				脚注6参照
K40				脚注6参照

【 0 4 6 7 】

10







20

30

40

50

【表 4 9】

K41				脚注6参照
K42				脚注6参照

⁵ 米国特許第9,573,895B2号明細書に記載される手順に従って製造される化合物であり、この出願の全教示内容が、参照により本明細書に援用される。

⁶ 米国特許第9,315,451号明細書に記載される手順に従って製造される化合物であり、この出願の全教示内容が、参照により本明細書に援用される。

⁷ 米国特許第9,624,166号明細書に記載される手順に従って製造される化合物であり、この出願の全教示内容が、参照により本明細書に援用される。

⁸ 米国特許第8,906,887号明細書に記載される手順に従って製造される化合物であり、この出願の全教示内容が、参照により本明細書に援用される。


【0468】

本明細書中で開示するさらなる実施例の化合物を以下に記載するスキーム1～スキーム21に従って調製した。

【0469】

【化274】

スキーム1



以下の化合物をスキーム1に従って調製した。

10


20

30

40

50

【化 2 7 5】




一般的な手順 A (脱アリル化) : 化合物 S 1 - 1 (4 9 8 m g 、 0 . 5 6 m m o l 、 1 当量、国際公開第 2 0 1 4 / 0 3 6 5 0 2 号が挙げられる文献の手順に従って調製した)、1, 3 - ジメチルバルビツール酸 (4 3 9 m g 、 2 . 8 1 m m o l 、 5 当量)、および $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (3 2 m g 、 0 . 0 2 8 m m o l 、 0 . 0 5 当量) の混合物に D C M (5 m L) を窒素下で加えた。生じた反応溶液を室温において 5 時間攪拌した。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 (バブリング) でクエンチした。得られた反応混合物を室温で 1 0 分間攪拌し、ジクロロメタン ($3 \times 1 0 \text{ mL}$) で抽出した。組み合わせた有機抽出物を無水硫酸ナトリウム上で乾燥させ、ろ過し、減圧下で濃縮した。1 0 % $\rightarrow$ 1 0 0 % の E t O A c / ヘキサンを用いたシリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって残渣を精製したところ、所望の生成物 S 1 - 2 (8 2 m g 、 1 7 % 、 M S (E S I) m/z 8 4 6 . 4 7 (M + H)) および S 1 - 3 (3 0 7 m g 、 6 8 %) が得られた。

S 1 - 3 : ^1H NMR (4 0 0 M H z , CDCl_3) δ 1 6 . 5 4 (s , 1 H) , 7 . 4 2 - 7 . 4 1 (m , 2 H) , 7 . 3 7 - 7 . 3 4 (m , 2 H) , 7 . 2 7 - 7 . 1 5 (m , 7 H) , 5 . 2 9 , 5 . 2 5 (A B q , J = 1 2 . 2 \text{ Hz} , 2 H) , 5 . 1 6 , 5 . 0 7 (A B q , J = 1 2 . 2 \text{ Hz} , 2 H) , 3 . 8 2 (b r s , 1 H) , 3 . 6 1 (t , J = 8 . 5 \text{ Hz} , 1 H) , 3 . 4 8 (s , 3 H) , 3 . 3 2 - 3 . 2 8 (m , 1 H) , 2 . 9 5 (d d , J = 4 . 3 , 1 5 . 3 \text{ Hz} , 1 H) , 2 . 6 9 - 2 . 5 9 (m , 1 H) , 2 . 5 2 - 2 . 4 3 (m , 2 H) , 2 . 1 8 - 1 . 9 8 (m , 5 H) , 1 . 8 8 - 1 . 7 3 (m , 2 H) , 1 . 5 6 - 1 . 3 8 (m , 2 H) , 0 . 9 0 (t , J = 7 . 3 \text{ Hz} , 3 H) , 0 . 6 3 (s , 9 H) , 0 . 1 1 (s , 3 H) , 0 . 0 0 (s , 3 H) ; M S (E S I) m/z 8 0 6 . 5 1 (M + H) .

【 0 4 7 0 】

【化 2 7 6】



一般的な手順 B - 1 (還元的アルキル化) : D C M (1 m L) 中のアミン S 1 - 3 (4 0 m g 、 0 . 0 5 m m o l 、 1 . 0 当量) の溶液に H O A c (5 . 7 μL 、 0 . 1 m m o l 、 2 当量) および S T A B (1 6 m g 、 0 . 0 8 m m o l 、 1 . 5 当量) を 0 $^{\circ}\text{C}$ において加えた。次に、プロピオンアルデヒド (3 . 6 μL 、 0 . 0 5 m m o l 、 1 . 0 当量) を加えた。生じた反応混合物を 0 $^{\circ}\text{C}$ において 2 時間攪拌した。飽和 NaHCO_3 を加えた。生じた混合物を D C M (1 0 m L) で抽出した。有機相を Na_2SO_4 上で乾燥させて、濾過して、減圧下で濃縮した。生じた粗生成物 S 1 - 4 - 1 を次の反応に直接用いた : M S (E S I) m/z 8 4 8 . 4 8 (M + H) .

【 0 4 7 1 】

10


20

30

40

50

【化 2 7 7】



一般的な手順 C (HF 脱シリル化) : HF 水溶液 (48 ~ 50 %, 0.1 mL) を室温において、ポリプロピレン反応容器中の CH₃CN (1 mL) 中の化合物 S1-4-1 (0.05 mmol, 1 当量) の溶液に添加した。混合物を室温で一晩激しく攪拌し、飽和 NaHCO₃ 水溶液 (3 mL) (激しくバブリング) にゆっくりと注いだ。得られた混合物を EtOAc (10 mL) で抽出した。有機相を塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウム上で乾燥させ、減圧下で濃縮した。残渣をさらに精製せずに次の工程にそのまま用いた (MS (ESI) m/z 734.40 (M+H))。

【0472】


一般的な手順 D-1 (包括的脱保護 (global deprotection)) : TFA (1 mL) 中の上述の中間体の溶液にジメチルスルフィド (0.1 mL) を加えた。生じた反応溶液を室温において一晩攪拌した。反応液を蒸発させて、残留物を水中 0.05 N HCl 中に溶解した。生じた溶液を、Phenomenex Polymerx 10 μ RP-γ 100A カラムを用いて、Waters Autopurification 系の分取逆相 HPLC によって精製した [10 μm, 150 × 21.20 mm; 流量、20 mL/分; 溶媒 A : 0.05 N HCl/水; 溶媒 B : CH₃CN; 注入容量 : 2.0 mL (0.05 N HCl/水); 勾配 : 20 分にわたる A 中 10 → 25 % の B; 質量による分別捕集 (mass-directed fraction collection)]。所望の生成物を含有する画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物 S1-5-1 (14.3 mg, 3 工程で 46 %) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.14 (s, 1H), 4.87–4.84 (m, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.87–3.81 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.37–3.29 (m, 2H), 3.28–3.07 (m, 4H), 3.01–2.88 (m, 2H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.43–2.24 (m, 5H), 1.83–1.73 (m, 2H), 1.64–1.54 (m, 1H), 1.26 (t, J = 7.3 Hz, 3H), 1.03 (t, J = 7.3 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 556.30 (M+H)。

【0473】

以下の化合物を、一般的な手順 B-1、C、および D-1 を用いることによって調製した。

【0474】

【化 2 7 8】




化合物 S1-5-2 を化合物 S1-3 およびアセトンから調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.15 (s, 1H), 4.90–4.85 (m, 1H), 3.99 (s, 1H), 3.88–3.82 (m, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.38–3.33 (m, 1H), 3.25 (dd, J = 16.0, 4.6 Hz, 1H), 3.20–3.08 (m, 2H), 3.02–2.94 (m, 1H), 2.8

7 (d, $J=12.4$ Hz, 1H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.42–2.37 (m, 5H), 1.65–1.56 (m, 1H), 1.44 (d, $J=6.4$ Hz, 3H), 1.40 (d, $J=6.4$ Hz, 3H), 1.26 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 556.31 (M+H).

【0475】

【化279】




10

化合物S1-5-3を化合物S1-3およびBocNHCH₂CHOから調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 三塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 4.09 (s, 1H), 3.78–3.87 (m, 3H), 3.68 (s, 3H), 3.60–3.65 (m, 1H), 3.39–3.43 (m, 2H), 2.93–3.24 (m, 5H), 2.55–2.62 (m, 1H), 2.23–2.40 (m, 6H), 1.52–1.62 (m, 1H), 1.25 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 557.3 (M+H).

【0476】

【化280】




20

化合物S1-5-4を化合物S1-3およびTBSOCH₂CHOから調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.12 (s, 1H), 4.01 (s, 1H), 3.80–3.91 (m, 4H), 3.67 (s, 3H), 3.39–3.50 (m, 2H), 3.05–3.24 (m, 4H), 2.88–3.00 (m, 2H), 2.55–2.61 (m, 1H), 2.20–2.40 (m, 5H), 1.55–1.62 (m, 1H), 1.25 (t, $J=8.0$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 558.3 (M+H).

【0477】

【化281】



30


化合物S1-5-5を化合物S1-3およびFCH₂CHO (国際公開第2011/146089A1号の文献の手順に従い、対応するアルコールから調製した) から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.13 (s, 1H), 4.03 (s, 1H), 3.69–3.88 (m, 4H), 3.66 (s, 3H), 3.25–3.38 (m, 3H), 3.05–3.23 (m, 2H), 2.89–3.00 (m, 2H), 2.55–2.61 (m, 1H), 2.21–2.42 (m, 6H), 1.56–1.66 (m, 1H), 1.23 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 560.3 (M+H).

40

50

【0478】


【化282】



化合物S1-5-6を化合物S1-3および $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CHO}$ （国際公開第2011/146089A1号の文献の手順に従い、対応するアルコールから調製した）から調製した。 ^1H NMR（400MHz， CD_3OD ，二塩酸塩） δ 7.03（s，1H），3.88（s，1H），3.69–3.75（m，1H），3.61–3.64（m，2H），3.67（s，3H），3.38–3.42（m，2H），3.30（s，3H），3.18–3.25（m，3H），2.95–3.15（m，2H），2.75–2.90（m，2H），2.45–2.51（m，1H），2.09–2.31（m，5H），1.44–1.54（m，1H），1.12（t， $J=7.2\text{Hz}$ ，3H）；MS（ESI） m/z 572.3（ $M+H$ ）。

【0479】


【化283】



化合物S1-5-7を化合物S1-3および $\text{BocN}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CHO}$ から調製した。 ^1H NMR（400MHz， CD_3OD ，三塩酸塩） δ 7.11（s，1H），4.09（s，1H），3.79–3.89（m，2H），3.67（s，3H），3.55–3.60（m，2H），3.30（s，3H），2.95–3.18（m，4H），2.79（s，3H），2.55–2.61（m，1H），2.21–2.31（m，6H），1.56–1.63（m，1H），1.25（t， $J=7.2\text{Hz}$ ，3H）；MS（ESI） m/z 571.3（ $M+H$ ）。

【0480】

【化284】




化合物S1-5-8を化合物S1-3および PhCHO から調製した。 ^1H NMR（400MHz， CD_3OD ，二塩酸塩） δ 7.55–7.62（m，2H），7.45–7.51（m，3H），7.09（s，1H），4.47–4.52（m，2H），3.80–3.75（m，2H），3.67（s，3H），3.09–3.23（m，4H），2.83–2.93（m，2H），2.55–2.61（m，1H），2.21–2.40（m，5H），2.00–2.08（m，1H），1.51–1.63（m，1H），1.25（t， $J=7.2\text{Hz}$ ，3H）；MS（ESI） m/z 604.3（ $M+$ ）。

H) .

【0481】

【化285】




一般的な手順B-1およびC、続いて以下の一般的な手順D-2を用いることにより、化合物S1-5-9を化合物S1-2 (44mg、0.052mmol、1当量) およびHCHOから調製した。

【0482】

一般的な手順D-2: Pd-C (10重量%、5mg) を部分的に室温においてCH₃OH (1mL) およびHCl/水 (1N、130μL、0.13mmol、2.5当量) の混合物中の上述の粗生成物の溶液に加えた。反応器をシールし、およびフラスコを短時間真空にしてから水素ガス (1気圧) でフラッシュすることによって水素でパージした。反応混合物を水素雰囲気 (1気圧) 下で室温において1時間30分間攪拌した。さらにPd-C (10重量%、5mg) を加えて、生じた反応混合物を水素雰囲気 (1気圧) 下で室温において1時間攪拌した。反応液を小さいセライトパッドで濾過した。ケーキをCH₃OHで洗浄した。濾液を濃縮した。残留物を、Phenomenex Polymerx 10μ RP-γ 100Aカラムを用いて、Waters Autopurification系の分取逆相HPLCによって精製した [10μm、150×21.20mm; 流量、2.0mL/分; 溶媒A: 0.05N HCl/水; 溶媒B: CH₃CN; 注入容量: 3.0mL (0.05N HCl/水); 勾配: 15分にわたるA中5→25%のB; 質量による分別捕集]。所望の生成物を含む画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物S1-5-9 (12.3mg) が得られた。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.15 (s, 1H), 4.96–4.89 (m, 1H), 3.84–3.81 (m, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.36–3.33 (m, 1H), 3.27–2.99 (m, 5H), 2.93 (s, 3H), 2.88–2.83 (m, 1H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.42–2.24 (m, 4H), 1.63–1.54 (m, 1H), 1.26 (t, J=7.3Hz, 3H); MS (ESI) m/z 528.23 (M+H)。

【0483】

【化286】




一般的な手順B-2 (アシル化/スルホニル化): DCM (3mL) 中の化合物S1-3 (43mg、0.053mmol、1当量) およびTEA (30μL、0.21mmol、4当量) の溶液に無水酢酸 (16μL、0.16mmol、3当量) を0℃において加えた。生じた反応混合物を0℃において攪拌して、一晩で室温まで温めた。反応液をDCMで希釈して、飽和重炭酸ナトリウムおよびブラインで洗浄した。生じた有機相を無水硫酸ナトリウム上で乾燥させて、濾過して、濃縮した。粗生成物を50℃でのHF脱シリル化のための一般的な手順C、および一般的な手順D-1に供して、S1-5-10 (11.2mg、3工程で36%) が得られた。

^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.04 (s, 1H), 3.79–3.85 (m, 2H), 3.69 (s, 3H), 3.05–3.21 (m, 4H), 2.90–3.00 (m, 1H), 2.53–2.70 (m, 2H), 2.21–2.45 (m, 6H), 2.05 (s, 3H), 1.51–1.60 (m, 1H), 1.25 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 556.3 (M+H).

【0484】

【化287】




10

化合物 S1-5-11 を化合物 S1-5-10 と同じ手順に従って化合物 S1-3 および Ms_2O から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.01 (s, 1H), 4.15 (m, 1H), 3.75–3.83 (m, 2H), 3.69 (s, 3H), 3.16–3.40 (m, 4H), 2.92–3.11 (m, 3H), 2.41–2.61 (m, 3H), 2.22–2.38 (m, 5H), 1.75–1.83 (m, 1H), 1.25 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 592.3 (M+H).

20

【0485】

【化288】



30

10 mL RBF 中のアミン S1-3 (48 mg, 0.06 mmol, 1.0 当量)、HOBt (12 mg, 0.09 mmol, 1.5 当量)、および EDC (17 mg, 0.09 mmol, 1.5 当量) の混合物に DCM (1 mL) を窒素下で加えた。その後、 Et_3N (21 μL , 0.12 mmol, 2 当量) およびサリチル酸 (9 mg, 0.07 mmol, 1.1 当量) を加えた。生じた反応混合物を室温において 5 日間攪拌した。生じた暗色の反応混合物を DCM (10 mL) で抽出した。有機相をブラインで洗浄して、 Na_2SO_4 上で乾燥させて、濾過して、減圧下で濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィー (10 g シリカゲルカラム、10~80% EtOAc /ヘキサン) によって精製して、所望の生成物 (13 mg, 23%) が得られた: MS (ESI) m/z 926.53 (M+H).

40


【0486】

上述の生成物を一般的な手順 C および D-1 に供して、化合物 S1-5-12 が得られた。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.83 (d, $J=7.3\text{ Hz}$, 1H), 7.40 (t, $J=7.3\text{ Hz}$, 1H), 7.03 (s, 1H), 6.94–6.90 (m, 2H), 5.07–5.06 (m, 1H), 3.81–3.76 (m, 2H), 3.65 (s, 3H), 3.21–3.06 (m, 4H), 2.98–2.94 (m, 1H), 2.62–2.58 (m, 2H), 2.45–2.22 (m, 5H), 1.74–1.67 (m, 1H), 1.23 (t, $J=7.3\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 634.39 (M+H).

50

【0487】

【化289】




アミンS1-3 (82 mg、0.10 mmol、1.0当量) の溶液を一般的な手順Cに供して、脱シリル化された生成物74 mgが得られた。DCM (1 mL) 中のこの中間体 (42 mg、0.06 mmol、1.0当量) の溶液にHgCl₂ (33 mg、0.12 mmol、2.2当量) およびTEA (30 μL、0.21 mmol、3.5当量) を0℃において加えた。次に、1,3-ビス(tert-ブトキシカルボニル)-2-メチルイソチオ尿素 (39 mg、0.12 mmol、2.2当量) を加えた。生じた反応混合物を一晩攪拌しながら室温まで温めた。生じた反応混合物を濾過して、DCM (10 mL) で洗浄した。濾液を減圧下で濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィー (10 g シリカゲルカラム、10% CH₃OH / DCM) によって精製して、所望の生成物 (20 mg、35%) が得られた：MS (ESI) m/z 934.57 (M+H)。

【0488】

上述の生成物を一般的な手順D-1に供して、化合物S1-5-13が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.06 (s, 1H), 4.30 (s, 1H), 3.78–3.84 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.32–3.40 (m, 2H), 3.08–3.17 (m, 3H), 2.90–3.00 (m, 1H), 2.53–2.60 (m, 3H), 2.21–2.39 (m, 5H), 1.58–1.64 (m, 1H), 1.22 (t, J=6.8 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 556.3 (M+H)。

【0489】

【化290】



一般的な手順B-1を用いることにより、化合物S1-5-14を化合物S1-3およびBocNHCH₂CHOから調製した。次に、生じた生成物をジオキサン (1 mL) 中4N HClで30分間処理して、濃縮した。残留物を一般的な手順B-2、C、およびD-1に供して、所望の生成物S1-5-14が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.10 (s, 1H), 3.99 (s, 1H), 3.79–3.83 (m, 1H), 3.67 (s, 3H), 3.55–3.60 (m, 1H), 3.45–3.51 (m, 3H), 3.31–3.35 (m, 1H), 3.05–3.27 (m, 4H), 2.92–3.00 (m, 1H), 2.79–2.83 (m, 1H), 2.55–2.60 (m, 1H), 2.20–2.40 (m, 5H), 1.98 (s, 3H), 1.52–1.62 (m, 1H), 1.22 (t, J=7.2 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 599.3 (M+H)。

【0490】

10


20

30

40

50


【化 2 9 1】



化合物 S 1 - 5 - 1 5 を化合物 S 1 - 5 - 1 4 と同様に調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.08 (s, 1H), 4.05 (s, 1H), 3.78-3.85 (m, 2H), 3.68 (m, 5H), 3.45-3.52 (m, 6H), 3.09-3.20 (m, 2H), 2.89-3.00 (m, 2H), 2.55-2.62 (m, 1H), 2.21-2.51 (m, 6H), 1.53-1.63 (m, 1H), 1.23 (t, J = 7.2 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 635.3 (M + H).

【0 4 9 1】

【化 2 9 2】



一般的な手順 B - 3 (置換): DMF (0.7 mL) 中のアミン S 1 - 3 (42 mg、0.05 mmol、1.0 当量) の溶液に BrCH₂CO₂^tBu (8 μL、0.05 mmol、1 当量) および ⁱPr₂NEt (45 μL、0.25 mmol、5 当量) を加えた。生じた反応混合物を室温において一晩攪拌して、50 °C に 6 時間加熱した。生じた反応混合物を EtOAc で希釈して、ブラインで洗浄して、Na₂SO₄ 上で乾燥させて、濾過して、減圧下で濃縮した。残留物を次の反応に直接用いた。

【0 4 9 2】


次に、粗生成物を一般的な手順 C および D - 1 に供して、所望の生成物 S 1 - 5 - 1 6 が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.08 (s, 1H), 4.19 (s, 2H), 3.99 (s, 1H), 3.78-3.83 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.05-3.22 (m, 3H), 2.83-3.00 (m, 2H), 2.52-2.61 (m, 1H), 2.19-2.40 (m, 5H), 1.56-1.67 (m, 1H), 1.22 (t, J = 7.2 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 572.2 (M + H).

【0 4 9 3】

以下の化合物を一般的な手順 B - 3、C、および D - 1 を用いることによって調製した。

【0 4 9 4】

【化 2 9 3】




化合物 S 1 - 5 - 1 7 を化合物 S 1 - 3 および BrCH₂CONH₂ から調製した。¹H

NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 4.15 (s, 2H), 3.98 (s, 1H), 3.79–3.84 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.09–3.24 (m, 3H), 2.83–3.00 (m, 2H), 2.55–2.63 (m, 1H), 2.20–2.40 (m, 5H), 1.55–1.65 (m, 1H), 1.22 (t, J=7.2 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 571.3 (M+H).

【0495】

【化294】




10

化合物S1-5-18を化合物S1-3およびBrCH₂CO₂Meから調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 4.26 (s, 2H), 4.03 (s, 1H), 3.84 (s, 3H), 3.79–3.82 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.09–3.24 (m, 3H), 2.87–3.00 (m, 2H), 2.55–2.62 (m, 1H), 2.20–2.50 (m, 5H), 1.55–1.63 (m, 1H), 1.21 (t, J=7.2 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 586.3 (M+H).

20

【0496】

【化295】



30


CH₃OH (1 mL) 中の対応するC-4エピマー (71 mg、0.12 mmol、1当量、国際公開第2014/036502号が挙げられる文献の手順に従って調製した) の溶液にピリジン (38 μL、0.47 mmol、4当量) を室温において加えた。生じた反応溶液を室温において3日間攪拌した。反応液を濃縮して、黄色の固体が得られ、これを水中0.05 N HCl中に溶解した。生じた反応溶液を、Phenomenex Polymerx 10 μ RP-γ 100Aカラムを用いて、Waters Autopurification系の分取逆相HPLCによって精製した [10 μm、150×21.20 mm; 流量、20 mL/分; 溶媒A: 0.05 N HCl/水; 溶媒B: CH₃CN; 注入容量: 2.0 mL (0.05 N HCl/水); 勾配: 20分にわたるA中10→25%のB; 質量による分別捕集]。所望の生成物を含有する画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物S1-6-1 (27.2 mg、38%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.18 (s, 1H), 4.88–4.84 (m, 1H), 4.72 (d, J=4.0 Hz, 1H), 3.88–3.82 (m, 1H), 3.67 (s, 3H), 3.41–3.30 (m, 3H), 3.27–3.22 (m, 1H), 3.20–3.06 (m, 2H), 3.03–2.98 (m, 1H), 2.96–2.88 (m, 2H), 2.61–2.54 (m, 1H), 2.41 (t, J=14.8 Hz, 1H), 2.36–2.23 (m, 3H), 2.18–2.14 (m, 1H), 1.56–1.46 (m, 1H), 1.44 (t, J=7.2 Hz, 3H), 1.26 (t, J=7.6 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 541.4 (M+H).

40

50

【0497】

【化296】




DMF (4.4 mL) 中の7-メトキシ-8-[(2S)-1-エチル-2-ピロリジニル]-6-デメチル-6-デオキシテトラサイクリン (550 mg、0.89 mmol、1当量、Org. Process Res. Dev., 2016, 20(2), 284-296が挙げられる文献の手順に従って調製した) の懸濁液に水 (109 μ L) 中のNH₂OH (109 μ L、1.78 mmol、2当量) の溶液を室温において加えた。生じた反応混合物を80℃において一晩攪拌し、セプタム内の針で空気開放した。生じた暗褐色の反応溶液を室温に冷却して、攪拌しているMTBE (220 mL) 中に滴下して、懸濁液が得られた。

【0498】

固体を濾過によって収集して、MTBEで洗浄した。次に、固体を真空下で乾燥させた。次に、固体をTFA (4 mL) 中に溶解した。Pd/C (10 wt%、80 mg) を加えた。反応器をシールし、およびフラスコを短時間真空にしてから水素ガス (1 気圧) でフラッシュすることによって水素でパージした。反応混合物を水素雰囲気 (1 気圧) 下で室温において一晩攪拌した。さらにPd-C (10 重量%、80 mg) を加えて、生じた反応混合物を水素雰囲気 (1 気圧) 下で室温において一晩攪拌した。反応液を濃縮して、CH₃OHで希釈した。混合物を小さいセライトパッドで濾過した。ケーキを洗浄した。濾液を濃縮した。残留物を、Phenomenex Polymerx 10 μ RP-y 100 Aカラムを用いて、Waters Autopurification系の分取逆相HPLC CH₃OHによって精製した [10 μ m、150 $\times$ 21.20 mm; 流量、20 mL/分; 溶媒A: 0.05 N HCl/水; 溶媒B: CH₃CN; 注入容量: 3.0 mL (0.05 N HCl/水); 勾配: 15分にわたるA中10 $\rightarrow$ 20%のB; 質量による分別捕集]。所望の生成物を含有する画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物S1-6-2 (91 mg) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.12 (s, 1H), 4.93-4.85 (m, 1H), 4.76 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 3.86-3.81 (m, 1H), 3.67 (s, 3H), 3.37-3.31 (m, 1H), 3.25 (dd, J = 15.2, 4.0 Hz, 1H), 3.20-3.07 (m, 2H), 2.90-2.82 (m, 2H), 2.62-2.56 (m, 1H), 2.43 (t, J = 14.8 Hz, 1H), 2.36-2.23 (m, 3H), 2.16-2.12 (m, 1H), 1.53-1.43 (m, 1H), 1.25 (t, J = 7.2 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 514.36 (M+H)。

【0499】

【化297】




化合物S1-7-1を、国際公開第2014/036502号が挙げられる文献の手順に従って左手側 (LHS) のエナンチオマーおよびジアリルエノンS2-3から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 4.77 (dd, J = 10.8, 8.0 Hz, 1H), 3.92-3.86 (m, 2H), 3.75 (s, 3H), 3.37-3.29 (m, 1H), 3.25-3.10 (m, 3H)

), 3.01–2.93 (m, 1H), 2.68 (dt, $J=12.4$, 1.2 Hz, 1H), 2.63–2.54 (m, 1H), 2.38 (t, $J=14.8$ Hz, 1H), 2.32–2.24 (m, 3H), 2.17–2.07 (m, 1H), 1.64–1.55 (m, 1H), 1.28 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 514.36 (M+H).

【0500】

【化298】




10

化合物S1-7-2を、国際公開第2014/036502号が挙げられる文献の手順に従って標準的なLHSおよびジアリルエノンのエナンチオマーから調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.06 (s, 1H), 4.76 (dd, $J=10.4$, 7.6 Hz, 1H), 3.91–3.85 (m, 2H), 3.75 (s, 3H), 3.37–3.30 (m, 1H), 3.25–3.09 (m, 3H), 3.00–2.92 (m, 1H), 2.67–2.57 (m, 2H), 2.39 (t, $J=14.8$ Hz, 1H), 2.34–2.24 (m, 3H), 2.17–2.09 (m, 1H), 1.65–1.56 (m, 1H), 1.27 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 514.36 (M+H).

20

【0501】

【化299】



30

化合物S1-7-3を、国際公開第2014/036502号が挙げられる文献の手順に従ってLHSのエナンチオマーおよびジアリルエノンのエナンチオマーから調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.15 (s, 1H), 4.94–4.85 (m, 1H), 3.91 (s, 1H), 3.80–3.72 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.37–3.07 (m, 4H), 3.00–2.91 (m, 1H), 2.70–2.67 (m, 1H), 2.62–2.56 (m, 1H), 2.45–2.23 (m, 5H), 1.65–1.56 (m, 1H), 1.26 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 514.36 (M+H).


【0502】

40

50


【化 3 0 0】

スキーム2



以下の化合物をスキーム2に従って調製した。

【化 3 0 1】




【0 5 0 3】

化合物S2-1 (125mg、0.299mmol、1当量、文献：Org. Process Res. Dev., 2016, 20(2), 284-296の手順に従って調製した) およびNaBH₃CN (76mg、1.209mmol、4当量) をCH₂Cl₂ およびCH₃CN (0.8+0.8mL) の混合物に加えた。フラスコを0°Cに冷却してからトリフルオロ酢酸 (0.092mL、1.202mmol、4当量) およびトリフルオロアセトアルデヒド水和物 (H₂O中75%、0.240mL、1.50mmol、5当量) を加えた。冷浴を取り外して、生じた混合物を室温において2時間攪拌した。EtOAcを加えて、混合物を飽和NaHCO₃溶液で洗浄した。有機相をロトバブによって濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製して、無色の油として所望の生成物S2-2-1 (59mg、40%、未反応SMも回収され得る) が得られた。¹H NMR (400MHz, CDCl₃) δ 7.08-7.50 (m, 11H), 5.09-5.17 (m, 2H), 3.92-4.00 (m, 1H), 3.70 (s, 3H), 3.51-3.60 (m, 1H), 3.08-3.20 (m, 1H), 2.75-2.83 (m, 1H), 2.49-2.57 (m, 1H), 2.40 (s, 3H), 2.20-2.28 (m, 1H), 1.88-2.00 (m, 1H), 1.55-1.65 (m, 1H), 1.21-1.30 (m, 1H); MS (ESI) m/z 500.3 (M+H).

【0504】


【化302】



火力乾燥した丸底フラスコに化合物 S 2 - 1 (125 mg、0.299 mmol、1 当量)、NaBH₃CN (57 mg、0.907 mmol、3 当量)、および 4 Å 分子篩 (100 mg) を加えて、フラスコを減圧して、N₂ で再び満たした。次に、無水 CH₃OH (2 mL)、(1-エトキシシクロプロピル)トリメチルシラン (0.240 mL、1.193 mmol、4 当量)、および HOAc (0.086 mL、1.500 mmol、5 当量) を加えて、生じた混合物を 55℃ において 16 時間攪拌した。EtOAc を加えて、混合物をセライトで濾過した。濾液を飽和 NaHCO₃ 溶液で洗浄した。有機相をロトバブによって濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製して、無色の油として所望の生成物 S 2 - 2 - 2 (89 mg、65%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.10–7.58 (m, 10 H), 7.02 (s, 1 H), 5.11 (s, 2 H), 3.95–4.01 (m, 1 H), 3.71 (s, 3 H), 3.21–3.30 (m, 1 H), 2.55–2.63 (m, 1 H), 2.40 (s, 3 H), 2.20–2.30 (m, 1 H), 1.78–1.90 (m, 2 H), 1.55–1.70 (m, 2 H), 0.27–0.35 (m, 2 H), 0.00–0.16 (m, 2 H); MS (ESI) m/z 458.3 (M+H).

【0505】

【化303】



化合物 S 2 - 1 (125 mg、0.299 mmol、1 当量)、N,N-ジイソプロピルエチルアミン (DIPEA、0.105 mL、0.602 mmol、2 当量)、および NaI (5 mg、0.033 mmol、0.1 当量) を DMF (1 mL) 中に加えてから 2-フルオロエチルブロミド (0.045 mL、0.604 mmol、2 当量) を加えて、生じた混合物を室温において 21 時間攪拌した。EtOAc を加えて、ブライン溶液で洗浄した。有機相をロトバブによって濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製して、無色の油として所望の生成物 S 2 - 2 - 3 (79 mg、57%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.09–7.50 (m, 11 H), 5.10–5.15 (m, 2 H), 4.30–4.51 (m, 2 H), 3.70 (s, 3 H), 3.40–3.50 (m, 1 H), 2.79–2.90 (m, 1 H), 2.37 (s, 3 H), 2.30–2.35 (m, 1 H), 2.18–2.26 (m, 1 H), 1.82–2.00 (m, 2 H), 1.53–1.61 (m, 1 H), 1.21–1.30 (m, 1 H), 0.82–0.91 (m, 1 H); MS (ESI) m/z 464.3 (M+H).

【0506】

10


20

30

40

50


【化 3 0 4】



ピロリジン S 2 - 1 (8 . 7 4 m m o l 、 1 当量、原料) に N a I (1 0 m g) 、ジメチルホルムアミド (D M F 、 1 0 m L) 、およびトリエチルアミン (T E A 、 2 . 8 2 m L 、 2 0 . 2 3 1 m m o l) を加えて、0℃に冷却した。D M F (5 m L) 中の臭化ベンジル (1 . 6 5 0 m L 、 1 3 . 8 6 7 m m o l) の溶液を加えた。反応混合物を室温において3時間攪拌した。C H ₂ C l ₂ (1 0 0 m L) を加えて、生じた混合物をブライン溶液で洗浄した。有機相を減圧下で濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製して、白色の固体として所望の生成物 S 2 - 2 - 4 (3 . 8 3 g 、 3 工程で 8 6 %) が得られた。¹ H N M R (4 0 0 M H z , C D C l ₃) δ 7 . 0 9 - 7 . 5 9 (m , 1 6 H) , 5 . 1 2 - 5 . 2 0 (m , 2 H) , 3 . 8 0 - 3 . 9 0 (m , 2 H) , 3 . 7 4 (s , 3 H) , 3 . 0 3 - 3 . 1 2 (m , 1 H) , 2 . 4 1 (s , 3 H) , 2 . 2 0 - 2 . 3 0 (m , 2 H) , 1 . 8 0 - 1 . 9 4 (m , 2 H) , 1 . 6 0 - 1 . 7 0 (m , 2 H) ; M S (E S I) m / z 5 0 8 . 3 (M + H) .

【 0 5 0 7 】


【化 3 0 5】



T r C l (8 7 m g 、 0 . 3 1 m m o l 、 1 . 0 当量) および T E A (4 8 μ L 、 0 . 3 4 m m o l 、 1 . 1 当量) を C H ₂ C l ₂ (3 m L) 中 S 2 - 1 (1 3 0 m g 、 0 . 3 1 m m o l 、 1 当量) に室温において加えた。反応混合物を室温において3日間攪拌して、D C M で希釈した。生じた溶液を飽和 N a H C O ₃ およびブラインで洗浄して、M g S O ₄ 上で乾燥させて、減圧下で濃縮して、黄色の固体として所望の生成物 S 2 - 2 - 5 が得られた。この粗生成物をさらなる精製なしでその後の反応に用いた。

【 0 5 0 8 】

【化 3 0 6】




一般的な手順 E (M i c h a e l - D i e c k m a n n アンヌレーション) : n - B u L i (7 0 μ L 、ヘキサン中 2 . 5 M 、 0 . 1 7 m m o l 、 1 . 4 当量) を T H F (1 m L) 中のジイソプロピルアミン (2 3 μ L 、 0 . 1 7 m m o l 、 1 . 4 当量) および T E A ・ H C l (1 m g 、 0 . 0 0 5 当量) の溶液に - 5 0 ° C において滴加した。反応混合物を - 2 0 ° C まで温めて、 - 7 0 ° C 未満に再冷却した。T H F (1 m L) 中の S 2 - 2 - 1 (5 9 m g 、 0 . 1 2 m m o l 、 1 当量) の溶液を、カニューレを介して、 - 7 3 ° C 未満において 1 0 分 にわたって滴加した。生じた赤オレンジ色の溶液を - 7 8 ° C において 1 時間攪拌して、E t O H / 液体 N ₂ バスを用いて - 1 0 0 ° C に冷却した。T H F (1 m L) 中のエノン S 2 - 3 の溶液 (6 4 m g 、 0 . 1 2 m m o l 、 1 当量、国際公開第 2 0 1 4 / 0 3 6 5 0 2 号が挙げられる文献の手順に従って調製した) を反応混合物に加えてから

LHMDS (120 μ L, THF中1.0M、0.12mmol、1当量)を続けた。反応混合物を -15°C まで徐々に温めて、その温度において45分間攪拌した。飽和水性NH₄Cl (20mL) 溶液を反応液に加えた。反応混合物をEtOAc (40mL) で抽出した。有機相をブライン (20mL) で洗浄して、Na₂SO₄上で乾燥させて、減圧下で濃縮した。0%→50% EtOAc/ヘキサンを用いたシリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーにより、黄色の固体として所望の生成物S2-4-1 (59mg、53%) が得られた。¹H NMR (400MHz, CDCl₃) δ 16.2 (s, 1H), 7.28–7.51 (m, 8H), 6.83–6.95 (m, 3H), 5.79–5.90 (m, 2H), 5.10–5.27 (m, 7H), 3.99–4.13 (m, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.03–3.67 (m, 7H), 2.57–2.80 (m, 6H), 1.19–1.26 (m, 6H), 0.85 (s, 9H), 0.27 (s, 3H), 0.15 (s, 3H); MS (ESI) m/z 940.3 (M+H).

【0509】


【化307】



一般的な手順Aを用いることにより、化合物S2-4-2をS2-2-2およびS2-3から調製した。¹H NMR (400MHz, CDCl₃) δ 16.1 (s, 1H), 7.09–7.50 (m, 9H), 6.70–7.00 (m, 2H), 5.60–5.75 (m, 2H), 4.95–5.13 (m, 7H), 3.98–4.08 (m, 5H), 3.59 (s, 3H), 3.07–3.21 (m, 4H), 2.15–2.50 (m, 4H), 1.55–1.75 (m, 6H), 1.13–1.21 (m, 5H), 0.77 (s, 9H), 0.17 (s, 3H), 0.04 (s, 3H); MS (ESI) m/z 898.3 (M+H).

【0510】

【化308】



一般的な手順Aを用いることにより、化合物S2-4-3をS2-2-4およびS2-3から調製した。¹H NMR (400MHz, CDCl₃) δ 16.1 (s, 1H), 7.10–7.41 (m, 14H), 6.71–6.89 (m, 2H), 5.69–5.71 (m, 2H), 4.98–5.18 (m, 9H), 3.98–4.07 (m, 2H), 3.65–3.79 (m, 1H), 3.60 (s, 3H), 3.00–3.28 (m, 4H), 2.30–2.57 (m, 4H), 2.10–2.21 (m, 2H), 1.69–1.82 (m, 3H), 1.10–1.20 (m, 3H), 0.73 (s, 9H), 0.17 (s, 3H), 0.04 (s, 3H); MS (ESI) m/z 948.3 (M+H).

【0511】

10


20

30

40

50

【化 3 0 9】




一般的な手順 A、C、および D-1 を用いることにより、化合物 S2-9-1 を S2-4-1 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.08 (s, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.70–3.74 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.55–3.62 (m, 2H), 3.10–3.25 (m, 2H), 2.90–3.00 (m, 1H), 2.60–2.65 (m, 1H), 2.35–2.50 (m, 3H), 2.15–2.25 (m, 3H), 2.00–2.10 (m, 1H), 1.58–1.64 (m, 1H); MS (ESI) m/z 568.3 (M+H).

10

【0512】

以下の化合物を化合物 S2-9-1 と同様に調製した。

【化 3 1 0】




20

S2-9-2: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 3.91 (s, 1H), 3.77–3.83 (m, 1H), 3.70 (s, 3H), 3.50–3.57 (m, 1H), 3.21–3.27 (m, 1H), 2.87–3.00 (m, 2H), 2.55–2.70 (m, 2H), 2.21–2.44 (m, 6H), 1.58–1.65 (m, 1H), 0.85–0.91 (m, 2H), 0.63–0.70 (m, 1H), 0.30–0.40 (m, 1H); MS (ESI) m/z 526.3 (M+H).

【化 3 1 1】


30



S2-9-3: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.12 (s, 1H), 3.92–3.96 (m, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.60 (s, 3H), 3.40–3.51 (m, 4H), 3.21–3.26 (m, 1H), 2.90–2.98 (m, 1H), 2.55–2.78 (m, 2H), 2.21–2.45 (m, 6H), 1.55–1.82 (m, 2H); MS (ESI) m/z 532.3 (M+H).

40

【化 3 1 2】




S2-9-4: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.31–7.42 (m, 5H), 7.02 (s, 1H), 4.21–4.36 (m, 2H), 3.89 (s, 1H), 3.65 (s, 3H), 3.56–3.62 (m, 1H), 3.42–3.50 (m, 1H), 3.18–3.22 (m, 1H), 2.89–2.97 (m, 1

50

H), 2.55–2.65 (m, 2H), 2.21–2.49 (m, 6H), 1.55–1.65 (m, 1H); MS (ESI) m/z 576.3 (M+H).

【0513】


【化313】



一般的な手順Eを用いることにより、化合物S2-9-5をS2-2-5およびS2-3から調製した。生じた生成物をTHF中の0.5N HCl (83 μ Lの6N HCl水溶液を917 μ LのTHFに加えた) で室温において45分間処理した。次に、飽和NaHCO₃をゆっくり加えて、EtOAcで抽出した。次に、有機溶液をブラインで洗浄して、Na₂SO₄上で乾燥させて、濾過して、濃縮した。一般的な手順B-1に続いて、一般的な手順A、C、D-1を用いることにより、残留物をHCHOでメチル化して、化合物S2-9-5が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.10 (s, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.78–3.85 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.32–3.38 (m, 1H), 3.21–3.28 (m, 1H), 2.90–3.00 (m, 1H), 2.79 (s, 3H), 2.55–2.68 (m, 2H), 2.21–2.41 (m, 6H), 1.55–1.65 (m, 1H); MS (ESI) m/z 500.2 (M+H).

【0514】


【化314】



一般的な手順AおよびCに続いて、C-4アミノ基のBoc保護を用いることにより、化合物S2-7をS2-4-3 (3.47 g, 3.92 mmol) から製造した。したがって、S2-6 (R=Bn) が、DCM (30 mL) 中のBoc₂O (655 mg, 3.0 mmol) およびTEA (0.6 mL) と室温において4時間反応した。反応混合物をフラッシュカラムクロマトグラフィー (50 g シリカゲル、0～60% EtOAc / ヘキサン) によって濃縮して、精製して、黄色の油として所望の生成物S2-7 (1.14 g, 4工程で33%) が得られた。

【0515】

【化315】



化合物2-7 (1.14 g, 1.34 mmol) を1N HCl水溶液 (1.34 mL, 1当量)、THF (6 mL)、およびCH₃OH (6 mL) の混合物中に溶解した。Pd-C (10重量%、110 mg) を一部加えた。反応器をシールし、およびフラスコを短時間真空にしてから水素ガス (1気圧) でフラッシュすることによって水素でパージした。反応混合物を水素雰囲気 (1気圧) 下で室温において二晩攪拌した。反応液を小さいセライトパッドで濾過した。ケーキをCH₃OHで洗浄した。濾液を濃縮した。残留物を

MTBEから再スラリー化して、黄色の固体として生成物S2-8が得られた。これをさらなる精製なしで以下の還元的アルキル化反応に用いた：MS (ESI) m/z 586.2 (M+H)。

【0516】

一般的な手順F（還元的アルキル化）：0℃のCH₃OH（1mL）中のピロリジンS2-8（1当量）の溶液にアルデヒド／ケトン（4当量）、HOAc（4当量）、およびNaBH(OAc)₃（4当量）を加えた。生じた反応混合物を0℃において1時間以上攪拌し、これをLC-MSによって監視した。

【0517】


一般的な手順G（Bocの脱保護）：還元的アミノ化の完了後、濃HCl（0.5mL）を加えた。生じた混合物を室温において0.5時間攪拌した。有機溶媒を減圧下で除去して、分取HPLCにより、黄色の固体として所望の生成物が得られた。

【0518】

注釈：ケトンおよび4-ピリジンカルボキシアルデヒドは、還元的アミノ化に非常に長い時間を必要とした。

【0519】

【化316】




一般的な手順Gを用いることにより、化合物S2-9-6を化合物S2-8から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 6.96 (s, 1H), 3.91 (s, 1H), 3.71 (s, 3H), 3.40–3.47 (m, 1H), 3.30–3.35 (m, 1H), 3.20–3.25 (m, 1H), 2.88–2.95 (m, 1H), 2.63–2.67 (m, 1H), 2.39–2.50 (m, 2H), 2.15–2.30 (m, 5H), 1.58–1.65 (m, 1H); MS (ESI) m/z 486.2 (M+H)。

【0520】

以下の化合物を、一般的な手順FおよびGを用いることにより、化合物S2-8から調製した。

【化317】



S2-9-7: ¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.09 (s, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.78–3.88 (m, 1H), 3.67 (s, 3H), 3.34–3.38 (m, 1H), 3.22–3.28 (m, 1H), 2.94–3.05 (m, 4H), 2.55–2.65 (m, 2H), 2.21–2.49 (m, 5H), 1.55–1.82 (m, 3H), 0.88–0.94 (t, J=8.0Hz, 3H); MS (ESI) m/z 528.2 (M+H)。

10


20

30

40

50


【化318】



S2-9-8: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.19 (s, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.39–3.48 (m, 2H), 3.27–3.11 (m, 4H), 2.89–2.96 (m, 1H), 2.55–2.71 (m, 2H), 2.37–2.45 (m, 1H), 2.21–2.31 (m, 3H), 1.55–1.65 (m, 1H), 1.28 (t, $J=6.0\text{ Hz}$, 6H); MS (ESI) m/z 528.3 ($M+H$).

10


【化319】



S2-9-9: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.13 (s, 1H), 3.92–3.97 (m, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.72–3.80 (m, 3H), 3.70 (s, 3H), 3.37–3.41 (m, 1H), 3.15–3.20 (m, 3H), 2.90–3.00 (m, 1H), 2.55–2.70 (m, 2H), 2.20–2.41 (m, 5H), 1.57–1.67 (m, 1H); MS (ESI) m/z 530.2 ($M+H$).

20


【化320】



30

S2-9-10: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 3.85–3.91 (m, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.38–3.48 (m, 4H), 2.90–3.00 (m, 1H), 2.73–2.81 (m, 1H), 2.68–2.78 (m, 3H), 2.23–2.41 (m, 5H), 1.58–1.65 (m, 1H), 1.26–1.31 (m, 1H); MS (ESI) m/z 582.3 ($M+H$).

【化321】




40

S2-9-11: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.15 (s, 1H), 3.91–4.00 (m, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.69 (s, 3H), 3.40–3.50 (m, 1H), 3.20–3.41 (m, 4H), 2.93–3.04 (m, 1H), 2.56–2.71 (m, 2H), 2.19–2.51 (m, 5H), 1.54–1.65 (m, 1H), 0.98–1.07 (m, 1H), 0.58

50


- 0.77 (m, 2H), 0.32-0.40 (m, 1H), 0.20-0.27 (m, 1H); MS (ESI) m/z 540.3 (M+H).

【化322】




S2-9-12: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.17 (s, 1H), 3.83-3.91 (m, 2H), 3.70-3.75 (m, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.20-3.24 (m, 1H), 2.88-2.95 (m, 1H), 2.53-2.78 (m, 2H), 2.21-2.42 (m, 8H), 1.84-2.93 (m, 1H), 1.58-1.80 (m, 4H); MS (ESI) m/z 540.3 (M+H).

【化323】




S2-9-13: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.13 (s, 1H), 3.92 (s, 1H), 3.82-3.89 (m, 1H), 3.70 (s, 3H), 3.50-3.57 (m, 1H), 3.03-3.12 (m, 2H), 2.91-3.00 (m, 1H), 2.55-2.71 (m, 3H), 2.21-2.45 (m, 5H), 1.55-1.71 (m, 3H), 1.25-1.37 (m, 3H), 0.88-0.93 (m, 3H); MS (ESI) m/z 542.3 (M+H).

【化324】



S2-9-14: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.17 (s, 1H), 3.88-3.95 (m, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.45-3.51 (m, 1H), 3.23-3.30 (m, 4H), 2.82-3.05 (m, 3H), 2.55-2.70 (m, 2H), 2.23-2.45 (m, 3H), 1.93-2.00 (m, 1H), 1.57-1.63 (m, 1H), 0.89-0.95 (m, 6H); MS (ESI) m/z 542.3 (M+H).


【化325】



S2-9-15: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩, two isomers) δ 7.11+7.13 (s, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.40-3.48 (m, 1H), 3.10-3.18 (m, 1H), 2.90-3.00 (m, 1H), 2.52-2.63 (m, 2H), 2.38-2.48 (m


, 1 H), 2.20–2.31 (m, 5 H), 1.80–1.90 (m, 1 H), 1.56–1.62 (m, 2 H), 1.25–1.30 (m, 5 H), 0.88–0.93 (m, 3 H); MS (ESI) m/z 583.3 (M+H).

【化326】




S2-9-16: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 三塩酸塩) δ 7.30 (s, 1 H), 3.95–4.03 (m, 1 H), 3.90 (s, 1 H), 3.70 (s, 3 H), 3.39–3.51 (m, 5 H), 3.21–3.25 (m, 1 H), 2.94–3.02 (m, 1 H), 2.58–2.69 (m, 5 H), 2.31–2.43 (m, 5 H), 2.20–2.27 (m, 1 H), 1.55–1.65 (m, 1 H); MS (ESI) m/z 543.3 (M+H).

【化327】




S2-9-17: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.17 (s, 1 H), 3.92 (s, 1 H), 3.75–3.81 (m, 1 H), 3.68 (s, 3 H), 3.41–3.50 (m, 1 H), 2.90–3.00 (m, 1 H), 2.58–2.70 (m, 2 H), 2.20–2.42 (m, 6 H), 2.07–2.14 (m, 1 H), 1.50–1.90 (m, 8 H), 1.27–1.40 (m, 2 H); MS (ESI) m/z 554.3 (M+H).

【化328】



S2-9-18: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.12 (s, 1 H), 3.85–3.91 (m, 2 H), 3.72–3.75 (m, 2 H), 3.69 (s, 3 H), 3.39–3.43 (m, 5 H), 2.75–3.00 (m, 3 H), 2.58–2.69 (m, 4 H), 2.21–2.45 (m, 6 H), 1.58–1.67 (m, 2 H), 1.27–1.31 (m, 1 H); MS (ESI) m/z 556.3 (M+H).


【化329】



S2-9-19: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.14 (s, 1 H), 3.91 (s, 1 H), 3.81–3.88 (m, 1 H), 3.69 (s, 3 H), 3.25–3.50 (m, 3 H), 3.05–3.15 (m, 2 H), 2.90


- 3.00 (m, 1H), 2.55-2.70 (m, 2H), 2.22-2.58 (m, 5H), 1.47-1.70 (m, 4H), 0.87 (t, J=6.0 Hz, 6H); MS (ESI) m/z 556.3 (M+H).

【化330】




S2-9-20: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.13 (s, 1H), 3.78 (s, 1H), 3.69 (s, 3H), 3.41-3.50 (m, 2H), 2.80-2.92 (m, 3H), 2.50-2.61 (m, 3H), 2.18-2.33 (m, 5H), 1.61-1.88 (m, 4H), 1.27-1.31 (m, 1H), 0.85-0.97 (m, 6H); MS (ESI) m/z 556.3 (M+H).

【化331】




S2-9-21: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 3.91 (s, 1H), 3.82-3.90 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.02-3.10 (m, 2H), 2.90-3.00 (m, 1H), 2.55-2.70 (m, 2H), 2.21-2.45 (m, 6H), 1.55-1.70 (m, 4H), 1.18-1.31 (m, 7H), 0.83-0.91 (m, 3H); MS (ESI) m/z 570.4 (M+H).

【化332】



S2-9-22: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.45-3.51 (m, 1H), 3.07-3.12 (m, 1H), 2.90-3.00 (m, 1H), 2.55-2.67 (m, 2H), 2.38-2.43 (m, 1H), 2.20-2.31 (m, 5H), 2.05-2.11 (m, 1H), 1.88-2.00 (m, 3H), 1.59-1.67 (m, 3H), 1.11-1.42 (m, 6H); MS (ESI) m/z 568.3 (M+H).

【化333】



10

20


30

40

50

S 2-9-23: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.18 (s, 1H), 3.88-4.01 (m, 2H), 3.70-3.75 (m, 2H), 3.68 (s, 3H), 3.40-3.51 (m, 2H), 3.30-3.38 (m, 2H), 2.90-3.00 (m, 1H), 2.59-2.70 (m, 2H), 2.20-2.42 (m, 6H), 1.96-2.02 (m, 1H), 1.85-1.92 (m, 1H), 1.58-1.78 (m, 4H); MS (ESI) m/z 570.3 (M+H).


【化334】



10

S 2-9-24: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 三塩酸塩) δ 7.25 (s, 1H), 3.91 (s, 1H), 3.73-3.81 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 3.45-3.61 (m, 5H), 2.98-3.11 (m, 3H), 2.69-2.70 (m, 2H), 2.21-2.42 (m, 8H), 1.83-2.05 (m, 2H), 1.57-1.65 (m, 1H); MS (ESI) m/z 569.3 (M+H).

【化335】




20

S 2-9-25: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 三塩酸塩) δ 7.20 (s, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.72-3.80 (m, 1H), 3.70 (s, 3H), 3.53-3.61 (m, 5H), 3.05-3.18 (m, 3H), 2.83 (s, 3H), 2.60-2.70 (m, 2H), 2.23-2.41 (m, 8H), 1.93-2.15 (m, 2H), 1.58-1.63 (m, 1H); MS (ESI) m/z 583.3 (M+H).

30


【化336】



S 2-9-26: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.16 (s, 1H), 3.91 (s, 1H), 3.69 (s, 3H), 3.21-3.51 (m, 5H), 2.88-3.06 (m, 3H), 2.52-2.72 (m, 2H), 2.21-2.45 (m, 5H), 1.77-1.85 (m, 1H), 1.50-1.72 (m, 5H), 1.05-1.30 (m, 3H), 0.78-0.96 (m, 2H); MS (ESI) m/z 582.4 (M+H).


40

【化 3 3 7】




S 2 - 9 - 2 7 : ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 三塩酸塩) δ 8.80 – 8.89 (m, 2H), 8.12 – 8.20 (m, 2H), 7.22 (s, 1H), 4.58 – 4.63 (m, 2H), 3.88 – 3.95 (m, 2H), 3.65 (s, 3H), 3.47 – 3.55 (m, 1H), 3.21 – 3.30 (m, 1H), 3.03 – 3.11 (m, 1H), 2.85 – 2.95 (m, 1H), 2.58 – 2.77 (m, 2H), 2.25 – 2.41 (m, 5H), 1.50 – 1.61 (m, 1H); MS (ESI) m/z 577.3 ($\text{M} + \text{H}$).

【化 3 3 8】



S 2 - 9 - 2 8 : ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.69 (s, 3H), 3.39 – 3.45 (m, 2H), 3.15 – 3.20 (m, 1H), 2.93 – 3.00 (m, 1H), 2.38 – 2.61 (m, 4H), 2.20 – 2.31 (m, 5H), 1.95 – 2.01 (m, 3H), 1.60 – 1.80 (m, 5H), 1.37 – 1.51 (m, 7H); MS (ESI) m/z 582.3 ($\text{M} + \text{H}$).

【化 3 3 9】



S 2 - 9 - 2 9 : ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.12 (s, 1H), 3.73 – 3.78 (m, 1H), 3.68 (s, 3H), 2.78 – 2.83 (m, 2H), 2.41 – 2.55 (m, 3H), 2.25 – 2.31 (m, 6H), 2.11 – 2.18 (m, 1H), 1.95 – 2.01 (m, 1H), 1.70 – 1.80 (m, 4H), 1.45 – 1.52 (m, 8H), 1.25 – 1.30 (m, 3H); MS (ESI) m/z 596.3 ($\text{M} + \text{H}$).

【0 5 2 1】

10

20


30

40

50

【化 3 4 0】

スキーム3




10

20

以下の化合物をスキーム3に従って調製した。

【化 3 4 1】




【0 5 2 2】

化合物 S3-1 (1.88 g、5.0 mmol、1 当量、文献：Org. Process Res. Dev., 2016, 20 (2), 284-296 の手順に従って調製した) を CH₃OH (10 mL) 中に溶解して、オルトギ酸トリメチル (1.10 mL、10.05 mmol、2 当量) および p-トルエンスルホン酸一水和物 (29 mg、0.152 mmol、0.03 当量) を加えた。反応混合物を 70 °C において 24 時間攪拌した。飽和 NaHCO₃ および EtOAc を加えた。有機相を分離して、ロトバブによって濃縮して、フラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製して、黄色の油として所望の生成物 S3-2 (2.03 g、96%) が得られた。

¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.23-7.45 (m, 8 H), 7.05-7.11 (m, 3 H), 5.61 (s, 1 H), 5.15 (s, 2 H), 3.76 (s, 3 H), 3.36 (s, 6 H), 2.39 (s, 3 H); MS (ESI) m/z 423.2 (M+H).

【0 5 2 3】

【化 3 4 2】



30


40

50

一般的な手順 E に続いて酸処理を用いることにより、エノン S 2-3 によって化合物 S 3-4 を S 3-2 から調製した。M-D 生成物 S 3-3 (1.30 g、1.51 mmol、1 当量) を THF (20 mL) 中に溶解した。次に、3 N HCl/THF (4 mL) を加えて、最終の水性 HCl 濃度を 0.5 M にした。反応混合物を室温において 2 時間攪拌した。飽和 NaHCO₃ および EtOAc を加えた。有機相をロトバブによって濃縮して、残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製して、黄色の油として所望の生成物 S 3-4 (1.15 g、2 工程で 47%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 15.89 (s, 1H), 10.35 (s, 1H), 7.31–7.52 (m, 11H), 5.78–5.85 (m, 2H), 5.35 (s, 2H), 5.08–5.25 (m, 5H), 4.06–4.11 (m, 1H), 3.86 (s, 3H), 3.18–3.38 (m, 5H), 2.41–2.63 (m, 4H), 0.81 (s, 9H), 0.25 (s, 3H), 0.12 (s, 3H); MS (ESI) m/z 817.3 (M+H).

【0524】


【化343】



一般的な手順 B-1 に続いて、一般的な手順 A、C、および D-1 を用いることにより、化合物 S 3-7-1 をアルデヒド S 3-4 およびジエチルアミンから調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.01 (s, 1H), 4.34 (d, J=8.0, 1H), 4.30 (d, J=8.0, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.73 (s, 3H), 3.13–3.27 (m, 5H), 2.90–2.98 (m, 1H), 2.62–2.67 (m, 1H), 2.37–2.45 (m, 1H), 2.20–2.28 (m, 1H), 1.59–1.65 (m, 1H), 1.30–1.42 (m, 6H); MS (ESI) m/z 502.4 (M+H).

【0525】

【化344】



一般的な手順 B-1 を用いてから、再度一般的な手順 B-1 を用いてシクロプロパンカルボキサリドと反応させ、次いで A、C、および D-1 により、化合物 S 3-7-2 をアルデヒド S 3-4 およびベンジルアミンから調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 2 塩酸塩, 2 回転異性体) δ 7.40–7.60 (m, 5H), 6.83+6.93 (s, 1H), 4.48–4.68 (m, 2H), 4.21–4.49 (m, 2H), 3.88+3.53 (s, 3H), 3.02–3.18 (m, 3H), 2.88–2.97 (m, 1H), 2.60–2.68 (m, 1H), 2.19–2.38 (m, 2H), 1.51–1.61 (m, 1H), 1.18–1.27 (m, 1H), 0.70–0.85 (m, 2H), 0.38–0.45 (m, 2H); MS (ESI) m/z 590.3 (M+H).

【0526】

10

20


30

40

50


【化 3 4 5】

スキーム4



以下の化合物をスキーム4に従って調製した。

【化 3 4 6】




【0 5 2 7】

化合物 S 4 - 1 (5 0 4 m g 、 1 . 1 3 m m o l 、 1 当量、文献：O r g . P r o c e s s R e s . D e v . , 2 0 1 6 , 2 0 (2) , 2 8 4 - 2 9 6 の手順に従って調製した) を CH_2Cl_2 (3 m L) 中に溶解して、 N_2 下で -78°C まで冷却してから BBr_3 溶液 (CH_2Cl_2 中 1 . 0 M 、 3 . 4 m L 、 3 . 4 m m o l 、 3 当量) を 5 分間滴加した。生じた黄色の混合物を -78°C において 4 . 5 時間攪拌して、 CH_3OH (2 m L) によって注意深くクエンチした。 CH_2Cl_2 (4 0 m L) を暗色の溶液に加えて、飽和 NaHCO_3 で洗浄した。有機相をロトバブによって濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィー ($0 \rightarrow 55\% \text{ EtOAc} / \text{ヘキサン}$) によって精製して、黄色の油として所望の生成物 S 4 - 2 (3 1 2 m g 、 8 1 %) が得られた。 $^1\text{H NMR}$ (4 0 0 M H z , CDCl_3) δ 1 1 . 6 5 (b r s , 1 H) , 1 0 . 2 5 (b r s , 1 H) , 7 . 3 9 - 7 . 4 7 (m , 2 H) , 7 . 1 5 - 7 . 3 0 (m , 3 H) , 6 . 6 6 (s , 1 H) , 3 . 3 9 - 3 . 5 5 (m , 2 H) , 3 . 7 9 - 3 . 8 8 (m , 1 H) , 2 . 5 8 (s , 3 H) , 2 . 2 0 - 2 . 4 3 (m , 3 H) , 1 . 9 0 - 2 . 1 1 (m , 3 H) , 1 . 1 0 - 1 . 2 3 (m , 3 H) ; M S (E S I) m / z 3 4 2 . 2 (M + H) .

【0 5 2 8】

【化 3 4 7】



化合物 S 4 - 2 (1 4 1 m g 、 0 . 4 1 3 m m o l 、 1 当量) および 4 - ジメチルアミノピリジン (D M A P 、 8 m g 、 0 . 0 6 6 m m o l 、 0 . 1 6 当量) を CH_3CN (1 m L) 中に溶解して、生じた溶液を 0°C まで冷却した。 CH_3CN (1 . 0 m L) 中の二

炭酸ジ-tert-ブチル (Boc₂O、90 mg、0.413 mmol、1当量) の溶液をゆっくり加えた。反応混合物を室温まで温めると、白色の沈殿物が出現した。一晚攪拌した後、CH₂Cl₂ (100 mL) を加えて、飽和 NaHCO₃ によって洗浄した。有機相をロトバブによって濃縮して、フラッシュカラムクロマトグラフィー (0→50% EtOAc/ヘキサン) によって精製して、白色の固体として所望の生成物 S4-3 (136 mg、75%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 11.62 (br s, 1H), 7.38–7.45 (m, 2H), 7.21–7.30 (m, 3H), 6.75 (s, 1H), 3.50–3.55 (m, 1H), 3.37–3.42 (m, 1H), 2.88–2.95 (m, 1H), 2.35 (s, 3H), 2.17–2.31 (m, 3H), 1.86–2.00 (m, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.08–1.14 (m, 3H); MS (ESI) m/z 442.2 (M+H).


【注釈：この生成物は、DCM、EtOAc、および CH₃OH 中で溶解性が低く、簡単な再結晶から精製することができるはずである。】

【0529】

一般的な手順 H (C7-OH アルキル化)：フェノール S4-3 および K₂CO₃ を DMF 中に加えてから R-Br/KI または R-I を加えて、生じた混合物を室温または 50°C において、示した時間攪拌した。EtOAc を加えて、ブライン溶液で洗浄した。有機相をロトバブによって濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製して、無色の油として所望の生成物 S4-4-1～S4-4-5 が得られた。

【0530】


【化348】



フェノール S4-3 (125 mg、0.283 mmol、1当量) を DMF (2 mL) 中の K₂CO₃ (60 mg、0.434 mmol、1.5当量)、KI (5 mg、0.030 mmol、0.1当量)、および BnBr (0.031 mL、0.286 mmol、1当量) で室温において 18 時間処理して、生成物 S4-4-1 (111 mg、74%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.21–7.51 (m, 1H), 4.81 (s, 2H), 3.65–3.71 (m, 1H), 3.30–3.39 (m, 1H), 2.59–2.65 (m, 1H), 2.46 (s, 3H), 2.05–2.21 (m, 2H), 1.57–1.95 (m, 3H), 1.42 (s, 9H), 1.20–1.25 (m, 1H), 1.00–1.09 (m, 3H); MS (ESI) m/z 532.3 (M+H).

【0531】

【化349】




フェノール S4-3 (88 mg、0.199 mmol、1当量) を DMF (2 mL) 中の K₂CO₃ (41 mg、0.297 mmol、1.5当量)、KI (3 mg、0.018 mmol、0.1当量)、および C₂H₅Br (0.030 mL、0.402 mmol、2当量) で 50°C において 23 時間処理して、生成物 S4-4-2 (81 mg、86%) が得られた。

）が得られた。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.35–7.43 (m, 2H), 7.20–7.30 (m, 4H), 4.06–4.12 (m, 1H), 3.75–3.82 (m, 2H), 3.57–3.65 (m, 1H), 3.31–3.38 (m, 1H), 2.55–2.62 (m, 1H), 2.40 (s, 3H), 2.15–2.25 (m, 2H), 1.78–1.85 (m, 2H), 1.53–1.62 (m, 2H), 1.41 (s, 9H), 1.20–1.25 (m, 2H), 0.97–1.05 (m, 3H); MS (ESI) m/z 470.3 ($M+H$).

【0532】


【化350】



フェノールS4-3 (89 mg、0.202 mmol、1当量)をDMF (2 mL)中の K_2CO_3 (41 mg、0.297 mmol、1.5当量)および $n\text{-C}_3\text{H}_7\text{I}$ (0.039 mL、0.401 mmol)で50℃において24時間処理して、生成物S4-4-3 (98 mg、90%)が得られた。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.38–7.45 (m, 2H), 7.21–7.28 (m, 4H), 4.05–4.11 (m, 1H), 3.70–3.81 (m, 2H), 3.30–3.37 (m, 1H), 2.56–2.63 (m, 1H), 2.40 (s, 3H), 2.15–2.22 (m, 2H), 1.78–1.85 (m, 2H), 1.55–1.66 (m, 2H), 1.41 (s, 9H), 1.20–1.27 (m, 2H), 1.00–1.15 (m, 6H); MS (ESI) m/z 484.3 ($M+H$).

【0533】

【化351】



フェノールS4-3 (220 mg、0.499 mmol、1当量)をDMF中の K_2CO_3 (104 mg、0.753 mmol、1.5当量)、KI (9 mg、0.054 mmol、0.1当量)、および $(\text{CH}_3)_2\text{CHBr}$ (0.470 mL、5.00 mmol、10当量)で50℃において40時間処理して、生成物S4-4-4 (133 mg、55%)が得られた。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.38–7.45 (m, 2H), 7.21–7.28 (m, 4H), 4.07–4.16 (m, 2H), 3.65–3.71 (m, 1H), 3.30–3.40 (m, 1H), 2.52–2.61 (m, 1H), 2.40 (s, 3H), 2.15–2.26 (m, 2H), 1.78–1.95 (m, 2H), 1.50–1.60 (m, 2H), 1.42 (s, 9H), 1.20–1.35 (m, 5H), 0.98–1.05 (m, 3H); MS (ESI) m/z 484.3 ($M+H$).

【0534】

10


20

30

40

50

【化 3 5 2】




フェノール S 4 - 3 (8 9 m g 、 0 . 2 0 2 m m o l 、 1 当量) を D M F (2 m L) 中の K_2CO_3 (4 1 m g 、 0 . 2 9 7 m m o l 、 1 . 5 当量) 、 K I (3 m g 、 0 . 0 1 8 m m o l 、 0 . 1 当量) 、 および $n-C_4H_9Br$ (0 . 1 9 3 m L 、 1 . 7 9 m m o l 、 9 当量) で 5 0 ° C に お い て 5 3 時 間 処 理 し て 、 生 成 物 S 4 - 4 - 5 (7 5 m g 、 7 5 %) が 得 ら れ た 。 ^1H NMR (4 0 0 M H z , $CDCl_3$) δ 7 . 2 1 - 7 . 4 3 (m , 6 H) , 4 . 0 8 - 4 . 1 3 (m , 2 H) , 3 . 6 9 - 3 . 7 5 (m , 2 H) , 3 . 3 0 - 3 . 3 6 (m , 1 H) , 2 . 5 6 - 2 . 6 3 (m , 1 H) , 2 . 4 0 (s , 3 H) , 2 . 1 5 - 2 . 2 2 (m , 2 H) , 1 . 7 5 - 1 . 8 2 (m , 2 H) , 1 . 5 0 - 1 . 5 5 (m , 2 H) , 1 . 4 3 (s , 9 H) , 1 . 2 0 - 1 . 2 7 (m , 3 H) , 0 . 9 7 - 1 . 0 5 (m , 6 H) ; MS (ESI) m/z 4 9 8 . 3 (M + H) .

【 0 5 3 5 】

以下の化合物を、一般的な手順 E、A、C、および D - 1 を用いることにより、対応する左手側 S 4 - 4 およびエノン S 2 - 3 から調製した。


【化 3 5 3】



【 0 5 3 6 】


S 4 - 4 - 1 を 左 手 側 と し て 用 い た と き に 、 最 終 工 程 に お い て 、 化 合 物 S 4 - 7 - 1 が S 4 - 7 - 2 と 一 緒 に 副 生 成 物 と し て 単 離 さ れ た 。 ^1H NMR (4 0 0 M H z , CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7 . 4 7 - 7 . 5 1 (m , 1 H) , 6 . 9 1 (s , 1 H) , 4 . 6 9 - 4 . 7 6 (m , 1 H) , 3 . 8 2 - 3 . 9 0 (m , 2 H) , 3 . 1 1 - 3 . 2 0 (m , 3 H) , 2 . 9 0 - 2 . 9 8 (m , 1 H) , 2 . 6 2 - 2 . 6 7 (m , 1 H) , 2 . 4 5 - 2 . 5 2 (m , 1 H) , 2 . 2 0 - 2 . 3 0 (m , 5 H) , 1 . 5 5 - 1 . 6 2 (m , 1 H) , 1 . 2 5 (t , J = 5 . 6 H z , 3 H) ; MS (ESI) m/z 5 0 0 . 3 (M + H) .

【化 3 5 4】



S 4 - 7 - 2 : ^1H NMR (4 0 0 M H z , CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7 . 3 2 - 7 . 4 0 (m , 5 H) , 6 . 9 8 (s , 1 H) , 4 . 6 8 - 4 . 7 2 (m , 2 H) , 4 . 4 7 - 4 . 5 1 (m , 1 H) , 3 . 8 9 (s , 1 H) , 3 . 6 7 - 3 . 7 2 (m , 1 H) , 2 . 9 2 - 3 . 1 1 (m , 4 H) , 2 . 6 1 - 2 . 6 7 (m , 1 H) , 2 . 4 5 - 2 . 5 2 (m , 1 H) , 2 . 0 0 - 2 . 2 5 (m , 5 H) , 1 . 7 5 - 1 . 8 1 (m , 1 H) , 1 . 5 5 - 1 . 6 2 (m , 1 H) , 1 . 2 8 (t , J = 5 . 6 H z , 3 H) ; MS (ESI) m/z 5 9 0 . 3 (M + H) .


【化 3 5 5】



S 4 - 7 - 3 : ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.09 (s, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.78–3.88 (m, 2H), 3.68–3.75 (m, 1H), 3.32–3.40 (m, 2H), 3.05–3.22 (m, 3H), 2.90–2.98 (m, 1H), 2.53–2.62 (m, 2H), 2.21–2.40 (m, 5H), 1.55–1.64 (m, 1H), 1.39 (t, $J=5.6\text{ Hz}$, 3H); 1.25 (t, $J=5.6\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 528.2 ($M+H$).

10

【化 3 5 6】




20

S 4 - 7 - 4 : ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.09 (s, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.79–3.85 (m, 1H), 3.69–3.75 (m, 1H), 3.57–3.63 (m, 1H), 3.32–3.40 (m, 2H), 3.06–3.22 (m, 3H), 2.89–2.96 (m, 1H), 2.55–2.62 (m, 2H), 2.21–2.40 (m, 6H), 1.79–1.86 (m, 1H), 1.55–1.64 (m, 1H), 1.23 (t, $J=5.6\text{ Hz}$, 3H); 1.05 (t, $J=5.6\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 542.3 ($M+H$).

【化 3 5 7】


30



S 4 - 7 - 5 : ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.11 (s, 1H), 3.99–4.06 (m, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.75–3.82 (m, 1H), 3.32–3.40 (m, 2H), 3.02–3.21 (m, 3H), 2.88–2.94 (m, 1H), 2.53–2.67 (m, 2H), 2.20–2.38 (m, 6H), 1.55–1.65 (m, 1H), 1.36 (d, $J=7.6\text{ Hz}$, 3H), 1.21 (t, $J=6.0\text{ Hz}$, 3H); 1.12 (d, $J=7.6\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 542.3 ($M+H$).

40

【化 3 5 8】




50

S 4-7-6: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.09 (s, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.73-3.86 (m, 2H), 3.59-3.65 (m, 1H), 3.32-3.40 (m, 2H), 3.06-3.25 (m, 3H), 2.89-2.96 (m, 1H), 2.55-2.67 (m, 2H), 2.21-2.38 (m, 5H), 1.75-1.83 (m, 2H), 1.48-1.60 (m, 3H), 1.24 (t, $J=5.6\text{ Hz}$, 3H); 0.98 (t, $J=5.6\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 556.3 (M+H).

【0537】


【化359】

スキーム5



以下の化合物をスキーム5に従って調製した。

【化360】




【0538】

トルエン (15 mL) 中の化合物 S 5-1 (1.71 g、3.50 mmol、1 当量、文献: J. Med. Chem., 2013, 56, 8112-8138 の手順に従って調製した) および $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_4$ (404 mg、0.35 mmol、0.1 当量) の溶液にアリルトリブチルスズ (1.29 mL、4.2 mmol、1.2 当量) を窒素下で加えた。生じた反応混合物を、上部に冷水コンデンサを備える、予熱した油浴中で還流させた。反応液は、加熱して直ぐに澄明な溶液に変わった。反応液を20時間加熱して、室温まで冷却した。反応液をロトバブによって濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィー (50 g シリカゲル、1→10% EtOAc/ヘキサン) によって精製して、所望の生成物 S 5-2 (1.55 g、97%) が得られた。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 7.42-7.33 (m, 7H), 7.26-7.24 (m, 1H)

, 7.05–7.03 (m, 2H), 6.06–6.00 (m, 1H), 5.53 (d, $J=3.0\text{ Hz}$, 1H), 5.06–4.98 (m, 4H), 3.71–3.67 (m, 2H), 3.44 (d, $J=3.0\text{ Hz}$, 6H), 2.35 (s, 3H); MS (ESI) m/z 499.29 (M-H).

【0539】

【化361】




10

化合物 S5-2 (1.55 g、3.4 mmol、1 当量) を THF (9.17 mL) および 6 N HCl 水溶液 (0.83 mL) の予備混合溶液中に溶解した。生じた反応溶液を室温において 1 時間攪拌した。飽和 NaHCO₃ および EtOAc を加えた。有機相を分離して、ロトバブによって濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィー (50 g シリカゲル、1→10% EtOAc/ヘキサン) によって精製して、白色の固体として所望の生成物 S5-3 (1.24 g、90%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 10.46 (s, 1H), 7.41–7.34 (m, 7H), 7.27–7.24 (m, 1H), 7.05–7.03 (m, 2H), 6.05–5.96 (m, 1H), 5.06–5.03 (m, 1H), 4.98 (s, 2H), 4.98–4.91 (m, 1H), 3.87–3.86 (m, 2H), 2.40 (d, $J=2.4\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 403.27 (M-H).

20

【0540】

【化362】



30


化合物 S5-3 (702 mg、1.74 mmol、1 当量) および N-アリルグリシン・HCl (439 mg、2.89 mmol、1.7 当量) の混合物に DMF (8 mL) を窒素下で加えてから TEA (408 μ L、2.89 mmol、1.7 当量) を続けた。生じた反応混合物を 80°C において 1 時間 45 分間攪拌して、室温に冷却した。次に、生じた反応混合物を EtOAc と水に分配した。有機相を分離して、ブラインで洗浄して、減圧下で濃縮した。10%→40% EtOAc/ヘキサンを用いたシリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーにより、白色の固体として所望の生成物 S5-4-1 (650 mg、82%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.41–7.34 (m, 7H), 7.26–7.22 (m, 1H), 7.07–7.04 (m, 2H), 6.01–5.97 (m, 1H), 5.26–5.14 (m, 2H), 5.01 (s, 2H), 4.30 (br s, 1H), 3.79 (br s, 1H), 3.21–3.09 (m, 4H), 2.87 (br d, $J=15.9\text{ Hz}$, 1H), 2.52 (br s, 1H), 2.35 (s, 3H), 2.13 (br s, 1H), 1.66 (br s, 1H); MS (ESI) m/z 458.30 (M+H).

40

【0541】

50


【化 3 6 3】



化合物 S 5 - 3 (2 9 0 m g 、 0 . 7 2 m m o l 、 1 当量) およびサルコシン (7 6 m g 、 0 . 8 6 m m o l 、 1 . 2 当量) の混合物に DMF (3 m L) を窒素下で加えた。生じた反応混合物を 8 0 ° C において 2 時間 3 0 分間攪拌して、室温に冷却した。次に、生じた反応混合物を EtOAc と水に分配した。有機相を分離して、ブラインで洗浄して、減圧下で濃縮した。1 0 % → 1 0 0 % EtOAc / ヘキサンを用いたシリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーにより、白色の固体として所望の生成物 S 5 - 4 - 2 (2 5 0 m g 、 8 1 %) が得られた。¹H NMR (4 0 0 M H z , C D C l ₃) δ 7 . 4 1 - 7 . 3 4 (m , 7 H) , 7 . 2 6 - 7 . 2 2 (m , 1 H) , 7 . 0 6 - 7 . 0 4 (m , 2 H) , 5 . 0 4 , 5 . 0 0 (A B q , J = 1 1 . 0 H z , 2 H) , 4 . 0 9 (b r s , 1 H) , 3 . 2 4 - 3 . 1 2 (m , 3 H) , 2 . 8 8 (b r d , J = 1 2 . 8 H z , 1 H) , 2 . 6 4 (s , 3 H) , 2 . 5 6 (b r s , 1 H) , 2 . 3 5 (d , J = 1 . 8 H z , 3 H) , 2 . 2 1 - 2 . 1 2 (m , 1 H) , 1 . 7 6 - 1 . 6 9 (m , 1 H) ; MS (ESI) m / z 4 3 2 . 2 4 (M + H) .

【 0 5 4 2 】

【化 3 6 4】



化合物 S 5 - 3 (5 7 5 m g 、 1 . 4 2 m m o l 、 1 当量) および N - ベンジルグリシン・HCl (3 4 4 m g 、 1 . 7 1 m m o l 、 1 . 2 当量) の混合物に DMF (6 m L) を窒素下で加えてから TEA (3 0 2 μ L 、 2 . 1 3 m m o l 、 1 . 5 当量) を続けた。生じた反応混合物を 8 0 ° C において 2 時間 3 0 分間攪拌して、室温に冷却した。次に、生じた反応混合物を EtOAc と水に分配した。有機相を分離して、ブラインで洗浄して、減圧下で濃縮した。1 % → 2 0 % EtOAc / ヘキサンを用いたシリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーにより、白色の固体として所望の生成物 S 5 - 4 - 3 (6 0 0 m g 、 8 3 %) が得られた。¹H NMR (4 0 0 M H z , C D C l ₃) δ 7 . 4 2 - 7 . 3 0 (m , 1 2 H) , 7 . 2 6 - 7 . 2 2 (m , 1 H) , 7 . 0 8 - 7 . 0 5 (m , 2 H) , 5 . 0 3 (s , 2 H) , 4 . 3 9 (b r s , 2 H) , 3 . 6 3 - 3 . 6 1 (m , 1 H) , 3 . 1 6 - 3 . 1 2 (m , 2 H) , 2 . 8 9 - 2 . 8 6 (m , 2 H) , 2 . 4 4 - 2 . 4 2 (m , 1 H) , 2 . 3 8 (d , J = 1 . 8 H z , 3 H) , 2 . 0 8 (b r s , 1 H) , 1 . 6 0 - 1 . 5 6 (m , 1 H) ; MS (ESI) m / z 5 0 8 . 2 7 (M + H) .

【 0 5 4 3 】

10


20

30

40

50


【化 3 6 5】



一般的な手順 E を用いることにより、化合物 S 5 - 6 - 1 を S 5 - 4 - 1 (6 5 0 m g 、 1 . 4 2 m m o l 、 1 当量) および C - 4 ジメチルアミノエノン S 5 - 5 (6 9 0 m g 、 1 . 4 2 m m o l 、 1 当量) から調製した。生成物 S 5 - 6 - 1 (9 5 7 m g 、 ジアステレオマーの混合物、 8 0 %) : ^1H NMR (4 0 0 M H z , CDCl_3) δ 1 6 . 0 8 (s , 0 . 5 H) , 1 6 . 0 5 (s , 0 . 5 H) , 7 . 5 0 - 7 . 4 8 (m , 2 H) , 7 . 4 1 - 7 . 3 0 (m , 8 H) , 6 . 0 2 - 5 . 9 4 (m , 1 H) , 5 . 3 6 (s , 2 H) , 5 . 2 2 (b r d , J = 1 6 . 5 H z , 1 H) , 5 . 1 4 (b r d , J = 9 . 2 H z , 1 H) , 4 . 9 3 - 4 . 8 5 (m , 2 H) , 4 . 3 3 - 4 . 2 6 (m , 1 H) , 3 . 9 8 - 3 . 9 4 (m , 1 H) , 3 . 8 4 - 3 . 7 6 (m , 1 H) , 3 . 2 6 - 3 . 2 2 (m , 2 H) , 3 . 0 6 - 2 . 9 2 (m , 4 H) , 2 . 8 0 - 2 . 6 5 (m , 1 H) , 2 . 5 6 - 2 . 4 1 (m , 9 H) , 2 . 1 4 - 2 . 1 0 (m , 2 H) , 1 . 7 0 - 1 . 4 9 (m , 1 H) , 0 . 8 2 (s , 4 . 5 H) , 0 . 8 1 (s , 4 . 5 H) , 0 . 2 7 (s , 3 H) , 0 . 1 2 (s , 3 H) ; MS (ESI) m/z 8 4 6 . 6 2 (M + H) .

【 0 5 4 4 】


【化 3 6 6】



一般的な手順 E を用いることにより、化合物 S 5 - 6 - 2 を S 5 - 4 - 2 (2 5 0 m g 、 0 . 5 8 m m o l 、 1 当量) および C - 4 ジアリルアミノエノン S 2 - 3 (3 1 0 m g 、 0 . 5 8 m m o l 、 1 当量) から調製した。生成物 S 5 - 6 - 2 (4 2 1 m g 、 ジアステレオマーの混合物、 8 3 %) : ^1H NMR (4 0 0 M H z , CDCl_3) δ 1 5 . 8 4 (b r s , 1 H) , 7 . 4 1 - 7 . 3 9 (m , 2 H) , 7 . 2 9 - 7 . 2 3 (m , 8 H) , 5 . 7 5 - 5 . 6 5 (m , 1 H) , 5 . 2 6 (s , 2 H) , 5 . 1 3 - 5 . 0 9 (m , 2 H) , 5 . 0 2 - 5 . 0 0 (m , 2 H) , 4 . 8 2 - 4 . 6 8 (m , 2 H) , 3 . 9 7 - 3 . 9 5 (m , 1 H) , 3 . 2 4 - 2 . 8 8 (m , 1 0 H) , 2 . 5 5 - 2 . 3 4 (m , 7 H) , 2 . 0 9 - 2 . 0 1 (m , 2 H) , 0 . 7 1 (s , 4 . 5 H) , 0 . 6 9 (s , 4 . 5 H) , 0 . 1 6 (s , 1 . 5 H) , 0 . 1 5 (s , 1 . 5 H) , 0 . 0 0 (s , 3 H) ; MS (ESI) m/z 8 7 2 . 5 6 (M + H) .

【 0 5 4 5 】

【化 3 6 7】




一般的な手順 E を用いることにより、化合物 S 5 - 6 - 3 を S 5 - 4 - 3 (6 0 0 m g

、1.18mmol、1当量)およびC-4ジアリルアミノエノンS2-3(631mg、1.18mmol、1当量)から調製した。生成物S5-6-3のジアステレオマーB(S5-6-3B、405mg、36%)をフラッシュカラムクロマトグラフィーによって単離した。しかし、ジアステレオマーA(S5-6-3A、570mg、51%)を少量のジアステレオマーと混合した。S5-6-3A: ^1H NMR (400MHz, CDCl_3) δ 16.03 (s, 1H), 7.53–7.51 (m, 2H), 7.51–7.31 (m, 12H), 7.28–7.24 (m, 1H), 5.88–5.78 (m, 2H), 5.39 (s, 2H), 5.24 (d, $J=17.1\text{Hz}$, 2H), 5.14 (d, $J=9.8\text{Hz}$, 2H), 4.89–4.82 (m, 2H), 4.46–4.40 (m, 2H), 4.11 (d, $J=10.4\text{Hz}$, 1H), 3.67 (d, $J=12.8\text{Hz}$, 1H), 3.36–3.33 (m, 2H), 3.27–3.21 (m, 3H), 3.10–3.02 (m, 3H), 2.85–2.83 (m, 1H), 2.72–2.43 (m, 4H), 2.16 (d, $J=14.0\text{Hz}$, 1H), 2.05–2.02 (m, 1H), 1.58–1.45 (m, 2H), 0.85 (s, 9H), 0.28 (s, 3H), 0.14 (s, 3H). S5-6-3B: ^1H NMR (400MHz, CDCl_3) δ 16.03 (s, 1H), 7.53–7.51 (m, 2H), 7.43–7.30 (m, 12H), 7.26–7.24 (m, 1H), 5.88–5.78 (m, 2H), 5.39 (s, 2H), 5.24 (d, $J=17.1\text{Hz}$, 2H), 5.17 (d, $J=9.8\text{Hz}$, 2H), 4.91, 4.87 (ABq, $J=11.0\text{Hz}$, 2H), 4.13 (d, $J=9.8\text{Hz}$, 1H), 3.68 (br d, $J=12.2\text{Hz}$, 1H), 3.39–3.19 (m, 5H), 3.02–2.78 (m, 4H), 2.67–2.63 (m, 1H), 2.58–2.54 (m, 1H), 2.51–2.43 (m, 2H), 2.17 (br d, $J=14.6\text{Hz}$, 1H), 2.10–2.05 (m, 1H), 1.58–1.55 (m, 2H), 0.83 (s, 9H), 0.28 (s, 3H), 0.13 (s, 3H); MS (ESI) m/z 948.56 (M+H).

【0546】

【化368】



一般的な手順Aを用いることにより、化合物S5-7をS5-6-1(205mg、0.24mmol、1当量)から調製した(168mg、ジアステレオマーの混合物、86%): ^1H NMR (400MHz, CDCl_3) δ 7.66–7.61 (m, 1H), 7.53–7.44 (m, 3H), 7.38–7.32 (m, 6H), 5.36 (s, 2H), 4.98–4.82 (m, 3H), 3.95 (d, $J=10.4\text{Hz}$, 1H), 3.25–3.22 (m, 1H), 3.14–3.00 (m, 4H), 2.77–2.65 (m, 2H), 2.56–2.37 (m, 9H), 2.13 (br d, $J=14.6\text{Hz}$, 1H), 1.98–1.95 (m, 1H), 1.56–1.44 (m, 1H), 0.82 (s, 4.5H), 0.81 (s, 4.5H), 0.27 (s, 3H), 0.12 (s, 3H); MS (ESI) m/z 806.55 (M+H).

【0547】

10


20

30

40

50


【化 3 6 9】



一般的な手順Aを用いることにより、化合物S5-8-1およびS5-8-2をS5-6-2 (377mg、0.43mmol、1当量) から調製した。S5-8-1 (198mg、ジアステレオマーの混合物、58%) : MS (ESI) m/z 792.46 (M+H)。S5-8-2 (58mg、ジアステレオマーの混合物、16%) : MS (ESI) m/z 832.49 (M+H)。

【0548】


【化 3 7 0】



一般的な手順CおよびD-1を用いることにより、化合物S5-9-1をS5-7 (42mg、0.052mmol、1当量) から調製した。S5-9-1の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-1A: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.36 (d, $J=8.8\text{Hz}$, 1H), 4.11 (s, 1H), 3.50-3.45 (m, 1H), 3.36-3.33 (m, 2H), 3.27-3.18 (m, 2H), 3.12-2.89 (m, 9H), 2.50-2.42 (m, 1H), 2.34-2.22 (m, 2H), 1.86-1.77 (m, 1H), 1.68-1.58 (m, 1H)。S5-9-1B: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.36 (d, $J=8.8\text{Hz}$, 1H), 4.11 (s, 1H), 3.51-3.43 (m, 1H), 3.37-3.33 (m, 2H), 3.27-3.17 (m, 2H), 3.12-2.87 (m, 9H), 2.50-2.42 (m, 1H), 2.34-2.22 (m, 2H), 1.86-1.77 (m, 1H), 1.68-1.58 (m, 1H); MS (ESI) m/z 514.32 (M+H)。

【0549】

【化 3 7 1】




一般的な手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S5-9-2をS5-7 (21mg、0.026mmol、1当量) およびHCHOから調製した。S5-9-2の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-2A: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.22 (d, $J=8.8\text{Hz}$, 1H), 4.11 (s, 1H), 3.72-3.68 (m, 1H), 3.61-3.57 (m, 1H), 3.36-3.30 (m, 1H), 3.24-3.18 (m, 5H), 3.13-3.05 (m, 4H), 3.00-2.92 (m, 5H), 2.60-2.56 (m, 1H), 2.37-2.24 (m, 2H), 1.85-1.75 (m, 1H), 1.69-1.60 (m, 1H)。S5-9-2B: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.22 (d, $J=8.8\text{Hz}$, 1H), 4.11 (s, 1H), 3.72-3.68 (m, 1H), 3.61-3.57 (m, 1H), 3.36-3.30 (m, 1H), 3.24-3.18 (m, 5H), 3.13-3.05 (m, 4H), 3.00-2.92 (m, 5H), 2.60-2.56 (m, 1H), 2.37-2.24 (m, 2H), 1.85-1.75 (m, 1H), 1.69-1.60 (m, 1H)。

^3OD , 二塩酸塩) δ 5.21 (d, $J=8.4\text{ Hz}$, 1H), 4.11 (s, 1H), 3.72–3.68 (m, 1H), 3.61–3.57 (m, 1H), 3.35–3.30 (m, 1H), 3.26–3.20 (m, 5H), 3.13–3.05 (m, 4H), 3.01–2.89 (m, 5H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.36–2.23 (m, 2H), 1.85–1.79 (m, 1H), 1.69–1.59 (m, 1H); MS (ESI) m/z 528.27 ($M+H$).

【0550】


【化372】



一般的な手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S5-9-3をS5-7 (42mg、0.052mmol、1当量) および CH_3CHO から調製した。S5-9-3の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-3A: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.29 (d, $J=8.8\text{ Hz}$, 1H), 4.13 (s, 1H), 3.86–3.77 (m, 1H), 3.74–3.69 (m, 1H), 3.58–3.53 (m, 1H), 3.42–3.37 (m, 1H), 3.28–2.92 (m, 12H), 2.60–2.52 (m, 1H), 2.36–2.25 (m, 2H), 1.85–1.75 (m, 1H), 1.69–1.59 (m, 1H), 1.42 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 3H). S5-9-3B: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.27 (d, $J=8.8\text{ Hz}$, 1H), 4.12 (s, 1H), 3.85–3.78 (m, 1H), 3.75–3.70 (m, 1H), 3.57–3.54 (m, 1H), 3.42–3.37 (m, 1H), 3.28–3.19 (m, 2H), 3.14–2.90 (m, 10H), 2.60–2.52 (m, 1H), 2.34–2.25 (m, 2H), 1.86–1.76 (m, 1H), 1.68–1.59 (m, 1H), 1.44 (t, $J=7.6\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 542.37 ($M+H$).

【0551】

【化373】




一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S5-9-4をS5-6-1 (46mg、0.054mmol、1当量) から調製した。S5-9-4の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-4A: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.30 (d, $J=8.4\text{ Hz}$, 1H), 4.13 (s, 1H), 3.74–3.62 (m, 2H), 3.57–3.53 (m, 1H), 3.39–3.29 (m, 1H), 3.24–3.17 (m, 2H), 3.12–2.92 (m, 10H), 2.60–2.53 (m, 1H), 2.36–2.25 (m, 2H), 1.88–1.76 (m, 3H), 1.69–1.59 (m, 1H), 1.06 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 3H). S5-9-4B: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.28 (d, $J=8.4\text{ Hz}$, 1H), 4.11 (s, 1H), 3.74–3.61 (m, 2H), 3.56–3.53 (m, 1H), 3.34–3.29 (m,

1 H), 3.27–3.18 (m, 2 H), 3.12–2.92 (m, 10 H), 2.59–2.53 (m, 1 H), 2.32–2.25 (m, 2 H), 1.88–1.76 (m, 3 H), 1.67–1.57 (m, 1 H), 1.06 (t, J=7.6 Hz, 3 H); MS (ESI) m/z 556.33 (M+H).

【0552】


【化374】



一般的な手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S5-9-5をS5-7 (42 mg、0.052 mmol、1当量) およびPhCHOから調製した。S5-9-5の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-5A: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.56–7.53 (m, 2 H), 7.50–7.49 (m, 3 H), 5.44 (d, J=8.8 Hz, 1 H), 4.94 (d, J=13.2 Hz, 1 H), 4.48 (d, J=13.2 Hz, 1 H), 4.10 (s, 1 H), 3.61–3.57 (m, 1 H), 3.44–3.42 (m, 1 H), 3.34–3.30 (m, 2 H), 3.28–2.91 (m, 10 H), 2.58–2.52 (m, 1 H), 2.40–2.23 (m, 2 H), 1.76–1.64 (m, 2 H). S5-9-5B: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.58–7.56 (m, 2 H), 7.51–7.49 (m, 3 H), 5.43 (d, J=8.8 Hz, 1 H), 4.94 (d, J=13.2 Hz, 1 H), 4.51 (d, J=13.2 Hz, 1 H), 4.13 (s, 1 H), 3.62–3.58 (m, 1 H), 3.47–3.41 (m, 1 H), 3.34–3.20 (m, 3 H), 3.15–2.91 (m, 9 H), 2.58–2.52 (m, 1 H), 2.37–2.26 (m, 2 H), 1.78–1.64 (m, 2 H); MS (ESI) m/z 604.41 (M+H).

【0553】

【化375】




一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S5-9-6およびS5-9-7をS5-6-2 (44 mg、0.050 mmol、1当量) から調製した。S5-9-6の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した一方、S5-9-7をジアステレオマーの混合物として単離した。S5-9-6A: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 5.21 (d, J=9.2 Hz, 1 H), 3.88 (s, 1 H), 3.70–3.66 (m, 1 H), 3.60–3.57 (m, 1 H), 3.34–3.29 (m, 2 H), 3.26–3.16 (m, 6 H), 3.04–2.98 (m, 1 H), 2.94–2.85 (m, 2 H), 2.61–2.54 (m, 1 H), 2.35–2.22 (m, 2 H), 1.83–1.72 (m, 3 H), 1.61–1.51 (m, 1 H), 1.02 (t, J=7.1 Hz, 3 H). S5-9-6B: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 5.21 (d, J=8.7 Hz, 1 H), 3.89 (s, 1 H), 3.72–3.68 (m, 1 H), 3.61–3.57 (m, 1 H), 3.55–3.29 (m, 2 H), 3.26–3.19 (m, 6 H), 3.06–2

. 98 (m, 1H), 2.93–2.87 (m, 2H), 2.61–2.55 (m, 1H), 2.34–2.22 (m, 2H), 1.85–1.73 (m, 3H), 1.61–1.52 (m, 1H), 1.03 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 542.30 ($M+H$).

S5-9-7: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩, ジアステレオマーの混合物) δ 5.23–5.20 (m, 1H), 4.23 (s, 1H), 3.73–3.68 (m, 1H), 3.61–3.57 (m, 1H), 3.51–3.47 (m, 1H), 3.38–3.33 (m, 2H), 3.26–3.20 (m, 7H), 3.10–3.04 (m, 1H), 2.99–2.89 (m, 3H), 2.36–2.22 (m, 2H), 1.86–1.76 (m, 5H), 1.69–1.59 (m, 1H), 1.05–0.98 (m, 6H); MS (ESI) m/z 584.3 ($M+H$).

【0554】


【化376】



一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S5-9-8BをS5-6-3B (20 mg、0.021 mmol、1当量) から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.34 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.48–3.43 (m, 1H), 3.35–3.32 (m, 3H), 3.26–3.16 (m, 3H), 3.05–2.96 (m, 1H), 2.93–2.85 (m, 2H), 2.49–2.41 (m, 1H), 2.32–2.21 (m, 2H), 1.85–1.72 (m, 3H), 1.60–1.51 (m, 1H), 1.02 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 528.29 ($M+H$).

【0555】

【化377】




一般的な手順B-1およびAを用いることにより、化合物S5-9-9をS5-8-2 (58 mg、0.07 mmol、1当量) および HCHO から調製した。材料の半分を一般的な手順CおよびD-1に従って処理して、生成物S5-9-9が得られた。S5-9-9の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-9A: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.21 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 3.82 (s, 1H), 3.71–3.67 (m, 1H), 3.63–3.56 (m, 1H), 3.35–3.31 (m, 1H), 3.23–3.16 (m, 5H), 3.06–2.91 (m, 5H), 2.83–2.80 (m, 1H), 2.61–2.55 (m, 1H), 2.35–2.28 (m, 1H), 2.25–2.21 (m, 1H), 1.84–1.74 (m, 1H), 1.62–1.52 (m, 1H). S5-9-9B: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.20 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 3.81 (s, 1H), 3.72–3.68 (m, 1H), 3.61–3.56 (m, 1H), 3.35–3.30 (m, 1H), 3.26–3.18 (m, 5H), 3.06–2.97 (m, 1H), 2.95–2.89 (m, 4H), 2.83–2.76 (m, 1H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.36–2.28 (m, 1H),

2.25–2.20 (m, 1H), 1.85–1.75 (m, 1H), 1.63–1.53 (m, 1H); MS (ESI) m/z 514.27 (M+H).

【0556】


【化378】



一般的な手順CおよびD-1を用いることにより、化合物S5-9-10をS5-8-1 (30mg、0.38mmol、1当量) から調製して、生成物S5-9-10が得られた。S5-9-10の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-10A: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.22 (d, $J=8.8\text{Hz}$, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.72–3.67 (m, 1H), 3.62–3.57 (m, 1H), 3.35–3.28 (m, 1H), 3.23–3.17 (m, 5H), 3.04–2.91 (m, 2H), 2.72–2.65 (m, 1H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.37–2.30 (m, 1H), 2.28–2.23 (m, 1H), 1.84–1.77 (m, 1H), 1.64–1.54 (m, 1H). S5-9-10B: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.21 (d, $J=9.2\text{Hz}$, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.72–3.68 (m, 1H), 3.62–3.57 (m, 1H), 3.35–3.29 (m, 1H), 3.25–3.19 (m, 5H), 3.04–2.96 (m, 1H), 2.93–2.87 (m, 1H), 2.69–2.65 (m, 1H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.36–2.23 (m, 2H), 1.86–1.76 (m, 1H), 1.64–1.54 (m, 1H); MS (ESI) m/z 500.26 (M+H).

【0557】

【化379】




一般的な手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S5-9-11をS5-8-1および CH_3CHO から調製して、生成物S5-9-11が得られた。S5-9-11の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-11A: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.22 (d, $J=8.4\text{Hz}$, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.71–3.68 (m, 1H), 3.62–3.57 (m, 1H), 3.46–3.39 (m, 1H), 3.38–3.28 (m, 2H), 3.23–3.17 (m, 5H), 3.05–2.99 (m, 1H), 2.96–2.91 (m, 1H), 2.87–2.83 (m, 1H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.36–2.23 (m, 2H), 1.84–1.74 (m, 1H), 1.62–1.52 (m, 1H), 1.36 (t, $J=7.2\text{Hz}$, 3H). S5-9-11B: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 5.21 (d, $J=8.4\text{Hz}$, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.72–3.68 (m, 1H), 3.64–3.55 (m, 1H), 3.48–3.41 (m, 1H), 3.38–3.28 (m, 2H), 3.26–3.18 (m, 5H), 3.07–2.99 (m, 1H), 2.96–2.84 (m, 2H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.36–2.22 (m, 2H),

1.84–1.74 (m, 1H), 1.66–1.52 (m, 1H), 1.36 (t, J = 7.2 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 528.23 (M+H).

【0558】

【化380】




10

一般的な手順B-1を用いることにより、および再度B-1をHCHOにより用いることにより、続いて一般的な手順CおよびD-1により、化合物S5-9-12をS5-8-1およびCH₃CHOから調製して、生成物S5-9-12が得られた。S5-9-12の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-12A: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 5.22 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 4.23 (s, 0.5H), 4.14 (s, 0.5H), 3.71–3.67 (m, 1H), 3.61–3.56 (m, 1H), 3.50–3.46 (m, 1H), 3.35–3.30 (m, 2H), 3.24–3.17 (m, 5H), 3.10–3.02 (m, 2.5H), 2.95–2.91 (m, 3.5H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.36–2.22 (m, 2H), 1.84–1.74 (m, 1H), 1.67–1.58 (m, 1H), 1.43–1.39 (m, 3H). S5-9-12B: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 5.21 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 4.23 (s, 0.5H), 4.14 (s, 0.5H), 3.73–3.68 (m, 1H), 3.62–3.57 (m, 1H), 3.52–3.47 (m, 1H), 3.38–3.30 (m, 2H), 3.26–3.20 (m, 5H), 3.09–2.88 (m, 6H), 2.61–2.57 (m, 1H), 2.36–2.22 (m, 2H), 1.85–1.75 (m, 1H), 1.67–1.58 (m, 1H), 1.44–1.39 (m, 3H); MS (ESI) m/z 542.30 (M+H).

20

【0559】

【化381】



一般的な手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S5-9-13をS5-8-1およびCH₃CHOから調製して、生成物S5-9-13が得られた。S5-9-13の2つのジアステレオマーを分取逆相HPLCによって分離した。S5-9-13A: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 5.22 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 4.25 (s, 1H), 3.72–3.67 (m, 1H), 3.62–3.54 (m, 2H), 3.48–3.43 (m, 2H), 3.35–3.28 (m, 2H), 3.25–3.17 (m, 5H), 3.09–3.02 (m, 1H), 2.94–2.90 (m, 1H), 2.62–2.54 (m, 1H), 2.36–2.26 (m, 2H), 1.84–1.75 (m, 1H), 1.69–1.59 (m, 1H), 1.41 (t, J = 7.2 Hz, 6H). S5-9-13B: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 5.21 (d, J = 9.2 Hz, 1H), 4.25 (s, 1H), 3.73–3.68 (m, 1H), 3.63–3.55 (m, 2H), 3.50–3.4

40


50

2 (m, 2H), 3.36–3.28 (m, 2H), 3.25–3.19 (m, 5H), 3.12–3.02 (m, 1H), 2.95–2.89 (m, 1H), 2.62–2.54 (m, 1H), 2.34–2.23 (m, 2H), 1.85–1.75 (m, 1H), 1.68–1.59 (m, 1H), 1.41 (t, $J = 7.2 \text{ Hz}$, 6H); MS (ESI) m/z 556.29 (M+H).

【0560】


【化382】

スキーム6



以下の化合物をスキーム6に従って調製した。

【化383】



【0561】

一般的な手順Eを用いることにより、化合物S6-2を化合物S6-1（国際公開第2011/025982A2号が挙げられる文献の手順に従って調製した）およびジアリルエノンS2-3から調製した。

$^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 15.91 (s, 1H), 7.65 (d, $J = 9.2 \text{ Hz}$, 1H), 7.51–7.44 (m, 4H), 7.40–7.27 (m, 6H), 6.93 (d, $J = 9.2 \text{ Hz}$, 1H), 5.85–5.75 (m, 2H), 5.36 (s, 2H), 5.30–5.19 (m, 4H), 5.11 (d, $J = 10.0 \text{ Hz}$, 2H), 4.09 (d, $J = 10.4 \text{ Hz}$, 1H), 3.35–3.32 (m, 2H), 3.22–3.12 (m, 3H), 2.96–2.92 (m, 2H), 2.52–2.45 (m, 2H), 2.14–2.10 (m, 1H), 0.82 (s, 9H), 0.28 (s, 3H), 0.14 (s, 3H); MS (ESI) m/z 827.60 (M+H).

【0562】

10


20

30

40

50


【化 3 8 4】



一般的な手順Aを用いることにより、化合物S6-3およびS6-4を化合物S6-2から調製した。S6-3： ^1H NMR (400MHz, CDCl_3) δ 16.41 (s, 1H), 7.64 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 7.52–7.46 (m, 4H), 7.42–7.30 (m, 6H), 6.95 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 5.45, 5.35 (ABq, $J=12.0\text{ Hz}$, 2H), 5.31, 5.24 (ABq, $J=12.8\text{ Hz}$, 2H), 4.00 (br s, 1H), 3.07–3.03 (m, 1H), 2.88–2.79 (m, 1H), 2.69–2.66 (m, 1H), 2.42 (t, $J=15.2\text{ Hz}$, 1H), 2.17–2.12 (m, 1H), 1.47–1.38 (m, 1H), 0.74 (s, 9H), 0.23 (s, 3H), 0.10 (s, 3H); MS (ESI) m/z 747.50 ($M+H$). S6-4: MS (ESI) m/z 787.55 ($M+H$).

【0563】


【化 3 8 5】



一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S6-6-1を化合物S6-3から調製した。 ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.75 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 6.95 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 3.90 (br s, 1H), 3.22–3.17 (m, 1H), 3.04–2.96 (m, 1H), 2.63 (dt, $J=12.4, 2.0\text{ Hz}$, 1H), 2.54 (t, $J=14.8\text{ Hz}$, 1H), 2.22 (ddd, $J=13.2, 4.8, 2.0\text{ Hz}$, 1H), 1.63–1.54 (m, 1H); MS (ESI) m/z 455.30 ($M+H$).

【0564】

【化 3 8 6】




一般的な手順B-1、C、およびD-2を用いることにより、HCHOにより、化合物S6-6-2およびS6-6-3を化合物S6-4から調製した。S6-6-2： ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.75 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 6.94 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 3.83 (br s, 1H), 3.19–3.15 (m, 1H), 3.06–2.98 (m, 1H), 2.91 (s, 3H), 2.82–2.79 (m, 1H), 2.51 (t, $J=14.8\text{ Hz}$, 1H), 2.20 (ddd, $J=13.2, 5.2, 2.4\text{ Hz}$, 1H), 1.60–1.51 (m, 1H); MS (ESI) m/z 469.30 ($M+H$). S6-6-3： ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.77 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 6.95 (d

, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 4.22 (br s, 0.5H), 4.14 (br s, 0.5H), 3.40–3.29 (m, 1H), 3.22–2.94 (m, 7H), 2.53 (t, $J=14.8\text{ Hz}$, 1H), 2.26–2.19 (m, 1H), 1.88–1.75 (m, 2H), 1.70–1.59 (m, 1H), 1.06–0.98 (m, 3H); MS (ESI) m/z 511.36 (M+H).

【0565】

【化387】




10

一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S6-6-4およびS6-6-5を化合物S6-2から調製した。S6-6-4: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.75 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 6.93 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.34–3.15 (m, 3H), 3.06–2.97 (m, 1H), 2.87 (d, $J=12.4\text{ Hz}$, 1H), 2.50 (t, $J=14.8\text{ Hz}$, 1H), 2.21 (ddd, $J=14.0, 5.2, 2.8\text{ Hz}$, 1H), 1.82–1.73 (m, 2H), 1.60–1.50 (m, 1H), 1.02 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 497.29 (M+H). S6-6-5: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.77 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 6.96 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 4.24 (s, 1H), 3.51–3.46 (m, 1H), 3.41–3.26 (m, 2H), 3.23–3.03 (m, 3H), 2.95–2.92 (m, 1H), 2.54 (t, $J=14.8\text{ Hz}$, 1H), 2.20 (ddd, $J=13.2, 4.4, 2.4\text{ Hz}$, 1H), 1.89–1.79 (m, 4H), 1.68–1.59 (m, 1H), 1.03 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 3H), 0.99 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 539.38 (M+H).

20

【0566】

【化388】



30


一般的な手順B-1 (0°C)、C、およびD-2を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物S6-6-6を化合物S6-3から調製した。 ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.75 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 6.94 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.47–3.39 (m, 1H), 3.37–3.29 (m, 1H), 3.19–3.15 (m, 1H), 3.05–2.97 (m, 1H), 2.84 (d, $J=12.4\text{ Hz}$, 1H), 2.51 (t, $J=14.8\text{ Hz}$, 1H), 2.21 (ddd, $J=13.6, 4.8, 2.4\text{ Hz}$, 1H), 1.60–1.51 (m, 1H), 1.36 (t, $J=7.6\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 483.29 (M+H).

40

【0567】

50


【化 3 8 9】



一般的な手順 B-1 (0℃) を用いることによって CH_3CHO により、次いで再度 HCHO による B-1、C、および D-2 を用いることにより、化合物 S6-6-7 を化合物 S6-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.76 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.95 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.25 (br s, 0.5H), 4.16 (br s, 0.5H), 3.52–3.43 (m, 1H), 3.39–3.31 (m, 1H), 3.22–3.18 (m, 5H), 2.53 (t, $J=14.8$ Hz, 1H), 2.27–2.20 (m, 1H), 1.70–1.58 (m, 1H), 1.43–1.36 (m, 3H); MS (ESI) m/z 497.32 ($M+H$).

【0568】


【化 3 9 0】



一般的な手順 B-1、C、および D-2 を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物 S6-6-8 を化合物 S6-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.76 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.95 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.27 (s, 1H), 3.64–3.55 (m, 1H), 3.46 (q, $J=7.6$ Hz, 2H), 3.36–3.29 (m, 1H), 3.22–3.17 (m, 1H), 3.11–3.03 (m, 1H), 2.93–2.90 (m, 1H), 2.53 (t, $J=14.8$ Hz, 1H), 2.22 (ddd, $J=13.6, 5.2, 2.8$ Hz, 1H), 1.68–1.59 (m, 1H), 1.41 (t, $J=7.2$ Hz, 3H), 1.40 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 511.34 ($M+H$).

【0569】

【化 3 9 1】




一般的な手順 B-2、C、および D-2 を用いることにより、 Ac_2O によって化合物 S6-6-9 を化合物 S6-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD) δ 7.74 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.92 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.69 (d, $J=6.4$ Hz, 1H), 3.14–3.10 (m, 1H), 3.04–2.96 (m, 1H), 2.72 (t, $J=14.8$ Hz, 1H), 2.47–2.42

(m, 1H), 2.39–2.33 (m, 1H), 2.03 (s, 3H), 1.62–1.55 (m, 1H); MS (ESI) m/z 497.29 (M+H).

【0570】

【化392】



10


一般的な手順B-2、CおよびD-2を用いることにより、Ms₂Oによって化合物S6-6-10を化合物S6-3から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD) δ 7.73 (d, J=9.2Hz, 1H), 6.91 (d, J=9.2Hz, 1H), 4.10 (d, J=4.4Hz, 1H), 3.19–3.14 (m, 1H), 3.14 (s, 3H), 3.04–2.96 (m, 1H), 2.70 (t, J=14.8Hz, 1H), 2.51 (dt, J=14.0, 4.0Hz, 1H), 2.27 (ddd, J=14.0, 6.4, 3.6Hz, 1H), 1.69–1.61 (m, 1H); MS (ESI) m/z 533.32 (M+H).

【0571】

【化393】

20


スキーム7



30

以下の化合物をスキーム7に従って調製した。

【化394】



40

50


【0572】

一般的な手順B-1を用いることにより、化合物S7-2を化合物S7-1 (J. Med. Chem., 2013, 56, 8112-8138が挙げられる文献の手順に従って調製した) およびイソキノリンから調製した。¹H NMR (400MHz, CDCl₃) δ 7.38-7.22 (m, 9H), 7.14-7.08 (m, 5H), 7.00-6.99 (m, 1H), 5.13 (br s, 2H), 3.78 (br s, 2H), 3.70 (br s, 2H), 2.87 (br s, 2H), 2.74 (br s, 2H), 2.48 (s, 3H); MS (ESI) m/z 498.5 (M+H).

【0573】

【化395】

10




一般的な手順Eを用いることにより、化合物S7-3を化合物S7-2およびジアリルエノンS2-3から調製した。¹H NMR (400MHz, CDCl₃) δ 15.96 (br s, 1H), 7.51-7.49 (m, 2H), 7.40-7.31 (m, 5H), 7.27-7.20 (m, 4H), 7.16-7.12 (m, 3H), 6.98-6.96 (m, 1H), 5.86-5.76 (m, 2H), 5.36 (s, 2H), 5.23-5.16 (m, 4H), 5.12-5.10 (m, 2H), 4.09 (d, J=9.6Hz, 1H), 3.74-3.65 (m, 4H), 3.37-3.31 (m, 4H), 3.23-3.17 (m, 2H), 3.02-2.94 (m, 1H), 2.84-2.70 (m, 4H), 2.52-2.42 (m, 2H), 2.15-2.12 (m, 1H), 0.83 (s, 9H), 0.26 (s, 3H), 0.14 (s, 3H); MS (ESI) m/z 938.70 (M+H).

20

【0574】

【化396】

30




一般的な手順Aを用いることにより、化合物S7-4およびS7-5を化合物S7-3から調製した。S7-4: MS (ESI) m/z 858.59 (M+H)。S7-5: MS (ESI) m/z 898.71 (M+H)。

【0575】

【化397】

40




一般的な手順CおよびD-1を用いることにより、化合物S7-6-1を化合物S7-4から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.33-7.25 (m, 4H), 7.19 (d, J=7.2Hz, 1H), 4.73, 4.68 (ABq, J=13.6Hz, 2H), 4.55 (s, 2H), 3.92 (s, 1H), 3.

50

8.4 (br s, 1H), 3.62 (br s, 1H), 3.42 (dd, $J=16.0$, 4.4 Hz, 1H), 3.30–3.18 (m, 2H), 3.09–3.02 (m, 1H), 2.72–2.69 (m, 1H), 2.42 (t, $J=14.8$ Hz, 1H), 2.29 (ddd, $J=14.0$, 5.2, 2.4 Hz, 1H), 1.65–1.55 (m, 1H); MS (ESI) m/z 566.35 (M+H).

【0576】

【化398】



10


一般的な手順B-1、C、およびD-2を用いることにより、HCHOによって化合物S7-6-2およびS7-6-3を化合物S7-5から調製した。S7-6-2: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.33–7.26 (m, 4H), 7.19 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 4.72, 4.67 (ABq, $J=13.2$ Hz, 2H), 4.55 (s, 2H), 3.85 (br s, 2H), 3.63 (br s, 1H), 3.42 (dd, $J=16.0$, 4.0 Hz, 1H), 3.30–3.22 (m, 2H), 3.10–3.04 (m, 1H), 2.92 (s, 3H), 2.85 (d, $J=12.6$ Hz, 1H), 2.43 (t, $J=14.8$ Hz, 1H), 2.29–2.23 (m, 1H), 1.64–1.54 (m, 1H); MS (ESI) m/z 580.4 (M+H). S7-6-3: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.33–7.26 (m, 4H), 7.21–7.19 (m, 1H), 4.72, 4.68 (ABq, $J=15.6$ Hz, 2H), 4.55 (s, 2H), 4.24 (s, 0.5H), 4.17 (s, 0.5H), 3.84 (br s, 1H), 3.62 (br s, 1H), 3.46–3.34 (m, 2H), 3.32–2.96 (m, 8H), 2.44 (br t, $J=15.2$ Hz, 1H), 2.99 (br t, $J=13.2$ Hz, 1H), 1.86–1.77 (m, 2H), 1.68–1.65 (m, 1H), 1.05–0.99 (m, 3H); MS (ESI) m/z 622.4 (M+H).

20

30

【0577】

【化399】



一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S7-6-4およびS7-6-5を化合物S7-3から調製した。S7-6-4: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.31–7.18 (m, 5H), 4.71 (q, $J=13.6$ Hz, 2H), 4.55 (s, 2H), 3.93 (s, 1H), 3.84 (br s, 1H), 3.63 (br s, 1H), 3.42–3.38 (m, 1H), 3.38–3.17 (m, 4H), 3.07 (br s, 1H), 2.95 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.39 (t, $J=14.4$ Hz, 1H), 2.29 (d, $J=12.0$ Hz, 1H), 1.83–1.74 (m, 2H), 1.61–1.52 (m, 1H), 1.03 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 608.43 (M+H). S7-6-5: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.34–7.19 (m, 5H), 4.70 (s, 2H), 4.55 (s, 2H), 4.26 (s, 1H), 3.87–3.85 (m, 1H), 3.63 (br s, 1H), 3.54–3.37 (m,


40

50

3 H), 3.29–3.13 (m, 5 H), 2.99 (d, $J=13.2$ Hz, 1 H), 2.44 (t, $J=14.4$ Hz, 1 H), 2.27 (d, $J=12.0$ Hz, 1 H), 1.90–1.80 (m, 4 H), 1.71–1.61 (m, 1 H), 1.05–0.98 (m, 6 H); MS (ESI) m/z 650.45 (M+H).

【0578】

【化400】




10

一般的な手順B-1 (0°C)、C、およびD-1を用いることにより、CH₃CHOによって化合物S7-6-6を化合物S7-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.33–7.18 (m, 5 H), 4.73, 4.67 (ABq, $J=13.6$ Hz, 2 H), 4.55 (s, 2 H), 3.90 (s, 1 H), 3.84 (br s, 1 H), 3.62 (br s, 1 H), 3.48–3.32 (m, 3 H), 3.29–3.21 (m, 2 H), 3.10–3.03 (m, 1 H), 2.90 (d, $J=12.8$ Hz, 1 H), 2.41 (t, $J=14.4$ Hz, 1 H), 2.30–2.26 (m, 1 H), 1.63–1.53 (m, 1 H), 1.37 (t, $J=7.6$ Hz, 3 H); MS (ESI) m/z 594.40 (M+H).

20

【0579】

【化401】




30

一般的な手順B-1 (0°C)を用いることによってCH₃CHOにより、次いで再度HCHOによるB-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S7-6-7を化合物S7-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.33–7.26 (m, 4 H), 7.21–7.19 (m, 1 H), 4.73, 4.68 (ABq, $J=13.2$ Hz, 2 H), 4.55 (s, 2 H), 4.26 (s, 0.5 H), 4.18 (s, 0.5 H), 3.85 (br s, 1 H), 3.62 (br s, 1 H), 3.56–3.34 (m, 3 H), 3.30–3.14 (m, 3 H), 3.04–2.95 (m, 4 H), 2.42 (br t, $J=15.2$ Hz, 1 H), 2.30 (br t, $J=15.2$ Hz, 1 H), 1.73–1.61 (m, 1 H), 1.44–1.37 (m, 3 H); MS (ESI) m/z 608.43 (M+H).

40

【0580】

【化402】



一般的な手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、CH₃CHOによって化


50

合物 S 7 - 6 - 8 を化合物 S 7 - 4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.34–7.25 (m, 4H), 7.20–7.18 (m, 1H), 4.74, 4.68 (ABq, $J=13.2\text{ Hz}$, 2H), 4.55 (s, 2H), 4.28 (s, 1H), 3.84 (br s, 1H), 3.65–3.56 (m, 2H), 3.53–3.34 (m, 4H), 3.29–3.10 (m, 3H), 2.98 (d, $J=13.2\text{ Hz}$, 1H), 2.41 (t, $J=14.8\text{ Hz}$, 1H), 2.30 (br d, $J=12.4\text{ Hz}$, 1H), 1.71–1.64 (m, 1H), 1.43 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 3H), 1.42 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 622.42 (M+H).

【0581】

【化403】

10




一般的な手順 B - 2、C、および D - 1 を用いることにより、 Ac_2O によって化合物 S 7 - 6 - 9 を化合物 S 7 - 4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.33–7.24 (m, 4H), 7.21–7.19 (m, 1H), 4.72–4.65 (m, 3H), 4.55 (s, 2H), 3.84 (br s, 1H), 3.61 (br s, 1H), 3.37–3.33 (m, 1H), 3.30–3.20 (m, 2H), 3.05–2.99 (m, 1H), 2.63 (t, $J=15.2\text{ Hz}$, 1H), 2.46–2.36 (m, 2H), 2.05 (s, 3H), 1.66–1.59 (m, 1H); MS (ESI) m/z 608.42 (M+H).

【0582】

【化404】

20



一般的な手順 B - 2、C、および D - 1 を用いることにより、 Ms_2O によって化合物 S 7 - 6 - 10 を化合物 S 7 - 4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.32–7.23 (m, 4H), 7.20–7.18 (m, 1H), 4.69 (s, 2H), 4.54 (s, 2H), 4.10 (d, $J=4.4\text{ Hz}$, 1H), 3.84 (br s, 1H), 3.63 (br s, 1H), 3.38 (dd, $J=16.8, 5.2\text{ Hz}$, 1H), 3.28–3.20 (m, 2H), 3.16 (s, 3H), 2.99–2.91 (m, 1H), 2.60 (t, $J=16.0\text{ Hz}$, 1H), 2.48–2.44 (m, 1H), 2.32–2.26 (m, 1H), 1.72–1.64 (m, 1H); MS (ESI) m/z 644.36 (M+H).

【0583】


30

40

50


【化 4 0 5】

スキーム 8



以下の化合物をスキーム 8 に従って調製した。

【化 4 0 6】




【0 5 8 4】

化合物 S8-1 (1.62 g、3.76 mmol、1 当量、J. Med. Chem., 2013, 56, 8112-8138 が挙げられる文献の手順に従って調製した) を THF (16 mL) 中に溶解した。生じた反応溶液を -78℃ に冷却した。 $i\text{PrMgCl} \cdot \text{LiCl}$ (1.3 M、4.89 mL、4.89 mmol、1.3 当量) の溶液を加えた。次に、生じた反応溶液を氷/水浴内で 2 時間攪拌して、飽和 NH_4Cl 溶液を加えた。生じた反応混合物を EtOAc で抽出した。有機相を分離して、ブラインで洗浄して、濃縮した。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィー (100 g シリカゲル、2→8% EtOAc/ヘキサン) によって精製して、白色の固体として化合物 S8-2 (1.1 g、83%) が得られた。 $^1\text{H NMR}$ (400 MHz, CDCl_3) δ 7.43–7.34 (m, 8 H), 7.26–7.23 (m, 1 H), 7.10–7.08 (m, 2 H), 6.83–6.80 (m, 1 H), 5.13 (s, 2 H), 2.45 (s, 3 H)。

【0 5 8 5】

【化 4 0 7】



一般的な手順 E を用いることにより、化合物 S8-3 を化合物 S8-2 およびジアリルエノン S2-3 から調製した：MS (ESI) m/z 793.60 ($M+H$)。

【0 5 8 6】

10


20

30

40

50

【化 4 0 8】




一般的な手順 A を用いることにより、化合物 S 8 - 4 および S 8 - 5 を化合物 S 8 - 3 から調製した。S 8 - 4 : MS (ESI) m/z 713.45 (M+H)。S 8 - 5 : MS (ESI) m/z 753.51 (M+H)。

10

【0 5 8 7】

【化 4 0 9】




一般的な手順 C および D - 1 を用いることにより、化合物 S 8 - 7 - 1 を化合物 S 8 - 4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.49 (d, $J=8.8\text{ Hz}$, 1H), 6.83 (d, $J=8.8\text{ Hz}$, 1H), 3.90 (s, 1H), 3.32-3.27 (s, 1H), 3.10-2.94 (m, 1H), 2.66-2.62 (m, 1H), 2.34 (t, $J=15.6\text{ Hz}$, 1H), 2.23 (ddd, $J=13.6, 5.2, 2.8\text{ Hz}$, 1H), 1.63-1.54 (m, 1H); MS (ESI) m/z 421.24 (M+H)。

20

【0 5 8 8】

【化 4 1 0】



30


一般的な手順 B - 1、C、および D - 2 を用いることにより、HCHO によって化合物 S 8 - 7 - 2 および S 8 - 7 - 3 を化合物 S 8 - 5 から調製した。S 8 - 7 - 2 : ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.40 (dd, $J=8.4, 7.2\text{ Hz}$, 1H), 6.79 (d, $J=8.4\text{ Hz}$, 1H), 6.73 (d, $J=7.2\text{ Hz}$, 1H), 3.79 (s, 1H), 3.04-2.95 (m, 1H), 2.90 (s, 3H), 2.87-2.82 (m, 1H), 2.77-2.74 (m, 1H), 2.54 (t, $J=14.8\text{ Hz}$, 1H), 2.15 (ddd, $J=13.2, 4.8, 2.8\text{ Hz}$, 1H), 1.56-1.47 (m, 1H); MS (ESI) m/z 401.29 (M+H)。S 8 - 7 - 3 : ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.50 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 6.84 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 4.22 (s, 0.5H), 4.13 (s, 0.5H), 3.41-3.32 (m, 2H), 3.22-3.15 (m, 1H), 3.09-2.91 (m, 5H), 2.34 (t, $J=15.2\text{ Hz}$, 1H), 2.26-2.19 (m, 1H), 1.88-1.74 (m, 2H), 1.68-1.62 (m, 1H), 1.06-0.99 (m, 3H); MS (ESI) m/z 477.33 (M+H)。

40

【0 5 8 9】

50


【化 4 1 1】



一般的な手順 C および D-2 を用いることにより、化合物 S8-7-4、S8-7-5、および S8-7-6 を化合物 S8-3 から調製した。S8-7-4: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.40 (dd, $J=8.8, 7.2$ Hz, 1H), 6.79 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 6.73 (d, $J=7.2$ Hz, 1H), 3.86 (s, 1H), 3.33–3.17 (m, 2H), 3.03–2.94 (m, 1H), 2.87–2.80 (m, 1H), 2.53 (t, $J=14.4$ Hz, 1H), 2.17 (ddd, $J=13.2, 4.8, 2.4$ Hz, 1H), 1.82–1.72 (m, 2H), 1.56–1.47 (m, 1H), 1.03 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 429.34 ($M+H$). S8-7-5: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.48 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 6.82 (d, $J=8.8$ Hz, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.34–3.18 (m, 2H), 3.03–2.94 (m, 1H), 2.85 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.30 (t, $J=15.2$ Hz, 1H), 2.24–2.20 (m, 1H), 1.82–1.72 (m, 2H), 1.60–1.50 (m, 1H), 1.02 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 463.31 ($M+H$). S8-7-6: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.50 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.84 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.24 (s, 1H), 3.53–3.45 (m, 1H), 3.41–3.25 (m, 3H), 3.22–3.16 (m, 1H), 3.09–2.99 (m, 1H), 2.95–2.92 (m, 1H), 2.33 (t, $J=14.8$ Hz, 1H), 2.21 (ddd, $J=13.2, 4.4, 2.8$ Hz, 1H), 1.89–1.74 (m, 4H), 1.68–1.59 (m, 1H), 1.03 (t, $J=7.6$ Hz, 3H), 0.99 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 505.35 ($M+H$).

【0590】

【化 4 1 2】



一般的な手順 B-1 (0°C)、C、および D-1 を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物 S8-7-7 を化合物 S8-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.48 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 6.82 (d, $J=8.4$ Hz, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.46–3.41 (m, 1H), 3.37–3.32 (m, 1H), 3.30–3.25 (m, 1H), 3.03–2.95 (m, 1H), 2.85–2.82 (m, 1H), 2.30 (t, $J=15.2$ Hz, 1H), 2.24–2.20 (m, 1H), 1.60–1.51 (m, 1H), 1.36 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 449.26 ($M+H$).

【0591】

10


20

30

40

50


【化 4 1 3】



一般的な手順 B-1 (0℃) を用いることによって CH_3CHO により、次いで再度 HCHO による B-1、C、および D-1 を用いることにより、化合物 S8-7-8 を化合物 S8-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.50 (d, $J=8.8\text{ Hz}$, 1H), 6.84 (d, $J=8.8\text{ Hz}$, 1H), 4.23 (s, 0.5H), 4.14 (s, 0.5H), 3.51–3.43 (m, 1H), 3.37–3.30 (m, 2H), 3.08–2.89 (m, 5H), 2.34 (t, $J=15.2\text{ Hz}$, 1H), 2.28–2.19 (m, 1H), 1.71–1.58 (m, 1H), 1.42 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 1.5H), 1.38 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 1.5H); MS (ESI) m/z 463.28 ($M+H$).

【0592】


【化 4 1 4】



一般的な手順 B-1、C、および D-1 を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物 S8-7-9 を化合物 S8-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.50 (d, $J=8.8\text{ Hz}$, 1H), 6.84 (d, $J=8.8\text{ Hz}$, 1H), 4.23 (s, 1H), 3.65–3.56 (m, 1H), 3.50–3.44 (m, 2H), 3.36–3.29 (m, 2H), 3.08–3.01 (m, 1H), 2.93–2.90 (m, 1H), 2.36–2.23 (m, 2H), 1.69–1.59 (m, 1H), 1.42 (t, $J=7.6\text{ Hz}$, 6H), 0.99 (t, $J=7.6\text{ Hz}$, 3H); MS (ESI) m/z 477.30 ($M+H$).

【0593】

【化 4 1 5】




一般的な手順 B-2、C、および D-1 を用いることにより、 Ac_2O によって化合物 S8-7-10 を化合物 S8-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD) δ 7.47 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 6.80 (d, $J=9.2\text{ Hz}$, 1H), 4.68 (d, $J=6.4\text{ Hz}$, 1H), 3.22 (dd, $J=16.0, 4.4\text{ Hz}$, 1H), 3.01–2.93 (m, 1H), 2.52 (t, $J=15.6\text{ Hz}$, 1H), 2.46–2.42 (m, 1H), 2.39–2.32 (m, 1H), 2.04 (s, 3H), 1.64–1.56 (m, 1H); MS (ESI) m/z 463.27 ($M+$

H) .

【0594】

【化416】



10


一般的な手順B-2、C、およびD-1を用いることにより、 Ms_2O によって化合物S8-7-11を化合物S8-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD) δ 7.46 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.79 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.10 (d, $J=4.4$ Hz, 1H), 3.25 (dd, $J=16.0, 4.4$ Hz, 1H), 3.14 (s, 3H), 3.01–2.92 (m, 1H), 2.53–2.48 (m, 2H), 2.30–2.24 (m, 1H), 1.69–1.61 (m, 1H); MS (ESI) m/z 499.22 ($\text{M}+\text{H}$).

【0595】

【化417】

20


スキーム9



30

以下の化合物をスキーム9に従って調製した。

【化418】



40

【0596】


化合物S9-1 (0.15 g、0.35 mmol、1.0当量、国際公開第2014/036502A2号が挙げられる文献の手順に従って調製した)をDCM (2 mL)中に溶解した。ジメチルアミン (0.12 mL、EtOH中5.6 M、0.70 mmol、2.0当量)および酢酸 (60 μL 、1.14 mmol、3.0当量)を窒素雰囲気下で加えた。次に、ナトリウムトリアセトキシボロヒドリド (148 mg、0.70 mmol、2.0当量)を加えた。10分後、LC/MSにより、出発材料が消費されていることが示された。飽和 NaHCO_3 溶液を加えて、DCMで抽出した。有機相を減圧下で濃縮し

50

た。残留物をフラッシュカラムクロマトグラフィー（Biotage 10 g シリカゲルカラム、ヘキサン中 10% → 30% EtOAc 勾配）によって精製して、無色の油として 100 mg（62%）の化合物 S9-2 が得られた。 ^1H NMR（400 MHz, CDCl_3 ） δ 7.45–7.43（m, 2H）, 7.38–7.34（m, 5H）, 7.26–7.22（m, 1H）, 7.20（s, 1H）, 7.09–7.06（m, 2H）, 5.17（s, 2H）, 3.49（s, 2H）, 2.40（s, 3H）, 2.23（s, 6H）; MS（ESI） m/z 460.23（M+H）。

【0597】

【化419】




10

一般的な手順 E を用いることにより、化合物 S9-3 を化合物 S9-2 およびジアリルエノン S2-3 から調製した：MS（ESI） m/z 900.41（M+H）。

【0598】

【化420】




20

一般的な手順 A を用いることにより、化合物 S9-4 を化合物 S9-3 から調製した。 ^1H NMR（400 MHz, CDCl_3 ） δ 16.52（s, 1H）, 7.49–7.44（m, 6H）, 7.41–7.29（m, 6H）, 7.25（s, 1H）, 5.40, 5.36（ABq, $J=12.0$ Hz, 2H）, 5.31, 5.22（ABq, $J=12.0$ Hz, 2H）, 3.92（d, $J=2.0$ Hz, 1H）, 3.49, 3.43（ABq, $J=14.4$ Hz, 2H）, 3.02（dd, $J=16.0, 4.4$ Hz, 1H）, 2.79–2.71（m, 1H）, 2.64–2.61（m, 1H）, 2.28–2.20（m, 1H）, 2.20（s, 6H）, 2.13–2.08（m, 1H）, 1.58–1.49（m, 1H）, 0.74（s, 9H）, 0.22（s, 3H）, 0.10（s, 3H）; MS（ESI） m/z 820.33（M+H）。

30

【0599】

【化421】




40

一般的な手順 C および D-2 を用いることにより、化合物 S9-5-1 を化合物 S9-4 から調製した。 ^1H NMR（400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩） δ 7.24（s, 1H）, 4.45（s, 2H）, 3.90（s, 1H）, 3.19（dd, $J=15.6, 3.6$ Hz, 1H）, 3.04–2.96（m, 1H）, 2.94（s, 3H）, 2.86（s, 3H）, 2.68（br d, $J=12.8$ Hz, 1H）, 2.41（t, $J=14.4$ Hz, 1H）, 2.27–2.24（m, 1H）, 1.64–1.54（m, 1H）; MS（ESI） m/z 528.18（M+H）。

50

【0600】


【化422】



一般的な手順B-1 (0℃)、C、およびD-2を用いることにより、CH₃CHOによって化合物S9-5-2を化合物S9-4から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.20 (s, 1H), 4.45 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.46-3.39 (m, 1H), 3.37-3.30 (m, 1H), 3.18 (dd, J=15.6, 4.4Hz, 1H), 3.05-2.97 (m, 1H), 2.94 (s, 3H), 2.86 (s, 3H), 2.86-2.83 (m, 1H), 2.41 (t, J=14.8Hz, 1H), 2.24 (ddd, J=14.0, 5.6, 2.8Hz, 1H), 1.64-1.54 (m, 1H), 1.36 (t, J=7.2Hz, 3H); MS (ESI) m/z 556.2 (M+H).

【0601】


【化423】



一般的な手順B-1 (0℃)を用いることにより、CH₃CHOにより、再度HCHOによるB-1、C、およびD-2を用いることにより、化合物S9-5-3を化合物S9-4から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.22 (s, 1H), 4.46 (s, 2H), 4.24 (s, 0.5H), 4.15 (s, 0.5H), 3.53-3.44 (m, 1H), 3.38-3.30 (m, 1H), 3.22-3.18 (m, 1H), 3.11-2.94 (m, 8H), 2.86 (s, 3H), 2.42 (t, J=14.4Hz, 1H), 2.29-2.23 (m, 1H), 1.68-1.60 (m, 1H), 1.44-1.34 (m, 3H); MS (ESI) m/z 570.2 (M+H).

【0602】

【化424】




一般的な手順B-1、C、およびD-2を用いることにより、CH₃CHOによって化合物S9-5-4を化合物S9-4から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.28 (s, 1H), 4.47 (s, 2H), 4.28 (s, 1H), 3.65-3.56 (m, 1H), 3.54-3.43 (m, 2H), 3.41-3.34 (m, 1H), 3.21 (br d, J=15.6Hz, 1H), 3.13-3.05 (m, 1H), 2.99-2.96 (m, 1H), 2.96 (s, 3H), 2.86 (s, 3H), 2.41 (t, J=14.8Hz, 1H), 2.28 (br d, J=1

2.8 Hz, 1H), 1.69–1.60 (m, 1H), 1.42 (t, J = 7.2 Hz, 6H); MS (ESI) m/z 584.20 (M+H).

【0603】

【化425】


スキーム10



10

以下の化合物をスキーム10に従って調製した。

【化426】



20


【0604】

一般的な手順B-1を用いることにより、HCHOによって化合物S10-2をS10-1（国際公開第2014/036502A2号が挙げられる文献の手順に従って調製した）から調製した。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.46–7.44 (m, 2H), 7.38–7.33 (m, 5H), 7.26 (s, 1H), 7.26–7.22 (m, 1H), 7.09–7.06 (m, 2H), 5.19, 5.15 (ABq, J = 11.6 Hz, 2H), 3.49 (t, J = 8.4 Hz, 1H), 3.26–3.21 (m, 1H), 2.33 (q, J = 9.2 Hz, 1H), 2.29–2.20 (m, 1H), 2.15 (s, 3H), 1.97–1.88 (m, 1H), 1.86–1.78 (m, 1H), 1.60–1.50 (m, 1H); MS (ESI) m/z 486.15 (M+H).

30

【0605】

【化427】



40


一般的な手順Eを用いることにより、化合物S10-3を化合物S10-2およびジアリルエノンS2-3から調製した。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 15.99 (s, 1H), 7.51–7.47 (m, 4H), 7.40–7.31 (m, 5H), 7.28–7.26 (m, 2H), 5.83–5.73 (m, 2H), 5.36 (s,

50

2 H), 5.23 (s, 2 H), 5.23–5.18 (m, 2 H), 5.09 (d, J = 10.4 Hz, 2 H), 4.09 (d, J = 10.4 Hz, 1 H), 3.43 (t, J = 8.0 Hz, 1 H), 3.35–3.30 (m, 2 H), 3.22–3.16 (m, 3 H), 3.12 (dd, J = 15.2, 4.0 Hz, 1 H), 2.95–2.88 (m, 1 H), 2.66 (t, J = 15.6 Hz, 1 H), 2.52–2.48 (m, 1 H), 2.45–2.40 (m, 1 H), 2.30 (q, J = 8.4 Hz, 1 H), 2.23–2.10 (m, 1 H), 2.06 (s, 3 H), 1.96–1.89 (m, 1 H), 1.85–1.77 (m, 1 H), 1.59–1.51 (m, 1 H), 0.82 (s, 9 H), 0.25 (s, 3 H), 0.13 (s, 3 H); MS (ESI) m/z 926.37 (M+H).

【0606】


【化428】



一般的な手順Aを用いることにより、化合物S10-4を化合物S10-3から調製した。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 16.51 (s, 1 H), 7.55–7.53 (m, 2 H), 7.49–7.47 (m, 2 H), 7.41–7.28 (m, 7 H), 5.40, 5.36 (ABq, J = 12.4 Hz, 2 H), 5.28, 5.22 (ABq, J = 12.0 Hz, 2 H), 3.92 (d, J = 2.4 Hz, 1 H), 3.43 (t, J = 8.0 Hz, 1 H), 3.23–3.19 (m, 1 H), 3.02 (dd, J = 15.2, 3.6 Hz, 1 H), 2.80–2.71 (m, 1 H), 2.64–2.61 (m, 1 H), 2.34–2.10 (m, 3 H), 2.09 (s, 3 H), 1.96–1.79 (m, 3 H), 1.58–1.49 (m, 2 H), 0.74 (s, 9 H), 0.22 (s, 3 H), 0.10 (s, 3 H); MS (ESI) m/z 846.37 (M+H).

【0607】

【化429】



一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S10-5-1を化合物S10-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.27 (s, 1 H), 4.85–4.74 (m, 1 H), 3.88 (s, 1 H), 3.88–3.83 (m, 1 H), 3.42–3.33 (m, 1 H), 3.21 (dd, J = 16.0, 3.6 Hz, 1 H), 3.03–2.94 (m, 1 H), 2.77 (s, 3 H), 2.66–2.54 (m, 2 H), 2.54–2.23 (m, 5 H), 1.65–1.55 (m, 1 H); MS (ESI) m/z 554.14 (M+H).

【0608】

10


20

30

40

50


【化 4 3 0】



一般的な手順 B-1 (0°C)、C、および D-2 を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物 S10-5-2 を化合物 S10-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.33 (s, 1H), 4.82–4.75 (m, 1H), 3.89 (s, 1H), 3.89–3.83 (m, 1H), 3.47–3.33 (m, 3H), 3.21 (dd, $J=16.0, 4.0$ Hz, 1H), 3.06–2.98 (m, 1H), 2.87 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.77 (s, 3H), 2.61–2.52 (m, 1H), 2.43–2.44 (m, 5H), 1.64–1.54 (m, 1H), 1.37 (t, $J=7.2$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 582.16 ($M+H$).

【0609】


【化 4 3 1】



一般的な手順 B-1 (0°C) を用いることによって CH_3CHO により、再度 HCHO による B-1、C、および D-2 を用いることにより、化合物 S9-5-3 を化合物 S9-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.38 (s, 1H), 4.80–4.75 (m, 1H), 4.26 (s, 0.5H), 4.18 (s, 0.5H), 3.89–3.85 (m, 1H), 3.56–3.46 (m, 1H), 3.43–3.32 (m, 2H), 3.23 (d, $J=15.6$ Hz, 1H), 3.13–2.95 (m, 5H), 2.77 (s, 3H), 2.62–2.55 (m, 1H), 2.44–2.26 (m, 5H), 1.70–1.60 (m, 1H), 1.44–1.37 (m, 3H); MS (ESI) m/z 596.18 ($M+H$).

【0610】

【化 4 3 2】




一般的な手順 B-1、C、および D-2 を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物 S9-5-4 を化合物 S9-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.40 (s, 1H), 4.79–4.77 (m, 1H), 4.27 (s, 1H), 3.89–3.86 (m, 1H), 3.63–3.56 (m, 1H), 3.48–3.35 (m, 4H), 3.23 (br d, $J=15.6$ Hz, 1H), 3.09 (br s, 1H), 2.97 (br d, $J=13.6$ Hz, 1H), 2.76 (s, 3H), 2.60–2.54 (m, 1H), 2.42–2.27 (m, 5H), 1.68–1.60 (m, 1H), 1.41 (t, $J=6.4$ Hz, 6H); MS (ESI) m/z 610.19 ($M+H$).

【0611】

【化433】


スキーム11



10

以下の化合物をスキーム11に従って調製した。

【化434】



20

【0612】


一般的な手順Eを用いることにより、化合物S11-3-1をS11-1（国際公開第2012/021712A1号が挙げられる文献の手順に従って調製した）およびC-4メチルエチルアミノエノンS11-2-1（国際公開第2014/036502A2号が挙げられる文献の手順に従って調製した）から調製した。¹H NMR（400MHz，CDCl₃）δ 15.84（s，1H），7.59（s，1H），7.51-7.49（m，4H），7.39-7.32（m，5H），7.28-7.24（m，1H），5.39，5.34（ABq，J=12.8Hz，2H），5.36（s，2H），4.24（br s，1H），4.02（d，J=9.6Hz，1H），3.43-3.39（m，1H），3.20（d，J=15.6Hz，1H），2.94-2.80（m，3H），2.74-2.60（m，2H），2.56-2.44（m，3H），3.36（s，3H），2.26-2.14（m，1H），2.21（s，3H），1.97-1.90（m，1H），1.05（t，J=7.2Hz，3H），0.84（s，9H），0.28（s，3H），0.16（s，3H）；MS（ESI）m/z 858.3（M+H）。

30

40

【0613】

【化435】




50

一般的な手順 E を用いることにより、化合物 S 1 1 - 3 - 2 を S 1 1 - 1 および C - 4 ジエチルアミノエノン S 1 1 - 2 - 2 (国際公開第 2 0 1 4 / 0 3 6 5 0 2 A 2 号が挙げられる文献の手順に従って調製した) から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 15.83 (s, 1H), 7.60 (s, 1H), 7.51–7.47 (m, 4H), 7.39–7.31 (m, 5H), 7.28–7.24 (m, 1H), 5.42–5.30 (m, 4H), 4.24–4.19 (m, 1H), 4.03 (d, $J=10.4$ Hz, 1H), 3.42–3.38 (m, 1H), 3.23–3.19 (m, 1H), 2.95–2.86 (m, 2H), 2.75–2.68 (m, 5H), 2.51–2.44 (m, 3H), 2.23–2.20 (m, 1H), 2.20 (s, 3H), 1.97–1.90 (m, 1H), 1.08 (t, $J=7.2$ Hz, 3H), 0.84 (s, 9H), 0.28 (s, 3H), 0.16 (s, 3H); MS (ESI) m/z 872.3 (M+H).

【0614】


【化436】



一般的な手順 C および D - 2 を用いることにより、化合物 S 1 1 - 4 - 1 および S 1 1 - 5 - 1 を化合物 S 1 1 - 3 - 1 から調製した。S 1 1 - 4 - 1: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 6.89 (s, 1H), 4.16 (s, 1H), 3.39 (br s, 2H), 3.29–3.22 (m, 1H), 3.08–2.86 (m, 9H), 2.70 (s, 3H), 2.53 (t, $J=15.1$ Hz, 1H), 2.21–2.18 (m, 1H), 2.02–1.92 (m, 2H), 1.67–1.61 (m, 1H), 1.37 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 568.18 (M+H). S 1 1 - 5 - 1: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.05 (s, 1H), 5.94 (t, $J=8.2$ Hz, 1H), 4.17–4.10 (m, 3H), 3.40 (br s, 2H), 3.22–3.18 (m, 1H), 3.12–2.90 (m, 8H), 2.72–2.58 (m, 3H), 2.24–2.21 (m, 1H), 1.69–1.60 (m, 1H), 1.39 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 566.16 (M+H).

【0615】

【化437】



一般的な手順 C および D - 2 を用いることにより、化合物 S 1 1 - 4 - 2 および S 1 1 - 5 - 2 を化合物 S 1 1 - 3 - 1 から調製した。S 1 1 - 4 - 2: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 6.89 (s, 1H), 4.24 (s, 1H), 3.53–3.47 (m, 2H), 3.42–3.34 (m, 2H), 3.27–3.22 (m, 1H), 3.08–3.04 (m, 2H), 2.99–2.86 (m, 4H), 2.70 (s, 3H), 2.53 (t, $J=15.2$ Hz, 1H), 2.20 (ddd, $J=14.0, 5.2, 2.8$ Hz, 1H), 2.00–1.93 (m, 2H), 1.67

−1.57 (m, 1H), 1.40 (t, J=7.2 Hz, 6H); MS (ESI) m/z 582.2 (M+H). S11-5-2: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.05 (s, 1H), 5.94 (t, J=8.2 Hz, 1H), 4.24–4.10 (m, 3H), 3.51 (br s, 2H), 3.40 (br s, 2H), 3.23–3.19 (m, 1H), 3.12–2.89 (m, 6H), 2.72–2.54 (m, 2H), 2.22 (ddd, J=13.7, 4.6, 2.7 Hz, 1H), 1.68–1.59 (m, 1H), 1.40 (t, J=7.3 Hz, 6H); MS (ESI) m/z 580.2 (M+H).

【0616】


【化438】

スキーム12



以下の化合物をスキーム12に従って調製した。

【化439】



【0617】

CH₃OH (1 mL) 中の化合物 S12-1-1 (R₁, R₂=CH₃, CH₃CH₂, 26 mg、0.041 mmol、1 当量、国際公開第 2014/036502 A2 号が挙げられる文献の手順に従って調製した) の溶液に HCHO 溶液 (9 μL、0.12 mmol、3.0 当量) を加えた。Pd-C (10 重量%、10 mg) を窒素下で加えた。反応器をシールし、およびフラスコを短時間真空にしてから水素ガス (1 気圧) でフラッシュすることによって水素でパージした。反応混合物を水素雰囲気 (1 気圧) 下で室温において一晩攪拌した。反応液を小さいセライトパッドで濾過した。ケーキを CH₃OH で洗浄した。濾液を濃縮した。残留物を、Phenomenex Polymerx 10 μm RP-γ 100 Å カラムを用いて、Waters Autopurification 系の分取逆相 HPLC によって精製した [10 μm、150×21.20 mm; 流量、20 mL/分; 溶媒 A: 0.05 N HCl/水; 溶媒 B: CH₃CN; 注入容量: 3.0 mL (0.05 N HCl/水); 勾配: 20 分にわたる A 中 5→35% の B; 質量による分別捕集]。所望の生成物を含有する画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物 S12-2-1 (15.6 mg) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.49 (s, 1H), 4.75 (t, J=8.0 Hz, 1H), 4.26 (s, 0.5H), 4.18 (s, 0.5H), 3.94–3.89 (m, 1H), 3.55–3.48 (m, 1H), 3.43–3.26 (m, 3H), 3.04–2.95 (m, 5H), 2.75–2.61 (m, 5H), 2.36–2.24 (m, 4H), 1.70–1.61 (m, 1H), 1.42–1.389 (m, 3H); MS (ESI) m/z 580.23 (M+H).

【0618】

10


20

30

40

50


【化 4 4 0】



化合物 S 1 2 - 2 - 2 を、化合物 S 1 2 - 2 - 1 についての類似の手順を用いることにより、化合物 S 1 2 - 1 - 2 ($R_1 R_2 = Et_2$ 、国際公開第 2 0 1 4 / 0 3 6 5 0 2 A 2 号が挙げられる文献の手順に従って調製した) から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.50 (s, 1H), 4.74 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 4.26 (s, 1H), 3.94–3.89 (m, 1H), 3.64–3.56 (m, 1H), 3.53–3.45 (m, 2H), 3.42–3.34 (m, 2H), 3.29–3.26 (m, 1H), 3.06–2.96 (m, 2H), 2.74 (s, 3H), 2.71–2.61 (m, 5H), 2.36–2.22 (m, 4H), 1.69–1.59 (m, 1H), 1.41 (t, $J = 7.2$ Hz, 6H); MS (ESI) m/z 594.06 ($M+H$).

【0 6 1 9】


【化 4 4 1】



化合物 S 1 2 - 2 - 3 を、化合物 S 1 2 - 2 - 1 についての類似の手順を用いることにより、化合物 S 1 2 - 1 - 2 ($R_1 R_2 = Et_2$) および CH_3CHO から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.56 (s, 1H), 4.75 (t, $J = 8.0$ Hz, 1H), 4.26 (s, 1H), 3.99–3.93 (m, 1H), 3.63–3.56 (m, 1H), 3.53–3.43 (m, 2H), 3.39–3.32 (m, 2H), 3.29–3.25 (m, 1H), 3.10–2.95 (m, 4H), 2.70–2.62 (m, 2H), 2.34–2.20 (m, 4H), 1.69–1.59 (m, 1H), 1.41 (t, $J = 7.2$ Hz, 6H), 1.24 (t, $J = 7.2$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 608.07 ($M+H$).

【0 6 2 0】

【化 4 4 2】




CH_3OH (3 mL) 中の化合物 S 1 2 - 1 - 2 ($R_1 R_2 = Et_2$ 、266 mg、0.41 mmol、1 当量) の溶液に $PhCHO$ (100 μL 、0.99 mmol、2.4 当量) および $NaBH(OAc)_3$ (110 mg、0.52 mmol、1.3 当量) を 0 °C において加えた。生じた反応混合物を 0 °C において 15 分間攪拌した。次に、低温を取り除いて、反応液を室温において 15 分間攪拌した。濃 HCl (4 滴) を加えて、生じた反

応液を約2 mLに濃縮した。残留物を、攪拌しているMTBE (70 mL) 中に滴下して、懸濁液が得られた。固体を濾過によって収集して、減圧下で乾燥させた。次に、固体を0.05 N HCl/水中に溶解した。生じた溶液を、Phenomenex Polymerx 10 μ RP-y 100Aカラムを用いて、Waters Autopurification系の分取逆相HPLCによって精製した[10 μ m、150 $\times$ 21.20 mm; 流量、2.0 mL/分; 溶媒A: 0.05 N HCl/水; 溶媒B: CH₃CN; 注入容量: 3.0 mL (0.05 N HCl/水); 勾配: 20分にわたるA中10 $\rightarrow$ 60%のB; 質量による分別捕集]。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.32–7.31 (m, 6H), 4.89 (t, J=8.0 Hz, 1H), 4.47 (d, J=12.8 Hz, 1H), 4.27 (s, 1H), 4.22 (d, J=12.8 Hz, 1H), 3.88–3.83 (m, 1H), 3.64–3.37 (m, 5H), 3.19–3.15 (m, 1H), 3.03–2.95 (m, 2H), 2.77–2.68 (m, 1H), 2.57 (t, J=14.8 Hz, 1H), 2.24–2.12 (m, 4H), 1.67–1.58 (m, 1H), 1.43 (t, J=7.2 Hz, 6H); MS (ESI) m/z 670.32 (M+H)。

【0621】


【化443】

スキーム13



以下の化合物をスキーム13に従って調製した。

【化444】




【0622】

トルエン (8 mL) 中の化合物 S13-1 (1.04 g、2.77 mmol、1 当量) に NaH (444 mg、鉍油中 60%、11.09 mmol、4 当量) を加えた。白色の

懸濁液を室温において8分間撹拌した。ヨウ素（2.81g、11.09mmol、4当量）を加えた。反応混合物を室温において一晩撹拌した。水および1N HCl（11mL）を加えてから10%水性Na₂SO₃を加えた。混合物をEtOAcで抽出した。有機相をブラインで洗浄して、減圧下で濃縮して、所望の生成物S13-2が得られた：MS（ESI）m/z 498.9（M-H）。

【0623】

【化445】




10

上記の生成物S13-2（2.77mmol、粗化合物、1当量）をDMF（5mL）中に溶解した。BnBr（0.40mL、3.32mmol、1.2当量）およびK₂CO₃（0.57g、4.16mmol、1.5当量）を加えた。懸濁液を室温において一晩撹拌した。反応混合物をEtOAcで希釈して、水（50mL×2）およびブライン（30mL×1）で洗浄した。有機相を減圧下で濃縮して、残留物をシリカゲル上において0から3% EtOAc／ヘキサンで精製して、所望の生成物S13-3が得られた：MS（ESI）m/z 589.0（M-H）。

【0624】

【化446】




20

-78℃に冷却したTHF（5mL）中の化合物S13-3（632mg、1.07mmol、1当量）にiPrMgCl-LiCl（1.07mL、1.3M／THF、1.39mmol、1.3当量）を滴加しながら、反応液の内部温度を-72から-75℃の間で維持した。反応液を-78℃において30分間撹拌した。1-N-Boc-2,3-ジヒドロピロール（0.92mL、5.33mmol、5当量）を滴加した。反応液を撹拌しながら2時間にわたって-78℃から室温まで徐々に温めた。反応液をさらに室温において48時間撹拌した。EtOAc（100mL）を加えた。反応混合物を飽和水性塩化アンモニウム（50mL×2）およびブライン（50mL×1）で洗浄して、硫酸マグネシウム上で乾燥させて、減圧下で濃縮した。0から8% EtOAc／ヘキサンによるシリカゲルでのカラムクロマトグラフィーにより、淡い色の油として所望の生成物S13-4（224mg、38%）が得られた：MS（ESI）m/z 576.4（M+Na）。

【0625】

【化447】



30

40


化合物S13-4（224mg、0.40mmol）を室温において1時間、ジオキサン中の4N HClで処理した。飽和水性重炭酸ナトリウム（50mL）を加えて、反応混合物をEtOAc（50mL×3）で抽出した。組み合わせたEtOAc抽出物を硫酸

50

マグネシウム上で乾燥させて、減圧下で濃縮して、淡い色の固体として化合物 S 13-5 (165 mg、90%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.20–7.60 (m, 8H), 7.10 (d, J=7.3 Hz, 2H), 5.56 (ABq, J=12.2, 28.1 Hz, 2H), 4.76 (d, J=3.6 Hz, 1H), 4.03 (br d, J=8.0 Hz, 1H), 3.10–3.20 (m, 1H), 2.65–2.80 (m, 1H), 2.49 (s, 3H), 1.90–2.00 (m, 1H), 1.55–1.70 (m, 1H); MS (ESI) m/z 454.4 (M+H).

【0626】


【化448】



1,2-ジクロロエタン (4 mL) 中の化合物 S 13-5 (165 mg、0.36 mmol、1当量) に HOAc (0.033 mL、0.55 mmol、1.5当量)、ベンズアルデヒド (0.055 mL、0.54 mmol、1.5当量)、および Na(OAc)₃BH (116 mg、0.55 mmol、1.5当量) を室温において加えた。反応混合物を室温において一晩攪拌して、水性重炭酸ナトリウム (50 mL) を加えて、EtOAc (50 mL × 3) で抽出した。組み合わせた EtOAc 抽出物を硫酸ナトリウム上で乾燥させて、減圧下で濃縮した。0~8% EtOAc/ヘキサンによるシリカゲルでのカラムクロマトグラフィーにより、淡い色の油として所望の生成物 S 13-6 (178 mg、91%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 7.20–7.70 (m, 13H), 7.07 (d, J=7.4 Hz), 5.48 (br d, J=12.2 Hz, 1H), 5.18 (br d, J=12.2 Hz, 1H), 4.62 (br s, 1H), 4.23 (br s, 1H), 3.85 (br s, 1H), 3.64 (d, J=12.8 Hz, 1H), 3.01 (br s, 1H), 2.82 (br s, 1H), 2.49 (s, 3H), 2.04 (br s, 1H), 1.87 (br s, 1H); MS (ESI) m/z 544.4 (M+H).

【0627】

【化449】




−78℃のTHF (2 mL) 中のジイソプロピルアミン (0.058 mL、0.41 mmol、1.25当量) に nBuLi (0.164 mL、2.5 M/ヘキサン、0.41 mmol、1.25当量) を滴加した。反応液を0℃において10分間攪拌して、−78℃に冷却した。化合物 S 13-6 (178 mg、0.33 mmol、4 mL THF中) を滴加しながら、反応液の内部温度を−70から−78℃の間で維持した。生じた濃い赤色の溶液を−78℃において30分間攪拌した。LHMDS (0.41 mL、1 M/THF、0.41 mmol、1.25当量) およびエノン S 5-5 (198 mg、0.41 mmol、2 mL THF中) を滴加しながら、反応液の内部温度を−70から−78℃の間で維持した。反応液を攪拌しながら2時間にわたり、−78℃から0℃まで徐々に温めた。飽和水性重炭酸ナトリウム (50 mL) を加えた。反応混合物を EtOAc (50 mL × 3) で抽出した。組み合わせた EtOAc 抽出物を硫酸マグネシウム上で乾燥させた。0から25% EtOAc/ヘキサンによるシリカゲルでのカラムクロマトグラフィーに

より、黄色の泡として所望の生成物の2つのジアステレオマーが得られた。S13-7A、ジアステレオマーA (125 mg、41%) : ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 16.01 (s, 1H), 7.18–7.50 (m, 11H), 6.80–6.90 (m, 4H), 5.49 (br s, 2H), 5.36 (s, 2H), 4.97 (s, 2H), 4.50 (br s, 1H), 4.13 (br s, 1H), 3.94 (d, $J=13.0$ Hz, 1H), 3.76 (br s, 1H), 3.62 (d, $J=13.4$ Hz, 1H), 3.19 (br d, $J=16.5$ Hz, 1H), 2.90–3.05 (m, 2H), 2.40–3.80 (m, 4H), 2.48 (s, 6H), 2.11 (br d, $J=14.7$ Hz, 1H), 0.85 (s, 9H), 0.28 (s, 3H), 0.16 (s, 3H); MS (ESI) m/z 932.6 (M+H). S13-7B, ジアステレオマーB (136 mg, 44%) : ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 15.87 (s, 1H), 6.85–7.45 (m, 15H), 6.05 (d, $J=10.4$ Hz, 1H), 5.35 (br s, 1H), 5.25–5.35 (m, 1H), 5.30 (d, $J=10.2$ Hz, 2H), 4.51 (br s, 1H), 4.07 (br s, 1H), 3.90 (d, $J=13.1$ Hz, 1H), 3.70–3.80 (m, 1H), 3.75 (d, $J=13.0$ Hz, 1H), 3.55–3.65 (m, 1H), 3.08–3.18 (m, 1H), 2.00–2.95 (m, 6H), 2.40 (s, 6H), 0.80 (s, 9H), 0.00–0.25 (m, 6H); MS (ESI) m/z 932.6 (M+H).

【0628】


【化450】



ジオキサン (4 mL) 中の化合物 S13-7A (125 mg、0.134 mmol) を室温において一晩、48%水性 HF (4 mL) で処理した。反応混合物を、激しく攪拌している飽和水性 K_2HPO_4 溶液 (160 mL) 中にゆっくり加えた。混合物を EtOAc (50 mL $\times$ 3) で抽出した。EtOAc 抽出物を組み合わせて、硫酸マグネシウム上で乾燥させて、減圧下で濃縮して、黄色の泡として粗生成物 S13-8A が得られた: MS (ESI) m/z 818.5 (M+H)。同様に化合物 S13-7B (136 mg、0.146 mmol) を脱シリル化して、黄色の泡として化合物 S13-8B が得られた: MS (ESI) m/z 818.5 (M+H)。

【0629】

【化451】



化合物 S13-8A (0.134 mmol、粗化合物) をジオキサン:メタノール (3:1、v/v、4 mL) 中に溶解した。HCl (0.5 M/水性メタノール、1 mL) および 10% Pd-C (29 mg、0.014 mmol、0.1 当量) を加えた。次に、反応混合物を H_2 (1 気圧) 下で 4 時間攪拌した。反応混合物の半分 (2.5 mL) を反応器から取り出して、小さいセライトパッドで濾過した。セライトパッドをメタノール (2 mL $\times$ 3) で洗浄した。組み合わせた濾液を減圧下で濃縮した。粗生成物を、20 分にわたる、5% アセトニトリル/0.05 N HCl から 40% アセトニトリル/0.05 N

HClの勾配による分取HPLCによって精製して、凍結乾燥後に黄色の固体として所望の生成物S13-9-1A(22mg、ビス-HCl塩、53%)が得られた。¹H NMR(400MHz, CD₃OD) δ 5.31(d, J=3.7Hz, 1H), 4.40(br d, J=5.5Hz, 1H), 4.13(s, 1H), 3.64(dd, J=6.7, 11.6Hz, 1H), 2.90-3.20(m, 4H), 3.05(s, 3H), 2.95(s, 3H), 2.50-2.62(m, 1H), 2.10-2.30(m, 3H), 1.55-1.70(m, 1H); MS(ESI) m/z 550.4(M+H).

【0630】

上述の反応混合物のもう半分(2.5mL)にホルムアルデヒド(0.10mL、水中37%、1.33mmol、20当量)を加えた。反応混合物をH₂(1気圧)下で室温において72時間攪拌して、小さいセライトパッドで濾過した。セライトパッドをメタノール(2mL×3)で洗浄して、組み合わせた濾液を減圧下で濃縮した。粗生成物を、20分にわたる、5%アセトニトリル/0.05N HClから40%アセトニトリル/0.05N HClの勾配による分取HPLCによって精製して、凍結乾燥後にオレンジ色の固体として所望の生成物S13-9-2A(16mg、ビス-HCl塩、38%)が得られた。¹H NMR(400MHz, CD₃OD) δ 5.42(d, J=3.0Hz, 1H), 4.40(br s, 1H), 4.13(s, 1H), 3.70-3.80(m, 1H), 2.94-3.15(m, 4H), 3.08(s, 3H), 3.05(s, 3H), 2.95(s, 3H), 2.55-2.65(m, 1H), 2.20-2.35(m, 3H), 1.58-1.70(m, 1H); MS(ESI) m/z 564.3(M+H).

【0631】

化合物S13-8B(0.146mmol、粗化合物)をS13-8Aと同様に処理して、以下の所望の化合物が得られた。


S13-9-1B(19mg、ビス-HCl塩、黄色の固体、42%): ¹H NMR(400MHz, CD₃OD) δ 5.30(d, J=3.0Hz, 1H), 4.40(br d, J=5.5Hz, 1H), 4.13(s, 1H), 3.63(dd, J=6.3, 11.6Hz, 1H), 2.90-3.22(m, 4H), 3.04(s, 3H), 2.94(s, 3H), 2.52-2.61(m, 1H), 2.08-2.30(m, 3H), 1.56-1.68(m, 1H); MS(ESI) m/z 550.4(M+H).

S13-9-2b(18mg、ビス-HCl塩、黄色の固体、39%): ¹H NMR(400MHz, CD₃OD) δ 5.41(d, J=2.8Hz, 1H), 4.39(br s, 1H), 4.14(s, 1H), 3.70-3.78(m, 1H), 2.90-3.25(m, 4H), 3.11(s, 3H), 3.04(s, 3H), 2.95(s, 3H), 2.54-2.63(m, 1H), 2.20-2.35(m, 3H), 1.58-1.69(m, 1H); MS(ESI) m/z 564.3(M+H).

【0632】


【化 4 5 2】

スキーム14



以下の化合物をスキーム14に従って調製した。

【化 4 5 3】




【0633】

一般的な手順Eを用いることにより、化合物S14-2を化合物S14-1（国際公開第2012/021712A1号が挙げられる文献の手順に従って調製した、対応するフェノールの標準的なベンジル化を介して得た）およびジアリルエノンS2-3から調製した。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 16.05 (s, 1H), 7.52–7.42 (m, 4H), 7.41–7.25 (m, 6H), 7.13–7.07 (m, 1H), 6.83 (dd, J=9.4, 4.1 Hz, 1H), 5.85–5.73 (m, 2H), 5.36 (s, 2H), 5.24–5.07 (m, 6H), 4.08 (d, J=10.1 Hz, 1H), 3.36–3.27 (m, 2H), 3.25–3.10 (m, 3H), 3.04–2.9 (m, 1H), 2.68–2.57 (m, 1H), 2.54–2.39 (m, 2H), 2.15–2.08 (m, 1H), 0.816 (s, 9H), 0.25 (s, 3H), 0.12 (s, 3H); MS (ESI) m/z 777.58 (M+H).

【0634】

【化 4 5 4】




一般的な手順Aを用いることにより、化合物S14-3およびS14-4を化合物S14-2から調製した。S14-3: ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 16.61 (s, 1H), 7.54–7.42 (m, 4H), 7.42–7.26 (m, 6H), 7.08 (t, J=8.4 Hz, 1H), 6.83 (dd, J=9.0, 4.0 Hz, 1H), 5.39, 5.35 (ABq, J=12.2 Hz, 2H), 5.23, 5.14 (ABq, J=12.2 Hz, 2H), 3.92 (d, J=2.4 Hz, 1H), 3.0

2 (dd, $J=16.0, 3.6$ Hz, 1H), 2.87–2.75 (m, 1H), 2.64–2.57 (m, 1H), 2.19 (t, $J=16.0$ Hz, 1H), 2.15–2.05 (m, 2H), 0.73 (s, 9H), 0.20 (s, 3H), 0.09 (s, 3H); MS (ESI) 697.53 m/z (M+H). S14-4: ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 16.66 (s, 1H), 7.54–7.42 (m, 4H), 7.42–7.25 (m, 6H), 7.10–7.04 (m, 1H), 6.83 (dd, $J=9.2, 4.5$ Hz, 1H), 5.93–5.78 (m, 1H), 5.41–5.34 (m, 2H), 5.30–5.08 (m, 4H), 4.69 (d, $J=6.1$ Hz, 1H), 3.76–3.70 (m, 1H), 3.58–3.50 (m, 1H), 3.46–3.37 (m, 1H), 3.02–2.94 (m, 1H), 2.83–2.67 (m, 2H), 2.15 (t, $J=15.0$ Hz, 1H), 2.06–1.98 (m, 1H), 0.72 (s, 9H), 0.20 (s, 3H), 0.07 (s, 3H); MS (ESI) m/z 737.51 (M+H).

【0635】


【化455】



一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S14-6-1を化合物S14-3から調製した。S14-6-1: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.26 (t, $J=8.9$ Hz, 1H), 6.80 (dd, $J=9.2, 4.0$ Hz, 1H), 3.87 (s, 1H), 3.15 (dd, $J=15.3, 4.9$ Hz, 1H), 2.97 (qd, $J=9.8, 4.9$ Hz, 1H), 2.61 (dt, $J=12.6, 2.1$ Hz, 1H), 2.29 (t, $J=10.4$ Hz, 1H), (qd, $J=13.7, 2.4$ Hz, 1H), 1.59 (td, $J=13.3, 10.6$ Hz, 1H); MS (ESI) m/z 405.25 (M+H).

【0636】

【化456】



一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S14-6-2を化合物S14-2から調製した。S14-6-2: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.26 (t, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.81 (dd, $J=9.2, 4.0$ Hz, 1H), 3.86 (s, 1H), 3.27–3.17 (m, 2H), 3.16–3.09 (m, 1H), 3.04–2.92 (m, 1H), 2.82 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.27 (t, $J=14.6$ Hz, 1H), 2.19 (dq, $J=13.6, 2.6$ Hz, 1H), 1.76 (td, $J=15.6, 7.7$ Hz, 2H), 1.57 (td, $J=13.4, 11.0$ Hz, 1H), 1.03 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 447.33 (M+H).

【0637】

10


20

30

40

50


【化 4 5 7】



一般的な手順 B-1、C、および D 2 を用いることにより、HCHO によって化合物 S 1 4-6-3 および S 1 4-6-4 を化合物 S 1 4-4 から調製した。S 1 4-6-3: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.27 (t, $J=8.9$ Hz, 1H), 6.81 (dd, $J=9.2, 4.0$ Hz, 1H), 3.78 (s, 1H), 3.14 (dd, $J=15.0, 4.6$ Hz, 1H), 3.04-2.93 (m, 2H), 2.90 (s, 3H), 2.80-2.73 (m, 1H), 2.28 (t, $J=14.6$ Hz, 1H), 2.18 (dq, $J=13.6, 2.6$ Hz, 1H), 1.62-1.50 (m, 1H), MS (ESI) m/z 419.32 ($M+H$). S 1 4-6-4: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.27 (t, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.81 (dd, $J=9.2, 4.0$ Hz, 1H), 4.19 (s, 0.5H), 4.09 (s, 0.5H), 3.39-3.31 (m, 1H), 3.22-3.09 (m, 2H), 3.08-2.86 (m, 5H), 2.34-2.13 (m, 2H), 1.90-1.56 (m, 3H), 1.08-0.95 (m, 3H); MS (ESI) m/z 461.32 ($M+H$).

【0 6 3 8】


【化 4 5 8】



一般的な手順 B-1 (0°C)、C、および D 2 を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物 S 1 4-6-5 を化合物 S 1 4-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.26 (t, $J=8.9$ Hz, 1H), 6.81 (dd, $J=9.2, 4.0$ Hz, 1H), 3.84 (s, 1H), 3.48-3.30 (m, 2H), 3.14 (dd, $J=14.6, 4.3$ Hz, 1H), 3.03-2.92 (m, 1H), 2.79 (d, $J=12.2$ Hz, 1H), 2.27 (t, $J=14.4$ Hz, 1H), 2.19 (qd, $J=11.2, 3.2$ Hz, 1H), 1.62-1.50 (m, 1H), 1.35 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 433.31 ($M+H$).

【0 6 3 9】

【化 4 5 9】




一般的な手順 B-1 (0°C) を用いることによって CH_3CHO により、次いで再度 HCHO による B-1、C、および D-2 を用いることにより、化合物 S 1 4-6-6 を化合物 S 1 4-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7

. 27 (t, $J=8.9$ Hz, 1H), 6.81 (dd, $J=9.2, 4.0$ Hz, 1H), 4.21 (s, 0.5H). 4.10 (s, 0.5H), 3.52–3.41 (m, 1H), 3.38–3.29 (m, 1H), 3.19–3.11 (m, 1H), 3.09–2.85 (m, 5H), 2.34–2.15 (m, 2H), 1.71–1.56 (m, 1H), 1.44–1.33 (m, 3H); MS (ESI) m/z 447.29 ($M+H$).

【0640】

【化460】




10

一般的な手順B-1、C、およびD2を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物S14-6-7を化合物S14-3から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.27 (t, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.81 (dd, $J=9.2, 4.0$ Hz, 1H), 4.23 (s, 1H), 3.63–3.52 (m, 1H), 3.80–3.40 (m, 2H), 3.35–3.24 (m, 1H), 3.19–3.11 (m, 1H), 3.07–2.96 (m, 1H), 2.88 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.32–2.16 (m, 2), 1.69–1.56 (m, 1H), 1.40 (t, $J=7.0$ Hz, 6H); MS (ESI) m/z 461.32 ($M+H$).

20

【0641】

【化461】




30

一般的な手順B-2、C、およびD-2を用いて、 Ac_2O により、化合物S14-6-8を化合物S14-3から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.23 (t, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.76 (dd, $J=9.2, 3.7$ Hz, 1H), 4.70–4.59 (m, 1H), 3.10–3.03 (m, 1H), 3.02–2.91 (m, 1H), 2.53–2.30 (m, 2H), 2.03 (s, 3H), 1.65–1.56 (m, 1H); MS (ESI) m/z 447.24 ($M+H$).

【0642】

【化462】



40

一般的な手順B-2、C、およびD-2を用いて、 Ms_2O により、化合物S14-6-9を化合物S14-3から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.24 (t, $J=8.9$ Hz, 1H), 6.77 (dd, $J=8.9, 4.0$ Hz, 1H), 4.09 (d, $J=4.3$ Hz, 1H), 3.16–3.08 (m, 4H)


50

, 3.04–2.92 (m, 1H), 2.53–2.40 (m, 2H), 2.31–2.23 (m, 1H), 1.72–1.61 (m, 1H); MS (ESI) m/z 483.1 (M+H).

【0643】


【化463】

スキーム15



以下の化合物をスキーム15に従って調製した。

【化464】




【0644】

一般的な手順Eを用いることにより、化合物S15-2を化合物S15-1（国際公開第2011/025982A2号が挙げられる文献の手順に従って調製した）およびジアリルエノンS2-3から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 16.07 (s, 1H), 7.51–7.43 (m, 4H), 7.40–7.25 (m, 6H), 6.92, 6.82 (ABq, $J=8.8\text{ Hz}$, 2H), 5.88–5.73 (m, 2H), 5.35 (s, 2H), 5.23–5.06 (m, 6H), 4.11 (d, $J=9.8\text{ Hz}$, 1H), 3.80 (s, 3H), 3.36–3.15 (m, 5H), 3.00–2.77 (m, 1H), 2.56–2.34 (m, 3H), 2.15–2.08 (m, 1H), 0.81 (s, 9H), 0.25 (s, 3H), 0.12 (s, 3H); MS (ESI) m/z 789.55 (M+H).

【0645】

【化465】




一般的な手順Aを用いることにより、化合物S15-3およびS15-4を化合物S15-2から調製した。S15-3: ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3) δ 16.

6.3 (s, 1H), 7.53–7.46 (m, 4H), 7.41–7.27 (m, 6H), 6.93 (d, J=9.2 Hz, 1H), 6.85 (d, J=9.2 Hz, 1H), 5.41, 5.36 (ABq, J=12.1 Hz, 2H), 5.22, 5.12 (ABq, J=12.1 Hz, 2H), 3.96–3.92 (m, 1H), 3.66 (s, 3H), 3.16 (dd, J=15.9, 4.3 Hz, 1H), 2.84–2.72 (m, 1H), 2.64–2.57 (m, 1H), 2.13–2.06 (m, 3H), 0.75 (s, 9H), 0.22 (s, 3H), 0.12 (s, 3H); MS (ESI) m/z 709.49 (M+H). S15-3: ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 16.70 (s, 1H), 7.54–7.46 (m, 4H), 7.41–7.28 (m, 6H), 6.93 (d, J=9.2, 1H), 6.85 (d, J=9.2 Hz, 1H), 5.95–5.84 (m, 1H), 5.42, 5.37 (ABq, J=12.2 Hz, 2H), 5.32–5.08 (m, 4H), 3.77 (s, 3H), 3.56 (dd, J=13.2, 6.7 Hz, 1H), 3.47–3.39 (m, 1H), 3.11 (dd, J=15.9, 4.9 Hz, 1H), 2.80–2.68 (m, 2H), 2.61–2.45 (m, 1H), 2.08–1.98 (m, 2H), 1.51–1.39 (m, 1H), 0.73 (s, 9H), 0.22 (s, 3H), 0.10 (s, 3H); MS (ESI) m/z 749.48 (M+H).

【0646】


【化466】



一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S15-6-1を化合物S15-3から調製した。S15-6-1: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 塩酸塩) δ 7.21 (d, J=9.2 Hz, 1H), 6.78 (d, J=9.2 Hz, 1H), 3.83 (s, 1H), 3.77 (s, 3H), 2.93–2.82 (m, 1H), 2.60–2.52 (m, 1H), 2.22–2.07 (m, 2H), 1.63–1.50 (m, 1H); MS (ESI) m/z 417.25 (M+H).

【0647】

【化467】




一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S15-6-2およびS15-6-3を化合物S15-2から調製した。S15-6-2: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 塩酸塩) δ 7.21 (d, J=9.2 Hz, 1H), 6.78 (d, J=9.2 Hz, 1H), 3.85 (s, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.28–3.14 (m, 3H), 2.96–2.84 (m, 1H), 2.80 (d, J=12.2 Hz, 1H), 2.20–2.05 (m, 2H), 1.81–1.65 (m, 2H), 1.60–1.48 (m, 1H), 1.02 (t, J=7.3 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 459.4 (M+H). S15-6-3: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 塩酸塩) δ 7.22 (d, J=9.2 Hz, 1H), 6.78 (d, J=9.2 Hz, 1H), 4.18 (s, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.39–3.14 (m, 5H), 3.04–2.64 (m, 2H), 2.20–2.08 (m, 2H), 1.90

− 1.74 (m, 2H), 1.70−1.52 (m, 1H), 1.08−0.98 (m, 6H); MS (ESI) m/z 501.3 (M+H).

【0648】


【化468】



一般的な手順B-1、C、およびD2を用いることにより、HCHOによって化合物S14-6-4およびS14-6-5を化合物S15-4から調製した。S15-6-4: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.21 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.78 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 3.80−3.76 (m, 4H), 3.26−3.20 (m, 1H), 2.95−2.84 (m, 4H), 2.78−2.71 (m, 1H), 2.19−2.04 (m, 2H), 1.60−1.47 (m, 1H); MS (ESI) m/z 431.2 (M+H). S15-6-5: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩, 回転異性体) δ 7.21 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.78 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.18 (s, 0.5H), 4.08 (s, 0.5H), 3.78 (s, 3H), 3.40−3.23 (m, 3H), 3.22−3.10 (m, 1H), 3.04−2.85 (m, 4H), 2.23−2.06 (m, 2H), 1.90−1.69 (m, 2H), 1.69−1.54 (m, 1H), 1.07−0.96 (m, 3H); MS (ESI) m/z 473.2 (M+H).

【0649】


【化469】



一般的な手順B-1 (0°C)、C、およびD2を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物S15-6-6を化合物S15-3から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.21 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.77 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 3.84 (s, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.45−3.20 (m, 2H), 2.96−2.83 (m, 1H), 2.78 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.21−2.00 (m, 2H), 1.59−1.46 (m, 1H), 1.35 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 445.2 (M+H).

【0650】

【化470】




一般的な手順B-1 (0°C)を用いることによって CH_3CHO により、次いで再度HCHOによるB-1、C、およびD-2を用いることにより、化合物S15-6-7を化

合物 S 1 5 - 3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩, 回転異性体) δ 7.22 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.77 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.20 (s, 0.5H), 4.09 (s, 0.5H), 3.77 (s, 3H), 3.52–3.40 (m, 1H), 3.38–3.22 (m, 2H), 3.04–2.83 (m, 5H), 2.23–2.06 (m, 2H), 1.70–1.53 (m, 1H), 1.44–1.33 (m, 3H); MS (ESI) m/z 459.2 ($M+H$).

【0651】

【化471】




10

一般的な手順 B-1、C、および D 2 を用いることにより、 CH_3CHO によって化合物 S 1 5 - 6 - 8 を化合物 S 1 5 - 3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 7.21 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.77 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.22 (s, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.64–3.52 (m, 1H), 3.48–3.37 (m, 2H), 3.30–3.23 (m, 2H), 3.01–2.81 (m, 2H), 2.23–2.05 (m, 2H), 1.66–1.53 (m, 1H), 1.39 (t, $J=7.3$ Hz, 6H); MS (ESI) m/z 473.2 ($M+H$).

20

【0652】

【化472】




30

一般的な手順 B-2、C、および D-2 を用いて、 Ac_2O により、化合物 S 1 5 - 6 - 9 を化合物 S 1 5 - 3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩, 回転異性体) δ 7.18 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.75 (d, $J=8.5$ Hz, 1H), 4.71–4.64 (m, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.20 (dd, $J=16.5, 4.9$ Hz, 1H), 2.94–2.84 (m, 1H), 2.46–2.22 (m, 3H), 2.03 (s, 3H), 1.63–1.52 (m, 1H); MS (ESI) m/z 459.2 ($M+H$).

【0653】

【化473】



40

一般的な手順 B-2、C、および D-2 を用いて、 Ms_2O により、化合物 S 1 5 - 6 - 10 を化合物 S 1 5 - 3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸


50

塩，回転異性体) δ 7.18 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 6.74 (d, $J=9.2$ Hz, 1H), 4.71–4.64 (m, 1H), 4.08 (d, $J=4.3$ Hz, 1H), 3.77 (s, 3H), 3.23 (dd, $J=15.9, 4.9$ Hz, 1H), 3.13 (s, 3H), 2.95–2.84 (m, 1H), 2.48 (td, $J=7.2, 3.5$ Hz, 1H), 2.33–2.18 (m, 2H), 1.69–1.58 (m, 1H); MS (ESI) m/z 495.18 (M+H).

【0654】


【化474】

スキーム16



以下の化合物をスキーム16に従って調製した。

【化475】



【0655】

一般的な手順Eを用いることにより、化合物S16-2-1をS16-1 (6.574 g、12.36 mmol、2.1当量) およびC-4エチルメチルアミノエノンS2-3 (3.149 g、5.89 mmol、1当量) から調製した。生成物S16-2-1 (1.321 g、23%) : ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 16.17 (s, 1H), 7.55–7.50 (m, 4H), 7.41–7.30 (m, 8H), 7.29–7.22 (m, 4H), 7.18–7.11 (m, 4H), 6.68 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 5.88–5.76 (m, 2H), 5.37 (s, 2H), 5.27–5.10 (m, 5H), 5.00 (d, $J=9.5$ Hz, 1H), 4.33 (d, $J=14.6$ Hz, 2H), 4.19 (d, $J=14.0$ Hz, 2H), 3.38–3.19 (m, 4H), 3.13–2.95 (m, 2H), 2.17–2.10 (m, 1H), 0.83 (s, 9H), 0.26 (s, 3H), 0.15 (s, 3H); MS (ESI) m/z 972.55 (M+H).

【0656】

10


20

30

40

50


【化 4 7 6】



一般的な手順Aを用いることにより、化合物S16-2-2を化合物S16-2-1 (1.321g、1.36mmol、1当量)から調製した。S16-2-2 (884mg、72%)：¹H NMR (400MHz, CDCl₃) δ 16.52 (s, 1H), 7.40–7.33 (m, 4H), 7.30–7.20 (m, 6H), 7.20–7.13 (m, 2H), 7.09–7.02 (m, 4H), 6.56 (d, J=10.4Hz, 1H), 5.31, 5.26 (ABq, J=16.8Hz, 2H), 5.17, 5.04 (ABq, J=10.4Hz, 2H), 4.26, 4.11 (ABq, J=14.0Hz, 2H), 3.82 (s, 1H), 2.82 (dd, J=15.3, 4.3Hz, 1H), 2.64–2.52 (m, 1H), 2.52–2.44 (m, 1H), 2.08–1.92 (m, 4H), 0.67 (s, 9H), 0.12 (s, 3H), 0.00 (s, 3H); MS (ESI) m/z 892.56 (M+H).

【0657】


【化 4 7 7】



一般的な手順Cに続いて、0℃のDCM (10mL)中のBoc₂O (227mg、1.04mmol、1.05当量)での処理、その後の周囲温度への加温を用いて、LCMS分析による完了まで、化合物S16-3を化合物S16-2-2 (884mg、0.99mmol、1当量)から調製した。反応溶液を飽和水性塩化アンモニウム (30mL)で希釈して、EtOAc (2×35mL)で抽出した。組み合わせた有機層をブラインで洗浄して、Na₂SO₄上で乾燥させて、濾過して、減圧下で濃縮した。生じた粗生成物を、8%～50% EtOAc/ヘキサンを用いるシリカゲルでのフラッシュカラムクロマトグラフィーを介して精製して、所望の生成物S16-3 (750mg、86%)が得られた。¹H NMR (400MHz, CDCl₃) δ 16.03 (s, 1H), 7.50–7.21 (m, 15H), 7.18–7.11 (m, 5H), 6.68 (d, J=10.4Hz, 1H), 5.83–5.77 (m, 1H), 5.35 (s, 2H), 5.23 (d, J=9.7Hz, 1H), 5.13–5.03 (m, 2H), 4.57 (s, 1H), 4.33 (d, J=14.6Hz, 2H), 4.22 (d, J=14.0Hz, 2H), 2.92–2.85 (m, 1H), 2.70–2.57 (m, 2H), 2.16–2.05 (m, 2H), 1.57 (s, 9H); MS (ESI) m/z 878.61 (M+H).

【0658】

【化 4 7 8】



10

20

30


40

50

1 N 水性 HCl (854 μ L、1 当量) を有するメタノール：ジオキサン (1：1、8 mL) 中に S16-3 (750 mg、0.854 mmol、1 当量) を溶解することによって化合物 S16-4 を調製した。Pd-C (10 重量%、106 mg) を一部加えて、反応器をシールし、およびフラスコを短時間真空にしてから水素ガス (1 気圧) でフラッシュすることによって水素でパージした。反応混合物を水素雰囲気 (1 気圧) 下で室温において 6.5 時間撹拌した。反応液を小さいセライトパッドで濾過した。ケーキを CH₃OH で洗浄した。濾液を濃縮して、生じたオレンジ色の泡をさらなる精製なしで用いた。S16-4：MS (ESI) m/z 518.26 (M-H)。

【0659】


【化479】



CH₃OH (750 μ L) 中の S16-4 (20 mg、0.038 mmol、1 当量) の溶液に濃 HCl (12 N、200 μ L) を加えた。反応液を室温において 4 時間撹拌した。溶液を減圧下で濃縮して、残留物を水中の 0.05 N HCl 中に溶解して、生じた溶液を、Phenomenex Polymerx 10 μ RP- γ 100A カラムを用いて、Waters Autopurification 系の分取逆相 HPLC によって精製した [10 μ m、150 $\times$ 21.20 mm; 流量、20 mL/分; 溶媒 A：0.05 N HCl/水; 溶媒 B：CH₃CN; 注入容量：2.0 mL (0.05 N HCl/水); 勾配：20 分にわたる A 中 5 $\rightarrow$ 30% の B; 質量による分別捕集]。所望の生成物を含有する画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物 S16-5 が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.38 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.23–3.10 (m, 1H), 3.09–2.95 (m, 1H), 2.64 (d, J = 12.2 Hz, 1H), 2.42–2.30 (m, 1H), 2.29–2.19 (m, 1H), 2.68–2.45 (m, 1H); MS (ESI) m/z 420.2 (M+H)。

【0660】

【化480】




一般的な手順 H (アシル化/アミン付加)：DMPU：CH₃CN (400 μ L：1.6 mL) 中の S16-4 (32 mg、0.62 mmol、1 当量) の溶液に Na₂CO₃ (32 mg、0.302 mmol、5 当量) および臭化プロモアセチル (6.5 μ L、0.72 mmol、1.2 当量) を加えた。この混合物を窒素雰囲気下で 1.5 時間撹拌した。メチルアミンの溶液 (THF 中 2.0 M、335 μ L、0.62 mmol、1.0 当量) を加えて、反応液を室温において 17 時間撹拌した。反応溶液を減圧下で濃縮してから CH₃OH (400 μ L) 中に溶解して、迅速に撹拌している MTBE (15 mL) に滴下した。生じた緑色の沈殿物をセライトパッドで濾別して、MTBE で洗浄した。固体を、数滴の濃 HCl を含有する CH₃OH でセライトパッドから洗浄した。生じたオレンジ色の溶液を真空中で濃縮した。粗残留物を CH₃OH (1 mL) 中に溶解し、ここに水中 0.05 N HCl (300 μ L) および濃 HCl (200 μ L) を加えた。反応溶液を室温において 1.5 時間撹拌した。溶液を減圧下で濃縮して、生じた残留物を CH₃OH (800 μ L) 中に溶解して、迅速に撹拌している MTBE (15 mL) に加えた。生じ

たオレンジ色の沈殿物をすでに述べたようにセライトパッドで濾過して洗浄してから、 CH_3OH でセライトパッドから洗浄した。溶液を減圧下で濃縮した。残留物を水中0.05 N HCl 中に溶解して、生じた溶液をPhenomenex Polymerx 10 μm RP- γ 100Aカラムを用いて、Waters Autopurification系の分取逆相HPLCによって精製した[10 μm 、150×21.20mm; 流量、20 mL/分; 溶媒A: 0.05 N HCl /水; 溶媒B: CH_3CN ; 注入容量: 2.0 mL (0.05 N HCl /水); 勾配: 20分にわたるA中5→30%のB; 質量による分別捕集]。所望の生成物を含有する画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物S16-6-1 (4.9 mg、4%) が得られた。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.06 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.18–3.10 (m, 1H), 3.07–2.93 (m, 1H), 2.77 (s, 3H), 2.62 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.33–2.18 (m, 2H), 1.64–1.56 (m, 1H); MS (ESI) m/z 491.21 (M+H)。

【0661】


【化481】



一般的な手順Hを用いて、エチルアミンにより、化合物S16-6-2を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.07 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.18–3.10 (m, 3H), 3.07–2.93 (m, 1H), 2.67–2.60 (m, 1H), 2.33–2.20 (m, 2H), 1.64–1.56 (m, 1H) 1.35 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 565.19 (M+H)。

【0662】


【化482】



一般的な手順Hを用いて、プロピルアミンにより、化合物S16-6-3を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.08 (s, 2H), 3.89 (s, 1H), 3.17–2.92 (m, 4H), 2.66 (d, $J=12.2$ Hz, 1H), 2.33–2.20 (m, 2H), 1.85–1.72 (m, 2H), 1.64–1.56 (m, 1H), 1.04 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 519.26 (M+H)。

【0663】

【化483】



10

20

30


40

50

一般的な手順Hを用いて、ブチルアミンにより、化合物S16-6-4を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.08 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.18–2.94 (m, 4H), 2.66 (d, $J=12.2$ Hz, 1H), 2.33–2.20 (m, 2H), 1.78–1.68 (m, 2H), 1.64–1.52 (m, 1H), 1.48–1.38 (m, 2H), 1.00 (t, $J=7.6$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 533.32 ($M+H$).

【0664】

【化484】




10

一般的な手順Hを用いて、イソプロピルアミンにより、化合物S16-6-5を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.08 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.52–3.43 (m, 1H), 3.18–3.10 (m, 1H), 3.05–2.95 (m, 1H), 2.63 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.35–2.20 (m, 2H), 1.64–1.56 (m, 1H), 1.37 (d, $J=6.8$ Hz, 6H); MS (ESI) m/z 519.19 ($M+H$).

【0665】

【化485】




20

一般的な手順Hを用いて、ジメチルアミンにより、化合物S16-6-6およびS16-6-7を化合物S16-4から調製した。S16-6-6: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.22 (s, 2H), 3.87 (s, 1H), 3.18–3.10 (m, 1H), 3.07–2.93 (m, 7H), 2.77 (s, 3H), 2.64–2.60 (m, 1H), 2.33–2.18 (m, 2H), 1.64–1.56 (m, 1H); MS (ESI) 505.27 m/z ($M+H$). S16-6-7: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.78–4.74 (m, 1H), 4.22 (s, 2H), 3.18–3.08 (m, 1H), 2.99 (s, 6H), 2.92–2.74 (m, 2H), 2.36–2.27 (s, 1H), 2.14–2.05 (m, 1H), 1.52–1.42 (m, 1H); MS (ESI) m/z 505.27 ($M+H$).

30

【0666】

【化486】



40


一般的な手順Hを用いて、ジメチルアミンにより、化合物S16-6-8およびS16-6-9を化合物S16-4から調製した。S16-6-8: ^1H NMR (400 MHz

50

z, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.22 (d, J=11.0 Hz, 1H), 4.28 (d, J=17.7 Hz, 1H), 4.16 (d, J=17.7 Hz, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.50–3.23 (m, 2H), 3.17–3.10 (m, 1H), 3.03–2.94 (m, 4H), 2.64–2.60 (m, 1H) 2.36–2.19 (m, 2H), 1.66–1.55 (m, 1H), 1.38 (t, J=7.3 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 519.26 (M+H). S16-6-9: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.22 (d, J=11.0 Hz, 1H), 4.78–4.74 (m, 1H), 4.28 (d, J=17.7 Hz, 1H), 4.16 (d, J=17.7 Hz, 1H), 3.50–3.23 (m, 2H), 3.17–3.10 (m, 1H), 3.03–3.73 (m, 6H), 2.37–2.26 (m, 1H), 2.15–2.05 (m, 1H), 1.51–1.35 (m, 4H); MS (ESI) m/z 519.26 (M+H).

【0667】


【化487】



一般的な手順Hを用いて、N-メチルプロピルアミンにより、化合物S16-6-10を化合物S16-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.22 (d, J=11.0 Hz, 1H), 4.29 (d, J=16.5 Hz, 1H), 4.18 (d, J=18.9 Hz, 1H), 3.30–3.12 (m, 2H), 3.15–2.92 (m, 4H), (d, J=12.2 Hz, 1H), 2.36–2.20 (m, 2H), 1.86–1.76 (m, 2H), 1.64–1.56 (m, 1H), 1.03 (t, J=7.3 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 533.23 (M+H).

【0668】


【化488】



一般的な手順Hを用いて、N-メチルイソプロピルアミンにより、化合物S16-6-11を化合物S16-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.23 (d, J=11.0 Hz, 1H), 4.30 (d, J=15.9 Hz, 1H), 4.09 (d, J=15.9 Hz, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.72–3.65 (m, 1H), 3.18–3.10 (m, 1H), 3.05–2.93 (m, 1H), 2.90 (s, 3H), 2.66–2.61 (m, 1H), 2.35–2.18 (m, 2H), 1.59–1.52 (m, 1H), 1.43–1.32 (m, 6H); MS (ESI) m/z 533.25 (M+H).

【0669】

【化489】



10

20

30


40

50

一般的な手順Hを用いて、N-エチルイソプロピルアミンにより、化合物S16-6-12を化合物S16-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.22 (d, J=11.0 Hz, 1H), 4.31 (d, J=17.1 Hz, 1H), 4.08 (d, J=16.5 Hz, 1H), 3.88 (s, 1H), 3.82-3.72 (m, 1H), 3.41-3.32 (m, 1H), 3.21-3.10 (m, 1H), 3.17-2.93 (m, 1H), 2.66-2.61 (m, 1H), 2.35-2.18 (m, 2H), 1.64-1.52 (m, 1H), 1.44-1.30 (m, 9H); MS (ESI) m/z 547.26 (M+H).

【0670】


【化490】



一般的な手順Hを用いて、R-(-)-sec-ブチルアミンにより、化合物S16-6-13を化合物S16-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.24 (d, J=11.0 Hz, 1H), 4.10 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.72-3.65 (m, 1H), 3.31-3.25 (m, 2H), 3.18-3.10 (m, 1H), 3.05-2.93 (m, 1H), 2.90 (s, 3H), 2.66-2.61 (m, 1H), 2.35-2.18 (m, 2H), 1.88-1.82 (m, 1H), 1.65-1.52 (m, 1H), 1.38-1.25 (m, 3H), 1.04 (t, J=7.9 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 533.23 (M+H).

【0671】


【化491】



一般的な手順Hを用いて、S-(+)-sec-ブチルアミンにより、化合物S16-6-14を化合物S16-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.23 (d, J=11.0 Hz, 1H), 4.09 (s, 2H), 3.87 (s, 1H), 3.18-3.10 (m, 1H), 3.05-2.92 (m, 1H), 2.65-2.60 (m, 1H), 2.36-2.18 (m, 2H), 1.94-1.80 (m, 1H), 1.66-1.53 (m, 2H), 1.33 (d, J=6.7 Hz, 3H), 1.03 (t, J=7.3 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 533.23 (M+H).

【0672】

【化492】



一般的な手順Hを用いて、イソブチルアミンにより、化合物S16-6-15を化合物S16-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.

10

20

30


40

50

2.4 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.09 (s, 2H), 3.89 (s, 1H), 3.18–3.10 (m, 1), 3.15–2.92 (m, 3H), 2.67–2.60 (m, 1H), 2.34–2.19 (m, 2H), 2.13–2.00 (m, 1H), 1.66–1.52 (m, 1H), 1.06 (d, $J=6.7$ Hz, 6H); MS (ESI) m/z 533.32 (M+H).

【0673】

【化493】




10

一般的な手順Hを用いて、イソアミルアミンにより、化合物S16-6-16を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.08 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.20–3.08 (m, 3H), 3.15–2.92 (m, 1H), 2.68–2.62 (m, 1H), 2.36–2.20 (m, 2H), 1.78–1.52 (m, 3H), 0.99 (d, $J=6.1$ Hz, 6H); MS (ESI) m/z 547.25 (M+H).

20

【0674】

【化494】




一般的な手順Hを用いて、3,3-ジメチルブチルアミンにより、化合物S16-6-17を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.10 (s, 2H), 3.89 (s, 1H), 3.19–3.09 (m, 3H), 3.15–2.92 (m, 1H), 2.68–2.62 (m, 1H), 2.35–2.20 (m, 2H), 1.68–1.56 (m, 3H), 0.99 (s, 9H); MS (ESI) m/z 561.27 (M+H).

30

【0675】

【化495】




40

一般的な手順Hを用いて、アゼチジンにより、化合物S16-6-18を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.18 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.42–4.30 (m, 4H), 4.27–4.10 (m, 2H), 3.87 (s, 1H), 3.19–3.10 (m, 1H), 3.02–2.92 (m, 1H), 2.71–2.59 (m, 2H), 2.53–2.40 (m, 1H), 2.34–2.17 (m, 2H), 1.64–1.52 (m, 1H); MS (ESI) m/z 517.27 (M+H).

【0676】

50


【化 4 9 6】



一般的な手順Hを用いて、ピペリジンにより、化合物S16-6-19を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0\text{ Hz}$, 1H), 4.19 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.77-3.58 (m, 2H), 3.20-3.08 (m, 3H), 3.07-2.94 (m, 1H), 2.68-2.62 (m, 1H), 2.35-2.20 (m, 2H), 2.00-1.82 (m, 5H), 1.65-1.52 (m, 2H); MS (ESI) m/z 545.25 ($M+H$).

【0677】


【化 4 9 7】



一般的な手順Hを用いて、ヘキサメチレンイミンにより、化合物S16-6-20を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.24 (d, $J=11.0\text{ Hz}$, 1H), 4.27 (s, 2H), 3.89 (s, 1H), 3.61-3.51 (m, 2H), 3.41-3.32 (m, 2H), 3.19-3.09 (m, 1H), 3.07-2.94 (m, 1H), 2.66-2.61 (m, 1H), 2.35-2.20 (m, 2H), 2.06-1.90 (m, 4H), 1.86-1.69 (m, 4H), 1.67-1.53 (m, 1H); MS (ESI) m/z 559.56 ($M+H$).


【0678】

【化 4 9 8】




一般的な手順Hを用いて、ヘプタメチレンイミンにより、化合物S16-6-21およびS16-6-22を化合物S16-4から調製した。S16-6-21: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0\text{ Hz}$, 1H), 4.27 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.58-3.45 (m, 2H), 3.43-3.32 (m, 2H), 3.18-3.09 (m, 1H), 3.05-2.92 (m, 1H), 2.68-2.59 (m, 1H), 2.36-2.18 (m, 2H), 2.10-1.90 (m, 4H), 1.88-1.52 (m, 7H); MS (ESI) m/z 573.59 ($M+H$). S16-6-22: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0\text{ Hz}$, 1H), 4.74 (d, $J=4.9\text{ Hz}$, 1H), 4.25 (s, 2H), 3.56-3.45 (m, 2H), 3.41-3.31 (m, 2H), 3.16-3.07 (m, 1H), 2.92-2.74 (m, 2H), 2.37-2.26 (m, 1H), 2.12-1.89 (m, 5H), 1.86-


1. 61 (m, 5H), 1. 51–1. 40 (m, 1H); MS (ESI) m/z 573. 59 (M+H).
 【0679】
 【化499】



一般的な手順Hを用いて、シクロプロピルアミンにより、化合物S16-6-23を化合物S16-4から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8. 21 (d, J=11. 0Hz, 1H), 4. 18 (s, 2H), 3. 88 (s, 1H), 3. 18–3. 08 (m, 1H), 3. 05–2. 93 (m, 1H), 2. 90–2. 81 (m, 1H), 2. 67–2. 62 (m, 1H), 2. 33–2. 19 (m, 2H), 1. 64–1. 53 (m, 1H), 0. 98–0. 89 (m, 4H); MS (ESI) m/z 517. 27 (M+H).
 【0680】
 【化500】



一般的な手順Hを用いて、シクロブチルアミンにより、化合物S16-6-24を化合物S16-4から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8. 23 (d, J=11. 0Hz, 1H), 3. 96 (s, 2H), 3. 91–3. 79 (m, 2H), 3. 19–3. 09 (m, 1H), 3. 05–2. 92 (m, 1H), 2. 68–2. 60 (m, 1H), 2. 40–2. 19 (m, 6H), 2. 00–1. 88 (m, 2H), 1. 65–1. 53 (m, 1H); MS (ESI) m/z 531. 37 (M+H).
 【0681】
 【化501】



一般的な手順Hを用いて、シクロペンチルアミンにより、化合物S16-6-25を化合物S16-4から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8. 25 (d, J=11. 0Hz, 1H), 4. 09 (s, 2H), 3. 88 (m, 2H), 3. 68–3. 58 (m, 1H), 3. 19–3. 09 (m, 1H), 3. 05–2. 92 (m, 1H), 2. 68–2. 60 (m, 1H), 2. 38–2. 12 (m, 4H), 1. 91–1. 54 (m, 7H); MS (ESI) m/z 545. 23 (M+H).
 【0682】

10


20

30

40

50


【化502】



一般的な手順Hを用いて、シクロヘキサンメチルアミンにより、化合物S16-6-26を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.07 (s, 2H), 3.87 (m, 2H), 3.19–3.09 (m, 1H), 3.03–2.90 (m, 3H), 2.68–2.60 (m, 1H), 2.38–2.20 (m, 2H), 1.91–1.71 (m, 6H), 1.65–1.55 (m, 1H), 1.42–1.20 (m, 3H), 1.13–1.00 (m, 2H); MS (ESI) m/z 573.26 ($M+H$).

【0683】


【化503】



一般的な手順Hを用いて、シクロプロパンメチルアミンにより、化合物S16-6-27を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.10 (s, 2H), 3.87 (m, 2H), 3.19–3.10 (m, 1H), 3.04–2.92 (m, 3H), 2.65–2.60 (m, 1H), 2.34–1.97 (m, 2H), 1.65–1.55 (m, 1H), 1.16–1.08 (m, 1H), 0.78–0.70 (m, 2H), 0.46–0.40 (m, 2H); MS (ESI) m/z 531.21 ($M+H$).

【0684】


【化504】



一般的な手順Hを用いて、モルホリンにより、化合物S16-6-28を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.21 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.26 (s, 2H), 4.13–3.97 (m, 2H), 3.95–3.81 (m, 3H), 3.67–3.51 (m, 2H), 3.38–3.33 (m, 2H), 3.19–3.10 (m, 1H), 3.04–2.92 (m, 3H), 2.65–2.58 (m, 1H), 2.34–1.97 (m, 2H), 1.65–1.55 (m, 1H); MS (ESI) m/z 547.3 ($M+H$).

【0685】

【化505】



一般的な手順Hを用いて、イミダゾールにより、化合物S16-6-29を化合物S1

10

20

30


40

50

6-4から調製した。 ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.99 (s, 1H), 8.16 (d, $J=10.8\text{Hz}$, 1H), 7.67 (s, 1H), 7.60 (s, 1H), 5.32 (s, 2H), 3.87 (s, 1H), 3.17-3.10 (m, 1H), 3.05-2.92 (m, 1H), 2.65-2.58 (m, 1H), 2.34-2.15 (m, 2H), 1.65-1.52 (m, 1H); MS (ESI) m/z 528.15 ($M+H$).

【0686】

【化506】




10

一般的な手順Hを用いて、アニリンにより、化合物S16-6-30を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.29 (d, $J=11.0\text{Hz}$, 1H), 7.40-7.32 (m, 2H), 7.11-7.00 (m, 3H), 4.14 (s, 2H), 3.86 (s, 1H), 3.19-3.09 (m, 1H), 3.02-2.90 (m, 1H), 2.65-2.55 (m, 1H), 2.34-2.16 (m, 2H), 1.62-1.52 (m, 1H); MS (ESI) m/z 515.21 ($M-H$).

20

【0687】

【化507】




一般的な手順Hを用いて、2-フルオロエチルアミンヒドロクロリド (4当量) により、化合物S16-6-31およびS16-6-32を化合物S16-4から調製した。S16-6-31: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0\text{Hz}$, 1H), 4.88-4.83 (m, 1H), 4.76-4.70 (m, 1H), 4.16 (s, 2H), 3.87 (s, 1H), 3.56-3.44 (m, 2H), 3.19-3.09 (m, 1H), 3.06-2.94 (m, 1H), 2.67-2.57 (m, 1H), 2.34-2.16 (m, 2H), 1.62-1.52 (m, 1H); MS (ESI) 523.27 m/z ($M+H$). S16-6-32: ^1H NMR (400MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.25 (d, $J=11.0\text{Hz}$, 1H), 4.89-4.81 (m, 1H), 4.78-4.72 (m, 2H), 4.17 (s, 2H), 3.56-3.44 (m, 2H), 3.19-3.09 (m, 1H), 2.98-2.78 (m, 1H), 2.39-2.24-2.67 (m, 1H), 2.14-2.08 (m, 1H), 1.55-1.42 (m, 1H); MS (ESI) m/z 523.27 ($M+H$).

30

【0688】

【化508】




40

50

一般的な手順Hを用いて、2-メトキシエチルアミンにより、化合物S16-6-33を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0\text{ Hz}$, 1H), 4.10 (s, 2H), 3.87 (s, 1H), 3.72–3.67 (m, 2H), 3.42 (s, 3H), 3.35–3.31 (m, 2H), 3.19–3.09 (m, 1H), 3.04–2.92 (m, 1H), 2.65–2.60 (m, 1H), 2.34–2.18 (m, 2H), 1.64–1.52 (m, 1H); MS (ESI) m/z 535.24 ($M+H$).

【0689】


【化509】



一般的な手順Hを用いて、N,N-ジメチルエチレンジアミンにより、化合物S16-6-34を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 三塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0\text{ Hz}$, 1H), 4.21 (s, 2H), 3.87 (s, 1H), 3.67–3.55 (m, 4H), 3.19–3.09 (m, 1H), 3.05–2.92 (m, 7H), 2.65–2.60 (m, 1H), 2.35–2.18 (m, 2H), 1.64–1.52 (m, 1H); MS (ESI) m/z 548.24 ($M+H$).

【0690】


【化510】



また、S16-6-34を生成する反応から副産物S16-6-35も得られた。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.18 (d, $J=10.4\text{ Hz}$, 1H), 4.54 (s, 2H), 4.10–4.02 (m, 2H), 3.87 (s, 1H), 3.60–3.52 (m, 2H), 3.46 (s, 6H), 3.19–3.10 (m, 1H), 3.04–2.93 (m, 1H), 2.66–2.59 (m, 1H), 2.35–2.17 (m, 2H), 1.65–1.43 (m, 1H); MS (ESI) m/z 548.5 ($M+H$).

【0691】

【化511】



一般的な手順Hを用いて、N-メチルブチルアミンにより、化合物S16-6-36およびS16-6-37を化合物S16-4から調製した。S16-6-36: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0\text{ Hz}$, 1H), 4.31, 4.19 (AB q, $J=16.5\text{ Hz}$, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.34–3.25 (m, 1H), 3.23–3.11 (m, 2H), 3.05–2.94 (m, 4H), 2.67–2.60 (m, 1H), 2.36–2.18 (m, 2H), 1.82–1.71 (m, 2H), 1.66–1.54 (m, 1H), 1.50–1.3

10

20

30

40


50

9 (m, 2H), 1.02 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 547.26 (M+H). S16-6-37: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.24 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.76 (d, $J=4.9$ Hz, 1H), 4.29, 4.19 (ABq, $J=16.8$ Hz, 2H), 3.41–3.24 (m, 2H), 3.21–3.10 (m, 1H), 2.99 (s, 3H), 2.94–2.70 (m, 2H), 2.38–2.28 (m, 1H), 2.13–2.05 (m, 1H), 1.82–1.71 (m, 2H), 1.52–1.39 (m, 3H), 1.02 (t, $J=7.3$ Hz, 3H); MS (ESI) m/z 547.26 (M+H).

【0692】

【化512】

10




一般的な手順Hを用いて、ジエチルアミンにより、化合物S16-6-38を化合物S16-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.21 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.24 (s, 2H), 3.88 (s, 1H), 3.39–3.30 (m, 4H), 3.14 (dd, $J=15.3, 4.3$ Hz, 1H), 3.05–2.93 (m, 1H), 2.64 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.35–2.18 (m, 2H), 1.64–1.51 (m, 1H), 1.36 (t, $J=7.3$ Hz, 6H); MS (ESI) m/z 533.36 (M+H).

【0693】

【化513】

20



S1-6-2と類似の方法で化合物S16-6-39を7-フルオロ-9-ピロリジノアセトアミド-6-デメチル-6-デオキシテトラサイクリン (J. Med. Chem., 2012, 597–605) から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.74 (d, $J=4.9$ Hz, 1H), 4.31 (s, 2H), 3.82–3.72 (m, 2H), 3.23–3.06 (m, 3H), 2.94–2.74 (m, 2H), 2.37–2.26 (m, 1H), 2.23–1.99 (m, 5H), 1.52–1.39 (m, 1H); MS (ESI) m/z 531.35 (M+H).

【0694】


30

40

50

【化 5 1 4】


スキーム17



10

以下の化合物をスキーム17に従って調製した。

【化 5 1 5】



20

【0 6 9 5】

CH₃OH (1 mL) 中の S16-4 (26.7 mg、0.051 mmol、1 当量) の溶液に 1 N 水性 HCl (51 μL、0.051 mmol、1 当量)、HCHO (水性、37 重量%、5.7 μL、0.77 mmol、1.5 当量)、および Pd-C (10 重量%、15 mg) を加えた。反応器をシールし、およびフラスコを短時間真空にしてから水素ガス (1 気圧) でフラッシュすることによって水素でパージした。反応混合物を水素雰囲気 (1 気圧) 下で室温において 2 時間 30 分撹拌した。反応液を小さいセライトパッドで濾過した。ケーキを CH₃OH で洗浄した。濾液を濃縮して、粗残留物を CH₃OH (1 mL) 中に溶解し、ここに水中 0.05 N HCl (300 μL) および濃 HCl (200 μL) を加えた。反応溶液を室温において 1.5 時間撹拌した。溶液を減圧下で濃縮して、生じた残留物を、Phenomenex Polymerx 10 μ RP-γ 100 A カラムを用いて、Waters Autopurification 系の分取逆相 HPLC によって精製した [10 μm、150 × 21.20 mm; 流量、20 mL/分; 溶媒 A: 0.05 N HCl/水; 溶媒 B: CH₃CN; 注入容量: 3.0 mL (0.05 N HCl/水); 勾配: 15 分にわたる A 中 5 → 30% の B; 質量による分別捕集]。所望の生成物を含有する画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物 S17-3 (10.8 mg、40%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.91 (d, J = 9.8 Hz, 1H), 3.91 (s, 1H), 3.31–3.30 (m, 6H), 3.26–3.18 (m, 1H), 3.12–3.01 (m, 1H), 2.69 (d, J = 12.2 Hz, 1H), 2.45–2.34 (m, 1H), 2.32–2.23 (m, 1H), 1.69–1.55 (m, 1H); MS (ESI) m/z 448.25 (M+H)。


30

40

【0 6 9 6】

50

【化 5 1 6】



CH₃OH (1 mL) 中の S16-4 (17.6 mg、0.034 mmol、1 当量) の溶液に 1 N 水性 HCl (34 μL、0.034 mmol、1 当量)、HCHO (水性、37 重量%、CH₃OH 中の 10% 容量の 25 μL の溶液、0.034 mmol、1 当量)、および Pd-C (10 重量%、10 mg) を加えた。反応器をシールし、およびフラスコを短時間真空にしてから水素ガス (1 気圧) でフラッシュすることによって水素でパージした。反応混合物を水素雰囲気 (1 気圧) 下で室温において 1 時間 30 分撹拌した。反応液を小さいセライトパッドで濾過した。ケーキを CH₃OH で洗浄した。濾液を濃縮した。粗残留物を窒素雰囲気下で NMP 中に溶解して、S17-4 (文献 Org. Process Res. Dev., 2013, 17, 838-845 の手順に従って調製した; 10 当量) をチャージした。反応溶液を、迅速に撹拌している MTBE (15 mL) に滴下した。生じた黄褐色の沈殿物をセライトパッドで濾別して、MTBE で洗浄した。固体を CH₃OH でセライトパッドから洗浄した。生じたオレンジ色の溶液を真空中で濃縮した。粗残留物を CH₃OH (1 mL) 中に溶解し、ここに水中 0.05 N HCl (300 μL) および濃 HCl (200 μL) を加えた。反応溶液を室温において 15 時間撹拌した。溶液を減圧下で濃縮して、生じた残留物を CH₃OH (800 μL) 中に溶解して、迅速に撹拌している MTBE (15 mL) に加えた。生じたオレンジ色の沈殿物をすでに述べたようにセライトパッドで濾過して洗浄してから、CH₃OH でセライトパッドから洗浄した。溶液を減圧下で濃縮した。残留物を水中 0.05 N HCl 中に溶解して、生じた溶液を、Phenomenex Polymerx 10 μ RP-y 100 A カラムを用いて、Waters Autopurification 系の分取逆相 HPLC によって精製した [10 μm、150 × 21.20 mm; 流量、2.0 mL/分; 溶媒 A: 0.05 N HCl/水; 溶媒 B: CH₃CN; 注入容量: 2.0 mL (0.05 N HCl/水); 勾配: 20 分にわたる A 中 5 → 30% の B; 質量による分別捕集]。所望の生成物を含有する画分および対応するジアシル化合物を含有する画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物 S17-5 (5 mg、24%) および S17-6 (3 mg、12%) が得られた。S17-5: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.53-7.48 (m, 1H), 4.10, 4.05 (ABq, 10.5 Hz, 1H), 3.93-3.83 (m, 2H), 3.79-3.62 (m, 2H), 3.27-3.13 (m, 4H), 3.10-2.93 (m, 3H), 2.70-2.61 (m, 1H), 2.43-1.91 (m, 6H), 1.68-1.52 (m, 1H); MS (ESI) m/z 545.33 (M+H). S17-6: ¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.72 (at, J=7.3 Hz, 1H), 7.49 (dd, J=8.5, 2.4 Hz, 1H), 4.78-4.68 (m, 1H), 4.21-4.01 (m, 2H), 3.89, 3.84 (ABq, 8.0 Hz, 1H), 3.81-3.61 (m, 4H), 3.23 (d, J=7.6 Hz, 3H), 3.21-3.10 (m, 3H), 3.10-2.92 (m, 3H), 2.61-2.31 (m, 2H), 2.22-1.92 (m, 9H), 1.73-1.52 (m, 1H); MS (ESI) m/z 656.30 (M+H).

【0697】

10

20


30

40

50

【化 5 1 7】


スキーム18



10

以下の化合物をスキーム18に従って調製した。

【化 5 1 8】



20

【0 6 9 8】

火力乾燥したフラスコに N_2 下でS5-1 (748 mg、1.53 mmol、1当量) をチャージして、THF (24 mL) 中に溶解して、 $-78^\circ C$ に冷却した。イソプロピルマグネシウムクロリド塩化リチウム錯体 (THF中1.3 N、5.88 mL、7.64 mmol、5当量) を反応溶液に15分にわたって滴下し、内部温度を $-70^\circ C$ 未満に維持した。アニオン混合物を1時間にわたって $0^\circ C$ にゆっくり温めてから $-78^\circ C$ に再冷却した。火力乾燥したフラスコにジ-tert-ブチルアゾジカルボキシレート (1.76 g、7.63 mmol、5当量) をチャージして、真空にして、 N_2 でバックフィルしてからTHF (5 mL) 中に溶解した。この溶液を30分にわたり、低温アニオン溶液にTHF (1 mL) で順次リンスしながら滴加し、内部温度を $-70^\circ C$ 未満に維持した。生じた反応混合物を一晩室温にゆっくり温めた。飽和水性塩化アンモニウム (12 mL)、次に水 (10 mL) を加えて、混合物をEtOAc (50 mL、 2×20 mL) で3回抽出した。組み合わせた有機層を Na_2SO_4 上で乾燥させて、濾過して、減圧下で濃縮した。生じた残留物を溶離液としてのヘキサン中の2%~25%のEtOAcによるシリカゲルでのフラッシュカラムクロマトグラフィーを介して精製して、所望の化合物S18-1 (746 mg、76%) が得られた。 ^1H NMR (400 MHz, $CDCl_3$, 回転異性体) δ 7.44–7.23 (m, 8 H), 7.09–6.76 (m, 2 H), 5.99 (m, 0.5 H), 5.88 (m, 0.5 H), 5.10–5.94 (m, 2 H), 3.60–3.43 (m, 6 H), 2.40–2.33 (m, 3 H), 1.57–1.38 (m, 18 H); MS (ESI) m/z 641.26 (M+H).


30

40

【0 6 9 9】

50


【化 5 1 9】



一般的な手順Eを用いることにより、化合物S18-2-1およびS18-2-2を化合物S18-1、ならびにジメチルエノンS5-5およびエチルメチルエノンS11-2-1からそれぞれ調製した。S18-2-1: MS (ESI) m/z 1029.22 (M+H)。S18-2-2: MS (ESI) m/z 1043.41 (M+H)。

【0700】


【化 5 2 0】



THF (500 μ L) および4N水性HCl (500 μ L) 中のS18-2-1 (33 mg、0.032 mmol、1当量) の溶液を室温において一晩攪拌してから50℃において3.5時間加熱した。溶液を、pH7のリン酸バッファの付加を介して中和して、溶液をEtOAcで抽出した。組み合わせた有機層をNa₂SO₄上で乾燥させて、濾過して、減圧下で濃縮した。粗残留物を、一般的な手順D-2を用いて脱保護して、所望の化合物S18-3-1が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.05 (s, 1H), 4.08 (s, 1H), 3.39–3.22 (m, 1H), 3.09–2.91 (m, 8H), 2.34–2.17 (m, 2H), 1.70–1.57 (m, 1H); MS (ESI) m/z 472.98 (M+H)。

【0701】

【化 5 2 1】



THF (3 mL) および4N水性HCl (3 mL) 中のS18-2-2 (207 mg、0.198 mmol、1当量) の溶液を50℃において3時間、攪拌して加熱した。溶液を、6N水性NaOHの注意深い付加を介して中和して、溶液をEtOAcで抽出した。組み合わせた有機層をNa₂SO₄上で乾燥させて、濾過して、減圧下で濃縮した。粗残留物を、一般的な手順D-2を用いて脱保護して、所望の化合物S18-3-2が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 回転異性体, 二塩酸塩) δ 8.06 (s, 1H), 4.22 (s, 0.5H), 4.12 (s, 0.5H), 3.54–3.42 (m, 1H), 3.40–3.19 (m, 2H), 3.08–2.87 (m, 5H), 2.34–2.17 (m, 2H), 1.72–1.57 (m, 1H), 1.54–1.34 (m, 3H)。MS (ESI) m/z 487.09 (M+H)。

【0702】

10

20


30

40

50

【化 5 2 2】


スキーム19



10

以下の化合物をスキーム19に従って調製した。

【化 5 2 3】



20

【0 7 0 3】

化合物 S 1 9 - 1 (国際公開第 2 0 1 0 / 1 2 9 0 5 5 A 1 号が挙げられる文献の手順に従って調製した; 5 1 8 m g、1. 2 0 m m o l、1 当量) およびエチルメチルエノン S 1 1 - 2 - 1 (6 0 0 m g、1. 2 1 m m o l、1 当量) を N₂ 下で入れて、T H F (1 2 m L) 中に溶解して、- 7 3 °C に冷却した。L H M D S (T H F 中 1. 0 M、3. 6 m L、3. 6 m m o l、3 当量) を 2 6 分 に わ た っ て 滴 加 し、内部温度を - 7 0 °C 未満に維持した。反応溶液を 1 時間 に わ た っ て 0 °C に 温 め た。溶液を、p H 7 のリン酸バッファ (2 0 m L) の付加を介して中和して、溶液を室温に温めた。溶液を D C M (3 × 4 0 m L) で抽出して、組み合わせた有機層を 1 N N a O H (2 × 2 5 m L) およびブラインで洗浄してから N a₂ S O₄ 上で乾燥させて、濾過して、減圧下で濃縮した。生じた残留物を、溶離液としてのヘキサン中の 2 % ~ 2 5 % E t O A c によるシリカゲルでのフラッシュカラムクロマトグラフィーを介して精製して、所望の化合物 S 1 9 - 2 (8 1 2 m g、8 1 %) が得られた。¹ H N M R (4 0 0 M H z, C D C l₃, 回転異性体) δ 1 5. 4 5 (b r s, 1 H), 7. 5 4 - 7. 4 5 (m, 4 H), 7. 4 3 - 7. 3 0 (m, 6 H), 5. 4 0 - 5. 3 0 (m, 2 H), 5. 0 3 (a q, J = 9. 4 H z, 2 H), 3. 9 7 - 3. 8 6 (m, 1 H), 3. 2 4 (d d, J = 1 6. 2, 5. 2 H z, 1 H), 3. 1 2 - 3. 0 2 (m, 1 H), 2. 9 0 - 2. 7 5 (m, 1 H), 2. 7 2 - 2. 5 6 (m, 2 H), 2. 5 5 - 2. 3 2 (m, 5 H), 2. 2 3 - 2. 1 1 (m, 1 H), 1. 1 9 - 1. 0 6 (m, 3 H), 0. 8 1 (s, 9 H), 0. 2 8 8 - 0. 2 0 (b r m, 3 H), 0. 1 3 (s, 3 H); M S (E S I) m / z 8 3 6. 1 6 (M + H).


30

40

【0 7 0 4】

50


【化 5 2 4】



シール可能な容器に S 1 9 - 2 (2 9 0 m g 、 0 . 3 1 7 m m o l 、 1 当量) 、 P d ₂ d b a ₃ (1 3 . 5 m g 、 0 . 0 1 5 m m o l 、 0 . 0 5 当量) 、 キサントホス (3 0 . 3 m g 、 0 . 0 5 2 m m o l 、 0 . 1 5 当量) 、 K ₃ P O ₄ (2 0 2 m g 、 0 . 9 5 2 m m o l 、 3 当量) をチャージした。容器をキャッピングかつシールしてから真空にして、N ₂ (g) で 3 回バックフィルした。容器に 1 , 4 - ジオキサン (3 . 2 m L) およびメチルアミン溶液 (T H F 中 2 . 0 M 、 4 7 5 μ L 、 0 . 9 5 1 m m o l 、 3 当量) をチャージしてから 1 0 0 ° C のバス内に 2 時間入れた。生じた混合物をセライトパッドで濾過して、E t O A c で洗浄した。濾液を減圧下で濃縮した。生じた残留物を、Sunfire Prep C18 OBD カラムを用いて、Waters Autopurification 系の分取逆相 HPLC によって精製した [5 μ m 、 1 9 × 5 0 m m ; 流量、2 0 m L / 分 ; 溶媒 A : 0 . 1 % H C O ₂ H を有する H ₂ O ; 溶媒 B : 0 . 1 % H C O ₂ H を有する C H ₃ C N ; 勾配 : 2 0 分にわたる A 中 5 → 1 0 0 % の B ; 質量による分別捕集] 。所望の MW の画分は、出発材料も含有した。これらの画分の凍結乾燥により、S 1 9 - 2 および S 1 9 - 3 の混合物が、1 : 0 . 4 3 の比率で提供された (比率は、C D C l ₃ 中での ¹ H NMR を介して判定した ; 合計 9 9 m g 、 2 8 . 5 m g の所望の生成物、1 1 %) 。この混合物をさらなる精製なしで用いた。S 1 9 - 3 : MS (ESI) m / z 7 8 5 . 1 8 (M + H) 。

【 0 7 0 5】

【化 5 2 5】



一般的な手順 C および D - 2 (C H ₃ O H : ジオキサン 1 : 1 中、H C l / 水なし) を用いて、化合物 S 1 9 - 4 を S 1 9 - 3 から調製した。¹ H NMR (4 0 0 M H z , C D ₃ O D , 回転異性体 , 二塩酸塩) δ 4 . 2 2 (s , 0 . 5 H) , 4 . 1 2 (s , 0 . 5 H) , 3 . 5 3 - 3 . 4 1 (m , 1 H) , 3 . 3 7 - 3 . 2 9 (m , 1 H) , 3 . 1 0 - 2 . 8 7 (m , 9 H) , 2 . 3 1 - 2 . 1 5 (m , 2 H) , 1 . 6 9 - 1 . 5 3 (m , 1 H) , 1 . 4 5 - 1 . 3 3 (m , 3 H) . MS (ESI) m / z 4 9 3 . 0 5 (M + H) 。

【 0 7 0 6】

10


20

30


40

50

スキーム20




【化 5 2 7】




【 0 7 0 8 】

【化 5 2 8】



【 0 7 0 9 】


【化 5 2 9】



一般的なHCHOによる手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S20-6-1を化合物S20-3から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.21 (d, J=10.6Hz, 1H), 4.31 (s, 2H), 3.75-3.83 (m, 3H), 3.10-3.25 (m, 4H), 2.95-3.04 (m, 2H), 2.90 (s, 3H), 2.05-2.30 (m, 5H), 1.63-1.71 (m, 1H); MS (ESI) m/z 545.3 (M+H).

【0710】


【化 5 3 0】



一般的なアセトンによる手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S20-6-2およびS20-6-3を化合物S20-3から調製した。S20-6-2: ¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.21 (d, J=10.6Hz, 1H), 4.30 (s, 2H), 3.75-3.85 (m, 3H), 3.10-3.25 (m, 3H), 2.95-3.04 (m, 1H), 2.80-2.85 (m, 1H), 2.05-2.27 (m, 5H), 1.80-1.90 (m, 2H), 1.53-1.62 (m, 1H), 1.35-1.45 (m, 6H); MS (ESI) m/z 573.3 (M+H). S20-6-3: ¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.21 (d, J=10.6Hz, 1H), 4.30 (s, 2H), 3.75-3.82 (m, 3H), 3.63-3.70 (m, 1H), 3.08-3.22 (m, 3H), 2.81-2.98 (m, 2H), 2.05-2.21 (m, 7H), 1.40-1.46 (m, 6H); MS (ESI) m/z 573.3 (M+H).

【0711】


【化 5 3 1】



一般的なプロピオンアルデヒドによる手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S20-6-4を化合物S20-3から調製した。¹H NMR (400MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.20 (d, J=10.6Hz, 1H), 4.30 (s, 2H), 3.72-3.81 (m, 3H), 3.10-3.25 (m, 3H), 2.95-3.04 (m, 2H), 2.80-2.87 (m, 2H), 2.05-2.25 (m, 6H), 1.80-1.90 (m, 2H), 1.55-1.60 (m, 1H), 0.98-1.05 (t, J=7.8Hz, 3H); MS (ESI) m/z 573.2 (M+H).

【0712】

【化532】




一般的なベンズアルデヒドによる手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S20-6-5を化合物S20-3から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.21 (d, J=10.6 Hz, 1H), 7.56–7.60 (m, 2H), 7.45–7.51 (m, 3H), 4.46–4.51 (m, 1H), 4.31 (s, 2H), 3.72–3.83 (m, 5H), 2.90–3.20 (m, 3H), 1.97–2.25 (m, 7H), 1.25–1.30 (m, 1H); MS (ESI) m/z 621.2 (M+H).

10

【0713】

【化533】




20

一般的な2-(tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)アセトアルデヒドによる手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S20-6-6を化合物S20-3から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 8.20 (d, J=10.6 Hz, 1H), 4.32 (s, 2H), 3.75–3.95 (m, 5H), 3.40–3.45 (m, 1H), 2.95–3.25 (m, 5H), 2.80–2.90 (m, 1H), 2.03–2.30 (m, 6H), 1.53–1.62 (m, 1H); MS (ESI) m/z 575.2 (M+H).

30

【0714】

【化534】




一般的なAc₂Oによる手順B-2、C、およびD-1を用いることにより、化合物S20-6-7を化合物S20-3から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 塩酸塩) δ 8.20 (d, J=10.6 Hz, 1H), 4.69–4.72 (m, 1H), 4.41 (s, 2H), 3.75–3.81 (m, 2H), 3.15–3.21 (m, 3H), 2.90–3.10 (m, 2H), 2.30–2.45 (m, 3H), 2.05–2.20 (m, 3H), 2.01 (s, 3H), 1.55–1.63 (m, 1H); MS (ESI) m/z 573.2 (M+H).

40

【0715】

50


【化 5 3 5】



一般的な Ms_2O による手順 B-2、C、および D-1 を用いることにより、化合物 S 20-6-8 を化合物 S 20-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 8.20 (d, $J=10.6$ Hz, 1H), 4.41 (s, 2H), 4.08-4.11 (m, 1H), 3.75-3.82 (m, 3H), 3.09-3.21 (m, 4H), 2.95-3.03 (m, 1H), 2.55-2.61 (m, 3H), 2.02-2.30 (m, 5H), 1.66-1.72 (m, 1H); MS (ESI) m/z 609.2 (M+H).

【0716】


【化 5 3 6】



一般的な N-Boc-2-アミノアセトアルデヒドによる手順 B-1、ジオキサン中での HCl (4N 水性) による処理、 Ac_2O による B-2、C、および D-1 を用いることにより、化合物 S 20-6-9 を化合物 S 20-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.31 (s, 2H), 3.96 (s, 1H), 3.83-3.73 (m, 2H), 3.65-3.52 (m, 1H), 3.52-3.42 (m, 2H), 3.24-3.08 (m, 3H), 3.06-2.96 (m, 1H), 2.82-2.75 (m, 1H), 2.32-1.96 (m, 10H), 1.63-1.50 (m, 1H); MS (ESI) m/z 616.5 (M+H).

【0717】

【化 5 3 7】



一般的な N-Boc-2-アミノアセトアルデヒドによる手順 B-1、ジオキサン中での HCl (4N 水性) による処理、 Ms_2O による B-2、C、および D-1 を用いることにより、化合物 S 20-6-10 を化合物 S 20-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.47 (s, 2H), 4.30 (s, 2H), 4.02 (s, 1H), 3.83-3.71 (m, 2H), 3.54-3.43 (m, 3H), 3.28-3.11 (m, 4H), 3.12 (s, 3H), 3.00 (s, 3H), 2.87-2.79 (m, 1H), 2.32-2.00 (m, 5H), 1.63-1.50 (m, 1H); MS (ESI) m/z 652.3 (M+H).

【0718】

10


20

30

40

50


【化 5 3 8】



一般的な *N*-Boc-2-アミノアセトアルデヒドによる手順 B-1、C、および D-1 を用いることにより、化合物 S20-6-11 を化合物 S20-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 三塩酸塩) δ 8.24 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.31 (s, 2H), 4.01 (s, 1H), 3.83–3.71 (m, 3H), 3.66–3.54 (m, 1H), 3.45–3.35 (m, 2H), 3.34–3.28 (m, 1H), 3.34–2.91 (m, 7H), 2.34–2.03 (m, 7H), 1.65–1.50 (m, 1H); MS (ESI) m/z 574.2 ($M+H$).

【0719】


【化 5 3 9】



一般的な *N*-Boc-2-メチルアミノアセトアルデヒドによる手順 B-1、ジオキサン中での HCl (4N 水性) による処理、および一般的な手順 D-1 に記載する逆相分取 HPLC を介した精製を用いることにより、化合物 S20-6-12 および S20-6-13 を既知の化合物 S20-7 (国際公開第 2014/036502 A2 号が挙げられる文献の手順を用いて調製した) から調製した。S20-6-12: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 三塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.31 (s, 2H), 4.03 (s, 1H), 3.86–3.72 (m, 3H), 3.72–3.61 (m, 1H), 3.46 (t, $J=7.0$ Hz, 1H), 3.24–3.09 (m, 5H), 2.79 (m, 3H), 2.32–2.01 (m, 6H), 1.63–1.50 (m, 1H); MS (ESI) m/z 588.4 ($M+H$). S20-6-13: ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 三塩酸塩) δ 8.22 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.83 (d, $J=4.9$ Hz, 1H), 4.31 (s, 2H), 3.87–3.72 (m, 3H), 3.70–3.59 (m, 1H), 3.57–3.42 (m, 2H), 3.24–3.09 (m, 3H), 3.09–3.01 (m, 1H), 3.01–2.89 (m, 1H), 2.82 (s, 3H), 2.36–1.99 (m, 6H), 1.56–1.43 (m, 1H); MS (ESI) m/z 588.4 ($M+H$).

【0720】

【化 5 4 0】




一般的な FCH_2CHO (国際公開第 2011/146089 A1 号の文献の手順に従い、対応するアルコールから調製した) による手順 B-1、C、および D-1 を用いることにより、化合物 S20-6-14 を化合物 S20-3 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4

. 88–4.72 (m, 2H), 4.32 (s, 2H), 4.00 (s, 1H), 3.85–3.58 (m, 4H), 3.27–3.08 (m, 3H), 3.07–2.94 (m, 4H), 2.89 (d, $J=13.4$ Hz, 1H), 2.34–1.99 (m, 6H), 1.65–1.51 (m, 1H); MS (ESI) m/z 577.3 (M+H).

【0721】

【化541】




10

一般的な $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CHO}$ （国際公開第2011/146089A1号の文献の手順に従い、対応するアルコールから調製した）による手順B-1、C、およびD-1を用いることにより、化合物S20-6-15を化合物S20-3から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.23 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 4.31 (s, 2H), 3.96 (s, 1H), 3.83–3.62 (m, 4H), 3.54–3.44 (m, 2H), 3.40 (s, 3H), 3.24–3.09 (m, 3H), 3.05–2.93 (m, 1H), 2.85 (ad, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.33–2.00 (m, 6H), 1.65–1.52 (m, 1H).

【0722】

【化542】



20

フラスコにS20-7 (51 mg、0.096 mmol、1当量 (国際公開第2014/036502A2号が挙げられる文献の手順を用いて調製した))、N-(3-ジメチルアミノプロピル)-N'-エチルカルボジイミドヒドロクロリド (29.8 mg、0.16 mmol、1.1当量)、および1-ヒドロキシベンゾトリアゾール (19.7 mg、0.15 mmol、1.5当量) をチャージして、 N_2 下に置いた。容器にDMF (2 mL) およびDIEA (26.6 μL 、0.15 mmol、1.6当量) を加えた。混合物を室温において1時間攪拌してから、Phenomenex Polymerx 10 μm RP- γ 100Aカラムを用いて、Waters Autopurification系の分取逆相HPLCによって精製した [10 μm 、150 $\times$ 21.20 mm; 流量、20 mL/分; 溶媒A: 0.05 N HCl/水; 溶媒B: CH_3CN ; 注入容量: 2.0 mL (0.05 N HCl/水); 勾配: 30分にわたるA中0 $\rightarrow$ 85%のB; 質量による分別捕集]。所望の生成物を含む画分を収集して、凍結乾燥すると、化合物S20-6-16が得られた。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 塩酸塩) δ 8.18 (d, $J=11.0$ Hz, 1H), 7.92 (dd, $J=7.9, 1.8$ Hz, 1H), 7.43–7.35 (m, 1H), 6.96–6.88 (m, 2H), 5.69–5.60 (m, 1H), 4.29 (s, 2H), 3.91–3.58 (m, 2H), 3.12–3.04 (m, 1H), 2.96–2.87 (m, 1H), 2.85–2.73 (m, 1H), 2.30–2.00 (m, 7H), 1.49–1.35 (m, 1H); MS (ESI) m/z 651.3 (M+H).

【0723】


30

40

50

【化 5 4 3】


スキーム21



10

以下の化合物をスキーム21に従って調製した。

【化 5 4 4】



20


【0 7 2 4】

DCM (37 mL) 中のS21-1 (1.65 g、3.72 mmol、1当量、文献：J. Med. Chem., 2013, 56, 8112-8138の手順に従って調製した) の溶液に4-フェニルピペリジン (2.99 g、18.6 mmol、5当量) に続いて、HOAc (1 mL、18.6 mmol、5当量) を加えた。1時間後、STAB (2.37 g、11.18 mmol、3当量) を加えた。1時間後、反応混合物をEtOAc (150 mL) で希釈して、飽和水性NaHCO₃ (2×90 mL)、1N NaOH (30 mL)、およびブライン (30 mL) で洗浄した。有機層をNa₂SO₄上で乾燥させて、濾過して、減圧下で濃縮した。生じた残留物を、DCM中のCH₃OH、0.5%~3%によるシリカゲルでのフラッシュカラムクロマトグラフィーを介して精製して、S21-2 (1.42 g、65%) が得られた。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 13.35 (brs, 1H), 7.53-7.45 (m, 2H), 7.43-7.18 (m, 11H), 7.09-7.02 (m, 2H), 5.14 (s, 2H), 4.60 (s, 2H), 3.85-3.75 (m, 2H), 2.92-2.55 (m, 4H), 2.42 (s, 3H), 2.04-1.94 (m, 2H)。MS (ESI) m/z 588.37 (M+H)。

30

【0 7 2 5】

【化 5 4 5】




一般的な手順Eを用いて、化合物S21-3をS21-2およびS2-3から調製した。¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 15.92 (s, 1H), 7.62-7.48 (m, 4H), 7.43-7.14 (m, 11H), 5.89-5.76 (m, 2

50

H), 5.38 (s, 2H), 5.23 (d, $J=17.1$ Hz, 2H), 5.15 (d, $J=9.58$ Hz, 2H), 5.04–4.94 (m, 2H), 4.07 (d, $J=10.4$ Hz, 1H), 3.79 (brs, 1H), 3.39–3.30 (m, 2H), 3.28–3.14 (m, 3H), 3.13–2.98 (m, 2H), 5.67–2.42 (m, 4H), 2.39–2.25 (m, 1H), 2.15 (d, $J=17.7$ Hz, 1H), 1.8 (brs, 1H), 0.83 (s, 9H), 0.27 (s, 3H), 0.13 (s, 3H). MS (ESI) m/z 1028.69 (M+H).

【0726】


【化546】



一般的な手順Aを用いることにより、化合物S21-4を化合物S21-3から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CDCl_3 , 回転異性体, 全てのピークがブロード化) δ 16.19 (m, 1H), 13.19 (brs, 1H), 7.54–7.17 (m, 15H), 5.42–4.91 (m, 5H), 4.61–4.35 (m, 2H), 4.09–3.99 (m, 1H), 3.90–3.60 (m, 2H), 3.29–2.44 (m, 7H), 2.36–1.82 (m, 4H), 0.87–0.59 (m, 9H), 0.22–0.04 (m, 6H). MS (ESI) m/z 948.60 (M+H).

【0727】


【化547】



一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S21-6-1を化合物S21-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.35–7.18 (m, 5H), 7.09 (d, $J=6.4$ Hz, 1H), 4.40 (s, 2H), 3.87 (s, 1H), 3.69–3.56 (m, 2H), 3.28–3.17 (m, 3H), 3.07–2.95 (m, 1H), 2.94–2.83 (m, 1H), 2.63 (d, $J=12.8$ Hz, 1H), 2.43–2.31 (m, 1H), 2.28–2.20 (m, 1H), 2.15–1.91 (m, 4H), 1.67–1.54 (m, 1H); MS (ESI) m/z 578.46 (M+H).

【0728】

【化548】




一般的な手順CおよびD-2を用いることにより、化合物S21-6-2を化合物S21-3から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.36–7.19 (m, 5H), 7.13–7.07 (m, 1H), 4.42 (s, 2H), 3.86 (s, 1H), 3.69–3.59 (m, 2H), 3.28–3.14 (m, 5H)

), 3.09–2.96 (m, 1H), 2.93–2.81 (m, 2H), 2.41–2.31 (m, 1H), 2.26–2.18 (m, 1H), 2.15–1.91 (m, 4H), 1.83–1.70 (m, 2H), 1.65–1.53 (m, 1H), 1.03 (t, J=8 Hz, 3H). MS (ESI) m/z 620.50 (M+H).

【0729】

【化549】




10

THF中のS21-4の溶液に臭化アリル（4当量）、炭酸カリウム（8当量）、および触媒量のNaIを加えた。この混合物を40℃において5時間加熱した。溶液をブラインで希釈して、EtOAcで抽出した。有機層を減圧下で濃縮して、生じた残留物をヘキサン中の10%～80% EtOAcによるシリカゲルでのフラッシュカラムクロマトグラフィーによって精製した。生じた生成物を一般的な手順B-1、C、およびD-2に供して、S21-6-3が得られた。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.38–7.20 (m, 5H), 7.15–7.07 (m, 1H), 4.42 (s, 2H), 3.80 (s, 1H), 3.70–3.59 (m, 2H), 3.28–3.15 (m, 3H), 3.09–2.98 (m, 1H), 2.95–2.73 (m, 5H), 2.42–2.30 (m, 1H), 2.26–2.17 (m, 1H), 2.16–1.91 (m, 4H), 1.67–1.54 (m, 1H); MS (ESI) m/z 592.4 (M+H).

20

【0730】

【化550】




30

一般的な手順B-1（0℃）、C、およびD2を用いることにより、CH₃CHOによって化合物S21-6-4を化合物S21-4から調製した。¹H NMR (400 MHz, CD₃OD, 二塩酸塩) δ 7.39–7.19 (m, 5H), 7.13–7.06 (m, 1H), 4.41 (s, 2H), 3.85 (s, 1H), 3.70–3.60 (m, 2H), 3.44–3.14 (m, 3H), 3.07–2.98 (m, 1H), 2.95–2.71 (m, 4H), 2.41–2.30 (m, 1H), 2.26–2.18 (m, 1H), 2.16–1.89 (m, 4H), 1.64–1.51 (m, 1H), 1.35 (t, J=7.3 Hz, 3H); MS (ESI) m/z 606.47 (M+H).

40

【0731】

【化551】




50

一般的な手順 B-1 (0℃) を用いることによって CH_3CHO により、 HCHO による B-1、C、および D-2 を用いることにより、化合物 S21-6-5 を化合物 S21-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.38–7.17 (m, 5H), 7.14–7.09 (m, 1H), 4.42 (s, 2H), 4.22 (s, 0.5H), 4.13 (s, 0.5H), 3.71–3.60 (m, 2H), 3.54–3.40 (m, 1H), 3.29–3.17 (m, 2H), 3.16–2.83 (m, 6H), 2.41–2.30 (m, 1H), 2.30–2.20 (m, 1H), 2.15–1.94 (m, 4H), 1.73–1.59 (m, 1H), 1.46–1.33 (m, 3H); MS (ESI) m/z 620.50 ($\text{M}+\text{H}$).

【0732】


【化552】



一般的な手順 B-1 (0℃) を用いることによって CH_3CHO により、再度 CH_3CHO による B-1、C、および D-2 を用いることにより、化合物 S21-6-6 を化合物 S21-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.38–7.18 (m, 5H), 7.13–7.08 (m, 1H), 4.42 (s, 2H), 4.24 (s, 1H), 3.70–3.53 (m, 3H), 3.50–3.40 (m, 2H), 3.29–3.17 (m, 4H), 3.14–3.02 (m, 1H), 2.95–2.84 (m, 2H), 2.41–2.30 (m, 1H), 2.28–2.20 (m, 1H), 2.15–1.92 (m, 4H), 1.72–1.58 (m, 1H), 1.40 (t, $J=7.2\text{ Hz}$, 6H); MS (ESI) m/z 634.49 ($\text{M}+\text{H}$).

【0733】

【化553】



一般的な Ac_2O による手順 B-2、C、および D-2 を用いることにより、化合物 S21-6-7 を化合物 S21-4 から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 8.39–8.31 (m, 1H), 7.37–7.19 (m, 5H), 7.09–7.03 (m, 1H), 4.76–4.69 (m, 1H), 4.42 (s, 2H), 3.71–3.61 (m, 2H), 3.28–3.21 (m, 1H), 3.19–3.11 (m, 1H), 3.08–2.98 (m, 1H), 2.95–2.84 (m, 1H), 2.65–2.53 (m, 1H), 2.47–2.34 (m, 2H), 2.28–2.20 (m, 1H), 2.18–1.91 (m, 7H), 1.68–1.58 (m, 1H); MS (ESI) m/z 620.3 ($\text{M}+\text{H}$).

【0734】

10


20

30

40

50

【化 5 5 4】



一般的な $M s_2 O$ による手順B-2、C、およびD-2を用いることにより、化合物S21-6-8を化合物S21-4から調製した。 ^1H NMR (400 MHz, CD_3OD , 二塩酸塩) δ 7.35–7.17 (m, 5H), 7.03 (d, $J=5.6$ Hz, 1H), 4.37 (s, 2H), 4.14–4.09 (m, 1H), 3.66–3.55 (m, 2H), 3.27–3.09 (m, 6H), 3.08–2.98 (m, 1H), 2.92–2.82 (m, 1H), 2.67–2.54 (m, 1H), 2.53–2.44 (m, 1H), 2.37–2.26 (m, 1H), 2.13–2.88 (m, 4H), 1.79–1.69 (m, 1H); MS (ESI) m/z 656.3 ($M+H$).

【0735】

実施例4：抗菌活性

本発明の化合物の抗菌活性を以下のプロトコルに従って調べた。

【0736】

最小発育阻止濃度 (MIC) アッセイ

臨床検査標準協会 (the Clinical and Laboratory Standards Institute) (CLSI) のガイダンス (例えば、CLSI. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; nineteenth information supplement. CLSI document M100-S19, CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898, USA, 2009) に従ってMICを測定した。簡潔に説明すると、凍結した菌株を解凍し、ミュラー・ヒントンプロス (MHB) または他の適切な培地 (連鎖球菌属 (*Streptococcus*) には血液が必要であり、ヘモフィルス属 (*Haemophilus*) にはヘミンおよびNADが必要である) で継代培養した。一晚培養した後、菌株をミュラー・ヒントン寒天で継代培養し、再び一晚培養した。コロニー形態が適切かおよび汚染がないかどうか、コロニーを観察した。0.5マクファーランド標準に等しい出発接種材料を調製するように、単離されたコロニーを選択した。出発接種材料を、さらなる使用のために、MHBを用いて1:125で希釈した (これが使用接種材料である)。5.128 mg/mLの最終濃度まで滅菌水で希釈することによって試験化合物を調製した。抗生物質 (冷凍貯蔵し、解凍し、解凍から3時間以内に使用する) および化合物を所望の使用濃度までさらに希釈した。

【0737】

アッセイを以下のように行った。50 μL のMHBを96ウェルプレートのウェル2～12に添加した。100 μL の適切に希釈した抗生物質をウェル1に添加した。50 μL の抗生物質をウェル1から取り出し、ウェル2に添加し、ウェル2の内容物を上下に5回ピペット操作することによって混合した。ウェル2中の50 μL の混合物を取り出し、ウェル3に添加し、上記のように混合した。連続希釈を同じようにウェル12まで続けた。全てが50 μL を含有するように、50 μL をウェル12から取り出した。次に、50 μL の使用接種材料を全ての試験ウェルに添加した。50 μL の使用接種材料および50 μL のMHBを空のウェルに添加することにより、増殖対照ウェルを作製した。次に、プレートを37°Cで一晚培養し、培養器から取り出し、各ウェルをプレート読み取りミラーで読み取った。細菌の増殖を阻害した試験化合物の最小濃度 (MIC) を記録した。

【0738】

【表 5 0】

例:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[Abt]	32	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.125	0.06	0.03	0.015
増殖	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+

[abt] = ウェル内の抗生物質濃度 $\mu\text{g/ml}$

増殖 = 細菌増殖(混濁)

【0 7 3 9】

解釈: $\text{MIC} = 2 \mu\text{g} / \text{mL}$ 。

【0 7 4 0】

接種濃度(生菌数)を測定するためのプロトコル

50 μL の接種材料をウェル 1 にピペットで入れた。90 μL の滅菌した 0.9% の NaCl を 96 ウェルマイクロタイタープレートのウェル 2 ~ 6 にピペットで入れた。10 μL をウェル 1 から取り出し、それをウェル 2 に添加してから混合した。10 μL をウェル 2 から取り出し、ウェル 3 以降の内容物と混合し、ウェル 6 まで連続希釈を行った。10 μL を各ウェルから取り出し、適切な寒天プレート上に塗布した。プレートを一晚培養器に入れた。明らかなコロニーを含むスポット状のコロニーを数えた。コロニーの数に希釈係数を掛けることによって生菌数を計算した。

【0 7 4 1】

【表 5 1】

ウェルからのスポット	1	2	3	4	5	6
希釈係数	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7

【0 7 4 2】

菌株

以下の菌株(以下で一覧にしている)を最小阻止濃度(MIC)アッセイで調査した。

【0 7 4 3】

10

20

30

40

50

【表 5 2】

生物	株表示	基本性質
黄色ブドウ球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>)	SA100	ATCC 13709, MSSA, Smith 株
黄色ブドウ球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>)	SA101	ATCC 29213, CLSI 品質対照株, MSSA
黄色ブドウ球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>)	SA191	HA-MRSA, テトラサイクリン耐性, 肺感染 モデル分離株
黄色ブドウ球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>)	SA161	HA-MRSA, テトラサイクリン耐性, <i>tet</i> (M)
黄色ブドウ球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>)	SA158	テトラサイクリン耐性 <i>tet</i> (K)
表皮ブドウ球菌 (<i>Staphylococcus epidermidis</i>)	SE164	ATCC 12228, CLSI 品質対照株, テトラサイクリン耐性
大便連鎖球菌 (<i>Enterococcus faecalis</i>)	EF103	ATCC 29212, <i>tet</i> -I/R, 対照株
大便連鎖球菌 (<i>Enterococcus faecalis</i>)	EF159	テトラサイクリン耐性, <i>tet</i> (M)
大便連鎖球菌 (<i>Enterococcus faecalis</i>)	EF327	創傷分離株(US) <i>tet</i> (M)
エンテロコッカス・フェシウム (<i>Enterococcus faecium</i>)	EF404	血液分離株(US) <i>tet</i> (M)
肺炎連鎖球菌 (<i>Streptococcus pneumoniae</i>)	SP106	ATCC 49619, CLSI 品質対照株
肺炎連鎖球菌 (<i>Streptococcus pneumoniae</i>)	SP160	テトラサイクリン耐性, <i>tet</i> (M)
化膿連鎖球菌 (<i>Streptococcus pyogenes</i>)	SP312	2009 臨床分離株, <i>tet</i> (M)
化膿連鎖球菌 (<i>Streptococcus pyogenes</i>)	SP193	有効性モデル用の化膿連鎖球菌 (<i>S. pyogenes</i>); <i>tetS</i> ; スルホンアミド感受性
インフルエンザ菌 (<i>Haemophilus influenzae</i>)	HI262	テトラサイクリン耐性, アンピシリン耐性
モラクセラ・カタラーリス (<i>Moraxella catarrhalis</i>)	MC205	ATCC 8176, CLSI 品質対照株
大腸菌(<i>Escherichia coli</i>)	EC107	ATCC 25922, CLSI 品質対照株
大腸菌(<i>Escherichia coli</i>)	EC155	テトラサイクリン耐性, <i>tet</i> (A)
エンテロバクター・クロアカエ (<i>Enterobacter cloacae</i>)	EC108	ATCC 13047, wt
エンテロバクター・クロアカエ (<i>Enterobacter cloacae</i>)	EC603	尿分離株(スペイン)
大腸菌(<i>Escherichia coli</i>)	EC878	MG1655 <i>tolC::kan</i>

【 0 7 4 4 】

10

20

30

40

50

【表 5 3】

生物	株表示	基本性質
肺炎桿菌 (<i>Klebsiella pneumoniae</i>)	KP109	ATCC 13883, wt
肺炎桿菌 (<i>Klebsiella pneumoniae</i>)	KP153	テトラサイクリン耐性, <i>tet</i> (A), MDR, ESBL ⁺
肺炎桿菌 (<i>Klebsiella pneumoniae</i>)	KP457	2009 ESBL ⁺ , CTX-M, OXA
プロテウス・ミラビリス (<i>Proteus mirabilis</i>)	PM112	ATCC 35659
プロテウス・ミラビリス (<i>Proteus mirabilis</i>)	PM385	尿 ESBL ⁺ 分離株
緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	PA111	ATCC 27853, wt, 対照株
緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	PA169	Wt, PA170-173 の親
緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	PA173	PA170 $\Delta mexX$; MexXY-(機能的排出ポンプ欠損)
緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	PA555	ATCC BAA-47, 野生株 PAO1
緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	PA556	Multiple-Mex 排出ポンプノックアウト株
緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	PA673	米国の北東中部の男性の導尿管からの尿分離株 2009
緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	PA669	気管吸引物からの臨床分離株 2009
緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	PA693	米国の太平洋岸の女性の角膜剥離物からの分離株 2009
緑膿菌 (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	PA1145	マウス肺炎モデルに用いられる株
アシネトバクター・バウマニ (<i>Acinetobacter baumannii</i>)	AB110	ATCC 19606, wt
アシネトバクター・バウマニ (<i>Acinetobacter baumannii</i>)	AB250	嚢胞性線維症分離株, MDR
ステノトロホモナス・マルトフィリア (<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>)	SM256	嚢胞性線維症分離株, MDR
バークホルデリア・セノセパシア (<i>Burkholderia cenocepacia</i>)	BC240	嚢胞性線維症分離株, MDR

*MDR, 多剤耐性; MRSA, メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(*S. aureus*); MSSA, メチシリン感受性黄色ブドウ球菌(*S. aureus*); HA-MRSA, 院内感染型 MRSA; *tet*(K), 主要グラム陽性菌のテトラサイクリン排出機構; *tet*(M), 主要グラム陽性菌のテトラサイクリンリボソーム保護機構; ESBL⁺, 基質拡張型 β -ラクタマーゼ

【0745】

結果

本発明の試験した化合物の最小阻止濃度 (MIC) の値を図 14A～図 14E 中に示した表中にまとめて記載する。MIC 値を $\mu\text{g}/\text{ml}$ で報告する。

【0746】

本明細書中で引用した全ての特許、公開された出願、および参考文献の関連する教示は、その全体が参照により援用される。

【0747】

本発明を、例となる実施形態を参照して詳細に示し、かつ記載してきたが、当業者であ

10

20

30

40

50



れば、形態の種々の変更形態および詳細が、添付の特許請求の範囲によって包含される本発明の要旨を逸脱しない範囲でなされ得ることを理解するであろう。

本発明の態様として以下のものが挙げられる。

項 1

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (I) もしくは (I') :

【化 A - 1】



を有する化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、

X が、C (R²) および N から選択され；

R¹ が、-OR^A、水素、ハロ、- (C₁~C₆アルキル)、-C (O) NR^BR^{B'}、-NR^BR^{B'}、-S (O)_{0~2}R^C、(C₀~C₆アルキレニル) - (C₃~₁₂) カルボシクリル、および - (C₀~C₆アルキレニル) - (4~13員) ヘテロシクリルであり；

R² が、- (C₀~C₆アルキレニル) - (4~13員) ヘテロシクリル、水素、ハロ、- (C₁~C₆アルキル)、-OR^A、-C (O) NR^BR^{B'}、-NR^BR^{B'}、-S (O)_{0~2}R^C もしくは (C₀~C₆アルキレニル) - (C₃~₁₂) カルボシクリルであり；
または

R¹ および R² が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、C₃~₁₂ カルボシクリルもしくは 4~13 員ヘテロシクリル環を形成し；

R³、R⁵、および R⁶ の各々が、水素、ハロ、- (C₁~C₆アルキル)、-OR^A、-C (O) NR^BR^{B'}、NR^BR^{B'}、S (O)_{0~2}R^C、- (C₀~C₆アルキレニル) - (C₃~₁₂) カルボシクリル、および - (C₀~C₆アルキレニル) - (4~13員) ヘテロシクリルから独立して選択され；または

R² および R³ が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、C₃~₁₂ カルボシクリルもしくは 4~13 員ヘテロシクリル環を形成し；

R⁴ が、水素、- (C₁~C₆アルキル)、- (C₀~C₆アルキレニル) - (C₃~₁₂) カルボシクリル、および - (C₀~C₆アルキレニル) - (4~13員) ヘテロシクリルから選択され；

R^{4'} が、水素、- (C₁~C₆アルキル)、S (O)_{1~2}R^C、- (C₀~C₆アルキレニル) - (C₃~₁₂) カルボシクリル、- (C₀~C₆アルキレニル) - (4~13員) ヘテロシクリル、-C (O) - (C₁~C₆アルキル)、および -C (O) - (C₁~C₆アルキル) - NR^DR^E、-C (NR^{*}) NR^{**}R^{***} から選択され、ここで、R^{*}、R^{**}、および R^{***} の各々が、独立して、H もしくは C₁~₄ アルキル、-C (O) - (C₃~₁₂) カルボシクリルであり；または

R⁴およびR^{4'}が、それらが共通して結合される窒素原子と任意選択的に一緒になって、N、O、およびSから独立して選択される1～2つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む4～8員環を形成し；

R⁶が、水素、－(C₁～C₆アルキル)および－(C₃～C₆シクロアルキル)から選択され；

R^Aの各々が、－(C₁～C₆アルキル)、水素、－(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～12)カルボシクリル、－(C₀～C₆アルキレニル)－(4～13員)ヘテロシクリル、－C(O)－(C₁～C₆アルキル)、－C(O)－(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～12)カルボシクリル、－C(O)－(C₀～C₆アルキレニル)－(4～13員)ヘテロシクリル、および－C(O)N(R^D)(R^E)から独立して選択され；

R^Bの各々およびR^{B'}の各々が、水素、－(C₁～C₆アルキル)、－(C₁～C₆ハロアルキル)、－(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～12)カルボシクリル、－(C₀～C₆アルキレニル)－(4～13員)ヘテロシクリル、－S(O)_{1～2}－(C₁～C₆アルキル)、－S(O)_{1～2}(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～12)カルボシクリル、－S(O)_{1～2}(C₀～C₆アルキレニル)－(4～13員)ヘテロシクリル、－C(O)－(C₁～C₆アルキル)、－C(O)－(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～12)カルボシクリル、－C(O)H、－C(O)－(C₀～C₆アルキレニル)－(4～13員)ヘテロシクリル、－C(O)－(C₀～C₆アルキレニル)－N(R^D)(R^E)、および－N⁺(R^F)₃から独立して選択され、ここで、R^Fが、各々の存在について独立して、H、C₁～6アルキル、C₁～6ハロアルキル、(C₁～4アルコキシ)－(C₁～6)アルキル、アミノ(C₁～6)アルキル、モノーもしくはジ(C₁～4アルキル)アミノ－(C₁～6)アルキル、(C₃～12)カルボシクリル－(C₀～3)アルキレニル、または4～13員ヘテロシクリルについて、O、NもしくはSから選択される1つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む任意の2つのR^Fであって、それらが結合される窒素原子と一緒にされる任意の2つのR^Fであり；

R^Cの各々が、－(C₁～C₆アルキル)、－(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～12)カルボシクリル、および－(C₀～C₆アルキレニル)－(4～13員)ヘテロシクリルから独立して選択され；

R^Dの各々およびR^Eの各々が、水素、－(C₁～C₆アルキル)、－(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～12)、カルボシクリル、および－(C₀～C₆アルキレニル)－(4～13員)ヘテロシクリルから独立して選択され、

ここで、

R¹、R²、R³、R⁴、R^{4'}、R⁵、R⁶の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、ハロ、=O、OR^A、NR^BR^{B'}、およびS(O)_{0～2}R^Cから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；

R^{6'}、R^A、またはR^Cの任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、1つ以上のフルオロで任意選択的にかつ独立して置換され；

R¹、R²、R³、R⁴、R^{4'}、R⁵、R⁶のいずれかの任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、またはR¹およびR²、R²およびR³もしくはR⁴およびR^{4'}を一緒にすることによって形成される任意の環が、ハロ、=O、C₁～C₄フルオロアルキル、C₁～C₄アルキル、－(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～C₁₀カルボシクリル)、－(C₀～C₆アルキレニル)－(4～13員ヘテロシクリル)、OR^A、－(C₀～C₆アルキレニル)－NR^BR^{B'}、およびS(O)_{0～2}R^Cから独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R¹、R²、R³、R⁴、R^{4'}、R⁵、R⁶のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、またはR¹およびR²、R²およびR³もしくはR⁴およびR^{4'}を一緒にすることによって形成される任意の環が、R^Fで置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^Fの各々が、－(C₁～C₆アルキル)、－(C₁～C₆ハロアルキル)、－(C₁～C₆ヒドロキシアアルキル)、－(C₀～C₆アルキレニル)－(C₃～12)カルボシクリル



ル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-C(O)_2-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキレニル})-NR^B R^{B'}$ 、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、 R^6 の任意のシクロアルキル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ 、および $-N(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})_2$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；
 R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 もしくは R^6 の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1 \sim C_4$ アルキルまたは $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される、方法。

項 2

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (I) もしくは (I')

【化 A-2】



を有する化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、

X が、 N および $C(R^2)$ から選択され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、および R^6 の各々が、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-OR^A$ 、 $-C(O)NR^B R^{B'}$ 、 $NR^B R^{B'}$ 、 $S(O)_{0 \sim 2}R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ -カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ -ヘテロシクリルから独立して選択され；または

R^1 および R^2 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、カルボシクリルもしくはヘテロシクリル環を形成し；または

R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、カルボシクリルもしくはヘテロシクリル環を形成し；

R^4 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ -カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})$ -ヘテロシクリルから選択され；

R^4 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $S(O)_{1 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、および $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル}) - NR^D R^E$ から選択され；または

R^4 および R^4' が、それらが共通して結合される窒素原子と任意選択的に一緒になって、N、O、および S から独立して選択される 1～2 つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む 4～8 員環を形成し；

R^6 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、および $-(C_3 \sim C_6 \text{ シクロアルキル})$ から選択され；

R^A の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、および $-C(O) N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^B の各々および $R^{B'}$ の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ ハロアルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、および $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル}) - N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^C の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリルから独立して選択され；

R^D の各々および R^E の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - $(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリルから独立して選択され、

ここで、

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；

$R^{6'}$ 、 R^A 、または R^C の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、1 つ以上のフルオロで任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および R^4' を一緒にすることによって形成される任意の環が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - $(C_3 \sim C_{10})$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - $(4 \sim 13 \text{ 員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および R^4' を一緒にすることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^F の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ ハロアルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ ヒドロキシアルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim$

10

20

30

40

50

C_6 アルキレニル) - ヘテロシクリル、- ($C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - $C(O)_2$ - ($C_1 \sim C_6$ アルキル)、- ($C_1 \sim C_6$ アルキレニル) - $NR^B R^{B'}$ 、および - $C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され;

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、 R^6 の任意のシクロアルキル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4$ アルキル)、および $-N(C_1 \sim C_4$ アルキル) $_2$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され;

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 もしくは R^6 の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1 \sim C_4$ アルキルまたは $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_1 \sim C_4$ アルキル)で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される、方法。

10

項3

Xが、Nおよび $C(R^2)$ から選択され;

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、および R^6 の各々が、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6$ アルキル)、 $-ORA$ 、 $-C(O)NR^B R^{B'}$ 、 $NR^B R^{B'}$ 、 $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($C_3 \sim 12$)カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリルから独立して選択され;または

20

R^1 および R^2 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリルもしくは $4 \sim 13$ 員ヘテロシクリル環を形成し;または

R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリルもしくは $4 \sim 13$ 員ヘテロシクリル環を形成し;

R^4 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6$ アルキル)、 $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($C_3 \sim 12$)カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリルから選択され;

R^4 が、水素、 $-(C_2 \sim C_6$ アルキル)、 $S(O)_{1 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($C_3 \sim 12$)カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6$ アルキル)、および $-C(O) - (C_1 \sim C_6$ アルキル) - $NR^D R^E$ から選択され;または

30

R^4 および $R^{4'}$ が、それらが共通して結合される窒素原子と任意選択的に一緒になって、N、O、およびSから独立して選択される1~2つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む4~8員環を形成し;

R^6 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6$ アルキル)、および $-(C_3 \sim C_6$ シクロアルキル)から選択され;

R^A の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6$ アルキル)、 $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($C_3 \sim 12$)カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6$ アルキル)、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($C_3 \sim 12$)カルボシクリル、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され;

40

R^B の各々および $R^{B'}$ の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6$ アルキル)、 $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($C_3 \sim 12$)カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_1 \sim C_6$ アルキル)、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($C_3 \sim 12$)カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6$ アルキル)、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($C_3 \sim 12$)カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され;

R^C の各々が、 $-(C_1 \sim C_6$ アルキル)、 $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($C_3 \sim 12$)カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6$ アルキレニル) - ($4 \sim 13$ 員)ヘテロシクリル

50

ルから独立して選択され；

R^D の各々および R^E の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、 $-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、 $-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され、

ここで、

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；

$R^{6'}$ 、 R^A 、または R^C の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、1つ以上のフルオロで任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および $R^{4'}$ を一緒にすることによって形成される任意の環が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $4 \sim 13$ 員ヘテロシクリル、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および $R^{4'}$ を一緒にすることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^F の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、 $-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、 $-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、 $-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、 $-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、 $-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、 $-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、 $R^{6'}$ の任意のシクロアルキル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 、 R^6 の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})$ 、および $-N(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})_2$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 $R^{4'}$ 、 R^5 もしくは R^6 の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1 \sim C_4$ アルキルまたは $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})$ で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される、項1に記載の方法またはその薬学的に許容できる塩。

項 4

X が、 N および $C(R^2)$ から選択され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^5 、および R^6 の各々が、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-OR^A$ 、 $-C(O)NR^B R^{B'}$ 、 $NR^B R^{B'}$ 、 $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ ヘテロシクリルから独立して選択され；または

R^1 および R^2 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、カルボシクリルもしくはヘテロシクリル環を形成し；または

R^2 および R^3 が、それらが結合される原子と任意選択的に一緒になって、カルボシクリルもしくはヘテロシクリル環を形成し；

R^4 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ 、カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ ヘテロシクリルから選択され；

R^4 が、水素、 $-(C_2 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $S(O)_{1 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、および $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル}) - NR^D R^E$ から選択され；または

R^4 および R^4' が、それらが共通して結合される窒素原子と任意選択的に一緒になって、N、O、および S から独立して選択される 1～2 つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む 4～8 員環を形成し；

R^6 が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、および $-(C_3 \sim C_6 \text{ シクロアルキル})$ から選択され；

R^A の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、および $-C(O) N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^B の各々および $R^{B'}$ の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-C(O) H$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、および $-C(O) N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^C の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリルから独立して選択され；

R^D の各々および R^E の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリルから独立して選択され、

ここで、

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；

$R^{6'}$ 、 R^A 、または R^C の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、1 つ以上のフルオロで任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および R^4' を一緒にすることによって形成される任意の環が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、4～13 員ヘテロシクリル、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、または R^1 および R^2 、 R^2 および R^3 もしくは R^4 および R^4' を一緒にすることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^F の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2} - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、 $-C(O) - (C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - カルボシクリル、 $-C(O) H$ 、 $-C(O) - (C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ - ヘテロシクリル、および $-C(O) N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルもしくはヘテロシク

リル部分、 R^6 の任意のシクロアルキル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 、 R^6 の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})$ 、および $-N(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})_2$ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；
 R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、または R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^4' 、 R^5 もしくは R^6 の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C_1 \sim C_4$ アルキルまたは $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル})$ で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される、項 2 に記載の方法またはその薬学的に許容できる塩。

項 5

R^5 、 R^6 、および R^6 の各々が水素である、項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載の方法。

項 6

R^4 が、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から選択され；

R^4' が、水素、ヒドロキシおよびハロから独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的に置換される $-(C_2 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_3 \sim C_6 \text{ シクロアルキル})$ 、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-N(R^D)(R^E)$ 、および $S(O)_{1 \sim 2}R^C$ から選択され；または

R^4 および R^4' が、それらが共通して結合される窒素原子と一緒にあって、N、O、および S から独立して選択される 1 ～ 2 つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む 4 ～ 6 員環を形成し；

R^C が $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ であり；

R^D および R^E の各々が、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から独立して選択される、項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載の方法。

項 7

R^4 が、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から選択され；

R^4' が、水素、 $-(C_2 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_3 \sim C_6 \text{ シクロアルキル})$ 、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-N(R^D)(R^E)$ 、および $S(O)_{1 \sim 2}R^C$ から選択され；

R^C が $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ であり；

R^D および R^E の各々が、独立して、水素および $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から選択される、項 6 に記載の方法。

項 8

R^4 が、水素、メチル、エチルおよびプロピルから選択され；

R^4' が、水素、エチル、プロピル、シクロプロピル、 $-C(O)CH_3$ 、 $-C(O)CH_2N(CH_3)_2$ 、および $-S(O)_2CH_3$ から選択される、項 7 に記載の方法。

項 9

R^1 が、水素、ハロ、ハロ、 $-NR^B R^{B'}$ 、 $-C(O)NR^B R^{B'}$ 、 $-OR^A$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリルから独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的に置換される $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から選択され、ここで、 R^A が、1 つ以上のフルオロで任意選択的に置換される $C_1 \sim C_6$ アルキルである、項 1 ～ 8 のいずれか一項に記載の方法。

項 9

R^1 が、水素、ハロ、ハロ、 $-NR^B R^{B'}$ 、 $-C(O)NR^B R^{B'}$ 、 $-OR^A$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})$ ヘテロシクリルから独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的に置換される $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ から選択され、ここで、 R^A が、1 つ以上のフルオロで任意選択的に置換される $C_1 \sim C_6$ アルキルである、項 1 ～ 8 のいずれか一項に記載の方法。

項 10

R^3 が、水素および $-N(R^B)(R^{B'})$ から選択され、ここで、 R^B が水素である、項

10

20

30

40

50

1～9のいずれか一項に記載の方法。

項 1 1

XがC(R²)である、項1～10のいずれか一項に記載の方法。

項 1 2

XがC(R²)であり；

R¹が、水素、ハロ、ハロ、-NR^BR^{B'}、-C(O)NR^BR^{B'}、-OR^A、-(C₀～C₆アルキレニル)- (C₃～₁₂)カルボシクリル、および-(C₀～C₆アルキレニル)- (4～13員)ヘテロシクリルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される-(C₁～C₆アルキル)から選択され、ここで、R^Aが、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換されるC₁～C₆アルキルである、項1～11のいずれか一項に記載の方法。

10

項 1 3

XがC(R²)であり；

R¹が、水素、ハロ、ハロ、-NR^BR^{B'}、-C(O)NR^BR^{B'}、-OR^A、-(C₀～C₆アルキレニル)-カルボシクリル、および-(C₀～C₆アルキレニル)-ヘテロシクリルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される-(C₁～C₆アルキル)から選択され、ここで、R^Aが、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換されるC₁～C₆アルキルである、項1～11のいずれか一項に記載の方法。

項 1 4

R¹が、水素、ハロ、ハロおよびOR^Aから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換される-(C₁～C₆アルキル)から選択され、ここで、R^Aが、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換されるC₁～C₆アルキルである、項12または13に記載の方法。

20

項 1 5

R¹が、水素、フルオロ、クロロ、CF₃、OCH₃、OCF₃、N(CH₃)₂、およびNHCH₃から選択される、項14に記載の方法。

項 1 6

R¹が、水素、フルオロ、クロロ、CF₃およびOCF₃から選択される、項15に記載の方法。

項 1 7

XがC(R²)であり；

R¹およびR²が、それらが結合される原子と一緒に、4～13員窒素含有ヘテロシクリル環を形成し、ここで、R¹およびR²を含む前記環が、C₁～C₄アルキルで任意の置換可能な窒素原子において任意選択的に置換され；NR^BR^{B'}で炭素原子において任意選択的に置換され、R^BおよびR^{B'}の各々が、独立して、水素およびC₁～C₆アルキルから選択される、項1～11のいずれか一項に記載の方法。

30

項 1 8

XがC(R²)であり；

R¹およびR²が、それらが結合される原子と一緒に、窒素含有ヘテロシクリル環を形成し、ここで、R¹およびR²を含む前記環が、C₁～C₄アルキルで任意の置換可能な窒素原子において任意選択的に置換され、かつNR^BR^{B'}で炭素原子において任意選択的に置換され、R^BおよびR^{B'}の各々が、水素およびC₁～C₆アルキルから独立して選択される、項1～11のいずれか一項に記載の方法。

40


項 1 9

XがC(R²)であり；

R¹およびR²が、それらが結合される炭素原子と一緒に、

50

【化 A - 3】



を形成し、式中、

【化 A - 4】

“ ~ 1 ”

が、R¹に結合される炭素原子への結合点を表し；

【化 A - 5】


“ ~ 2 ”

が、R²に結合される炭素原子への結合点を表し；fが0または1である、項1～11のいずれか一項に記載の方法。

項 2 0

R¹およびR²が、それらが結合される炭素原子と一緒に、

【化 A - 6】



を形成し、式中、

【化 A - 7】

“ ~ 1 ”

が、R¹に結合される炭素原子の結合点を表し、

【化 A - 8】

“ ~ 2 ”

が、R²に結合される炭素原子の結合点を表す、項17～19のいずれか一項に記載の方法。

項 2 1

XがC(R²)であり；

R²が、-(C₁～C₆アルキル)で窒素原子において任意選択的に置換される-(C₀～C₆アルキレニル)-(4～13員)ヘテロシクリル；-(C₀～C₆アルキレニル)-(C₃～12)カルボシクリル；またはNR^BR^Bで置換される-(C₁～C₆)アルキルである、項1～16のいずれか一項に記載の方法。

項 2 2

10

20

30

40

50

XがC(R²)であり；

R²が、-(C₁~C₆アルキル)で窒素原子において任意選択的に置換される-(C₀~C₆アルキレニル)-ヘテロシクリル；-(C₀~C₆アルキレニル)-カルボシクリル；またはNR^BR^{B'}で置換される-(C₁~C₆)アルキルである、項1~16のいずれか一項に記載の方法。

項23

R²が、C₁~C₄アルキルまたはベンジルで窒素原子において任意選択的に置換されるピロリジニルである、項22に記載の方法。

項24

XがC(R²)であり；

R²およびR³が、それらが結合される原子と一緒にあって、窒素含有4~13員ヘテロシクリルを形成する、項1~16のいずれか一項に記載の方法。

項25


XがC(R²)であり；

R²およびR³が、それらが結合される原子と一緒にあって、窒素含有ヘテロシクリルを形成する、項1~16のいずれか一項に記載の方法。

項26

R²およびR³が、それらが結合される原子と一緒にあって、

【化A-9】



を形成し、式中、

【化A-10】

“ ω_2 ”

が、R²に結合される炭素原子への結合点を表し；

【化A-11】

“ ω_3 ”

が、R³に結合される炭素原子への結合点を表し；fが0または1である、項25に記載の方法。

項27

XがC(R²)であり；

R³が、水素および-N(R^B)(R^{B'})から選択され、ここで、R^Bが水素であり、R^{B'}が、-C(O)-(C₀~C₆アルキレニル)-(4~13員)ヘテロシクリルまたは-C(O)-(C₀~C₆アルキレニル)-N(R^D)(R^E)である、項1~23のいずれか一項に記載の方法。


項28

XがC(R²)であり；

R³が、水素および-N(R^B)(R^B)から選択され、ここで、R^Bが水素であり、R^Bが、-C(O)-(C₀~C₆アルキレニル)-(4~13員)ヘテロシクリルまたは-C(O)-(C₀~C₆アルキレニル)-N(R^D)(R^E)である、項1~23のいずれか一項に記載の方法。

項29

R³が、水素および
【化A-12】



10

から選択される、項27または28に記載の方法。

項30

XがNである、項1~10のいずれか一項に記載の方法。

項31

前記化合物が、以下またはその薬学的に許容できる塩の1つから選択される、項1に記載の方法。

































20

30

40

50

【表 A - 1】

化合物構造	化合物構造	化合物構造
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

10
























20

30

40

50

【表 A - 2】

化合物構造	化合物構造	化合物構造
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

10

20

30

40

50

【表 A - 3】

化合物構造	化合物構造	化合物構造


10

20

項 3 2

前記化合物が、

【化 A - 1 3】



30

40



またはその薬学的に許容できる塩から選択される、項 1 ～ 3 1 のいずれか一項に記載の方法。

項 3 3

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (I I I) もしくは (I I I') :

50

【化 A - 1 4】



を有する化合物またはその薬学的に許容できる塩の有効量を投与することを含み、式中、
 R^1 が、水素、ブromo、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-O-C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-S(O)_m-C_3 \sim C_7$ シクロアルキル、 $-CN$ 、 $-NR^G R^{G'}$ 、および $-NH-C(O)-(C_1 \sim C_6$ アルキレニル) $-NR^G R^G$ から選択され、ここで、 R^1 によって表される基中のアルキル、アルキレニル、またはシクロアルキルの各々が、フルオロで任意選択的に置換され；

R^2 が、フルオロ、 $-C_1 \sim C_6$ アルキル、および $-[C(R^H)(R^H)]_m-NR^I R^I$ から選択され；

R^3 が、水素、フルオロ、ブromo、 $-CN$ 、 $-[C(R^H)(R^H)]_n-NR^I R^I$ 、 $-NR^G R^{G'}$ 、 NO_2 、 $-NH-C(O)-C_1 \sim C_4$ アルキレニル $-NR^G R^{G'}$ 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-NH-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-NH-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-NH-S(O)_m-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-NH-S(O)_m-(4 \sim 13$ 員) ヘテロシクリルから選択され；

R^G および $R^{G'}$ の各々が、水素および $C_1 \sim C_4$ アルキルから独立して選択され；または R^G および $R^{G'}$ が、それらが結合される窒素原子と一緒に、 N 、 S 、および O から選択される 1 つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む (4 ~ 7 員) 複素環を形成し、ここで、(4 ~ 7 員) 複素環は、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、フルオロ置換 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-C_1 \sim C_4$ アルキルもしくは $-C_1 \sim C_4$ アルキレニル $-O-C_1 \sim C_4$ アルキルで任意選択的に置換され、かつ任意選択的にベンゾ縮合され；

R^H および $R^{H'}$ の各々が、水素、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、および $C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリルから独立して選択され；

R^I の各々が、水素、 $C_1 \sim C_{12}$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレニル $-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および $-C_0 \sim C_6$ アルキレニル (4 ~ 13 員) ヘテロシクリルから選択され；

$R^{I'}$ の各々が、水素、 $C_1 \sim C_8$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレニル $-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレニル (4 ~ 13 員) ヘテロシクリル、 $-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-C_0 \sim C_6$ アルキレニル $-C(O)-NR^G R^{G'}$ 、 $-C(O)-C_1 \sim C_6$ アルキレニル $-NR^G R^{G'}$ 、 $-C_2 \sim C_6$ アルキレニル $-NR^G R^{G'}$ 、 $-S(O)_m-C_1 \sim C_6$ アルキル、 $-S(O)_m-C_3 \sim C_{10}$ カルボシクリル、および $-S(O)_m-(4 \sim 13$ 員) ヘテロシクリルから選択され、ここで、 R^I または $R^{I'}$ によって表される基中のアルキル、カルボシクリル、アルキレニル、またはヘテロシクリルの各々が

、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $-O-C_1\sim C_4$ アルキル、 $C_1\sim C_4$ アルキル、フルオロ置換 $-C_1\sim C_4$ アルキル、 $-NR^G R^G$ 、 $C_3\sim C_{10}$ カルボシクリル、および（４～１３員）ヘテロシクリルから独立して選択される１つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；あるいは

R^I および R^I が、それらが結合される窒素原子と一緒に、（４～７員）単環式複素環、または（６～１３員）二環、スピロ環もしくは架橋複素環を形成し、ここで、前記（４～７員）単環式複素環、または前記（６～１３員）二環、スピロ環もしくは架橋複素環が、 N 、 S 、および O から独立して選択される１～４つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含み；前記（４～７員）単環式複素環、または前記（６～１３員）二環、スピロ環もしくは架橋複素環が、 $C_3\sim C_{10}$ カルボシクリル、（４～１３員）ヘテロシクリル、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $C_1\sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1\sim C_4$ アルキル、 $-O-C_3\sim C_{10}$ カルボシクリル、 $-O-$ （４～１３員）ヘテロシクリル、 $-C_0\sim C_4$ アルキル $-O-C_1\sim C_4$ アルキル、 $-C_0\sim C_4$ アルキル $-O-C_1\sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-C(O)-C_1\sim C_4$ アルキル、 $-C(O)NR^G R^G$ 、 $-N(R^G)-C(O)-C_1\sim C_4$ アルキル、および $-C_0\sim C_4$ アルキレニル $-NR^G R^G$ から独立して選択される１つ以上の置換基で任意選択的に置換され、カルボシクリルまたはヘテロシクリル置換基が各々、フルオロ、クロロ、 $-OH$ 、 $C_1\sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1\sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1\sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1\sim C_4$ フルオロアルキル、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1\sim C_4$ アルキル)、または $-N(C_1\sim C_4$ アルキル)₂で任意選択的に置換され；
 m が、０、１、または２であり；
 n が、１または２である、方法。

項 3 4

R^2 が、フルオロ、メチル、 $-CH(R^H)-N(R^I)(R^I)$ 、 $-(CH_2)_2-N(R^I)(R^I)$ 、 $-NH$ （ピリジル）、 $-NH(C_1\sim C_8$ アルキル)、 $-NHC(O)-C_1\sim C_3$ アルキレニル $-$ ピペリジン、 $-NHC(O)-C_1\sim C_3$ アルキレニル $-$ ピロリジン、または $-NHS(O)_2$ フェニルであり、ここで、 R^2 によって表される基中のピペリジンの各々およびピロリジンの各々が、１つ以上の $-C_1\sim C_6$ アルキルで任意選択的に置換され；

R^H が、水素もしくはメチルであり；

R^I が、水素、 $C_1\sim C_3$ 直鎖状アルキル、 $C_1\sim C_3$ 直鎖状フルオロアルキル、シクロプロピルもしくは $-CH_2-$ シクロプロピルであり；

R^I が、水素、 $C_1\sim C_8$ アルキル、 $-CH_2-CHF_2$ 、 $-C_2\sim C_6$ アルキレニル $-O-C_1\sim C_3$ アルキル、 $-C_3\sim C_{10}$ シクロアルキル、 $-C_3\sim C_{10}$ シクロアルキル置換 $C_1\sim C_3$ アルキル、シクロプロピル置換シクロプロピル、 $-(CH_2)_2$ フェニルもしくは $-S(O)_2$ フェニルであり、ここで、 R^2 が、水素もしくは $C_1\sim C_2$ アルキルであるとき、 R^3 がさらにベンジルであり；または

R^I および R^I が、それらが結合される窒素原子と一緒に、ピロリジン、ピペリジン、ピペラジン、およびモルホリンから選択される環を形成し、ここで、前記環が、 $-OH$ 、 $-C_1\sim C_3$ アルキル、および $-C_1\sim C_3$ アルキレニル $-O-C_1\sim C_3$ アルキルから独立して選択される１つ以上の置換基で任意選択的に置換され、前記環が、シクロプロピルに任意選択的にベンゾ縮合もしくはスピロ縮合される、項 3 3 に記載の方法。

項 3 5

R^2 が、フルオロ、メチル、または $-CH(R^H)-N(R^I)(R^I)$ であり；

R^H が、水素またはメチルであり；

R^I が、水素、 $C_1\sim C_3$ 直鎖状アルキルもしくは $-CH_2-$ シクロプロピルであり；

R^I が、水素、 $C_1\sim C_8$ アルキル、 $-CH_2-CHF_2$ 、 $-C_1\sim C_6$ アルキレニル $-O-C_1\sim C_3$ アルキル、 $C_3\sim C_{10}$ シクロアルキル、 $-(CH_2)_2$ フェニル、および $C_3\sim C_{10}$ シクロアルキル置換 $C_1\sim C_3$ アルキルから選択され、ここで、 R^I によって表される基中のシクロアルキルの各々が、 $-C_1\sim C_3$ アルキルで任意選択的に置換されるかもしくは任意選択的にベンゾ縮合され、 R^2 が、水素もしくは $C_1\sim C_2$ アルキルで

あるとき、 R^3 がさらにベンジルであり；または
 R^I および $R^{I'}$ が、それらが結合される窒素原子と一緒に、ピロリジンおよびピペリジンから選択される環を形成し、ここで、前記環が、フルオロ、 $C_1 \sim C_3$ アルキル、および $-C_1 \sim C_3$ アルキレン- $O-C_1 \sim C_3$ アルキルから独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的に置換され、前記環が、シクロプロピルに任意選択的にベンゾ縮合もしくはスピロ縮合される、項33に記載の方法。

項36

R^2 および R^3 の少なくとも1つが、水素以外である、項33～35のいずれか一項に記載の方法。

項37

R^2 および R^3 の両方が、水素以外である、項36に記載の方法。



項38

R^1 が、フルオロ、クロロ、 $-CN$ 、および $-N(CH_3)_2$ から選択され；
 R^3 が、 NH_2 、または $-CH_2-NH-CH_2-CCH_3$ である、項37に記載の方法。

項39

前記化合物が、構造式(IV)もしくは(IV')：

【化A-15】




によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項33に記載の方法。

項40

R^1 が、 $-OCH_3$ 、 $-CF_3$ 、 Cl 、 F 、および $-N(CH_3)_2$ から選択される、項39に記載の方法。

項41


前記化合物が、
 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^{I'}$ が、
 【化A-16】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^{I'}$ が、


【化 A - 17】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 18】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 19】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 20】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 21】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 22】



であり；

50


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-23】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-24】


10



であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-25】

20



であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-26】



30

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-27】



40

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-28】



50


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-29】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-30】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-31】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-32】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-33】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-34】



10

20


30

40

50

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-35】



10


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-36】



であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-37】



20

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-38】



30

であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-39】




40

であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

50


【化 A - 4 0】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 4 1】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 4 2】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 4 3】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 4 4】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 A - 4 5】



10

20


30

40

50


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-46】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-47】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-48】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-49】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-50】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

10


20

30

40

50


【化 A - 5 1】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 5 2】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 5 3】



20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 5 4】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 5 5】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 5 6】




であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

50


【化 A - 5 7】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 5 8】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 5 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 6 0】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 6 1】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 A - 6 2】



10

20


30

40

50

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-63】



10


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-64】



であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-65】



20

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-66】



30

であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-67】




40

であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

50


【化 A - 6 8】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 6 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 7 0】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 7 1】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 7 2】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 7 3】



10

20


30

40

50


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-74】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-75】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-76】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-77】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-78】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

10


20

30

40

50


【化 A - 7 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 8 0】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 8 1】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 8 2】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 8 3】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 8 4】



10

20

30

40

50


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-85】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-86】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-87】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-88】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-89】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-90】



10

20


30

40

50

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-91】



10


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-92】



であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-93】



20

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-94】



30

であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-95】




40

であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

50


【化 A - 9 6】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 A - 9 7】




10

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 A - 9 8】




20

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 A - 9 9】




30

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 A - 1 0 0】




40

であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 1 0 1】



であり；


50

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
 【化A-102】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
 【化A-103】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
 【化A-104】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
 【化A-105】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
 【化A-106】



であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
 【化A-107】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 1 0 8】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 1 0 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 1 1 0】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 1 1 1】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、


【化 A - 1 1 2】



であり；


 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

【化 A - 1 1 3】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-114】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-115】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-116】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-117】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-118】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-119】



10

20


30

40

50


であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-120】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-121】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-122】




であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-123】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、
【化A-124】



であり；

R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^IR^I$ が、

10


20

30

40

50


【化 A - 1 2 5】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 1 2 6】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 1 2 7】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 1 2 8】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、


【化 A - 1 2 9】



であり；

 R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、

【化 A - 1 3 0】



10

20


30

40

50

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-131】



10

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-132】



20

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-133】



30

であり；


R^1 がフルオロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-134】



40

であり；


R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-135】



であり；


50

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
 【化A-136】



であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
 【化A-137】




であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
 【化A-138】




であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
 【化A-139】




であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
 【化A-140】




であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
 【化A-141】




であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-142】




であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-143】




であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-144】




であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-145】



であり；

R^1 がクロロであり、 $-CH(R^H)-NR^I R^I$ が、
【化A-146】



である化合物または前述のもののいずれかの薬学的に許容できる塩から選択される、項4
0に記載の方法。

項42

前記化合物が、

10


20

30

40

50

【化 A - 1 4 7】




10

またはその薬学的に許容できる塩から選択される、項 4 1 に記載の方法。

項 4 3

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (X) もしくは (X-1)

【化 A - 1 4 8】



20

30

のいずれか 1 つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、


R^{700} が、各々の存在について独立して、ハロゲンであり；

R^{901a} が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり；

R^{401} および $R^{401'}$ が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ ヒドロキシアルキル、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}) C(O)-$ 、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリル- $C(O)-$ であり、ここで、カルボシクリル部分が、ヒドロキシ基、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}) S(O)_{1 \sim 2}-$ 、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}) C(O)NH(C_1 \sim C_4 \text{ アルキレニル})-$ 、 $(C_1 \sim C_4 \text{ アルキル}) S(O)_{1 \sim 2}NH(C_1 \sim C_4 \text{ アルキレニル})-$ 、または以下の構造式：

40

【化 A - 1 4 9】



(式中、

50

【化 A - 150】

“ ”

が、窒素原子への結合点を表し、 R^{4a} および $R^{4a'}$ が、各々の存在について独立して、 H もしくは $C_1 \sim C_4$ アルキルであり、またはそれらが結合される窒素原子と一緒にあって、4～13員ヘテロシクリルを形成する)

によって表される部分で任意選択的に置換され；

R^{901} 、 $R^{901'}$ 、および $R^{901''}$ が、各々の存在について独立して、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ ヒドロキシアルキル、 $(C_1 \sim C_4$ アルコキシ) - $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、アミノ - $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、モノ - もしくはジ - $(C_1 \sim C_4$ アルキル) アミノ - $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリル - $(C_0 \sim C_3)$ アルキレニル、 $(4 \sim 13$ 員) ヘテロシクリル - $(C_0 \sim C_3)$ アルキレニル、または R^{901} 、 $R^{901'}$ 、および $R^{901''}$ のいずれか 2 つであって、それらが結合される窒素原子と一緒にあって、4～13員ヘテロシクリルを形成するいずれか 2 つである、方法。

項 4 4

R^{700} が F であり；

R^{901} 、 $R^{901'}$ 、および $R^{901''}$ が、各々の存在について独立して、 H 、 $C_1 \sim C_6$ アルキル、 $C_1 \sim C_6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim C_6$ ヒドロキシアルキル、 $(C_1 \sim C_4$ アルコキシ) - $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、アミノ - $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、モノ - もしくはジ - $(C_1 \sim C_4$ アルキル) アミノ - $(C_1 \sim C_6)$ アルキル、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリル - $(C_0 \sim C_3)$ アルキレニル、 $(4 \sim 13$ 員) ヘテロシクリル - $(C_0 \sim C_3)$ アルキレニルである、項 4 3 に記載の方法。

項 4 5

前記化合物が、構造式 (X) によって表され；


R^{700} が F であり；

R^{901} および $R^{901'}$ が、それらが結合される窒素原子と一緒にあって、4～13員ヘテロシクリルを形成する、項 4 3 に記載の方法。

項 4 6

前記化合物が、以下の構造式：

【化 A - 151】



10


20

30

40

50

【化A-152】



10


20

30

40

50

【化 A - 1 5 3】



10


20

のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項43または44に記載の方法。

項47

前記化合物が、以下の構造式：

【化 A - 1 5 4】




30

40

50

【化A-155】



10


20

30

40

50

【化 A - 1 5 6】




のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項 4 3 または 4 5 に記載の方法。

項 4 8

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式 (X I)

【化 A - 1 5 7】




のいずれか1つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、

R⁹⁰²、R^{902'}、R⁴⁰²、および R^{402'} が、各々の存在について独立して、H または C₁ ~ C₆ アルキルである、方法。

項 4 9

前記化合物が、以下の構造式：

【化 A - 1 5 8】




によって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項 4 8 に記載の方法。

項 5 0

構造式 (XII)

【化 A - 1 5 9】



10

によって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩であって、式中、以下のとおりである、化合物またはその薬学的に許容できる塩。

【表 A - 4】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-5				CH
S17-3				CH
S16-6-4				CH
S16-6-2				CH
S16-6-31				CH
S16-6-32				CH
S16-6-33				CH












20

30

40

50

【表 A - 5】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-6-34				CH
S16-6-35				CH
S16-6-3				CH
S16-6-4				CH
S16-6-5				CH
S16-6-15				CH
S16-6-13				CH
S16-6-14				CH
S16-6-16				CH
S16-6-17				CH
S16-6-27				CH

10

20

30

40

50

【表 A - 6】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-6-29				CH
S16-6-23				CH
S16-6-24				CH
S16-6-25				CH
S16-6-30				CH
S16-6-6				CH
S16-6-7				CH
S16-6-8				CH
S16-6-9				CH
S16-6-10				CH
S16-6-36				CH

10












20

30

40

50

【表 A - 7】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-6-37				CH
S16-6-38				CH
S16-6-11				CH
S16-6-12				CH
S16-6-18				CH
S16-6-39				CH
S17-5				CH
S17-6				CH
S16-6-29				CH
S16-6-19				CH
S16-6-28				CH

10













20

30

40

50

【表 A - 8】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S16-6-20				CH
S16-6-21				CH
S16-6-22				CH
S20-6-1				CH
S20-6-4				CH
S20-6-2				CH
S20-6-3				CH
S20-6-5				CH
S20-6-7				CH
S20-6-16				CH
S20-6-8				CH

10

20

30

40

50

【表 A - 9】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
S20-6-14				CH
S20-6-6				CH
S20-6-15				CH
S20-6-11				CH
S20-6-12				CH
S20-6-13				CH
S20-6-9				CH
S20-6-10				CH
S19-4				N

項 5 1

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式：

10


20

30

40

50

【化 A - 1 6 0】



10

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、以下のとおりである、方法。

20

30

40

50

【表 A - 10】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
K43				CH
K44				CH
K45				N
K46				N
K47				CH
K48				CH
K49				CH
K50				CH
K51				CH

10

20

30

40

50

【表 A - 1 1】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
K52				CH
K53				CH
K54				CH
K55				CH
K56				CH
K57				CH
K58				CH
K59				CH
K60				CH
K61				CH
K62				CH
K63				CH

10




20

30

40

50

【表 A - 1 2】


化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{IX}	X
K64				CH
K65				CH

10

項 5 2

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化 A - 1 6 1】



20

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、

R^{803} が、H、 $C_1 \sim 6$ アルキル、 $C_1 \sim 6$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 6$ ヒドロキシアルキル、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリル- ($C_0 \sim 3$) アルキレニル、アミノ- ($C_1 \sim C_4$) アルキル、モノ-もしくはジ- ($C_1 \sim C_4$ アルキル) アミノ- ($C_1 \sim 4$) アルキル、または ($4 \sim 13$ 員) ヘテロシクリル- ($C_0 \sim C_3$) アルキレニルであり、ここで、ヘテロシクリル部分が、 $C_1 \sim 3$ アルキルで任意選択的に置換され；

30

R^{701} が、H、 $C_1 \sim 4$ アルキルオキシ、-OH、 $C_1 \sim 4$ アルキル、 $C_1 \sim 4$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアルキル、または $C_1 \sim 4$ ハロアルコキシであり；

R^{403} および $R^{403'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1 \sim 4$ アルキル； $C_1 \sim 4$ ハロアルキル； $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアルキル；($C_1 \sim 4$ アルコキシ)- ($C_1 \sim 4$) アルキル；アミノ- ($C_1 \sim C_4$) アルキル；モノ-もしくはジ- ($C_1 \sim C_4$ アルキル) アミノ- ($C_1 \sim 4$) アルキル；カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される $C_3 \sim 12$ カルボシクリル- ($C_0 \sim C_3$) アルキレニル-；($C_1 \sim 4$ アルキル) C(O)-、($C_1 \sim 4$ アルキル) S(O)_{1~2}；($C_1 \sim 4$ アルキル) C(O)NH ($C_1 \sim 4$ アルキレニル)-；($C_1 \sim 4$ アルキル) S(O)_{1~2}NH ($C_1 \sim 4$ アルキレニル)-；HOC(O)- ($C_1 \sim C_3$) アルキレニル-；H₂NC(O)- ($C_1 \sim C_3$) アルキレニル；または($C_1 \sim 4$ アルキルオキシ) C(O)- ($C_1 \sim C_3$) アルキレニルである、方法。

40

項 5 3

R^{701} が-OCH₃であり、 R^{803} がエチルである、項 5 2 に記載の方法。

項 5 4

R^{701} が-OCH₃であり、 R^{403} および $R^{403'}$ の各々が水素である、項 5 2 に記載の方法。

項 5 5

50

R⁸⁰³がエチルであり、R⁴⁰³およびR^{403'}の各々が水素である、項52に記載の方法。

項56

R⁷⁰¹が-O-CF₃であり、R⁸⁰³がメチルである、項52に記載の方法。


項57

R⁷⁰¹が-CF₃であり、R⁹⁰³が、C₁~4アルキルまたは(C₃~C₆)カルボシクリル-(C₀~C₃)アルキレニルである、項52に記載の方法。

項58

前記化合物が、以下の構造式：

【化A-162】



10








20

30

40

50

【化A-163】



10


20

30

40

50

【化 A - 1 6 4】



10


のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項 5 2 または 5 3 に記載の方法。

項 5 9

前記化合物が、以下の構造式：

20

【化 A - 1 6 5】




30

40

50

【化A-166】



10


20

30

40

50

【化 A - 1 6 7】



10


のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項 5 2 または 5 4 に記載の方法。

20

項 6 0

前記化合物が、以下の構造式：

【化 A - 1 6 8】



30


のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項 5 2 または 5 5 に記載の方法。

項 6 1

前記化合物が、以下の構造式：

50

【化 A - 1 6 9】




10

のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項52または56に記載の方法。

項 6 2

前記化合物が、以下の構造式：

【化 A - 1 7 0】



20

30

のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項52または57に記載の方法。


40

項 6 3

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式：

50

【化 A - 1 7 1】



によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、

R^{702} が、H、ハロゲン、 $C_1 \sim 4$ アルキルオキシ、 $-OH$ 、 $C_1 \sim 4$ アルキル、 $C_1 \sim 4$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアルキル、または $C_1 \sim 4$ ハロアルコキシであり；

R^{404} および $R^{404'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1 \sim 4$ アルキル； $C_1 \sim 4$ ハロアルキル； $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアルキル； $(C_1 \sim 4 \text{ アルコキシ}) - (C_1 \sim 4)$ アルキル；アミノ- $(C_1 \sim 4)$ アルキル；モノ-もしくはジ- $(C_1 \sim 4)$ アルキル アミノ- $(C_1 \sim 4)$ アルキル；カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される $C_3 \sim 12$ カルボシクリル- $(C_0 \sim C_3)$ アルキレニル； $(C_1 \sim 4 \text{ アルキル}) C(O)-$ 、 $(C_1 \sim 4 \text{ アルキル}) S(O)_{1 \sim 2}-$ ； $(C_1 \sim 4 \text{ アルキル}) C(O)NH-C_1 \sim 4$ アルキレニル； $(C_1 \sim 4 \text{ アルキル}) S(O)_{1 \sim 2}NH-C_1 \sim 4$ アルキレニル； $HOC(O)-(C_1 \sim C_3)$ アルキレニル-； $H_2NC(O)-(C_1 \sim C_3)$ アルキレニル-；または $(C_1 \sim 4 \text{ アルキルオキシ}) C(O)-(C_1 \sim C_3)$ アルキレニル-である、方法。

項 6 4

R^{702} が $C_1 \sim 4$ ハロアルキルである、項 6 3 に記載の方法。

項 6 5

R^{702} が、H または ハロゲンである、項 6 3 に記載の方法。

項 6 6

R^{702} が $-OCH_3$ である、項 6 3 に記載の方法。

項 6 7

前記化合物が、以下の構造式：

10


20

30

40

50

【化 A - 1 7 2】



10

20

のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項6 3 または 6 4 に記載の方法。

項 6 8


前記化合物が、以下の構造式：

30

40

50

【化 A - 1 7 3】



のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項 6 3 または 6 5 に記載の方法。

項 6 9

前記化合物が、以下の構造式：

10


20

30

40

50

【化 A - 1 7 4】



10


20

のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項 6 3 または 6 6 に記載の方法。

項 7 0

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化 A - 1 7 5】



30

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、

R^{703} が、H、ハロゲン、 $C_1 \sim 4$ アルキルオキシ、 $-OH$ 、 $C_1 \sim 4$ アルキル、 $C_1 \sim 4$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアリル、または $C_1 \sim 4$ ハロアルコキシであり；

R^{801} および $R^{801'}$ が、それぞれ独立して、H、 $C_1 \sim 6$ アルキル、または $C_3 \sim 12$ カルボシクリル - ($C_0 \sim 3$) アルキレニルであり；

R^{405} および $R^{405'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1 \sim 4$ アルキル； $C_1 \sim 4$ ハロアルキル； $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアリル；($C_1 \sim 4$ アルコキシ) - ($C_1 \sim 4$) アルキル；アミノ - ($C_1 \sim 4$) アルキル；モノ - もしくはジ - ($C_1 \sim 4$ アルキル) アミノ - ($C_1 \sim 4$) アルキル；カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される $C_3 \sim 12$ カルボシクリル - ($C_0 \sim 3$) アルキレニル；($C_1 \sim 4$ アルキル) $C(O)$ -、($C_1 \sim 4$ アルキル) $S(O)_{1 \sim 2}$ -；($C_1 \sim 4$ アルキル) $C(O)NH(C_1 \sim 4$

40

50

アルキレニル) - ; (C₁~4アルキル) S(O)₁~2NH(C₁~4アルキレニル) - ; HOC(O) - (C₁~C₃)アルキレニル; H₂NC(O) - (C₁~C₃)アルキレニル; または (C₁~4アルキルオキシ) C(O) - (C₁~C₃)アルキレニルである、方法。


項 7 1

R⁷⁰³がC₁~4アルキルオキシであり、R⁴⁰⁵およびR^{405'}が、それぞれ独立して、HまたはC₁~4アルキルである、項 7 0 に記載の方法。

項 7 2

前記化合物が、以下の構造式：

【化 A - 1 7 6】




のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項 7 0 または 7 1 に記載の方法。

項 7 3

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化 A - 1 7 7】



によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、

R⁷⁰⁴が、H、ハロゲン、C₁~4アルキルオキシ、-OH、C₁~4アルキル、C₁~4ハロアルキル、C₁~4ヒドロキシアルキル、またはC₁~4ハロアルコキシであり；

R⁸⁰²およびR^{802'}が、それらが結合される窒素原子と一緒に、4~13員単環式または7~13員二環式ヘテロシクリルを形成し；

R⁴⁰⁶およびR^{406'}が、それぞれ独立して、H；C₁~4アルキル；C₁~C₄ハロアルキル；C₁~C₄ヒドロキシアルキル；(C₁~C₄アルコキシ) - (C₁~4)アルキ

ル；アミノ－（ $C_1 \sim C_4$ ）アルキル；モノ－もしくはジ－（ $C_1 \sim C_4$ アルキル）アミノ－（ $C_1 \sim 4$ ）アルキル；カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される $C_3 \sim 1_2$ カルボシクリル－（ $C_0 \sim C_3$ ）アルキレニル；（ $C_1 \sim 4$ アルキル） $C(O)$ －、（ $C_1 \sim 4$ アルキル） $S(O)_{1 \sim 2}$ －；（ $C_1 \sim 4$ アルキル） $C(O)NH(C_1 \sim 4$ アルキレニル)－；（ $C_1 \sim 4$ アルキル） $S(O)_{1 \sim 2}NH(C_1 \sim 4$ アルキレニル)－； $HOC(O)$ －（ $C_1 \sim C_3$ ）アルキレニル－； $H_2NC(O)$ －（ $C_1 \sim C_3$ ）アルキレニル－；または（ $C_1 \sim 4$ アルキルオキシ） $C(O)$ －（ $C_1 \sim C_3$ ）アルキレニル－である、方法。

項 7 4


R 7 0 4がハロゲンであり；

R⁸⁰²およびR⁸⁰²'が、それらが結合される窒素原子と一緒に、1, 2, 3, 4-テトラヒドロイソキノリンを形成する、項73に記載の方法。

項 7 5

前記化合物が、以下の構造式：

【化:A-178】




のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項73または74に記載の方法。

項 7 6

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化 A - 179】



10

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、

R^{705} が、H、ハロゲン、 $C_1 \sim 4$ アルキルオキシ、 $-OH$ 、 $C_1 \sim 4$ アルキル、 $C_1 \sim 4$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアルキル、または $C_1 \sim 4$ ハロアルコキシであり；

R^{804} が、アミノ- $C_1 \sim 6$ アルキル、モノ-もしくはジ- ($C_1 \sim C_4$ アルキル) アミノ ($C_1 \sim 6$) アルキル、または C 結合 4 ~ 13 単環式ヘテロシクリルであり、ここで、前記ヘテロシクリルが窒素を含有するとき、前記窒素が任意選択的に $C_1 \sim 4$ アルキルを有するものであり；

R^{407} および $R^{407'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1 \sim 4$ アルキル； $C_1 \sim C_4$ ハロアルキル； $C_1 \sim C_4$ ヒドロキシアルキル；($C_1 \sim C_4$ アルコキシ) - ($C_1 \sim 4$) アルキル；アミノ- ($C_1 \sim C_4$) アルキル；モノ-もしくはジ- ($C_1 \sim C_4$ アルキル) アミノ- ($C_1 \sim 4$) アルキル；カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される $C_3 \sim 12$ カルボシクリル- ($C_0 \sim C_3$) アルキレニル；($C_1 \sim 4$ アルキル) $C(O)-$ 、($C_1 \sim 4$ アルキル) $S(O)_{1 \sim 2}-$ ；($C_1 \sim 4$ アルキル) $C(O)NH(C_1 \sim 4$ アルキレニル) -；($C_1 \sim 4$ アルキル) $S(O)_{1 \sim 2}NH(C_1 \sim 4$ アルキレニル) -； $HOC(O)- (C_1 \sim C_3)$ アルキレニル-； $H_2NC(O)- (C_1 \sim C_3)$ アルキレニル-；または ($C_1 \sim 4$ アルキルオキシ) $C(O)- (C_1 \sim C_3)$ アルキレニル-である、方法。

20

項 7 7

R^{705} が $C_1 \sim 4$ ハロアルキルであり；

R^{804} が、モノ-またはジ- ($C_1 \sim C_2$ アルキル) アミノ ($C_1 \sim 6$) アルキルである、項 7 6 に記載の方法。

30

項 7 8


R^{705} が $C_1 \sim 4$ ハロアルキルであり；

R^{804} が、メチルまたはエチルで N 置換される 4 ~ 5 単環式ヘテロシクリルである、項 7 6 に記載の方法。

項 7 9

前記化合物が、以下の構造式：

【化 A - 180】



40


のいずれか 1 つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項 7 6 または 7 7 に記載の方法。

項 8 0

50

前記化合物が、以下の構造式：

【化 A - 1 8 1】




10

のいずれか1つによって表されるか、またはその薬学的に許容できる塩である、項76または78に記載の方法。

項81

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、以下の構造式

【化 A - 1 8 2】



20

によって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、

R^{706} が、H、ハロゲン、 $C_1 \sim 4$ アルキルオキシ、 $-OH$ 、 $C_1 \sim 4$ アルキル、 $C_1 \sim 4$ ハロアルキル、 $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアルキル、または $C_1 \sim 4$ ハロアルコキシであり；

R^{805} および $R^{805'}$ が、それらが結合される窒素原子と一緒に、 $C_3 \sim 12$ カルボシクリルで任意選択的に置換される4～13単環式ヘテロシクリルを形成し；

30

R^{408} および $R^{408'}$ が、それぞれ独立して、H； $C_1 \sim 4$ アルキル； $C_1 \sim 4$ ハロアルキル； $C_1 \sim 4$ ヒドロキシアルキル； $(C_1 \sim 4$ アルコキシ) - $(C_1 \sim 4)$ アルキル；アミノ - $(C_1 \sim 4)$ アルキル；モノ-またはジ- $(C_1 \sim 4$ アルキル)アミノ - $(C_1 \sim 4)$ アルキル；カルボシクリル部分がヒドロキシル基で任意選択的に置換される $C_3 \sim 12$ カルボシクリル - $(C_0 \sim C_3)$ アルキレニル； $(C_1 \sim 4$ アルキル) $C(O) -$ 、 $(C_1 \sim 4$ アルキル) $S(O)_{1 \sim 2} -$ ； $(C_1 \sim 4$ アルキル) $C(O)NH(C_1 \sim 4$ アルキレニル) - ； $(C_1 \sim 4$ アルキル) $S(O)_{1 \sim 2}NH(C_1 \sim 4$ アルキレニル) - ； $HOC(O) - (C_1 \sim C_3)$ アルキレニル； $H_2NC(O) - (C_1 \sim C_3)$ アルキレニル； $(C_1 \sim 4$ アルキルオキシ) $C(O) - (C_1 \sim C_3)$ アルキレニルである、方法。

40

項82


R^{706} がハロゲンであり、 R^{805} および $R^{805'}$ が、それらが結合される窒素原子と一緒に、フェニルで任意選択的に置換される5～6単環式ヘテロシクリルを形成する、項81に記載の方法。

項83

前記化合物が、以下の構造式：

50

【化 A - 183】



10


20

のいずれか1つによって表され、またはその薬学的に許容できる塩である、項81または82に記載の方法。

項84

構造式 (XIII)

【化 A - 184】




30

によって表される任意の化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物であって、式中、以下のとおりである、化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物。

40

50

【表 A - 1 3】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S8-7-2			
S8-7-4			
S15-6-1			
S15-6-4			
S15-6-6			
S15-6-2			
S15-6-7			
S15-6-8			
S15-6-5			

10

20

30

40

50

【表 A - 1 4】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S15-6-3			
S15-6-9			
S15-6-10			
S2-9-6			
S2-9-5			
S1-7-3			
S1-7-1			
S1-7-2			
S1-6-2			
S2-9-3			
S2-9-1			

10

20

30

40

50

【表 A - 1 5】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S2-9-9			
S2-9-16			
S2-9-7			
S2-9-10			
S2-9-8			
S2-9-13			
S2-9-14			
S2-9-11			
S2-9-15			
S2-9-18			

10

20

30

40

50

【表 A - 1 6】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S2-9-19			
S2-9-20			
S2-9-21			
S2-9-2			
S2-9-12			
S2-9-17			
S2-9-22			
S2-9-28			
S2-9-29			
S2-9-23			
S2-9-24			
S2-9-25			

10

20

30

40

50

【表 A - 17】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S2-9-26			
S2-9-4			
S2-9-27			
S1-5-9			
S1-6-1			
S1-5-1			
S1-5-2			
S1-5-8			
S1-5-4			
S1-5-6			
S1-5-5			
S1-5-3			

10

20

30

40

50

【表 A - 18】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S1-5-7			
S1-5-14			
S1-5-15			
S1-5-18			
S1-5-17			
S1-5-16			
S1-5-10			
S1-5-12			
S1-5-11			
S1-5-13			
S4-7-1			
S4-7-3			

【表 A - 19】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S4-7-4			
S4-7-5			
S4-7-6			
S4-7-2			
S3-7-1			
S3-7-2			
S9-5-1			
S9-5-2			
S9-5-3			
S9-5-4			
S10-5-1			
S10-5-2			

10





20

30

40

50

【表 A - 2 0】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S10-5-3			
S10-5-4			
S8-7-1			
S8-7-7			
S8-7-5			
S8-7-8			
S8-7-9			
S8-7-3			
S8-7-6			
S8-7-10			
S8-7-11			
S7-6-1			

10

20

30

40

50

【表 A - 2 1】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S7-6-2			
S7-6-6			
S7-6-4			
S7-6-7			
S7-6-8			
S7-6-3			
S7-6-5			
S7-6-9			
S7-6-10			
S6-6-1			
S6-6-2			
S6-6-6			

10





20

30

40

50

【表 A - 2 2】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S6-6-7			
S6-6-3			
S6-6-8			
S6-6-5			
S6-6-4			
S6-6-9			
S6-6-10			
S11-4-1			
S11-4-2			
S11-5-1			 ジアステレオマー-A
S11-5-2			 ジアステレオマー-A
S12-2-1			

10

20

30

40

50

【表 A - 2 3】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S12-2-2			
S12-2-3			
S12-2-4			
S14-6-1			
S14-6-3			
S14-6-5			
S14-6-2			
S14-6-6			
S14-6-4			
S14-6-7			
S14-6-8			
S14-6-9			

10

20

30

40

50


【表 A - 2 4】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
S21-6-1			
S21-6-3			
S21-6-4			
S21-6-2			
S21-6-5			
S21-6-6			
S21-6-7			
S21-6-8			

項 8.5

血液癌を処置する方法であって、処置を必要とする対象に、構造式：

【化 A - 1 8 5】



のいずれか 1 つによって表される化合物、またはその薬学的に許容できる塩、またはその薬学的に許容できる組成物の有効量を投与することを含み、式中、以下のとおりである、方法。

【表 A - 2 5】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
K1			
K2			
K3			
K4 (化合物3A)			
K5			
K6			
K7			
K8			
K9			
K10			
K11			
K12			

10

20

30

40

50

【表 A - 2 6】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
K13			
K14			
K15			
K16			
K17			
K18			
K19			
K20			
K21			
K22			
K23			
K24			

10

20

30

40

50

【表 A - 2 7】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
K25			
K26			
K27			
K28			
K29			
K30			
K31			
K32			
K33			
K34			
K35			
K36			

10

20

30

40

50



【表 A - 2 8】

化合物番号	R ^{IV}	R ^{VII}	R ^{VIII}
K37			
K38			
K39			
K40			
K41			
K42			

項 8.6

構造式 (XIV) もしくは (XV) :

【化 A - 186】




のいずれか1つによって表される化合物またはその薬学的に許容できる塩であって、

環 E が、4 または 5 員カルボシクリルであり；

環 F が、少なくとも 1 つの窒素原子を含む 5 または 6 員ヘテロシクリルであり；

環 G が、以下の構造式

【化 A - 1 8 7】



10

のいずれか 1 つによって表され、式中、

【化 A - 1 8 8】

“~~~~~”

が、環 G の環 D への結合点を表し、

【化 A - 1 8 9】

“~~~~~”

20

が、単結合または二重結合であり、 G^1 、 G^2 、および G^3 が、それぞれ独立して、原子価が許容するように、 $-CH=$ 、 $-CH_2-$ 、 $-N=$ 、または $-NH-$ であるが、

【化 A - 1 9 0】

“~~~~~”

30

が単結合であるとき、 G^1 、 G^2 、および G^3 の少なくとも 2 つが $-NH-$ であることを条件とし；

R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、水素、ハロ、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-OR^A$ 、 $-(C)(O)NR^B R^B'$ 、 $NR^B R^B'$ 、 $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリルから選択され；

R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、および $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $S(O)_{1 \sim 2} R^C$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、および $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})-NR^D R^E$ から選択され；または

40

R^{41} および $R^{41'}$ 、ならびに別々に R^{42} および $R^{42'}$ が、それらが共通して結合される窒素原子と一緒にあって、N、O、および S から独立して選択される 1 ~ 2 つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む 4 ~ 8 員環を形成し；

R^A の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{ アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{ 員})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^B の各々および R^B' の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ ハロ})$

50

アルキル)、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、および $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^C の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され；

R^D の各々および R^E の各々が、水素、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、および $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリルから独立して選択され；

ここで、

R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、ハロ、 $=O$ 、 OR^A 、 $NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で任意選択的にかつ独立して置換され；

R^A または R^C の任意のアルキルまたはアルキレニル部分が、1つ以上のフルオロで任意選択的にかつ独立して置換され；

環E、F、およびG、または R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} もしくは $R^{42'}$ のいずれかの任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、または R^{41} および $R^{41'}$ もしくは R^{42} および $R^{42'}$ を一緒にすることによって形成される任意の環が、ハロ、 $=O$ 、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12 \text{カルボシクリル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員ヘテロシクリル})$ 、 OR^A 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-NR^B R^{B'}$ 、および $S(O)_{0 \sim 2} R^C$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

環FおよびG、または R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} もしくは $R^{42'}$ のいずれかの任意のヘテロシクリル部分、または R^{41} および $R^{41'}$ もしくは R^{42} および $R^{42'}$ を一緒にすることによって形成される任意の環が、 R^F で置換可能な窒素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^F の各々が、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ハロアルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{ヒドロキシアルキル})$ 、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-S(O)_{1 \sim 2}-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-C(O)-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(C_3 \sim 12)$ カルボシクリル、 $-C(O)H$ 、 $-C(O)-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-(4 \sim 13 \text{員})$ ヘテロシクリル、 $-(C_0 \sim C_6 \text{アルキレニル})-C(O)_2-(C_1 \sim C_6 \text{アルキル})$ 、 $-(C_1 \sim C_6 \text{アルキレニル})-NR^B R^{B'}$ 、および $-C(O)N(R^D)(R^E)$ から独立して選択され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のカルボシクリルもしくはヘテロシクリル部分、または R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} もしくは $R^{42'}$ の任意の置換基が、フルオロ、クロロ、 $C_1 \sim C_4$ アルキル、 $C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ アルキル、 $-O-C_1 \sim C_4$ フルオロアルキル、 $=O$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-NH(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})$ 、および $-N(C_1 \sim C_4 \text{アルキル})_2$ から独立して選択される1つ以上の置換基で炭素原子において任意選択的にかつ独立して置換され；

R^A 、 R^B 、 $R^{B'}$ 、 R^C 、 R^D 、 R^E 、 R^F の任意のヘテロシクリル部分、または R^{71} 、 R^{72} 、 R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} もしくは $R^{42'}$ の任意のヘテロシクリル置換基が、 $-C$

10

20

30

40


50

1 ～ C₄ アルキルまたは - S (O)_{1～2} - (C₁ ～ C₄ アルキル) で置換可能な窒素原子において任意選択的に置換される、化合物またはその薬学的に許容できる塩。

項 8 7

環 E および環 F が、一緒に、以下の構造式：

【化 A - 1 9 1】



10

のいずれか 1 つによって表され、式中、F¹ および F² が、各々の存在について独立して、- CH₂ - または - NR⁰ - から選択され、ここで、R⁰ が、各々の存在について独立して、H または C₁ ～ C₄ アルキルであり、

【化 A - 1 9 2】

“~~~~~”

20

が、環 E の環 D への結合点を表す、項 8 6 に記載の化合物。

項 8 8

R^{4 1}、R^{4 1}′、R^{4 2} もしくは R^{4 2}′ が、それぞれ独立して、水素；ヒドロキシおよびハロから独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的に置換される - (C₁ ～ C₆ アルキル)；- (C₃ ～ C₆ シクロアルキル)；- C (O) - (C₁ ～ C₆ アルキル)；- C (O) - (C₁ ～ C₆ アルキレニル) - N (R^D) (R^E)；ならびに S (O)_{1～2} R^C から選択され；または

R^{4 1} および R^{4 1}′ もしくは R^{4 2} および R^{4 2}′ が、それらが共通して結合される窒素原子と一緒に、N、O、および S から独立して選択される 1 ～ 2 つのさらなるヘテロ原子を任意選択的に含む 4 ～ 6 員環を形成し；

R^C が - (C₁ ～ C₆ アルキル) であり；

R^D および R^E の各々が、水素および - (C₁ ～ C₆ アルキル) から独立して選択される、項 8 6 に記載の化合物。

30

項 8 9

R^{4 1}、R^{4 1}′、R^{4 2}、または R^{4 2}′ が、それぞれ独立して、水素、- (C₁ ～ C₆ アルキル)、- (C₃ ～ C₆ シクロアルキル)、- C (O) - (C₁ ～ C₆ アルキル)、- C (O) - (C₁ ～ C₆ アルキレニル) - N (R^D) (R^E)、および S (O)_{1～2} R^C から選択され；

R^C が - (C₁ ～ C₆ アルキル) であり；

R^D および R^E の各々が、水素および - (C₁ ～ C₆ アルキル) から独立して選択される、項 8 6 ～ 8 8 のいずれか一項に記載の化合物。

40

項 9 0

R^{4 1}、R^{4 1}′、R^{4 2}、または R^{4 2}′ が、それぞれ独立して、水素、メチル、エチル、プロピル、シクロプロピル、- C (O) CH₃、- C (O) CH₂ N (CH₃)₂、および - S (O)₂ CH₃ から選択される、項 8 6 ～ 8 9 のいずれか一項に記載の化合物。

項 9 1

R^{7 1} および R^{7 2} が、それぞれ独立して、水素；ハロ；ヒドロキシル、ハロ、および - NR^B R^B′ から独立して選択される 1 つ以上の置換基で任意選択的に置換される - (C₁

50

～C₆アルキル)；-NR^BR^{B'}；-C(O)NR^BR^{B'}、-OR^A、-(C₀～C₆アルキレニル)-(C₃～C₈)カルボシクリル、ならびに-(C₀～C₆アルキレニル)-(4～8員)ヘテロシクリルから選択され、ここで、R^Aが、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換されるC₁～C₆アルキルである、項86～90のいずれか一項に記載の化合物。

項92

R^{7.1}およびR^{7.2}が、それぞれ独立して、水素；ハロ；1つ以上のハロで任意選択的に置換される-(C₁～C₆アルキル)；および-OR^Aから選択され、ここで、R^Aが、1つ以上のフルオロで任意選択的に置換されるC₁～C₆アルキルである、項91に記載の化合物。

10


項93

R^{7.1}およびR^{7.2}が、それぞれ独立して、水素、フルオロ、クロロ、-CF₃、-OCH₃、-OCF₃、-N(CH₃)₂、および-NHCH₃から選択される、項86～91のいずれか一項に記載の化合物。

項94

環Eが、以下の構造式

【化A-193】



20

によって表され、式中、

【化A-194】

“”


30

の各々が、前記環Eの前記環Dへの結合点を表す、項86～93のいずれか一項に記載の化合物。

項95

環Eが、以下の構造式

【化A-195】



40


によって表され、式中、

【化A-196】

“”

の各々が、前記環Eの前記環Dへの結合点を表す、項86～93のいずれか一項に記載の化合物。

50


項 9 6環 F が、以下の構造式【化 A - 1 9 7】

10

のいずれか 1 つによって表され、式中、【化 A - 1 9 8】

“”

の各々が、前記環 F の前記環 E への結合点を表し、ここで、 R^0 が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルである、項 8 6 ～ 9 5 のいずれか一項に記載の化合物。

項 9 7環 G が、以下の構造式【化 A - 1 9 9】

20

のいずれか 1 つによって表され、式中、【化 A - 2 0 0】

“”

30

の各々が、前記環 G の前記環 D への結合点を表し、ここで、 $R^{0,0}$ が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルである、項 8 6 ～ 9 3 のいずれか一項に記載の化合物。

項 9 8

$R^{4,1}$ 、 $R^{4,1'}$ 、 $R^{4,2}$ 、または $R^{4,2'}$ が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり；


40

$R^{7,1}$ および $R^{7,2}$ が、それぞれ独立して、F または $-CF_3$ である、項 8 6 ～ 9 6 のいずれか一項に記載の化合物。

項 9 9環 E が、以下の構造式

50

【化 A - 2 0 1】



によって表され、式中、


【化 A - 2 0 2】

“1 wavy”

の各々が、前記環 E の前記環 D への結合点を表し、

環 F が、以下の構造式

【化 A - 2 0 3】



のいずれか 1 つによって表され、式中、

【化 A - 2 0 4】

“2 wavy”

の各々が、前記環 F の前記環 E への結合点を表し、

R^0 が、各々の存在について独立して、H または C 1 ~ C 4 アルキルであり；

R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、H または C 1 ~ C 4 アルキルであり；

R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、F または $-CF_3$ である、項 8 6 に記載の化合物。

項 1 0 0

環 E が、以下の構造式

【化 A - 2 0 5】




によって表され、式中、

【化 A - 2 0 6】

“1”

の各々が、前記環 E の前記環 D への結合点を表し、
環 F が、以下の構造式

【化 A - 2 0 7】



10

のいずれか 1 つによって表され、式中、
【化 A - 2 0 8】

“2”

20

の各々が、前記環 F の前記環 E への結合点を表し、

R^0 が、各々の存在について独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり；


R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり；

R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、F または $-CF_3$ である、項 86 に記載の化合物。

項 1 0 1

環 G が、以下の構造式

【化 A - 2 0 9】



30

のいずれか 1 つによって表され、式中、
【化 A - 2 1 0】

“”

40

の各々が、前記環 G の前記環 D への結合点を表し；

R^{41} 、 $R^{41'}$ 、 R^{42} 、または $R^{42'}$ が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルであり；


R^{71} および R^{72} が、それぞれ独立して、F または $-CF_3$ である、項 86 に記載の化合物。

項 1 0 2


以下の構造式：

50


【化 A - 2 1 1】




S5-9-7




S5-9-2, ジアステレオマーAおよびB



S5-9-3, ジアステレオマーAおよびB



S5-9-4, ジアステレオマーAおよびB



S5-9-5, ジアステレオマーAおよびB

10


20

30


40

50


【化A-212】




S5-9-10, ジアステロマーAおよびB




S5-9-9, ジアステロマーAおよびB




S5-9-11, ジアステロマーAおよびB




S5-9-8, ジアステロマーB




S5-9-6, ジアステロマーAおよびB




S5-9-12, ジアステロマーAおよびB




S5-9-13, ジアステロマーAおよびB



S5-9-1, ジアステロマーAおよびB



S13-9-1, ジアステロマーAおよびB



S13-9-2, ジアステロマーAおよびB

10


20

30

40

50

【化 A - 2 1 3】




10

のいずれか 1 つによって表される、項 8 6 ～ 1 0 1 のいずれか一項に記載の化合物またはその薬学的に許容できる塩。

項 1 0 3

以下の構造式

【化 A - 2 1 4】



20

によって表され、式中、 R^{91} 、 R^{n1} 、および R^{n2} が、それぞれ独立して、フェニルで任意選択的に置換される H または $C_1 \sim C_4$ アルキルである、項 8 6 に記載の化合物またはその薬学的に許容できる塩。

項 1 0 4


前記化合物が、以下の構造式：

30

40

50

【化 A - 2 1 5】



10

20

30


40

のいずれか 1 つによって表されるか、または前述のもののいずれかの薬学的に許容できる塩である、項 1 0 3 に記載の化合物。

項 1 0 5

以下の構造式

【化 A - 2 1 6】




によって表され、式中、 R^{g2} 、 R^{n3} 、および R^{n4} が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルである、項 8 6 に記載の化合物またはその薬学的に許容できる塩。

10

項 1 0 6

以下の構造式：

【化 A - 2 1 7】




20

のいずれか 1 つによって表される、項 1 0 5 に記載の化合物またはその薬学的に許容できる塩。

項 1 0 7

以下の構造式

【化 A - 2 1 8】




30

によって表され、式中、 R^{n5} および R^{n6} が、それぞれ独立して、H または $C_1 \sim C_4$ アルキルである、項 8 6 に記載の化合物またはその薬学的に許容できる塩。

項 1 0 8

以下の構造式：

【化 A - 2 1 9】



40

のいずれか 1 つによって表される、項 1 0 5 に記載の化合物または前述のもののいずれかの薬学的に許容できる塩。

項 1 0 9

50

薬学的に許容できるキャリアまたは希釈剤と、項 50、84 または 86～108 のいずれか一項に記載の化合物とを含む医薬組成物。

項 110

血液癌を患う対象を処置する方法であって、前記対象に、項 50、84 もしくは 86～108 のいずれか一項に記載の化合物もしくはその薬学的に許容できる塩、または項 109 に記載の医薬組成物の治療的に有効な量を投与することを含む方法。

項 111

前記血液癌が白血病である、項 1～49、51～83、85 または 110 のいずれか一項に記載の方法。

項 112

前記白血病が、急性骨髄性白血病、急性リンパ芽球性白血病、慢性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病、慢性骨髄単球性白血病、急性単球白血病から選択される、項 111 に記載の方法。

項 113

前記白血病が急性骨髄性白血病である、項 112 に記載の方法。

項 114

前記血液癌がリンパ腫である、項 1～49、51～83、85 または 110 のいずれか一項に記載の方法。

項 115

前記リンパ腫が、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群または脊髄増殖性症候群、マントル細胞リンパ腫、びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫（DLBCL）、バーキットリンパ腫／白血病、および B 細胞リンパ腫から選択される、項 114 に記載の方法。

項 116

1 つ以上のさらなる治療剤の投与を含む、項 1～49、51～83、85 または 110 のいずれか一項に記載の方法。

項 117

前記さらなる治療剤が、シタラビンおよびアンスラサイクリン薬物である、項 116 に記載の方法。

項 118

前記アンスラサイクリン薬物が、ダウノルピシンまたはイダルピシンから選択される、項 116 に記載の方法。

項 119

クラドリビンの投与をさらに含む、項 116 または 118 に記載の方法。

項 120

前記対象がヒトである、項 49、51～83、85 または 110 のいずれか一項に記載の方法。

項 121

細菌感染の処置を、それを必要とする対象において行う方法であって、前記対象に、項 50、84 もしくは 86～108 のいずれか一項に記載の化合物もしくはその薬学的に許容できる塩、または項 109 に記載の医薬組成物の治療的に有効な量を投与することを含む方法。

項 122

前記感染症が、グラム陽性生物によって引き起こされる、項 121 に記載の方法。

項 123

前記グラム陽性生物が、バチルス綱（*Bacilli*）；アクチノバクテリア門（*Actinobacteria*）；およびクロストリジウム綱（*Clostridia*）から選択される、項 122 に記載の方法。

項 124

前記感染症が、グラム陰性生物によって引き起こされる、項 121 に記載の方法。

10

20

30

40

50

項 1 2 5

前記グラム陰性生物が、腸内細菌科 (*Enterobacteriaceae*)、バクテロイデス門 (*Bacteroidetes*)、ビブリオ科 (*Vibrionaceae*)、パストレラ科 (*Pasteurellaceae*)、シュードモナス科 (*Pseudomonadaceae*)、ナイセリア科 (*Neisseriaceae*)、リケッチア (*Rickettsiae*)、モラクセラ科 (*Moraxellaceae*)、プロテアエ (*Proteaeae*) の任意の種、アシネトバクター属 (*Acinetobacter spp.*)、ヘリコバクター属 (*Helicobacter spp.*)、およびカンピロバクター属 (*Campylobacter spp.*) からなる群から選択される、項 1 2 4 に記載の方法。

10

項 1 2 6

前記感染症が、リケッチア目 (*Rickettsiales*) およびクラミジア目 (*Chlamydiales*) から選択される生物によって引き起こされる、項 1 2 1 に記載の方法。

項 1 2 7

前記感染症が、クラミジア門 (*Chlamydiae*) およびスピロヘータ門 (*Spiriochaetales*) から選択される生物によって引き起こされる、項 1 2 1 に記載の方法。

項 1 2 8

前記感染が、モリクト (*Molluscites*) 綱から選択される生物によって引き起こされる、項 1 2 1 に記載の方法。

20

項 1 2 9

前記感染が、複数の生物によって引き起こされる、項 1 2 1 に記載の方法。

項 1 3 0

前記感染が、1 つ以上の抗生物質に対して耐性を示す生物によって引き起こされる、項 1 2 1 に記載の方法。

項 1 3 1

前記グラム陽性菌が、黄色ブドウ球菌 (*S. aureus*)、CoNS、肺炎球菌 (*S. pneumoniae*)、化膿連鎖球菌 (*S. pyogenes*)、*S.* アガラクティアエ (*S. agalactiae*)、*E.* フェカーリス (*E. faecalis*)、および *E.* フェシウム (*E. faecium*) から選択される、項 1 2 2 に記載の方法。

30

項 1 3 2

前記グラム陰性菌が、インフルエンザ菌 (*H. influenzae*)、*M.* カタラーリス (*M. catarrhalis*)、およびレジオネラ・ニューモフィラ (*Legionella pneumophila*) から選択される、項 1 2 4 に記載の方法。

【図面】

【図 1】

【図 2】




図 1




図 2

40

50

【図 3】




図 3

【図 4】




図 4

10

【図 5】




図 5

【図 6】




図 6

20

30

40

50

【図 7 A】




図 7A

【図 7 B】




図 7B

【図 7 C - D】




図 7C




図 7D

【図 7 E】




図 7E

10

20

30

40

50

【図 7 F】




図 7F

【図 8】




図 8

【図 9】




図 9

【図 10】




図 10

10

20

30

40

50

【図 1 1】




図 11

【図 1 2】




図 12

【図 1 3】




図 13

【図 1 4 A - 1】

化合物 番号	MIC(μg/ml)															
	S101	S143	S156	E107	E109	S103	E107	E105	E103	K145	P145	P145	P145	P145	P145	P145
S123	1	2	0.125	0.5	0.25	0.0625	0.25	0.25	2	4	32	4	32	>32	>32	EA
S124	0.5	2	0.0312	1	0.25	<0.0156	0.0625	0.25	0.0312	2	2	32	2	32	32	4
S124-1	0.125	2	<0.0156	2	0.25	<0.0156	<0.0156	0.0625	<0.0156	1	2	16	1	16	32	2
S141	4	32	0.125	16	8	2	0.0625	16	0.0312	1	4	0.125	4	8	8	16
S142	0.25	16	<0.0156	8	4	0.125	<0.0156	0.5	<0.0156	1	4	16	0.25	16	32	4
S143	1	8	0.25	8	8	1	<0.0156	8	<0.0156	1	4	16	0.25	16	32	8
S144	2	16	0.125	4	2	<0.0156	<0.0156	8	0.0312	2	2	16	1	8	16	4
S145	1	4	0.0312	4	1	<0.0156	<0.0156	2	<0.0156	1	2	16	1	16	32	4
S146	0.125	4	<0.0156	2	0.5	<0.0156	<0.0156	0.5	<0.0156	2	4	16	2	16	32	2
S147	0.5	4	0.0625	4	1	<0.0156	<0.0156	0.5	<0.0156	2	4	32	4	32	>32	1
S148	1	4	<0.0156	4	1	0.25	<0.0156	2	<0.0156	4	8	32	2	32	>32	4
S149	4	>32	1	>32	32	8	1	32	0.25	8	16	>32	0.5	>32	>32	16
S150	0.5	2	0.0625	2	2	0.25	0.0312	1	0.0312	2	4	32	2	32	>32	4
S151	8	32	1	32	16	4	0.5	16	0.0625	4	16	>32	1	32	>32	16
S152	0.625	1	0.5	2	0.5	0.25	0.125	16	<0.0156	2	1	8	0.25	16	>32	8
S153	<0.0156	0.5	0.125	2	0.25	0.25	0.0625	16	0.0312	1	8	16	0.25	16	16	2
S154	16	>32	6	32	32	2	2	>32	1	8	32	32	0.5	>32	>32	>32
S155	>32	>32	>32	>32	16	8	>32	4	>32	>32	4	>32	2	>32	>32	>32
S156	32	>32	4	16	16	4	0.5	8	1	2	16	>32	1	>32	>32	>32
S157	4	2	1	2	2	16	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32
S158	0.5	0.5	1	0.5	0.5	2	8	>32	>32	8	>32	>32	>32	>32	>32	2
S159	8	2	1	0.5	0.5	4	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32

図 14A-2へ

図 14A-1

【図 14 A - 2】

[illegible]

☒ 14A-2

【図 1 4 B - 1】

[illegible]

図14B-2へ

图14B-1

【図 14 B - 2】

[illegible]

图14B-2

【図 1 4 C - 1】

化合物 序号	μCg/mL										μg/mL									
	SA101	SA161	SA188	EZ27	EZ44	SP160	EC017	EC035	EC278	PC457	PA085	PA085	PA145	PA088	PA073	PA083	EC083	SA258	SA240	
25213	16	>32	4	32	8	4	32	8	4	>32	0.5	8	4	32	0.5	32	>32	4	>32	
SS4-10A	16	>32	4	32	8	4	32	8	4	>32	0.5	8	4	32	0.5	32	>32	4	>32	
SS4-10B	32	8	8	8	8	8	4	32	0.5	8	4	32	0.5	8	4	32	>32	8	>32	
SS4-10C	16	>32	4	32	16	2	>32	0.5	8	>32	0.5	8	16	>32	>32	>32	>32	>32	>32	
SS4-10D	16	>32	8	8	8	1	32	0.5	8	16	>32	0.5	8	>32	>32	>32	>32	>32	>32	
SS4-10E	2	32	2	16	8	2	2	1	8	32	>32	0.5	>32	>32	>32	>32	>32	32	16	
SS4-10F	0.5	2	0.5	0.5	0.25	0.0312	0.5	4	0.125	4	0.125	>32	>32	>32	>32	>32	4	8	32	
SS4-10G	4	32	4	16	8	2	1	16	0.5	8	32	>32	1	>32	>32	>32	>32	16	4	
SS4-10H	4	8	2	1	1	0.125	0.5	2	0.125	4	16	>32	>32	>32	>32	>32	8	4	32	
SS4-10I	0.5	32	0.25	8	2	0.0625	0.0312	0.0312	0.25	2	0.125	>32	>32	>32	>32	>32	0.5	2	16	
SS4-10J	0.5	32	0.25	4	1	0.0625	0.0312	0.0312	0.25	2	16	>32	>32	>32	>32	>32	0.5	4	16	
SS4-10K	0.5	>32	0.25	32	8	1	0.25	0.125	0.125	1	8	0.125	16	32	32	4	32	16	>32	
SS4-10L	0.25	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.125	4	<0.0156	1	2	8	0.0625	8	16	16	8	8	8	16	
SS4-10M	4	4	2	0.5	<0.056	0.0312	1	<0.0156	1	4	32	0.5	32	>32	>32	>32	2	4	16	
SS4-10N	>32	>32	>32	>32	>32	>32	4	>32	>32	>32	16	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	
SS4-10O	>32	>32	32	32	32	>32	2	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	
SS4-10P	8	4	2	2	0.125	8	16	16	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	16	
SS4-10Q	4	8	4	1	0.5	0.0312	0.0625	1	<0.0156	2	4	8	32	4	>32	0.5	>32	>32	>32	
SS4-10R	8	8	4	4	0.25	0.5	8	4	8	32	16	>32	32	1	32	>32	>32	>32	>32	
SS4-10S	>32	>32	>32	>32	32	8	16	>32	4	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	
SS4-10T	>32	>32	8	>32	>32	8	16	1	32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	
SS4-10U	16	>32	2	>32	>32	16	2	4	0.25	16	32	>32	1	>32	>32	>32	>32	>32	>32	
SS4-10V	2	0.5	2	0.2	0.125	1	0.25	0.125	1	32	>32	>32	2	>32	>32	>32	>32	8	4	

図14C-2へ

14C-1

【図 1 4 C - 2】

【図 1 4 D - 1】

圖 14C-12b

化合物 番号	SV101	SV161	SV168	SV202	SV204	SV160	SV161	SV162	SV163	SV164	SV165	SV166	SV167	SV168	SV169	SV170	SV171	SV172	SV173	SV174	SV175	SV176	SV177	SV178	SV179	SV180	SV181	SV182	SV183	SV184	SV185	SV186	SV187	SV188	SV189	SV190	SV191	SV192	SV193	SV194	SV195	SV196	SV197	SV198	SV199	SV200	SV201	SV202	SV203	SV204	SV205	SV206	SV207	SV208	SV209	SV210	SV211	SV212	SV213	SV214	SV215	SV216	SV217	SV218	SV219	SV220	SV221	SV222	SV223	SV224	SV225	SV226	SV227	SV228	SV229	SV230	SV231	SV232	SV233	SV234	SV235	SV236	SV237	SV238	SV239	SV240	SV241	SV242	SV243	SV244	SV245	SV246	SV247	SV248	SV249	SV250	SV251	SV252	SV253	SV254	SV255	SV256	SV257	SV258	SV259	SV260	SV261	SV262	SV263	SV264	SV265	SV266	SV267	SV268	SV269	SV270	SV271	SV272	SV273	SV274	SV275	SV276	SV277	SV278	SV279	SV280	SV281	SV282	SV283	SV284	SV285	SV286	SV287	SV288	SV289	SV290	SV291	SV292	SV293	SV294	SV295	SV296	SV297	SV298	SV299	SV300	SV301	SV302	SV303	SV304	SV305	SV306	SV307	SV308	SV309	SV310	SV311	SV312	SV313	SV314	SV315	SV316	SV317	SV318	SV319	SV320	SV321	SV322	SV323	SV324	SV325	SV326	SV327	SV328	SV329	SV330	SV331	SV332	SV333	SV334	SV335	SV336	SV337	SV338	SV339	SV340	SV341	SV342	SV343	SV344	SV345	SV346	SV347	SV348	SV349	SV350	SV351	SV352	SV353	SV354	SV355	SV356	SV357	SV358	SV359	SV360	SV361	SV362	SV363	SV364	SV365	SV366	SV367	SV368	SV369	SV370	SV371	SV372	SV373	SV374	SV375	SV376	SV377	SV378	SV379	SV380	SV381	SV382	SV383	SV384	SV385	SV386	SV387	SV388	SV389	SV390	SV391	SV392	SV393	SV394	SV395	SV396	SV397	SV398	SV399	SV400	SV401	SV402	SV403	SV404	SV405	SV406	SV407	SV408	SV409	SV410	SV411	SV412	SV413	SV414	SV415	SV416	SV417	SV418	SV419	SV420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
S154	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	&

【図 14D-2】

【図 1 4 E - 1】

圖 14D-1b5

S16-530	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2	>2

【図 14D-2】

【図 1 4 E - 1】

圖 14D-1(b5)

S16-530	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32

【図 1 4 E - 2】

図 14E-1から

化合物 番号	R4	R7	R8	MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
S17-6	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32
S19-1A	1	4	16	0.125	16	32	32	16	16	32
S19-1B	32	>32	4	>32	>32	>32	>32	>32	>32	>32
S19-2A	4	2	0.5	0.125	0.5	16	32	2	>32	>32
S19-2B	16	16	8	16	16	32	>32	>32	>32	>32
S19-3	0.0625	2	1	2	0.5	0.0625	32	<0.0156	2	0.5
S19-4										
S19-5										
S19-6										
S19-7	0.5	2	4	4	8	32	1	>32	>32	1
シタロピリン	0.0625	8	0.0312	32	8	0.5	16	0.125	32	>32
シタロピリン	0.0625	0.125	0.0625	0.0312	0.0312	0.5	0.0312	1	4	16

図 14E-2

【図 1 5 A】

化合物 番号	R4 R7 R8			IC ₅₀ (μM)					
				液性腫瘍					
S8-7-2				4.2					
S8-7-4				2.1					
K1				0.23		1.96			
K2				0.60		2.70			
K3				1.3		13.75			
S15-6-1				1.6					
S15-6-4				5.5					
S15-6-6				3.8					
S15-6-2				1.9					
S15-6-7				4.2					
S15-6-8				4.0					
S15-6-5				3.8					
S15-6-3				2.0					
S15-6-9				15					

図 15A

【図 1 5 B】

化合物 番号	R4 R7 R8			IC ₅₀ (μM)					
				液性腫瘍					
S15-6-10				8.0					
S2-9-6				1.6					
K2-9-5				0.11	0.14	0.38	0.24		
K4				0.07	0.11	0.5	0.21	0.13	0.15
S1-7-3				>5					
S1-7-1				0.09	0.23	0.83	0.92	0.25	0.20
S1-7-2				3.5					
S1-6-2				3.1					
S2-9-3				0.12	0.29	0.57	0.48		
S2-9-1				3.2					
S2-9-9				0.88					
S2-9-16				20					
S2-9-7				0.10	0.24	0.28	0.6		
S2-9-10				0.47					

図 15B

【図 1 5 C】

化合物 番号	R4 R7 R8			IC ₅₀ (μM)					
				液性腫瘍					
S2-9-8				0.04	0.09	0.28	0.2	0.11	0.07
S2-9-13				0.10	0.15	0.48	0.31		
S2-9-14				0.11	0.14	0.09	0.31		
S2-9-11				0.13	0.17	0.27	0.38		
S2-9-15				0.07	0.16	0.44	0.30		
S2-9-18				0.09	0.17	0.55	1.4		
S2-9-19				0.13	0.18	0.39	0.60		
S2-9-20				0.76					
S2-9-21				0.14	0.34	0.51	0.38		
S2-9-2				0.10	0.19	0.35	0.22		
S2-9-12				0.10	0.08	0.29	0.19	0.12	0.01
S2-9-17				0.06	0.09	0.39	0.21		
S2-9-22				0.07	0.11	0.34	0.12	0.07	0.06
S2-9-28				0.07	0.11	0.32	0.30		

図 15C

10

20

30

40

50

【図 15 D】

化合物 番号	R ⁷ R ⁸			IC ₅₀ (μM)						
	R ⁷ R ⁸			液性腫瘍						
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
S2-9-29				2.8						
S2-9-23				0.11	0.15	0.29	0.15	0.24	0.15	0.15
S2-9-24				3.7						
S2-9-25				1.9						
S2-9-26				0.14	0.33	0.55	0.62			
S2-9-4				0.25						
S2-9-27				0.95						
S1-5-9				0.17	0.19	0.48	0.26			
K5				0.15	0.18	0.54	0.68			
S1-6-1				0.91						
S1-5-1				2.2						
S1-5-2				0.10	0.19	0.28	0.23			
S1-5-8				0.44						
K6				6.5						

図 15D

【図 15 E】

化合物 番号	R ⁷ R ⁸			IC ₅₀ (μM)						
	R ⁷ R ⁸			液性腫瘍						
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
K7				0.55		5.45				
S1-5-4				7.2						
S1-5-6				2.5						
S1-5-5				0.93						
S1-5-3				3.6						
S1-5-7				>20						
S1-5-14				2.6						
S1-5-15				4.6						
S1-5-18				7						
S1-5-17				0.28						
S1-5-16				2.9						
S1-5-10				18						
S1-5-12				1.2						
S1-5-11				15						

図 15E

【図 15 F】

化合物 番号	R ⁷ R ⁸			IC ₅₀ (μM)						
	R ⁷ R ⁸			液性腫瘍						
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
S1-5-13				>5						
S4-7-1				3.0						
S4-7-3				0.05	0.21	0.87	0.72			
S4-7-4				0.09	0.16	0.46	0.55	0.17	0.12	0.14
S4-7-5				0.04	0.35	0.72	1.1			
S4-7-6				0.05	0.19	0.56	0.83			
S4-7-2				0.04	0.12	0.77	0.51			
S3-7-1				0.10	0.28	0.9				
S3-7-2				0.90						
K8				3.2		15.68				
S9-5-1				0.22		0.87				
S9-5-2				0.23		3.00				
K9				1.6		12.64				
S9-5-3						7.23				

図 15F

【図 15 G】

化合物 番号	R ⁷ R ⁸			IC ₅₀ (μM)						
	R ⁷ R ⁸			液性腫瘍						
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
S9-5-4						9.36				
S10-5-1				0.21		1.33				
S10-5-2				0.09	0.22	0.44	0.29			
K10				0.40		3.69				
S10-5-3						2.69				
S10-5-4						3.34				
S8-7-1				1.4						
S8-7-7				1.0						
S8-7-5				0.52						
S8-7-8				0.93						
S8-7-9				0.86						
S8-7-3				1.1						
S8-7-6				1.2						
S8-7-10				20						

図 15G

10

20

30

40

50

【図 15 H】

化合物 番号	R ⁴ R ⁷ R ⁸			IC ₅₀ (μM)						
				液性腫瘍						
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
S8-7-11				15						
S7-6-1				1.0						
S7-6-2				1.8						
S7-6-6				0.45						
S7-6-4				0.15						
K11				0.30	0.45					
K12				0.4						
K13				0.45	0.92					
K14				0.40	0.64					
K15				0.58	0.87					
K16				0.27	0.40					
K17				1.6	12.28					
K18				0.39	0.84					
K19				0.39	0.75					

図 15H

【図 15 I】

化合物 番号	R ⁴ R ⁷ R ⁸			IC ₅₀ (μM)						
				液性腫瘍						
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
S7-6-7				0.34						
S7-6-8				0.28						
S7-6-3				0.25						
S7-6-5				0.40						
S7-6-9				>10						
S7-6-10				>10						
K20				0.43	0.55					
K21				0.38	0.51					
S6-6-1				1.7						
S6-6-2				1.2						
S6-6-6				0.96						
S6-6-7				0.97						
S6-6-3				1.8						
S6-6-8				0.90						

図 15I

【図 15 J】

化合物 番号	R ⁴ R ⁷ R ⁸			IC ₅₀ (μM)						
				液性腫瘍						
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
S6-6-5				0.91						
S6-6-4				0.31						
S6-6-9				>20						
S6-6-10				25						
K22				3.6						
S11-4-1				2.8						
S11-4-2				4.9						
K23				1.6	19.18					
K24				0.24	1.66					
S11-5-1				0.62						
S11-5-2				0.57						
K25				0.25	3.02					
K26				0.22	1.16					
K27				0.56	6.89					

図 15J

【図 15 K】

化合物 番号	R ⁴ R ⁷ R ⁸			IC ₅₀ (μM)						
				液性腫瘍						
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
K28				0.41	2.63					
S12-2-1				1.1	2.05					
S12-2-2					4.18					
S12-2-3					3.47					
S12-2-4				0.96						
K29				0.50	2.05					
S14-6-1				1.0						
S14-6-3				2.1						
S14-6-5				1.1						
S14-6-2				1.1						
K30				2.0	2.71					
S14-6-6				2.0						
S14-6-4				2.7						
S14-6-7				1.7						

図 15K

10

20

30

40

50

【図 15 L】


化合物 番号				IC ₅₀ (μM)							
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	液性腫瘍							
				MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01	
S14-6-8		F	H	21							
S14-6-9		F	H	19							
S21-6-1		F		0.34							
S21-6-3		F		2.8							
S21-6-4		F		0.8							
S21-6-2		F		0.26							
S21-6-5		F		0.4							
S21-6-6		F		0.39							
S21-6-7		F		4.0							
S21-6-8		F		16							
K31		F		0.32		0.94					
K32		F		0.78							
K33		F		0.50		0.71					
K34		F		2.1		26.26					

図 15L

【図 15 M】


化合物 番号				IC ₅₀ (μM)							
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	液性腫瘍							
				MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01	
K35		F		0.65		0.57					
K36		F		0.52		0.87					
K37		F		0.19		0.90					
K38		F		0.38		1.36					
K39		F		1.2		6.58					
K40		F		0.57		1.54					
K41		F		6.0		9.92					
K42		F		0.51		2.33					
サンサイクリン		H	H	不活性		4.94					
ミノサイクリン		H	H	6.44		30.88					

図 15M

【図 16 A】


化合物 番号				IC ₅₀ (μM)							
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	X	液性腫瘍細胞株						
					MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
S16-5		F	H	CH	2.3						
S17-3		F		CH	3.3						
S16-6-1		F		CH	0.63						
S16-6-2		F		CH	0.45						
S16-6-31		F		CH	6.8						
S16-6-32		F		CH	>20						
S16-6-33		F		CH	1.1	1.9	>10				
S16-6-34		F		CH	>20						
S16-6-35		F		CH	2.2						
S16-6-3		F		CH	0.26						
S16-6-4		F		CH	0.28						
S16-6-5		F		CH	0.12	0.33	2.5	2.5			
S16-6-15		F		CH	0.26						
S16-6-13		F		CH	0.22						

図 16A

【図 16 B】


化合物 番号				IC ₅₀ (μM)							
	R ⁴	R ⁷	R ⁸	X	液性腫瘍細胞株						
					MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01
S16-6-14		F		CH	0.22						
S16-6-16		F		CH	0.55						
S16-6-17		F		CH	0.45						
S16-6-27		F		CH	0.32						
S16-6-26		F		CH	0.45						
S16-6-23		F		CH	1.0						
S16-6-24		F		CH	0.27						
S16-6-25		F		CH	0.22						
S16-6-30		F		CH	>20						
S16-6-6		F		CH	0.07	0.20	0.68	2.4	0.17	0.24	0.22
S16-6-7		F		CH	4.2						
S16-6-8		F		CH	0.12	0.28	1.9	1.3			
S16-6-9		F		CH	4.1						
S16-6-10		F		CH	0.16						

図 16B

10

20

30

40

50

【図 1 6 C】

化合物 番号					IC50 (μM)							
	R4	R7	R9	X	液性腫瘍細胞株							
					MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01	
S16-6-36				CH								
S16-6-37												
S16-6-38				CH	0.07	0.23	0.89	1.2	0.28	0.14	0.16	
S16-6-11				CH	0.05	0.11	0.70	0.80	0.15	0.17	0.28	
S16-6-12				CH	0.21							
S16-6-18				CH	0.08	0.21	1.0	0.75	0.20	0.41	0.39	
K43				CH	0.10	0.13	0.54	0.53	0.10	0.15	0.25	
S16-6-39				CH	>10							
S17-5				CH	6.0							
S17-6				CH	>20							
S16-6-29				CH	3.9							
S16-6-19				CH	0.04	0.13	0.95	1.6	0.28	0.40	0.52	
S16-6-28				CH	>20							
S16-6-20				CH	0.13	0.48	1.5					

図 16C

【図 1 6 D】

化合物 番号					IC50 (μM)							
	R4	R7	R9	X	液性腫瘍細胞株							
					MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01	
S16-6-21				CH	0.47							
S16-6-22				CH	3.1							
S20-6-1				CH	0.21	0.48	1.4	0.94	0.32	0.31	0.80	
K44				CH	0.26	1.44						
S20-6-4				CH	0.14							
S20-6-2				CH	0.55							
S20-6-3				CH	8.9							
S20-6-5				CH	0.93							
S20-6-7				CH	>25							
S20-6-16				CH	3.4							
S20-6-8				CH	>25							
S20-6-14				CH	1.9							
S20-6-6				CH	7.4							
S20-6-15				CH	0.59							

図 16D

【図 1 6 E】

化合物 番号					IC50 (μM)							
	R4	R7	R9	X	液性腫瘍細胞株							
					MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01	
S20-6-11				CH	>5							
S20-6-12				CH	>20							
S20-6-13				CH	>20							
S20-6-9				CH	≥20							
S20-6-10				CH	>5							
S19-4				N	>5							
K45				N			>40					
K46				N			2.88					
K47				CH	0.91		5.81					
K48				CH	不活性		16.83					
K49				CH	0.51		1.71					
K50				CH	8.9		37.24					
K51				CH	不活性		>40					
K52				CH	0.55		1.06					

図 16E

【図 1 6 F】

化合物 番号					IC50 (μM)							
	R4	R7	R9	X	液性腫瘍細胞株							
					MV4-11	MOLT-4	THP-1	K-562	KG-1	KU812	MEG-01	
K53				CH	不活性		>40					
K54				CH	不活性		>40					
K55				CH	1.1		1.11					
K56				CH	8.3		4.01					
K57				CH	0.84		1.00					
K58				CH	0.34		3.04					
K59				CH	不活性		>40					
K60				CH	不活性		>40					
K61				CH	3.5		10.71					
K62				CH	1.3		0.75					
K63				CH	1.2		0.67					
K64				CH	0.40		0.83					
K65				CH	不活性		4.09					
チガサイリン				CH	1.7	2.3	6.5	3.2	2.7			

図 16F

【図 1 7 A】


化合物 番号				IC ₅₀ (μM)	
	R ⁴	R ⁷	E	MV4-11	THP-1
S5-9-1A				11	
S5-9-1B				7.3	
S5-9-2A				7.0	
S5-9-2B				3.6	
S5-9-3A				11	
S5-9-3B				5.5	
S5-9-4A				8.1	
S5-9-4B				2.4	
S5-9-5A				0.94	

図17A

【図 1 7 B】


化合物 番号				IC ₅₀ (μM)	
	R ⁴	R ⁷	E	MV4-11	THP-1
S5-9-5B				0.40	
S5-9-10A				1.0	
S5-9-10B				0.90	
S5-9-9A				2.3	
S5-9-9B				7.9	
S5-9-11A				2.8	
S5-9-11B				1.7	
S5-9-8B				6.9	
S5-9-6A				2.4	

図17B

【図 1 7 C】


化合物 番号				IC ₅₀ (μM)	
	R ⁴	R ⁷	E	MV4-11	THP-1
S5-9-6B				1.4	
S5-9-12A				6.5	
S5-9-12B				3.4	
S5-9-13A				7.2	
S5-9-13B				2.2	
S5-9-7				4.4	
S13-9-1A				2.8	
S13-9-1B				18	
S13-9-2A				5.0	

図17C

【図 1 7 D】


化合物 番号				IC ₅₀ (μM)	
	R ⁴	R ⁷	E	MV4-11	THP-1
S13-9-2B				3.0	
S18-3-1				>40	
S18-3-2				2.4	

図17D

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)国際特許分類

A 6 1 K 31/704 (2006.01)

F I

A 6 1 K 31/704

(33)優先権主張国・地域又は機関

米国(US)

アメリカ合衆国 マサチューセッツ 0 1 7 4 1 - 1 8 3 9 カーライル, サフォーク レーン 3 2

(72)発明者 ハント, ダイアナ, ケイ.

アメリカ合衆国 マサチューセッツ 0 2 1 3 9 ケンブリッジ, ナンバー 2, パール ストリート
2 5 2

(72)発明者 スン, ツイシアン

アメリカ合衆国 マサチューセッツ 0 2 4 7 4 アーリントン, ワシントン ストリート 3 3 3

(72)発明者 チャオ, ペン

アメリカ合衆国 ニュージャージー 0 8 8 2 3 フランクリン パーク, グレゴリー レーン 5 5

審査官 福山 則明

(56)参考文献 特表 2 0 1 5 - 5 2 8 4 6 8 (J P, A)

国際公開第 2 0 1 2 / 0 2 1 7 1 2 (W O, A 1)

Org. Process Res. Dev., 2015年12月28日, 2016, Vol. 20, pp. 284-296

(58)調査した分野 (Int.Cl., D B名)

A 6 1 K 3 1 / 0 0 - 3 1 / 8 0

C a p l u s / R E G I S T R Y (S T N)