(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104826038 A
(43)申请公布日 2015.08.12

(21)申请号 201510182188.0

(22)申请日 2015.04.16

(71)申请人 李殿国
地址 250033 山东省济南市北园大街247号山东大学第二医院

(72)发明人 李殿国

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
A61K 36/9068(2006.01)
A61P 1/14(2006.01)
A61K 35/57(2015.01)
A61K 35/64(2015.01)
A61K 35/644(2015.01)

权利要求书1页 说明书6页

(54)发明名称

一种小儿消食糖浆及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种小儿消食糖浆，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴20-30份、莱菔子14-30份、鸡内金20-30份、砂仁10-30份、蚕蛹4-18份、大枣6-20份、莲子10-30份、百合8-20份、黄精6-22份、山楂5-25份、苦瓜3-15份、生姜5-15份、牛奶20-40份、山药2-20份、大麦3-21份、玫瑰花4-20份、炒牵牛子2-18份、油桐根4-20份、粟芽8-26份、甘草5-25份、蜂蜜20-40份。本发明结合儿童的体质特点以及多年临床应用经验选药组方，并采用现代制剂技术研制而成；糖浆易入口，儿童容易接受，克服了儿童惧怕口服药物不良口感与打针注射疼痛的用药特点，使儿童依从性提高，给药剂量准确；以“调和脾胃、扶助运化”为治疗准则，对小儿厌食症的治疗有效率高。

CN 104826038 A

1. 一种小儿消食糖浆，其特征在于，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 20-30 份、莱菔子 14-30 份、鸡内金 20-30 份、砂仁 10-30 份、蚕蛹 4-18 份、大枣 6-20 份、莲子 10-30 份、百合 8-20 份、黄精 6-22 份、山楂 5-25 份、苦瓜 3-15 份、生姜 5-15 份、牛奶 20-40 份、山药 2-20 份、大麦 3-21 份、玫瑰花 4-20 份、炒牵牛子 2-18 份、油桐根 4-20 份、粟芽 8-26 份、甘草 5-25 份、蜂蜜 20-40 份。

2. 如权利要求 1 所述的一种小儿消食糖浆，其特征在于，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 22-28 份、莱菔子 18-26 份、鸡内金 22-28 份、砂仁 15-25 份、蚕蛹 8-14 份、大枣 10-16 份、莲子 15-25 份、百合 12-16 份、黄精 10-18 份、山楂 10-20 份、苦瓜 6-12 份、生姜 8-12 份、牛奶 25-35 份、山药 7-15 份、大麦 8-16 份、玫瑰花 8-16 份、炒牵牛子 6-14 份、油桐根 8-16 份、粟芽 13-21 份、甘草 10-20 份、蜂蜜 25-35 份。

3. 如权利要求 1 所述的一种小儿消食糖浆，其特征在于，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 25 份、莱菔子 22 份、鸡内金 25 份、砂仁 20 份、蚕蛹 11 份、大枣 13 份、莲子 20 份、百合 14 份、黄精 14 份、山楂 15 份、苦瓜 9 份、生姜 10 份、牛奶 30 份、山药 11 份、大麦 12 份、玫瑰花 12 份、炒牵牛子 10 份、油桐根 12 份、粟芽 17 份、甘草 15 份、蜂蜜 30 份。

4. 一种制备如权利要求 1-3 任意一项所述的小儿消食糖浆的制备方法，其特征在于，所述制备方法具体步骤如下：取方中厚朴、莱菔子、鸡内金、砂仁、蚕蛹、大枣、莲子、百合、黄精、山楂、苦瓜、生姜、大麦、玫瑰花、炒牵牛子、油桐根、粟芽、甘草研磨粉碎，用质量分数为 95％的乙醇回流提取 2 次，第一次加 8-10 倍量乙醇，回流提取 2-3 小时，过滤，药渣第二次加 6-8 倍量乙醇，回流提取 1-2 小时，过滤，合并滤液，减压回收乙醇至无醇味，滤过，将滤液减压浓缩至密度为 1.20-1.25 的稠膏，将山药进行榨汁，过滤得到山药汁，将占小儿消食糖浆总量 10-20％的甜菊糖苷溶于牛奶、蜂蜜、山药汁，然后与稠膏混合均匀，并进行均质，进行灌装，10mL/ 支，高温灭菌，即得所述的小儿消食糖浆。

一种小儿消食糖浆及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药领域，具体涉及一种治疗小儿厌食症的小儿消食糖浆及其制备方法。

背景技术

[0002] 小儿厌食症是指小儿较长时间食欲减退或食欲缺乏等症状。小儿厌食症又称消化功能紊乱，在小儿时期很常见，主要的症状有呕吐、食欲不振、腹泻、便秘、腹胀、腹痛和便血等。目前导致小儿厌食症的主要原因是喂养不当，在城市这种现象尤为明显。主要是因为家庭经济改善、市场儿童食品供应增多，独生子女娇生惯养，家长缺乏科学的喂养知识，乱吃零食，过食冷饮，乱给“营养食品”以及一些高蛋白、高糖食品如巧克力等，反使食欲下降。

[0003] 小儿厌食多导致脾胃虚弱，加上小儿乳食不能自节，若调护稍不适宜，就很容易损伤脾胃。脾胃是人体的“后天之本”，人体的五脏六腑、四肢百骸都要依靠脾胃才能获得营养，人体一旦缺乏营养来源，则会导致免疫力低下，容易生病，同时，其他脏腑的疾患，也常常影响脾胃，使其功能失常。

[0004] 小儿厌食发病无明显季节性，但夏季暑湿当令，可使症状加重，病程长者，可出现形体偏瘦，面色少华等症状，对患儿有不良影响，故应早期诊断，及时治疗。对于小儿厌食症的治疗，在临床上主要采用口服给药制剂，如片剂、微丸、颗粒剂、散剂、口服液与汤剂为主。由于药物的不良口感与气味，儿童对于口服给药制剂的依从性较差，特别是小儿喂药难，服药后易于引起呕吐而使给药剂量难以保证，往往影响疗效。

发明内容

[0005] 本发明的目的是针对现有技术的不足，提供一种治疗效果好、有效率高、对人体无毒副作用、易服用的小儿消食糖浆。

[0006] 本发明解决上述问题所采用的技术方案是：

[0007] 一种小儿消食糖浆，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 20-30 份、莱菔子 14-30 份、鸡内金 20-30 份、砂仁 10-30 份、蚕蛹 4-18 份、大枣 6-20 份、莲子 10-30 份、百合 8-20 份、黄精 6-22 份、山楂 5-25 份、苦瓜 3-15 份、生姜 5-15 份、牛奶 20-40 份、山药 2-20 份、大麦 3-21 份、玫瑰花 4-20 份、炒牵牛子 2-18 份、油桐根 4-20 份、粟芽 8-26 份、甘草 5-25 份、蜂蜜 20-40 份。

[0008] 进一步，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 22-28 份、莱菔子 18-26 份、鸡内金 22-28 份、砂仁 15-25 份、蚕蛹 8-14 份、大枣 10-16 份、莲子 15-25 份、百合 12-16 份、黄精 10-18 份、山楂 10-20 份、苦瓜 6-12 份、生姜 8-12 份、牛奶 25-35 份、山药 7-15 份、大麦 8-16 份、玫瑰花 8-16 份、炒牵牛子 6-14 份、油桐根 8-16 份、粟芽 13-21 份、甘草 10-20 份、蜂蜜 25-35 份。

[0009] 进一步，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 25 份、莱菔子 22 份、鸡内金 25 份、砂仁 20 份、蚕蛹 11 份、大枣 13 份、莲子 20 份、百合 14 份、黄精 14 份、山

楂 15 份、苦瓜 9 份、生姜 10 份、牛奶 30 份、山药 11 份、大麦 12 份、玫瑰花 12 份、炒牵牛子 10 份、油桐根 12 份、粟芽 17 份、甘草 15 份、蜂蜜 30 份。

[0010] 药理作用：

[0011] 厚朴：味苦、辛，性温。归脾、胃、肺、大肠经。燥湿消痰，下气除满。用于湿滞伤中，脘痞吐泻，食积气滞，腹胀便秘，痰饮喘咳。

[0012] 莱菔子：性平，味辛、甘。归肺、脾、胃经。消食除胀，降气化痰。主治食积气滞，脘腹胀满，嗳气，下痢后重，咳嗽痰多，喘促胸满。

[0013] 鸡内金：甘，平。归脾、胃、小肠、膀胱经。消食健胃助消化，涩精止遗。可以促进胃液分泌，提高胃酸度及消化力，使胃运动功能明显增强，胃排空加快。涩精止遗。适宜消化不良、面色萎黄、不思纳谷、小儿疳积、形体消瘦、腹大腹胀、脾胃虚弱、食积胀满、肠结核、骨结核等病症患者食用。

[0014] 砂仁：味辛，性湿。归脾、胃、肾经。有化湿开胃，温脾止泻，理气安胎的功效。用于湿浊中阻，脘痞不饥，脾胃虚寒，呕吐泄泻，妊娠恶阻，胎动不安。

[0015] 蚕蛹：甘、辛、咸，微温。归脾、胃、肝、肾经。生津止渴，消食理气。用于消渴，消瘦，小儿疳积。

[0016] 大枣：甘、温。归脾、胃经。补中益气，养血安神。用于脾虚食少，乏力便溏，妇人脏躁。中医常用红枣养胃健脾。如在处方中遇有药力较猛或有刺激性药物时，常配用红枣，以保护脾胃，红枣中含有糖类、蛋白质、脂肪、有机酸，对大脑有补益作用。用红枣与面粉制成枣糕，能养胃补脑。

[0017] 莲子：鲜者甘、涩、平，无毒；干者甘、温涩、无毒。入脾、肾、心经。清心醒脾，补脾止泻，养心安神明目、补中养神，健脾补胃，止泻固精，益肾涩精止带。滋补元气。主治心烦失眠，脾虚久泻，大便溏泄，久痢，腰疼，男子遗精，妇人赤白带下。还可预防早产、流产、孕妇腰酸。

[0018] 百合：甘微苦，平。入心、肺经。润肺止咳，清心安神。治肺费久嗽，咳唾痰血；热病后余热来清，虚烦惊悸，神志恍惚；脚气浮肿。

[0019] 黄精：甘、平。归脾、肺、肾经。补气养阴，健脾，润肺，益肾。《湖南农村常用中草药手册》中记治脾胃虚弱，体倦无力。

[0020] 山楂：酸甘，微温。入脾、胃、肝经。消食积，散瘀血，驱绦虫。治肉积，症瘕，痰饮，痞满，吞酸，泻痢，肠风，腰痛，疝气产后儿枕痛，恶露不尽，小儿乳食停滞。消食健胃，行气散瘀。用于肉食积滞、胃烷胀满、泻痢腹痛、瘀血经闭、产后瘀阻、心腹刺痛、疝气疼痛、高血脂症。

[0021] 苦瓜：味苦、无毒、性寒。入心、肝、脾、肺经。具有清热祛暑、明目解毒、降压降糖、利尿凉血、解劳清心、益气壮阳之功效。具有清凉解渴、清热解毒、清心明目、益气解乏、益肾利尿的作用。

[0022] 生姜：味辛，性微温。归肺、脾、胃经。解表散寒，温中止呕，温肺止咳，解毒。风寒感冒，脾胃寒症，胃寒呕吐，肺寒咳嗽，解鱼蟹毒。

[0023] 牛奶：味甘，性平、微寒，入心、肺、胃经。具有补虚损，益肺胃，生津润肠之功效。用于久病体虚、气血不足、营养不良、噎膈反胃、胃及十二指肠溃疡、消渴、便秘。牛奶含有丰富的矿物质、钙、磷、铁、锌、铜、锰、钼。最难得的是，牛奶是人体钙的最佳来源，而且钙磷比例

非常适当，利于钙的吸收。

[0024] 山药：甘、平、无毒。归脾、肺、肾经。补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少，泄泻便溏，白带过多。

[0025] 大麦：甘咸，凉。入脾、胃二经。和胃，宽肠，利水。治食滞泄泻，小便淋痛，水肿，汤火伤。用于脾胃虚弱，食积饱满、涨闷；烦热口渴；小便不利。

[0026] 玫瑰花：味甘微苦、性微温。归肝、脾、胃经。《本草正文》中道："玫瑰花，清而不浊，和而不猛，柔肝醒胃，疏气活血，宣通窒滞而绝无辛温刚燥之弊，断推气分药之中，最有捷效而最驯良，芳香诸品，殆无其匹。"

[0027] 炒牵牛子：性寒，味苦；有毒。归肺经、肾经、大肠经。主治泻水通便，消痰涤饮，杀虫攻积。用于水肿胀满，二便不通，痰饮积聚，气逆喘咳，虫积腹痛，蛔虫、绦虫病。

[0028] 油桐根：辛，寒，有毒。治食积痞满，水肿，臌胀，哮喘，瘰疬，蛔虫病。《四川中药志》："治食积饱胀，胸前痞满及湿气水肿。"《贵州草药》："清热解毒，利水，通便，止血，消积。"

[0029] 粟芽：味苦，无毒。入脾、胃二经。健脾，消食，治食积胀满，不思饮食。治食滞胀满，食欲不佳。

[0030] 甘草：甘，平。入脾、胃、肺经。益气补中；缓急止痛；润肺止咳；泻火解毒；调和诸药。主倦怠食少；肌瘦面黄；心悸气短；腹痛便溏；四肢挛急疼痛；脏躁；咳嗽气喘；咽喉肿痛；痈疮肿痛；小儿胎毒；及药物、食物中毒（摘录《中华草本》）。

[0031] 蜂蜜：蜂蜜可以促使胃酸正常分泌，还有增强肠蠕动的作用，能显著缩短排便时间。《纲目》记载：和营卫、润脏腑，通三焦，调脾胃。

[0032] 本发明还提供一种小儿消食糖浆的制备方法，所述制备方法具体步骤如下：取方中厚朴、莱菔子、鸡内金、砂仁、蚕蛹、大枣、莲子、百合、黄精、山楂、苦瓜、生姜、大麦、玫瑰花、炒牵牛子、油桐根、粟芽、甘草研磨粉碎，用质量分数为95％的乙醇回流提取2次，第一次加8-10倍量乙醇，回流提取2-3小时，过滤，药渣第二次加6-8倍量乙醇，回流提取1-2小时，过滤，合并滤液，减压回收乙醇至无醇味，滤过，将滤液减压浓缩至密度为1.20-1.25的稠膏，将山药进行榨汁，过滤得到山药汁，将占小儿消食糖浆总量10-20％的甜菊糖苷溶于牛奶、蜂蜜、山药汁，然后与稠膏混合均匀，并进行均质，进行灌装，10mL/支，高温灭菌，即得所述的小儿消食糖浆。

[0033] 对小儿厌食症的治疗原则，重在调和脾胃、扶助运化。方中莱菔子消食除胀，降气化痰，鸡内金消食健胃助消化、涩精止遗，砂仁有有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效，油桐根治食积痞满、水肿、臌胀、哮喘、瘰疬、蛔虫病，粟芽健脾消食，治食积胀满、不思饮食，五者合用达到温脾健胃、助消化之功效，共为君药；厚朴燥湿消痰、下气除满，蚕蛹生津止渴、消食理气，莲子清心醒脾、补脾止泻、健脾补胃，炒牵牛子主治泻水通便、消痰涤饮、杀虫攻积，以上诸药在消食理气的基础上补脾止泻，是为臣药；黄精补气养阴，健脾润肺益肾，山楂消食积，散瘀血，驱绦虫，苦瓜清凉解渴、清热解毒，山药补脾养胃、生津益肺、补肾涩精，大麦治食滞泄泻、小便淋痛、水肿、汤火伤，此五味药起到健脾润肺、消积生津的作用，为佐药；大枣补中益气、养血安神，生姜解表散寒，温中止呕，温肺止咳，牛奶具有补虚损、益肺胃、生津润肠之功效，是为使药；更有玫瑰花清而不浊、和而不猛、柔肝醒胃、疏气活血，蜂蜜和营卫、润脏腑、通三焦、调脾胃，甘草益气补中、缓急止痛、润肺止咳、泻火解毒、调和诸药。

诸药共奏健脾利湿、消积理气、宣肺调中之功效，达到治疗小儿厌食的目的。

[0034] 本发明的有益效果是：

[0035] (1) 本发明结合儿童的体质特点以及多年临床应用经验选药组方，并采用现代制剂技术研制而成的中草药糖浆；

[0036] (2) 糖浆易入口，儿童容易接受，克服了儿童惧怕口服药物不良口感与打针注射疼痛的用药特点，使儿童依从性提高，给药剂量准确；

[0037] (3) 以“调和脾胃、扶助运化”为治疗准则，对小儿厌食症的治疗有效率高。

[0038] 下面结合临床实验数据进一步说明本发明的有益效果。

[0039] (1) 临床资料

[0040] 在某医院招募 236 例患小儿厌食症的 2-6 岁的儿童使用本发明药品进行治疗。

[0041] (2) 诊断标准

[0042] 主要临床表现有呕吐、食欲不振、腹泻、便秘、腹胀、腹痛和便血等。

[0043] (3) 治疗方法

[0044] 口服，一日三次，每次 10mL/ 支，饭前服用，15 天一个疗程。

[0045] (4) 疗效评定标准

[0046] 治愈：无呕吐、腹胀现象，体重增加，食欲增加，其余胃肠不适的症状完全消失。

[0047] 显效：呕吐得到明显控制，腹满明显缓解，体重增加，食欲增加，其余胃肠不适的症状消失。

[0048] 好转：呕吐次数减少或间歇时间延长，腹满有所缓解，体重停止减轻，食欲有所改善，其余胃肠不适的症状部分症状消失。

[0049] 无效：症状无改善或加重。

[0050] (5) 治疗结果

[0051] 236 例患者中，191 例治愈，治愈率为 80.93％；29 例显效，显效率为 12.29％；16 例有效，有效率为 6.78％；总有效率为 100％。

[0052] (6) 典型病例

[0053] 病例 1：患儿唐某某，女，4 岁，食欲不振持续半年多，近来厌食、拒食，腹胀腹痛明显，形体消瘦，面色暗黄，神情不稳定，大便澹或夹食物残渣，舌淡、边有花剥苔，脉细弱。服用本发明中药一个疗程后，患儿主动觅食，继续服用一个疗程，患儿食量已于同龄人相同，后坚持服用一个疗程，患儿体重增加，体重增加，随访 1 年，患儿很少生病。

[0054] 病例 2：患儿邓某，男，3.5 岁，食欲不振、脘腹胀满、恶心、烦躁不安、大便干结，查苔厚腻，诊为食滞型厌食，服用本发明药物治疗两个疗程后，患儿食欲增加，主动觅食，后坚持服用一个疗程，患儿面色红润。随访半年无复发，患儿无任何不良反应，精神饱满。

具体实施方式

[0055] 下面将结合本发明的实施例，对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0056] 实施例 1

[0057] 一种小儿消食糖浆，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 20 份、莱菔子 14 份、鸡内金 20 份、砂仁 10 份、蚕蛹 4 份、大枣 6 份、莲子 10 份、百合 8 份、黄精 6 份、山楂 5 份、苦瓜 3 份、生姜 5 份、牛奶 20 份、山药 2 份、大麦 3 份、玫瑰花 4 份、炒牵牛子

2 份、油桐根 4 份、粟芽 8 份、甘草 5 份、蜂蜜 20 份。

[0058] 所述小儿消食糖浆的制备方法具体步骤如下：取方中厚朴、莱菔子、鸡内金、砂仁、蚕蛹、大枣、莲子、百合、黄精、山楂、苦瓜、生姜、大麦、玫瑰花、炒牵牛子、油桐根、粟芽、甘草研磨粉碎，用质量分数为 95％的乙醇回流提取 2 次，第一次加 8 倍量乙醇，回流提取 2 小时，过滤，药渣第二次加 6 倍量乙醇，回流提取 1 小时，过滤，合并滤液，减压回收乙醇至无醇味，滤过，将滤液减压浓缩至密度为 1.20 的稠膏，将山药进行榨汁，过滤得到山药汁，将占小儿消食糖浆总量 10％的甜菊糖苷溶于牛奶、蜂蜜、山药汁，然后与稠膏混合均匀，并进行均质，进行灌装，10mL/ 支，高温灭菌，即得所述的小儿消食糖浆。

[0059] 实施例 2

[0060] 一种小儿消食糖浆，其特征在于，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 30 份、莱菔子 30 份、鸡内金 30 份、砂仁 30 份、蚕蛹 18 份、大枣 20 份、莲子 30 份、百合 20 份、黄精 22 份、山楂 25 份、苦瓜 15 份、生姜 15 份、牛奶 40 份、山药 20 份、大麦 21 份、玫瑰花 20 份、炒牵牛子 18 份、油桐根 20 份、粟芽 26 份、甘草 25 份、蜂蜜 40 份。

[0061] 所述小儿消食糖浆的制备方法具体步骤如下：取方中厚朴、莱菔子、鸡内金、砂仁、蚕蛹、大枣、莲子、百合、黄精、山楂、苦瓜、生姜、大麦、玫瑰花、炒牵牛子、油桐根、粟芽、甘草研磨粉碎，用质量分数为 95％的乙醇回流提取 2 次，第一次加 10 倍量乙醇，回流提取 3 小时，过滤，药渣第二次加 8 倍量乙醇，回流提取 2 小时，过滤，合并滤液，减压回收乙醇至无醇味，滤过，将滤液减压浓缩至密度为 1.25 的稠膏，将山药进行榨汁，过滤得到山药汁，将占小儿消食糖浆总量 20％的甜菊糖苷溶于牛奶、蜂蜜、山药汁，然后与稠膏混合均匀，并进行均质，进行灌装，10mL/ 支，高温灭菌，即得所述的小儿消食糖浆。

[0062] 实施例 3

[0063] 一种小儿消食糖浆，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 22 份、莱菔子 18 份、鸡内金 22 份、砂仁 15 份、蚕蛹 8 份、大枣 10 份、莲子 15 份、百合 12 份、黄精 10 份、山楂 10 份、苦瓜 6 份、生姜 8 份、牛奶 25 份、山药 7 份、大麦 8 份、玫瑰花 8 份、炒牵牛子 6 份、油桐根 8 份、粟芽 13 份、甘草 10 份、蜂蜜 25 份。

[0064] 所述小儿消食糖浆的制备方法具体步骤如下：取方中厚朴、莱菔子、鸡内金、砂仁、蚕蛹、大枣、莲子、百合、黄精、山楂、苦瓜、生姜、大麦、玫瑰花、炒牵牛子、油桐根、粟芽、甘草研磨粉碎，用质量分数为 95％的乙醇回流提取 2 次，第一次加 9 倍量乙醇，回流提取 2.5 小时，过滤，药渣第二次加 7 倍量乙醇，回流提取 1.5 小时，过滤，合并滤液，减压回收乙醇至无醇味，滤过，将滤液减压浓缩至密度为 1.22 的稠膏，将山药进行榨汁，过滤得到山药汁，将占小儿消食糖浆总量 15％的甜菊糖苷溶于牛奶、蜂蜜、山药汁，然后与稠膏混合均匀，并进行均质，进行灌装，10mL/ 支，高温灭菌，即得所述的小儿消食糖浆。

[0065] 实施例 4

[0066] 一种小儿消食糖浆，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴 28 份、莱菔子 26 份、鸡内金 28 份、砂仁 25 份、蚕蛹 14 份、大枣 16 份、莲子 25 份、百合 16 份、黄精 18 份、山楂 20 份、苦瓜 12 份、生姜 12 份、牛奶 35 份、山药 15 份、大麦 16 份、玫瑰花 16 份、炒牵牛子 14 份、油桐根 16 份、粟芽 21 份、甘草 20 份、蜂蜜 35 份。

[0067] 所述小儿消食糖浆的制备方法具体步骤如下：取方中厚朴、莱菔子、鸡内金、砂仁、蚕蛹、大枣、莲子、百合、黄精、山楂、苦瓜、生姜、大麦、玫瑰花、炒牵牛子、油桐根、粟芽、甘草

研磨粉碎，用质量分数为95％的乙醇回流提取2次，第一次加10倍量乙醇，回流提取3小时，过滤，药渣第二次加6倍量乙醇，回流提取2小时，过滤，合并滤液，减压回收乙醇至无醇味，滤过，将滤液减压浓缩至密度为1.21的稠膏，将山药进行榨汁，过滤得到山药汁，将占小儿消食糖浆总量18％的甜菊糖苷溶于牛奶、蜂蜜、山药汁，然后与稠膏混合均匀，并进行均质，进行灌装，10mL/支，高温灭菌，即得所述的小儿消食糖浆。

[0068] 实施例5

[0069] 一种小儿消食糖浆，制成该小儿消食糖浆的有效成分及其质量份数为：厚朴25份、莱菔子22份、鸡内金25份、砂仁20份、蚕蛹11份、大枣13份、莲子20份、百合14份、黄精14份、山楂15份、苦瓜9份、生姜10份、牛奶30份、山药11份、大麦12份、玫瑰花12份、炒牵牛子10份、油桐根12份、粟芽17份、甘草15份、蜂蜜30份。

[0070] 所述小儿消食糖浆的制备方法具体步骤如下：取方中厚朴、莱菔子、鸡内金、砂仁、蚕蛹、大枣、莲子、百合、黄精、山楂、苦瓜、生姜、大麦、玫瑰花、炒牵牛子、油桐根、粟芽、甘草研磨粉碎，用质量分数为95％的乙醇回流提取2次，第一次加9倍量乙醇，回流提取2小时，过滤，药渣第二次加7倍量乙醇，回流提取1小时，过滤，合并滤液，减压回收乙醇至无醇味，滤过，将滤液减压浓缩至密度为1.25的稠膏，将山药进行榨汁，过滤得到山药汁，将占小儿消食糖浆总量13％的甜菊糖苷溶于牛奶、蜂蜜、山药汁，然后与稠膏混合均匀，并进行均质，进行灌装，10mL/支，高温灭菌，即得所述的小儿消食糖浆。

[0071] 以上所述是本发明的优选实施方式，其目的在于让熟悉此项技术的人了解本发明内容并加以实施，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。