

(12) Ausschließungspatent

(11) DD 283 400 A5



Erteilt gemäß § 17 Absatz 1 Patentgesetz
der DDR vom 27.10.1983
in Übereinstimmung mit den entsprechenden
Festlegungen im Einigungsvertrag

5(51) C 07 D 211/80
C 07 D 213/04
A 61 K 31/44

DEUTSCHES PATENTAMT

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21) DD C 07 D / 325 090 1
(31) P3801406.8
21317/A88

(22) 17.01.89
(32) 20.01.88
11.07.88

(44) 10.10.90
(33) DE
IT

(71) siehe (73)

(72) Angerbauer, Rolf, Dr. Dipl.-Chem., DE; Fey, Peter, Dr. Dipl.-Chem., DE; Hübsch, Walter, Dr. Dipl.-Chem., DE; Philipps, Thomas, Dr. Dipl.-Chem., BE; Bischoff, Hilmar, Dr. Dipl.-Biol., DE; Petzinna, Dieter, Dr., DE; Schmidt, Delf, Dr. Dipl.-Chem., DE; Thomas, Günter, Dr., DE

(73) Bayer AG, Leverkusen, 5090, DE


(74) Internationales Patentbüro Berlin, Wallstraße 23/24, Berlin, 1020, DD

(54) Verfahren zur Herstellung substituierter Pyridine

(55) neue Verbindungen;

Cholesterin-biosynthesehemmende Wirkung;
HMG-CoA-Reduktaseinhibitoren; Anwendung als
Arzneimittel


(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von substituierten Pyridinen. Erfindungsgemäß werden Verbindungen der Formel (I) hergestellt, worin A, B, D, E und R die in der Beschreibung und in den Ansprüchen angegebene Bedeutung haben. Erfindungsgemäß können die neuen substituierten Pyridine durch Reduktion von Pyridinen, die durch einen Ketonrest substituiert sind, und nachfolgende Verseifung, Cyclisierung oder Hydrierung hergestellt werden. Die erfindungsgemäßen Verbindungen können als Wirkstoffe in Arzneimittel verwendet werden, die geeignet sind für die Behandlung von Hyperlipoproteinämie, Lipoproteinämie oder Arteriosklerose. Formel (I)



(I)

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von substituierten Pyridinen
der Formel



in welcher

5 A - für Heteroaryl steht, das bis zu 3-fach gleich
oder verschieden durch Halogen, Alkyl, Alkoxy,
Alkylthio, Alkylsulfonyl, Aryl, Aryloxy, Aryl-
thio, Arylsulfonyl, Trifluormethyl, Trifluor-
methoxy, Trifluormethylthio, Alkoxycarbonyl oder
10 durch eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$ substituiert
sein kann,

worin

15 R^1, R^2 - gleich oder verschieden sind und
Alkyl, Aryl, Aralkyl, Acyl, Alkyl-
sulfonyl oder Arylsulfonyl bedeuten,

oder

20 - für Aryl steht, das bis zu 5-fach gleich oder
verschieden substituiert sein kann durch Al-
kyl, das gegebenenfalls durch Hydroxy oder
Alkoxy substituiert sein kann, Alkoxy, Alkyl-
thio, Alkylsulfonyl, Aryl, Aryloxy, Arylthio,
25 Arylsulfonyl, Aralkyl, Aralkoxy, Aralkylthio,
Aralkylsulfonyl, Halogen, Cyano, Nitro, Tri-
fluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-
thio, Alkoxycarbonyl, Sulfamoyl, Dialkylsulf-
amoyl, Carbamoyl, Dialkylcarbamoyl oder durch
30 eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,

worin

35 R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,
- für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl steht,
B - für Cycloalkyl steht, oder
- für Alkyl steht, das substituiert sein kann

5

durch Halogen, Cyano, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethylthio, Trifluormethylsulfonyl, Alkoxycarbonyl, Acyl oder durch eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,

10

worin

15

R^1 , R^2 - gleich oder verschieden sind und Alkyl, Aryl, Aralkyl, Acyl, Alkylsulfonyl oder Arylsulfonyl bedeuten,

20

oder durch Carbamoyl, Dialkylcarbamoyl, Sulfamoyl, Dialkylsulfamoyl, Heteroaryl, Aryl, Aryloxy, Arylthio, Arylsulfonyl, Aralkoxy, Aralkylthio oder Aralkylsulfonyl, wobei die Heteroaryl- und Arylreste der letztgenannten Substituenten bis zu 3-fach gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio oder Alkylsulfonyl substituiert sein können,

25

D,E gleich oder verschieden sind und

30

- für Wasserstoff stehen, oder
- für CN oder NO_2 stehen, oder
- für Cycloalkyl stehen, oder
- für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl stehen, das substituiert sein kann durch Azido, Halogen, Hydroxy, Cyano, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Trifluormethyl, Trifluormeth-

35

Le A 25 747

5 oxy, Trifluormethylthio, Trifluormethylsul-
fonyl, Alkoxy-carbonyl, Acyl oder durch eine
Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,

worin

10 R^1 , R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

oder durch Carbamoyl, Dialkylcarbamoyl, Sulf-
amoyl, Dialkylsulfamoyl, Heteroaryl, Aryl,
Aryloxy, Arylthio, Arylsulfonyl, Aralkoxy,
15 Aralkylthio oder Aralkylsulfonyl, wobei die
Heteroaryl- und Arylreste bis zu 3-fach gleich
oder verschieden durch Halogen, Cyano, Tri-
fluormethyl, Trifluormethoxy, Alkyl, Alkoxy,
Alkylthio oder Alkylsulfonyl substituiert sein
20 kann,

oder

25 - für Heteroaryl stehen, die bis zu 3-fach
gleich oder verschieden durch Halogen, Alkyl,
Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Aryl, Aryl-
oxy, Arylthio, Arylsulfonyl, Trifluormethyl,
Trifluormethoxy, Trifluormethylthio, Alkoxy-
carbonyl oder durch eine Gruppe der Formel
30 $-NR^1R^2$ substituiert sein können,

worin

35

Le A 25 747

17 JAN 1957 20 988

100 200 300

6.1.1957

5 R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

oder

10 - für Aryl stehen, das bis zu 5-fach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch Alkyl, das gegebenenfalls durch Hydroxy oder Alkoxy substituiert sein kann, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Aryl, Aryloxy, Arylthio, Arylsulfonyl, Aralkyl, Aralkoxy, Aralkylthio, Aralkylsulfonyl, Halogen, Cyano, Nitro, Tri-
15 fluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethylthio, Alkoxycarbonyl, Sulfamoyl, Dialkylsulfamoyl, Carbamoyl, Dialkylcarbamoyl oder durch eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,
20

worin

25 R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

oder

30 - für eine Gruppe der Formel $-NR^3R^4$, $-COR^5$ oder $-CR^{11}R^{12}-Y$ stehen,

worin

35 R^3 und R^4 gleich oder verschieden sind und

- 5
- Wasserstoff oder
 - Alkyl, Aryl, Aralkyl, oder
 - eine Gruppe der Formel $-COR^6$ oder $-SO_2R^7$ bedeuten, oder
- 10
- R^3 und R^4 gemeinsam eine Alkylidenkette bilden, die durch N, O, S und/oder N-Alkyl, N-Aryl, N-Aryl, N-Carbamoyl oder N-Alkoxy-carbonyl unterbrochen sein kann,
- 15
- R^6 - für Wasserstoff steht, oder
- für eine Gruppe $-NHR^8$ steht, oder
 - für Alkoxy steht, oder
 - für Alkyl, Aryl, Aryloxy, Aralkyl, Aralkoxy oder Heteroaryl steht,
- 20
- wobei die genannten Reste bis zu 3-fach gleich oder verschieden durch Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Halogen, Cyano, Trifluormethyl, Trifluor-methoxy, Trifluormethylthio, Amino,
- 25
- Alkylamino oder Dialkylamino substituiert sein können,
- 30
- R^7 - für Cycloalkyl steht, oder
- für Alkyl steht, das durch Cyano, Halogen, Trifluormethyl, Trifluor-methoxy oder Alkoxy-carbonyl substituiert sein kann, oder
 - für Aryl, Aralkyl oder Heteroaryl
- 35

steht, wobei die genannten Reste bis
zu 3-fach gleich oder verschieden
durch Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Ha-
logen, Cyano, Trifluormethyl, Tri-
fluormethoxy, Trifluormethylthio,
Amino, Alkylamino oder Dialkylamino
substituiert sein können, oder

und

R^8 - für Wasserstoff steht, oder
- für Cycloalkyl steht, oder
- für gegebenenfalls durch Cyano,
Halogen, Trifluormethyl oder
Trifluormethoxy substituiertes Alkyl
steht, oder
- für Aryl, Aralkyl oder Heteroaryl
steht, wobei die genannten Reste bis
zu 3-fach gleich oder verschieden
durch Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Ha-
logen, Cyano, Trifluormethyl, Tri-
fluormethoxy, Trifluormethylthio,
Amino, Alkylamino oder Dialkylamino
substituiert sein können,

R^5 - Wasserstoff, Cycloalkyl, Hydroxy, Alkoxy,
Trimethylsilylalkoxy, Aryloxy, Aralkoxy
bedeutet, oder
- für eine Gruppe der Formel $-NR^9R^{10}$
steht,

Le A 25 747

17.000 11. 10.988

10. 10. 10

worin

5

R^9 und R^{10} gleich oder verschieden sind
und Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder
Aralkyl bedeuten,

10

oder.

15

- ein über ein Stickstoffatom gebundenen,
gegebenenfalls substituierten heterocyc-
lischen Rest der Reihe Pyrrolidin, Pi-
peridin, Morpholin, Thiomorpholin oder
Piperazin bedeutet,

und

20

R^{11} und R^{12} gleich oder verschieden sein
können und

25

- für Wasserstoff, oder
- für Alkyl stehen, das gegebenenfalls
durch Hydroxy, Halogen, Alkoxy oder
Alkoxycarbonyl substituiert sein
kann, oder
- für Cycloalkyl stehen, oder

30

R^{11} und R^{12} gemeinsam einen gesättigten oder
ungesättigten carbocyclischen oder he-
terocyclischen Ring mit bis zu 6 Koh-
lenstoffatomen bilden,

35

Le A 25 747

und

5

Y - eine Gruppe der Formel $-NR^{13}R^{14}$, $-COR^{15}$,
 $-S-R^{16}$, $-SO-R^{16}$, $-SO_2-R^{16}$, $-OR^{17}$ oder
 $-N_3$ bedeutet,

10

workin

R^{13} und R^{14} gleich oder verschieden sind
und

15

- für Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder Aralkyl stehen, wobei die Arylreste durch Halogen, Cyano, Alkyl, Alkoxy oder Trifluormethyl substituiert sein können, oder

20

- für eine Gruppe der Formel $-COR^{15}$,
 $-SO_2R^{16}$ stehen,

25

oder R¹³ und R¹⁴ gemeinsam eine Alkylenkette bilden, die durch N, O, S und/oder N-Alkyl, N-Aryl, N-Aralkyl, N-Carbamoyl oder N-Alkoxycarbonyl unterbrochen sein kann.

30

R¹⁵ - Wasserstoff bedeutet, oder
 - eine Gruppe -NR¹⁸R¹⁹ bedeutet,
 oder
 - Alkyl oder Alkoxy bedeutet, oder
 - Aryl, Aryloxy, Aralkyl, Aralkoxy
 oder Heteroaryl bedeutet, wobei die

35

5
genannten Reste bis zu 3-fach
gleich oder verschieden durch
Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Halogen,
Cyano, Trifluormethyl, Trifluor-
methoxy, Trifluormethylthio, Amino,
10 Alkylamino oder Dialkylamino sub-
stituiert sein können,

R¹⁶ - Cycloalkyl bedeutet, oder
- geradkettiges oder verzweigtes
15 Alkyl bedeutet, das durch Cyano,
Halogen, Trifluormethyl, Trifluor-
methoxy oder Alkoxycarbonyl
substituiert sein kann, oder
- Aryl, Aralkyl oder Heteroaryl
bedeutet,
20 wobei die genannten Reste bis zu
3-fach gleich oder verschieden
durch Alkyl, Alkoxy, Alkylthio,
Halogen, Cyano, Trifluormethyl,
Trifluormethoxy, Trifluormethyl-
25 thio, Amino, Alkylamino oder
Dialkylamino substituiert sein
können, oder
- Trimethylsilyl oder Dimethylethyl-
silyl bedeutet, oder
30 - eine Gruppe -NR⁹R¹⁰ bedeutet,

wobei

35

Le A 25 747

5. R^9 und R^{10} die oben angegebene Bedeutung haben,

10 R^{17} - für Wasserstoff steht, oder
- für Cycloalkyl steht, oder
- für Alkyl steht, das substituiert
sein kann durch Halogen, Cyano,
Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl,
Trifluormethyl, Trifluormethoxy,
Trifluormethylthio, Trifluormethyl-
sulfonyl, Alkoxycarbonyl, Acyl oder
15 durch eine Gruppe der Formel
 $-NR^1R^2$,

worin

20 R^1 , R^2 die oben angegebene Bedeutung
haben,

25 oder durch Carbamoyl, Dialkylcarb-
amoyl, Sulfamoyl, Dialkylsulfamoyl,
Heteroaryl, Aryl, Aryloxy, Arylthio,
Arylsulfonyl, Aralkoxy, Aralkylthio
oder Aralkylsulfonyl, wobei die He-
teroaryl- und Arylreste bis zu 3-
fach gleich oder verschieden durch
30 Halogen, Cyano, Trifluormethyl, Tri-
fluormethoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkyl-
thio oder Alkylsulfonyl substituiert
sein kann,

35

Le A 25 747

5

- 10

worin

20

25

- 30

35

5

eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,

worin

10

R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

oder

15

- für 2,5-Dioxo-tetrahydropyrryl,
- für Tetrahydropyranyl, oder
- für Trialkylsilyl steht, oder eine Gruppe COR^{16} bedeutet,

wobei

20

R^{16} die oben angegebene Bedeutung hat,

und

25

R^{18} und R^{19} gleich oder verschieden sind und

30


- Wasserstoff bedeuten, oder
- Cycloalkyl bedeuten, oder
- gegebenenfalls durch Cyano, Halogen, Tri fluormethyl oder Trifluormethoxy substituiertes Alkyl bedeuten, oder
- Aryl, Aralkyl oder Heteroaryl bedeuten, wobei die genannten

35

5 Reste bis zu 3-fach gleich oder
 verschieden durch Alkyl, Alkoxy,
 Alkylthio, Halogen, Cyano, Trifluor-
 methyl, Trifluormethoxy, Trifluor-
 methylthio, Amino, Alkylamino oder
 10 Dialkylamino substituiert sein
 können,

oder,

15 D und E gemeinsam für den Rest der Formel



20 stehen, und einen Ring bilden, wobei

W - für eine Gruppe der Formel C=O oder -CHOH
 steht,

25 m - für eine Zahl 1, 2 oder 3 steht,

Z - für O, S, CH₂ oder für N-R²⁰ steht,

30 R¹³ und R¹⁴ die oben angegebene Bedeutung haben,
 und

35

Le A 25 747


5 R^{20} - für Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Aralkyl,
Carbamoyl oder Alkoxycarbonyl steht,

und wobei in diesem Fall D und E benachbart sind,

10 X - für eine Gruppe der Formel $-CH_2-CH_2-$ oder -
 $CH=CH-$ steht,

und

15 R - für eine Gruppe der Formel



20 worin

R^{21} - Wasserstoff oder Alkyl bedeutet

und

25


R^{22} - Wasserstoff,
- Alkyl, Aryl oder Aralkyl, oder
- ein Kation bedeutet,

30 sowie deren Oxidationsprodukte,

35 Le A 25 747

dadurch gekennzeichnet, daß man

Ketone der allgemeinen Formel (VIII)



in welcher

A, B, D, E und R^{23} die oben angegebene Bedeutung haben,

reduziert,

im Fall der Herstellung der Säuren die Ester verseift,

im Fall der Herstellung der Lactone die Carbonsäuren cyclisiert,

im Fall der Herstellung der Salze entweder die Ester oder die Lactone verseift,

im Fall der Herstellung der Ethylenverbindungen ($\text{X} =$

$-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$) die Ethenverbindungen ($\text{X} = -\text{CH}=\text{CH}-$) nach üblichen Methoden hydriert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Reduktion im Temperaturbereich von -80°C bis $+30^\circ\text{C}$ durchführt.

Verfahren zur Herstellung von substituierten Pyridinen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von substituierten Pyridinen, Zwischenverbindungen zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung in Arzneimitteln.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Es ist bekannt, daß aus Pilzkulturen isolierte Lactonderivate Inhibitoren der 3-Hydroxy-3-methyl-glutaryl Coenzym A Reduktase (HMG-CoA-Reduktase) sind [Mevinolin, EP-A 22 478; US-PS 4 231 938]. Darüber hinaus sind auch bestimmte Indolderivate bzw. Pyrazolderivate Inhibitoren der HMG-CoA-Reduktase [EP-A 1 114 027; US-Patent 4 613 610].


Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist die Bereitstellung von neuen Verbindungen, die Cholesterin-biosynthesehemmende Wirkung aufweisen und als HMG-CoA-Reduktaseinhibitoren zur Behandlung von Hyperlipoproteinämie, Lipoproteinämie oder Arteriosklerose geeignet sind.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, neue Verbindungen mit den gewünschten Eigenschaften und Verfahren zu ihrer Herstellung aufzufinden.

Es wurden nun substituierte Pyridine der allgemeinen Formel (I),



in welcher

5 A - für Heteroaryl steht, das bis zu 3-fach gleich oder
verschieden durch Halogen, Alkyl, Alkoxy, Alkyl-
thio, Alkylsulfonyl, Aryl, Aryloxy, Arylthio, Aryl-
sulfonyl, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Tri-
fluormethylthio, Alkoxycarbonyl oder durch eine
Gruppe der Formel $-NR^1R^2$ substituiert sein kann,

10

worin

15 R^1, R^2 - gleich oder verschieden sind und Alkyl,
Aryl, Aralkyl, Acyl, Alkylsulfonyl oder
Arylsulfonyl bedeuten,

oder

20 - für Aryl steht, das bis zu 5-fach gleich oder ver-
schieden substituiert sein kann durch Alkyl, das
gegebenenfalls durch Hydroxy oder Alkoxy substi-
tuiert sein kann, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl,
Aryl, Aryloxy, Arylthio, Arylsulfonyl, Aralkyl,
Aralkoxy, Aralkylthio, Aralkylsulfonyl, Halogen,
25 Cyano, Nitro, Trifluormethyl, Trifluormethoxy,
Trifluormethylthio, Alkoxycarbonyl, Sulfamoyl,
Dialkylsulfamoyl, Carbamoyl, Dialkylcarbamoyl oder
durch eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,

30

worin

R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

35 - für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl steht,

Le A 25 747

17.06.1957 283400

- 5 B - für Cycloalkyl steht, oder
- für Alkyl steht, das substituiert sein kann durch
Halogen, Cyano, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl,
Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-
thio, Trifluormethylsulfonyl, Alkoxycarbonyl, Acyl
oder durch eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,
10
worin

15 R^1, R^2 - gleich oder verschieden sind und Alkyl,
Aryl, Aralkyl, Acyl, Alkylsulfonyl oder
Arylsulfonyl bedeuten,

20 oder durch Carbamoyl, Dialkylcarbamoyl, Sulfamoyl,
Dialkylsulfamoyl, Heteroaryl, Aryl, Aryloxy, Aryl-
thio, Arylsulfonyl, Aralkoxy, Aralkylthio oder Ar-
alkylsulfonyl, wobei die Heteroaryl- und Arylreste
der letztgenannten Substituenten bis zu 3-fach
gleich oder verschieden durch Halogen, Cyano, Tri-
fluormethyl, Trifluormethoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkyl-
thio oder Alkylsulfonyl substituiert sein können,
25
D,E gleich oder verschieden sind und
- für Wasserstoff stehen, oder
- für CN oder NO_2 stehen, oder
- für Cycloalkyl stehen, oder
30 - für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl stehen,
das substituiert sein kann durch Azido, Halogen,
Hydroxy, Cyano, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl,
35

- 5 Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-
thio, Trifluormethylsulfonyl, Alkoxy-carbonyl, Acyl
oder durch eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,

worin

10 R^1 , R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

oder durch Carbamoyl, Dialkylcarbamoyl, Sulfamoyl,
Dialkylsulfamoyl, Heteroaryl, Aryl, Aryloxy, Aryl-
thio, Arylsulfonyl, Aralkoxy, Aralkylthio oder Ar-
15 alkylsulfonyl, wobei die Heteroaryl- und Arylreste
bis zu 3-fach gleich oder verschieden durch Halo-
gen, Cyano, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Alkyl,
Alkoxy, Alkylthio oder Alkylsulfonyl substituiert
sein kann,

20 oder

- für Heteroaryl stehen, die bis zu 3-fach gleich
oder verschieden durch Halogen, Alkyl, Alkoxy,
25 Alkylthio, Alkylsulfonyl, Aryl, Aryloxy, Arylthio,
Arylsulfonyl, Trifluormethyl, Trifluormethoxy,
Trifluormethylthio, Alkoxy-carbonyl oder durch eine
Gruppe der Formel $-NR^1R^2$ substituiert sein können,

30 worin

35

Le A 25 747

17.000 100 000 000

R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

5

oder

- 10 - für Aryl stehen, das bis zu 5-fach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch Alkyl, das gegebenenfalls durch Hydroxy oder Alkoxy substituiert sein kann, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl, Aryl, Aryloxy, Arylthio, Arylsulfonyl, Aralkyl, Aralkoxy, Aralkylthio, Aralkylsulfonyl, Halogen, Cyano, Nitro, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Tri-
15 fluormethylthio, Alkoxycarbonyl, Sulfamoyl, Dialkylsulfamoyl, Carbamoyl, Dialkylcarbamoyl oder durch eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,

worin

20

R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

oder

- 25 - für eine Gruppe der Formel $-NR^3R^4$, $-COR^5$ oder $-CR^{11}R^{12}-Y$ stehen,

worin

- 30 R^3 und R^4 gleich oder verschieden sind und
- Wasserstoff oder
- Alkyl, Aryl, Aralkyl, oder

35

Le A 25 747

11.06.1950 209880

5 - eine Gruppe der Formel $-\text{COR}^6$ oder $-\text{SO}_2\text{R}^7$
 bedeuten, oder

R^3 und R^4 gemeinsam eine Alkylidenkette bilden,
 die durch N, O, S und/oder N-Alkyl, N-Aryl,
 N-Carbamoyl oder N-Alkoxycarbonyl unterbrochen
10 sein kann,

R^6 - für Wasserstoff steht, oder
 - für eine Gruppe $-\text{NHR}^8$ steht, oder
 - für Alkoxy steht, oder
15 - für Alkyl, Aryl, Aryloxy, Aralkyl, Aralk-
 oxy oder Heteroaryl steht, wobei die ge-
 nannten Reste bis zu 3-fach gleich oder
 verschieden durch Alkyl, Alkoxy, Alkyl-
 thio, Halogen, Cyano, Trifluormethyl,
20 Trifluormethoxy, Trifluormethylthio, Ami-
 no, Alkylamino oder Dialkylamino substi-
 tuiert sein können,

R^7 - für Cycloalkyl steht, oder
25 - für Alkyl steht, das durch Cyano, Halo-
 gen, Trifluormethyl, Trifluormethoxy oder
 Alkoxycarbonyl substituiert sein kann,
 oder
 - für Aryl, Aralkyl oder Heteroaryl steht,
30 wobei die genannten Reste bis zu 3-fach
 gleich oder verschieden durch Alkyl, Alk-
 oxy, Alkylthio, Halogen, Cyano, Trifluor-

35

Le A 25 747

17 JUN 1964 - 508080

5 methyl, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-
thio, Amino, Alkylamino oder Dialkylamino
substituiert sein können, oder

und

10 R^8 - für Wasserstoff steht, oder
- für Cycloalkyl steht, oder
- für gegebenenfalls durch Cyano, Halogen,
Trifluormethyl oder Trifluormethoxy sub-
stituiertes Alkyl steht, oder
15 - für Aryl, Aralkyl oder Heteroaryl steht,
wobei die genannten Reste bis zu 2-fach
gleich oder verschieden durch Alkyl, Alk-
oxy, Alkylthio, Halogen, Cyano, Trifluor-
methyl, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-
20 thio, Amino, Alkylamino oder Dialkylamino
substituiert sein können,

R^5 - Wasserstoff, Cycloalkyl, Hydroxy, Alkoxy, Tri-
methylsilylalkoxy, Aryloxy, Aralkoxy bedeutet,
25 oder
- für eine Gruppe der Formel $-NR^9R^{10}$ steht,

worin

30 R^9 und R^{10} gleich oder verschieden sind und
Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder Aralkyl
bedeuten,

35

Le A 25 747

17. JUN 1953 - 569880

1953 JUN 17

475A

oder

5

- ein über ein Stickstoffatom gebundenen, gegebenenfalls substituierten heterocyclischen Rest der Reihe Pyrrolidin, Piperidin, Morphin, Thiomorpholin oder Piperazin bedeutet,

10

und

R^{11} und R^{12} gleich oder verschieden sein können und

15

- für Wasserstoff, oder
- für Alkyl stehen, das gegebenenfalls durch Hydroxy, Halogen, Alkoxy oder Alkoxy-carbonyl substituiert sein kann, oder
- für Cycloalkyl stehen, oder

20

R^{11} und R^{12} gemeinsam einen gesättigten oder ungesättigten carbocyclischen oder heterocyclischen Ring mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bilden,

25

und

Y - eine Gruppe der Formel $-NR^{13}R^{14}$, $-COR^{15}$, $-S-R^{16}$, $-SO-R^{16}$, $-SO_2-R^{16}$, $-OR^{17}$ oder $-N_3$ bedeutet,

30

worin

R^{13} und R^{14} gleich oder verschieden sind und

35

Le A 25 747

- 5 - für Wasserstoff, Alkyl, Aryl oder Aralkyl
 stehen, wobei die Arylreste durch Halo-
 gen, Cyano, Alkyl, Alkoxy oder Trifluor-
 methyl substituiert sein können,
 oder
10 - für eine Gruppe der Formel $-\text{COR}^{15}$,
 $-\text{SO}_2\text{R}^{16}$ stehen,

 oder R^{13} und R^{14} gemeinsam eine Alkylenkette
 bilden, die durch N, O, S und/oder N-Alkyl,
15 N-Aryl, N-Aralkyl, N-Carbamoyl oder N-Alkoxy-
 carbonyl unterbrochen sein kann,

- R^{15} - Wasserstoff bedeutet, oder
 - eine Gruppe $-\text{NR}^{18}\text{R}^{19}$ bedeutet, oder
 - Alkyl oder Alkoxy bedeutet, oder
20 - Aryl, Aryloxy, Aralkyl, Aralkoxy oder
 Heteroaryl bedeutet, wobei die genannten
 Reste bis zu 3-fach gleich oder ver-
 schieden durch Alkyl, Alkoxy, Alkylthio,
 Halogen, Cyano, Trifluormethyl, Triflu-
25 ormethoxy, Trifluormethylthio, Amino,
 Alkylamino oder Dialkylamino substitu-
 iert sein können,

- R^{16} - Cycloalkyl bedeutet, oder
30 - geradkettiges oder verzweigtes Alkyl
 bedeutet, das durch Cyano, Halogen,
 Trifluormethyl, Trifluormethoxy oder
 Alkoxycarbonyl substituiert sein kann,
 oder
35 - Aryl, Aralkyl oder Heteroaryl bedeutet,

35

17.000.000.000.000

- 5 oder durch Carbamoyl, Dialkylcarbamoyl,
Sulfamoyl, Dialkylsulfamoyl, Heteroaryl,
Aryl, Aryloxy, Arylthio, Arylsulfonyl,
Aralkoxy, Aralkylthio oder Aralkylsulfo-
10 nyl, wobei die Heteroaryl- und Arylreste
bis zu 3-fach gleich oder verschieden
durch Halogen, Cyano, Trifluormethyl,
Trifluormethoxy, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio
oder Alkylsulfonyl substituiert sein
kann,
- 15 oder
- für Heteroaryl steht, das bis zu 3-fach
gleich oder verschieden durch Halogen,
Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsulfonyl,
20 Aryl, Aryloxy, Arylthio, Arylsulfonyl,
Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Tri-
fluormethylthio, Alkoxycarbonyl oder
durch eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$
substituiert sein kann,
- 25 worin
- R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung
haben,
- 30 oder
- für Aryl steht, das bis zu 5-fach gleich
oder verschieden substituiert sein kann
35 durch Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Alkylsul-

5 fonyl, Aryl, Aryloxy, Arylthio, Arylsul-
fonyl, Aralkyl, Aralkoxy, Aralkylthio,
Aralkylsulfonyl, Halogen, Cyano, Nitro,
Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Tri-
fluormethylthio, Alkoxycarbonyl, Sulf-
amoyl, Dialkylsulfamoyl, Carbamoyl,
10 Dialkylcarbamoyl oder durch eine Gruppe
der Formel $-NR^1R^2$,

worin

15 R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung
haben,

oder

- für 2,5-Dioxo-tetrahydropyrryl,
- für Tetrahydropyranyl, oder
20 - für Trialkylsilyl steht, oder eine Gruppe
 COR^{16} bedeutet,

wobei

25 R^{16} die oben angegebene Bedeutung hat,

und

30 R^{18} und R^{19} gleich oder verschieden sind und
- Wasserstoff bedeuten, oder
- Cycloalkyl bedeuten, oder
- gegebenenfalls durch Cyano, Halogen, Tri-
fluormethyl oder Trifluormethoxy substitu-
35 iertes Alkyl bedeuten, oder


Le A 25 747

17.000 19.10.1960 90880

5 - Aryl, Aralkyl oder Heteroaryl bedeuten,
wobei die genannten Reste bis zu 3-fach
gleich oder verschieden durch Alkyl, Alk-
oxy, Alkylthio, Halogen, Cyano, Trifluor-
methyl, Trifluormethoxy, Trifluormethyl-
thio, Amino, Alkylamino oder Dialkylamino
10 substituiert sein können,

oder,

15 D und E gemeinsam für den Rest der Formel



20 stehen, und einen Ring bilden, wobei

W - für eine Gruppe der Formel $\text{C}=\text{O}$ oder $-\text{CHOH}$ steht,

25 m - für eine Zahl 1, 2 oder 3 steht,

Z - für O, S, CH_2 oder für $\text{N}-\text{R}^{20}$ steht,

30 R^{13} und R^{14} die oben angegebene Bedeutung haben,

und

35 R^{20} - für Wasserstoff, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Carbamoyl
oder Alkoxycarbonyl steht,

Le A 25 747

17.11.1950 10.08.50

und wobei in diesem Fall D und E benachbart sind,


5

X - für eine Gruppe der Formel $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ oder $-\text{CH}=\text{CH}-$ steht,

und

10

R - für eine Gruppe der Formel



worin

R^{21} - Wasserstoff oder Alkyl bedeutet

20

und

R^{22} - Wasserstoff,

- Alkyl, Aryl oder Aralkyl, oder

25

- ein Kation bedeutet,

und deren Oxidationsprodukte gefunden.

Unter den Oxidationsprodukten der erfindungsgemäßen

30 Verbindungen der allgemeinen Formel (I) versteht man die entsprechenden Verbindungen des Pyridin-N-oxids.

35

Le A 25 747

Überraschenderweise zeigen die erfindungsgemäßen substituierten Pyridine eine überlegene inhibitorische Wirkung auf die HMG-CoA Reduktase (3-Hydroxy-3-methyl-glutaryl Coenzym A Reduktase).

Cycloalkyl steht im allgemeinen für einen cyclischen Kohlenwasserstoffrest mit 3 bis 8 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist der Cyclopropyl-, Cyclopentyl- und der Cyclohexylring. Beispielsweise seien Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl und Cyclooctyl genannt.

Alkyl steht im allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt wird Niederalkyl mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl, Isohexyl, Heptyl, Isoheptyl, Octyl und Isooctyl genannt.

Alkoxy steht im allgemeinen für einen über ein Sauerstoffatom gebundenen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist Niederalkoxy mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt ist ein Alkoxyrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, Pentoxy, Isopentoxy, Hexoxy, Isohexoxy, Heptoxy, Isoheptoxy, Octoxy oder Isooctoxy genannt.

Alkylthio steht im allgemeinen für einen über ein Schwefel-

5 felatom gebundenen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist Niederalkylthio mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt ist ein Alkylthioester mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien Methylthio, Ethylthio, Propylthio, Isopropylthio, Butylthio, Isobutylthio, Pentylthio, Isopentylthio, Hexylthio, Isohexylthio, Heptylthio, Isoheptylthio, Octylthio oder Isooctylthio genannt.

15 Alkylsulfonyl steht im allgemeinen für einen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, der über eine SO_2 -Gruppe gebunden ist. Bevorzugt ist Niederalkylsulfonyl mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen. Beispielsweise seien genannt: Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Propylsulfonyl, Isopropylsulfonyl, Butylsulfonyl, Isobutylsulfonyl, Pentylsulfonyl, Isopentylsulfonyl, Hexylsulfonyl, Isohexylsulfonyl.

25 Sulfamoyl (Aminosulfonyl) steht für die Gruppe $-\text{SO}_2-\text{NH}_2$.

Aryl steht im allgemeinen für einen aromatischen Rest mit 6 bis etwa 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugte Arylreste sind Phenyl, Naphthyl und Biphenyl.

30 Aryloxy steht im allgemeinen für einen aromatischen Rest mit 6 bis etwa 12 Kohlenstoffatomen, der über ein Sauerstoffatom gebunden ist. Bevorzugte Aryloxyreste sind Phenoxy oder Naphthyloxy.

35

Le A 25 747

11.11.1968

11.11.1968

Arylthio steht im allgemeinen für einen aromatischen Rest mit 6 bis etwa 12 Kohlenstoffatomen, der über ein Schwefelatom gebunden ist. Bevorzugte Arylthioester sind Phenylthio oder Naphthylthio.

10 Arylsulfonyl steht im allgemeinen für einen aromatischen Rest mit 6 bis etwa 12 Kohlenstoffatomen, der über eine SO₂-Gruppe gebunden ist. Beispielsweise seien genannt: Phenylsulfonyl, Naphthylsulfonyl und Biphenylsulfonyl.

15 Aralkyl steht im allgemeinen für einen über eine Alkylkette gebundenen Arylrest mit 7 bis 14 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt werden Aralkylreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen im aliphatischen Teil und 6 bis 12 Kohlenstoffatome im aromatischen Teil. Beispielsweise seien folgende Aralkylreste genannt: Benzyl, Naphthylmethyl, 20 Phenethyl und Phenylpropyl.

Aralkoxy steht im allgemeinen für einen Aralkylrest mit 7 bis 14 Kohlenstoffatomen, wobei die Alkylkette über ein Sauerstoffatom gebunden ist. Bevorzugt werden Aralkoxyreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen im aliphatischen 25 Teil und 6 bis 12 Kohlenstoffatomen im aromatischen Teil. Beispielsweise seien folgende Aralkoxyreste genannt: Benzyloxy, Naphthylmethoxy, Phenethoxy und Phenylpropoxy.

30 Aralkylthio steht im allgemeinen für einen Aralkylrest mit 7 bis etwa 14 Kohlenstoffatomen wobei die Alkylkette über ein Schwefelatom gebunden ist. Bevorzugt werden Ar-

35

Le A 25 747

17.11.1950

- alkylthioester mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen im aliphatischen Teil und 6 bis 12 Kohlenstoffatomen im aromatischen Teil. Beispielsweise seien folgende Aralkylthioester genannt: Benzylthio, Naphthylmethylthio, Phenethylthio und Phenylpropylthio.
- 10 Aralkylsulfonyl steht im allgemeinen für einen Aralkylrest mit 7 bis etwa 14 Kohlenstoffatomen, wobei die Alkylreste über eine SO₂-Kette gebunden ist. Bevorzugt werden Aralkylsulfonylreste mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen im aliphatischen Teil und 6 bis 12 Kohlenstoffatomen im aromatischen Teil. Beispielsweise seien folgende Aralkylsulfonylreste genannt: Benzylsulfonyl, Naphthylmethylsulfonyl, Phenethylsulfonyl und Phenylpropylsulfonyl.
- 20 Alkoxy-carbonyl kann beispielsweise durch die Formel
- $$\begin{array}{c} \text{-C-OAlkyl} \\ || \\ \text{O} \end{array}$$
- dargestellt werden. Alkyl steht hierbei für einen geradkettigen oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt wird Niederalkoxy-carbonyl mit 1 bis etwa 6 Kohlenstoffatomen im Alkylteil. Insbesondere bevorzugt wird ein Alkoxy-carbonyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylteil. Beispielsweise seien die folgenden Alkoxy-carbonylreste genannt: Methoxy-carbonyl, Ethoxy-carbonyl, Propoxy-carbonyl, Isopropoxy-carbonyl, Butoxy-carbonyl oder Isobutoxy-carbonyl.

35

Le A 25 747

17.06.1911 10.00.00

5 Acyl steht im allgemeinen für Phenyl oder geradkettiges
oder verzweigtes Niederalkyl mit 1 bis etwa 6 Kohlen-
stoffatomen, die über eine Carbonylgruppe gebunden sind.
Bevorzugt sind Phenyl und Alkylreste mit bis zu 4 Koh-
lenstoffatomen. Beispielsweise seien genannt: Benzoyl,
Acetyl, Ethylcarbonyl, Propylcarbonyl, Isopropylcarbo-
10 nyl, Butylcarbonyl und Isobutylcarbonyl.

15 Halogen steht im allgemeinen für Fluor, Chlor, Brom oder
Iod, bevorzugt für Fluor, Chlor oder Brom. Besonders be-
vorzugt steht Halogen für Fluor oder Chlor.

20 Heteroaryl steht im allgemeinen für einen 5- bis 6-glie-
drigen aromatischen Ring, der als Heteroatome Sauer-
stoff, Schwefel und/oder Stickstoff enthalten kann und
an den weitere aromatische Ringe ankondensiert sein
25 können. Bevorzugt sind 5- und 6-gliedrige aromatische
Ringe, die einen Sauerstoff, ein Schwefel und/oder bis
zu 2 Stickstoffatome enthalten und die gegebenenfalls
benzokondensiert sind. Als besonders bevorzugte Hetero-
arylrreste seien genannt: Thienyl, Furyl, Pyrölyl,
25 Pyräzölyl, Fyridyl, Pyrimidyl, Pyrazinyl, Pyridäzinyl,
Chinölyl, Isochinölyl, Chinäzölyl, Chinöxälyl, Phthälä-
zänyl, Cinnölyl, Thiazölyl, Benzothiazölyl, Isothia-
zölyl, Oxäzölyl, Benzoxäzölyl, Isoxäzölyl, Imidäzölyl,
Benzimidäzölyl, Pyrazölyl, Indölyl, und Isoindölyl.

30 Steht R^{22} für einen Esterrest so ist hiermit bevorzugt,
ein physiologisch verträgliches Esterrest gemeint, der

35

Le A 25 747

12.11.1980

10 Methylester, Ethylester, Propylester, Benzylester.

25 det werden können.

substituierten Pyridine (Ia) der allgemeinen Formel



35


Le A 25 747

in welcher

5

A, B, D, E, X und R die oben angegebene Bedeutung haben.

10 Im Rahmen der vorliegenden Erfindung entsprechen die substituierten Pyridine (Ib) der allgemeinen Formel



15


in welcher

A, B, D, E, X und R die oben angegebene Bedeutung haben.

20

Im Rahmen der allgemeinen Formel (I) sind Verbindungen der allgemeinen Formeln (Ia) und (Ib) bevorzugt.

25 Bevorzugt sind solche Verbindungen der allgemeinen Formeln (Ia) und (Ib)



30

in welchen

A - für Thienyl, Furyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Oxazo-

35

Le A 25 747

- 5 lyl, Isoxazolyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyrazinyl, Pyridazinyl, Indolyl, Isoindolyl, Chinolyl, Isochinolyl, Phthalazinyl, Chinoxalinyll, Chinazolinyl, Cinolinyl, Benzothiazolyl, Benzoxazolyl oder Benzimidazolyl steht, das bis zu 2-fach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, 10 Brom, Niederalkyl, Niederalkoxy, Phenyl, Phenoxy, Trifluormethyl, Trifluormethoxy oder Niederalkoxycarbonyl, oder
- 15 - für Phenyl oder Naphthyl steht, das bis zu 4-fach gleich oder verschieden substituiert sein kann durch Niederalkyl, das gegebenenfalls durch Hydroxy oder Niederalkoxy substituiert sein kann, Niederalkoxy, Niederalkylthio, Niederalkylsulfonyl, Phenyl, Phenylxy, Phenylthio, Phenylsulfonyl, Benzyl, Benzyloxy, Benzylthio, Benzylsulfonyl, 20 Phenethyl, Phenylethoxy, Phenylethylthio, Phenylethylsulfonyl, Fluor, Chlor, Brom oder Cyano,
- 25 R¹ und R² gleich oder verschieden sind und Niederalkyl, Phenyl, Benzyl, Acetyl, Benzoyl, Phenylsulfonyl oder Niederalkylsulfonyl bedeuten,
- 30 - für geradkettiges oder verzweigtes Niederalkyl steht, B - für Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl steht oder
- 35 - für Niederalkyl steht, das substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Niederalkoxy, Niederalkylthio, Niederalkylsulfonyl, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfonyl, Niederalkoxycarbonyl, Benzoyl, Niederalkylcarbonyl, durch eine Gruppe der Formel -NR¹R²,

worin

5

R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,
oder durch Pyridyl, Pyrimidyl, Pyrazinyl, Py-
ridazinyl, Chinolyl, Isochinolyl, Pyrrolyl,
10 Indolyl, Thienyl, Furyl, Imidazolyl, Oxazolyl,
Thiazolyl, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio, Phe-
nylsulfonyl, Benzyloxy, Benzylthio, Benzyl-
sulfonyl, Phenylethoxy, Phenylethylthio oder
Phenylethylsulfonyl, wobei die genannten He-
15 teroaryl- und Arylreste bis zu 2-fach gleich
oder verschieden durch Fluor, Chlor, Brom,
Niederalkyl, Niederalkoxy, Trifluormethyl,
oder Trifluormethoxy substituiert sein kön-
nen,

- 20 D,E - gleich oder verschieden sind und
- für Wasserstoff stehen, oder
 - für CN oder NO_2 stehen, oder
 - für Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl
stehen, oder
 - 25 - für geradkettiges oder verzweigtes Niederalkyl
stehen, das substituiert sein kann durch Azido, Fluor,
Chlor, Brom, Cyano, Hydroxy, Niederalkoxy, Nieder-
alkylthio, Niederalkylsulfonyl, Trifluormethyl,
Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfonyl, Nieder-
30 alkoxycarbonyl, Benzoyl, Niederalkylcarbonyl,
durch eine Gruppe der Formel $-\text{NR}^1\text{R}^2$,

worin

35

Le A 25 747

11.11.1953 20.08.50

5

10

15

20

25

Le A 25 747

5

10

R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

oder

15

- für eine Gruppe der Formel $-NR^3R^4$, $-COR^5$ oder $-CR^{11}R^{12}-Y$ stehen,

worin

20

R^3 und R^4 gleich oder verschieden sind und

- Wasserstoff oder

- Niederalkyl, Phenyl oder Benzyl, oder

- eine Gruppe der Formel $-COR^6$ oder $-SO_2R^7$ bedeuten,

25

wobei

R^6 - für Wasserstoff steht, oder

30

- für eine Gruppe $-NHR^8$ steht, oder

- für Niederalkoxy steht, oder

- für gegebenenfalls durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Fluor, Chlor, Brom, Trifluorme-

35

5 thyl, Dimethylamino oder Diethylamino substituier-
tes Niederalkyl, Phenyl, Benzyl, Benzyloxy, Thienyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Chinolyl, Isochinolyl, Benzothiazolyl, Benzoxazolyl, Thiazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl oder Isothiazolyl steht,

10

R⁷ - für Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl steht, oder

15

- für gegebenenfalls durch Cyano, Fluor, Chlor, Brom, Trifluormethyl oder Niederalkoxy-carbonyl substituier-
tes Niederalkyl steht, oder

20

- für gegebenenfalls durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Fluor, Chlor, Brom, Trifluormethyl, Dimethylamino oder Diethylamino substituier-
tes Phenyl, Benzyl, Thienyl, Furyl, Pyrimidyl, Pyridyl, Chinolyl, Isochinolyl, Benzothiazolyl, Benzoxazolyl, Thiazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl oder Isothiazolyl steht,

25

und

30

R⁸ - für Wasserstoff steht, oder
- für gegebenenfalls durch Cyano, Fluor, Chlor oder Brom substituier-
tes Niederalkyl steht, oder
- für gegebenenfalls durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Fluor, Chlor, Brom, Tri-

35

Le A 26 747

12.11.1971 14.00.00

- 5 fluormethyl, Dimethylamino oder Diethyl-
amino substituiertes Phenyl, Benzyl, Thi-
enyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Chino-
lyl, Isochinolyl, Benzothiazolyl, Benz-
oxazolyl, Thiazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl
oder Isothiazolyl steht,
- 10
- R^5 - Wasserstoff, Cyclohexyl, Hydroxy, Niederalk-
oxy, Trimethylsilylniederalkoxy, Benzyloxy
bedeutet, oder
- für eine Gruppe der Formel $-NR^9R^{10}$ steht,
- 15
- worin
- R^9 und R^{10} gleich oder verschieden sind und
- 20 - Wasserstoff, Niederalkyl oder Phenyl be-
deuten, oder
- einen heterocyclischen Ring der Reihe
Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, N-Al-
kylpiperazin, N-Arylpiperazin, N-Benzyl-
piperazin, N-Carbamoylpiperazin oder N-
25 Alkoxycarbonylpiperazin bedeutet,
- und
- R^{11} und R^{12} gleich oder verschieden sein können und
- 30 - für Wasserstoff, oder
- für Niedrigalkyl stehen, das gegebenenfalls
durch Hydroxy, Fluor, Chlor, Niederalkoxy oder
Niederalkoxycarbonyl substituiert sein kann,
- 35

oder
5 - für Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl
stehen, oder

10 R^{11} und R^{12} gemeinsam einen gesättigten oder ungesättigten carbocyclischen oder heterocyclischen Ring mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bilden,

15 Y - eine Gruppe der Formel $-NR^{13}R^{14}$, $-COR^{15}$, $-S-R^{16}$, $SO-R^{16}$, $-SO_2R^{16}$, $-OR^{17}$ oder $-N_3$ bedeutet,

wobei

20 R^{13} und R^{14} gleich oder verschieden sind und
- für Wasserstoff, Niederalkyl, Phenyl oder Benzyl stehen, wobei die genannten Reste durch Fluor, Chlor, Brom, Niederalkyl, Niederalkoxy oder Trifluormethyl substituiert sein können, oder
25 - für eine Gruppe der Formel $-COR^{15}$, $-SO_2R^{16}$ stehen,

30 oder R^{13} und R^{14} gemeinsam eine Alkylenkette bilden, die durch O, N, S, N-Niederalkyl, N-Benzyl, N-Phenyl, N-Carbamoyl oder N-Niederalkoxycarbonyl unterbrochen sein kann,

35 R^{15} - eine Gruppe $-NR^{18}R^{19}$ bedeutet, oder
- Niederalkyl oder Niederalkoxy bedeutet,

Le A 25 747

17.11.1980

- oder
- 5 - gegebenenfalls durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Fluor, Chlor, Brom, Trifluormethyl, Dimethylamino oder Diethylamino substituiertes Phenyl, Benzyl, Benzyloxy, Thienyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Chinolyl, Isochinolyl, Benzothiazolyl, Benzoxazolyl, Thiazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl oder Isothiazolyl bedeutet,
- 10
- 15 R^{16} - Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, oder
- 20 - gegebenenfalls durch Cyano, Fluor, Chlor, Brom, Trifluormethyl oder Niederalkoxycarbonyl substituiertes geradkettiges oder verzweigtes Niederalkyl bedeutet, oder
- 25 - gegebenenfalls ein- oder mehrfach gleich oder verschieden durch Niederalkyl, Niederalkoxy, Fluor, Chlor, Brom, Trifluormethyl, Dimethylamino oder Diethylamino substituiertes Phenyl, Naphthyl, Benzyl, Thienyl, Furyl, Pyrimidyl, Pyridyl, Chinolyl, Isochinolyl, Benzothiazolyl, Benzoxazolyl, Thiazolyl, Oxazolyl, Isoxazolyl oder Isothiazolyl bedeutet, oder
- 30 - Trimethylsilyl oder Dimethylethylsilyl bedeutet, oder
- 35 - eine Gruppe $-NR^9R^{10}$ bedeutet,

wobei

5

R^9 und R^{10} die oben angegebene Bedeutung haben,

10

R^{17} - für Wasserstoff, oder
- für Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl steht, oder
- für Niederalkyl steht, das substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Niederalkoxy, Niederalkylthio, Niederalkylsulfonyl, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluormethylsulfonyl, Niederalkoxycarbonyl, Benzoyl, Niederalkylcarbonyl, durch eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$,

15

20

worin

R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

25

oder durch Pyridyl, Pyrimidyl, Pyrazinyl, Pyridazinyl, Chinolyl, Isochinolyl, Pyrrolyl, Indolyl, Thienyl, Furyl, Imidazolyl, Oxazolyl, Thiazolyl, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio, Phenylsulfonyl, Benzyloxy, Benzylthio, Benzylsulfonyl, Phenylethoxy, Phenylethylthio oder Phenylethylsulfonyl, wobei die genannten Heteroaryl- und Arylreste bis zu 2-fach gleich oder verschie-

30

35

Le A 25 747

11.11.1971 10.11.1971

11.11.1971

35

1744 1910 069080

5

10

- für 2,5-Dioxo-tetrahydropyrryl oder
- für Tetrahydropyranyl, oder
- für Dimethyl-tert.butylsilyl, Tripropylsilyl oder Tributylsilyl steht, oder
- eine Gruppe der Formel COR¹⁶ bedeutet,

15

R^{16} die oben angegebene Bedeutung hat,

20

R^{18} und R^{19} gleich oder verschieden sind und

- 25


30

35

oder

5

D, E gemeinsam einen Ring der Formel



worin

15

W - für eine Gruppe der Formel C=O oder für CH-OH steht,

m - für eine Zahl 1 oder 2 steht,

20

Z - für O, CH₂ oder NHR²⁰ steht,

R¹³ und R¹⁴ die oben angegebene Bedeutung haben,

und

25

R²⁰ - für Wasserstoff, Niederalkyl, Phenyl, Benzyl, Carbamoyl oder Niederalkoxycarbonyl steht,

und wobei in diesem Fall D und E benachbart sind,

30

X - für eine Gruppe der Formel -CH=CH- steht,

R - für eine Gruppe der Formel

35

Le A 25 747

17.01.1968

17.01.1968

worin

und

und deren Oxidationsprodukte.

in welchen

35

Le A 25 747

- 5 Hydroxypropyl, Butyl, Isobutyl, Methoxymethyl,
Ethoxymethyl, Propoxymethyl, tert. Butyl, Methoxy,
Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy,
tert. Butoxy, Methylthio, Ethylthio, Propylthio,
Isopropylthio, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl,
10 Propylsulfonyl, Isopropylsulfonyl, Phenyl, Phenoxy,
Benzyl, Benzyloxy, Fluor, Chlor, Brom, Cyano,
Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Methoxycarbonyl,
Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl,
Butoxycarbonyl, Isobutoxycarbonyl oder tert. Butoxy-
carbonyl,
15 - für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl oder tert. Butyl steht,
B - für Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl
steht, oder
- für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, sec.-
Butyl oder tert. Butyl steht, das substituiert sein
20 kann durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Methoxy, Eth-
oxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, sec. Butoxy, tert.-
Butoxy, Methylthio, Ethylthio, Propylthio, Isopropyl-
thio, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Propylsulfonyl,
Isopropylsulfonyl, Trifluormethyl, Trifluormethoxy,
25 Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Butoxycarbonyl, Iso-
butoxycarbonyl, tert.-Butoxycarbonyl, Benzoyl, Ace-
tyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Thienyl, Furyl, Phenyl,
Phenoxy, Phenylthio, Phenylsulfonyl, Benzyloxy, Ben-
zylthio oder Benzylsulfonyl,
30
D,E - gleich oder verschieden sind und
- für CN, NO₂ stehen, oder
- für Wasserstoff, Cyclopropyl, Cyclopentyl oder

35

Le A 25 747

1111 1111 1111 1111

1111 1111

1111 1111

Cyclohexyl stehen, oder
5 - für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Iso-
butyl, tert. Butyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl oder
Isohexyl stehen, das substituiert sein kann durch
Azido, Fluor, Chlor, Brom, Jod, Cyano, Hydroxy, Methoxy,
Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy,
10 tert. Butoxy, Methylthio, Ethylthio, Propylthio,
Isopropylthio, Butylthio, Isobutylthio, tert. Butyl-
thio, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Propylsul-
fonyl, Isopropylsulfonyl, Butylsulfonyl, Isobu-
tylsulfonyl, tert. Butylsulfonyl, Trifluormethyl,
15 Trifluormethoxy, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl,
Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, Butoxycarbonyl,
Isobutoxycarbonyl, tert. Butoxycarbonyl, Benzoyl,
Acetyl, Ethylsulfonyl, oder durch eine Gruppe
-NR¹R²,

20
wobei

R¹ und R² gleich oder verschieden sind und
Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl,
25 Isobutyl, tert. Butyl, Phenyl, Benzyl, Acetyl,
Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Propylsulfonyl,
Isopropylsulfonyl oder Phenylsulfonyl
bedeuten,

30 oder durch Pyridyl, Pyrimidyl, Pyrazinyl, Pyridazi-
nyl, Chinolyl, Isochinolyl, Thienyl, Furyl, Phenyl,
Phenoxy, Phenylthio, Phenylsulfonyl, Benzyl-
oxy, Benzylthio oder Benzylsulfonyl, wobei die genannten

35

- 5 Heteroaryl- und Arylreste durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Isobutyl, tert. Butyl, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, tert.-Butoxy, Trifluormethyl oder Trifluormethoxy substituiert sein können, oder
- 10 - für Thienyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyrazinyl, Tetrazolyl, Pyridazinyl, Oxazolyl, Isooxazolyl, Imidazolyl, Pyrazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Chinolyl, Isochinolyl, Benzoxazolyl, Benzimidazolyl oder Benzthiazolyl stehen, wobei die genannten Reste
- 15 durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, tert.-Butoxy, Phenyl, Phenoxy, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Butoxycarbonyl, Isobutoxycarbonyl oder tert. Butoxycarbonyl substituiert
- 20 sein können, oder
- für Phenyl stehen, das bis zu 3-fach gleich oder verschieden durch Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl, Methylhydroxy, Ethylhydroxy, Propylhydroxy, Isohexyl, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, Methoxymethyl, Ethoxymethyl, Propoxymethyl, tert. Butoxy, Methylthio, Ethylthio, Propylthio, Isopropylthio, Butylthio, Isobutylthio, tert. Butylthio, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Propylsulfonyl, Isopropylsulfonyl, Butylsulfonyl, Isobutylsulfonyl, tert. Butylsulfonyl, Phenyl,
- 25
- 30
- 35

5 Phenoxy, Phenylthio, Phenylsulfonyl, Benzyl, Benzyl-
oxy, Benzylthio, Benzylsulfonyl, Fluor, Chlor, Brom,
Cyano, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Trifluorme-
thylthio, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxy-
carbonyl, Isopropoxycarbonyl, Butoxycarbonyl, Iso-
10 butoxycarbonyl, tert.Butoxycarbonyl oder durch eine
Gruppe $-NR^1R^2$ substituiert sein kann,

wobei

15 R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben,

oder

20 - für eine Gruppe der Formel $-NR^3R^4$, $-COR^5$ oder
 $-CR^{11}R^{12}-Y$ stehen,

worin

25 R^3 und R^4 gleich oder verschieden sind und
- Wasserstoff oder
- Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, tert.Butyl,
Pentyl, Isopentyl, Hexyl, Isohexyl, Phenyl,
Benzyl, oder
- eine Gruppe der Formel $-COR^6$ oder $-SO_2R^7$ bedeu-
ten,

30

worin

35 R^6 - für Wasserstoff steht, oder
- für eine Gruppe $-NHR^8$ steht, oder

Le A 25 747

11.11.1971 10.9887
1.11.1971

40.10.1971

- 5
- für Methoxy, Ethoxy, Propoxy oder Isopropoxy steht, oder
 - für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl oder Butyl steht, oder
 - für gegebenenfalls durch Methyl, Methoxy, Fluor oder Chlor substituiertes Phenyl, Benzyl, Benzyloxy, Thienyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Chinolyl oder Isochinolyl steht,
- 10
- 15
- R^7 - für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, Butoxycarbonyl oder Isobutoxycarbonyl substituiertes Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl oder Isobutyl steht, oder
- 20
- für gegebenenfalls durch Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Methoxy, Ethoxy, Propoxy oder Isopropoxy, Fluor oder Chlor substituiertes Phenyl, Thienyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Chinolyl oder Isochinolyl steht,
- 25
- und
- 30
- R^8 - für Wasserstoff steht, oder
- für gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl oder Isohexyl steht, oder
 - für Phenyl steht, das durch Fluor, Chlor,
- 35

11.11.1971 10:00
4234

5 Methyl oder Methoxy substituiert sein
kann,

10 R⁵ - Wasserstoff, Cyclohexyl, Hydroxy, Methoxy,
Ethoxy, Propoxy, Butoxy, Isopropoxy, Isobutoxy
oder Trimethylsilylethoxy bedeutet, oder
- für NR⁹R¹⁰ steht,

 worin

15 R⁹ und R¹⁰ gleich oder verschieden sind und
Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Iso-
propyl, Butyl, Isobutyl oder Phenyl be-
deutet,
oder
20 - einen heterocyclischen Ring der Reihe Pi-
peridin, N-Methylpiperazin, N-Ethylpiper-
azin, N-Benzylpiperazin oder Morpholin be-
deutet,

25 und

30 R¹¹ und R¹² gleich oder verschieden sind und
- für Wasserstoff, oder
- für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl stehen,
das gegebenenfalls durch Hydroxy, Fluor, Chlor,
Methoxy, Ethoxy, Methoxycarbonyl,
Ethoxycarbonyl substituiert sein kann, oder
- für Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl
stehen,

35

Le A 25 747

11.11.1971 10.11.1971

- 5 oder R¹¹ und R¹² gemeinsam für Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl stehen,
- und
- 10 Y - eine Gruppe der Formel -NR¹³R¹⁴, -COR¹⁵, -SR¹⁶, -SO-R¹⁶, -SO₂R¹⁶, -OR¹⁷ oder -N₃ bedeutet,
- wobei
- 15 R¹³ und R¹⁴ gleich oder verschieden sind, und
- für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, oder
 - für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Methyl oder Methoxy substituiertes Phenyl, oder
 - 20 - für eine Gruppe -COR¹⁵ oder -SO₂R¹⁶ stehen, oder
- 25 R¹³ und R¹⁴ gemeinsam mit dem Stickstoffatom einen Ring der Reihe Piperidin, Piperazin, Morpholin, Morpholin-N-oxid, N-Niederalkylpiperazin, Benzylpiperazin oder Phenylpiperazin bilden,
- 30 R¹⁵ - Wasserstoff bedeutet, oder
- eine Gruppe -NR¹⁸R¹⁹ bedeutet, oder
 - Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, oder
 - gegebenenfalls durch Methyl, Methoxy, Fluor oder Chlor substituiertes Phenyl, Benzyl, Benzyloxy, Thienyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Chinolyl oder Isochinolyl bedeutet,
 - 35

- 5 R¹⁶ gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, Butoxycarbonyl oder Isobutoxycarbonyl substituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl oder Isopentyl bedeutet, oder
- 10 - gegebenenfalls ein- oder mehrfach gleich oder verschieden durch Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Methoxy, Fluor oder Chlor substituiertes Benzyl, Phenyl, Naphthyl, Thienyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Chinolyl oder Isochinolyl bedeutet, oder
- 15 - Trimethylsilyl oder Dimethylethylsilyl bedeutet,
- eine Gruppe -NR⁹R¹⁰ bedeutet,
- 20 wobei
- R⁹ und R¹⁰ die oben angegebene Bedeutung haben,
- 25 R¹⁷ - für Wasserstoff, Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl steht, oder
- für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl oder Isohexyl steht, das
- 30 substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, tert. Butoxy, Methylthio, Ethylthio, Propylthio,
- 35

Le A 25 747

17.11.1981 11.09.80

BR 10 00

- 5 Isopropylthio, Butylthio, Isobutylthio,
tert. Butylthio, Methylsulfonyl, Ethylsul-
fonyl, Propylsulfonyl, Isopropylsulfonyl,
Butylsulfonyl, Isobutylsulfonyl, tert.-
Butylsulfonyl, Trifluormethyl, Trifluor-
methoxy, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl,
10 Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, But-
oxycarbonyl, Isobutoxycarbonyl, tert.-
Butoxycarbonyl, Benzoyl, Acetyl, Ethyl-
carbonyl, oder durch eine Gruppe $-NR^1R^2$,
15 wobei

 R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind
und Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl,
Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Phenyl,
20 Benzyl, Acetyl, Methylsulfonyl, Ethyl-
sulfonyl, Propylsulfonyl, Isopropyl-
sulfonyl oder Phenylsulfonyl bedeu-
ten,

25 oder durch Pyridyl, Pyrimidyl, Pyrazinyl,
Pyridazinyl, Chinolyl, Isochinolyl, Thie-
nyl, Furyl, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio,
Phenylsulfonyl, Benzyloxy, Benzylthio oder
Benzylsulfonyl, wobei die genannten Hete-
30 roaryl- und Arylreste durch Fluor, Chlor,
Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Isobu-
tyl, tert. Butyl, Methoxy, Ethoxy, Prop-
oxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, tert.-
- 35

- 5 Butoxy, Trifluormethyl oder Trifluormethoxy substituiert sein kann, oder
- für Thienyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Pyrazinyl, Pyridazinyl, Oxazolyl, Isooxazolyl, Imidazolyl, Pyrazolyl, Thiazolyl, Isothiazolyl, Chinolyl, Isochinolyl,
- 10 Benzooxazolyl, Benzimidazolyl oder Benzothiazolyl steht, wobei die genannten Reste durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy,
- 15 Butoxy, Isobutoxy, tert. Butoxy, Phenyl, Phenoxy, Trifluormethyl, Trifluormethoxy, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Butoxycarbonyl, Isobutoxycarbonyl oder tert. Butoxycarbonyl substituiert sein können,
- 20 oder
- für Benzyl oder Phenyl steht, das bis zu 3-fach gleich oder verschieden durch
- 25 Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl, Isohexyl, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy, Isobutoxy, tert. Butoxy, Methylthio, Ethylthio, Propylthio, Isopropylthio, Butylthio, Isobutylthio,
- 30 tert. Butylthio, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Propylsulfonyl, Isopropylsulfonyl, Butylsulfonyl, Isobutylsulfonyl, tert. Butylsulfonyl, Phenyl, Phenoxy, Phenylthio,
- 35

5 Phenylsulfonyl, Benzyl, Benzyloxy,
Benzylthio, Benzylsulfonyl, Fluor, Chlor,
Brom, Cyano, Trifluormethyl, Trifluormeth-
oxy, Trifluormethylthio, Methoxycarbonyl,
Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Isopro-
poxycarbonyl, Butoxycarbonyl, Isobutoxy-
10 carbonyl, tert.Butoxycarbonyl oder durch
eine Gruppe $-NR^1R^2$ substituiert sein
kann,

15 wobei

R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung
haben,

20 oder

- für 2,5-Dioxo-tetrahydropyrryl oder
- für Tetrahydropyranyl steht, oder
- für Dimethyl-tert.butylsilyl oder Trime-
- thylsilyl steht, oder
- eine Gruppe $-COR^{16}$ bedeutet,

25

wobei

R^{16} die oben angegebene Bedeutung hat,

und

30

R^{18} und R^{19} gleich oder verschieden sind und

- Wasserstoff bedeuten, oder
- gegebenenfalls durch Fluor oder Chlor sub-

35


5 stituiertes Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl oder Isohexyl bedeuten, oder
- Phenyl bedeuten, das durch Fluor, Chlor, Methyl oder Methoxy substituiert sein kann,

10

oder

D und E gemeinsam einen Ring der Formel

15



bilden,

20

worin

25

R^{20} - für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Carbamoyl, Methoxycarbonyl oder Ethoxycarbonyl steht,


X - für eine Gruppe der Formel $-CH=CH-$ steht,

R - für eine Gruppe der Formel

30

35

Le A 25 747



worin

10 R^{21} - Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl oder tert. Butyl bedeutet,

und

15 R^{22} - Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl oder Benzyl bedeutet, oder ein Natrium-, Kalium-, Calcium-, oder Magnesium- oder Ammoniumion bedeutet.

20 und deren Oxidationsprodukte.

Ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der allgemeinen Formeln (Ia) und (Ib)

25 in welchen

A - für Thienyl oder Furyl steht,

- für Phenyl steht, das bis zu 2-fach gleich oder verschieden durch Methyl, Hydroxymethyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Methoxy,

30 Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Phenoxy, Benzyloxy, Fluor, Chlor, Trifluormethyl substituiert sein kann,

- für Methyl, Ethyl, Propyl oder Isopropyl steht,

35 Le A 25 747

- 5 B - für Cyclopropyl, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl oder tert. Butyl steht, das durch Fluor, Chlor, Methoxy, Phenyl oder Phenoxy substituiert sein kann,
- 10 D, E gleich oder verschieden sind und
- 10 - für Wasserstoff, CN, NO₂, Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl stehen, oder
- 15 - für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl oder Isohexyl stehen, das substituiert sein kann durch
- 15 Azido, Fluor, Chlor, Iod, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Methylthio, Ethylthio, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl oder durch eine Gruppe der Formel NR¹R²,
- 20 wobei
- 25 R¹ und R² gleich oder verschieden sind und
- 25 - für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Phenyl oder Benzyl stehen,
- 30 oder durch gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Methyl, Methoxy, Trifluormethyl oder Trifluormethoxy substituiertes Pyridyl, Pyrimidyl, Chinolyl, Thienyl, Furyl, Phenyl, Phenoxy, Phenylsulfonyl oder Benzyloxy, oder
- 35 - für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Methoxy, Phenyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl substituiertes Thienyl, Furyl, Pyridyl, Pyrimidyl, Chinolyl, Isochinolyl, Benzoxazolyl,

- 5 Tetrazolyl, Benzthiazolyl oder Benzimidazolyl stehen,
 oder
- 10 - für Phenyl stehen, das bis zu 2-fach gleich oder
 verschieden durch Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl,
 Butyl, Isobutyl, tert.Butoxy, Methoxy, Ethoxy, Prop-
 oxy, Isopropoxy, Methylthio, Ethylthio, Methylsulfo-
 nyl, Ethylsulfonyl, Phenyl, Phenoxy, Phenylsulfonyl,
 Benzyloxy, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Trifluormethyl,
 Trifluormethoxy, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl oder
 eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$ substituiert sein
 kann,
- 15 wobei
- R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung haben.
- 20 oder
- für eine Gruppe der Formel $-NR^3R^4$, $-COR^5$ oder
 $-CR^{11}R^{12}-Y$ stehen
- 25 worin
- R^3 - Wasserstoff bedeutet,
- 30 R^4 - Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Propyl, oder
 - eine Gruppe der Formel $-COR^6$ oder $-SO_2R^7$ bedeu-
 tet,
- worin
- 35 R^6 - für Wasserstoff steht, oder

Le A 25 747

17. JUN 1954 509680075 61

42540

- 5
- für eine Gruppe -NHR^8 steht, oder
 - für Methoxy oder Ethoxy steht, oder
 - für Methyl, Ethyl, Propyl oder Isopropyl steht,
- 10
- R^7 - für Trifluormethyl, Phenyl, TolyI steht,
- R^8 - für Wasserstoff steht, oder
- für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl oder Butyl, oder
 - für Phenyl steht,
- 15
- R^5 - Wasserstoff, Cyclohexyl, Hydroxy, Amino, Methylamino, Dimethylamino, Methoxy, Ethoxy oder Trimethylsilylethoxy bedeutet, oder
- für die Gruppe NR^9R^{10} steht
- 20
- worin
- R^9 und R^{10} gleich oder verschieden sind und
- Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl oder Phenyl bedeuten, oder
- 25
- R^9 und R^{10} gemeinsam einen Morpholinring bilden,
- und
- 30
- R^{11} und R^{12} Wasserstoff, Methyl oder Ethyl bedeuten,
- 35

Le A 25 747

5

10

15

20

25

30

35

17 Jan 1968

- eine Gruppe $-NR^9R^{10}$ bedeutet,

5

wobei

R^9 und R^{10} die oben angegebene Bedeutung haben,

10

R^{17} - für Wasserstoff, Cyclopropyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl steht, oder

- für Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, tert. Butyl, Pentyl, Isopentyl, Hexyl oder Isohexyl steht, das substituiert sein kann durch Fluor, Chlor, Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Methylthio, Ethylthio, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Ethoxycarbonyl, Propoxycarbonyl, Isopropoxycarbonyl oder durch eine Gruppe der Formel NR^1R^2 ,

15

20

wobei

25

R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind und
- für Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Phenyl oder Benzyl stehen,

30

oder durch gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Methyl, Methoxy, Trifluormethyl oder Trifluormethoxy substituiertes Pyridyl, Py-

35

Le A 25 747

- 5 rimidyl, Chinolyl, Thienyl, Furyl, Phenyl,
Phenoxy, Phenylsulfonyl oder Benzyloxy,
oder
- 10 - für gegebenenfalls durch Fluor, Chlor, Me-
thyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Methoxy,
Phenyl, Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl
substituiertes Thienyl, Furyl, Pyridyl,
Pyrimidyl, Chinolyl, Isochinolyl, Benzoxa-
zolyl, Benzthiazolyl oder Benzimidazolyl
steht, oder
- 15 - für Benzyl oder Phenyl steht, das bis zu
2-fach gleich oder verschieden durch
Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl,
Isobutyl, tert.Butoxy, Methoxy, Ethoxy,
Propoxy, Isopropoxy, Methylthio, Ethylthio,
20 Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, Phenyl,
Phenoxy, Phenylsulfonyl, Benzyloxy, Fluor,
Chlor, Brom, Cyano, Trifluormethyl, Tri-
fluormethoxy, Methoxycarbonyl, Ethoxycar-
bonyl oder eine Gruppe der Formel $-NR^1R^2$
substituiert sein kann,
- 25 wobei
- R^1 und R^2 die oben angegebene Bedeutung
haben,
- 30 - für 2,5-Dioxo-tetrahydropyrryl oder
- für Tetrahydropyranyl, oder
- für Dimethyl-tert.butylsilyl oder Trimethyl-
silyl steht, oder
- eine Gruppe $-COR^{16}$ bedeutet,
- 35

Le A 25 747

5

wobei

R^{16} die oben angegebene Bedeutung hat,

und

10

R^{18} und R^{19} gleich oder verschieden sind und


- Wasserstoff bedeuten, oder
- Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl
oder Isobutyl bedeuten, oder
- Phenyl bedeuten,

15

oder

D und E' gemeinsam einen Ring der Formel

20



bilden,

25

X - für eine Gruppe der Formel



(E-konfiguriert) steht ,


30 und

35

Le A 25 747

R - für eine Gruppe der Formel

5



10

worin

R^{21} - Wasserstoff bedeutet

und

15

R^{22} - Wasserstoff, Methyl oder Ethyl bedeutet, oder ein Natrium- oder Kaliumion bedeutet

und deren Oxidationsprodukte.

20

Die erfindungsgemäßen substituierten Pyridine der allgemeinen Formel (I) haben mehrere asymmetrische Kohlenstoffatome und können daher in verschiedenen stereochemischen Formen existieren. Sowohl die einzelnen Isomeren als auch deren Mischungen sind Gegenstand der Erfindung.

25

Je nach der Bedeutung der Gruppe X bzw. des Restes R ergeben sich unterschiedliche Stereoisomere, die im folgenden näher erläutert werden sollten:



30

a) Steht die Gruppe -X- für eine Gruppe der Formel $-\text{CH}=\text{CH}-$, so können die erfindungsgemäßen Verbindun-

35

Le A 25 747


gen in zwei stereoisomeren Formen existieren, die an
der Doppelbindung E-konfiguriert (II) oder Z-konfigu-
riert (III) sein können:



(A, B, D, E und R haben die oben angegebene Bedeutung).

Bevorzugt sind diejenigen Verbindungen der allgemei-
nen Formel (I) die E-konfiguriert sind (II).

b) Steht der Rest -R- für eine Gruppe der Formel



so besitzen die Verbindungen der allgemeinen Formel
(I) mindestens zwei asymmetrische Kohlenstoffatome,
nämlich die beiden Kohlenstoffatome an denen die
Hydroxygruppen gebunden sind. Je nach der relativen
Stellung dieser Hydroxygruppen zueinander, können
die erfindungsgemäßen Verbindungen in der erythro-


35

Le A 25 747


Konfiguration (IV) oder in der threo-Konfiguration (V) vorliegen.

5

10



15



Sowohl von den Verbindungen in Erythro- als auch in Threo-Konfiguration existieren wiederum jeweils zwei Enantiomere, nämlich 3R,5S-Isomeres bzw. 3S,5R-Isomeres (Erythro-Form) sowie 3R,5R-Isomeres und 3S,5S-Isomeres (Threo-Form).


20

Bevorzugt sind hierbei die Erythro-konfigurierten Isomeren, besonders bevorzugt das 3R,5S-Isomere sowie das 3R,5S-3S,5R-Racemat.

25

c) Steht der Rest -R- für eine Gruppe der Formel

30




35

Le A 25 747


5 so besitzen die substituierten Pyridine mindestens zwei
asymmetrische Kohlenstoffatome, nämlich das Kohlen-
stoffatom an dem die Hydroxygruppe gebunden ist, und
das Kohlenstoffatom an welchem der Rest der Formel



gebunden ist. Je nach der Stellung der Hydroxygruppe
zur freien Valenz am Lactonring können die substitu-
ierten Pyridine als cis-Lactone (VI) oder als trans-
Lactone (VII) vorliegen.



cis-Lacton (VI)







trans-Lacton (VII)

30 Sowohl vom cis-Lacton aus als auch vom trans-Lacton
existieren wiederum jeweils zwei Isomeren nämlich das
4R,6R-Isomere bzw. das 4S,6S-Isomere (cis-Lacton),

35 Le A 25 747







5 sowie das 4R,6S-Isomere bzw. 4S,6R-Isomere (trans-Lacton). Bevorzugte Isomeren sind die trans-Lactone. Besonders bevorzugt ist hierbei das 4R,6S-Isomere (trans) sowie das 4R,6S-4S,6R-Racemat.

10 Beispielsweise seien die folgenden isomeren Formen der substituierten Pyridine genannt:



35

Le A 25 747




35

Le A 25 747




Le A 25 747

Erfindungsgemäß werden die substituierten Pyridine der allgemeinen Formel (I)



in welcher

A, B, D, E, X und R die oben angegebene Bedeutung haben, in der Weise hergestellt, daß man Ketone der allgemeinen Formel (VIII)




in welcher

A, B, D und E die oben angegebene Bedeutung haben,

und

R^{23} - für Alkyl steht,



Le A 25 747

11.11.1977

Die Reduktion kann mit den üblichen Reduktionsmitteln,
5 bevorzugt mit solchen, die für die Reduktion von Ketonen
zu Hydroxyverbindungen geeignet sind, durchgeführt wer-
den. Besonders geeignet ist hierbei die Reduktion mit
Metallhydriden oder komplexen Metallhydriden in inerten
10 Lösemitteln, gegebenenfalls in Anwesenheit eines Trial-
kylborans. Bevorzugt wird die Reduktion mit komplexen
Metallhydriden wie beispielsweise Lithiumboranat, Natri-
umborant, Kaliumborant, Zinkborant, Lithium-trialkyl-
hydrid-borate, Natrium-trialkyl-hydrido-boranten, Na-
trium-cyano-trihydrido-borat oder Lithiumaluminiumhydrid
15 durchgeführt. Ganz besonders bevorzugt wird die Reduk-
tion mit Natriumborhydrid, in Anwesenheit von Triethyl-
boran durchgeführt.

Als Lösemittel eignen sich hierbei die üblichen organi-
20 schen Lösemittel, die sich unter den Reaktionsbedingun-
gen nicht verändern. Hierzu gehören bevorzugt Ether wie
beispielsweise Diethylether, Dioxan, Tetrahydrofuran
oder Dimethoxyethan, oder Halogenkohlenwasserstoffe wie
beispielsweise Dichlormethan, Trichlormethan, Tetra-
25 chlormethan, 1,2-Dichlorethan, oder Kohlenwasserstoffe
wie beispielsweise Benzol, Toluol oder Xylol. Ebenso ist
es möglich Gemische der genannten Lösemittel einzu-
setzen.

30 Besonders bevorzugt wird die Reduktion der Ketongruppe
zur Hydroxygruppe unter Bedingungen durchgeführt, bei
denen die übrigen funktionellen Gruppen wie beispiels-

35

Le A 25 747

17 JAN 1954 608800


1954 JAN 1

4334

Darüberhinaus ist es auch möglich, die Reduktion der
5 Carbonylgruppe und die Reduktion der Doppelbindung in
zwei getrennten Schritten durchzuführen.

Die Carbonsäuren im Rahmen der allgemeinen Formel (I)
entsprechen der Formel (Ic)

10




15

in welcher

A, B, D, E und R^{20} die oben angegebene Bedeutung haben.

20 Die Carbonsäureester im Rahmen der allgemeinen Formel
(I) entsprechen der Formel (Id)

25



in welcher

30 A, B, D, E, und R^{21} die oben angegebene Bedeutung
haben,

35

Le A 25 747

und


5

R^{23} - für Alkyl steht.

Die Salze der erfindungsgemäßen Verbindungen im Rahmen
der allgemeinen Formel (I) entsprechen der Formel (Ie)

10

15



in welcher

20

A, B, D, E und R^{21} die oben angegebene Bedeutung haben,


und

M^{n+} für ein Kation steht, wobei n die Wertigkeit angibt.

25

Die Lactone im Rahmen der allgemeinen Formel (I) entsprechen der Formel (If)

30



35

Le A 25 747

in welcher

5

A, B, D, E und R^{21} die oben angegebene Bedeutung haben.

10

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Carbonsäuren der allgemeinen Formel (Ic) werden im allgemeinen die Carbonsäureester der allgemeinen Formel (Id) oder die Lactone der allgemeinen Formel (If) nach üblichen Methoden verseift. Die Verseifung erfolgt im allgemeinen indem man die Ester oder die Lactone in inerten Lösemitteln mit üblichen Basen behandelt, wobei im allgemeinen zunächst die Salze der allgemeinen Formel (Ie) entstehen, die anschließend in einem zweiten Schritt durch Behandeln mit Säure in die freien Säuren der allgemeinen Formel (Ic) überführt werden können.

15

20

Als Basen eignen sich für die Verseifung die üblichen anorganischen Basen. Hierzu gehören bevorzugt Alkalihydroxide oder Erdalkalihydroxide wie beispielsweise Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid oder Bariumhydroxid, oder Alkalicarbonat wie Natrium- oder Kaliumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat, oder Alkalialkoholate wie Natriumethanolat, Natriummethanolat, Kaliummethanolat, Kaliumethanolat oder Kalium-tert.butanolat. Besonders bevorzugt werden Natriumhydroxid oder Kaliumhydroxid eingesetzt.

25

30

35

Le A 25 747

ren. Hierzu gehören bevorzugt Mineralsäuren wie bei-
5 spielsweise Chlorwasserstoffsäure, Bromwasserstoffsäure,
Schwefelsäure oder Phosphorsäure. Es hat sich bei der
Herstellung der Carbonsäuren (Ic) hierbei als vorteil-
haft erwiesen, die basische Reaktionsmischung der Ver-
seifung in einem zweiten Schritt ohne Isolierung der
10 Salze anzusäuern. Die Säuren können dann in üblicher
Weise isoliert werden.

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen Lactone der Formel
(If) werden im allgemeinen die erfindungsgemäßen Carbon-
15 säuren (Ic) nach üblichen Methoden cyclisiert, bei-
spielsweise durch Erhitzen der entsprechenden Säure in
inerten organischen Lösemitteln, gegebenenfalls in
Anwesenheit von Molsieb.

20 Als Lösemittel eignen sich hierbei Kohlenwasserstoffe
wie Benzol, Toluol, Xylol, Erdölfraktionen, oder Tetra-
lin oder Diglyme oder Triglyme. Bevorzugt werden Benzol,
Toluol oder Xylol eingesetzt. Ebenso ist es möglich Ge-
mische der genannten Lösemittel einzusetzen. Besonders
25 bevorzugt verwendet man Kohlenwasserstoffe, insbesondere
Toluol, in Anwesenheit von Molsieb.

Die Cyclisierung wird im allgemeinen in einem Tempera-
turbereich von -40°C bis $+200^{\circ}\text{C}$, bevorzugt von -25°C bis
30 $+50^{\circ}\text{C}$ durchgeführt.

Die Cyclisierung wird im allgemeinen bei Normaldruck
durchgeführt, es ist aber auch möglich, das Verfahren

35

Le A 25 747

11.000 13.11.1968

bei Unterdruck oder bei Überdruck durchzuführen (z.B.
5 in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar).

Darüberhinaus wird die Cyclisierung auch in inerten or-
ganischen Lösemitteln, mit Hilfe von cyclisierenden bzw.
wasserabspaltenden Agentien durchgeführt. Als wasserab-
10 spaltende Agentien werden hierbei bevorzugt Carbodiimide
verwendet. Als Carbodiimide werden bevorzugt N,N'-Di-
cyclohexylcarbodiimid-Paratoluolsulfonat, N-Cyclohexyl-
N'-[2-(N''-methyilmorpholinium)ethyl]carbodiimid oder N-
(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid-Hydrochlorid
15 eingesetzt.


Als Lösemittel eignen sich hierbei die üblichen orga-
nischen Lösemittel. Hierzu gehören bevorzugt Ether wie
Diethylether, Tetrahydrofuran oder Dioxan, oder Chlor-
20 kohlenwasserstoffe wie Methylenchlorid, Chloroform oder
Tetrachlorkohlenstoff, oder Kohlenwasserstoffe wie Ben-
zol, Toluol, Xylol oder Erdölfraktionen. Besonders be-
vorzugt werden Chlorkohlenwasserstoffe wie beispiels-
weise Methylenchlorid, Chloroform oder Tetrachlorkohlen-
25 stoff, oder Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, Xy-
lol, oder Erdölfraktionen. Besonders bevorzugt werden
Chlorkohlenwasserstoffe wie beispielsweise Methylen-
chlorid, Chloroform oder Tetrachlorkohlenstoff einge-
setzt.

30 Die Reaktion wird im allgemeinen in einem Temperatur-
bereich von 0°C bis +80°C, bevorzugt von +10°C bis +50°C
durchgeführt.

35

Le A 25 747

Die Trennung der Isomeren in die stereoisomer einheitlichen Bestandteile erfolgt im allgemeinen nach üblichen Methoden wie sie beispielsweise von E.L. Eliel, Stereochemistry of Carbon Compounds, McGraw Hill, 1962 beschrieben werden. Bevorzugt wird hierbei die Trennung der Isomeren auf der Stufe der racemischen Ester. Besonders bevorzugt wird hierbei die racemische Mischung der trans-Lactone (VII) durch Behandeln entweder mit D-(+)- oder L-(-)- α -Methylbenzylamin nach üblichen Methoden in die diastereomeren Dihydroxyamide (Iq)



Le A 25 747

- hydroxid in Wasser und/oder organischen Lösemitteln wie
- 5 Alkoholen z.B. Methanol, Ethanol, Propanol oder Isopropanol, ergeben die entsprechenden enantiomerenreinen Dihydroxysäuren (Ic), die wie oben beschrieben durch Cyclisierung in die enantiomerenreinen Lactone überführt werden können. Im allgemeinen gilt für die Herstellung
- 10 der erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen Formel (I) in enantiomerenreiner Form, daß die Konfiguration der Endprodukte nach der oben beschriebenen Methode abhängig ist von der Konfiguration der Ausgangsstoffe.
- 15 Die Isomerentrennung soll im folgenden Schema beispielhaft erläutert werden:





20

25

30

35


Le A 25 747



Le A 25 747

Die als Ausgangsstoffe eingesetzten Ketone (VIII) sind
5 neu.

Es wurde ein Verfahren zur Herstellung der erfindungs-
gemäßen Ketone der allgemeinen Formel (VIII)




15 in welcher

A, B, D, E und R^{23} die oben angegebene Bedeutung haben,

gefunden, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man

20

Aldehyde der allgemeinen Formel (IX)



in welcher


30

A, B, D und E die oben angegebene Bedeutung haben,

in inerten Lösemitteln mit Acetessigester der
allgemeinen Formel (X)

35

Le A 25 747




in welcher

10 R^{23} die oben angegebene Bedeutung hat,

in Anwesenheit von Basen umgesetzt.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann beispielsweise durch
15 folgendes Formelschema erläutert werden:



35

Le A 25 747

6 Als Basen kommen hierbei die üblichen stark basischen Verbindungen in Frage. Hierzu gehören bevorzugt lithiumorganische Verbindungen wie beispielsweise N-Butyllithium, sec. Butyllithium, tert. Butyllithium oder Phenyllithium, oder Amide wie beispielsweise Lithiumdiisopropylamid, Natriumamid oder Kaliumamid, oder Lithiumhexamethyldisilylamid, oder Alkalihydride wie Natriumhydrid oder Kaliumhydrid. Ebenso ist es möglich, Gemische der genannten Basen einzusetzen. Besonders bevorzugt werden N-Butyllithium oder Natriumhydrid oder deren Gemisch eingesetzt.

15 Als Lösemittel eignen sich hierbei die üblichen organischen Lösemittel, die sich unter den Reaktionsbedingungen nicht verändern. Hierzu gehören bevorzugt Ether wie Diethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan oder Dimethoxyethan, oder Kohlenwasserstoffe wie Benzol, Toluol, Xylol, Cyclohexan, Hexan oder Erölfractionen. Ebenso ist es möglich, Gemische der genannten Lösemittel einzusetzen. Besonders bevorzugt werden Ether wie Diethylether oder Tetrahydrofuran verwendet.

25 Die Reaktion wird im allgemeinen in einem Temperaturbereich von -80°C bis $+50^{\circ}\text{C}$, bevorzugt von -20°C bis Raumtemperatur durchgeführt.

30 Das Verfahren wird im allgemeinen bei Normaldruck durchgeführt, es ist aber auch möglich das Verfahren bei Unterdruck oder bei Überdruck durchzuführen, z.B. in einem Bereich von 0,5 bis 5 bar.

35

Le A 25 747


- 5 Bei der Durchführung des Verfahrens wird der Acetessigester im allgemeinen in einer Menge von 1 bis 2, bevorzugt von 1 bis 1,5 mol, bezogen auf 1 mol des Aldehyds eingesetzt.
- 10 Die als Ausgangsstoffe eingesetzten Acetessigester der Formel (X) sind bekannt oder können nach bekannten Methoden hergestellt werden [Beilstein's Handbuch der organischen Chemie III, 632; 438].
- 15 Als Acetessigester für das erfindungsgemäße Verfahren seien beispielsweise genannt:
Acetessigsäuremethylester, Acetessigsäureethylester, Acetessigsäurepropylester, Acetessigsäureisopropylester.

20

Die Herstellung der als Ausgangsstoffe eingesetzten Aldehyde der allgemeinen Formel (IX) soll im folgenden beispielhaft für die Verbindungen des Typs (Ia) erläutert werden.

25


[A]



30

35

Le A 25 747



- 10 Hierbei werden gemäß Schema A Pyridine der Formel (X), in
welchen R²⁴ für einen Alkylrest mit bis zu 4 Kohlen-
stoffatomen steht, im ersten Schritt [1] in inerten
Lösungsmitteln wie Ethern, beispielsweise Diethylether,
Tetrahydrofuran oder Dioxan, vorzugsweise Tetrahydro-
15 furan, mit Metallhydriden als Reduktionsmittel, bei-
spielsweise Lithiumaluminiumhydrid, Natriumcyanobor-
hydrid, Natriumaluminiumhydrid, Diisobutylaluminium-
hydrid oder Natrium-bis-(2-methoxyethoxy)-dihydro-
aluminat, in Temperaturbereichen von -70°C bis +100°C,
20 vorzugsweise von -70°C bis Raumtemperatur, bzw. von
Raumtemperatur bis 70°C je nach verwendetem Reduk-
tionsmittel zu den Hydroxymethylverbindungen (XI)
reduziert. Vorzugsweise wird die Reduktion mit Li-
thiumaluminiumhydrid in Tetrahydrofuran in einem
25 Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 80°C
durchgeführt. Die Hydroxymethylverbindungen (XI) werden
im zweiten Schritt [2] nach üblichen Methoden zu den
Aldehyden (VII) oxidiert. Die Oxidation kann beispiels-
weise mit Pyridiniumchlorochromat, gegebenenfalls in
30 Anwesenheit von Aluminiumoxid, in inerten Lösungsmitteln
wie Chlorkohlenwasserstoffen, vorzugsweise Methylenchlo-
rid, in einem Temperaturbereich von 0°C bis 60°C, bevor-
zugt bei Raumtemperatur durchgeführt werden, oder aber
mit Trifluoressigsäure/Dimethylsulfoxid nach den übli-
chen Methoden der Swern Oxidation durchgeführt werden.
35 Die Aldehyde (XII) werden im dritten Schritt [3] mit

Le A 25 747

11.11.1958 12.11.1958

12.11.1958

12.11.1958

10

15




30



17 MAR 1974 064800

Die Variation des Restes D soll in den folgenden Reaktionsgleichungen an einigen Beispielen erläutert werden:


[C]





Die Dihydropyridine (XIV) können zu den Dihydropyridincarbonsäuren (XV) verseift werden, beispielsweise durch Umsetzung mit einem Alkalihydroxyd in Dimethoxyethan bei Raumtemperatur. Die Dihydropyridincarbonsäuren (XV) kön-

Le A 25 747

nen beispielsweise durch Erhitzen auf 200°C in Diethyl-
 5 lenglykol zu den Dihydropyridinen (XVI) decarboxyliert
 werden. Außerdem können die Dihydropyridincarbonsäuren
 (XV) nach bekannten Methoden zu den Dihydropyridincar-
 bonsäureamiden (XVII) umgesetzt werden, beispielsweise
 durch Reaktion mit Dicyclohexylcarbodiimid.



Die Dihydropyridine (XVIII) können mit üblichen Redukti-
 onsmitteln zu den Dihydropyridinen (XIX) reduziert wer-
 den, beispielsweise durch Umsetzung Lithiumaluminiumhy-
 20 drid in Tetrahydrofuran, bei Raumtemperatur oder in der
 Siedehitze.



Le A 25 747

Die Pyridine (XX), die wie oben beschrieben, aus den
5 Dihydropyridinen (XVIII) durch Oxidation hergestellt
werden, können durch geeignete Reduktionsmittel, wie
beispielsweise Lithiumaluminiumhydrid, Diisobutylalumi-
niumhydrid oder Natrium-bis-(2-methoxyethoxy)-dihydro-
aluminat in inerten Lösemitteln, wie beispielsweise Te-
10 trahydrofuran, zu den Pyridinen (XXI) reduziert werden.

Die Pyridine (XXI) können nach bekannten Methoden zu den
Pyridinen (XXII) umgesetzt werden, beispielsweise durch
Reaktion mit einem Alkyl- oder Benzylhalogenat in Gegen-
15 wart einer Base wie beispielsweise Natriumhydrid oder
beispielsweise durch Umsetzung mit einem Trialkylsilyl-
halogenid oder einem Säurehalogenid in Gegenwart einer
Base wie Imidazol, Pyridin oder Triethylamin. Die Hy-
droxygruppe der Pyridine (XXI) kann nach bekannten
20 Methoden in eine Abgangsgruppe überführt werden, z.B.
durch Umsetzung mit Trifluormethansulfonsäureanhydrid,
Thionylchlorid oder Methansulfonsäurechlorid in Gegen-
wart einer Base. Die Abgangsgruppe kann dann nach be-
kannten Methoden gegen Nucleophile ausgetauscht werden.

25 Die erfindungsgemäßen Verbindungen der allgemeinen For-
mel (I) besitzen wertvolle pharmakologische Eigenschaf-
ten und können in Arzneimitteln eingesetzt werden. Ins-
besondere sind sie Inhibitoren der 3-Hydroxy-3-methyl-
30 glutarylCoenzym A (HGM-CoA) Reduktase und infolge dessen
Inhibitoren der Cholesterolbiosynthese. Sie können des-
halb zur Behandlung von Hyperlipoproteinämie, Lipopro-
teinämie oder Arteriosklerose eingesetzt werden.

Die erfindungsgemäßen Wirkstoffe bewirken außerdem eine
35 Senkung des Cholesteringehaltes im Blut.

Le A 25 747

Die neuen Wirkstoffe können in bekannter Weise in die
5 üblichen Formulierungen überführt werden, wie Tabletten,
Dragees, Pillen, Granulate, Aerosole, Sirupe, Emulsio-
nen, Suspensionen und Lösungen, unter Verwendung iner-
ter, nicht toxischer, pharmazeutisch geeigneter Träger-
stoffe oder Lösungsmittel. Hierbei soll die therapeu-
10 tisch wirksame Verbindung jeweils in einer Konzentration
von etwa 0,5 bis 98-Gew.-%, bevorzugt 1 bis 90 Gew.-%,
der Gesamtmischung vorhanden sein, d.h. in Mengen, die
ausreichend sind, um den angegebenen Dosierungsspielraum
zu erreichen.

15

Die Formulierungen werden beispielsweise hergestellt
durch Verstrecken der Wirkstoffe mit Lösungsmitteln
und/oder Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung
von Emulgiermitteln und/oder Dispergiermitteln, wobei
20 z.B. im Fall der Benutzung von Wasser als Verdünnungs-
mittel gegebenenfalls organische Lösungsmittel als
Hilfslösungsmittel verwendet werden können.

Als Hilfsstoffe seien beispielsweise aufgeführt:

25 Wasser, nicht-toxische organische Lösungsmittel, wie
Paraffine (z.B. Erdölfractionen), pflanzliche Öle (z.B.
Erdnuß/Sesamöl), Alkohole (z.B. Ethylalkohol, Glycerin),
Trägerstoffe, wie z.B. natürliche Gesteinsmehle (z.B.
Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide), synthetische Ge-
30 steinsmehle (z.B. hochdisperse Kieselsäure, Silikate),
Zucker (z.B. Rohr-, Milch- und Traubenzucker), Emulgier-
mittel (z.B. Polyoxyethylen-Fettsäure-Ester, Polyoxy-
ethylen-Fettalkohol-Ether, Alkylsulfonate und Arylsulfo-

35

Le A 25 747

5 nate), Dispergiermittel (z.B. Lignin-Sulfitablaugen, Methylcellulose, Stärke und Polyvinylpyrrolidon) und Gleitmittel (z.B. Magnesiumstearat, Talkum, Stearinsäure und Natriumlaurylsulfat).

10 Die Applikation erfolgt in üblicher Weise, vorzugsweise oral, parenteral, perlingual oder intravenös. Im Falle der oralen Anwendung können Tabletten selbstverständlich
15 außer den genannten Trägerstoffen auch Zusätze, wie Natriumcitrat, Calciumcarbonat und Dicalciumphosphat zusammen mit verschiedenen Zuschlagstoffen, wie Stärke, vorzugsweise Kartoffelstärke, Gelatine und dergleichen
20 enthalten. Weiterhin können Gleitmittel, wie Magnesiumstearat, Natriumlaurylsulfat und Talkum zum Tablettieren mitverwendet werden. Im Falle wäßriger Suspensionen können die Wirkstoffe außer den obengenannten Hilfsstoffen
mit verschiedenen Geschmacksaufbesserern oder Farbstoffen versetzt werden.

Für den Fall der parenteralen Anwendung können Lösungen der Wirkstoffe unter Verwendung geeigneter flüssiger
25 Trägermaterialien eingesetzt werden.

Im allgemeinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, bei intravenöser Applikation Mengen von etwa 0,001 bis 1
mg/kg, vorzugsweise etwa 0,01 bis 0,5 mg/kg Körpergewicht zur Erzielung wirksamer Ergebnisse zu verabreichen, und bei oraler Applikation beträgt die Dosierung
30 etwa 0,01 bis 20 mg/kg, vorzugsweise 0,1 bis 10 mg/kg Körpergewicht.

35

Le A 25 747

Trotzdem kann es gegebenenfalls erforderlich sein, von den genannten Mengen abzuweichen, und zwar in Abhängigkeit vom Körpergewicht bzw. der Art des Applikationsweges, vom individuellen Verhalten gegenüber dem Medikament, der Art von dessen Formulierung und dem Zeitpunkt bzw. Intervall, zu welchen die Verabreichung erfolgt.

So kann es in einigen Fällen ausreichend sein, mit weniger als der vorgenannten Mindestmenge auszukommen, während in anderen Fällen die genannte obere Grenze überschritten werden muß. Im Falle der Applikation größerer Mengen kann es empfehlenswert sein, diese in mehreren Einzelgaben über den Tag zu verteilen.


Ausführungsbeispiele

Die Erfindung wird nachstehend an einigen Beispielen näher erläutert.

Herstellungsbeispiele

Beispiel 1

(E/Z)-4-Carboxyethyl-5-(4-fluorphenyl)-2-methyl-pent-4-en-3-on




62 g (0,5 Mol) 4-Fluorbenzaldehyd und 79 g (0,5 mol) Isobutyrylessigsäureethylester werden in 300 ml Isopropanol vorgelegt und mit einem Gemisch aus 2,81 ml (28 mmol) Piperidin und 1,66 ml (29 mmol) Essigsäure in 40 ml Isopropanol versetzt. Man läßt 48 Stunden bei Raumtemperatur rühren, engt im Vakuum ein und destilliert den Rückstand im Hochvakuum.

Kp 0,5 mm: 127 °C

Ausbeute: 108,7 g (82,3 % der Theorie)

Beispiel 2

1,4-Dihydro-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester



98 g (0,371 mol) der Verbindung aus Beispiel 1 werden mit 58,3 g (0,371 mol) 3-Amino-4-methyl-pent-2-en-säure-ethylester in 300 ml Ethanol 18 h am Rückfluß gekocht.

Die Mischung wird auf Raumtemperatur abgekühlt, das Lösungsmittel im Vakuum abgedampft und die nicht umgesetzten Ausgangsmaterialien im Hochvakuum bei 130°C abdestilliert. Den zurückbleibenden Sirup verrührt man mit n-Hexan und saugt den ausgefallenen Niederschlag ab,


wäscht mit n-Hexan nach und trocknet im Exsikkator.

Ausbeute: 35 g (23,4% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,1 - 1,3 (m, 18H); 4,00 - 4,25 (m, 6H); 5,0 (s, 1H); 6,13 (s, 1H); 6,88 (m, 2H); 7,2 (m, 2H) ppm.

Beispiel 3

2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester



Zu einer Lösung von 6,6 g (16,4 mmol) der Verbindung aus Beispiel 2 in 200 ml Methylenchlorid p.A. gibt man 3,8 g (16,4 mmol) 2,3-Dichlor-5,6-dicyan-p-benzochinon und rührt 1 h bei Raumtemperatur. Dann wird über Kieselgur abgesaugt, die Methylenchloridphase dreimal mit je 100 ml Wasser extrahiert und über Magnesiumsulfat getrocknet. Nach Einengen im Vakuum wird der Rückstand an einer Säule (100 g Kieselgel 70-230 mesh, ø 3,5 cm, mit Essigester/Petrolether 1:9) chromatographiert.

Ausbeute: 5,8 g (87,9% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,98 (t, 6H); 1,41 (d, 12H); 3,1 (m, 2H); 4,11 (q, 4H); 7,04 (m, 2H); 7,25 (m, 2H) ppm.


Le A 25 747

Beispiel 4

5

2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-pyridin-3-carbonsäure-ethylester

10



15

Unter Stickstoff gibt man zu einer Lösung von 9,2 g (23 mmol) der Verbindung aus Beispiel 3 in 100 ml trockenem Tetrahydrofuran bei -10°C bis -5°C 21 ml (80,5 mmol) einer 3,5 molaren Lösung von Natrium-bis-(2-methoxyethoxy)-dihydroaluminat in Toluol und rührt 5 h bei Raumtemperatur. Nach Abkühlen auf 0°C tropft man vorsichtig 100 ml Wasser zu und extrahiert dreimal mit je 100 ml Essigester. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingedampft. Der Rückstand wird an einer Säule (200 g Kieselgel 70-230 mesh, $\varnothing$ 4,5 cm, mit Essigester/Petrolether 3:7) chromatographiert.

25

Ausbeute: 7,2 g (87,2% der Theorie)

30


$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,95 (t, 3H); 1,31 (m, 12H); 3,05 (m, 1H); 3,48 (m, 1H), 3,95 (q, 2H); 4,93 (d, 2H); 7,05 - 7,31 (m, 4H) ppm.

35

Le A 25 747

Beispiel 5

5- (tert. Butyldimethylsilyloxymethyl)-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3-carbonsäure-ethylester



Zu einer Lösung von 4,5 g (12,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 4 in 50 ml Dimethylformamid gibt man bei Raumtemperatur 2,1 g (13,8 mmol) tert. Butyldimethylsilylchlorid, 1,8 g (27,5 mmol) Imidazol und 0,05 g 4-Dimethylaminopyridin. Es wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt, mit 200 ml Wasser versetzt und mit 1 N Salzsäure auf pH 3 eingestellt. Die Mischung wird dreimal mit je 100 ml Ether extrahiert, die vereinigten organischen Phasen einmal mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Der Rückstand wird an einer Säule (150 g Kieselgel, 70-230 mesh, ø 4 cm, mit Essigester/Petrolether 1:9) chromatographiert.


Ausbeute: 4,2 g (73,7% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,0 (s, 6H); 0,9 (s, 9H); 1,02 (t, 3H); 1,35 (m, 12H); 3,1 (m, 1H); 3,47 (m, 1H); 4,03 (q, 2H); 4,4 (s, 2H); 7,05 - 7,40 (m, 4H) ppm.

Le A 25 747

Beispiel 6

3-(tert.-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-pyridin



Unter Stickstoff gibt man zu einer Lösung von 4,2 g (9,2 mmol) der Verbindung aus Beispiel 5 in 100 ml trockenem Tetrahydrofuran bei 0°C 9,2 ml (32,2 mmol) einer 3,5 molaren Lösung von Natrium-bis-(2-methoxyethoxy)-dihydroaluminat in Toluol und rührt über Nacht bei Raumtemperatur. Nach Abkühlen auf 0°C tropft man vorsichtig 100 ml Wasser zu und extrahiert dreimal mit je 100 ml Essigester. Die vereinigten organischen Phasen werden einmal mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Der Rückstand wird an einer Säule (100 g Kieselgel 70-230 mesh, ø 3,5 cm, mit Essigester/Petrolether 2:8) chromatographiert.


Ausbeute: 2,4 g (60% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,2 (s, 6H); 1,11 (s, 9H); 1,6 (m, 12H); 3,7 (m, 2H); 4,55 (s, 2H); 4,65 (d, 2H); 7,35 - 7,55 (m, 4H) ppm.

Le A 25 747

Beispiel 7

5-*(tert.*-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2,6-diisopropyl)-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3-carbaldehyd



Zu einer Lösung von 2,7 g (6,2 mmol) der Verbindung aus Beispiel 6 in 50 ml Methylenchlorid gibt man 1,24 g (12,4 mmol) neutrales Aluminiumoxid und 2,7 g (12,4 mmol) Pyridiniumchlorochromat und rührt 1 h bei Raumtemperatur. Man saugt über Kieselgur ab und wäscht mit 200 ml Methylenchlorid nach. Die Methylenchloridphase wird im Vakuum eingeeengt und der Rückstand an einer Säule (100 g Kieselgel 70-230 mesh, ø 3,5 cm, mit Essigester/Petrolether 1:9) chromatographiert.


Ausbeute: 2 g (77% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,0 (s, 6H); 0,9 (s, 9H); 1,35 (m, 12H); 3,5 (m, 1H); 3,9 (m, 1H); 4,38 (s, 2H); 7,15 - 7,35 (m, 4H); 9,8 (s, 1H) ppm.

Le A 25 747

Beispiel 8

(E)-3-[5-tert.-Butyldimethylsilyloxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-prop-2-enal



Unter Stickstoff tropft man zu einer Suspension von 180 mg (6 mmol) 80%igem Natriumhydrid in 15 ml trockenem Tetrahydrofuran bei -5°C 1,6 g (6 mmol) Diethyl-2-(cyclohexylamino)-vinylphosphonat gelöst in 30 ml trockenem Tetrahydrofuran. Nach 30 min werden bei derselben Temperatur 2 g (4,7 mmol) der Verbindung aus Beispiel 7 in 40 ml trockenem Tetrahydrofuran zugetropft und 30 min zum Rückfluß erwärmt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird der Ansatz in 200 ml eiskaltes Wasser gegeben und dreimal mit je 100 ml Essigester extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen und über Magnesiumsulfat getrocknet. Nach Einengen im Vakuum wird der Rückstand in 70 ml Toluol aufgenommen, mit einer Lösung von 0,9 g (7 mmol) Oxalsäure-Dihydrat in 30 ml Wasser versetzt und 30 min zum Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur werden die Phasen getrennt, die organische Phase mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Der

Le A 25 747


Rückstand wird an einer Säule (100 g Kieselgel 70-230
5 mesh ø 3,5 cm, mit Essigester/Petrolether 1:9) chroma-
tographiert.

Ausbeute: 2 g (95% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,0 (s, 6H); 0,9 (s, 9H); 1,38 (m,
12H); 3,36 (m, 1H); 3,48 (m, 1H);
10 4,48 (s, 2H); 6,03 (dd, 1H); 7,12 -
7,35 (m, 5H); 9,45 (d, 1H) ppm.

Beispiel 9

15 Methyl-(E)-7-[5-tert.butyltrimethylsilyloxymethyl-2,6-
diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-5-hydroxy-3-
oxo-hept-6-enoat



Unter Stickstoff tropft man zu einer Suspension von 330
mg (11 mmol) 80%igem Natriumhydrid in 30 ml trockenem
Tetrahydrofuran bei -5°C 1,02 g (8,8 mmol) Acetessigsäu-
remethylester in 5 ml trockenem Tetrahydrofuran. Nach 15
30 min werden bei derselben Temperatur 5,5 ml (8,8 mmol)
15%iges Butyllithium in n-Hexan zugetropft und 15 min
nachgerührt. Anschließend werden 2 g (4,4 mmol) der Ver-
bindung aus Beispiel 8 gelöst in 20 ml trockenem Tetra-

35

Le A 25 747

5 Zu einer Lösung von 1,9 g (3,7 mmol) der Verbindung aus
Beispiel 9 in 40 ml trockenem Tetrahydrofuran gibt man
bei Raumtemperatur 4,5 ml (4,5 mmol) 1 M Triethylboran-
Lösung in Tetrahydrofuran, leitet während 5 min Luft
durch die Lösung und kühlt auf -30°C Innentemperatur ab.
Es werden 160 mg (4,5 mmol) Natriumborhydrid und langsam
10 3 ml Methanol zugegeben, 30 min bei -30°C gerührt und
dann mit einem Gemisch von 12 ml 30%igem Wasserstoffper-
oxid und 25 ml Wasser versetzt. Die Temperatur läßt man
dabei bis 0°C ansteigen und rührt noch 30 min nach. Die
Mischung wird dreimal mit je 70 ml Essigester extra-
15 hiert, die vereinigten organischen Phasen je einmal mit
gesättigter Natriumhydrogencarbonat-Lösung und gesättig-
ter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsul-
fat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Der Rückstand
wird an einer Säule (80 g Kieselgel 230-400 mesh, $\varnothing$ 2,5
20 cm, mit Essigester/Petrolether 4:6) chromatographiert.
Ausbeute: 1,5 g (78,9% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,0 (s, 6H); 0,9 (s, 9H); 1,35 (m,
12H); 1,5 (m, 2H); 2,5 (m, 2H); 3,35
(m, 1H); 3,45 (m, 1H); 3,8 (s, 3H);
25 4,15 (m, 1H); 4,45 (m, 3H); 5,32
(dd, 1H); 6,38 (d, 1H); 7,05 - 7,25
(m, 4H) ppm.


30

35

Le A 25 747

Beispiel 11

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Zu 8,4 g (14,6 mmol) der Verbindung aus Beispiel 10 gelöst in 135 ml Methanol gibt man 15 ml 0,1 N Salzsäure und rührt 4 Tage bei Raumtemperatur. Die Mischung wird im Vakuum eingeeengt, der Rückstand in Dichlormethan aufgenommen und mehrmals mit gesättigter Natriumhydrogencarbonat-Lösung gewaschen. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet, im Vakuum eingeeengt und der Rückstand an einer Säule (Kieselgel 70-230 mesh, mit Essigester/Petrolether 4:6) chromatographiert.

Ausbeute: 3,5 g (52,5% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,25 (m, 6H); 1,33 (d, 6H); 1,40 (m, 2H); 2,41 (m, 2H); 3,30 (m, 1H); 3,45 (m, 1H); 3,71 (s, 3H); 4,07 (m, 1H); 4,28 (m, 1H); 4,39 (d, 2H); 5,25 (dd, 1H); 6,30 (d, 1H); 7,08 (m, 4H) ppm.


Le A 25 747

Beispiel 12

5

5-Benzylloxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3-carbonsäure-ethylester

10



15

Unter Stickstoff tropft man zu einer Suspension von 414 mg (13,8 mmol) 80%igem Natriumhydrid in 20 ml Dimethylformamid bei 0°C 4,5 g (12,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 4 in 50 ml Dimethylformamid und rührt 30 min. bei derselben Temperatur. Anschließend werden 1,65 ml (13,8 mmol) Benzylbromid in 20 ml Dimethylformamid zugeotropft und weitere 3 h bei Raumtemperatur gerührt. Die Mischung wird bei 0°C auf 300 ml Wasser gegossen und dreimal mit je 150 ml Ether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden einmal mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeengt. Der Rückstand wird an einer Säule (100 g Kieselgel 70-230 mesh, ø 3,5 cm, mit Essigester/Petrolether 1:10) chromatographiert.

30 Ausbeute: 2,6 g (46,4% der Theorie)

30

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,95 (t, 3H); 1,3 (m, 12H); 3,05 (m, 1H); 3,38 (m, 1H); 3,97 (q, 2H); 4,2 (s, 2H); 4,38 (s, 2H); 7,02 (m, 2H); 7,25 (m, 7H) ppm.

35


Le A 25 747

Beispiel 13

5

3-Benzylloxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-pyridin

10



15

2,5 g (5,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 12 werden analog Beispiel 6 umgesetzt.

Ausbeute: 1,5 g (68% der Theorie)

20


$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,3 (m, 12H); 3,35 (m, 1H); 3,45 (m, 1H); 4,13 (s, 2H); 4,35 (m, 4H); 7,08 (m, 2H); 7,25 (m, 7H) ppm.

Beispiel 14

25

5-Benzylloxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3-carbaldehyd

30



35

Le A 25 747


1,5 g (3,6 mmol) der Verbindung aus Beispiel 13 werden
analog Beispiel 7 umgesetzt.

Ausbeute: 1,1 g (75,9% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,3 (m, 12H); 3,4 (m, 1H); 3,85 (m,
1H); 4,18 (s, 2H); 4,38 (s, 2H);
7,05 - 7,35 (m, 9H); 9,75 (s, 1H)
ppm.

Beispiel 15

(E)-3-[5-Benzyloxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-prop-2-enal



1,1 g (2,7 mmol) der Verbindung aus Beispiel 14 werden
analog Beispiel 8 umgesetzt.

Ausbeute: 450 mg (38,8% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,35 (m, 12H); 3,35 (m, 1H); 3,42
(m, 1H); 4,21 (s, 2H); 4,41 (s, 2H);
6,0 (dd, 1H); 7,05 - 7,4 (m, 10H);
9,38 (d, 1H) ppm.


Le A 25 747

Beispiel 16

5

Methyl-(E)-7-[5-benzyloxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-5-hydroxy-3-oxo-hept-6-enoat

10



15

431 mg (1 mmol) der Verbindung aus Beispiel 15 werden analog Beispiel 9 umgesetzt.


Ausbeute: 300 mg (54,8% der Theorie)

20

Beispiel 17

Methyl-erythro-(E)-7-[3-benzyloxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-5-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

25



30

35

Le A 25 747


300 mg (0,55 mmol) der Verbindung aus Beispiel 16 werden
analog Beispiel 10 umgesetzt.

Ausbeute: 180 mg (59,6% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,2 - 1,35 (m, 12H); 1,4 (m, 2H);
2,41 (m, 2H); 3,3 (m, 2H); 3,73 (s,
3H); 4,05 (m, 1H); 4,15 (s, 2H);
4,28 (m, 1H); 4,35 (s, 2H); 5,25
(dd, 1H); 6,3 (d, 1H); 6,95 - 7,35
(m, 9H) ppm.

Beispiel 18

1,4-Dihydro-4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-
pyridin-3,5-dicarbonsäure-3-ethyl-5-methylester



15 g (56,8 mmol) der Verbindung aus Beispiel 1 und 6,5 g
(56,8 mol) 3-Aminocrotonsäuremethylester werden in 150
ml Ethanol 20 h am Rückfluß gekocht. Die Mischung wird
abgekühlt, abfiltriert und im Vakuum eingeeengt. Der
Rückstand wird an einer Säule (250 g Kieselgel 70-230

Le A 25 747

1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

mesh, ø 4,5 cm, mit Essigester/Petrolether 3:7)

5 chromatographiert.

Ausbeute: 13,6 g (66,3% der Theorie)


$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,2 (m, 9H); 2,35 (s, 3H); 3,65 (s, 3H); 4,12 (m, 3H); 4,98 (s, 1H); 5,75 (s, 1H); 6,88 (m, 2H); 7,25 (m, 2H) ppm.

10

Beispiel 19

4-(4-Fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-pyridin-3,5-dicarbonsäure-3-ethyl-5-methylester

15



20

13,5 g (37,4 mmol) der Verbindung aus Beispiel 18 werden analog Beispiel 3 umgesetzt.

25

Ausbeute: 9,5 g (70,9% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,9t (t, 3H); 1,31 (d, 6H); 2,6 (s, 3H); 3,11 (m, 1H); 3,56 (s, 3H); 4,03 (q, 2H); 7,07 (m, 2H); 7,25 (m, 2H) ppm.


30

35

Le A 25 747

Beispiel 20

4-(4-Fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-2-isopropyl-6-methyl-
pyridin-3-carbonsäure-ethylester



Unter Stickstoff gibt man zu einer Lösung von 9,5 g
(26,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 19 in 200 ml
absolutem Tetrahydrofuran bei 0°C 26,5 ml (92,75 mmol)
einer 3,5 molaren Lösung von Natrium-bis-(2-methoxy-
ethoxy)-dihydroaluminat in Toluol und rührt 30 min bei
Raumtemperatur. Nach erneutem Abkühlen auf 0°C, tropft
man vorsichtig 200 ml Wasser zu und extrahiert dreimal
mit je 150 ml Essigester. Die vereinigten organischen
Phasen werden einmal mit gesättigter Natriumchlorid-
Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im
Vakuum eingeeengt. Der Rückstand wird an einer Säule (200
g Kieselgel 70-230 mesh, ø 4,5 cm, mit Essigester/
Petrolether 2:8) chromatographiert.

Ausbeute: 4,2 g (48,2% der Theorie)

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,98 (t, 3H); 1,3 (d, 6H); 2,73 (s,
3H); 3,05 (m, 1H); 3,98 (q, 2H);
4,45 (d, 2H); 7,1 (m, 2H); 7,25 (m,
2H) ppm.

Le A 25 747

17. JAN 1988 08:08:00


NOV 1988 08:08:00

Beispiel 21

5

(E/Z)-4-Carboxyethyl-5-(4-fluor-3-phenoxyphenyl)-2-methyl-pent-4-en-3-on

10



15

49 g (0,31 mol) Isobutyrylessigsäureethylester und 67 g (0,31 mol) 3-Phenoxy-4-fluorbenzaldehyd werden in 300 ml Isopropanol vorgelegt und mit einem Gemisch aus 1,81 ml (18 mmol) Piperidin und 1,06 ml (18,6 mmol) Essigsäure in 30 ml Isopropanol versetzt. Man rührt über Nacht bei Raumtemperatur, engt dann im Vakuum ein und trocknet im Hochvakuum.

20

Ausbeute: 110 g (wurde ohne weitere Reinigung in Beispiel 22 eingesetzt).

25

Beispiel 22

30


1,4-Dihydro-2,6-diisopropyl-4-(4-fluor-3-phenoxyphenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester

35

Le A 25 747

5

10



15

30 g (84,3 mmol) der Verbindung aus Beispiel 21 und 13,2 g (84,3 mmol) 3-Amino-4-methyl-pent-2-en-säure-ethyl-ester werden in 150 ml Ethanol über Nacht am Rückfluß gekocht. Man kühlt die Mischung auf 0°C, saugt den ausgefallenen Niederschlag ab, wäscht mit Petrolether nach und trocknet im Exsikkator.

Ausbeute: 18,4 g (44,2% der Theorie)

20

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,05 - 1,25 (m, 18H); 4,05 - 4,2 (m, 6H); 4,95 (s, 1H); 6,03 (s, 1H); 6,85 - 7,1 (m, 6H); 7,3 (m, 2H) ppm.


25

Beispiel 23

2,6-Diisopropyl-4-(4-fluor-3-phenoxy-phenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester

30

35



Le a 26 164

17.000 101.4 269880

100% 100% 100%

100%

18,4 g (37,2 mmol) der Verbindung aus Beispiel 22 werden
5 analog Beispiel 3 umgesetzt.

Ausbeute: 17,6 g (96% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,05 (t, 6H); 1,29 (d, 12H); 3,08
(m, 2H); 4,05 (q, 4H); 6,95 - 7,35
(m, 8H) ppm.


10

Beispiel 24

2,6-Diisopropyl-4-(4-fluor-3-phenoxy-phenyl)-5-hydroxy-
15 methyl-pyridin-3-carbonsäure-ethylester

15

20



10 g (20,3 mmol) der Verbindung aus Beispiel 23 werden
25 analog Beispiel 4 umgesetzt.

Ausbeute: 4,9 g (59,0% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,07 (t, 3H); 1,3 (m, 12H); 3,04 (m,
1H); 3,47 (m, 1H); 4,05 (m, 2H);
4,45 (s, 2H); 6,95 - 7,4 (m, 8H)
30 ppm.

30

35


Le A 25 747

Beispiel 25

5

1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäuremethyl-(2-cyanethyl)-ester

10



15

In 150 ml Ethanol werden 15,4 g (0,1 mol) 3-Aminocroton-
säure-2-cyanethylester, 12,4 g (0,1 mol) p-Fluorbenzal-
dehyd und 11,6 g Acetessigsäuremethylester über Nacht
unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Entfernen des Lösemit-
tels am Rotationsverdampfer nimmt man in Essigester auf,
wäscht mit Wasser, trocknet und erhält nach Entfernen
des Lösemittels im Vakuum 33,8 g Rohprodukt.

20

Rohausbeute: 94,4% der Theorie

$^1\text{H-NMR}$ (DMSO): δ = 1,15 (tr, 3H, CH_3); 2,3 (m, 6H,
25 CH_3); 2,75 (m, 2H, CH_2CN); 3,55 (s,
3H, OCH_3); 4,15 (m, 2H, OCH_2); 4,9
(m, 1H, p- FC_6H_4 -CH); 6,9 - 7,3 (m,
4H, Aromaten -H); 8,8, 9,0 (2s, 1H,
30 NH) ppm.


35

35

Le A 25 747

Beispiel 26

1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-methylester



Zu einer Lösung von 12 g (0,3 mol) Natriumhydroxid in 300 ml Wasser/150 ml 1,2-Dimethoxyethan gibt man 33,8 g Rohprodukt aus Beispiel 25. Die Suspension erwärmt sich, es bildet sich eine klare Lösung. Nach Rühren bei 25°C über Nacht gibt man 100 ml Wasser hinzu, wäscht dreimal mit Dichlormethan, stellt mit verdünnter Salzsäure auf pH 1 ein und extrahiert das klebrig ausgefallene Produkt mit Dichlormethan. Nach dem Trocknen und Einengen des Lösemittels im Vakuum erhält man 25,8 g Rohprodukt.

Rohausbeute: 84,5% der Theorie

$^1\text{H-NMR}$ (DMSO): δ = 2,25 (s, 6H, CH_3); 3,55 (s, 3H, OCH_3); 4,85 (breites s, 1H, $\text{FC}_6\text{H}_4\text{-CH}$); 6,9 - 7,3 (m, 4H, Aromaten-H); 8,85 (breites s, 1H, NH); 1,7 (breit, 1H, COOH) ppm.


Le A 25 747

Beispiel 27

5

1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3-carbonsäuremethylester

10



15

In 90 ml Bis-(2-hydroxyethyl)-ether (Diglycol) werden
12,5 g (41 mmol) Rohprodukt aus Beispiel 26 suspendiert
und auf 200°C Badtemperatur erhitzt, wobei eine starke
Gasentwicklung stattfindet. Nach beendeter Gasentwick-
lung wird die nun klare Lösung schnell abgekühlt, mit
500 ml Wasser/500 ml Ether gewaschen, die wäßrige Phase
noch zweimal mit Ether gewaschen, die vereinigten Ether-
phasen mit Wasser, 1 N Natronlauge und Wasser gewaschen
und getrocknet. Nach dem Entfernen des Lösemittels am
Rotationsverdampfer erhält man 8,7 g Rohprodukt.
Rohausbeute: 81,2% der Theorie

30


35

Le A 25 747

Beispiel 28

- 5 2,6-Dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3-carbonsäuremethylester

10




- 15 In 90 ml Eisessig werden 8,6 g (33 mmol) Rohprodukt aus Beispiel 27 und 3,3 g Chrom-VI-oxid 1 h unter Rückfluß erhitzt. Das Lösemittel wird am Rotationsverdampfer entfernt, der Rückstand mit Essigester/Petrolether 1:1 versetzt und vom Ungelöstem abgesaugt. Die Mutterlauge wird
- 20 im Vakuum eingeeengt und über 500 g Kieselgel mit Essigester/Petrolether 1:1 chromatographiert.
Ausbeute: 1,45 g (16,3% der Theorie)
 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 2,6 (s, 6H, CH_3); 3,65 (s, 3H, OCH_3); 7,0 (s, 1H, Pyridin-H); 7,1 - 7,4 (m, 4H, Aromaten-H) ppm.
- 25

Beispiel 29

- 2,6-Dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-pyridin

30

35



Le A 25 747

17.11.1980

10.11.1980

Ausbeute: 93% der Theorie

Beispiel 30

25

Cc1cc(C)c(C=O)c(cc1N)c2ccc(F)cc2

35

Le A 25 747


5 phiert nach Einengen über 150 g Kieselgel mit Dichlor-
methan/Methanol 10:1 und erhält 0,71 g Produkt.

Ausbeute: 72% der Theorie

¹H-NMR (DMSO): δ = 2,5 (s, 3H, CH₃); 2,7 (s, 3H, CH₃);
7,2 (s, 1H, Pyridin-H); 7,3 - 7,6
10 (m, 4H, Aromaten-H); 9,95 (s, 1H,
CHO) ppm.

Beispiel 31

15 (E)-3-[2,6-Dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-prop-
2-enal



25 Zu 75,5 mg (3,2 mmol) Natriumhydrid in 3 ml absolutem
Tetrahydrofuran gibt man unter Stickstoffatmosphäre in-
nerhalb 15 min bei 0°C 778 mg (3,2 mmol) [2-(Cyclohexyl-
amino)vinyl]-phosphorsäurediethylester in 3 ml Tetrahy-
drofuran, rührt 15 min bei 0°C und tropft eine Lösung
30 von 0,6 g (2,6 mmol) der Verbindung aus Beispiel 30 in
3 ml Acetonitril/3 ml Dimethylformamid zu. Nach 1 h

35

Le A 25 747

15 min tropft man bei 0°C 0,55 ml (0,77 mmol) n-Butyl-
 5 lithium (1,5 m in Hexan) hinzu, rührt 15 min bei 0°C und
 tropft 180 mg (0,7 mmol) der Verbindung aus Beispiel 31
 in 3 ml Tetrahydrofuran hinzu. Nach 1 h hydrolysiert man
 mit gesättigter Ammoniumchloridlösung, wäscht dreimal
 10 mit Dichlormethan, trocknet die organische Phase und er-
 hält nach Entfernen des Lösemittels im Vakuum 0,25 g Öl.
 Rohausbeute: 95,5% der Theorie


¹H-NMR (CDCl₃): δ = 2,55, 2,58 (2s, 6H, CH₃); 2,6 (2H,
 CH₂); 3,45 (s, 2H, CH₂CO₂); 3,75 (s,
 3H, OCH₃); 4,6 (m, 1H, CHOH); 5,45
 15 (dd, 1H, CH-CHOH); 6,5 (d, 1H,
 CH=CH-CHOH); 6,9 (s, 1H, Pyridin-H);
 7,0 - 7,4 (m, 4H, Aromaten-H) ppm.

Beispiel 33

20

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-
 pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

25



30

Durch eine Lösung von 0,25 g (0,67 mmol) der Verbindung
 aus Beispiel 32 und 0,81 ml (0,81 mmol) Triethylboran

35

Le A 25 747


Analog Beispiel 25 erhält man aus 2,75 g (0,1 mol)
 5 Isopropyliden-4-fluor-benzoylessigsäureethylester und
 15,4 g (0,1 mol) 3-Aminocrotonsäure-2-cyanethylester
 32,6 g Rohprodukt.

Rohausbeute: 93,6% der Theorie

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,7 - 1,3 (m, 9H, CH_3); 2,3, 2,35
 10 (2s, 3H, CH_3); 2,75 (m, 2H, CH_2CN);
 3,9 - 4,4 (m, 5H, CHCH_3 , CH_2O); 5,6
 5,7, 6,1, 6,2 (4s, 1H, CH); 7,0 -
 8,0 (m, 4H, Aromaten-H) ppm.

15 Beispiel 35

1,4-Dihydro-2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methyl-
 pyridin-3,5-dicarbonsäure-3-ethylester



25 Analog Beispiel 26 erhält man aus 36 g (93,2 mmol) der
 Verbindung aus Beispiel 34 7,17 g Rohprodukt.

Rohausbeute: 22,2% der Theorie


$^1\text{H-NMR}$ (DMSO): δ = 0,8 (m, 9H, CH_3); 1,6 (m, 1H,
 30 CHCH_3); 2,2, 2,25 (2s, 3H, CH_3); 3,8
 (m, 3H, CH_2O , CH); 7,2 - 7,5 (m, 4H,
 Aromaten-H) ppm.

35

Le A 25 747

5

10




15

20

25

30



Le A 25 747


5 Analog Beispiel 28 erhält man aus 6,95 g (22,9 mmol) der
Verbindung aus Beispiel 36 nach Chromatographie
(Kieselgel, Toluol/Ethanol 95:5) 2,82 g.

Ausbeute: 41% der Theorie

10 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,0 (tr, 3H, CH_3); 1,3 (d, 6H,
 CH_3CH); 2,6 (s, 3H, CH_3); 3,1 (sept,
1H, CH); 4,1 (q, 2H, CH_2O); 7,0 (s,
1H, Pyridin-H); 7,1 - 7,6 (m, 4H,
Aromaten-H) ppm.

15 Beispiel 38

2-(4-Fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-4-isopropyl-6-methyl-
pyridin



25

5,5 g (18,3 mmol) der Verbindung aus Beispiel 37 werden
analog Beispiel 29 umgesetzt. Nach Trocknen im
Exsikkator erhält man 4,24 g Rohprodukt.

Ausbeute: 89% der Theorie

30 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,3 (d, 6H); 2,55 (s, 3H); 3,36 (m,
1H); 4,49 (s, 2H); 7,09 (m, 3H);
7,53 (m, 2H) ppm.

35


Le A 25 747

Beispiel 39

5

2-(4-Fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methyl-pyridin-3-carbaldehyd

10



15 4,1 g (15,85 mmol) der Verbindung aus Beispiel 38 werden analog Beispiel 30 umgesetzt.

Ausbeute: 2,23 g (54,7% der Theorie)


$^1\text{H-NMR}(\text{CDCl}_3)$: δ = 1,3 (d, 6H); 2,65 (s, 3H); 3,91 (m, 1H); 7,10 - 7,28 (m, 3H); 7,5 (m, 2H); 9,91 (s, 1H) ppm.

20

Beispiel 40

25 (E)-3-[2-(4-Fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-prop-2-enal

30



35

Le A 25 747

192-309680


2,13 g (8,3 mmol) der Verbindung aus Beispiel 39 werden analog Beispiel 8 umgesetzt.

Ausbeute: 1,34 g Rohprodukt (57% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 12,8 (d, 6H); 2,6 (s, 3H); 3,27 (m, 1H); 6,11 (dd, 1H); 7,05 - 7,55 (m, 6H); 9,55 (d, 1H) ppm.

Beispiel 41

Methyl-(E)-7-[2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methylpyrid-3-yl]-5-hydroxy-3-oxo-hept-6-enoat



1,07 g (3,78 mmol) der Verbindung aus Beispiel 40 werden analog Beispiel 32 umgesetzt.

Ausbeute: 0,34 g Rohprodukt (22,5% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,25 (d, 6H); 2,5 (m, 2H); 2,57 (s, 3H); 3,2 (m, 1H); 3,42 (s, 2H); 3,75 (s, 3H); 4,45 (m, 1H); 5,3 (dd, 1H); 6,6 (d, 1H); 7,05 (m, 3H); 7,43 (m, 2H) ppm.


Le A 25 747

Beispiel 42

5

Methyl-erythro-(E)-7-[2-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

10



15

200 mg (0,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 41 werden analog Beispiel 33 umgesetzt.

Ausbeute: 21,5 mg (10,7% der Theorie)

20


$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,23 (d, 6H); 1,5 (m, 2H); 2,45 (m, 2H); 2,58 (s, 3H); 3,21 (m, 1H); 3,72 (s, 3H); 4,11 (m, 1H); 4,38 (m, 1H); 5,31 (dd, 1H); 6,55 (d, 1H); 7,05 (m, 3H); 7,4 (m, 2H) ppm.

25

Beispiel 43

1,4-Dihydro-4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-pyridin-3,5-dicarbonsäure-5-(2-cyanethyl)-3-ethylester

30



35

Le A 25 747

17.000 195-400 000

2001 10 10

5 Analog Beispiel 25 erhält man aus 26,4 g (0,1 mol) 4-Fluorbenzyliden-2-butanoylessigsäureethylester und 15,4 g (0,1 mol) 3-Aminocrotonsäure-2-cyanethylester 44,6 g Rohprodukt.

Rohausbeute: 100% der Theorie

10 $^1\text{H-NMR}$ (DMSO): δ = 1,15 (m, 9H, $\text{CH}_3\text{-CH}_2$, $\text{CH}_3\text{-CH-CH}_3$); 2,3 (s, 3H, CH_3); 2,45 (m, 2H, $\text{CH}_2\text{-CN}$); 4,0 (q, 2H, CH_2O); 4,1 (m, 1H, CHCH_3); 4,15 (m, 2H, CH_2O); 4,4 (s, 1H, p- $\text{FC}_6\text{H}_4\text{CH}$); 6,9 - 7,3 (m, 4H, Aromaten-H); 8,3 (s, 1H, NH) ppm.


15

Beispiel 44

1,4-Dihydro-4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methylpyridin-3,5-dicarbonsäure-3-ethylester

20

25



30

Analog Beispiel 26 erhält man aus 10,2 g (25,6 mmol) der Verbindung des Beispiels 43 8,5 g Rohprodukt.

Rohausbeute: 95% der Theorie

35 $^1\text{H-NMR}$ (DMSO): δ = 1,15 (m, 9H, CH_3CH_2 , CH_3CHCH_3); 2,25, 2,3 (2s, 3H, CH_3); 4,0 (m, 3H, CH_2O , CH_3CH); 4,85, 6,3 (2s, 1H, $\text{FC}_6\text{H}_4\text{-CH}$); 6,9 - 7,3 (m, 4H, Aromaten-H); 8,1 (s, 1H, NH); 10,9 (s, 1H, COOH) ppm.


Le A 25 747

17.11.1951-20.00.00

3200 10 10

Beispiel 45

1,4-Dihydro-4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-
pyridin-3-carbonsäureethylester



Analog Beispiel 27 erhält man aus 8,35 g (24 mmol) der
Verbindung aus Beispiel 44 5,6 g Rohprodukt.


Rohausbeute: 77,5% der Theorie

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,2 (m, 9H, H_3CH_2 , CH_3CHCH_3); 2,6
(s, 3H, CH_3); 4,1 (m, CHCH_3 , CH_2O);
4,5, 4,6 (2d, 1H, $\text{FC}_6\text{H}_4\text{CH}$); 5,3 (s,
1H, NH); 6,9 - 7,4 (m, 5H, Aromaten-H) ppm.

Beispiel 46

4-(4-Fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-pyridin-3-carbon-
säureethylester

Le A 25 747



Analog Beispiel 37 erhält man aus 5,5 g (18,2 mmol) der Verbindung des Beispiels 45 nach Chromatographie über Kieselgel (Dichlormethan) 2,9 g rotes Öl.


Ausbeute: 53% der Theorie

15 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,05 (tr, 3H, CH_3CH_2); 1,35 (d, 6H, CH_3CH); 2,6 (s, 3H, CH_3); 3,15 (sept., 1H, CH); 4,1 (q, 2H, CH_2); 6,95 (s, 1H, Pyridin-H); 7,1 - 7,4 (m, 4H, Aromaten-H) ppm.

20

Beispiel 47

4-(4-Fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-2-isopropyl-6-methylpyridin



35

Le A 25 747

Ausbeute: 91% der Theorie

10

15 4-(4-Fluorophenyl)-2-isopropyl-6-methyl-pyridin-3-
carbaldehyd




25

30

Le A 25 747

Beispiel 49

(E)-3-[4-(4-Fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-prop-2-enal




Analog Beispiel 31 erhält man aus 0,51 g (1,99 mmol) der Verbindung des Beispiels 48 0,48 g.

Ausbeute: 85,5% der Theorie

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,2 (d, 6H, CH_3CH); 2,5 (s, 3H, CH_3); 3,3 (sept, 1H, CH); 6,0 (dd, 1H, CHCHO); 6,9 (s, 1H, Pyridin-H); 7,0 - 7,3 (m, 4H, Aromaten-H); 7,5 (d, 1H, CH); 9,5 (d, 1H, CHO) ppm.

Beispiel 50

Methyl-(E)-7-[4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-5-hydroxy-3-oxo-hept-6-enoat



Le A 25 747


5 Analog Beispiel 32 erhält man aus 0,41 g (1,44 mmol) der
Verbindung des Beispiels 49 0,22 g.

Ausbeute: 38,2% der Theorie

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,3 (d, 6H, CH₃CH); 2,5 (s, 3H,
CH₃); 3,3 (sept, 1H, CH); 3,5 (s,
2H, CH₂); 3,25 (s, 3H, OCH₃); 4,6
10 (m, 1H; CHOH); 5,3 (dd, 1H, CH); 6,6
(d, 1H, CH); 6,9 (s, 1H, Pyridin-H);
7,0 - 7,3 (m, 4H, Aromaten-H) ppm.

15 Beispiel 51

Methyl-erythro-(E)-7-[4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-6-
methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



1,2 g (3,01 mmol) der Verbindung aus Beispiel 50 werden
analog Beispiel 33 umgesetzt.

Ausbeute: 320 mg (26,6% der Theorie)

30 ¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,28 (d, 6H); 1,40 (m, 2H); 2,45 (m,
2H); 2,55 (s, 3H); 3,35 (m, 1H);
3,72 (s, 3H); 4,15 (m, 1H); 4,35 (m,
1H); 5,30 (dd, 1H); 6,55 (d, 1H);
6,88 (s, 1H); 7,0 - 7,30 (m, 4H,
35 ppm.


Le A 25 747

Beispiel 52

5

1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-5-phenyl-
pyridin-3-carbonsäuremethylester

10



15 In 150 ml Ethanol werden 24,0 g (0,1 mol) 1-(4-Fluorphenyl)-2-phenyl-buten-3-on, 23 g (0,2 mol) 3-Amino-croton-säuremethylester und 6 ml (0,1 mol) Eisessig über Nacht unter Rückfluß erhitzt, nach Zugabe von 11,5 g (0,1 mol) 3-Aminocrotonsäuremethylester und 3 ml Eisessig 18 h
20 unter Rückfluß erhitzt und nach wiederholter Zugabe von 11,5 g (0,1 mol) 3-Aminocrotonsäuremethylester und 3 ml Eisessig nochmals 18 h unter Rückfluß erhitzt. Das Lösemittel wird im Vakuum entfernt, der Rückstand mit 80 ml Methanol versetzt, Ungelöstes abgesaugt, die methanolische Lösung in Vakuum eingeeengt, aus dem Rückstand bei 73°C - 90°C/18 mbar und anschließend bei 60°C bis 70°C/0,2 mbar überschüssigen Aminocrotonester abdestilliert. Man erhält 37,5 g Rohprodukt als glasharte Schmelze.

30 Rohausbeute: >100% der Theorie

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,85 (s, 3H, CH_3); 2,85 (s, 3H, CH_3); 3,6 (s, 3H, CH_3); 4,65, 5,4 (2br, s, 1H, CH); 6,7 - 7,4 (m, 9H, Aromaten-H) ppm.

35

Le A 25 747

17.11.2014 10:00


17.11.2014

Beispiel 53

5

2,6-Dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-5-phenyl-pyridin-3-carbonsäuremethylester

10



15 Analog Beispiel 37 erhält man aus 37,3 g (0,1 mol, roh) der Verbindung des Beispiels 52 20,4 g Feststoff,

Ausbeute: 49,4% der Theorie

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 2,45 (s, 3H, CH_3); 2,6 (s, 3H, CH_3);
3,5 (s, 3H, CH_3); 6,7 - 7,4 (m, 9H,

20


Aromaten-H) ppm.

Beispiel 54

25

2,6-Dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-5-phenyl-pyridin

30



Analog Beispiel 29 erhält man aus 20,2 g (60 mmol) der Verbindung des Beispiels 53, 12,4 g Rohprodukt.


35 Ausbeute: 67% der Theorie)

Le A 25 747

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 2,0 (br, s, 1H, OH); 2,3 (s, 3H, CH₃); 2,75 (s, 3H, CH₃); 4,45 (s, 2H, CH₂); 6,8 - 7,3 (m, 9H, Aromaten-H) ppm.

Beispiel 55

2,6-Dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-5-phenyl-pyridin-3-carb-
aldehyd




Analog Beispiel 30 erhält man aus 6,0 g (19,5 mmol) der
Verbindung des Beispiels 54 nach Chromatographie über
Kieselgel (Dichlormethan) 3,8 g Feststoff.

Ausbeute: 64% der Theorie

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 2,4 (s, 3H, CH₃); 2,9 (s, 3H, CH₃);
6,8 - 7,3 (m, 9H, Aromaten-H) 9,8
(s, 1H, CHO) ppm.

Beispiel 56

(E)-3-[2,6-Dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-5-phenyl-pyrid-3-
yl]-prop-2-enal



Le A 25 747

Ausbeute: 60% der Theorie

10

15



Rohausbeute: 89% der Theorie

30

Le A 25 747

0-75619-868-5


1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Beispiel 58

5

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-5-phenyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

10



15

Analog Beispiel 33 erhält man aus 2,4 g (5,3 mmol) der Verbindung des Beispiels 57 nach Chromatographie über Kieselgel (Essigester) 550 mg Produkt.

Ausbeute: 23,1% der Theorie

20 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,7 (br, s, 2H, OH); 2,3 (s, 3H, CH_3); 2,4 - 2,6 (m, 2H, CH_2 . 2,65 (s, 3H, CH_3); 3,7 (s, 3H, OCH_3); 4,1 (m, 1H, CHOH); 4,45 (m, 1H, CHOH); 5,4 (dd, 1H, CHCHOH); 6,3 (d, 1H, CH); 6,7 - 7,3 (m 9H, Aromaten-H) ppm.


25

Beispiel 59

30 2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-methoxymethyl-pyridin-3-carbonsäureethylester

35

Le A 25 747



10 Zu 3 g (8,4 mmol) der Verbindung aus Beispiel 4 in 100 ml trockenem Tetrahydrofuran gibt man unter Stickstoffatmosphäre 0,57 ml (9,2 mmol) Methyljodid und bei -50°C 327 mg (10,9 mmol) 80%iges Natriumhydrid. Man rührt 2 Stunden nach und läßt dabei die Temperatur bis 25°C


15 ansteigen. Die Mischung wird vorsichtig mit Wasser versetzt, mehrmals mit Ether extrahiert, die organische Phase über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt.

Ausbeute: 2,9 g (92,7% der Theorie)

20 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,97 (t, 3H); 1,3 (m, 12H); 3,05 (m, 1H); 3,21 (s, 3H); 3,38 (m, 1H); 3,96 (q, 2H); 4,1 (s, 2H); 7,08 (m, 2H); 7,25 (m, 2H) ppm.

25 Beispiel 60

2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-5-methoxymethyl-pyridin



Le A 25 747


Unter Stickstoffatmosphäre werden zu 0,5 g (13,2 mmol)
5 Lithiumaluminiumhydrid in 20 ml absolutem Tetrahydrofu-
ran bei 60°C 2,85 g (7,6 mmol) der Verbindung aus Bei-
spiel 59 gelöst in 30 ml absolutem Tetrahydrofuran
zugetropft. Man erhitzt 1 Stunde zum Rückfluß, kühlt
anschließend auf 0°C ab und tropft vorsichtig 1,5 ml
10 Wasser und 0,3 ml 15%ige Kaliumhydroxyd-Lösung zu. Es
wird vom ausgefallenen Niederschlag abgesaugt und dieser
mehrmals mit Ether ausgekocht. Die vereinigten Phasen
werden über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum
eingeeengt. Der Rückstand wird an einer Säule (Kieselgel
15 70-230 mesh, mit Essigester/Petrolether 1:9)
chromatographiert.

Ausbeute: 1,9 g (74,8% der Theorie)

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,3 (m, 12H); 3,17 (s, 3H); 3,35 (m,
1H); 3,43 (m, 1H); 4,02 (s, 2H);
20 4,35 (d, 2H); 7,12 (m, 2H); 7,25 (m,
2H) ppm.

Beispiel 61

25 Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-
5-methoxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat




Le A 25 747

Aus der Verbindung aus Beispiel 60 wurde, in Analogie zu
den Reaktionen aus den Beispielen 7, 8, 9, 10, das
Beispiel 61 hergestellt.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,23 (m, 6H); 1,32 (d, 6H); 1,40 (m, 2H); 2,43 (m, 2H); 3,18 (s, 3H); 3,32 (m, 2H); 3,73 (s, 3H); 4,05 (s, 2H); 4,08 (m, 1H); 4,29 (m, 1H); 5,23 (dd, 1H); 6,31 (d, 1H); 7,0 - 7,20 (m, 4H) ppm.

Beispiel 62

Methyl-erythro-(E)-7-[5-tert.butyldimethylsilyloxymethyl-4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Aus der Verbindung aus Beispiel 20 wurde in Analogie zu
den Reaktionen aus den Beispielen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 die obige Verbindung synthetisiert.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,0 (s, 6H); 0,82 (s, 9H); 1,22 (d, 6H); 1,40 (m, 2H); 2,42 (m, 2H); 2,65 (s, 3H); 3,28 (m, 1H); 3,70 (s, 3H); 4,08 (m, 1H); 4,26 (m, 1H); 4,29 (s, 2H); 5,22 (dd, 1H); 6,30 (d, 1H); 7,0 - 7,20 (m, 4H) ppm.


Le A 25 747

Beispiel 63

5

Methyl-erythro-(E)-7-[4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-
1-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-
enoat

10



15

Aus der Verbindung aus Beispiel 20 wurde in Analogie zu
den Reaktionen aus den Beispielen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 die obige Verbindung synthetisiert.

20

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,22 (d, 6H); 1,30 - 1,60 (m, 2H);
2,43 (m, 2H); 2,69 (s, 3H); 3,32 (m,
1H); 3,72 (s, 3H); 4,07 (m, 1H);
4,30 (m, 1H); 4,41 (s, 2H); 5,25
(dd, 1H); 6,31 (d, 1H); 7,11 (m,
4H) ppm.

25


Beispiel 64

30

Methyl-erythro-(E)-7-[3-benzyloxymethyl-4-(4-fluorphe-
nyl)-1-isopropyl-6-methyl-pyrid-5-yl]-3,5-dihydroxy-
hept-6-enoat

35

Le A 25 747



10


Aus der Verbindung aus Beispiel 20 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 die obige Verbindung synthetisiert.

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,23 (d, 6H); 1,40 (m, 2H); 2,42 (m, 2H); 2,63 (s, 3H); 3,30 (m, 1H); 3,72 (s, 3H); 4,10 (m, 1H); 4,15 (s, 2H); 4,32 (m, 1H); 4,38 (s, 2H); 5,20 (dd, 1H); 6,31 (d, 1H); 7,0 - 7,40 (m, 9H) ppm.

20

Beispiel 65

3-(tert.-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2,6-diisopropyl-5-(2,2-dimethyl-butyryloxymethyl)-4-(4-fluorphenyl)-pyridin



35

Le A 25 747

12.11.1968

816 11-68


Zu 1,29 g (3 mmol) der Verbindung aus Beispiel 6 in 50 ml absolutem Tetrahydrofuran werden bei 0°C nacheinander 865 mg (3,3 mmol) Triphenylphosphin, 0,41 ml (3,3 mmol) 2,2-Dimethylbuttersäure und 0,52 ml (3,3 mmol) Azodicarbonsäurediethylester gegeben und über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Die Mischung wird im Vakuum eingengt und der Rückstand an einer Säule (Kieselgel 70-230 mesh, mit Essigester/Petrolether 1:9) chromatografiert.

Ausbeute: 1,32 g (87,4% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,01 (s, 6H); 0,86 (t, 3H); 0,91 (s, 9H); 1,2 (s, 6H); 1,39 (m, 12H); 1,6 (q, 2H); 3,24 (m, 1H); 3,48 (m, 1H); 4,38 (s, 2H); 4,79 (s, 2H); 7,05 - 7,35 (m, 4H) ppm.

Beispiel 66

2,6-Diisopropyl-3-(2,2-dimethyl-butyryloxymethyl)-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-pyridin



35

Le A 25 747


1,3 g (2,6 mmol) der Verbindung aus Beispiel 65 gelöst
 in 20 ml absolutem Tetrahydrofuran werden mit 2,6 ml
 (2,6 mmol) einer 1 molaren Tetrabutylammoniumfluorid-
 Lösung in Tetrahydrofuran versetzt und 1 Stunde bei
 Raumtemperatur gerührt. Die Mischung wird mit gesät-
 tigter Natriumhydrogencarbonat-Lösung versetzt und
 mehrmals mit Dichlormethan extrahiert. Die organische
 Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet, im Vakuum
 eingeeengt und der Rückstand an einer Säule (Kieselgel
 70-230 mesh, mit Laufmittel Essigester/Petrolether 1:9)
 chromatographiert.

Ausbeute: 1 g (95,2% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,71 (t, 3H); 1,02 (s, 6H); 1,21 (d,
 6H); 1,25 (d, 6H); 1,43 (q, 2H);
 3,09 (m, 1H); 3,38 (m, 1H); 4,3 (d,
 2H); 4,61 (s, 2H); 6,95 - 7,18 (m,
 4H) ppm.

Beispiel 67

2,6-Diisopropyl-5-(2,2-dimethyl-butyryloxymethyl)-4-(4-
 fluorphenyl)-pyridin-3-carbaldehyd



Le A 25 747


1 g (2,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 66 wird
analog Beispiel 7 umgesetzt.

Ausbeute: 890 mg (86,4% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,82 (t, 3H); 1,25 (s, 6H); 1,32 (m, 12H); 1,55 (q, 2H); 3,26 (m, 1H); 3,88 (m, 1H); 4,77 (s, 2H); 7,09 - 7,27 (m, 4H); 9,77 (s, 1H) ppm.

Beispiel 68

(E)-3-[2,6-Diisopropyl-5-(2,2-dimethyl-butyryloxy-
thyl)-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-prop-2-enal



860 mg (2,1 mol) der Verbindung aus Beispiel 67 werden
analog zu Beispiel 8 umgesetzt.

Ausbeute: 420 mg (45,6% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,82 (t, 3H); 1,14 (s, 6H); 1,31 (m, 12H); 1,53 (q, 2H); 1,22 (m, 1H); 3,33 (m, 1H); 4,75 (s, 2H); 5,99 (dd, 1H); 7,05 - 7,29 (m, 5H); 9,4 (d, 1H) ppm.

Le A 25 747


Beispiel 69

5

Methyl-(E)-7-[2,6-diisopropyl-5-(2,2-dimethyl-butyryl-oxymethyl)-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-5-hydroxy-3-oxo-hept-6-enoat

10

15



Unter Stickstoff tropft man zu einer Suspension von 54,6 mg (1,82 mmol) 80%igem Natriumhydrid in 5 ml absolutem Tetrahydrofuran bei -5°C 0,15 ml (1,4 mmol) Acetessigsäuremethylester in 2 ml absolutem Tetrahydrofuran. Nach 15 Minuten werden bei derselben Temperatur 0,89 ml (1,4 mmol) 15%iges Butyllithium in n-Hexan zugetropft und nach weiteren 15 Minuten 408 mg (1,8 mmol) trockenes Zinkbromid in 5 ml absolutem Tetrahydrofuran hinzugefügt. Man läßt noch 15 Minuten bei -5°C nachrühren, tropft 400 mg (0,91 mmol) der Verbindung aus Beispiel 68 gelöst in 10 ml trockenem Tetrahydrofuran zu und rührt über Nacht. Die Mischung wird mit gesättigter Ammoniumchlorid-Lösung versetzt und mehrmals mit Ether extrahiert. Die organische Phase wird über Magensiumsulfat getrocknet, im Vakuum eingeeengt und der Rückstand an einer Säule (Kieselgel 70-230 mesh, mit Essigester/Petrol-ether 3:7) chromatographiert.

Ausbeute: 200 mg (38,5% der Theorie)

35

Le A 25 747


17.11.1977

8/107 21

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,8 (t, 3H); 1,12 (s, 6H); 1,27 (d, 6H); 1,32 (d, 6H); 1,53 (q, 2H); 2,45 (m, 2H); 3,18 (m, 1H); 3,27 (m, 1H); 3,43 (s, 2H); 3,74 (s, 3H), 4,50 (m, 1H); 4,73 (s, 2H); 5,28 (dd, 1H); 6,38 (d, 1H); 7,0 - 7,10 (m, 4H) ppm.

Beispiel 70

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-5-(2,2-dimethyl-butxyloxymethyl)-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



180 mg (0,32 mmol) der Verbindung aus Beispiel 69 werden analog Beispiel 10 umgesetzt.

Ausbeute: 138 mg (77,5% der Theorie)

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,81 (t, 3H); 1,12 (s, 6H); 1,28 (m, 6H); 1,40 (m, 2H); 1,53 (q, 2H); 2,43 (m, 2H); 3,17 (m, 1H); 3,32 (m, 1H); 3,73 (s, 3H); 4,08 (m, 1H); 4,31 (m, 1H); 4,75 (s, 2H); 5,28 (dd, 1H); 6,32 (d, 1H); 7,0 - 7,1 (m, 4H) ppm.


Le A 25 747

Beispiel 71

5

Methyl-erythro-(E)-7-[5-benzyloxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

10



15

Aus der Verbindung aus Beispiel 6 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 65, 66, 67, 68, 69 und 70 die obige Verbindung synthetisiert.

20

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,31 (m, 6H); 1,40 (m, 2H); 2,43 (m, 2H); 3,32 (m, 2H); 3,73 (s, 3H); 4,07 (m, 1H); 4,32 (m, 1H); 5,07 (s, 2H); 5,30 (dd, 1H); 6,32 (d, 1H); 6,90 - 7,20 (m, 4H); 7,42 (m, 2H); 7,55 (m, 1H); 8,02 (m, 2H) ppm.

25

Beispiel 72

30


Methyl-erythro-(E)-7-[3-acetoxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-5-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

35

Le A 25 747

17 JAN 1988 069886

5



10

Aus der Verbindung aus Beispiel 6 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 65, 66, 67, 68, 69 und 70 die obige Verbindung synthetisiert.

15


$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,25 (m, 12H); 1,40 (m, 2H); 2,02 (s, 3H); 2,43 (m, 3H); 3,20 (m, 1H); 3,32 (m, 1H); 3,72 (s, 3H); 4,07 (m, 1H); 4,29 (m, 1H); 4,81 (s, 2H); 5,28 (dd, 1H); 6,30 (d, 1H); 7,0 - 7,1 (m, 4H) ppm.

20

Beispiel 73

(E/Z)-3-Carboxymethyl-4-(4-fluorphenyl)but-3-en-2-on

25



30

35

Le A 25 747

62 g (0,5 mol) 4-Fluorbenzaldehyd und 53,9 ml (0,5 mol)
 5 Acetessigsäuremethylester werden in 300 ml Isopropanol
 vorgelegt, mit einem Gemisch aus 2,81 ml (28 mmol) Pi-
 peridin und 1,66 ml (29 mmol) Essigsäure in 40 ml Iso-
 propanol versetzt und 48 h bei Raumtemperatur gerührt.
 Die Mischung wird im Vakuum eingeengt und der Rückstand
 10 im Hochvakuum destilliert.

Kp 0,5 mm: 138°C


Ausbeute: 50,5 g (45,5% der Theorie)

Beispiel 74

15

1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3,5-
 dicarbonsäure-dimethylester

20



25

33,3 g (0,15 mol) der Verbindung aus Beispiel 73 werden
 mit 17,3 g (0,15 mol) 3-Aminocrotonsäuremethylester in
 150 ml Ethanol 4 h unter Rückfluß gekocht. Die Mischung
 wird auf 0°C abgekühlt, der ausgefallene Niederschlag
 30 abgesaugt, mit wenig Petrolether nachgewaschen und im
 Exsikkator getrocknet.

Ausbeute: 32 g (66,8% der Theorie)

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 2,33 (s, 6H); 3,65 (s, 6H); 4,99
 (s, 1H); 5,77 (s, 1H); 6,89 (m, 2H);
 35 7,22 (m, 2H) ppm.

Le A 25 747

17 JAN 1974 10 56 9880

Page 144/145


4008

Beispiel 75

5

2,6-Dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-
re-dimethylester

10



15

32 g (0,1 mol) der Verbindung aus Beispiel 74 werden
analog Beispiel 3 umgesetzt.

Ausbeute: 27,2 g (87% der Theorie)


$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 2,59 (s, 6H); 3,56 (s, 6H); 7,08 (m,
20 2H); 7,25 (m, 2H) ppm.

Beispiel 76

25

2,6-Dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxy-methyl-pyridin-
3-carbonsäuremethylester

30



35

Le A 25 747


17. JAN 1966 569880

Unter Stickstoff gibt man zu einer Lösung von 14,9 g (47 mmol) der Verbindung aus Beispiel 75 in 300 ml trockenem Tetrahydrofuran bei -10°C bis -5°C 40,3 ml (141 mmol) einer 3,5 molaren Lösung von Natrium-bis-(2-methoxyethoxy)-dihydroaluminat in Toluol und rührt 30 Minuten bei Raumtemperatur. Nach Abkühlen auf 0°C tropft man vorsichtig 100 ml Wasser hinzu und extrahiert mehrmals mit Essigester. Die vereinigten organischen Phasen werden mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeengt. Der Rückstand kristallisiert mit Ether/Petrolether. Nach Trocknen im Exsikkator erhält man 7,5 g Substanz (55,2% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 2,52 (s, 3H); 2,7 (s, 3H); 3,52 (s, 3H); 4,45 (s, 2H); 7,05 - 7,3 (m, 4H) ppm.

Beispiel 77

Methyl-erythro-(E)-7-[5-tert.butyldimethylsilyloxy-methyl-2,6-dimethyl-4-(4-fluorphenyl)pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Aus der Verbindung aus Beispiel 76 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 5, 6, 7, 8, 9 und 10 das Beispiel 77 hergestellt.


Le A 25 747

17. JAN 1977 12.09.80

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,01 (s, 6H); 0,92 (s, 9H); 1,40 (m, 2H); 2,49 (m, 2H); 2,62 (s, 3H); 2,71 (s, 3H); 3,80 (s, 3H); 4,17 (m, 1H); 4,36 (s, 2H); 4,38 (m, 1H); 5,42 (dd, 1H); 6,31 (d, 1H); 7,10 - 7,20 (m, 4H) ppm.

Beispiel 78


Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-dimethyl-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Aus der Verbindung aus Beispiel 77 wurde analog Beispiel 11 das Beispiel 78 hergestellt.

Beispiel 79

(E/Z)-2-Carboxyethyl-1-cyclopropyl-3-(4-fluorphenyl)-2-prop-2-en-1-on



Le A 25 747


39 g (0,25 mol) Cyclopropylcarbonylessigsäureethylester
5 und 31 g (0,25 mol) 4-Fluorbenzaldehyd werden in 150 ml
trockenem Isopropanol vorgelegt und mit einem Gemisch
aus 1,4 ml (14 mmol) Piperidin und 0,83 ml (14,5 mmol)
Essigsäure in 20 ml Isopropanol versetzt. Man rührt 48
10 Stunden bei Raumtemperatur, engt im Vakuum ein und des-
tilliert den Rückstand im Hochvakuum.
Kp 0,5 mm: 140°C
Ausbeute: 52,3 g (79,8% der Theorie)

Beispiel 80

15

1,4-Dihydro-2-cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-6-
isopropyl-pyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester

20



25

39,3 g (0,15 mol) der Verbindung aus Beispiel 79 und
23,6 g (0,15 mol) 3-Amino-4-methyl-pent-2-en-säure-
ethylester werden in 150 ml Ethylenglykol über Nacht un-
ter Rückfluß gekocht. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur
30 wird mehrmals mit Ether extrahiert, die vereinigten
Etherphasen dreimal mit 10%iger Salzsäure, je einmal mit
Wasser und gesättigter Natriumhydrogencarbonat-Lösung
gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum
eingengt. Den Rückstand verrührt man mit Petrolether/
35 Ether, saugt ab und trocknet im Exsikkator.

Le A 25 747


Ausbeute: 22,8 g (37,8% der Theorie)

5 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,65 (m, 2H); 1,03 (m, 2H); 1,15 (m, 13H); 2,78 (m, 1H); 4,15 (m, 4H); 5,03 (s, 1H); 5,72 (s, 1H); 6,90 (m, 2H); 7,22 (m, 2H) ppm.

10 Beispiel 81

2-Cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-6-isopropyl-pyridin-3,5-dicarbonsäure-diethylester

15



20

19,1 g (47 mmol) der Verbindung aus Beispiel 80 werden analog Beispiel 3 umgesetzt.

Ausbeute: 9,8 g (52,5% der Theorie)

25 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,97 (m, 8H); 1,25 (m, 8H); 2,09 (m, 1H); 3,06 (m, 1H); 4,02 (m, 4H); 7,06 (m, 2H); 7,26 (m, 2H) ppm.

30 Beispiel 82


6-Cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-2-isopropyl-pyridin-3-carbonsäure-ethylester

35

Le A 25 747

17. JAN 1964 569886

5



10

6 g (15 mmol) der Verbindung aus Beispiel 81 werden analog Beispiel 4 umgesetzt.

Ausbeute: 3,1 g (57,9% der Theorie)

15


$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,97 (t, 3H); 1,03 (m, 2H); 1,22 (m, 8H); 2,38 (m, 1H); 3,03 (m, 1H); 4,0 (q, 2H); 4,58 (s, 2H); 7,1 (m, 2H); 7,25 (m, 2H) ppm.

20

Beispiel 83

6-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-2-isopropyl-5-methoxymethyl-pyridin-3-carbonsäure-ethylester

25



30

2,9 g (8 mmol) der Verbindung aus Beispiel 82 werden analog Beispiel 59 umgesetzt.

Ausbeute: 2 g (67,4% der Theorie)


35

Le A 25 747

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,93 (t, 3H); 0,98 (m, 2H); 1,22 (d, 6H); 1,24 (m, 2H); 2,32 (m, 1H); 3,03 (m, 1H); 3,28 (s, 3H); 3,97 (q, 2H); 4,25 (s, 2H); 7,08 (m, 2H); 7,25 (m, 2H) ppm.

10 Beispiel 84

6-Cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxy-methyl-2-isopropyl-5-methoxymethyl-pyridin



Unter Stickstoff gibt man zu einer Lösung von 1,9 g (5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 83 in 50 ml trockenem Tetrahydrofuran 44,3 ml (15 mmol) einer 3,5 molaren Lösung von Natrium-bis-(2-methoxyethoxy)-dihydroaluminat in Toluol, rührt 2 Stunden bei Raumtemperatur und 1 Stunde unter Rückfluß. Nach Abkühlen auf 0°C tropft man vorsichtig 50 ml Wasser hinzu und extrahiert mehrmals mit Essigester. Die Essigesterphasen werden vereinigt, mit gesättigter Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Ausbeute: 1,6 g (97% der Theorie)

35

Le A 25 747

17. JAN. 1971 283400


¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,89 (m, 2H), 1,17 (d, 6H); 1,19 (m, 2H); 2,20 (s, 1H); 3,13 (s, 3H); 3,32 (m, 1H); 4,07 (s, 2H); 4,2 (s, 2H); 7,05 (m, 2H); 7,16 (m, 2H) ppm.

10 Beispiel 85

Methyl-erythro-(E)-7-[6-cyclopropyl-2-isopropyl-4-(4-fluorophenyl)-5-methoxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat

15

20



25

Aus der Verbindung aus Beispiel 84 wurde, in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 7, 8, 9 und 10 das Beispiel 85 hergestellt.

30

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,95 (m, 2H); 1,17 (m, 6H); 1,22 (m, 2H); 1,40 (m, 2H); 2,25 (m, 1H); 2,44 (m, 2H); 3,22 (s, 3H); 3,23 (m, 1H); 3,73 (s, 3H); 4,07 (m, 1H); 4,18 (s, 2H); 4,28 (m, 1H); 5,22 (dd, 1H); 6,30 (d, 1H); 7,0 - 7,20 (m, 4H) ppm.

35


Le A 25 747

17 JAN 1970 069880

8001 100 00

Beispiel 86

5-Chlormethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3-carbonsäure-ethylester



5 g (13,9 mmol) der Verbindung aus Beispiel 4 gelöst in 100 ml trockenem Tetrahydrofuran werden bei -5°C nacheinander mit 1,69 ml (20,9 mmol) Pyridin und 1,5 ml (20,9 mmol) Thionylchlorid versetzt und 15 Minuten bei derselben Temperatur gerührt. Die Mischung wird mit Essigester verdünnt, mehrmals mit gesättigter Natriumhydrogencarbonat-Lösung extrahiert, die organische Phase über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Der Rückstand wird an einer Säule (Kieselgel 70 bis 230 mesh, in Petrolether/Essigester 95:5) chromatographiert.

Ausbeute: 3,2 g (65,2% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,98 (t, 3H); 1,30 (d, 6H); 1,35 (d, 6H); 3,05 (m, 1H); 3,45 (m, 1H); 3,98 (q, 2H); 4,38 (s, 2H); 7,13 (m, 2H); 7,31 (m, 2H) ppm.


Beispiel 87

2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-phenoxy-methyl-pyridin-3-carbonsäure-ethylester

Le A 25 747

17. JAN. 1977 509880

300.500.08



Zu einer Lösung von 2,11 g (18,2 mmol) Natriumphenolat in 50 ml absolutem Tetrahydrofuran tropft man bei 0°C 3,22 g (9,1 mmol) der Verbindung aus Beispiel 86 gelöst in 50 ml absolutem Tetrahydrofuran und kocht 4 Tage am Rückfluß. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit 150 ml Wasser verdünnt und mehrmals mit Ether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden über Magnesiumsulfat getrocknet, im Vakuum eingedunstet und der Rückstand an einer Säule (Kieselgel 70-230 mesh, mit Petrol-
 15 ether/Essigester 95:5) chromatographiert.

Ausbeute: 3,2 g (80,8% der Theorie)

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,97 (t, 3H); 1,3 (d, 6H); 1,33 (d, 6H); 3,1 (m, 1H); 3,32 (m, 1H); 4,0 (q, 2H); 4,7 (s, 2H); 6,78 - 7,31 (m, 9H) ppm.

25

Beispiel 88


2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-3-phenoxymethyl-pyridin

30

35

Le A 25 747

17 JAN 1989 569880




3,25 g (7,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 87 werden analog Beispiel 60 umgesetzt.

Ausbeute: 2,75 g (93,2% der Theorie)

15 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,35 (m, 12H); 3,30 (m, 1H); 3,48 (m, 1H); 4,42 (d, 2H); 4,62 (s, 2H); 6,75 - 7,30 (m, 9H) ppm.

Beispiel 89

20 Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-phenoxy-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



35

Le A 25 747


17 JAN 19 - 569880

Aus der Verbindung aus Beispiel 88 wurde, in Analogie zu
den Beispielen 7, 8, 9 und 10 das Beispiel 89
hergestellt.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,28 (m, 6H); 1,31 (d, 6H); 1,43 (m, 2H); 2,41 (m, 2H); 3,30 (m, 2H); 3,71 (s, 3H); 4,08 (m, 1H); 4,30 (m, 1H); 4,65 (s, 2H); 5,28 (dd, 1H); 6,35 (d, 1H); 6,75 - 7,30 (m, 9H) ppm.

Beispiel 90

2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-(tetrahydropyran-2-yl-oxymethyl)-pyridin-3-carbonsäure-ethylester



Zu einer Lösung von 5,36 g (14,9 mmol) der Verbindung aus Beispiel 4 in 100 ml trockenem Dichlormethan gibt man 1,88 g (22,4 mmol) Dihydropyran und 0,525 g (1,49 mmol) Pyridinium-p-toluol-sulfonat und kocht 48 Stunden am Rückfluß. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird mit Dichlormethan verdünnt und mehrmals mit Wasser extrahiert. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet, im Vakuum eingengt und der Rückstand an einer Säule (Kieselgel 70-230 mesh, mit Dichlormethan) chromatographiert.

Le A 25 747


17. JAN 1973

Ausbeute: 4,4 g (66,7% der Theorie)

5 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,98 (t, 3H); 1,31 (m, 12H); 1,40 -
1,80 (m, 6H); 3,05 (m, 1H); 3,43 (m,
2H); 3,61 (m, 1H); 3,98 (q, 2H);
4,05 (d, 1H); 4,45 (m, 1H); 4,55 (d,
1H); 7,05 (m, 2H); 7,25 (m, 2H)
10 ppm.

Beispiel 91

2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-5-
15 (tetrahydropyran-2-yl-oxy-methyl)-pyridin



25 4,4 g (9,9 mmol) der Verbindung aus Beispiel 90 werden
analog Beispiel 60 umgesetzt.

Ausbeute: 2,5 g (63,5% der Theorie)

30 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,32 (m, 12H); 1,40 - 1,80 (m, 6H);
3,40 (m, 3H); 3,57 (m, 1H); 3,95 (d,
1H); 4,35 (m, 3H); 4,5 (d, 1H); 7,11
(m, 2H); 7,25 (m, 2H) ppm.

35

Le A 25 747

2 8 3 4 0 0


Beispiel 92

5

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-
5-(tetrahydropyran-2-yl-oxymethyl)-pyrid-3-yl]-3,5-
dihydroxy-hept-6-enoat

10

15



Aus der Verbindung aus Beispiel 91 wurde, in Analogie zu
den Reaktionen aus den Beispielen 7,8, 9 und 10 das
Beispiel 92 hergestellt.

20

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,20 - 1,80 (m, 20H); 2,43 (m, 2H);
3,32 (m, 1H); 3,41 (m, 2H); 3,58 (m,
1H); 3,72 (s, 3H); 3,98 (d, 1H);
4,08 (m, 1H); 4,29 (m, 1H); 4,43 (m,
1H); 4,54 (d, 1H); 5,28 (dd, 1H);
6,31 (d, 1H); 7,10 (m, 4H) ppm.


25

Beispiel 93

30

3-Amino-4-methyl-pent-2-en-säure-2-(trimethylsilyl)-
ethylester

35



Le A 25 747

17 JAN 1966 1569880

230 17 11


5 Zu 150 g (0,65 Mol) Isobutyryl-essigsäure-2-(trimethylsilyl)ethylester in 700 ml Toluol werden 3 g p-Toluolsulfonsäure gegeben und die Mischung bei Raumtemperatur mit Ammoniak-Gas gesättigt. Man läßt über Nacht stehen und kocht anschließend 8 Stunden am Rückfluß, wobei ständig Ammoniak-Gas eingeleitet wird. Nach Abkühlen
10 auf Raumtemperatur wird filtriert, die Toluol-Lösung mehrmals mit Wasser extrahiert, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt.

Ausbeute: 134 g (90% der Theorie)

15 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,21 (s, 9H); 1,15 (m, 2H); 1,30 (m, 6H); 2,48 (m, 1H); 4,31 (m, 2H); 4,71 (s, 1H) ppm.

Beispiel 94

20 1,4-Dihydro-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-5-ethyl-3-(2-trimethylsilyl)-ethylester



35 Zu einer Lösung von 45,8 g (0,2 mol) der Verbindung aus Beispiel 93 in 100 ml Ethylenglykol werden 52,7 g (0,2 mol) der Verbindung aus Beispiel 1 gegeben und über Nacht am Rückfluß gekocht. Die Mischung wird abgekühlt, mit 5 ml konz. Salzsäure versetzt und erneut 30 Minuten auf 100°C erwärmt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird

Le A 25 747

17 JAN 1977 509886

931-100-10


im Vakuum eingengt, der Rückstand in Essigester aufgenommen und mehrmals mit verdünnter Salzsäure extrahiert. Die organisch Phase wird anschließend je einmal mit gesättigter Natriumhydrogencarbonat- und Natriumchlorid-Lösung gewaschen, über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingengt. Der Rückstand wird an einer Säule (Kieselgel 70-230 mesh; mit Dichlormethan) chromatografiert.

Ausbeute: 39,2 g (41,3% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,01 (s, 9H); 0,95 (m, 2H); 1,18 (m, 12H); 1,22 (t, 3H); 4,10 (m, 6H); 4,97 (s, 1H); 6,10 (s, 1H); 6,85 (m, 2H); 7,18 (m, 2H) ppm.

Beispiel 95

1,4-Dihydro-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-3-ethylester



Zu einer Lösung von 38,9 g (81,8 mmol) der Verbindung aus Beispiel 94 in 300 ml trockenem Tetrahydrofuran werden 83,3 ml (83,3 mmol) einer 1 molaren Lösung von Tetrabutylammoniumfluorid in Tetrahydrofuran gegeben und

Le A 25 747

17. JAN 1968 869880


48 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Nach Einengen im Vakuum wird der Rückstand in Ether aufgenommen, je dreimal mit verdünnter Natronlauge und verdünnter Schwefelsäure gewaschen, die organische Phase über Magnesiumsulfat getrocknet und erneut im Vakuum eingeeengt.

Ausbeute: 29 g (94,5% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,09 - 1,3 (m, 15H); 4,02 (q, 2H); 4,08 (m 2H); 4,18 (m, 1H); 4,89 (s, 1H); 7,03 (m, 2H); 7,12 (m, 2H) ppm.

Beispiel 96

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Aus der Verbindung aus Beispiel 95 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 27, 3, 29, 7, 8, 9 und 10 das Beispiel 96 hergestellt.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,28 (m, 12H); 1,50 (m, 2H); 2,47 (m, 2H); 3,05 (m, 1H); 3,35 (m, 1H); 3,72 (s, 3H); 4,13 (m, 1H); 4,38 (m, 1H); 5,31 (dd, 1H); 6,55 (d, 1H); 6,85 (s, 1H); 7,05 (m, 2H); 7,25 (m, 2H) ppm.


Le A 25 747

Beispiel 97

5

1-(4-Fluorphenyl)-4-methyl-2-phenyl-penten-3-on

10



15

Zu 24,8 g (0,2 mol) 4-Fluorbenzaldehyd und 32,4 g (0,2 mol) Benzyl-isopropylketon in 150 ml Toluol werden 0,9 ml Piperidin gegeben und die Mischung über Nacht am Rückfluß gekocht. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird mehrmals mit Wasser extrahiert, die organische Phase über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Der Rückstand wird im Hochvakuum bei 0,1 mbar bis 150°C Badtemperatur andestilliert und man erhält 43,8 g Rohprodukt im Destillationsrückstand.

20

25

Ausbeute: 81% der Theorie

30


35

Le A 25 747

17 JAN 1966

Beispiel 98

1,4-Dihydro-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-phenyl-
pyridin-3-carbonsäure-ethylester



Zu 13,45 g (50 mmol) der Verbindung aus Beispiel 97 und
17,4 g (100 ml) 3-Amino-4-methyl-pent-2-en-säure-ethyl-
ester in 80 ml Ethylenglykol werden 2,86 ml (50 mmol)
Eisessig gegeben und die Mischung über Nacht am Rückfluß
gekocht. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird im Vakuum
eingengt, der Rückstand in Dichlormethan gelöst und
mehrmals mit Wasser extrahiert. Die organische Phase
wird über Magnesiumsulfat getrocknet, im Vakuum einge-
engt und der Rückstand in Essigester aufgenommen. Nach
Extrahieren mit 10%iger Salzsäure, Wasser und gesättig-
ter Natriumhydrogencarbonat-Lösung wird die organische
Phase erneut getrocknet, eingengt und der Rückstand an
einer Säule (Kieselgel 70-230 mesh, mit Essigester/Pe-
trolether) chromatographiert.

Ausbeute: 2,3 g (11,3% der Theorie)


$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,1 (m, 9H); 1,25 (m, 6H); 2,70 (m,
1H); 3,90 - 4,40 (m, 3H); 4,55 (s,
1H); 5,75 (s, 1H); 6,80 - 7,30 (m,
9H) ppm.

Le A 25 747

17 JAN 1969 - 369880

Beispiel 99

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-phenyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat




Aus der Verbindung aus Beispiel 98 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 3, 29, 7, 8, 9 und 10 das Beispiel 99 hergestellt.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,18 (d, 6H); 1,32 (m, 6H); 1,42 (m, 2H); 2,40 (m, 2H); 2,70 (d, 1H); 2,88 (m, 1H); 3,38 (m, 1H); 3,48 (d, 1H); 3,71 (s, 3H); 4,05 (m, 1H); 4,30 (m, 1H); 5,30 (dd, 1H); 6,39 (d, 1H); 6,70 - 7,20 (m, 9H) ppm.

Beispiel 100

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-carboxyethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Le A 25 747


17 JAN 1989 8 36 9886

Aus der Verbindung aus Beispiel 4 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 7, 8, 69 und 10 das Beispiel 100 hergestellt.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,98 (t, 3H); 1,25 (m, 6H); 1,32 (d, 6H); 1,45 (m, 2H); 2,42 (m, 2H); 3,05 (m, 1H); 3,32 (m, 1H); 3,72 (s, 3H); 3,98 (q, 2H); 4,10 (m, 1H); 4,32 (m, 1H); 5,29 (dd, 1H); 6,38 (d, 1H); 7,02 (m, 2H); 7,12 (m, 2H) ppm.

Beispiel 101

1,4-Dihydro-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-morpholinocarbonyl-pyridin-3-carbonsäureethylester



Zu 1,875 g (5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 95 gelöst in 20 ml trockenem Tetrahydrofuran gibt man unter Stickstoffatmosphäre 1,05 g (6,5 mmol) N,N'-Carbonylimidazol und rührt 30 Minuten bei Raumtemperatur. Anschließend wird 30 Minuten am Rückfluß gekocht, mit einer Lösung von 0,87 ml (10 mmol) Morpholin in 5 ml trockenem

Le A 25 747


17. JAN 1970 - 01.9.0000

5 Tetrahydrofuran versetzt und weitere 2 Stunden zum Sieden erhitzt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird im Vakuum eingeeengt, der Rückstand in Dichlormethan aufgenommen und nacheinander mit 1 N Salzsäure, 1 N Natronlauge und Wasser gewaschen. Die organische Phase wird über Magnesiumsulfat getrocknet, im Vakuum eingeeengt und 10 der kristalline Rückstand im Exsikkator getrocknet.
Ausbeute: 1,96 g (88% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,0 - 1,28 (m, 15H); 3,20 - 4,40 (komplexer Bereich, 12H); 4,70 (s, 1H); 5,50 (s, 1H); 6,90 (m, 2H); 7,20 (m, 2H) ppm.

Beispiel 102

20 2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3,5-dicarbonsäure-3-ethylester-5-morpholid



30 9 g (21,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 101 werden analog Beispiel 3 umgesetzt.

Ausbeute: 7,6 g (80% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,95 (t, 3H); 1,25 (m, 6H); 1,35 (m, 6H); 2,70 - 3,80 (komplexer Bereich, 10H); 4,0 (m, 2H); 7,0 - 7,50 (m, 4H) ppm.

Le A 25 747


17. JAN 1980 569880

Beispiel 103

5

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-
5-morpholinocarbonyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-
enoat

10



15

Aus der Verbindung aus Beispiel 102 wurde in Analogie zu
den Reaktionen aus den Beispielen 29, 7, 8, 9 und 10 das
Beispiel 103 hergestellt.

20

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,10 - 1,50 (komplexer Bereich,
14H); 2,40 (m, 2H); 2,80 - 3,65
(komplexer Bereich, 10H); 3,75 (s,
3H); 4,10 (m, 1H); 4,35 (m, 1H);
5,25 (m, 1H); 6,45 (dd, 1H); 6,95 -
7,50 (m, 4H) ppm.

25


Beispiel 104

30

2,6-Diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-5-
morpholinomethyl-pyridin

35

Le A 25 747




¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,28 (d, 6H); 1,32 (d, 6H); 2,15 (m, 4H); 3,18 (s, 2H); 3,45 (m, 2H); 3,52 (m, 4H); 4,32 (d, 2H); 7,05 - 7,20 (m, 4H) ppm.

30 Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-
5-morpholinomethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-
enoat

35 Le A 25 747

17 JAN 1971 - 06.9880



Aus der Verbindung aus Beispiel 104 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 7, 8, 9 und 10 das Beispiel 105 hergestellt.


15 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,25 (m, 12H); 1,40 (m, 2H); 2,20 (m, 4H); 2,45 (m, 2H); 3,20 (s, 2H); 3,30 (m, 1H); 3,45 (m, 1H); 3,55 (m, 4H); 3,75 (s, 3H); 4,10 (m, 1H); 4,30 (m, 1H); 5,30 (dd, 1H); 6,25 (d, 1H); 7,0 - 7,20 (m, 4H) ppm.

20

Beispiel 106

Methyl-erythro-(E)-7-(2,6-diisopropyl)-4-(4-fluorphenyl)-5-iodomethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

25



Le A 25 747


17 JAN 1974

80 mg (0,1514 mmol) der Verbindung aus Beispiel 105 werden in 5 ml Methyljodid gelöst, 3 Stunden auf 30°C und über Nacht bei 60°C unter Lichtausschuß gerührt. Die Mischung wird im Vakuum eingengt und im Exsikkator über Phosphorpentoxid getrocknet. Man erhält 120 mg Rohprodukt.

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,20 - 1,70 (komplexer Bereich, 14H); 2,45 (m, 2H); 3,30 (m, 2H); 3,75 (s, 3H); 4,05 (m, 1H); 4,20 (s, 2H); 4,30 (m, 1H); 5,30 (dd, 1H); 6,25 (d, 1H); 7,0 - 7,25 (m, 4H) ppm.

Beispiel 107

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-benzylthio-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Zu 90 mg (0,158 mmol) der Verbindung aus Beispiel 106 gelöst in 2 ml trockenem Dichlormethan gibt man unter Stickstoffatmosphäre hintereinander 22,3 µl (0,19 mmol) Benzylmercaptan, 32,7 µl (0,237 mmol) Triethylamin und


Le A 25 747

17 JAN 1980 13:08:00

5 rührt über Nacht bei Raumtemperatur. Die Mischung wird
mit Dichlormethan verdünnt und mehrmals mit Wasser ex-
trahiert. Nach Trocknen der organischen Phase über Mag-
nesiumsulfat und Einengen im Vakuum, wird der Rückstand
an einer Säule (Kieselgel 70-230 mesh, mit Essigester/
10 Petrolether 1:1) chromatographiert.
Ausbeute: 20 mg (22,4% der Theorie)
 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,23 (m, 12H); 1,4 (m, 2H); 2,40 (m,
2H); 3,20 (m, 2H); 3,28 (s, 2H);
3,55 (s, 2H); 3,73 (s, 3H); 4,05 (m,
1H); 4,25 (m, 1H); 5,25 (dd, 1H);
15 6,25 (d, 1H); 6,90 - 7,28 (m, 9H)
ppm.

Beispiel 108

20 4-{[5-(3,5-dihydroxy-6-methoxycarbonylhex-1-enyl)-2,6-
diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl)methyl-
morpholinoxid



35 Zu 80 mg (0,1515 mmol) der Verbindung aus Beispiel 105
gelöst in 3 ml trockenem Dichlormethan gibt man 52 mg
(0,303 mmol) m-Chlorperbenzoesäure und rührt 1 Stunde

Le A 25 747

17. JAN 1981 12 4 8 5 0


bei Raumtemperatur. Die Mischung wird nacheinander mit
 5 Kaliumjodid-Lösung, Natriumthiosulfat-Lösung und Natriumhydrogencarbonat-Lösung gewaschen, die organische Phase über Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingengt.

Ausbeute: 60 mg (73% der Theorie)

10 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,10 - 1,55 (komplexer Bereich, 14H); 2,45 (m, 2H); 2,70 - 3,70 (komplexer Bereich, 10H); 3,75 (s, 3H); 4,0 (m, 1H); 4,10 (m, 1H); 4,30 (m, 2H); 5,25 (dd, 1H); 6,25 (d, 1H); 7,0 - 7,30 (m, 4H) ppm.

Beispiel 109

20 2-(4-Fluorbenzoyl)-4-methyl-pent-2-en-carbonsäureethylester



30 Eine Lösung von 210 g (1 mol) 4-Fluorbenzoylessigsäureethylester und 144 g (2 mol) 2-Methylpropanal wird in 100 ml Isopropanol mit 7 ml Piperidin und 5 ml Essigsäure über Nacht bei 50°C gerührt. Nach vollständiger Umsetzung wird der Ansatz bei ca. 15 Torr eingengt und das Rohprodukt (270 g, ca. 85%ig) ohne weitere Reinigung weiter umgesetzt.

35

Le A 25 747


17. JAN 1955 8069880

Beispiel 110

5

3-Ethoxycarbonyl-2-(4-Fluorphenyl)-1,4-dihydro-4-isopropyl-6-methyl-5-methoxycarbonyl-pyridin

10



15

62,9 g (0,2 mol) der Verbindung aus Beispiel 109 und 21,9 g (0,19 mol) 3-Amino-crotonsäure-methylester werden in 200 ml Ethylenglykol über Nacht am Rückfluß gekocht. Man extrahiert dreimal mit Ether, wäscht die vereinigten organischen Phasen mit 2 N Salzsäure und gesättigter Kochsalzlösung, trocknet über Magnesiumsulfat und engt zur Trockene ein. Der Rückstand (65 g) wird in zwei Portionen an je 750 g Kieselgel (230 - 400 mesh) in einer Säule (7,5 cm ø) mit Petrolether/Essigester 10:1 → 5:1 chromatographiert.

25

Ausbeute: 21,5 g (31%) gelbe Kristalle
Schmp. : 109°C

Beispiel 111


30

3-Ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-pyridin

35

Le A 25 747

5



10

Analog Beispiel 3 wurde aus 14,9 g (14,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 110 das Beispiel 111 hergestellt.

Ausbeute: 15,2 g (102%) Rohprodukt, farbloses Öl, das ohne weitere Reinigung umgesetzt wird.

15

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,02 (t, 3H, CH_2CH_3); 1,33 (d, 6H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$); 2,55 (s, 3H, 6- CH_3); 3,15 (sept, 1H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$); 3,95 (s, 3H, O- CH_3); 4,08 (q, 2H, $\text{CH}_2\text{-CH}_3$); 7,1 (m, 2H, 3'-H); 7,55 (m, 2H, 2'-H); ppm.


20

Beispiel 112

25

3-Ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-4-isopropyl-6-methyl-pyridin

30




35

Le A 25 747

5 Analog Beispiel 4 wurde aus 10 g (27,8 mmol) der Verbindung aus Beispiel 111 das Beispiel 112 hergestellt. Ausbeute: 4,53 g (49% der Theorie) gelbliche Kristalle Schmp. : 113°C

10 Beispiel 113

Methyl-erythro-(E)-7-[5-tert.butyldimethyl-silyloxymethyl-2(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Aus der Verbindung des Beispiels 112 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 5, 6, 7, 8, 9 und 10 das Beispiel 113 hergestellt.

25 Man erhielt einen farblosen Schaum.

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,2 (s, 6H, Si(CH₃)₂); 9,13 (s, 9H, Si-C(CH₃)₃); 1,3 (m, 8H, CH(CH₃)₂ + CH(OH)-CH₂-CH(OH)); 2,4 (m, 2H, CH₂-COOCH₃); 2,65 (s, 3H, 6'-CH₃); 3,1 (b, 1H, OH); 3,65 (b, 1H, OH); 3,7 (s, 3H, O-CH₃); 4,1 (m, 1H, CH-OH); 4,35 (m, 1H, CH-OH); 4,8 (s, 2H, 5'-CH₂); 5,15 (dd, 1H, 6-H); 6,7 (d, 1H, 7-H); 7,0 (m, 2H, 3''-H); 7,35 (m, 2H, 2''-H) ppm.

30

35


Le A 25 747

Beispiel 114

5

Methyl-erythro-(E)-7-[2-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-4-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

10



15

223 g (0,4 mmol) der Verbindung aus Beispiel 113 werden in 5 ml Methanol mit 0,5 ml 1 N Salzsäure 2 Tage bei Raumtemperatur gerührt. Einengen und Säulenchromatographie an 18 g Kieselgel 230-400 mesh, ø 2 cm, Chloroform/Methanol 10:1 ergeben 100 mg (57% der Theorie) farblosen Schaum.

20

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,2 - 1,45 (m, 8H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ + $\text{CH}(\text{OH})\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{OH})$); 2,4 (m, 2H, $\text{CH}_2\text{-COOCH}_3$); 2,7 (s, 3H, 6'- CH_3); 3,1 (b, 1H, OH); 3,6 (m, 2H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ + OH); 3,7 (s, 3H, O- CH_3); 4,1 (m, 1H, CHOH); 4,35 (m, 1H, CH-OH); 4,88 (s, 2H, 5'- CH_2); 5,18 (dd, 1H, 6'-H); 6,7 (d, 1H, 7-H); 7,03 (m, 2H, 3''-H); 7,38 (m, 2H, 2''-H) ppm.

25

30

35

Le A 25 747

17 JUN 1971 08:08


Beispiel 115

5

Methyl-erythro-(E)-7-[5-benzyloxymethyl-2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat

10

15



Aus der Verbindung des Beispiels 112 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 12, 6, 7, 8, 9 und 10 das Beispiel 115 hergestellt. Man erhielt einen farblosen Schaum.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,2 - 1,45 (m, 8H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ + $\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})$); 2,4 (m, 2H, $\text{CH}_2-\text{COOCH}_3$); 2,6 (s, 3H, 6'- CH_3); 3,05 (b, 1H, OH); 3,5 (m, 2H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ + OH); 3,72 (s, 3H, O- CH_3); 4,1 (m, 1H, $\text{CH}-\text{OH}$); 4,35 (m, 1H, CHOH); 4,62 (s, 2H, O- CH_2); 4,66 (s, 2H, O CH_2); 5,15 (dd, 7H, 6-H); 6,2 (d, 1H, 7-H); 7,12 (m, 2H, 3''-H); 7,3 - 7,45 (m, 7H, Aromaten-H) ppm.

35

Le A 25 747


17 JAN 1988 * 86 9880

Beispiel 116

5

Methyl-erythro-(E)-7-[2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-5-methoxymethyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

10



15

Aus der Verbindung des Beispiels 112 wurde in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 59, 6, 7, 8, 9 und 10 das Beispiel 116 hergestellt. Man erhielt einen farblosen Schaum.

20

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): $\delta = 1,2 - 1,45$ (m, 8H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2 + \text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})$); 2,4 (m, 2H, $\text{CH}_2-\text{COOCH}_3$); 2,63 (s, 3H, 66'- CH_3); 3,15 (b, 1H, OH); 3,5 (m, 4H, O- $\text{CH}_3 + \text{CH}(\text{CH}_3)_2$); 3,62 (b, 1H, OH); 3,71 (s, 3H, COOCH_3); 4,1 (m, 1H, CH-OH); 4,35 (m, 1H, CH-OH); 4,55 (s, 2H, O- CH_2); 5,15 (dd, 1H, 6-H); 6,65 (d, 1H, 7-H); 7,0 (m, 2H, 3''-H); 7,35 (m, 2H, 2''-H) ppm.

25

30


35

Le A 25 747

17. JAN 1966 - 569887

Beispiel 117

3-Benzylloxymethyl-4-(4-fluorphenyl)-6-isopropyl-5-(methyl-erythro-(E)-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat-7-yl)-pyridin-N-oxid



208,4 mg (0,4 mmol) der Verbindung aus Beispiel 64 gelöst in 10 ml Dichlormethan werden mit 863 mg (4 mmol) 80 %iger meta-Chlorperoxybenzoesäure versetzt und über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Nach Einengen im Vakuum wird der Rückstand an einer Säule (Kieselgel 70-230 mesh, mit Dichlormethan/Methanol 96:4) chromatographiert.

Ausbeute: 107 mg (50% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,20 - 1,60 (m, 2H); 1,45 (d, 6H); 2,40 (m, 2H); 2,58 (s, 3H); 3,62 (m, 1H); 3,72 (s, 3H); 4,08 (m, 1H); 4,12 (s, 2H); 4,30 (m, 1H); 4,38 (s, 2H); 5,23 (dd, 1H); 6,28 (d, 1H); 7,00 - 7,40 (m, 9H) ppm.

Le A 25 747


17. JAN. 1981 1669880

Beispiel 118

5

3-Amino-4'-fluor-zimtsäurenitril

10



Zu einer Suspension von 30 g (1 mol) Natriumhydrid in 300 ml p.a. Tetrahydrofuran tropft man bei Raumtemperatur unter Rühren eine Lösung von 41 g (1 mol) Acetonitril, 135 g (1,1 mol) 4-Fluorbenzonitril und 7,4 g (0,1 mol) tert.-Butanol in 300 ml Tetrahydrofuran zu und erhitzt auf ca. 30°C, bis die Reaktion anspringt. Unter externem Kühlen wird der Rest bei 35 - 40°C zugetropft und anschließend 30 min unter Rückfluß gekocht. Dann werden vorsichtig 500 ml Wasser zugetropft, die wäßrige Phase zweimal mit Essigester extrahiert und die vereinigten organischen Phasen über Natriumsulfat getrocknet. Nach Abziehen des Lösemittels bleibt ein Kristallbrei, der mit Ether verrührt und abgesaugt wird (65,1 g). Das Filtrat wird zur Trockene einrotiert, mit Toluol über 300 g Kieselgel filtriert und wie oben aus Ether kristallisiert (46,3 g).
Ausbeute: 111,4 g (69% der Theorie) farblose Kristalle
Schmp.: 108°C


35

Le A 25 747

17. JAN. 1959-5089880

Beispiel 119

E/Z-4-Methoxycarbonyl-2,6-dimethyl-hept-4-en-3-on




158 g (1 mol) Isobutyrylessigsäureethylester, 108 g
 (1,5 mol) Isobutyraldehyd, 8,75 ml Piperidin und 6,25 ml
 Essigsäure werden in 400 ml Isopropanol 20 h bei 50°C
 gerührt. Man zieht im Wasserstrahlvakuum flüchtige Kom-
 ponenten ab und destilliert anschließend im Hochvakuum.

Ausbeute: 145 g (68 % der Theorie) farbl. Öl,
 Kp = 60°C, 0,2 mbar

Beispiel 120

3-Cyano-5-ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-4,6-diisopropyl-pyridin



- 5 26,7 g (165 mmol) der Verbindung aus Beispiel 118 und 35
g (165 mmol) E/Z-4-Ethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-hept-4-
en-3-on aus Beispiel 130 werden 4 h bei 200°C Badtempe-
ratur erhitzt. Dann gibt man weitere 17 g (80 mmol) der
letzten Komponente zu und erhitzt über Nacht. Der Rück-
stand wird mit 3 l Toluol/Petrolether (1:1), 3 l Toluol
10 und 2 l Toluol/Essigester (10:1) über 450 g Kieselgel
(230-400 mesh) vorgereinigt. Aus dem eingengten Filtrat
kristallisieren aus Ether 5,7 g (9,7%) gelbliche Kris-
talle (Schmp.: 140°C). Das Filtrat wird nochmal an 750 g
Kieselgel mit Petrolether/Essigester (10:1) chromatogra-
15 phiert. Man erhält zwei Zonen:
1. 7,4 g (12,5%) farblose Kristalle vom Schmp.: 141°C
(aus Ether/Petrolether) und als Nebenprodukt
 2. 3,5-Bis-cyano-2,6-bis-4-fluorphenyl-1,4-dihydro-4-
isopropyl-pyridin [2,2 g (3,7%) gelbliche Kristalle
20 vom Schmp.: 227 - 228°C, aus Ether/Petrolether].
- Gesamtausbeute: 13,1 g (22% der Theorie)
- ¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,93 (d, 3H); 1,02 (d, 3H); 1,2 (m,
6H); 1,3 (t, 3H); 1,8 (m, 1H); 3,6
(d, 1H); 4,2 (m, 2H); 6,15 (b, 1H);
25 7,2 (t, 2H); 7,53 (m, 2H) ppm.

30

35


Le A 25 747

17 JAN 1968

0000 100 00

Beispiel 121

3-Cyano-5-ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-4,6-diisopropyl-pyridin




Die Darstellung erfolgt analog der Vorschrift von Beispiel 3 aus 16,0 g (45 mmol) der Verbindung aus Beispiel 120.

Ausbeute: 14,5 g (91% der Theorie)

Schmp.: 82° C

Beispiel 122

2-(4-Fluorphenyl)-3-formyl-5-hydroxymethyl-4,6-diisopropyl-pyridin



Zu einer Lösung von 14,5 g (41 mmol) der Verbindung aus Beispiel 121 in 320 ml Toluol p.a. tropft man unter Argon bei -78° C bis -75° C 110 ml (165 mmol) einer 1,5 M Lösung von Diisobutylaluminiumhydrid in Toluol, rührt 2 h bei dieser Temperatur und anschließend 1 h bei -20° C.

Le A 25 747


17. JUL 1980 7 36 9 58 0

5 Dann werden 350 ml Wasser und 250 ml Essigester
zugetropft, mit Kieselgur abgesaugt, mit Essigester
nachgewaschen und die wäßrige Phase mit 300 ml
Essigester extrahiert. Die vereinigten organischen
Phasen werden mit Kochsalzlösung gewaschen, über
Natriumsulfat getrocknet und eingeengt. Säulenchro-
10 matographie an 500 g Kieselgel (230-400 mesh) mit
Petrolether/Essigester (5:1) und Umkristallisation aus
Ether/Petrolether ergibt 5,4 g (42% der Theorie)
gelbliche Kristalle vom Schmp.: 147°C.

15 Beispiel 123

(E) -3-[2-(4-Fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-4,6-
diisopropyl-pyridin-3-yl]-prop-2-enal

20



25

Die Darstellung erfolgt analog Beispiel 8 aus 200 mg
(6,6 mmol) 80%igem Natriumhydrid, 0,86 g (3,3 mmol)
Diäthyl-2-(cyclohexylamino)-vinylphosphonat und 0,94 g
(3 mmol) der Verbindung aus Beispiel 122.

30 Ausbeute: 0,46 g (45% der Theorie)
Schmp.: 210°C

35

Le A 25 747

17. JAN. 1977 669680


08

Beispiel 124

5

Methyl-(E)-7-[2-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-4,6-diisopropyl-pyridin-3-yl]-5-hydroxy-3-oxo-hept-6-enoat

10



15

Zu einer Suspension von 0,15 g (5 mmol) 80%igem Natriumhydrid in 6,5 ml Tetrahydrofuran p.a. tropft man bei 0°C - 5°C unter Argon 0,5 ml (4,5 mmol) Acetessigsäuremethylester. Nach jeweils 15 min. werden bei 0°C zuerst innerhalb 10 min 3,65 ml (6 mmol) 15%iges Butyllithium in Hexan zugetropft, dann eine Lösung von 1,01 g (4,5 mmol) trockenem Zinkbromid in 4,5 ml Tetrahydrofuran und schließlich 0,51 g (1,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 123. Man rührt über Nacht bei Raumtemperatur, versetzt langsam mit gesättigter Ammoniumchlorid-Lösung, extrahiert die wäßrige Phase mit Essigester, wäscht die vereinigten organischen Phasen mit gesättigter Kochsalz-Lösung, trocknet über Natriumsulfat und engt ein. Nach Säulenchromatographie (ø 3 cm) an 20 g Kieselgel (230-400 mesh) mit Petrolether-Essigester (1:1) erhält man 0,17 g (25% der Theorie) gelbliches Öl. $R_f = 0,35$ (Petrolether-Essigester (1:1)).

35

Le A 25 747

17 JAN 1971 4369680

1971 JAN 19


40264

Beispiel 125

5

Methyl-erythro-(E)-7-[2-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-
4,6-diisopropyl-pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-
enoat

10



15

Die Darstellung erfolgt analog der Vorschrift von
Beispiel 10 aus 0,15 g (0,33 mmol) der Verbindung aus
Beispiel 124.

20

Ausbeute: 85 mg (56% der Theorie)

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,25 - 1,6 (m, 14H, $\text{CH(OH)-CH}_2\text{-CH(OH) + CH(CH}_3)_2$); 2,45 (m, 2H, $\text{CH}_2\text{-COOCH}_3$); 3,1 (b, 1H, OH); 3,45 -
25 3,7 (m, 3H, $\text{CH(CH}_3)_2 + \text{OH}$); 3,7 (s, 3H, OCH_3); 4,1 (m, 1H, CH(OH)); 4,35 (m, 1H, CH(OH)); 4,85 (s, 2H, $\text{CH}_2\text{-OH}$); 5,7 (dd, 1H, 6-H); 6,25 (d, 1H, 7-H); 7,05 (t, 2H, 3''-H); 7,45 (m,
30 2H, 2''-H) ppm.


35

Beispiel 126

5

5-Ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-3-formyl-4,6-diisopropyl-pyridin

10



15

Die Darstellung erfolgt analog dem Verfahren für Beispiel 122 aus 3,5 g (10 mmol) der Verbindung aus Beispiel 121 und 35 ml 1 M Lösung von Diisobutylaluminiumhydrid in Toluol, wobei 1,5 h die Temperatur bei -75°C gehalten wird, dann auf -30°C erwärmt wird, bevor man mit Wasser versetzt.

20


Ausbeute: 0,8 g (22% der Theorie) farblose Kristalle
Schmp.: 88°C (aus Petrolether)

Beispiel 127

25

(E)-3-[5-Ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-4,6-diisopropyl-pyridin-3-yl]-prop-2-enal

30



35

Die Darstellung erfolgt analog der Vorschrift von Beispiel 8 aus 1,25 g (3,5 mmol) der Verbindung aus Beispiel 126.


Le A 25 747

Ausbeute: 0,17 g (72% der Theorie) farbloses Öl
 $R_f = 0,35$ (Petrolether-Essigester (5:1)).

Beispiel 128

Methyl-(E)-7-[5-ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-4,6-
 diisopropyl-pyridin-3-yl]-5-hydroxy-3-oxo-hept-6-enoat

15




Die Darstellung erfolgt analog der Vorschrift von
 Beispiel 123 aus 0,95 g (2,48 mmol) der Verbindung aus
 Beispiel 127.

Ausbeute: 0,83 g (67% der Theorie) farbloses Öl
 $R_f = 0,27$ (Petrolether-Essigester (2:1))

25 Beispiel 129

Methyl-erythro-(E)-7-[5-ethoxycarbonyl-2-(4-fluor-
 phenyl)-4,6-diisopropyl-pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxy-
 hept-6-enoat

30



35

Le A 25 747

17 JAN 1991 10:08:50


Die Darstellung erfolgt analog der Vorschrift von
Beispiel 10 aus 0,89 g (1,66 mmol) der Verbindung aus
Beispiel 128.

Ausbeute: 0,65 g (78% der Theorie) farbloses Öl

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,25 - 1,5 (m, 17H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ + CH_2 -
 CH_3 + $\text{CH}(\text{OH})$ - CH_2); 2,42 (m, 2H, CH_2 -
 COOCH_3); 2,95 (m, 1H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$);
3,15 (b, 1H, OH); 3,2 (m 1H,
 $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$); 3,6 (b, 1H, OH); 3,7 (s,
3H, O- CH_3); 4,1 (m, 1H, CH-OH); 4,4
(m, 3H, CH-OH + O- CH_2 - CH_3); 5,2 (dd,
1H, 6-H); 6,75 (d, 1H, 7-H); 7,05
(t, 2H, 3''-H); 7,45 (m, 2H, 2''-H)
ppm.

Beispiel 130

Methyl-erythro-(E)-7-[2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-5-
methoxy-methyl-6-methyl-1-oxyl-pyridin-3-yl]-3,5-
dihydroxy-hept-6-enoat



67 mg (0,15 mmol) der Verbindung aus Beispiel 116 und 54
mg (0,17 mmol) 55%ige Metachlorperbenzoesäure werden in

6 ml Dichlormethan 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Das
 5 Lösemittel wird abgezogen, der Rückstand in 20 ml Essig-
 ester aufgenommen und mit 20 ml gesättigter Natriumhy-
 drogencarbonatlösung gewaschen. Die wäßrige Phase wird
 mit 20 ml Essigester gewaschen und die vereinigten or-
 ganischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet. Das
 10 Rohprodukt wird an 10 g Kieselgel (230-400 mesh) in
 einer Säule (ø 2 cm) mit Essigester und Essigester/Me-
 thanol (10:1) chromatographiert.

Ausbeute: 57 mg (82% der Theorie) amorpher Feststoff


¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,1 - 1,3 (m, 2H, CH(OH)-CH₂-
 15 CH(OH)); 1,35 (d, 6H, CH(CH₃)₂);
 2,38 (m, 2H, CH₂-COOCH₃); 2,6 (s,
 3H, 6'-CH₃); 3,4 (b, 1H, OH); 3,5
 (m, 4H, CH(CH₃)₂ + CH₂-O-CH₃); 3,28
 (b, 1H, OH); 3,72 (s, 3H, COOCH₃);
 20 4,05 (m, 1H, HO-C-H); 4,28 (m, 1H,
 HO-C-H); 4,55 (s, 2H, O-CH₂); 5,12
 (dd, 1H, 6-H); 6,38 (d, 1H, 7-H);
 7,05 - 7,25 (m, 4H, Aromaten-H)
 ppm.

25 MS: m/e = 461 (9%), M⁺.

Beispiel 131

2-(4-Fluorphenyl)-3-formyl-4,6-diisopropyl-5-methoxy-
 30 methyl pyridin

35



Le A 25 747

17. JAN 1966 569880

RPPI


Aus 3,15 g (10 mmol) der Verbindung aus Beispiel 122 in
 5 Analogie zur Vorschrift aus Beispiel 59 erhält man
 3,15 g (96 % der Theorie) farblose Kristalle vom Schmp.
 77° C (aus MeOH)

Beispiel 132

10

Methyl-erythro-(E)-7-[2-(4-fluorphenyl)-4,6-diisopropyl-
 5-methoxymethyl-pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-
 enoat

15



20

Aus der Verbindung aus Beispiel 131 erhält man gemäß den
 Vorschriften aus Beispiel 8, 9 und 10 farblose Kristalle
 vom Schmp. 92° C (aus Ether/Petrolether)

25

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3) : δ = 1,3 (m, 14H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ + 4-H); 2,4
 (m, 2H, 2-H); 3,05 (b, 1H, OH);
 3,3-3,57 (m, 5H, O-CH_3 + $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$);
 3,62 (b, 1H, OH); 3,72 (s, 3H,
 30 COOCH_3); 4,1 (m, 1H CH-OH) 4,35 (m,
 1H, CH-OH); 4,55 (s, 2H, O-CH_2);
 5,15 (dd, 1H, 6-H); 6,75 (d, 1H,
 7-H); 7,0 (+, 2H, 3''H); 7,45 (m,
 2H, 2''-H).

35

Le A 25.747


17 JAN 1961 4 56 9880

Beispiel 133

5

5-Cyano-3-ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-4-isopropyl-6-methyl-pyridin

10



15

17,4 g (0,2 mol) 3-Amino-crotonsäurenitril und 56 g (0,2 mol) der Verbindung aus Beispiel 109 werden in 800 ml Ethanol über Nacht am Rückfluß gekocht. Das Lösungsmittel wird abgezogen und der Rückstand an Kieselgel mit Petrolether/Essigester 20:1 chromatographiert.

20

Ausbeute: 14,9 g (21 % der Theorie)


$^1\text{H-NMR}$ (COCl_3): δ = 1,0 (m, 9H); 1,9 (m, 1H); 2,2 (m, 3H); 3,6 (d, 1H); 3,9 (m, 2H); 5,75 (b, 1H); 7,1 (t, 2H); 7,25 (m, 2H).

25

Beispiel 134

5-Cyano-3-ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methyl-pyridin

30



35

Le A 25 747

17 JAN 1989 8 38 08 80

000-101 28

460001

5 Analog Beispiel 3 aus 9,8 g (30 mmol) der Verbindung aus
Beispiel 133


Ausbeute: 9,4 g (96 % der Theorie), Schmp. 76°C.

Beispiel 135

10

5-Cyano-2-(4-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-4-isopropyl-5-methyl-pyridin

15



20

Unter Argon gibt man zu einer Lösung von 9,8 g (30 mmol) der Verbindung aus Beispiel 134 in 150 ml Toluol p.a. bei -75°C innerhalb von 1,5 h 50 ml (60 mmol) 1,2 M Diisobutylaluminiumhydrid-Lösung in Toluol zu und rührt weitere 30 min.

25

Bei -30°C werden vorsichtig 280 ml Wasser zugetropft, mit Kieselgur abgesaugt und mit Essigester nachgewaschen. Die wäßrige Phase wird dreimal mit Essigester extrahiert, die vereinigten organischen Phasen mit ges. Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. Säulenchromatographie (400 g Kieselgel, 230-400 mesh, ø 6 cm, Petrolether/Essigester 10/1 → 5/1) ergibt 3 Zonen:

30

35

Le A 25 747

17 JAN 1987 0669880


2001-01-01

CPD-2001

1.

- 5 3-Ethoxycarbonyl-2-(4-fluorphenyl)-5-formyl-4-isopropyl-6-methyl-pyridin

10



2,6 g (26 % der Theorie) vom Schmp. 53° C

15

2.


2,1 g (25 % der Theorie) der Titelverbindung (Beispiel 135) Schmp. 157° C aus Ether/Petrolether.

20

3.

2-(4-Fluorphenyl)-5-formyl-3-hydroxymethyl)-4-isopropyl-6-methyl-pyridin

25



30

1,6 g (19 % der Theorie), Schmp. 150° C aus Ether/Petrol-ether.

35


Le A 25 747

Beispiel 136

5

5-Cyano-2-(4-fluorphenyl)-3-formyl-4-isopropyl-6-methyl-
pyridin.

10



15

Zu 1,1 g (14 mmol) DMSO in 8 ml Methylenchlorid tropft
man bei -75°C 2,2 g (10,5 mmol) Trifluoressigsäurean-
hydrid in 10 ml Methylenchlorid, rührt 10 min bei -70°C ,
tropft dann eine Lösung von 2,0 g (7 mmol) der Verbin-
dung aus Beispiel 135 in 50 ml Methylenchlorid zu und
rührt 1 h bei -70°C .

20

Zu der jetzt vorliegenden Suspension werden 2,1 ml (21
mmol) Triethylamin getropft und 10 min bei -65°C ge-
rührt. Nach Erwärmen auf Raumtemperatur wird mit ges.
Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet
und eingeengt.

25

Rohausbeute: 2,0 g (100 % der Theorie), Schmp. 109°C
 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,52 (d, 6H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$); 2,9 (s, 3H,
6- CH_3); 4,0 (sept. 1H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$);
7,2 (m, 2H, 3'-H); 7,5 (m, 2H, 2'-H);
9,95 (s, 1H, CHO).

30

35

Le A 25 747

17. JAN 1986 4 56 PM '86


SPRINT 1.0

Beispiel 137

5

(E)-3-[5-Cyano-2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methylpyrid-3-yl]-prop-2-enal

10



15 Analog Beispiel 8 aus 1,9 g der Verbindung aus Beispiel 136


Ausbeute: 0,6 g (28 % der Theorie), Schmp. 112° C (Ether-Petrolether).

Beispiel 138

20

Methyl-(E)-7-[5-cyano-2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methylpyrid-3-yl]-5-hydroxy-3-oxo-hept-6-enoat

25



30

Analog Beispiel 9 aus 0,52 g (1,7 mmol) der Verbindung aus Beispiel 137

Ausbeute: 0,32 g (44 % der Theorie) gelbliches Öl.

35


Le A 25 747

Beispiel 139

5

Methyl-erythro-(E)-7-[5-Cyano-2-(4-fluorphenyl)-4-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

10



15

Analog Beispiel 10 aus 0,32 g der Verbindung aus Beispiel 138

Ausbeute: 0,15 g (47 % der Theorie) gelbliches Öl.

20

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,35 (m, 2H, $\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{-CH}(\text{OH})$);
1,45 (d, 6H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$); 2,42 (m, 2H, $\text{CH}_2\text{-COOCH}_3$); 2,7 (s, 3H, 6- CH_3);
3,55 (m, 2H, $\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ + OH); 3,68 (b, 1H, OH); 3,72 (s, 3H, O- CH_3);
4,13 (m, 1H, $\text{CH}(\text{OH})$), 4,4 (m, 1H, $\text{CH}(\text{OH})$); 5,32, (dd, 1H, Olefin-H);
6,6 (d, 1H, Olefin-H); 7,08 (m, 2H, 3"-H); 7,45 (m, 2H, 2"-H).

25


30 Beispiel 140

4-Fluorbenzoylessigsäureethylester

35

Le A 25 747


17. JAN 1954 - 2000000



- 5 In einen Liter Diethylether p.a. werden 21,7 g (0,72 mol) Natriumhydrid (80 %ig, 20 % Mineralöl) eingewogen und anschließend 85,5 g (127 ml, 0,72 mol) Kohlensäure-
- 10 diethylester (VK 22-010) zugegeben. In dieser Lösung wird in der Siedehitze über einen Zeitraum von 4 Stunden eine Lösung von 100 g (0,72 mol) 4-Fluoracetophenon in 300 ml Diethylether zugetropft (kräftiger, mechanischer Rührer erforderlich; es bildet sich ein zäher Brei).
- 15 Danach wird eine weitere Stunde am Rückfluß gekocht, dann auf ca. 5°C abgekühlt und bei dieser Temperatur unter N₂ zunächst eine Lösung aus 50 ml Essigsäure und 100 ml Et₂O zugetropft. Anschließend wird etwa 500 ml H₂O zugetropft und die organische Phase abgetrennt. Die
- 20 Wasserphase wird nochmals mit Et₂O extrahiert (2 x 400 ml), die vereinigten etherischen Phasen mit NaHCO₃-Lösung gewaschen, über MgSO₄ getrocknet und eingeeengt. Der Rückstand wird über eine kurze Vigreux-Kolonne destilliert.
- 25 Ausbeute: 93 g (60 %) Kp 0,4 mm 99-102°C

Beispiel 141

- 30 5-Cyano-3-ethoxycarbonyl-4-(4-fluorphenyl)-1,4-dihydro-2-isopropyl-6-methyl-pyridin



Le A 25 747

17. JAN 1971 569680

52,8 g (0,2 mol) der Verbindung aus Beispiel 1 und
5 16,4 g (0,2 mol) 3-Amino-crotonsäurenitril werden in
200 ml Ethylenglykol 2 h am Rückfluß gekocht. Nach dem
Abkühlen hebt man das abgeschiedene Öl ab, und extra-
hiert noch dreimal mit Ether. Die Etherphasen werden mit
Wasser gewaschen, getrocknet und eingeengt. Der Rück-
10 stand und das zuerst isolierte Öl werden aus Ether
kristallisiert.


Ausbeute: 31,4 g (48 %), Schmp. 168°C.

Beispiel 142

15

5-Cyano-3-ethoxycarbonyl-4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-
6-methyl-pyridin

20



25

Analog Beispiel 3 werden 14,8 g (45 mmol) der Verbindung
aus Beispiel 141 umgesetzt.

30 Ausbeute: 13,7 g (93 % der Theorie) farbl. Kristalle vom
Schmp. 95°C.

35

Le A 25 747

17. JAN 1980 + 269880


ROHM 501 7 5 1 1 1

Beispiel 143

5

5-Cyano-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-2-isopropyl-6-methyl-pyridin

10




15

Verbindung 1

5-Cyano-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxyiminomethyl-3-hydroxymethyl-2-isopropyl-6-methyl-pyridin

20



25

Verbindung 2

16,3 g (50 mmol) der Verbindung aus Beispiel 142 in
240 ml Toluol p.A. tropft man bei -78°C unter Argon
innerhalb von 3 h 83,3 ml (0,1 mol) 1,2 M Diisobutyl-
aluminiumhydrid Lösung in Toluol, daß die Temperatur
unter -75°C bleibt.

30

35

Le A 25 747

17 JAN 1956 16.9086

100 102

5 Man rührt noch 30 min bei -75°C , läßt auf -30°C erwärmen und gibt dann vorsichtig 300 ml Wasser und 160 ml Essigester zu.

10 Über Kieselgur wird abgesaugt und mit Essigester nachgewaschen. Die wäßrige Phase wird dreimal mit Essigester extrahiert, die vereinigten org. Phasen mit ges. Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. Zweimalige Säulenchromatographie über Kieselgel mit Toluol/Essigester 5:1 bzw. Petrolether/Essigester 5:1 ergibt 3,4 g einer Fraktion von R_f -Wert 0,2
15 (Petrolether/Essigester 5:1), die ein Gemisch aus 5-Cyano-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-2-isopropyl-6-methyl-pyridin und 4-(4-Fluorphenyl)-5-formyl-3-hydroxy-2-isopropyl-6-methyl-pyridin darstellt.

20 3,16 g dieses Gemisches werden in 10 ml Methanol gelöst und zu einer Lösung von 1,22 g (17,6 mol) Hydroxylaminhydrochlorid und 1,22 g (14,9 mmol) Natriumacetat in 10 ml Wasser gegeben. Nach 3 h Rühren bei Raumtemperatur wird das Methanol abrotiert, etwas Wasser zugegeben und
25 dreimal mit Essigester extrahiert. Die org. Phasen werden mit ges. Kochsalzlösung gewaschen, unter Natriumsulfat getrocknet und eingeeengt. Den Rückstand chromatographiert man in einer Säule (100 g Kieselgel 230-400 mesh, $\varnothing$ 4 cm, Petrolether/Essigester 5:1). Man erhält
30 zwei Fraktionen:

35

Le A 25 747

17. JUN 1967

- 5 Verbindung 1: 0,65 g (4,9 %) farbl. Kristalle vom
Schmp. 132° C
- 5-Cyano-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxy-
methyl-2-isopropyl-6-methyl-pyridin
- 10 ¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,32 (d, 6H,, CH(CH₃)₂); 1,6 (b, 1H,
OH); 2,7 (s, 3H, 6-CH₃); 3,5 (sept,
1H, CH(CH₃)₂); 4,5 (d, 2H, CH₂-OH);
7,15-7,35 (m, 4H, Aromaten-H).
- 15 Verbindung 2: 2,15 g (15,3 %) amorpher Feststoff
- 5-Cyano-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxy-
iminomethyl-3-hydroxymethyl-2-iso-
propyl-6-methyl-pyridin
- 20 ¹H-NMR (CFCl₃): δ = 1,33 (d, 6H, CH(CH₃)₂);
1,4 (b, 1H, -OH);
2,7 (s, 3H,, 6-CH₃);
3,48 (m, 1H, CH(CH₃)₂);
25 4,4 (d, 2H, CH₂-OH);
7,15 (m, 4H, Aromaten-H);
7,77 (s, 1H, CH=N-);
8,08 (s, 1H, =N-OH).

30

35

Le A 25 747

17 JAN 1973 4569886


4569886

Beispiel 144

5

5-Cyano-4-(4-fluorphenyl)-3-formyl-2-isopropyl-6-methyl-
pyridin

10



15

A) 0,63 g (2,2 mmol) der Verbindung 1 aus Beispiel 144
wird analog dem Verfahren aus Beispiel 136 umge-
setzt. Ausbeute: 0,6 g (97 %).

20

B) Zu 1,1 g (14 mmol) DMSO in 8 ml Methylenchlorid
p.A. tropft man bei -78°C 4,4 g (21 mmol) Trifluor-
essigsäureanhydrid in 15 ml Methylenchlorid und
rührt 10 min bei -70°C . Dann gibt man 2,1 g (7
mmol) der Verbindung 2 aus Beispiel 143 in 50 ml
Methylenchlorid zu, rührt 1 h bei -70°C , gibt jetzt
5,8 ml (42 mmol) Triethylamin zu und rührt 4 h bei
Raumtemperatur. Es wird mit ges. Kochsalzlösung ge-
waschen, eingeengt, über 100 g Kieselgel (230-400
mesh, $\varnothing$ 4 cm, Petrolether/Essigester 10:1) chroma-
tographiert und aus Essigester/Petrolether umkri-
stallisiert.

25

30

Ausbeute: 0,31 g (16 %), Schmp. 82°C

35

Le A 25 747

17. JUN 1971


1971 JUN 17

1971 JUN 17

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,32 (d, 6H, CH(CH₃)₂); 2,78 (s, 3H, 6-CH₃); 3,77 (m, 1H, CH(CH₃)₂); 7,23 (m, 2H, 3'-H); 7,36 (m, 2H, 2'-H); 9,86 (s, 1H, CHO).

Beispiel 145

Methyl-erythro-(E)-7-[5-cyano-4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-6-methyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Die Umsetzung erfolgt aus der Verbindung aus Beispiel 144 in Analogie zu den Reaktionen aus Beispiel 8, 9 und 10. Farbloser Feststoff, Schmp. 124°C.

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,3 (m, 8H, CH(CH₃)₂ + CH(OH)-CH₂-CH(OH)); 2,4 (m, 2H, CH₂-COOCH₃); 2,75 (s, 3H, 6-CH₃); 3,35 (m, 2H, CH(CH₃) + OH); 3,6 (b, 1H, OH); 3,7 (s, 3H O-CH₃); 4,1 (m, 1H, CH-OH); 4,35 (m, 1H, CH-OH); 5,3 (dd, 1H, 6-H); 6,4 (d, 1H, 7-H); 7,05-7,3 (m, 4H, Ar-H).

Le A 25 747


Beispiel 146

5

5-(tert.-Butyldimethylsilyloxymethyl)-6-cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-2-isopropyl-pyridin-3-carbonsäureethylester

10

15



15 g (42 mmol) der Verbindung aus Beispiel 82 werden analog Beispiel 5 umgesetzt.


20 Ausbeute: 14,9 g (85,4 % der Theorie)

Beispiel 147

3-(tert.-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-hydroxymethyl-6-isopropyl-pyridin

30

35



Le A 25 747

17 JAN 1957


689685

4/8/57

16,9 g (35,8 mmol) der Verbindung aus Beispiel 146
werden analog Beispiel 6 umgesetzt.
Ausbeute: 12,3 g (80,1 % der Theorie).

Beispiel 148


3-(tert.-Butyldimethylsilyloxymethyl)-2-cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-6-isopropyl-5-methoxymethyl-pyridin



5,5 g (12,8 mmol) der Verbindung aus Beispiel 147 werden
analog Beispiel 59 umgesetzt.
Ausbeute: 5,7 g Rohprodukt.

Beispiel 149

2-Cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-6-isopropyl-5-methoxymethyl-pyridin



Le A 25 747

17. JAN 1971


100 100 000

5,7 g (12,8 mmol) des Rohproduktes aus Beispiel 148 werden in absol. Tetrahydrofuran gelöst. Nach Zugabe von 12,8 ml Tetrabutylammoniumfluorid-Lösung (1 M in THF) wird über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Dann werden 50 ml gesättigte Natriumhydrogencarbonatlösung zugegeben und es wird mehrmals mit Methylenchlorid extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit Natriumsulfat getrocknet, eingeeengt und über Kieselgel chromatographiert (Laufmittel: Petrolether/Essigester 7:3). Ausbeute: 3,9 g (94 % der Theorie).

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,0 (s, 6H); 0,87 (s, 9H); 0,8-1,0 (m, 2H); 1,22 (d, 6H); 1,10-1,30 (m, 2H); 2,31 (m, 1H); 3,12 (s, 3H); 3,30 (m, 1H); 3,98 (s, 2H); 4,47 (m, 2H); 7,0-7,3 (m, 4H) ppm.

Beispiel 150

Methyl-erythro-(E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-6-isopropyl-5-methoxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat




Le A 25 747

Aus der Verbindung aus Beispiel 149 wurde, in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 7, 8, 9, 10, das Beispiel 150 hergestellt.

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,89 (m, 2H); 1,18 (m, 2H); 1,26 (d, 6H); 1,40 (m, 2H); 2,24 (m, 1H); 2,44 (m, 2H); 3,17 (s, 3H); 3,30 (m, 1H); 3,72 (s, 3H); 4,03 (s, 2H); 4,12 (m, 1H); 4,32 (m, 1H); 5,51 (d,d, 1H); 6,32 (d, 1H); 7,10 (m, 4H) ppm.

Beispiel 151

3-Amino-3-cyclopropyl-acrylsäureethylester



49,9 g (0,32 mol) Cyclopropylcarbonylessigsäureethylester in 200 ml trockenem Toluol werden mit 1,1 g p-Toluolsulfonsäure versetzt und bei Raumtemperatur unter Rühren mit Ammoniak-Gas gesättigt. Nach Stehenlassen über Nacht wird 8 h am Wasserabscheider unter Rückfluß gekocht, wobei kontinuierlich Ammoniak-Gas eingeleitet wird. Man läßt über Nacht abkühlen, filtriert, engt die Toluollösung im Vakuum ein und destilliert im Hochvakuum bis 65°C vom nicht umgesetzten Ausgangsmaterial ab. Die Substanz befindet sich anschließend im Rückstand. Ausbeute: 11,9 g (24 % der Theorie).

Le A 25 747


17 JAN 1991 10:08:00

Beispiel 152

5

1,4-Dihydro-2,6-dicyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-
3,5-dicarbonsäure-diethylester

10



15

6,2 g (40 mmol) der Verbindung aus Beispiel 43 und
10,5 g (40 mmol) der Verbindung aus Beispiel 40 werden
in 100 ml Ethylenglykol gelöst und über Nacht am Rück-
fluß gekocht. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wird die
20 Mischung mehrmals mit Ether extrahiert, die organische
Phase je einmal mit 10 %iger Salzsäure, gesättigter
Natriumbicarbonat-Lösung und Wasser gewaschen, über
Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum eingeeengt.
Ausbeute: 10,4 g (65,1 % der Theorie).

25

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,60 (m, 4H); 0,95 (m, 4H); 1,23 (t,
6H); 2,72 (m, 2H); 4,12 (m, 4H);
5,02 (s, 1H); 5,40 (s, 1H); 6,88 (m,
2H); 7,20 (m, 2H) ppm.

30

Beispiel 153

Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-dicyclopropyl-4-(4-fluor-
phenyl)-5-methoxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-
35 6-enoat


Le A 25 747

17 JAN 1965 609880

100-100 0 3

5

10



Aus der Verbindung aus Beispiel 150 wurde, in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 3, 4, 59, 60, 7, 8, 9, 10, das Beispiel 153 hergestellt.

15

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 0,89 (m, 4H); 1,08 (m, 4H); 1,40 (m, 2H); 2,21 (m, 2H); 2,43 (m, 2H); 3,21 (s, 3H); 3,72 (s, 3H); 4,11 (m, 1H); 4,15 (s, 2H); 4,30 (m, 1H); 5,47 (dd, 1H); 6,30 (d, 1H); 7,10 (m, 4H) ppm.


20

Beispiel 154

25

2,6-Diisopropyl-5-ethoxymethyl-4-(4-fluorphenyl)-pyridin-3-carbonsäureethylester

30



35

Le A 25 747


17. JAN 1977 569886

5 Zu einer Suspension von 2,29 g (76 mmol) Natriumhydrid
(80 %ig) in 30 ml absol. Tetrahydrofuran tropft man bei
Raumtemperatur 4,4 ml (76 mmol) absol. Ethanol und rührt
30 min. Dann tropft man eine Lösung von 2,7 g (7,6 mmol)
der Verbindung aus Beispiel 86 in 20 ml absol. Tetra-
hydrofuran zu und erhitzt über Nacht unter Rückfluß. An-
10 schließend wird der Reaktionsansatz auf Eiswasser gegos-
sen und, nachdem der pH auf 8 eingestellt wurde, mehr-
mals mit Ether extrahiert. Die organische Phase wird mit
Kochsalzlösung gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet,
eingeeengt und über Kieselgel chromatographiert (Lauf-
15 mittel Essigester/ Petrolether 5:95).
Ausbeute: 1,07 g (36,4 % der Theorie).

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 0,95 (t, 3H); 1,13 (t, 3H); 1,31 (m,
6H); 3,05 (m, 1H); 3,32 (q, 2H);
20 3,41 (m, 1H); 3,97 (q, 2H); 4,18 (d,
2H); 7,08 (m, 2H); 7,27 m, 2H) ppm.

Beispiel 155

25 Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-5-ethoxymethyl-4-
(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat



Le A 25 747

17. JAN. 1977 0009880

DEPT. OF AGR.

4-15-71

5 Aus der Verbindung aus Beispiel 154 wurde, in Analogie zu den Reaktionen aus den Beispielen 60, 7, 8, 9, 10, das Beispiel 155 erhalten.

10 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,13 (t, 3H); 1,20-1,50 (m, 8H); 2,43 (m, 2H); 3,30 (m, 3H); 3,72 (s, 3H); 4,08 (m, 1H); 4,12 (s, 2H); 4,29 (m, 1H); 5,25 (dd, 1H); 6,30 (d, 1H); 7,0-7,2 (m, 4H) ppm.

15 Analog Beispiel 155 wurden aus Beispiel 86 folgende Verbindungen erhalten:

Beispiel 156

20 Methyl-erythro-(E)-(7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-propyloxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat.

Beispiel 157

25 Methyl-erythro-(E)-(7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-isopropoxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat.

Beispiel 158

30 Methyl-erythro-(E)-(7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorphenyl)-5-butyloxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat.

35

Le A 25 747

Beispiel 159

5

Methyl-erythro-(E)-(7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluor-phenyl)-5-pentyloxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat.

10 Beispiel 160

Methyl-erythro-(E)-(7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluor-phenyl)-5-hexyloxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat.


15

Beispiel 161

Natrium-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-5-ethoxymethyl-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

20

25



30

487 mg (1 mmol) der Verbindung aus Beispiel 155 werden in 10 ml Tetrahydrofuran gelöst und mit 10 ml 0,1 N Natronlauge versetzt. Nach 1 h wird das Tetrahydrofuran am Vakuum abgezogen und der wäßrige Rückstand wird gefriergetrocknet.


Ausbeute: 490 mg (99 % der Theorie).

35

Le A 25 747

Beispiel 162

5



10

15 trans-(E)-6-[2-(3-benzyloxymethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-pyrid-5-yl)-ethenyl]-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-on

5,5 g (10 mmol) der Verbindung aus Beispiel 17 werden in
 100 ml Tetrahydrofuran gelöst und nach Zugabe von 100 ml
 0,1 N Natronlauge wird 1 h bei Raumtemperatur gerührt.
 Anschließend wird mit 100 ml Wasser verdünnt, mit 1 N
 HCl auf pH 4,4 gestellt und mit Methylenchlorid extra-
 20 hiert. Die Methylenchloridphase wird mit Natriumsulfat
 getrocknet und im Vakuum eingeeengt. Der Rückstand wird
 in 100 ml absol. Toluol gelöst, mit 40 g Molekularsieb
 4 Å versetzt und über Nacht unter Rückfluß erhitzt. An-
 25 schließend wird vom Molekularsieb abfiltriert, im Vakuum
 eingeeengt und der Rückstand wird mit Petrolether kri-
 stallisiert.

30

Ausbeute: 4,3 g (83,2 % der Theorie)


35

Le A 25 747

17. JAN 1968

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,22 (d,6H); 1,32 (d,6H); 1,40-1,80
(m,2H); 2,45-2,70 (m,2H); 3,30
(m,2H); 4,12 (m,1H); 4,14 (s,2H);
4,45 (s,2H); 5,04 (m,1H); 5,28
(dd,1H); 6,39 (d,1H); 6,95-7,40
(m,9H)ppm.

Beispiel 163



trans-(E)-6-[2-(2,6-diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-5-
phenoxy-methyl-pyrid-3-yl)-ethenyl]-3,4,5,6-tetrahydro-4-
hydroxy-2H-pyran-2-one

Analog Beispiel 162 erhält man aus 540 mg (1 mmol) der
Verbindung aus Beispiel 89 450 mg (89,4 % der Theorie).


¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,25 (d,6H); 1,30 (d,6H); 1,40-1,70
(m,2H); 2,60 (m,2H); 3,30 (m,2H);
4,18 (m,1H); 4,65 (s,2H); 5,08
(m,1H); 5,30 (dd,1H); 6,42 (d,1H);
6,70-7,30 (m,9H)ppm.

Le A 25 747

Beispiel 164

5

10



15 Methyl-erythro-(E)-7-[3-azidomethyl-2,6-diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-pyrid-5-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

459 mg (1 mmol) der Verbindung aus Beispiel 11 und
 320 mg (1,1 mmol) Triphenylphosphin werden in 10 ml
 20 absol. Tetrahydrofuran gelöst. Nach Zugabe von 3,2 ml
 einer 0,48 molaren Lösung von HN_3 in Toluol wird mit
 einem Eisbad gekühlt und 173 ml (1,1 mmol) Azodicarbon-
 säurediethylester werden zugegeben. Anschließend wird
 über Nacht bei Raumtemperatur gerührt und dann im Vakuum
 25 eingeeengt. Der Rückstand wird über Kieselgel chromato-
 graphiert (Laufmittel: Essigester/Petrolether 1:1).

Ausbeute: 260 mg (53,7 % der Theorie)

30 $^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,30 (m, 6H); 1,39 (d, 6H); 1,25-1,60
 (m, 2H); 2,50 (m, 2H); 3,37 (m, 2H);
 3,80 (s, 3H); 4,15 (m, 1H); 4,18
 (s, 2H); 4,36 (m, 1H); 5,36 (dd, 1H);
 6,36 (d, 1H); 7,15 (m, 4H) ppm.

35


Le A 25 747

17 JAN 1981 4 50 9880

9981 14. 10

Beispiel 165

5



15 **Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-5-succinimidooxymethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat**

20 Die Herstellung erfolgt analog Beispiel 164 aus der Verbindung aus Beispiel 11 und N-Hydroxysuccinimid.

¹H-NMR (CDCl₃): δ = 1,28 (m, 6H); 1,37 (d, 6H); 1,2-1,5 (m, 2H); 2,43 (m, 2H); 2,66 (s, 4H); 3,32 (sept., 1H); 3,72 (s, 3H); 3,78 (sept., 1H); 4,08 (m, 1H); 4,31 (m, 1H); 4,86 (s, 2H); 5,28 (dd, 1H); 6,33 (d, 1H); 7,0-7,4 (m, 4H) ppm.

25

30

30

35


Le A 25 747

17.11.19. 1309880

Beispiel 166

5

10



15 Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-4-(4-fluorophenyl)-
5-succinimidomethyl-pyrid-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-
enoat

20 Die Herstellung erfolgt analog Beispiel 164 aus der
Verbindung aus Beispiel 11 und Succinimid.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,23 (m, 12H); 1,25-1,50 (m, 2H);
2,43 (m, 2H); 2,51 (s, 4H); 3,16
(m, 1H); 3,28 (m, 1H); 3,73 (s, 3H);
25 4,07 (m, 1H); 4,26 (m, 1H); 4,52
(s, 2H); 5,25 (dd, 1H); 6,20 (d, 1H);
7,0-7,2 (m, 4H) ppm.

30

35


Le A 25 747

17 JAN 1981 08:08:00

Beispiel 167

5

10



15 **Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-3-(4-fluorbenzyl-oxymethyl)-4-(4-fluorphenyl)-pyrid-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat**

20 Aus der Verbindung des Beispiels 4 und 4-Fluorbenzylbromid wird analog der Beispiele 12-17 das Beispiel 166 erhalten.

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,25 (m,6H); 1,32 (d,6H);
 1,2-1,5 (m,2H); 2,42 (m,2H); 3,30
 25 (m,2H); 3,72 (s,3H); 4,07 (m,1H);
 4,13 (s,2H); 4,28 (m,1H); 4,30
 (s,2H); 5,22 (dd,1H); 6,30 (d,1H);
 6,90-7,30 (m,8H) ppm.

30

35

Le A 25 747


17. JAN. 1966

BRIT. 950,115

Beispiel 168

5

10



15

trans-(E)-6-[2-(2,6-diisopropyl-3-(4-fluorbenzyloxy-
methyl)-4-(4-fluorophenyl)pyrid-5-yl)-ethenyl]-3,4,5,6-
tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-on

20

Die Herstellung erfolgt analog Beispiel 164 aus der
Verbindung von Beispiel 167.

25

$^1\text{H-NMR}$ (CDCl_3): δ = 1,23 (d,6H); 1,32 (d,6H); 1,40-1,80
(m,2H); 2,40 (m,2H); 3,30 (m,2H);
4,13 (s,2H); 4,16 (m,1H); 4,30
(s,2H); 5,05 (m,1H); 5,28 (dd,1H);
6,37 (d,1H); 6,9-7,3 (m,8H) ppm.

30


35

Le A 25 747

17. JAN 1991

Beispiel 169

5



(E/Z)-2-Ethoxycarbonyl-4-methyl-1-(thiophen-2-yl)penten-3-on

15


Analog der Vorschrift für Beispiel 1 wird die Titelverbindung aus Isobutyrylessigsäureethylester und Thiophen-2-carbaldehyd hergestellt.

20

Ausbeute: 86 % gelbes Öl, Kp 145°C (1,5 mbar)

Beispiel 170

25



30

(E/Z)-2-Ethoxycarbonyl-1-(furan-2-yl)-4-methyl-penten-3-on


35

Le A 25 747

5 Analog der Vorschrift für Beispiel 1 wird die Titelver-
bindung aus Furan-2-carbaldehyd und Isobutyrylessig-
säureethylester hergestellt.

Ausbeute: 93 % gelbes Öl, Kp.: 130°C (0,5 mbar)

10 Beispiel 171



20 2,6-Diisopropyl-4-(thiopen-2-yl)-1,4-dihydro-
pyridin-3,5-bis(carbonsäureethylester)

70 g (0,28 mol) der Verbindung aus Beispiel 169 und 44 g
(0,28 mol) Ethyl-3-amino-4-methyl-pent-2-enoat wurden
25 24 h auf 160°C erhitzt. Man nimmt in Essigester auf,
wäscht dreimal mit 6 N Salzsäure, zweimal mit Wasser und
gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung und trocknet
die org. Phase über Natriumsulfat. Man engt im Vakuum
ein und chromatographiert den Rückstand an 400 g
30 Kieselgel 230-400 mesh mit Petrolether/Dichlormethan
2:1.

Ausbeute: 50 g (46 %) farbl. Kristalle vom Schmp. 72°C
(aus n-Hexan)


35

Le A 25 747

Beispiel 172

5

10



15 Methyl-erythro-(E)-7-[2,6-diisopropyl-5-methoxymethyl-4(thiophen-2-yl)-pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat


Ausgehend von den Verbindungen aus Beispiel 171 wurde analog zu den Vorschriften für die Beispiele 3,4,59,6, 20 7,8,9 und 10 die Titelverbindung hergestellt.

Farblose Kristalle vom Schmp. 94° C

Beispiel 173

25

30



35 4-(Furan-2-yl)-3,5-bis(hydroxyethyl)-2,6-diisopropylpyridin


Le A 25 747

17 JAN 1973 4569380

B21 11 17

5 Ausgehend von der Verbindung aus Beispiel 170 und Ethyl-
3-amino-4-methyl-pent-2-enoat wurde in Analogie zu den
Verfahren aus Beispiel 171,3 und 122 die Titelverbindung
hergestellt. Farbl. Kristalle vom Schmp. 212° C.

10 Beispiel 174




15 3-Formyl-4-(furan-2-yl)-5-hydroxymethyl-
2,6-diisopropyl-pyridin

20 Die Synthese erfolgt aus 32 g (0.11 mol) der Verbindung
aus Beispiel 173 und 28.6 g (0.13 mol) Pyridiumchloro-
chromat analog zur Vorschrift von Beispiel 7.

25 Ausbeute: 14,6 g (46 %) farbl. Kristalle
vom Schmp. 113° C

Beispiel 175



35 Le A 25 747


17 JAN 1971 4389880

5 Methyl-erythro-(E)-7-[4-(furan-2-yl)-5-hydroxymethyl-
2,6-diisopropyl-pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-
enoat

10 Analog den Verfahren aus den Beispielen 123, 124 und 125
wurde ausgehend von der Verbindung aus Beispiel 174 die
Titelverbindung hergestellt.

Farbl. Kristalle vom Schmp. 86°C

15 Beispiel 176



25 Methyl-erythro-(E)-7-[2,4,6-triisopropyl-5-methoxymethyl-
pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoat

30 Ausgehend von den Verbindungen aus Beispiel 119 und
Ethyl-3-amino-4-methyl-pent-2-enoat wurde in Analyse
zu den Verfahren aus den Beispielen 171, 3, 4, 59, 6,
7, 8, 9 und 10 die Titelverbindung synthetisiert.

Farbl. Öl

35

Le A 25 747

17 JAN 1981 4369880

¹H-NMR(CDC1₃): δ = 1,1-1,35 (m, 18H, isopropyl-H)
 1,65-1,85 (m, 2H, 4-H)
 2,55 (d, 2H, 2-H), 3,2-3,45 (m, 7H,
 isopropyl-H, OH, CH₃-O-CH₂)
 3,7 (m, 4H, OH, COOCH₃)
 4,35 (m, 1H, HO-CH) 4,45 (m, 2H, CH₃-O-
CH₂) 4,62 (m, 1H, HO-CH) 5,55
 (dd, 1H, 6-H) 6,73 (d, 1H, 7-H)

15

20

25

30

35

Le A 25 747

17 JAN 1961

1002 20 10

Anwendungsbeispiel

5

Beispiel 177

Die Enzymaktivitätsbestimmung wurde modifiziert nach
G.C. Ness et al., Archives of Biochemistry and Bio-
10 physics 197, 493 - 499 (1979) durchgeführt. Männliche
Rattoratten (Körpergewicht 300 - 400 g) wurden 11 Tage
mit Altrominpulverfutter, dem 40 g Cholestyramin/kg Fut-
ter zugesetzt war, behandelt. Nach Dekapitation wurde
den Tieren die Leber entnommen und auf Eis gegeben. Die
15 Lebern wurden zerkleinert und im Potter-Elvehjem-Homoge-
nisator 3 mal in 3 Volumen 0,1 m Saccharose, 0,05 m KCl,
0,04 m $K_2H_2P_4$ Phosphat, 0,03 m Ethylendiamintetraessig-
säure, 0,002 m Dithiothreitol (SPE)-Puffer pH 7,2, homoge-
nisiert. Anschließend wurde 15 Minuten bei 15 000* g
20 zentrifugiert und das Sediment verworfen. Der Überstand
wurde 75 Minuten bei 100 000 g sedimentiert. Das Pellet
wird in 1/4 Volumen SPE-Puffer aufgenommen, nochmals ho-
mogenisiert und anschließend erneut 60 Minuten bei
100.000 g zentrifugiert. Das Pellet wird mit der 5-
25 fachen Menge ihres Volumens SPE-Puffer aufgenommen,
homogenisiert und bei -78°C eingefroren und gelagert (= Enzymlösung).

Zur Testung wurden die Testverbindungen (oder Mevinolin
30 als Referenzsubstanz) in Dimethylformamid unter Zugabe
von 5 Vol.-% 1 n NaOH gelöst und mit 10 µl in verschie-
denen Konzentrationen in den Enzymtest eingesetzt. Der
Test wurde nach 20 Minuten Vorinkubation der Verbindun-

35

Le A 25 747

17. JUN 1981 - 20. JUN 1981

2801

5 gen mit dem Enzym bei 37°C gestartet. Der Testansatz
 betrug 0,380 ml und enthielt 4 µMol Glucose-6-Phosphat,
 1,1 mg Rinderserumalbumin, 2,1 µMol Dithiothreitol, 0,35
 µMol NADP, 1 Einheit Glucose-6-Phosphatdehydrogenase,
 35 µMol K_xH_y-Phosphat pH 7,2, 20 µl Enzympräparation und
 56 nMol 3-Hydroxy-3-methyl-glutaryl Coenzym A (Glutaryl-
 10 3-¹⁴C) 100 000 dpm.

Nach Inkubation von 60 Minuten bei 37°C wurde der Ansatz
 zentrifugiert und 600 µl des Überstandes auf eine
 0,7 x 4 cm mit einem 5-Chlorid 100-200 mesh (Anionenaus-
 15 taucher) gefüllte Säule aufgetragen. Es wurde mit 2 ml
 dest. Wasser nachgewaschen und Durchlauf plus Waschwas-
 ser mit 3 ml Aquasol versetzt und im LKB-Scintillations-
 zähler gezählt. IC₅₀-Werte wurden durch Auftrag der pro-
 zentualen Hemmung gegen die Konzentration der Verbindung
 20 im Test durch Intrapolation bestimmt. Zur Bestimmung der
 relativen inhibitorischen Potenz wurde der IC₅₀-Wert der
 Referenzsubstanz Mevinolin als 100 gesetzt und mit dem
 simultan bestimmten IC₅₀-Wert der Testverbindung ver-
 glichen.

25	Beispiel Nr.	relative Aktivität (Mevinolin = 1)
	17	20
	70	30
	72	17
	85	20
30	89	10
	99	20
	100	30
	105	4
	107	3
35	139	20

relative in vitro Aktivitäten, Mevinolin = 1

Le A 25 747

17 JAN 1981 4 38 38 60

2. Anwendungsbeispiel

Beispiel 178

Die subchronische Wirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen auf die Blutcholesterinwerte von Hunden wurde in mehrwöchigen Fütterungsexperimenten geprüft. Dazu wurde die zu untersuchende Substanz über einen mehrwöchigen Zeitraum einmal täglich in einer Kapsel gesunden Beagle-Hunden zusammen mit dem Futter p.o. gegeben. Dem Futter war außerdem während der gesamten Versuchsperiode, d.h. vor, während und nach der Applikationsperiode der zu untersuchenden Substanzen Coolestyramin (4 g / 100 g Futter) als Gallensäuresequestrant beigemischt. Zweimal wöchentlich wurde den Hunden venöses Blut abgenommen und das Serumcholesterin mit einem handelsüblichen Testkit enzymatisch bestimmt. Die Serumcholesterinwerte während der Applikationsperiode wurden mit den Serumcholesterinwerten vor der Applikationsperiode (Kontrollen) verglichen.

So ergab sich z.B. für die erfindungsgemäße Verbindung Beispiel Nr. 17 nach 2-wöchiger Applikation von täglich 8 mg/kg p.o. eine Senkung des Serumcholesterins um 66%.