

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A61K 35/84



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200510071010.5

A61P 3/10

[43] 公开日 2005 年 10 月 26 日

[11] 公开号 CN 1686529A

[22] 申请日 2005.5.20

[21] 申请号 200510071010.5

[71] 申请人 李素梅

地址 050000 河北省石家庄市新华区永泰中
街 62 号北楼 1-401

[72] 发明人 李素梅

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称 一种治疗糖尿病的中成药

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗糖尿病的中成药，其含有党参、玄参、丹参、沙参、大黄、黄芪、黄连、黄芩、川牛膝、知母、五味子、当归、川芎、茯苓、天花粉、生地黄、山药、山芋肉、枸杞子、葛根、苍术、玉竹、乌梅、杜仲、赤芍等。本发明对于糖尿病有疗效，无副作用，愈后不易复发。适用于糖尿病初、中期。

-
1. 一种治疗糖尿病的中成药，其特征在于所述成份及重量配比：党参 5—10，玄参 10—20，丹参 10—20，沙参 10—15，大黄 5—10，黄芪 25—35，黄连 5—15，黄芩 10—15，川牛膝 10—20，知母 10—20，五味子 5—15，当归 10—15，川芎 10—15，茯苓 10—15，天花粉 10—20，生地黄 10—20，山药 15—25，山芋肉 10—15，枸杞子 10—20，葛根 10—20，苍术 10—15，玉竹 10—20，乌梅 10—15，杜仲 10—15，赤芍 10—15。
 2. 如权利要求书 1 所述的治疗糖尿病的中成药，其特征在于它的最佳重量配比：党参 10，玄参 15，丹参 15，沙参 12，大黄 8，黄芪 30，黄连 10，黄芩 12，川牛膝 15，知母 15，五味子 10，当归 12，川芎 12，茯苓 12，天花粉 15，生地黄 15，山药 20，山芋肉 12，枸杞子 15，葛根 15，苍术 12，玉竹 15，乌梅 12，杜仲 12，赤芍 12。

一种治疗糖尿病的中成药

技术领域

本发明涉及一种治疗糖尿病的中成药，特别是涉及一种治疗糖尿病的方剂。

背景技术

目前，随着我国人民生活水平的提高，患糖尿病的人也越来越多了，市场上随之出现了大量声称能治疗糖尿病的药物，但患者服了这些药物后，发觉这些药不同程度地存在以下缺点：1.疗程长；2.治愈率低，降血糖、降尿糖效果不好。

发明内容

本发明内容在于提供一种疗程短，降血糖效果好，费用低廉治疗糖尿病的中成药。

本发明的目的是通过如下途径实现的：一种治疗糖尿病的中成药，所述成份及重量配比：党参 5—10，玄参 10—20，丹参 10—20，沙参 10—15，大黄 5—10，黄芪 25—35，黄连 5—15，黄芩 10—15，川牛膝 10—20，知母 10—20，五味子 5—15，当归 10—15，川芎 10—15，茯苓 10—15，天花粉 10—20，生地黄 10—20，山药 15—25，山芋肉 10—15，枸杞子 10—20，葛根 10—20，苍术 10—15，玉竹 10—20，乌梅 10—15，杜仲 10—15，赤芍 10—15。

最佳重量配比：党参 10，玄参 15，丹参 15，沙参 12，大黄 8，黄

芪 30，黄连 10，黄芩 12，川牛膝 15，知母 15，五味子 10，当归 12，川芎 12，茯苓 12，天花粉 15，生地黄 15，山药 20，山芋肉 12，枸杞子 15，葛根 15，苍术 12，玉竹 15，乌梅 12，杜仲 12，赤芍 12。

本发明这样使用：第一阶段，将组方中药研磨至细粉。分成三大包，每一包为一个月服用药品。再将每大包分成 90 等份，一日三次，一次一小包，早饭前，午饭前，晚饭后温开水送服，血糖平稳正常后，巩固一个阶段逐渐减药。也可装胶囊或丸每次 2.6 克。第二阶段，根据自己的病情，适当减去中午一包，如不理想，可按原来量服用。

本组方剂适用于糖尿病初、中期。

本发明中葛根及黄连具有清热降血糖尿的效果；丹参可以化瘀止痛降糖等；枸杞子的作用在于补肾养气血；黄芪有补气养血的功效。

本发明对于糖尿病有疗效，无副作用，愈后不易复发。

具体实施例

下面结合实施例对本发明作进一步详细说明：取党参 10g，玄参 15g，丹参 15g，沙参 12g，大黄 8g，黄芪 30g，黄连 10g，黄芩 12g，川牛膝 15g，知母 15g，五味子 10g，当归 12g，川芎 12g，茯苓 12g，天花粉 15g，生地黄 15g，山药 20g，山芋肉 12g，枸杞子 15g，葛根 15g，苍术 12g，玉竹 15g，乌梅 12g，杜仲 12g，赤芍 12g。第一阶段，将组方两付中药为例加成细粉。分成三大包，每一包为一个月服用药品。再将每大包分成 90 等份，一日三次，一次一小包，早饭前，午饭前，晚饭后温开水送服。血糖平稳正常后，巩固一个阶段逐渐减药。第二阶段，根据自己的病情，适当减去中午一包。如不理想，可按原来量服用。

例如：

(1) 1999.9.27 李宗珍，患有糖尿病 10 余年，后期加重，通过别人介绍到我这里看病，通过品脉，肾功能衰退，有尿蛋白、面发肿，脾虚胃热。服用后，血糖、尿糖基本正常。

(2) 1999.10.28 行唐县城，薛秀荣 69 岁，患糖尿病十几年，几年前转脑瘫，半身不随，心脏病，气管炎，脂肪肝，胆囊炎等，经检查血糖空腹 13 个加号，尿糖 4 个加号，尿蛋白 2 个加号。99.11.17，到行唐城看病，见到薛秀荣情况很好，通过服用处方，经检验尿蛋白正常。血糖降到理想的范围。

(3) 2002.11.9，张文华，女，61 岁，糖尿病综合症，咳喘，腿痛，看东西模糊，心脏病，高血压，血糖饭前 13.9，饭后 2 小时 20.6，尿糖 4 个加号以上，长时间吃药居高不下。通过服药，恢复到正常范围。

(4) 96 年，李香联，女，患有糖尿病，偏瘫，头晕，心脏供血不足 20 余年。服药后，以上症状见轻，能自由活动。

(5) 96 年 3 月 4 号，王秀纯，患有糖尿病综合症、尿毒症、肾炎、偏瘫 20 余年。服药后，水肿消失，头晕消失。血糖、尿糖尿毒症症状减轻。