



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
BUNDESAMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

⑪ CH 649 468 A5

⑤① Int. Cl. 4: A 61 K 31/44

// (A 61 K 31/44, 31:04, 31:215)

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

⑫ **PATENTSCHRIFT** A5

②① Gesuchsnummer:	5580/83	⑦③ Inhaber:	Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
⑥② Teilgesuch von:	3328/79		
②② Anmeldungsdatum:	09.04.1979	⑦② Erfinder:	Meyer, Horst, Wuppertal 1 (DE) Bossert, Friedrich, Wuppertal 1 (DE) Kazda, Stanislav, Wuppertal 1 (DE) Hoffmeister, Friedrich, Wuppertal 1 (DE) Vater, Wulf, Leverkusen 3 (DE)
③③ Priorität(en):	11.04.1978 DE 2815578		
②④ Patent erteilt:	31.05.1985		
④⑤ Patentschrift veröffentlicht:	31.05.1985	⑦④ Vertreter:	E. Blum & Co., Zürich

⑤④ **Verwendung von 1,4-Dihydropyridinderivaten zur Herstellung eines cerebralwirksamen Mittels.**

⑤⑦ Die Verbindung 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3'-nitrophenyl)pyridin-3- β -methoxyäthylester-5-isopropylester wird neu bei der Herstellung eines Cerebraltherapeutikums verwendet.

PATENTANSPRÜCHE

1. Verwendung von 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3'-nitrophenyl)pyridin-3-β-methoxyäthylester-5-isopropylester zur Herstellung eines cerebralwirksamen Mittels.

2. Verwendung nach Anspruch 1, zur Herstellung eines Mittels gegen pathologisch verminderte cerebrale Funktionen und Leistungsschwäche.

3. Verwendung nach Anspruch 1, zur Herstellung eines Mittels gegen cerebrale Insuffizienz.

4. Verwendung nach Anspruch 1, zur Herstellung eines Mittels gegen cerebrale Durchblutungs- und Stoffwechselstörungen.

Vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung von 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3'-nitrophenyl)pyridin-3-β-methoxyäthylester-5-isopropylester zur Herstellung eines Cerebraltherapeutikums.

Es ist bereits bekannt, dass 1,4-Dihydropyridinderivate als Coronarmittel und Blutdruckmittel verwendet werden können (vergleiche DT-OS 2 117 571). Die obengenannte Verbindung ist bereits in der Britischen Patentschrift 1 358 951 des Anmelders als coronarwirksame Verbindung beschrieben. Weiterhin ist bekannt geworden, dass bestimmte basische 1,4-Dihydropyridinester eine cerebrale Wirkung besitzen (vergleiche DT-OS 2 302 866 und DT-OS 2 407 115).

Es wurde gefunden, dass die Verbindung 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3'-nitrophenyl)pyridin-3-β-methoxyäthylester-5-isopropylester eine sehr vorteilhafte Wirkung auf cerebrale Durchblutungsstörungen besitzt und diese Verbindung wird deshalb erfindungsgemäss zur Herstellung von cerebralwirksamen Mitteln verwendet.

Überraschenderweise zeigt die erfindungsgemäss verwendete Verbindung in sehr niedrigen Dosen eine cerebral-spezifische Wirkung, die ihre Verwendung zur Herstellung von Mitteln zur Behandlung cerebraler Insuffizienzen, insbesondere cerebraler Durchblutungsstörungen verschiedener Provenienz ermöglicht. Sowohl in der Wirkungsstärke als auch in der Wirkungsart und Spezifität ist die Verbindung den bekannten cerebralwirksamen Stoffen überlegen.

Sie eignet sich insbesondere für die Behandlung von altersbedingten und sklerotisch bedingten cerebralen Gefässerkrankungen, sowie cerebralen Hypoxidosen, posttraumatischen Hirnschädigungen, allgemeinen Gefäss- und stoffwechselbedingten cerebralen Leistungsschwächen, Gleichgewichtsstörungen und anderen vestibulären Erkrankungen und gefässbedingten Sehstörungen.

In der Reihe der aus dem Stand der Technik bekannten Cerebraltherapeutika ist bisher eine derartig starke und organspezifische cerebrale Wirkung nicht bekannt geworden, so dass die erfindungsgemässe Verwendung der Verbindung eine Bereicherung der Pharmazie darstellt.

Die Verbindung 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3'-nitrophenyl)pyridin-3-β-methoxyäthylester-5-isopropylester wird in an sich bekannter Weise erhalten, indem man z. B. 3-Ni-

trobenzylidenacetessigsäure-β-methoxyäthylester mit β-Aminocrotonsäureisopropylester in einem inerten organischen Lösungsmittel bei erhöhter Temperatur umsetzt. Die Verbindung besitzt einen Schmelzpunkt von 125 °C.

Weitere mögliche Herstellungsverfahren sind beschrieben in der DT-OS 2 117 571 und DT-OS 2 117 573.

Die vorteilhafte organspezifische Wirkung der erfindungsgemäss verwendeten Verbindung ist gekoppelt mit einer sehr guten Verträglichkeit und einer lang anhaltenden Wirkungsdauer. Ein Vergleich mit der in der DT-OS 2 407 115 als besonders wirksam hervorgehobenen Verbindung 2,6-Dimethyl-4-(3'-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarbonsäure-3-β-(N-benzyl-N-methylamino)äthylester-5-methylester zeigt sich, dass die erfindungsgemäss verwendete Verbindung nicht nur eine deutlich stärkere cerebrale Mehrdurchblutung verursacht, sondern neben der grösseren Wirkungsdauer auch ein vorteilhafteres Wirkungsprofil besitzt.

Die überraschenden vorteilhaften Eigenschaften seien durch folgende Untersuchung belegt:

An Hunden, Katzen, Ratten, Kaninchen, Rhesus- und Totenkopffaffen erhöht die erfindungsgemässe Verbindung die Gehirndurchblutung nach enteraler und parenteraler Applikation in einem breiten Dosenbereich. Die cerebral-vasodilatierende Wirkung steht im Vordergrund des Wirkungsspektrums der Substanz: sie erfolgt nach niedriger Dosierung und sehr spezifisch in den cerebralen Gefässen. Mit dieser überraschenden Prädisposition der cerebrovaskulären Wirkung unterscheidet sich die erfindungsgemäss verwendete Verbindung deutlich von sämtlichen handelsüblichen Präparaten dieser Kategorie, sowie auch von anderen Dihydropyridin-Derivaten, bei denen auch eine gewisse cerebral-dilatierende Wirkung im Tierexperiment deklariert wurde (vergl. DT-OS 2 407 115; YC-93).

Mit der erfindungsgemäss zu verwendenden Verbindung können effektive Prophylaxe und Therapie von Folgen eines ischämischen cerebralen Insultes erfolgreich durchgeführt werden. So wird z. B. bei Katzen eine postischämische cerebrale Minderdurchblutung völlig verhindert, die postischämische EEG-Veränderungen deutlich verbessert und die Mortalität nach einem experimentellen cerebralen Insult drastisch reduziert.

Mit dieser cerebralen antiischämischen Wirkung ist die erfindungsgemäss verwendete Verbindung konkurrenzlos. Es ist mit keinem der existierenden Pharmaka dieser Kategorie gelungen, eine derartige Wirkung zu erreichen.

Bei Ratten und Mäusen sind die experimentell induzierten Lern- und Gedächtnisstörungen vaskulärer und nicht-vaskulärer Genese (cerebrale Ischämie, Hypoxie, Konvulsionen, Schlafentzug u. a.) durch Behandlung mit der erfindungsgemäss verwendeten Verbindung überraschenderweise deutlich verbessert bis völlig normalisiert. Mit dem Ausmass dieser Wirkung ist die Verbindung den handelsüblichen Präparaten weit überlegen.

Die überraschende vorteilhafte Wirkung der erfindungsgemäss verwendeten Verbindung sei durch die Daten der folgenden Tabelle beispielhaft belegt.

Tabelle

Wirkung von Substanzen auf die Durchströmung der cerebralen und extracerebralen Gefässe bei Hunden

Substanz	Dosis mg/kg i.v.	Anzahl der Tiere	Steigerung der Gehirndurchblutung (¹³³ Xenon-Clearance)	Durchströmungssteigerung	
				A. carotis ext.	A. femoralis (el.-magn. Flowmeter)
BAY e 9736	0,01	22	30%	26%	0,5%
YC 93	0,01	3	16%	40%	10,0%
Bencyclan (Fludilat®)	10,0	5	34%	—	152%
Cinnarizin (Stutgeron®)	10,0	4	43%	—	65%

Der neue Wirkstoff kann in bekannter Weise in die üblichen Formulierungen übergeführt werden, wie Tabletten, Kapseln, Dragees, Pillen, Suppositorien, Granulate, Aerosole, Sirups, flüssige, feste und cremartige Emulsionen und Suspensionen und Lösungen, unter Verwendung inerte, nichttoxischer, pharmazeutisch geeigneter Trägerstoffe oder Lösungsmittel. Hierbei soll die therapeutisch wirksame Verbindung jeweils in einer Konzentration von etwa 0,1 bis 90 Gewichtsprozent der Gesamtmischung vorhanden sein, d. h. in Mengen, die ausreichend sind, um den angegebenen Dosierungsspielraum zu erreichen.

Die ausgesprochen gute Resorption der erfindungsgemäss verwendeten Verbindung durch Schleimhäute des gastrointestinalen Traktes, ermöglicht die Anwendung von vielen galenischen Zubereitungen:

die Substanz kann als Medikament in Form von Dragees, Kapseln, Beisskapseln, Tabletten, Tropfen, Sirup aber auch Zäpfchen und sogar Salben angewendet werden.

Die Formulierungen werden beispielsweise hergestellt durch Verstrecken der Wirkstoffe mit Lösungsmitteln und/oder Trägerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von Emulgiermitteln und/oder Dispergiernmitteln, wobei z. B. im Fall der Benutzung von Wasser als Verdünnungsmittel gegebenenfalls organische Lösungsmittel als Hilfslösungsmittel verwendet werden können.

Als Hilfsstoffe seien beispielhaft aufgeführt:

Wasser, nichttoxische organische Lösungsmittel, wie Paraffine (z. B. Erdölfractionen), pflanzliche Öle (z. B. Erdnuss-Sesamöl), Alkohole (z. B. Äthylalkohol, Glycerin), Glykole (z. B. Propylenglykol, Polyäthylenglykol); feste Trägerstoffe, wie z. B. natürliche Gesteinsmehle (z. B. hochdisperse Kieselsäure, Silikate), Zucker (z. B. Roh-, Milch- und Traubenzucker); Emulgiermittel, wie nichtionogene und anionische Emulgatoren (z. B. Polyoxyäthylen-Fettsäure-Ester, Polyoxyäthylen-Fettalkohol-Äther, Alkylsulfonate und Arylsulfonate), Dispergiernmittel (z. B. Lignin, Sulfitaugen, Methylcellulose, Stärke und Polyvinylpyrrolidon) und Gleitmittel (z. B. Magnesiumstearat, Talkum, Stearinsäure und Natriumlaurylsulfat).

Die Applikation erfolgt in üblicher Weise, vorzugsweise enteral oder parenteral, insbesondere oral.

Im Falle der enteralen Anwendung können Tabletten selbstverständlich ausser den genannten Trägerstoffen auch Zusätze, wie Natriumcitrat, Calciumcarbonat und Dicalciumphosphat zusammen mit verschiedenen Zuschlagstoffen, wie Stärke, vorzugsweise Kartoffelstärke, Gelatine und dergleichen enthalten. Weiterhin können Gleitmittel, wie Magnesiumstearat, Natriumlaurylsulfat und Talkum zum Tablettieren mitverwendet werden. Im Falle wässriger Suspensionen und/oder Elixieren, die für orale Anwendungen gedacht sind, können die Wirkstoffe ausser mit den obengenannten Hilfsstoffen mit verschiedenen Geschmacksaufbessern oder Farbstoffen versetzt werden.

Für den Fall der parenteralen Anwendung können Lösungen der Wirkstoffe unter Verwendung geeigneter flüssiger Trägermaterialien eingesetzt werden.

Im allgemeinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, bei intravenöser Applikation Mengen von etwa 0,0001 bis 0,5 mg/kg, vorzugsweise etwa 0,001 mg/kg Körpergewicht pro Tag zur Erzielung wirksamer Ergebnisse zu verabreichen, und bei enteraler Applikation beträgt die Dosierung etwa 0,001 bis 1 mg/kg, vorzugsweise 0,01 bis 0,5 mg/kg Körpergewicht pro Tag.

Trotzdem kann es gegebenenfalls erforderlich sein, von den genannten Mengen abzuweichen, und zwar in Abhängigkeit vom Körpergewicht des Versuchstieres bzw. der Art des Applikationsweges, aber auch auf Grund der Tierart und

deren individuellem Verhalten gegenüber dem Medikament bzw. Intervall, zu welchem die Verabreichung erfolgt.

So kann es in einigen Fällen ausreichend sein, mit weniger als der vorgenannten Mindestmenge auszukommen, während in anderen Fällen die genannte obere Grenze überschritten werden muss. Im Fall der Applikation grösserer Mengen kann es empfehlenswert sein, diese in mehrere Einzelgaben über den Tag zu verteilen. Für die Applikation in der Humanmedizin ist der gleiche Dosierungsspielraum vorgesehen.

Sinngemäss gelten hierbei die obigen Ausführungen.

Beispiele für pharmazeutische Formulierungen:

1. Weichgelatine Kapseln mit 5 mg Wirkstoff pro Kapsel.

Für ca. 10 000 Kapseln wird eine Lösung folgender Zusammensetzung hergestellt:

Bay e 9736 Wirkstoff	58,8 g
Glycerin	240,0 g
Polyäthylenglykol 400	3833,2 g
Wasser	400,0 g
	4532,0 g

Die Lösung wird nach an sich bekannter Weise in Weichgelatine Kapseln oblong der Grösse 6 minimis abgefüllt. Die Kapseln sind zum Zerbeißen oder zum Schlucken geeignet.

2. Tabletten, lackierte Tabletten oder Dragees mit 10 mg Wirkstoff:

Die folgenden Mengen beziehen sich auf Herstellung von 100 000 Tabletten bzw. Kernen:

Bay e 9736 fein gemahlener Wirkstoff	1,00 kg
Milchzucker	10,25 kg
Stärke	2,70 kg
Mikrokristalline Cellulose	2,70 kg

Obige Bestandteile werden in einem Planetenmischer gemischt und anschliessend mit einer Lösung, hergestellt aus

Polyvinylpyrrolidon	
(Mol Gewicht z. B. 25 000)	1,20 kg
Polysorbate 80 USP	0,06 kg
(Tween 80®) und	

Wasser ca. 4,00 kg gemischt und in an sich bekannter Weise granuliert, indem die feuchte Masse geraspelt und getrocknet wird.

Anschliessend gibt man zu:

Magnesiumstearat	0,09 kg
------------------	---------

Die fertige Tablettenmischung von 18 kg wird zu gewölbten Tabletten von 180 mg Gewicht gepresst. Durchmesser der Tabletten 8 mm.

Die Tabletten können nach an sich bekannter Weise lackiert oder dragiert werden.

3. Tropfen mit 4 mg Wirkstoff pro ml:

Folgende Lösung wird hergestellt:

	Für Tropfen mit 4 mg pro ml
Bay e 9736-Wirkstoff	4,0
Äthanol 96%ig	450,0 g
Aroma flüssig	6,0 g
Methylparaben	1,0 g
Polyäthylenglykol 400	50,0 g
50%iger Zuckersirup	400,0 g
Lebensmittel-Farbstoff (Gelborange S)	0,6 g
Wasser ad	1000,0 ml

Der Wirkstoff, Methylparaben und Aroma werden bei Zimmertemperatur gelöst. Dann gibt man Polyäthylenglykol 400 und den 50%igen Zuckersirup langsam unter Rühren zu, löst den Farbstoff und ergänzt mit Wasser auf 1000 ml.

Die Lösung wird in braune Flaschen abgefüllt, wobei gegebenenfalls noch Süsstoffe zugesetzt werden können.

649 468

4. Sirup mit 10 mg Wirkstoff pro 10 ml:
 Bay e 9736-Wirkstoff
 Methylparaben
 Äthanol 96%ig
 Aroma flüssig
 Polyäthylenglykol 400
 Glyzerin

1,0 g
 1,0 g
 250,0 g
 4,0 g
 100,0 g
 250,0 g

4

50%iger Zuckersirup
 Lebensmittelfarbstoff
 Gelborange S
 Wasser ad

300,0 g
 0,5 g
 1000,0 ml

5

Die Herstellung erfolgt in analoger Weise zu dem Beispiel 3.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65