(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103751482 A
(43)申请公布日 2014.04.30

(21)申请号 201410063001.0

(22)申请日 2014.02.22

(71)申请人 张利娜
地址 262100 山东省潍坊市安丘市健康路246号安丘市人民医院

(72)发明人 张利娜

(51)Int.Cl.
A61K 36/8945(2006.01)
A61P 15/00(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)
A61K 9/20(2006.01)

权利要求书2页 说明书7页

(54)发明名称

一种用于治疗产后腹痛的药物及制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种用于治疗产后腹痛的药物及制备方法，属中药领域；本发明药物有效成分的原料组成为：七叶莲、地笋、脆骨风、乳香、霜红藤、地血香、泽兰、山楂、蒲黄、石夹生、薅田薥、鳌菜、鸭脚艾、紫薇根、薯莨和翅卫矛；本发明药物具有补血活血、温经止痛、行气散瘀、祛风除湿之功效，对产后引起的腹部疼痛症状具有显著的疗效，安全可靠，无任何毒副作用，能够抑制产后腹痛，增进妇女健康具有积极的作用，临床试验表明，对产后腹痛患者治疗的总有效率高达96.9%，值得临床广泛推广应用。

CN 103751482 A

1. 一种用于治疗产后腹痛的药物，其特征在于：制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

七叶莲 48 ～ 74 份　地笋 45 ～ 71 份　脆骨风 37 ～ 63 份　乳香 32 ～ 59 份
霜红藤 32 ～ 58 份　地血香 30 ～ 57 份　泽兰 28 ～ 57 份　山楂 24 ～ 51 份
蒲黄 22 ～ 50 份　石夹生 18 ～ 47 份　薅田薷 16 ～ 46 份　鳌菜 12 ～ 40 份
鸭脚艾 11 ～ 37 份　紫薇根 8 ～ 34 份　薯莨 5 ～ 26 份　翅卫矛 3 ～ 22 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗产后腹痛的药物，其特征在于：制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

七叶莲 52 ～ 70 份　地笋 49 ～ 67 份　脆骨风 41 ～ 59 份　乳香 37 ～ 55 份
霜红藤 36 ～ 54 份　地血香 34 ～ 52 份　泽兰 32 ～ 52 份　山楂 28 ～ 46 份
蒲黄 27 ～ 46 份　石夹生 22 ～ 42 份　薅田薷 21 ～ 41 份　鳌菜 17 ～ 35 份
鸭脚艾 15 ～ 33 份　紫薇根 12 ～ 30 份　薯莨 9 ～ 22 份　翅卫矛 7 ～ 19 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗产后腹痛的药物，其特征在于：制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

七叶莲 57 ～ 65 份　地笋 54 ～ 62 份　脆骨风 46 ～ 54 份　乳香 42 ～ 50 份
霜红藤 41 ～ 49 份　地血香 39 ～ 47 份　泽兰 37 ～ 45 份　山楂 33 ～ 41 份
蒲黄 32 ～ 40 份　石夹生 27 ～ 37 份　薅田薷 26 ～ 36 份　鳌菜 22 ～ 30 份
鸭脚艾 20 ～ 28 份　紫薇根 17 ～ 25 份　薯莨 13 ～ 17 份　翅卫矛 11 ～ 15 份。

4. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗产后腹痛的药物，其特征在于：制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

七叶莲 61 份　地笋 58 份　脆骨风 50 份　乳香 46 份
霜红藤 45 份　地血香 43 份　泽兰 41 份　山楂 37 份
蒲黄 36 份　石夹生 32 份　薅田薷 31 份　鳌菜 26 份
鸭脚艾 24 份　紫薇根 21 份　薯莨 15 份　翅卫矛 13 份。

5. 一种如权利要求 1 ～ 4 任一项所述用于治疗产后腹痛的药物的制备方法，其特征在于：包括以下工艺步骤：

(1) 将七叶莲、脆骨风、山楂、蒲黄、石夹生和紫薇根洗净，放入容器内，加入 8 ～ 10 倍量的蒸馏水，浸泡 5 ～ 6 小时后，煮沸 3 ～ 4 小时，提取；再次加入 6 ～ 8 倍量蒸馏水，煮沸 2 ～ 3 小时，提取；最后，加入 4 ～ 6 倍量蒸馏水，加热煮沸 1 ～ 2 小时，提取；合并三次提取液，过滤，得滤液，浓缩为 65℃下相对密度为 1.10 ～ 1.16 的稠膏，备用；

(2)将地笋、霜红藤、薅田薷和翅卫矛洗净，浸入 6 倍量的 80% 的乙醇溶液浸泡 3 ～ 4 小时，加热回流提取 2 ～ 3 小时，回收乙醇，滤过，将滤液浓缩为 60℃环境下相对密度 1.20 ～ 1.25 的稠膏，备用；

(3) 将乳香洗净，置锅内用文火炒至表面稍见熔化点，略呈黄色，取出放凉后，研末，过 180 目细粉；

(4) 将地血香、泽兰和鳌菜进行混合，混合均匀后进行粉碎处理，研末，过 160 目细粉，备用；

(5) 将鸭脚艾和薯莨洗净，阴凉处晾干，切碎，放入容器内，绞汁，滤杂质，留汁液备用；

(6)将上述步骤(1)～(5)所制得的稠膏、细粉以及汁液混合，制成药丸，即得本发明所

述的用于治疗产后腹痛的药物。

一种用于治疗产后腹痛的药物及制备方法

所属技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域，尤其涉及一种用于治疗产后腹痛的药物及制备方法。

背景技术

[0002] 产妇分娩后，小腹疼痛者，称为“产后腹痛”，又称“儿枕痛”。本病相当于西医学的产后宫缩痛及产褥感染引起的腹痛。

[0003] 一般说来，引起女性下腹部疼痛的原因，可以分为月经周期相关引起的疼痛和非月经周期引起的下腹疼痛。初产妇因子宫纤维较为紧密，子宫收缩不甚强烈，易复原，且复原所需时间也较短，疼痛不明显；经产妇由于多次妊娠，子宫肌纤维多次牵拉，复原较难，疼痛时间相对延长，且疼痛也较初产妇剧烈些。

[0004] 产后腹痛包括腹痛和小腹痛，以小腹部疼痛最为常见，大多由于血瘀，气血虚，或感受风寒所致，以产后瘀血凝滞或风冷挟瘀血为主的名“儿枕痛”，小腹部可摸到硬块，有明显压痛，常兼见恶露不畅或不下，胸腹胀满，脉多弦濇有力，有偏寒、偏热的不同。气血虚的每易外感风寒，多见腹痛喜热按，往往摸不到硬块，头昏目眩，体倦畏冷，甚则心悸、气短、舌质淡，脉虚细或弦濇；如挟瘀血，则少腹硬痛，舌质多紫黯；兼气滞的则有胸闷腹胀、大便溏薄等症。产后小腹部疼痛为主者，称产后腹痛。以新产妇多见，是指产后子宫收缩时引起的收缩痛，又称“产后痛”、“宫缩痛”。

[0005] 中医将产后腹痛归入“产后腹中疗痛”、“儿枕痛”范畴。病因为产后气血运行不畅，瘀滞不通则痛，可由于产后伤血，百脉空虚，血少气弱，推行无力，以致血流不畅而瘀滞；也可由于产后虚弱，寒邪乘虚而入，血为寒凝，瘀血内停，不通则痛而致。西医学称“宫缩痛”、“产后痛”，属生理现象，一般不需治疗。若腹痛阵阵加剧，难以忍受，或腹痛绵绵，疼痛不已，影响产妇健康，则为病态，应予治疗。

[0006] 目前国内外对产后腹痛治疗多采用西医的治疗方法，对于治疗产后腹痛尚没有理想的特效药物，有些药虽然对产后腹痛等妇科疾病有一定作用，但其治疗效果不尽人意，且安全性能底，副作用大，不易于临床广泛推广应用。

发明内容

[0007] 本发明提供了一种用于治疗产后腹痛的药物及制备方法；本发明药物具有补血活血、温经止痛、行气散瘀、祛风除湿之功效，对产后引起的腹部疼痛症状具有显著的疗效，安全可靠，无任何毒副作用，能够抑制产后腹痛，增进妇女健康具有积极的作用，临床试验表明，对产后腹痛患者治疗的总有效率高达 96.9%，值得临床广泛推广应用。

[0008] 为实现上述目的，本发明的技术方案实施如下：

[0009] 一种用于治疗产后腹痛的药物，制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0010]

七叶莲 48～74 份 地笋 45～71 份 脆骨风 37～63 份 乳香 32～59 份

霜红藤 32～58 份 地血香 30～57 份 泽兰 28～57 份 山楂 24～51 份

蒲黄 22～50 份 石夹生 18～47 份 薅田薷 16～46 份 鳌菜 12～40 份

鸭脚艾 11～37 份 紫薇根 8～34 份 薯莨 5～26 份 翅卫矛 3～22 份。

[0011] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0012]

七叶莲 52～70 份 地笋 49～67 份 脆骨风 41～59 份 乳香 37～55 份

霜红藤 36～54 份 地血香 34～52 份 泽兰 32～52 份 山楂 28～46 份

蒲黄 27～46 份 石夹生 22～42 份 薅田薷 21～41 份 鳌菜 17～35 份

鸭脚艾 15～33 份 紫薇根 12～30 份 薯莨 9～22 份 翅卫矛 7～19 份。

[0013] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0014]

七叶莲 57～65 份 地笋 54～62 份 脆骨风 46～54 份 乳香 42～50 份

霜红藤 41～49 份 地血香 39～47 份 泽兰 37～45 份 山楂 33～41 份

蒲黄 32～40 份 石夹生 27～37 份 薅田薷 26～36 份 鳌菜 22～30 份

鸭脚艾 20～28 份 紫薇根 17～25 份 薯莨 13～17 份 翅卫矛 11～15 份。

[0015] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0016]

七叶莲 61 份 地笋 58 份 脆骨风 50 份 乳香 46 份

霜红藤 45 份 地血香 43 份 泽兰 41 份 山楂 37 份

蒲黄 36 份 石夹生 32 份 薅田薷 31 份 鳌菜 26 份

鸭脚艾 24 份 紫薇根 21 份 薯莨 15 份 翅卫矛 13 份。

[0017] 一种用于治疗产后腹痛的药物的制备方法，包括以下工艺步骤：

[0018] (1)将七叶莲、脆骨风、山楂、蒲黄、石夹生和紫薇根洗净，放入容器内，加入 8 ～ 10 倍量的蒸馏水，浸泡 5 ～ 6 小时后，煮沸 3 ～ 4 小时，提取；再次加入 6 ～ 8 倍量蒸馏水，煮沸 2 ～ 3 小时，提取；最后，加入 4 ～ 6 倍量蒸馏水，加热煮沸 1 ～ 2 小时，提取；合并三次提取液，过滤，得滤液，浓缩为 65℃下相对密度为 1.10 ～ 1.16 的稠膏，备用；

[0019] (2)将地笋、霜红藤、薅田薷和翅卫矛洗净，浸入 6 倍量的 80% 的乙醇溶液浸泡 3 ～ 4 小时，加热回流提取 2 ～ 3 小时，回收乙醇，滤过，将滤液浓缩为 60℃环境下相对密度 1.20 ～ 1.25 的稠膏，备用；

[0020] (3)将乳香洗净，置锅内用文火炒至表面稍见熔化点，略呈黄色，取出放凉后，研末，过 180 目细粉；

[0021] (4)将地血香、泽兰和鳌菜进行混合，混合均匀后进行粉碎处理，研末，过 160 目细粉，备用；

[0022] (5)将鸭脚艾和薯莨洗净,阴凉处晾干,切碎,放入容器内,绞汁,滤杂质,留汁液备用;

[0023] (6)将上述步骤(1)～(5)所制得的稠膏、细粉以及汁液混合,制成药丸,即得本发明所述的用于治疗产后腹痛的药物。

[0024] 本发明所用中药的药性如下:

[0025] 七叶莲:味微苦,性温。祛风除湿,活血止痛。治风湿痹痛,胃痛,跌打骨折,外伤出血。《广西实用中草药新选》:"行气止痛,活血消肿,壮筋骨。治急性风湿性关节炎,胃痛,骨折,扭挫伤,腰腿痛,瘫痪。"

[0026] 地笋:味甘、辛,性平。活血,益气,消水。主治吐血,衄血,产后腹痛,带下。《日华子本草》载:"止鼻洪,吐血,产后心腹痛。"

[0027] 脆骨风:味甘、微涩,性平;归肝、肾经。祛风除湿,散瘀止痛。主治湿痹痛,腰痛,产后腹痛,跌打损伤。

[0028] 乳香:味苦,性辛、温;入心、肝、脾经。活血,行气,止痛。主治瘀阻气滞的脘腹疼痛,风湿痹痛,跌打损伤,痛经,产后腹痛。《纲目》载:"消痈疽诸毒,托里护心,活血定痛,伸筋,治妇人难产,折伤。"现代医学研究证实,乳香具有镇痛抑菌作用。

[0029] 霜红藤:味苦、辛,性平;归肝、胃经。祛风除湿,活血止痛,解毒消肿。主治风湿痹痛,跌打损伤,月经不调,经闭,产后腹痛,胃痛,疝痛,疮痈肿痛,骨折,风疹,湿疹,带状疱疹,毒蛇咬伤。

[0030] 地血香:味辛、苦,性温;归脾、胃、肝经。祛风除湿,行气止痛,舒筋活络。主治风湿痹痛,胃痛,腹痛,痛经,产后腹痛,跌打损伤,慢性腰腿痛。《广西中草药》载:"活血散瘀,行气止痛,祛风湿。治跌打损伤,风湿骨痛,痛经,产后腹痛,急慢性胃肠炎。"

[0031] 泽兰:味苦、辛,性微温;归肝、脾经。活血化瘀,行水消肿。用于月经不调,经闭,痛经,产后瘀血腹痛,水肿。《药性论》载:"主产后腹痛,频产血气衰冷成劳,瘦羸,又治通身面目大肿,主妇人血沥腰痛。"

[0032] 山楂:味酸、甘,性微温;归脾、胃、肝经。消食健胃,行气散瘀。用于肉食积滞,胃脘胀满,泻痢腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,心腹刺痛,疝气疼痛;高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞,泻痢不爽。《纲目》载:"化饮食,消肉积,癥瘕,痰饮痞满吞酸,滞血痛胀。"

[0033] 蒲黄:味甘,性平;归肝、心包经。止血,化瘀,通淋。用于吐血,衄血,咯血,崩漏,外伤出血,经闭痛经,脘腹刺痛,跌扑肿痛,血淋涩痛。《日华子本草》载:"治(颠)扑血闷,排脓,疮疖,妇人带下,月候不匀,血气心腹痛,妊孕人下血坠胎,血运血癥,儿枕急痛,小便不通,肠风泻血,游风肿毒,鼻洪吐血,下乳,止泄精,血痢。破血消肿生使,补血止血炒用。"

[0034] 石夹生:味涩、苦,性微温;归肝、脾、肾经。活血祛瘀,舒筋理气。主治风湿性关节炎,月经不调,经闭腰痛,产后腹痛,痢疾。《新华本草纲要》载:"有舒筋活血、祛瘀止痛、强筋骨的功能。用于风湿性关节炎、月经不调、腰痛。"

[0035] 薅田薷:味苦、涩,性凉,无毒;归肝、肺、肾经。清热解毒,散瘀止血,杀虫疗疮。主治感冒发热,咳嗽痰血,痢疾,跌打损伤,产后腹痛,疥疮,疖肿,外伤出血。《南宁市药物志》载:"散瘀,止痛,化痰。治跌打,咳嗽,产后瘀痛,赤痢,热眼。"

[0036] 鳖菜:味辛、微苦,性微寒。活血调经,解毒消肿。主治月经不调,闭经,痛经,产后

瘀血腹痛，崩漏，跌打伤痛，疮痈。《本草拾遗》载：“主破血。产后腹痛，煮汁服之；亦捣碎敷疔疮。”

[0037] 鸭脚艾：味甘、微苦，性平。理气活血，调经利湿，解毒消肿。用于月经不调，闭经，慢性肝炎，肝硬化，肾炎水肿，白带，荨麻疹，腹胀，疝气；外用治跌打损伤，外伤出血，烧烫伤，疮疡，湿疹。《岭南采药录》载：“活血通经，疗霍乱水泻，止金疮出血。治汤火伤，心气痛，水胀，大小便血。”

[0038] 紫薇根：味微苦，性微寒。清热利湿，活血止血，止痛。主治痢疾，水肿，烧烫伤，湿疹，湿疹，痈肿疮毒，跌打损伤，血崩，偏头痛，牙痛，痛经，产后腹痛。

[0039] 薯莨：味苦、性凉，小毒。活血止血，理气止痛，清热解毒。主治咳血，咯血，呕血，衄血，尿血，便血，崩漏，月经不调，痛经，经闭，产后腹痛，脘腹胀痛，痧胀腹痛，热毒血痢，水泻，关节痛，跌打肿痛，疮疖，带状疱疹，外伤出血。《贵州民间方药集》载：“止痢疾。治产后腹痛，臌胀；又治哮喘。”

[0040] 翅卫矛：性寒，味苦；入肝、肺二经。破血落胎，调经续断。治产后腹痛，崩中下血，风湿疼痛。

[0041] 本发明与现有技术相比，具有以下有益效果：

[0042] 本发明药物具有补血活血、温经止痛、行气散瘀、祛风除湿之功效，对产后引起的腹部疼痛症状具有显著的疗效，安全可靠，无任何毒副作用，能够抑制产后腹痛，增进妇女健康具有积极的作用，临床试验表明，对产后腹痛患者治疗的总有效率高达 96.9%，值得临床广泛推广应用。

具体实施方式

[0043] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0044] 实施例 1

[0045] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0046]

七叶莲 70g 地笋 67g 脆骨风 59g 乳香 55g

霜红藤 54g 地血香 52g 泽兰 52g 山楂 46g

蒲黄 46g 石夹生 42g 薅田薯 41g 鳌菜 35g

鸭脚艾 33g 紫薇根 30g 薯莨 22g 翅卫矛 19g。

[0047] 一种用于治疗产后腹痛的药物的制备方法，包括以下工艺步骤：

[0048] (1)将七叶莲、脆骨风、山楂、蒲黄、石夹生和紫薇根洗净，放入容器内，加入 8 ～ 10 倍量的蒸馏水，浸泡 5 ～ 6 小时后，煮沸 3 ～ 4 小时，提取；再次加入 6 ～ 8 倍量蒸馏水，煮沸 2 ～ 3 小时，提取；最后，加入 4 ～ 6 倍量蒸馏水，加热煮沸 1 ～ 2 小时，提取；合并三次提取液，过滤，得滤液，浓缩为 65℃下相对密度为 1.10 ～ 1.16 的稠膏，备用；

[0049] (2)将地笋、霜红藤、薅田薯和翅卫矛洗净，浸入 6 倍量的 80% 的乙醇溶液浸泡 3 ～ 4 小时，加热回流提取 2 ～ 3 小时，回收乙醇，滤过，将滤液浓缩为 60℃环境下相对密度 1.20 ～ 1.25 的稠膏，备用；

[0050] (3)将乳香洗净，置锅内用文火炒至表面稍见熔化点，略呈黄色，取出放凉后，研

末，过 180 目细粉；

[0051] （4）将地血香、泽兰和鳌菜进行混合，混合均匀后进行粉碎处理，研末，过 160 目细粉，备用；

[0052] （5）将鸭脚艾和薯莨洗净，阴凉处晾干，切碎，放入容器内，绞汁，滤杂质，留汁液备用；

[0053] （6）将上述步骤（1）～（5）所制得的稠膏、细粉以及汁液混合，制成药丸，即得本发明所述的用于治疗产后腹痛的药物。

[0054] 用法用量：口服，每日 2 次，早晚各 1 次，每次 1 粒（每粒 0.8g）；5 天为 1 个疗程，2 ～ 4 个疗程可痊愈，病情严重者遵医嘱酌增用量。

[0055] 实施例 2

[0056] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0057]

七叶莲 65g 地笋 62g 脆骨风 54g 乳香 50g

霜红藤 49g 地血香 47g 泽兰 45g 山楂 41g

蒲黄 40g 石夹生 37g 薅田薯 36g 鳌菜 30g

鸭脚艾 28g 紫薇根 25g 薯莨 17g 翅卫矛 15g。

[0058] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0059] 实施例 3

[0060] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0061]

七叶莲 61g 地笋 58g 脆骨风 50g 乳香 46g

霜红藤 45g 地血香 43g 泽兰 41g 山楂 37g

蒲黄 36g 石夹生 32g 薅田薯 31g 鳌菜 26g

鸭脚艾 24g 紫薇根 21g 薯莨 15g 翅卫矛 13g。

[0062] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0063] 实施例 4

[0064] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0065]

七叶莲 57g 地笋 54g 脆骨风 46g 乳香 42g

霜红藤 41g 地血香 39g 泽兰 37g 山楂 33g

蒲黄 32g 石夹生 27g 薅田薯 26g 鳌菜 22g

鸭脚艾 20g 紫薇根 17g 薯莨 13g 翅卫矛 11g。

[0066] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0067] 实施例 5

[0068] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0069]

七叶莲 52g 地笋 49g 脆骨风 41g 乳香 37g

霜红藤 36g 地血香 34g 泽兰 32g 山楂 28g

蒲黄 27g 石夹生 22g 薅田薷 21g 鳌菜 17g

鸭脚艾 15g 紫薇根 12g 薯莨 9g 翅卫矛 7g。

[0070] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0071] 临床资料：

[0072] 1、病例选择：

[0073] 作为用于治疗产后腹痛的药物，选择产后腹痛患者 130 例临床观察，病人随机分成治疗组和对照组两组，治疗组女性 65 例，年龄 18 ～ 43 岁，平均年龄 30.5 岁，病程 1 ～ 2 年；对照组女性 65 例，年龄 19 ～ 42 岁，平均年龄 29.7 岁，病程 1 ～ 2 年；治疗组和对照组两组病例的病程、症状轻重程度基本一致，无显著差异，具有可比性。

[0074] 2、药物选择：

[0075] 治疗组服用本发明药物，口服，每日 2 次，早晚各 1 次，每次 1 粒（每粒 0.8g）；5 天为 1 个疗程，连续服用 2 ～ 4 个疗程，病情严重者遵医嘱酌增用量；对照组服用诺佛沙星胶囊，口服，一次 400mg，一日 2 次。

[0076] 3、疗效判定：

[0077] （1）治愈：疼痛症状消失，身体恢复正常。

[0078] （2）显效：疼痛症状明显减轻，身体基本恢复正常。

[0079] （3）有效：疼痛症状有所环节，身体明显恢复正常。

[0080] （4）无效：通过治疗后疼痛症状无减轻或加重。

[0081] 4、结果：

[0082]

	例数	治愈	显效	有效	无效	治愈率	总有效率
治疗组	65	35	16	12	2	53.8%	96.9%
对照组	65	11	15	16	23	16.9%	64.6%

[0083] 以上结果显示，治疗组的治愈率和总有效率明显高于对照组。

[0084] 典型病例举例：

[0085] 1、沈某，女，20 岁，河北石家庄人。患者产后 5 天小腹疼痛，拒按，得热痛缓，恶露量少，涩滞不畅色紫暗有块，块下痛减，伴胸胁胀痛。住院后，口服本发明药物治疗，每日 2 次，早晚各 1 次，每次 1 粒（每粒 0.8g）；服用 1 个疗程后，腹痛症状明显好转，继续服用 1 个疗程后，腹痛症状消失，疾病痊愈，未见复发。

[0086] 2、康某，女，25 岁，辽宁锦州人。患者产后 6 天时，暑天贪凉，晚间未盖好腹部，以致感受风寒，翌晨小腹疼痛，痛势剧烈，恶露聚止，腰酸肢软，头眩目花。住院后，给予本发明药物，服用 1 个疗程后，自觉小腹疼痛症状明显减轻，服用 2 个疗程后，诸症消失，身体恢复健康。

[0087] 3、顾某，女，28 岁，吉林辽源人。患者剖腹产后发生盆腔粘连，腹痛 1 年，外院 HSG 提醒双侧输卵管上举，盆腔粘连，B 超提示子宫附件未见显明异常。术前检查血常规：白细胞：4.5×10(9)/L，红细胞：4.45×10(12)/L，血红蛋白：109g/L，血小板：300×10(9)/L，ABO 血型：O 型，RH(D) 血型：阳性；心电图、胸片、凝血四项、肝肾功均无显著异样；丙肝抗体、梅毒抗体、艾滋病抗体均为阴性；白带惯例：干净度 III 度，无滴虫霉菌。入院诊断：慢性盆腔痛，盆腔粘连，剖宫产术后。给予本发明药物，服用 1 个疗程后，上述腹痛症状明显减轻，服用 3 个疗程后，诸症消除，1 年后随访无复发。

[0088] 4、钱某，女，32 岁，黑龙江牡丹江人。患者剖腹产 3 个月后一直有小腹隐隐做痛的情况，特别是使力大时加重，并伴有白带发黄等症状。后经医生诊断后，开始服用本发明药物，服用本发明 1 个疗程后复查，产后腹痛基本好转，又服本发明药物 1 个疗程，产后腹痛消失，身体恢复健康，随访未复发。

[0089] 5、方某，女，27 岁，吉林长春人。患者生产两个多月了，侧切刀口还有点痒，小腹总是有点很轻微的隐痛，很不舒服的感觉，并偶尔伴有很淡很淡的粉色粘液，入院检查后，有轻微炎症，因处于哺乳期，医生建议服用本发明药物，服用本发明 3 个疗程后复查，产后腹痛消失，身体恢复健康，随访未复发。

[0090] 6、季某，女，26 岁，山东威海人。患者做剖腹产一年，伤口两边有两个又硬又圆的包块，来月经前痛的厉害随着经后才没那么痛，去过很多医院求医都查不出原因，现在染上宫颈糜烂，后经医生诊断后，开始服用本发明药物，服用本发明 1 个疗程后复查，产后腹痛基本好转，又服本发明药物 2 个疗程，产后腹痛消失，身体恢复健康，随访未复发。