

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号
特許第4664677号
(P4664677)

(45) 発行日 平成23年4月6日(2011.4.6)

(24) 登録日 平成23年1月14日(2011.1.14)

(51) Int.Cl.

F I

C 1 2 N 15/09 (2006.01)

C 1 2 N 15/00 Z N A A

C O 7 K 1/14 (2006.01)

C O 7 K 1/14

C O 7 K 14/00 (2006.01)

C O 7 K 14/00 Z C C

請求項の数 31 (全 41 頁)

(21) 出願番号	特願2004-533653 (P2004-533653)	(73) 特許権者	505081032
(86) (22) 出願日	平成15年9月5日 (2003.9.5)		イソゲニカ リミテッド
(65) 公表番号	特表2005-537795 (P2005-537795A)		イギリス国 ビーイー1 1 キューエフ、
(43) 公表日	平成17年12月15日 (2005.12.15)		ピーターボロ、 シティー ロード、スツ
(86) 国際出願番号	PCT/GB2003/003860		アート ハウス
(87) 国際公開番号	W02004/022746	(74) 代理人	100066692
(87) 国際公開日	平成16年3月18日 (2004.3.18)		弁理士 浅村 皓
審査請求日	平成18年5月22日 (2006.5.22)	(74) 代理人	100072040
(31) 優先権主張番号	0220759.5		弁理士 浅村 肇
(32) 優先日	平成14年9月6日 (2002.9.6)	(74) 代理人	100088926
(33) 優先権主張国	英国 (GB)		弁理士 長沼 暉夫
(31) 優先権主張番号	0304521.8	(74) 代理人	100102897
(32) 優先日	平成15年2月27日 (2003.2.27)		弁理士 池田 幸弘
(33) 優先権主張国	英国 (GB)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 イン・ビトロでのペプチド発現ライブラリー

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

(a) (i) DNA 標的配列、

(i i) ライブラリー構成ペプチドをコードする DNA、及び

(i i i) (i) の前記 DNA 標的配列に直接的又は間接的に非共有結合することができるペプチドをコードする DNA を含む DNA 構築物であって、前記 DNA 構築物及びコードされたタンパク質がシス活性を有するように選択した DNA 構築物を提供する段階、

(b) 各発現ペプチドが生成元の DNA に非共有結合するように、前記 DNA 構築物が複数のライブラリー構成ペプチドをコードする、(a) による複数の DNA 構築物を発現する段階、

を含み、各ペプチドが前記ペプチドをコードする前記 DNA 構築物に結合した、複数のペプチドを含むイン・ビトロでのペプチド発現ライブラリーの作製方法。

【請求項 2】

前記 DNA 構築物が、

(i v) シス活性をもたらす DNA 要素、

をさらに含む請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】

(a) の前記 DNA 構築物が、

(v) r e p A タンパク質の C 末端の少なくとも 20 個のアミノ酸を含む断片をコー

ドするDNAであって、前記断片が(i v)の前記DNA要素と相互作用できるDNA、
をさらに含み、(i v)の前記DNA要素が、(i i)、(i i i)及び(v)の前記
DNAの3'に位置する請求項2記載の方法。

【請求項4】

(i i i)の前記DNAでコードされたペプチドが(i)の前記DNA標的配列を認識
し、それに直接結合することができる請求項1～3のいずれか一項に記載の方法。

【請求項5】

(i i i)の前記DNAでコードされたペプチドがrepAタンパク質であり、(i)
の前記DNA標的配列がoriである請求項4記載の方法。

【請求項6】

(i i)の前記DNAが制限酵素消化及び連結によって(i)及び(i i i)の前記D
NAに結合した請求項4又は5に記載の方法。

【請求項7】

前記repAが、IncI複合プラスミドのrepA並びにIncF、IncB、In
cK、IncZ及びIncL/MプラスミドのrepAから選択された請求項3～6のい
ずれか一項に記載の方法。

【請求項8】

前記DNA構築物が、repAをコードする配列、IncFIIプラスミドR1のci
sDNA要素及びoriDNAを含む請求項5記載の方法。

【請求項9】

前記repAタンパク質が、配列番号16の配列を有し、前記cisDNA要素が配列
番号17の配列を有する請求項3～8のいずれか一項に記載の方法。

【請求項10】

(i i i)の前記DNAでコードされたペプチドに結合しないDNAが非特異的DNA
結合タンパク質に結合する請求項1～9のいずれか一項に記載の方法。

【請求項11】

(i i i)の前記DNAでコードされたペプチドがエストロゲン受容体DNA結合ドメ
インであり、(i)の前記DNA標的配列はエストロゲン受容体標的配列である請求項4
記載の方法。

【請求項12】

前記DNA結合ドメインがエストロゲン受容体DNA結合断片のアミノ酸176から2
82までを含み、前記DNA標的配列は配列番号14のエストロゲン受容体標的配列を含
む請求項11記載の方法。

【請求項13】

前記DNAが適切なプロモーター及びイン・ビトロでの転写及び翻訳を可能にする翻訳
配列の制御下にある請求項1～12のいずれか一項に記載の方法。

【請求項14】

前記ライブラリー構成ペプチドが抗体又はその断片である請求項1～13のいずれか一
項に記載の方法。

【請求項15】

前記ライブラリーが少なくとも 10^4 個の分子を含む請求項1～14のいずれか一項に
記載の方法。

【請求項16】

前記発現は、ヌクレアーゼ活性を防御し、非特異的DNA-タンパク質又はタンパク質
-タンパク質相互作用を減少させる化合物の存在下で実施する請求項1～15のいずれか
一項に記載の方法。

【請求項17】

前記発現は細菌の一連の転写／翻訳環境で実施する請求項1～16のいずれか一項に記
載の方法。

【請求項18】

10

20

30

40

50

前記細菌の一連の転写／翻訳環境はS 3 0抽出系である請求項1 7記載の方法。

【請求項1 9】

少なくとも(a) イン・ビトロでのペプチド発現ライブラリーをスクリーニングする段階、及び(b) 関連するライブラリー構成要素を選択し単離する段階を含む、請求項1～1 8のいずれか一項に記載の方法によって生成された前記ライブラリーから所望の特性を示すペプチドを同定及び／又は精製する方法。

【請求項2 0】

特異的リガンド結合ペプチドの同定方法であって、少なくとも(a) 固相支持体の場合によっては結合したリガンド分子で請求項1～1 8のいずれか一項に記載の方法によって生成したイン・ビトロでのペプチド発現ライブラリーをスクリーニングする段階、(b) 前記リガンド分子に結合するライブラリー構成要素を選択し単離する段階、及び(c) 前記リガンド分子に特異的に結合するペプチドを単離する段階を含む方法。

10

【請求項2 1】

前記ライブラリー構成ペプチドが抗体又はそれらの断片である請求項1 9又は2 0に記載の方法。

【請求項2 2】

少なくとも、

(a) (i i i) のDNAでコードされたペプチドはDNA結合活性を有するライブラリー構成ペプチドであり、(i) の前記DNA標的配列は関心のある特異的DNA標的配列である請求項1～1 8のいずれか一項に記載のイン・ビトロでの発現ライブラリーを提供する段階、

20

(b) コードタンパク質が前記標的配列に結合するライブラリー構成要素を選択し単離する段階、及び

(c) 前記標的配列に結合するペプチドを単離する段階、

を含む、前記特異的DNA標的配列に結合する能力を有するペプチドを同定及び／又は精製する方法。

【請求項2 3】

前記ライブラリー構成ペプチドが、ジンクフィンガータンパク質、ヘリックスループヘリックスタンパク質又はヘリックスターナーヘリックスタンパク質である請求項2 2記載の方法。

30

【請求項2 4】

前記スクリーニング及び／又は選択段階は、ヌクレアーゼ活性を防御し、非特異的DNAタンパク質又はタンパク質タンパク質相互作用を減少させる化合物の存在下で実施する請求項1 9～2 3のいずれか一項に記載の方法。

【請求項2 5】

前記化合物がヘパリンである請求項2 4記載の方法。

【請求項2 6】

さらに前記単離ペプチドを発現するDNAを単離する請求項1 9～2 5のいずれか一項に記載の方法。

【請求項2 7】

40

前記DNAを発現ベクターにクローニングすることをさらに含む請求項2 6記載の方法。

【請求項2 8】

前記発現ベクターをイン・ビトロで細胞に導入することをさらに含む請求項2 7記載の方法。

【請求項2 9】

前記DNAでコードされたペプチドを発現することをさらに含む請求項2 7又は2 8に記載の方法。

【請求項3 0】

請求項1～1 8のいずれか一項に記載の方法によって生成したイン・ビトロでのペプチ

50

ド発現ライブラリー。

【請求項 31】

請求項 1～18 のいずれか一項に記載の DNA 構築物。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、一般的には組換え DNA 技術に関し、より具体的には、生物活性分子をコードする DNA 配列について DNA ライブラリーを構築しスクリーニングするイン・ビトロ (in vitro) 法に関する。

【背景技術】

10

【0002】

組換え DNA ライブラリーから所望のペプチドをコードする未知の遺伝子を単離することは、困難な操作である。ハイブリダイゼーションプローブを使用することによってこの操作を容易にすることができるが、これを使用するには一般的に、タンパク質をコードする遺伝子配列の少なくとも一部が公知であることが必要である。配列が分かっていないときは、DNA ライブラリーは発現ベクターで発現させることができ、抗体を使用して所望のタンパク質抗原のプラーク又はコロニーをスクリーニングしてきた。この方法は小さなライブラリーのスクリーニングには有用であるが、発現が希な cDNA 分子又は合成ペプチドの場合のように、クローン 10^5 個当たり約 1 個未満しか現れないような出現が希な配列は見逃されやすく、クローン数が 10^6 個より大きなライブラリーをスクリーニング

20

【0003】

ファージディスプレイ法は、繊維状バクテリオファージコートタンパク質の N 末端に融合した DNA ライブラリー及び細菌宿主におけるそれらの発現に基づき、ファージ粒子にパッケージされた融合タンパク質コード DNA を有するファージ粒子表面上における外来ペプチドの提示を引き起こす (Smith G. P.、1985、Science 228: 1315～1317)。ファージに取り込まれた融合タンパク質のライブラリーは、次に関心のある標的 (リガンド) に対する結合因子で選択することができる。次に、結合したファージを大腸菌 (E. coli) に再感染させ、その後増幅して選択を繰り返し、結合因子を濃縮することができる (Parmley, S. F. & Smith, G. P. 1988.、Gene. 73: 305～318、Barrett R. W. 他、1992、Analytical Biochemistry 204: 357～364 Williamson 他、Proc. Natl. Acad. Sci. USA、90: 4141～4145、Marks 他、1991、J. Mol. Biol. 222: 581～597)。

30

【0004】

40

LacI 融合プラスミドは、lac リプレッサーの DNA 結合能力に基づいている。ランダムペプチドのライブラリーを lacI リプレッサータンパク質の C 末端に融合する。LacI ペプチド融合物のそのコード DNA への結合は、プラスミドの lacO 配列を介して行われ、安定したペプチド-LacI ペプチド複合体が形成される。これらの複合体は、細胞溶解によって宿主細菌から放出され、関心のあるペプチドは、アフィニティ精製によって固定された受容体標的上に単離される。したがって、単離したプラスミドをエレクトロポレーションによって大腸菌に再導入して、スクリーニングを重ねるために選択した集団を増幅することができる (Cull, M. G. 他、1992 Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 89: 1865～1869)。

【0005】

50

これらの細菌による方法は、宿主細菌にDNAを導入する現在の方法で作製できるライブラリーの大きさには限界があり、導入した発現ペプチドには潜在的細胞毒性がある上、翻訳後に変更を行ったり、新規アミノ酸を発現ペプチドに取り込んだりできないことが制限となる。

【0006】

完全なイン・ビトロでのリボソーム系は、ペプチドの該ペプチドコードRNAへのリボソームによる結合に基づいて説明されている(WO91/05058)。リボソームディスプレイはまた、1本鎖Fv抗体断片(scFv)を選択するために使用されてきた(Mattheakis, L. C. 他、1994 Proc. Natl. Acad. Sci. USA、91:9022~9026、Hanes, J. & Pluckthun, A. 1997 Proc. Natl. Acad. Sci. USA、94:4937~4942)。この方法の欠点は、RNA遺伝物質の安定性が低いこと、RNA分解酵素が存在するおそれがある選択条件下では分解が増加しやすいことである。

【0007】

Griffiths及びTawfikが報告したイン・ビトロ法(WO99/02671及びWO00/40712)では、ペプチド発現の前にDNAを区分し、その後区分内のDNAを改変することによってこれらの問題のいくつかに取り組んでいる。改変可能なペプチドは、関心のある酵素活性から得られ、その後の段階で選択する。しかし、そのペプチドをコードするDNAを変更せず、区分から改変DNAを放出して、ペプチドとDNAの両方のペプチド結合活性を直接的に選択することは不可能である。

【0008】

他の従来方法、共有結合ディスプレイ法又はCDTは、WO9837186に記載されている。この方法は、架橋結合タンパク質のシス作用によるタンパク質とDNAとの架橋結合によって、遺伝子型と表現型との結合を保持することによる。この方法は、この技術をうまく使用するためには2つの必要条件が必要であることを示している。第1に、タンパク質はそれらをコードするDNA配列とイン・ビトロで相互作用する(シス作用)ことが必要で、第2に、前記タンパク質はそれ自身のDNA鋳型と共有結合を確立しなければならない。この方法は、DNAが化学的に変更され、関心のある結合ペプチドの回収及び同定が妨害されるおそれがあるという事実が欠点となっている。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

依然として、前述の方法に加えて、結合活性並びに酵素活性の直接選択が可能で、関心のあるペプチドをコードする完全な遺伝子材料の回収できる上、複合ペプチド構造の効果的な生成を可能にする用途の広いイン・ビトロでのペプチドライブラリー構築方法の必要性がある。

【課題を解決するための手段】

【0010】

したがって、本発明は、

(a) (i) DNA標的配列、

(ii) ライブラリー構成ペプチドをコードするDNA、及び

(iii) (ii)の前記DNA標的配列に直接的又は間接的に非共有結合することができるペプチドをコードするDNAを含むDNA構築物であって、前記DNA構築物及びコードされたタンパク質がシス活性を有するように選択されたDNA構築物を提供する段階、

(b) 各発現ペプチドが生成元のDNAに非共有結合するように、前記DNA構築物が複数のライブラリー構成ペプチドをコードする、(a)による複数のDNA構築物を発現する段階を含み、各ペプチドが前記ペプチドをコードするDNA構築物に結合した、複数のペプチドを含むイン・ビトロでのペプチド発現ライブラリーの作製方法を提供する。

【0011】

また、本発明は、

(a) (i) ライブラリー構成ペプチドをコードするDNA、及び

(ii) 二価性物質に非共有結合することができるペプチドをコードするDNAを含むDNA構築物であって、前記DNA構築物及びコードタンパク質はシス活性を有するように選択されたDNA構築物を提供する段階、

(b) 二価性物質又は二価性物質に結合することができるDNAタグを(a)の前記DNA構築物へ結合させる段階であって、前記二価性物質が(ii)の前記DNAでコードされたペプチドに結合することができる段階、及び

(c) 各発現ペプチドが前記二価性物質を介して生成元のDNAに結合するように、前記DNA構築物が複数のライブラリー構成ペプチドをコードする、(b)による複数のDNA構築物を発現する段階を含み、各ペプチドがペプチドをコードするDNA構築物に結合した複数のペプチドから構成されるイン・ビトロでのペプチド発現ライブラリーの作製方法を提供する。

10

【0012】

本発明は、このような方法によって作製されたペプチドライブラリー及びこのような方法で使用したDNA構築物にも適用される。

【0013】

本発明はまた、本発明のイン・ビトロでのペプチド発現ライブラリーのスクリーニング方法を提供する。1態様では、少なくとも(a)前記ライブラリーをスクリーニングする段階及び(b)関連するライブラリー構成要素を選択し単離する段階を含む、添付の特許請求の範囲のいずれか一項に記載の方法によって作製されたイン・ビトロでのペプチド発現ライブラリーから所望の特性を示すペプチドを同定及び／又は精製する方法を提供する。第2の態様では、特異的リガンド結合ペプチドの同定方法を提供し、前記方法には少なくとも(a)固相支持体の場合によっては結合したりガンド分子で本発明の方法で作製したイン・ビトロでのペプチド発現ライブラリーをスクリーニングする段階、(b)前記標的分子に結合するライブラリー構成要素を選択し単離する段階、及び前記標的分子に特異的に結合するペプチドを単離する段階が含まれる。第3の態様では、少なくとも(a)(iii)の前記ペプチド又はタンパク質はDNA結合活性を有するライブラリー構成ペプチドであり、(i)の前記DNA標的配列は関心のある標的配列である本発明によるイン・ビトロでの発現ライブラリーを提供する段階、(b)コードされたタンパク質が前記標的配列に結合するライブラリー構成要素を選択し単離する段階、(c)前記標的配列に結合するペプチドを単離する段階を含む、特異的なDNA標的配列に結合する能力を有するペプチドを同定及び／又は精製する方法を提供する。

20

30

【0014】

本発明のライブラリーから特異的ペプチドを単離及び／又は同定することに加えて、本発明のスクリーニング方法を使用して該ライブラリーから特異的ペプチドをコードするDNAを単離及び／又は同定することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

本発明は、イン・ビトロで関心のあるペプチドをコードするヌクレオチド配列のライブラリーの構築及びスクリーニングに関する。関心のあるペプチドをコードする構築物は、発現したペプチドが構築物にシス活性を示すように設計する。シス活性は、ペプチドが生成元、すなわち転写し翻訳した元のDNAに結合する能力として定義される。該構築物をイン・ビトロで発現することによって、非共有相互作用によってペプチドの同ペプチド分子をコードするDNAへの結合が引き起こされる。これは、タンパク質とそれをコードしたDNAとのイン・ビトロでの非共有相互作用の可能性を考慮せず、実際にライブラリーをスクリーニングするための実用的利用からこのような相互作用を特異的に排除しているWO98/37186の教示とは異なる。

40

【0016】

非共有結合とは、当業者に公知の方法、たとえば適切な溶媒の添加又はイオン状態の変

50

更、たとえば、pHの低いグリシン又はpHの高いトリエチルアミンの添加によって切断できる会合のことである。この場合では、非共有結合の一般的な例は、DNA結合タンパク質とDNA分子との非共有的相互作用であろう。反対に、共有結合がDNAとコードされたポリペプチドとの間で形成されると、非共有的なDNA結合タンパク質：DNA相互作用を切断するイオン状態及び溶媒では、ディスプレイされたペプチド又はタンパク質がDNAから遊離しない。たとえば、細菌の複製開始タンパク質repAはその標的DNA配列oriRと非共有的に結合し、0.2Mを上回る塩濃度のKClでこの標的DNA配列を遊離することができる（Giraldó R. & Diaz R. 1992 J. Mol. Biol. 228:787~802）。この塩濃度は共有結合には影響を及ぼさず、共有結合したタンパク質を遊離させるためにはもっと厳しい条件が必要で、回収されたDNAに損傷が及ぶ危険性が増大する。

10

【0017】

本発明は、得られたタンパク質DNA複合体の混合物から個々のペプチド及び関心の活性を備えたペプチドをコードする会合DNAを分離するのに十分な半減期で、コードされたペプチド又はタンパク質とDNA構築物との会合を維持させるシス活性及び非共有結合について記載する。たとえば、コードしたタンパク質とそのDNAとの会合の半減期は、30分まで、45分まで、1時間まで、2時間まで、6時間まで又は12時間までであってよい。したがって、本発明のスクリーニング方法は、ライブラリー構築後すぐに、又は後で、たとえば1時間後、2時間後、6時間後、12時間後、又は24時間後までに、又は24時間以上後で実施してよい。

20

【0018】

したがって本発明はここで、驚くべきことにこのようにコードされたペプチド又はタンパク質はイン・ビトロで発現し、その他のDNA配列の存在下でそのペプチドのコードDNAと結合することができることを示す。本発明はまた、タンパク質とDNAとの共有結合はこのようなシス活性の維持に必要ではなく、イン・ビトロでの発現及び選択系でペプチドの選択を可能にするには、DNAと結合タンパク質との間の非共有的相互作用で十分であることを示唆する。

【0019】

本発明では、それぞれがペプチド発現ライブラリーで発現するペプチド（ライブラリー構成ペプチド）をコードする個々のDNAライブラリー構成要素を適切なDNA構築物に配置する。該DNAライブラリー構成要素を入れたDNA構築物には、該構築物から該ライブラリー構成ペプチドを発現させるため、該構築物でコードされたペプチドを、それをコードしたDNA構築物に結合させるために必要な配列全てが含まれる。該ライブラリーの各ペプチドには一般的に、融合タンパク質の関連DNA構築物への結合に必要なペプチドに融合した該ライブラリー構成ペプチドを含む融合タンパク質が含まれる。このような融合タンパク質には、他の配列を含めることができ、前記ライブラリーペプチドはリンカー配列を介して前記結合ペプチドに結合することができる。

30

【0020】

複数の異なるライブラリー構成ペプチドをコードするこのような複数の構築物は、本発明のDNAライブラリーを形成する。このようなDNA分子ライブラリーの発現によって、該ライブラリーのその他の要素をコードするその他多くのDNA分子の存在下で、コードされた個々のタンパク質は、それらをコードする転写翻訳元DNAに非共有的に結合するようになる。したがって、特定のコードされたタンパク質に存在するペプチドライブラリー構成要素をコードする配列は、そのタンパク質に結合したDNAに存在するだろう。したがって、この方法によって、（通常結合活性を備えた）生物活性型のライブラリー構成ペプチドはそのペプチドをコードする特異的ライブラリー構成DNA配列に結合し、たとえば特定の結合活性によって関心のあるペプチドを選択し、その後該ライブラリー構成ペプチドをコードするDNAを単離同定することが可能になる。

40

【0021】

したがって、本発明の目的のためには、DNAライブラリーはDNA構築物の集団であ

50

る。各構築物には、ライブラリー構成ペプチドとして発現するペプチドをコードするDNA配列が含まれ、それぞれには適切なプロモーター、翻訳開始シグナル及び停止シグナルが含有される。本発明のDNAライブラリーには複数のこのようなDNA分子が含有される。複数のDNA構築物それぞれは、ライブラリー構成ペプチドをコードし、複数の異なるライブラリー構成要素を提供するようになっている。DNAライブラリーは少なくとも 10^4 個の異なるDNA分子を含有することが好ましい。たとえば、DNAライブラリーは、 10^6 個、 10^8 個、 10^{10} 個、 10^{12} 個、 10^{14} 個を上回る異なるDNA分子を含有することができる。

【0022】

ペプチド発現ライブラリーは、DNA分子のライブラリーから発現したペプチド配列の集団として定義される。したがって、本発明のペプチド発現ライブラリーにはそれらをコードするDNAに非共有的に結合したペプチドのライブラリーが包含される。たとえば、本発明のペプチド発現ライブラリーは、DNA分子のライブラリーから発現した、ライブラリーペプチド配列をそれぞれ含む少なくとも 10^4 個の異なるタンパク質のライブラリーであることができる。本発明のペプチド発現ライブラリーは、本発明のDNAライブラリーの発現によって形成された任意のライブラリーであることができる。

【0023】

ペプチドライブラリー構成要素は、長さが少なくとも2個のアミノ酸である様々な成分のアミノ酸鎖、又は酵素などの天然に生じるタンパク質の一部又は全部、受容体又は抗体又はそれらの断片などの結合分子として定義することができる。適切なペプチドライブラリー構成要素は、無作為なアミノ酸成分を有するペプチドであってよい。様々な、又は無作為な成分のペプチドは、N末端及び／又はC末端に公知のアミノ酸配列を隣接させて、構造を制限することができる。これらの公知の配列の長さは変化させることができる。様々な、又は無作為な成分のペプチドには、受容体又は抗体又はそれらの断片などの公知のタンパク質骨格の様々な位置に挿入することができる。該ペプチドは、同タンパク質骨格に1回又は複数回、たとえば2回以上挿入することができる。

【0024】

本発明によるDNA構築物は、ライブラリー構成ペプチドをコードするDNA及びコードされたペプチドがコードしたDNA構築物に結合するための手段を含むことができる。ライブラリー構成ペプチドをコードするDNAに加えて、本発明の適切なDNA構築物には、少なくともDNA標的配列及び該DNA標的配列に直接的に又は間接的に結合することができるペプチドをコードするDNAが含まれる。

【0025】

本発明では、該DNA構築物及びコードされたタンパク質は、シス活性を有するように選択される。すなわち、コードされたタンパク質は、それをコードしたDNA分子に特異的に結合する能力を有する。たとえば、シス活性は、コードされたDNA結合ペプチドが、他のDNA構築物の標的配列よりもそれをコードするDNA構築物の標的配列に特異的に（直接的又は間接的に）結合させるように作用することできる。

【0026】

シス活性は、シス活性をもたらすDNA要素、すなわち、DNAでコードされたタンパク質にシス活性を持ち、したがってそのコード配列に結合するのを可能にするか、又は強制するDNA要素の存在によってもたらすことができる場合がある。コードしたDNAの性質がコードされたペプチドにシス活性を付与する場合、別のDNA要素自体は必要とされない場合もある。

【0027】

シス活性をもたらすDNA要素は、該cis要素と相互作用するペプチドをコードするDNAと一緒にDNA構築物中に形成することができる。たとえば、以下で論じるrepA系のcis要素の場合、repAのC末端の少なくとも20個のアミノ酸を含むrepA配列断片をコードするDNAは、cisDNA要素と一緒にもたらすことができる。DNA構築物にこのようなDNA要素及びその作用に必要な他の配列を含めることによって

10

20

30

40

50

、通常シス作用のないDNA結合ペプチドにシス活性を付与することができる。たとえば、使用したcis要素と相互作用するペプチドをコードするDNAを該DNA構築物に含めることができる。

【0028】

或いは、cis要素と相互作用するペプチドは該DNA結合ペプチドの一部であることができる。たとえば、該DNA結合ペプチドは、repA-cis要素と相互作用する配列を含むrepAであることができる。或いは、該DNA結合ペプチドは、別のcis要素を必要とせずにシスでそのコードDNAに結合することができる。

【0029】

適切なDNA要素は、シス活性を可能にする、又はもたらす任意の要素であってよい。このようなDNA要素は、たとえば、コードされたペプチドの産生及び遊離を遅延させるように該DNA構築物の翻訳及び転写に關与する機構との相互作用によって作用することが可能である。

10

【0030】

コードされたペプチドが特異的に、それをコードするDNA分子に結合するのを可能にする任意のDNA要素は、本発明によるDNA要素として使用することができる。適切なDNA要素の一例は、以下により詳細に説明したrepA-cis系の要素である。この系では、RNAポリメラーゼは、転写のrho依存性終結の前に5' cis配列のループによって停止する。したがって、DNA要素の作用でコードされた結合ペプチドが生成元の構築物中の該DNA標的配列に結合することが可能になる。

20

【0031】

該cis DNA要素は、DNA構築物中においてライブラリー構成ペプチド及びDNA標的配列に結合することができるペプチド又はタンパク質の3'に位置することが好ましい。これは、RNAポリメラーゼがシス作用配列に達する前にこれらの配列が転写翻訳され得ることを意味する。

【0032】

本発明では、該結合ペプチドはDNA構築物に直接的又は間接的に結合することができる。直接的な結合の場合、該結合ペプチドは直接的かつ非共有的に該DNA標的配列に結合する。間接的な結合の場合、該結合ペプチドとDNA構築物との間の結合は他の分子によって形成される。このような分子、たとえば以下に説明したような二価性物質は、該ペプチドと該DNA標的配列の両方に関係する。

30

【0033】

適切なDNA構築物には、他の配列、たとえば、コードされたペプチドの発現を可能にする適切なプロモーター配列を含めることができる。

【0034】

シス活性が存在する系の一例は、repAと称するシス作用不適合群プラスミド複製タンパク質系である。この系の特性を以下に説明するように本発明で利用することができる。

【0035】

数多くのプラスミドには、repAをコードする配列及びcis DNA要素が含まれる。本発明のDNA構築物に存在するrepA配列及びcis DNA要素は、同じプラスミド種から得ることができるか、又は異なるプラスミド種から得ることができる。

40

【0036】

repA-cis系は図1に示したように作用するものと考えられている。簡単に説明すると、RNAポリメラーゼは、転写のrho依存性終結の前に5'-CIS配列のループによって停止される。これによって、repAのC末端ペプチドとCISとの一時的な相互作用が可能になり、DNA屈曲が起こることができる。次にrepAペプチドは、repAコーディング配列の末端アミノ酸から決まった距離にあるoriに結合する(Praszkier他、2000 J. Bacteriology 182:3972~3980、Praszkier及びPittard 1999 J. Bacteriol. 18

50

1:2765~2772; Masai及びArai, 1988 Nucleic Acids Res. 16:6493~6514)。

【0037】

プラスミドから得られたRepA配列と他のプラスミドから得られたcis配列との適合性は、RepAと選択されたcis配列との相互作用をモニターすることによって容易に決定することができる。

【0038】

適切なRepAタンパク質及び配列及びcisDNA要素には、DNAレベルでの関連性は疎遠であるが、シス作用RepAタンパク質の作用によってプラスミド複製を制御するIncI複合プラスミド又はIncF、IncB、IncK、IncZ及びIncL/Mプラスミドのものが含まれる。(Nikolletti他、1986 J. Bacteriol. 170:1311~1318、Praskier J. 他 1991 J. Bacteriol. 173:2393~2397)。これらの配列を提供するために使用することができる特定のプラスミドには、IncII不適合群のR1プラスミド及びIncBプラスミドpMU720が含まれる。(Praskier J. & Pittard J. 1999「IncBプラスミドの複製におけるCISの役割」(Role of CIS in replication of an IncB plasmid) J. Bacteriol. 181:2765~2772に記載されている)。IncIIのR1プラスミドから得られたrepAのDNA及びアミノ酸配列を配列番号15及び16に挙げる。IncIIのR1プラスミドから得られたcisDNA要素のDNA配列を配列番号17に挙げる。一般的に、該cis要素の長さはヌクレオチド150個から200個である。該配列がRepAと相互作用し、シス活性を表す能力を維持する限り、より長い又はより短い配列を使用することができる。cis配列内の置換又は欠失などの小さな変更、たとえば野生型cis配列内の1個、5個、10個、20個までのヌクレオチドの変更は企図される。

【0039】

該cis要素は、該RepAタンパク質のシス活性に必要である。(Praskier及びPittard 1999 J. Bacteriol. 181:2765~2772)。したがって、cisDNA要素はまた、該DNA構築物のrepA配列をコードするDNAの3'に位置しなければならない。シス配列に達すると、RNAポリメラーゼは停止し、該コードタンパク質の該DNA標的配列への結合が可能になる。

【0040】

本発明の1実施形態では、該DNA結合タンパク質自体にはrepA又はDNA結合可能なそれらの断片又は変種が含まれ、該cisDNA要素に結合できるrepAの少なくとも20個のC末端アミノ酸が含まれる。この実施形態では、該DNA標的配列には、ori配列、たとえばoriR配列が含まれる。本発明の他の態様では、該DNA結合タンパク質は、配列に取り込まれたこのような結合タンパク質によって認識される関連DNA標的配列を有する他のタンパク質によってもたらされる。これらの実施形態それぞれでは、該DNA構築物でコードされたペプチドが直接的に該コードDNA構築物に結合するので、DNA-タンパク質結合は直接的である。本発明の他の態様では、以下にさらに詳細に説明するように、該DNA-タンパク質結合は、ペプチドタグ-DNAタグ、二価性物質及び/又は適切なリンカーを使用して、間接的であってよい。

【0041】

したがって、1態様では、同じ配列がDNA標的配列に結合できるペプチドとrepAのC末端アミノ酸の両方を提供することができる。このような配列は、完全なrepA配列、又は使用したDNA標的配列に結合する能力を維持したrepA配列の断片又は変種であることが可能であるか、含むことが可能である。該repAはDNA結合タンパク質として作用する場合、cis配列及びori配列の両方(Praskier及びPittard 1999 J. Bacteriol. 181:2765~2772)がシス活性(cis)及びDNA結合(ori)に必要である。したがって、この態様では、該D

NA 標的配列は、ori 配列であり、前記標的に結合できるペプチド又はタンパク質は repA タンパク質である。本発明の DNA 構築物の ori の位置は変更可能である。前に説明したように、適切な repA、cis 及び ori 配列は 1 個又は複数のプラスミドによってもたらしることができる。たとえば、適切な配列は、Inc 複合プラスミド又は IncF、IncB、IncK、IncZ 及び IncL/M プラスミドからもたらしすることができる。IncII の R1 プラスミドから得られた ori の DNA 配列を配列番号 18 に挙げる。この配列又はその断片は、本発明の DNA 構築物に含めることができる。本発明の DNA 構築物には、完全な ori 配列を含めることができるか、又は使用する repA タンパク質が結合することができるそれらの断片を含めることができる。

【0042】

本発明に従って使用した RepA タンパク質はまた、RepA の変種又は断片が選択した ori 配列への結合能力を維持している限り、このような RepA の断片又は変種を含むことができる。このような repA の変種又は断片には、このような変種が ori 配列への結合能力を維持する限り、repA 配列内の、たとえば 1 個、2 個、3 個、20 個までのアミノ酸の置換を含めることができる。RepA の適切な断片は、RepA の ori 結合配列である。ori 配列には、前述のような野生型プラスミドに存在するものが含まれる。一般的に、このような ori 配列の長さはヌクレオチド 170 個から 220 個である。このような ori 配列が RepA によって認識される能力を維持している限り、野生型 ori 配列の断片及び変種もまた使用することができる。RepA タンパク質ファミリーの他のシス作用要素を使用することができる。たとえば、タンパク質の RepA ファミリーは、宿主範囲の広範なプラスミド上に見いだされ、すなわち、1 個の RepA プラスミドを異なる細菌種で見いだすことができる。(たとえば) 好熱性、好硫化物性、好塩性又は好酸性細菌の RepA ファミリープラスミドの単離によって、本発明の高温又は過剰な塩、pH 又は硫黄濃度で使用する RepA-cis-ori DNA がもたらされるだろう。RepA ファミリーのこのような要素は、このような極度の条件下でも標的分子に結合できるライブラリー構成要素の単離に有利であろう。選択した RepA タンパク質と組み合わせて使用するために適切な ori 配列は、RepA とこのような ori 配列との相互作用をモニターすることによって容易に決定することができる。

【0043】

したがって、本発明の基本的原理は、図 1 に示したような repA/cis/ori 系を参考にして説明することができる。これは本発明の DNA 構築物の一例である。該構築物には、5' から 3' に向かって、プロモーター配列、ライブラリー構成ペプチドをコードした配列、repA タンパク質をコードした配列、cis DNA 要素及び ori 配列が含まれる。簡単に説明すると、該 DNA 配列は、RNA ポリメラーゼによってプロモーターから RNA に転写される。該 cis DNA 要素に存在する rho 依存性終結機能が、RNA ポリメラーゼが該配列のこの部分で停止する原因となる。これによって、該 repA タンパク質及び該ライブラリーペプチドの翻訳が可能となる。該 repA タンパク質は、次に ori 配列に結合し、コードされたタンパク質がコード DNA 構築物に結合することが可能である。

【0044】

好ましい 1 実施形態では、ライブラリー構成要素 DNA 配列は該 repA、cis 及び IncFII プラスミド R1 の ori DNA に融合する (Masai H 他 1983 Proc Natl Acad Sci USA 80:6814~6818)。この実施形態では、関心のあるライブラリー構成要素 DNA 配列は、イン・ビトロでの転写/翻訳用の適切なプロモーター及び翻訳配列の制御下で、柔軟なアミノ酸リンカーをコードする DNA の領域によって repA DNA の 5' 末端に結合することができる。多くの適切なプロモーター、中でも、araB、tac プロモーター或いは T7、T3 又は SP6 プロモーターなどが当業者には公知である。該プロモーターは発現させるポリペプチド配列の上流に置くべきである。

【0045】

repAファミリーのタンパク質を本明細書で例として使用したが、これだけに限定はしない。他の関連のない非共有結合シス作用性DNA結合タンパク質を本発明で使用することも可能である。

【0046】

他の実施形態では、非シス作用性DNA結合タンパク質がシス活性を有するように変換することができる(図2参照)。これは、DNA標的配列に直接的に、又は間接的に結合できるこのようなタンパク質を、それらにシス活性を与えることができる配列と組み合わせる使用することによって実現することができる。DNA構築物にrepA系のcis要素などのシス活性をもたらすDNA要素を含めることによって、通常シスで作用しない結合タンパク質にシス活性を与えることができる。このような要素を含めると、DNA結合タンパク質によるDNA結合は確実にシスとなり、すなわち、コードされたDNA結合タンパク質は、転写及び翻訳元のDNA構築物に結合することができるだろう。

10

【0047】

1実施形態では、したがって、適切なDNA構築物はrepA系からシス活性(cis DNA要素)をもたらすDNA要素を含んでよい。このような要素はさらに、repAのC末端の一部をコードするDNA、好ましくはRepAのC末端部分の少なくとも20個のアミノ酸、より好ましくは30個のアミノ酸、40個、50個、60個又は70個までのアミノ酸を含み、repAの前記断片は該構築物内のDNA要素と相互反応することができる。他の例では、中でもシス作用するトランスポザーゼなどのタンパク質、Tn5及びIS903を本発明で使用することができた(McFall E. J. Bacteriol. 1986 Aug 167:429~432、Derbyshire KM & Grindley ND. Mol Microbiol. 1996 Sep 1:1261~72)。本発明のDNAコード配列には、RepAの所望の断片をコードする野生型配列、野生型RepAの断片をコードする変性配列又は該DNA構築物に取り込まれたcis要素と相互作用する能力を維持したRepAのこのような断片の変種をコードする配列を含めることができる。このような変種は、RepAのC末端の20個のアミノ酸のうち1個、2個、3個又は4個のアミノ酸の置換を含んでよい。

20

【0048】

repAファミリーのタンパク質を本明細書で例として使用したが、それだけに限定はしない。非シス作用タンパク質にシス活性を与えることができる任意のDNA要素を使用することができた。

30

【0049】

任意の非シス作用タンパク質はこのように変換することができる。例としては、エストロゲン受容体DNA結合ドメイン(DBD)はシス作用DNA結合タンパク質に変換することができるが、それだけに限らない。該エストロゲン受容体DNA結合ドメイン断片(アミノ酸176~282)は、大腸菌(E. coli)で発現し、特異的な2本鎖DNAエストロゲン受容体標的HREヌクレオチド配列に対して親分子と同等の親和性(0.5 M)で結合を示した(Murdoch他 1990、Biochemistry 29:8377~8385、Mader他、1993、DNAs Research 21:1125~1132)。1実施形態では、この配列をコードするDNAは、好ましくは3'末端で、repAの少なくとも20個のアミノ酸をコードするDNA、cis DNA配列、及びori配列に続くrepA ori認識配列の代わりのエストロゲン受容体標的認識配列(5'-TCAGG TCAGA GTGAC CTGAG CTA AA ATAA C ACA TT CAG-3'、配列番号14)までのDNAに融合する。関心のあるDNA配列は次に、イン・ビトロでの転写/翻訳用の適切なプロモーター及び翻訳配列の制御下で、柔軟なアミノ酸リンカーをコードするDNAの領域によってエストロゲン受容体DNA断片の5'末端に結合することができる。このポリペプチドの発現によって、そのポリペプチドをコードするDNA上の、正常なori配列の代わりに存在するその標的配列に該エストロゲン受容体DBDを方向付ける。次に、タンパク質-DNA複合体は、標的タンパク質上に捕捉することによって単離することができる。結合しなかったタンパク

40

50

質-DNA複合体は洗浄して、関心のあるペプチド又はタンパク質をコードするDNAを濃縮することが可能で、それらは次にPCRによって回収することができ、既に説明した方法を使用して、イン・ビトロでの発現及びタンパク質-DNA複合体捕捉をさらに何回か実施することによってさらに濃縮することができる。

【0050】

この取り組みは、該cisDNA要素及びrepAのC末端の少なくとも20個のアミノ酸をコードする配列、又は該DNA構築物の異なるシス作用系の同等要素を使用することによって、簡単にその他のDNA結合タンパク質に適用できることは明らかである。

【0051】

他の実施形態では、例としてジンクフィンガータンパク質、ヘリックスループヘリックスタンパク質又はヘリクスターンヘリックスタンパク質などの無作為化したDNA結合タンパク質のライブラリーは、関心のある標的配列への特異的な結合についてスクリーニングすることができる（図3参照）。この実施形態では、repAのori認識配列に関心のある標的配列によって、repAコーディング配列の多くは無作為化ジンクフィンガータンパク質のライブラリーによって置換することができる。したがって、この態様ではDNA結合タンパク質はライブラリー構成ペプチド及びDNA標的配列に結合することができるタンパク質の両方として作用する。それぞれのジンクフィンガータンパク質をコードするDNAはさらに、5'末端では、抗体などの他の捕捉タンパク質が認識できるペプチドタグ配列に結合し、3'末端では、repAの少なくとも20個のアミノ酸をコードしたDNA、cisDNA要素、及びori配列に続く関心のある標的配列までのDNAに結合することができる。このポリペプチドの発現によって、そのポリペプチドをコードするDNA上に、正常なori配列の代わりに存在する関心のある標的配列に該ジンクフィンガータンパク質を方向付ける。標的配列への結合は、無作為化フィンガードメインに関心のある配列に結合できる場合にのみ生じる。次に、タンパク質-DNA複合体は、融合タンパク質ポリペプチドのN末端のペプチドタグを認識する結合タンパク質で捕捉することによって単離することができる。結合しなかったDNAは洗浄して、標的配列に結合できるジンクフィンガータンパク質をコードするDNAを濃縮することが可能で、それらは次にPCRによって回収することができ、イン・ビトロでの発現及びタンパク質-DNA複合体捕捉をさらに何回か実施することによってさらに濃縮することができる。

【0052】

前記で説明したように、たとえばDNA結合タンパク質-標的配列の組み合わせの場合、結合ペプチドはDNA標的配列に直接結合することができ、或いは、たとえば二価性物質及び場合によってはDNAタグを介して、DNA標的配列に間接的に結合することができる（図4参照）。

【0053】

1実施形態では、DNA標的配列に直接結合することができないペプチドタグをコードするDNAは、イン・ビトロでの転写／翻訳用の適切なプロモーター及び翻訳配列の制御下で、場合によっては柔軟なアミノ酸リンカーをコードするDNAの領域によって、関心のあるライブラリー構成要素DNA配列の5'末端に結合する。コードされたペプチドはDNA標的配列に間接的に結合するので、これによって結合ペプチドをコードするDNAが形成される。場合によっては、該ライブラリー構成要素の3'末端のDNA配列はrepAの少なくとも最後の20個をコードするDNA及びcisDNA要素であるが、repAのori標的配列ではない。該DNA標的配列はDNAタグであってよく、又はDNAタグを含むことが可能である。このようなDNAタグは1カ所変更した塩基であってよい。たとえば、前述の要素を含有するライブラリーDNA構築物を調製するとき、該DNAの3'末端に、例としてフルオレセイン又はビオチンなどの分子をタグ付けすることができるが、これだけには限定されない。

【0054】

イン・ビトロでの発現の前に、ライブラリーDNA断片を二価性物質と混合することが

でき、この物質の1つの機能はDNAの5'末端であることが可能な標的配列を認識し、DNA断片対二価性物質1対1の割合で結合することである。この二価性物質のもう一つの機能要素は、DNA断片の5'末端でコードされることができるペプチドタグを認識し、結合することができる結合剤である。例として、該二価性物質は、DNA上のフルオレセイン又はビオチンを認識するFab断片及びDNA上にコードされたペプチドタグを認識する他のFab断片から構成されることができがそれだけに限定されない。この二価性物質は、2種類の要素の化学的架橋結合などの多くの様々な方法によって、又は融合タンパク質若しくは二特異的抗体として2種類の要素を発現することによって作製できることは当業者であれば明らかである。二価性物質を生成する前記方法は、例として挙げたものであって、これだけに限定はしない。

10

【0055】

該二価性物質は、コードされたペプチドを発現する前にDNA構築物に結合するか、又は発現中に与えることができる。

【0056】

該融合タンパク質は、二価性物質に結合する間に、次にDNA構築物から転写翻訳される。ペプチドタグがまず翻訳され、メッセンジャーRNA又はRNAポリメラーゼがDNAから遊離する前に、二価性物質の第2の要素によって結合することができる。これによって、発現したポリペプチド及びこのペプチドをコードするDNAの両方が二価性物質によって結合した機能性タンパク質-DNA複合体が生成する。該ペプチドタグ分子は、したがって間接的ではあるが、特異的にDNA標的(タグ)に結合する。タンパク質がこのようにDNA構築物に結合することによって、以下に説明するように、特定の特性を有するタンパク質をスクリーニングし、次にこのタンパク質に結合するコードDNAを同定することが可能である。タンパク質とDNAとの間の共有結合よりも二価性物質を使用することによって、DNA構築物はDNAに損傷を与える危険性を伴わずにタンパク質から容易に分離することができる。

20

【0057】

次に、タンパク質-DNA複合体は標的タンパク質を捕捉することによって単離することができる。結合しなかったタンパク質-DNA複合体は洗浄して、関心のあるペプチド又はタンパク質をコードするDNAを濃縮することが可能で、これは次にPCRによって回収することができ、既に説明した方法を使用して、イン・ビトロでの発現及びタンパク質-DNA複合体捕捉をさらに何回か実施することによってさらに濃縮することができる。

30

【0058】

さらに、この実施形態では、該DNAは直接、たとえば、共有結合によって、ポリマーなどの二価性物質に結合することができる。このようなポリマーは、ペプチドタグを認識できる複数の結合要素を含むことができ、ペプチド発現ライブラリー分子をディスプレイするペプチドをコードするDNAを含有する単位に多価ディスプレイすることができる。例として、前記ポリマーは、ポリエチレン並びにDNAに融合できるその他のポリマー化合物から構成されることができ、それだけに限定されない。したがって、本発明のDNA構築物はこのような二価性物質に結合させるか、又はこのような二価性物質に結合させることができる前述のようなDNAタグに結合することができる。

40

【0059】

本発明の実施形態全てにおいて、DNA構築物にはイン・ビトロでの転写／翻訳用の適切なプロモーター及び翻訳配列が含まれる。任意の適切なプロモーター、中でも、araB、tacプロモーター、T7、T3又はSP6プロモーターなどを使用することができる。このような配列を発現させるために、本発明のDNA配列に操作可能に結合するようにプロモーターを配置する。

【0060】

ライブラリー構成ペプチドをコードしたDNAは、任意の調達可能な手段によって作製することができる。特に、このようなDNAにはcDNAから単離された、DNAシャッ

50

フリングによって得られたDNA、及び合成DNAを含めることができる。

【0061】

該DNA構築物はまた、発現した融合タンパク質内にアミノ酸リンカーをコードすることができる。特に、柔軟性のあるアミノ酸リンカーを含めて、ライブラリー構成ペプチドに該DNA結合ペプチド／RepAを結合させることができる。

【0062】

本発明では、この好ましい実施形態を参照にして、自身のコードDNAに結合させたペプチド又はタンパク質発現ライブラリーを作製し、所望の活性を有するペプチドを以下の段階によって選択した。

【0063】

(融合タンパク質ライブラリーの構築)

ペプチドライブラリー構成要素及び結合タンパク質のイン・ビトロでの発現に適した方法で、適切なプロモーター及び翻訳又はリボソーム結合部位、開始コドン及び終止コドンの制御下で、柔軟なアミノ酸リンカーをコードしたDNAの領域によって、ペプチド又はタンパク質のDNAライブラリーを、シス作用DNA結合タンパク質などのDNA標的配列に結合することができるペプチドをコードしたDNAに融合することができる。repAタンパク質の例では、DNA（たとえばDNA）ライブラリー構成要素をrepADNA結合タンパク質又はそれらの断片に融合する。cis及びori配列を構築物のその他の要素の下流に含めることができる。DNAライブラリーの場合、前記DNA構築物は、イン・ビトロでの転写及び翻訳に適するように設計する。

【0064】

(DNAライブラリー融合タンパク質の発現及びシス結合)

シス活性を可能にするために、S30抽出系などの細菌の一連の転写／翻訳連結環境を使用することができる（Zubay、G. 1973. Ann. Rev. Genet. 7: 267）。cis及びori配列が存在するならば、この環境においてDNAライブラリー構成ペプチドーrepA融合タンパク質などのペプチドを発現することによって、この融合タンパク質をコードするDNAへの融合タンパク質の結合が生じる。ペプチドーrepA融合タンパク質のライブラリーをこの方法で発現すると、この方法によってタンパク質ーDNA複合体のライブラリーが作製され、該DNAに結合したタンパク質は、それを発現するDNAの断片でコードされ、それによってその後関心のあるペプチド又はタンパク質及び前記ペプチドをコードするDNAの両方を選択することが可能になる。これらのライブラリーは、該方法のイン・ビトロでの性質によってさらに複雑になり、より大きなライブラリーであっても、少なくとも $10^{10} \sim 10^{14}$ 個のDNA断片が容易に生じ得る。

【0065】

ヌクレアーゼ活性を阻害するか、非特異的DNAータンパク質又はタンパク質ータンパク質相互作用を減少させる化合物を、この転写／翻訳反応及びシス結合の間に添加することができる。適切な化合物の例には、界面活性剤及びウシ血清アルブミン（BSA）などのブロックタンパク質が含まれる。

【0066】

(関心のあるペプチドの選択)

本発明の方法によって作製されたイン・ビトロでのペプチド発現ライブラリーを使用して該ライブラリーの特定の要素をスクリーニングすることができる。たとえば、該ライブラリーは特定の活性又は特定の結合アフィニティを備えたペプチドをスクリーニングすることができる。関心のあるタンパク質ーDNA複合体は、たとえば、親和性又は活性増大技術によってライブラリーから選択することができる。これは、関心のあるタンパク質に特異的なリガンドによって、関心のあるタンパク質が抗体であれば抗原などで実現することができる。該リガンドは、たとえばビオチン化リガンドと共に、ELISAプレートウェルの表面などの固相表面上又は溶液中に存在させることができ、その後、タンパク質ーDNA複合体のライブラリーをリガンドとインキュベートしてリガンドーリガンド相互作用

10

20

30

40

50

用を可能にした後で、ストレプトアビジンコーティング表面又は磁気ビーズ上に捕捉させる。固相又は溶液中のいずれかでインキュベートした後、結合しない複合体を洗浄除去して、ウェル中のpHを変更することによって、或いはプロテアーゼ消化など当業者に公知のその他の方法によって、或いは加熱又はフェノールクロロホルム抽出でrepA-orri DNA結合を変性させて複合体から直接DNAを遊離させ、リガンドーリガンド相互作用を分断して、結合した複合体を単離する。DNAはまた、前記の方法の1つによって、PCR緩衝液中に直接遊離させて、増幅することができる。或いは、DNAは複合体から遊離することなく直接PCR増幅することができる。場合によっては、たとえばrepAタンパク質との結合によって結合しないDNAは、例として、ヒストンなどの非特異的DNA結合タンパク質による変性から保護することができる。当業者であれば、多くのその他の非特異的DNA結合タンパク質がこの目的に使用できることが明らかであろう。さらに、ヌクレアーゼ活性を阻害するか、非特異的DNAータンパク質又はタンパク質ータンパク質相互作用を抑える化合物を選択過程に存在させることができる。適切な化合物の例には、界面活性剤及び粉乳又はウシ血清アルブミン(BSA)などのブロックタンパク質、ヘパリン或いはオーリントリカルボン酸(aurintricarboxylic acid)が含まれる。

10

【0067】

結合した複合体を回収し、結合したDNAを再増幅し、選択法を反復することによって、所望の配列をコードするクローンを濃縮し、その後配列決定、さらにはクローニング及び／又は発現のために単離することができる。たとえば、関心のあるペプチドをコードしたDNAを単離し、たとえばPCRによって増幅することができる。1実施形態では、何重もネスティングしたPCRプライマーを使用することによって、選択及びDNA回収の反復を容易にすることができる。何度もPCR段階を重ねた後は、DNA末端は一般的に障害を受けている。このような障害を受けた分子からDNAを回収するために、DNA構築物の末端から離れたところでプライマーをアニーリングさせることが必要で、それによって選択毎に構築物が次々と短くなる。

20

【0068】

1実施形態では、DNA構築物及び／又はコードタンパク質はタグを含めるように設計することができる。このようなペプチド又はDNAタグは、たとえば前述のように、関心のあるライブラリー構成要素の分離及び単離に使用することができる。このようなタグを使用してまた、たとえば本明細書で説明したスクリーニング方法で使用するための固相支持体に該ライブラリー要素を保持することができる。

30

【0069】

したがって、本発明のスクリーニング方法には、関連のあるライブラリー構成ペプチドを選択し単離する段階をさらに含めることができ、ペプチドが所望の特性を示すことが可能になる上、該ペプチドをコードするDNAを同定し精製することが可能になる。

【0070】

したがって、本発明には本発明の方法によって同定されたペプチド及びDNAが含まれる。これらのペプチド及びDNAを単離及び／又は精製することができる。本発明の方法によって単離されたペプチド又はDNAは、たとえばアミノ酸又はヌクレオチドの欠失、添加又は置換によって改変することができる。適切に改変したペプチド又はDNAは、本発明の方法によって単離したペプチド又はDNAと少なくとも50%、少なくとも75%、少なくとも90%、少なくとも95%以上のアミノ酸配列又はヌクレオチド配列同一性を示すことが可能である。本発明の方法によって同定されたペプチドは、輸送及び／又は安定化の目的のために改変することができる。たとえば、このようなペプチドはペグ化して(ポリエチレングリコールに結合させて)血清中の半減期を延長するか、又はプロテアーゼ攻撃を防御することができる。本発明の方法によって同定されたペプチドは、ファージディスプレイなどのその他のディスプレイ系で、又はペプチド変種を合成しスクリーニングすることによって改変することができる。このように改変した配列の集合物は、本発明の構築物に取り込むことができ、たとえば、特定のリガンドへの結合を増強した変種

40

50

配列を発見するためにスクリーニングできる新規ライブラリーを形成することができる。したがって、1実施形態では、本発明の方法で使用するためのペプチドライブラリーは、構造的に関連のあるペプチドのライブラリーであってよい。

【0071】

或いは、本質的に無作為なペプチド配列のライブラリーを使用することが可能である。シス作用DNA結合タンパク質に融合したペプチドの様々な種類のライブラリーは、以下のものを含むこの実施形態でスクリーニングすることができる。

(i) 様々な長さの合成DNAをコードした無作為ペプチド配列。

(ii) 抗体又は抗体断片、たとえば1本鎖Fv抗体断片。これらは、1本鎖抗体結合分子を生成するために、柔軟なリンカーペプチドに結合した抗体重鎖及び軽鎖可変領域ドメインから構成される。

(iii) 関心のある活性を含有する細胞集団から単離された天然に生じるタンパク質の無作為cDNA断片。

(iv) 公知のタンパク質配列が無作為ペプチド配列に制約を加える骨格として作用する、公知のタンパク質領域に挿入された、又は置換された無作為ペプチド配列。多くのこのような骨格は、例として説明したが、これだけに限定するものではなく、CTLA-4 (WO00/60070) をペプチドライブラリー用の骨格として使用した。

【0072】

他の実施形態では、本発明は、たとえば、リガンドを結合するための抗体Fab断片で必要とされるような、構成要素が活性のために複数の鎖を必要とするDNAライブラリーのスクリーニング方法に関する。この実施形態では、重鎖又は軽鎖抗体DNAを、たとえばrepAのDNA結合ドメインをコードしたヌクレオチド配列に結合させる。一般的に、重鎖遺伝子(VH及びCH1)又は軽鎖遺伝子(VL及びCL)のいずれかのための未知の抗体DNAライブラリー配列をrepADNAの5'領域の適切なプロモーター及び翻訳配列の後ろに挿入する。したがって、DNAライブラリー構成要素—コードされたタンパク質に融合したrepAは、そのタンパク質をコードするDNAに結合して生成される。軽鎖又は重鎖タンパク質のいずれかをコードする第2の公知の鎖は、

(a) repA及び第1のポリペプチド融合タンパク質ライブラリーを含有する同じDNA断片、又は

(b) イン・ビトロでの転写／翻訳反応に存在するDNAの別の断片のいずれかから別々に発現する。

【0073】

公知の鎖は、repAタンパク質に融合し、それによって未知鎖のDNAに結合した未知の融合タンパク質ライブラリーと関連する。機能性Fabライブラリーは、次に該抗体に特異的なリガンドによって選択することができる。

【0074】

本発明のスクリーニング方法によって同定されたDNA、たとえば選択されたライブラリー構成ペプチドをコードするDNAは、ベクターにクローニングすることができる。1実施形態では、本発明の方法によって同定されたDNAは、宿主細胞によってコーディング配列の発現をもたらすことができる制御配列に操作可能に結合しており、すなわち、該ベクターは発現ベクターである。「操作可能に」という用語は、記載した成分が企図した方法でそれらが機能するのを可能にする関係にある並列を意味する。コーディング配列に「操作可能に結合した」、たとえばプロモーターなどの調節配列は、コーディング配列の発現が該調節配列に適合した条件下で実現するように配置される。

【0075】

このような発現ベクターは、分子生物学の分野では日常的に構築されており、たとえばプラスミドDNA及び適切なイニシエーター、プロモーター及びその他の要素、たとえば、タンパク質発現を可能にするために必要で、正確な方向に配置されたポリアデニル化シグナルなどの使用に関与することができる。その他の適切なベクターは、当業者には明らかである。この点に関する他の例としては、Sambrook他、1989が参考である。

10

20

30

40

50

【0076】

該ベクターは、たとえば、複製起点、場合によっては前記DNAの発現用のプロモーター、場合によっては該プロモーターの調節因子を備えたプラスミド、ウイルス又はファージベクターであることが可能である。該ベクターは、1個又は複数の選択可能なマーカー遺伝子、たとえば、細菌プラスミドの場合はアンピシリン耐性遺伝子、又は真菌ベクターの場合は耐性遺伝子を含有することが可能である。ベクターは、たとえば、DNA又はRNA産生のため、イン・ビトロで 사용할 ことができ、或いは宿主細胞、たとえば、哺乳類宿主細胞をトランスフェクト又は形質転換するために使用することができる。該ベクターはまた、イン・ビボで、たとえば遺伝子治療法で使用するために適応させることが可能である。

10

【0077】

プロモーター及びその他の発現調節シグナルは、発現を設計するための宿主細胞に適するように選択することができる。たとえば、酵母プロモーターには、サッカロマイセスセレビシエ (*S. cerevisiae*) GAL4及びADHプロモーター、サッカロマイセスポンベ (*S. pombe*) nmt1及びadhプロモーターが含まれる。哺乳類のプロモーターには、カドミウムなどの重金属に対する応答を誘導することができるメタロチオネインプロモーターが含まれる。SV40大型T抗原プロモーター又はアデノウイルスプロモーターなどのウイルスプロモーターもまた使用することができる。これらのプロモーターは全て、当業界で容易に入手することができる。

20

【0078】

哺乳類プロモーター、たとえばβ-アクチンプロモーターを使用することができる。組織特異的プロモーターは、特に好ましい。ウイルスプロモーター、たとえば、マウスのモロニー白血病ウイルス末端反復配列 (MMLV LTR)、ラウス肉腫ウイルス (RSV) LTRプロモーター、SV40プロモーター、ヒトサイトメガロウイルス (CMV) IEプロモーター、アデノウイルス、HSVプロモーター (たとえばHSVIEプロモーター) 又はHPVプロモーター、特にHPV上流調節領域 (URR) もまた使用することができる。ウイルスプロモーターは全て、当業界で容易に入手することができる。

【0079】

該ベクターはさらに、真核細胞ゲノム配列、好ましくは哺乳類ゲノム配列、又はウイルスゲノム配列に相同な配列を含むポリヌクレオチドの元となる関心のあるポリヌクレオチドに隣接した配列を含むことができる。これによって、本発明のポリヌクレオチドを真核細胞又はウイルスのゲノムに相同組換えによって導入することが可能であろう。特に、ウイルス配列に隣接した発現カセットを含むプラスミドベクターを使用して、本発明のポリヌクレオチドを哺乳類細胞に輸送するために適したウイルスベクターを調製することができる。適切なウイルスベクターのその他の例には、レンチウイルス、アデノウイルス、アデノ関連ウイルス及びHPVウイルスが含まれる。これらのウイルスを使用した遺伝子輸送技術は当業者には公知である。たとえば、レトロウイルスベクターを使用 して、宿主ゲノムにポリヌクレオチドを生じさせるポリヌクレオチドを安定して組み込むことができる。これとは対照的に、複製欠損アデノウイルスベクターはエピソームに残存するので、一時的な発現を可能にする。

30

40

【0080】

このような発現ベクターを使用して関心のあるリガンド、すなわち、ELISAなどの標準的結合アッセイ、又は適切な基質を与えると、たとえば色変化、発光又は蛍光発光を示す酵素アッセイによってペプチドライブラリー構成要素に結合する分子を同定することができる。利用可能であれば、その他の機能的アッセイを使用することもできる。

【0081】

他の実施形態では、本発明の方法によって同定されたDNAは、非発現ベクターにクローニングすることができる。このようなベクターを使用して、さらにDNAを特徴付けること、たとえば配列決定することができる。

【0082】

50

或いは、関心のあるリガンドをクローニングせずに同定することができる。適切な方法の例には、本発明のスクリーニング方法から回収された個々のDNA配列のイン・ビトロでの発現及びこのようなスクリーニング方法から回収された個々のDNAの配列決定が含まれる。このような個々のDNA配列は場合によっては増幅することができる。

【0083】

本発明はまた、本発明の方法によって、たとえば、前述の発現ベクターを細胞に導入することによって、同定されたペプチドが発現するように改変した細胞が含まれる。このような細胞には、たとえばバキュロウイルス発現系を使用した、たとえば哺乳類細胞又は昆虫細胞などの一時的、又は好ましくは安定した高等真核細胞株、酵母などの低級真核細胞或いは細菌細胞などの原核細胞を含めることができる。特に、本発明の方法によって同定されたペプチドをコードするベクターを挿入することによって改変できる細胞の例には、哺乳類HEK293T、CHO、HeLa及びCOS細胞が含まれる。好ましくは、選択された細胞株は安定であるだけでなく、十分なグリコシル化が可能で、ペプチドの細胞表面発現が可能なものである。形質転換した卵母細胞で発現を実施することができる。本発明の方法で同定したペプチドは、トランスジェニック非ヒト動物、好ましくはマウスの細胞で発現させることができる。本発明の方法によって同定したペプチドはまた、アフリカツメガエル (*Xenopus laevis*) 卵母細胞又は黒色素胞で発現させることができる。

【0084】

本発明を完全に理解するために、以下の図を参考にして実施形態を詳細に説明するが、単に例示するにすぎず、これだけに限定するものではない。

【0085】

本発明の実施形態のいくつかの例を以下に挙げる。

【0086】

材料及び方法

本出願で使用した以下の方法、アガロースゲルでの制限酵素消化産物の分析、フェノール／クロロホルム保存溶液を使用したDNA精製、リン酸緩衝生理食塩水の調製は、前述の Sambrook、J. 他、1989に記載されている。

【0087】

一般的な試薬は、SIGMA-Aldrich Ltd (Poole, Dorset, U. K.) から購入した。オリゴヌクレオチドはSIGMA-Genosys Ltd (Cambridgeshire, U. K.) から入手した。アミノ酸、及びS30抽出物はPromega Ltd (Southampton, Hampshire, U. K.) から入手した。ディーブメント (Deep Vent) 及びTaq DNAポリメラーゼは、New England Biolabs (Cambridgeshire, U. K.) から入手した。Taqplus DNAポリメラーゼは、Stratagene Inc. (Amsterdam, Netherlands) から入手した。GeneClean DNA ゲル精製キットは、BIO101 (La Jolla, California, U. S. A.) から、抗ヒトIgκ抗体はImmunologicals Direct Ltd (Oxfordshire, U. K.) から、抗c-mycポリクローナル抗体はVector Labs Inc (Cambridgeshire U. K.) から、抗V5抗体はAbcam Ltd (Cambridgeshire U. K.) から入手した。Superblockブロック剤はPerbio Science (Cheshire, U. K.) から入手した。

【実施例1】

【0088】

特異的シス作用タンパク質-DNA複合体の精製

イン・ビトロでの発現構築物は、TACプロモーター、c-mycエピトープ、ヒトカップ定常部又はV5エピトープのいずれかをRepA-CIS-ORI領域に次々と添加し、PCR増幅することによって調製した。このような構築物は、当業者に公知の多くの

方法、たとえば異なるDNA断片を増幅した後、アセンブリーPCR (assembly) によって調製することができる。この実施例では、最初の増幅用鋳型は、RepA-CIS-ORI領域を含有するR1プラスミドであった。(Masai、H. 及びArai、K. (1988)。DNAs Res. 16、6493～6514)。

【0089】

(a) 1次増幅。RepA-CIS-ORI領域は、dNTP 0.25mM、Taq plus Precision DNAポリメラーゼ2.5単位、1xPCR反応緩衝液 (Stratagene Inc、Amsterdam、Netherlands) を含有する反応液50μl中で、プライマーREPAFOR (配列番号01) 及びORIREV (配列番号02) それぞれ12.5pmolを使用して、プラスミドR1を含むECO K12株の単一コロニーからPCR増幅した。REPAFORプライマーはRepAコーディング領域の5'末端にアニーリングする。ORIREVプライマーは非コーディングORI領域の3'末端にアニーリングする。

10

【0090】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で4分15秒を1回、94℃、45秒、60℃、45秒、72℃、45秒を30回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、Gene clean IIキットを使用して、製造者 (Bio101、La Jolla、California、U. S. A.) の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40μlに精製した。

20

【0091】

(b) 2次増幅。ゲル精製し、100倍に希釈した1次反応生成物1μl (500pg) は、dNTP 0.25mM、Taq plus Precision DNAポリメラーゼ2.5単位、1xPCR反応緩衝液 (Stratagene Inc、Amsterdam、Netherlands) を含有する反応液50μl中で、プライマーCKREPFOR (配列番号03) 及びORIREV (配列番号02) それぞれ12.5pmolを使用して再増幅した。CKREPFORプライマーは、該プライマー反応生成物の5'末端にアニーリングし、カッパ定常部DNAの3'末端に付加する。ORIREVプライマーは該プライマー反応生成物の3'末端にアニーリングする。

【0092】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で2分15秒を1回、94℃、45秒、60℃、45秒、72℃、2分を30回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、Gene clean IIキットを使用して、製造者 (Bio101、La Jolla、California、U. S. A.) の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40μlに精製した。

30

【0093】

(c) 3次増幅。ゲル精製し、100倍に希釈した1次反応生成物1μl (500pg) は、dNTP 0.25mM、Taq plus Precision DNAポリメラーゼ2.5単位、1xPCR反応緩衝液 (Stratagene Inc、Amsterdam、Netherlands) を含有する反応液50μl中で、プライマーV5REPFOR (配列番号04) 及びORIREV (配列番号02) それぞれ12.5pmolを使用して再増幅した。V5REPFORプライマーは、該プライマー反応生成物の5'末端にアニーリングし、V5エピトープの3'部分に付加する。ORIREVプライマーは該プライマー反応生成物の3'末端にアニーリングする。

40

【0094】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で2分15秒を1回、94℃、45秒、60℃、45秒、72℃、2分を30回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、Gene clean IIキットを使用して、製造者 (Bio101、La Jolla、Cali

50

f o r n i a、U. S. A.) の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40 μ lに精製した。

【0095】

(d) 4次増幅。100倍に希釈したpCKV5プラスミド1 μ l (500 pg) は、dNTP 0.25mM、Taqplus Precision DNAポリメラーゼ2.5単位、1xPCR反応緩衝液(Stratagene Inc、Amsterdam、Netherlands)を含有する反応液50 μ l中で、プライマーMYCCKFOR (配列番号05) 及びCKREV (配列番号06) それぞれ12.5 pmolを使用した。pCKV5プラスミドはヒトカップ定常部cDNA (McGregor DP、Molloy PE、Cunningham C、& Harris WJ. 1994 Mol. Immunol. 31:219~26) 及びV5エピトープDNA (Southern JA、Young DF、Heaney F、Baumgartner WK、Randall RE. 1991 J. Gen. Virol. 72:1551~7) を含有する。MYCCKFORプライマーは、カップ定常部DNAの5'末端にアニーリングし、MYCエピトープDNAの3'部分に付加する。CKREVプライマーはカップ定常部DNAの3'末端にアニーリングする。

10

【0096】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で2分15秒を1回、94℃、45秒、60℃、45秒、72℃、2分を30回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、GeneClean IIキットを使用して、製造者(Bio101、La Jolla、California、U. S. A.) の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40 μ lに精製した。

20

【0097】

(e) 5次増幅。100倍に希釈したpCKV5プラスミド1 μ l (500 pg) は、dNTP 0.25mM、Taqplus Precision DNAポリメラーゼ2.5単位、及び1xPCR反応緩衝液(Stratagene Inc、Amsterdam、Netherlands)を含有する反応液50 μ l中で、プライマーMYCV5FOR (配列番号07) 及びV5REV (配列番号08) それぞれ12.5 pmolを使用した。MYCV5FORプライマーは、V5エピトープDNAの5'末端にアニーリングし、MYCエピトープDNAの3'部分に付加する。V5REVプライマーはV5エピトープDNAの5'末端にアニーリングする。

30

【0098】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で2分15秒を1回、94℃、45秒、60℃、45秒、72℃、30秒を30回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、GeneClean IIキットを使用して、製造者(Bio101、La Jolla、California、U. S. A.) の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40 μ lに精製した。

【0099】

(f) 6次増幅。100倍に希釈したpTACP2Aプラスミド(参照) 1 μ l (500 pg) は、dNTP 0.25mM、Taqplus Precision DNAポリメラーゼ2.5単位、及び1xPCR反応緩衝液(Stratagene Inc、Amsterdam、Netherlands)を含有する反応液50 μ l中で、プライマーTAC3 (配列番号09) 及びMYCTACREV (配列番号10) それぞれ12.5 pmolを使用した。TAC3プライマーはTACプロモーターDNAの5'末端にアニーリングする。MYCTACREVプライマーは、TACプロモーターDNAの3'末端にアニーリングし、MYCエピトープDNAの5'部分に付加する。

40

【0100】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で2分15秒を1回、9

50

4℃, 45秒、60℃, 45秒、72℃, 30秒を30回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、Gene clean IIキットを使用して、製造者(Bio101、La Jolla、California、U. S. A.)の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40μlに精製した。

【0101】

(g) 1次アセンブリーPCR。(f)及び(d)の反応生成物それぞれ1μl(50ng)は、dNTP 0.25mM、TaqディープベントDNAポリメラーゼ混合物(20:1)2.5単位、及び1xPCR反応緩衝液(New England Biolabs、Beverly、MA、U. S. A.)を含有する反応液50μl中で、プライマーTAC5(配列番号11)及びCKREV(配列番号06)それぞれ50pmolを使用した。TAC5プライマーは反応生成物(f)の5'末端にアニーリングし、20個のヌクレオチドを付加する。CKREVプライマーは、反応生成物(d)の3'末端にアニーリングする。

10

【0102】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で2分15秒を1回、94℃, 45秒、60℃, 45秒、72℃, 45秒を30回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、Gene clean IIキットを使用して、製造者(Bio101、La Jolla、California、U. S. A.)の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40μlに精製した。

20

【0103】

(h) 2次アセンブリーPCR。(f)及び(e)の反応生成物それぞれ1μl(50ng)は、dNTP 0.25mM、TaqディープベントDNAポリメラーゼ混合物(20:1)2.5単位、及び1xPCR反応緩衝液(New England Biolabs、Beverly、MA、U. S. A.)を含有する反応液50μl中で、プライマーTAC5(配列番号11)及びV5REV(配列番号08)それぞれ50pmolを使用した。TAC5プライマーは反応生成物(f)の5'末端にアニーリングし、20個のヌクレオチドを付加する。該CKREVプライマーは、反応生成物(e)の3'末端にアニーリングする。

30

【0104】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で2分15秒を1回、94℃, 45秒、60℃, 45秒、72℃, 45秒を30回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、Gene clean IIキットを使用して、製造者(Bio101、La Jolla、California、U. S. A.)の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40μlに精製した。

【0105】

(i) 3次アセンブリーPCR。(b)及び(g)に溶かした反応生成物それぞれ1μl(50ng)は、dNTP 0.25mM、TaqディープベントDNAポリメラーゼ混合物(20:1)2.5単位、及び1xPCR反応緩衝液(New England Biolabs、Beverly、MA、U. S. A.)を含有する反応液50μl中で、プライマーTAC3(配列番号09)及びORIREV(配列番号02)それぞれ50pmolを使用した。TAC3プライマーは、反応生成物(g)の5'末端の下流の20個のヌクレオチドにアニーリングする。ORIREVプライマーは、反応生成物(b)の3'末端にアニーリングする。(i)の反応性生成物はTAC-MYC-CK-REPA-CIS-ORI(配列番号12)と称する。

40

【0106】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で2分15秒を1回、94℃, 45秒、60℃, 45秒、72℃, 1分を30回、その後72℃で10分を1回実

50

施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、GeneClean IIキットを使用して、製造者（Bio101、La Jolla、California、U. S. A.）の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40 μ lに精製した。

【0107】

(j) 4次アセンブリーPCR。(b)及び(h)の反応生成物それぞれ1 μ l (50 ng)は、dNTP 0.25mM、TaqディープベントDNAポリメラーゼ混合物(20:1) 2.5単位、及び1xPCR反応緩衝液(New England Biolabs、Beverly、MA、U. S. A.)を含有する反応液50 μ l中で、プライマーTAC3(配列番号09)及びORIREV(配列番号02)それぞれ50 pmolを使用した。TAC3プライマーは、反応生成物(g)の5'末端の下流の20個のヌクレオチドにアニーリングする。ORIREVプライマーは、反応生成物(b)の3'末端にアニーリングする。(i)の反応性生成物はTAC-MYC-V5-REPA-CIS-ORI(配列番号13)と称する。

10

【0108】

PCR反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で2分15秒を1回、94℃、45秒、60℃、45秒、72℃、1分を30回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、GeneClean IIキットを使用して、製造者（Bio101、La Jolla、California、U. S. A.）の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水40 μ lに精製した。

20

【0109】

イン・ビトロでの転写／翻訳反応の準備。以下のPromega細菌直線鋳型S30を組み合わせたイン・ビトロでの転写／翻訳反応キット、TAC-MYC-CK-REPA-CIS-ORI鋳型20 μ l(前記の最終構築DNA配列番号012、0.5 μ g)、完全アミノ酸ミックス20 μ l(Promega)、S30プレミックス80 μ l、S30ミックス60 μ lを使用した該反応を氷上に設置し、該反応は25℃で30分間進行させ、氷上に置き、その後ブロック緩衝液で10倍に希釈した(Superblock(Perbio Ltd)、0.1%Tween 20、ニシン精子DNA 200 μ g/ml)。

30

【0110】

DNA-タンパク質複合体捕捉。NUNCstarイムノチューブは、PBSに溶かした抗c-myc抗体、抗C5抗体、又は抗ヒトカッパ鎖抗体のいずれか10 μ g/mlで、チューブ当たり500 μ lのPBSにより終夜4℃でコーティングした。他のチューブは、陰性対照として盲検のままにした。チューブは、PBSで2回洗浄し、Superblock/PBS/0.1mg/mlニシン精子DNA/0.1%Tween 20を用いて室温で1時間ブロックし、次にPBSで2回洗浄した。希釈した転写／翻訳反応液50 μ lを各チューブに添加し、室温で1時間インキュベートした。チューブは、PBS/0.1%Tween 20で5回、次にSuperblock/PBS/0.1mg/mlニシン精子DNA/0.1%Tween 20を用いて室温で30分間1回洗浄し、次にPBSで5回洗浄した。DNAは、T.E.緩衝液300 μ l及びフェノール／クロロホルム300 μ lで5分間振盪して回収した。これを13,200gで5分間遠心して、DNAを0.5倍量の7.5M酢酸アンモニウム、グリコーゲン20 μ g及び3倍量の無水エタノールで沈殿させた。遠心後、ペレットを70%エタノールで洗浄し、真空乾燥して、水20 μ lに再懸濁した。回収したDNA 10 μ lは、TAC3(配列番号09)プライマー及びORIREV(配列番号02)プライマーを含む反応液50 μ lで再増幅した。反応生成物は、1%アガロース/TAEゲルで電気泳動した(図5)。

40

【実施例2】

【0111】

Repa-DNA複合体の分離

50

実施例1で既に説明した2種類のイン・ビトロでの発現構築物（配列番号12及び配列番号13）は、DNAを回収し、以下の方法、グリシン、トリエチルアミン、フェノール／クロロホルム、プロテインキナーゼK及びEDTAのいずれかを使用することによってRepAから遊離すること以外は、実施例1で説明した通り、抗ヒトC-カップ抗体に対する選択実験で使用した。これらの方法を以下に説明する。

【0112】

グリシン：チューブをグリシン200mM、NaCl 150mM（pH2.0）500μlで10分間インキュベートした。次に、グリシンを新しいエッペンドルフチューブに移し、2M Tris（pH8.5）50μlを添加した。

【0113】

トリエチルアミン：チューブを0.1Mトリエチルアミン500μlで10分間インキュベートし、次にトリエチルアミン溶出液を新しいエッペンドルフチューブに移し、1M Tris（pH7.4）250μlを添加した。

【0114】

フェノール／クロロホルム：前記の実施例1の通りである。

【0115】

プロテインキナーゼK：チューブをTris 100mM（pH8.0）、EDTA 10mM（pH8.0）、0.5% SDS 500μlを用いて37℃、30分間インキュベートした。次に、プロテインキナーゼK溶出液を新しいエッペンドルフチューブに移した。

【0116】

EDTA：チューブをTris 10mM（pH8.0）、EDTA 1mM NaCl 500mM 250μl及びフェノール／クロロホルム250μlで5分間インキュベートした。次に、EDTA溶出液を新しいエッペンドルフチューブに移した。

【0117】

DNAを回収した後、該DNAをフェノール／クロロホルムで抽出し、適切であれば、実施例1で説明したようにエタノール沈殿を行った。再懸濁したDNA 10μlは、TAC3（配列番号09）プライマー及びCISREV（配列番号019）プライマーを含む反応液50μlで増幅した。CISREVプライマーは、ORIREV（配列番号02）の結合部位の上流196塩基にアニーリングする。反応生成物は、1%アガロース／TAEゲルで電気泳動した（データは示さず）。構築物（配列番号12）を含有するCK-DNAのみを、ほぼ等量で増幅した。

【0118】

これは、RepAからDNAを回収し遊離するための前述の方法のいずれかを使用できることを教示するだけでなく、この結果はまた、RepAはコグネイトDNAと非共有的方法で相互作用することを示唆している。

【実施例3】

【0119】

CISディスプレイ技術を使用したV5スパイキング実験における特異的抗V5結合因子の検出

イン・ビトロでの発現構築物は、TACプロモーター及びV5エピトープ又は12マーNNBライブラリーのいずれかをRepA-CIS-ORI領域に添加し、PCR増幅することによって調製した。このような構築物は、当業者に公知の多くの方法、たとえば異なるDNA断片を増幅した後、アセンブリーPCRによって調製することができる。この実施例では、最初の増幅鑄型は、RepA-CIS-ORI領域を含有するR1プラスミドであった。（Masai、H. 及びArai、K.（1988）. Nucleic Acids Res. 16、6493～6514）。

【0120】

（a）1次増幅。RepA-CIS-ORI領域は、dNTP 0.25mM、TaqディープベントDNAポリメラーゼ混合物（20：1）2.5単位、及び1xPCR反応

10

20

30

40

50

緩衝液 (New England Biolabs, Beverly, MA, U. S. A.) を含有する反応液 50 μ l 中で、プライマー REPAFOR (配列番号 01) 及び ORIREV408 (配列番号 02) それぞれ 12.5 pmol を使用して、プラスミド R1 を含む ECOK12 株の単一コロニーから PCR 増幅した。REPAFOR プライマーは repA コーディング領域の 5' 末端にアニーリングする。ORIREV408 プライマーは非コーディング ORI 領域の 3' 末端の下流にアニーリングする。

【0121】

PCR 反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で4分30秒を1回、その後94℃, 30秒、60℃, 45秒、72℃, 1分を25回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、Gene

10

【0122】

(b) 2次増幅。100倍に希釈したゲル精製1次反応生成物1 μ l (500 pg) は、dNTP 0.25mM、Taq ディープベント DNA ポリメラーゼ混合物 (20:1) 2.5 単位、及び 1x PCR 反応緩衝液 (New England Biolabs, Beverly, MA, U. S. A.) を含有する反応液 50 μ l 中で、プライマー V5 (NNB) REPFOR (配列番号 21) 及び ORIREV408 (配列番号 20) それぞれ 12.5 pmol を使用して再増幅した。V5 (NNB) REPFOR プライマーは、1 次反応生成物の 5' 末端にアニーリングし、V5 エピトープ DNA に付加する。ORIREV408 プライマーは該プライマー反応生成物の 3' 末端にアニーリングする。

20

【0123】

PCR 反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で4分30秒を1回、94℃, 30秒、60℃, 45秒、72℃, 1分を25回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、Gene

【0124】

(c) 3次増幅。100倍に希釈したゲル精製1次反応生成物1 μ l (500 pg) は、dNTP 0.25mM、Taq ディープベント DNA ポリメラーゼ混合物 (20:1) 2.5 単位、及び 1x PCR 反応緩衝液 (New England Biolabs, Beverly, MA, U. S. A.) を含有する反応液 50 μ l 中で、プライマー NNBREPFOR (配列番号 22) 及び ORIREV408 (配列番号 20) それぞれ 12.5 pmol を使用して再増幅した。NNBREPFOR プライマーは、該プライマー反応生成物の 5' 末端にアニーリングし、無作為アミノ酸 12 マー NNB ライブラリー DNA に付加する。ORIREV408 プライマーは該プライマー反応生成物の 3' 末端にアニーリングする。

30

【0125】

PCR 反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で4分30秒を1回、94℃, 30秒、60℃, 45秒、72℃, 1分を25回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、Gene

40

【0126】

(d) 4次増幅。100倍に希釈した pTACP2A プラスミド (参考) 1 μ l (500 pg) は、dNTP 0.25mM、Taq ディープベント DNA ポリメラーゼ混合物 (20:1) 2.5 単位、及び 1x PCR 反応緩衝液 (New England Bio

50

labs、Beverly、MA、U. S. A.) を含有する反応液 50 μ l 中で、プライマー TACFARUP (配列番号 23) 及び TACREV (配列番号 27) それぞれ 12.5 pmol を使用した。TACFARUP プライマーは TAC プロモーター DNA の 5' 末端にアニーリングする。TACREV プライマーは TAC プロモーター DNA の 3' 末端にアニーリングする。

【0127】

PCR 反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で1分45秒を1回、94℃, 15秒、60℃, 30秒、72℃, 30秒を25回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、GeneClean II キットを使用して、製造者 (Bio101、La Jolla、California、U. S. A.) の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水 40 μ l に精製した。

10

【0128】

(e) 1 次アセンブリー PCR。(b) 及び (d) の反応生成物それぞれ 1 μ l (50 ng) は、dNTP 0.25 mM、Taq ディープベント DNA ポリメラーゼ混合物 (20:1) 2.5 単位、及び 1x PCR 反応緩衝液 (New England Biolabs、Beverly、MA、U. S. A.) を含有する反応液 50 μ l 中で、プライマー TACFARUP (配列番号 23) 及び ORIREV408 (配列番号 20) それぞれ 50 pmol を使用した。TACFARUP プライマーは、反応生成物 (d) の 5' 末端にアニーリングする。ORIREV480 プライマーは、反応生成物 (b) の 3' 末端にアニーリングする。(e) の反応性生成物は TAC-V5-REPA-CIS-ORI-408 (配列番号 24) と称する。

20

【0129】

PCR 反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で45秒を1回、94℃, 15秒、60℃, 30秒、72℃, 1分30秒を25回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、GeneClean II キットを使用して、製造者 (Bio101、La Jolla、California、U. S. A.) の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水 40 μ l に精製した。

【0130】

30

(f) 2 次アセンブリー PCR。(c) 及び (d) の反応生成物それぞれ 1 μ l (50 ng) は、dNTP 0.25 mM、Taq ディープベント DNA ポリメラーゼ混合物 (20:1) 2.5 単位、及び 1x PCR 反応緩衝液 (New England Biolabs、Beverly、MA、U. S. A.) を含有する反応液 50 μ l 中で、プライマー TACFARUP (配列番号 23) 及び ORIREV408 (配列番号 20) それぞれ 50 pmol を使用した。TACFARUP プライマーは、反応生成物 (d) の 5' 末端にアニーリングする。ORIREV480 プライマーは、反応生成物 (c) の 3' 末端にアニーリングする。

【0131】

PCR 反応は、エッペンドルフマスターサイクラーで、94℃で1分45秒を1回、94℃, 15秒、60℃, 30秒、72℃, 1分30秒を25回、その後72℃で10分を1回実施した。反応生成物は、アガロースゲル上で電気泳動して、ゲルを切り出し、GeneClean II キットを使用して、製造者 (Bio101、La Jolla、California、U. S. A.) の指示に従って、生成物をゲルから滅菌水 40 μ l に精製した。(f) の反応生成物は TAC-NNB-REPA-CIS-ORI-408 (配列番号 25) と称する。

40

【0132】

イン・ビトロでの転写／翻訳反応物の調製。Promega 細菌線型 S30 を組み合わせた以下のイン・ビトロでの転写／翻訳反応キット、5000 倍希釈した TAC-V5-REPA-CIS-ORI-408 鋳型 (0.1 ng

50

の前記の最終構築物DNA配列番号24) 20 µl

TAC-NNB-REPA-CIS-ORI-408 鋳型 (0.5 µg の前記の最終構築物DNA配列番号25) 20 µl

完全アミノ酸ミックス (Promega) 20 µl

S30 プレミックス 80 µl

S30 ミックス 60 µl

を使用して反応装置を氷上に設置し、該反応は、25℃で30分間進行させ、氷上に置き、次に2% Marvel/PBS で10倍に希釈した。

【0133】

DNA-タンパク質複合体捕捉。NUMCstar イムノチューブは、PBS 500 µl に溶かした抗V5抗体10 µg/ml、4℃で一晩コーティングした。もう1本のチューブは陰性対照として盲検のままにした。チューブをPBSで2回洗浄し、ブロッキング緩衝液 (2% Marvel、0.1% Tween 20、0.1 mg/ml ニシン精子DNA) で室温で1時間ブロックし、次にPBSで2回洗浄した。希釈した転写/翻訳反応液1 ml を各チューブに添加し、室温で1時間インキュベートした。チューブをPBS/0.1% Tween 20 で5回、次いでPBSで5回洗浄した。DNAはTE緩衝液500 µl 及びフェノール/クロロホルム500 µl で回収した。これを13,200 g で5分間遠心して、DNAを1/10量の3M酢酸ナトリウム、グリコーゲン50 µg/ml 及び2倍量の無水エタノールで沈殿させた。遠心後、ペレットを70%エタノールで洗浄し、真空乾燥し、水40 µl に再懸濁した。回収したDNA 20 µl をビオチン化プライマーbTAC6 (配列番号26) 及びbCISREV (配列番号19) を含む反応液50 µl で再増幅した。反応生成物は、1% アガロース/TAEゲルで電気泳動した。

【0134】

回収したDNAの発現ベクターpDMG-K (配列番号27) へのクローニング。反応生成物はゲル精製して、QIAquickゲル抽出キット (QIAGEN Ltd West Sussex, U.K.) を使用して製造者の指示に従って滅菌水50 µl で溶出した。精製した反応生成物とプラスミドpDMG-Kの両者をNcoI及びNotI 20単位で消化した。(New England Biolabs, Beverly, MA, U.S.A.)。切断したプラスミドをQIAquickゲル抽出キット (QIAGEN Ltd West Sussex, U.K.) を使用して製造者の指示に従ってゲル精製し、次にウシ腸アルカリホスファターゼ (Promega, Southampton, U.K.) 0.01単位で処理し、次にフェノール/クロロホルム抽出し、前記のようにエタノール沈殿させた。沈殿したDNAを水20 µl に溶解した。切断したPCR生成物は、1xTBS、BSA 0.3 mg/ml、0.1% Tween 20 中のストレプトアビジンコーティングした細片 (Roche Diagnostics Ltd, East Sussex, U.K.) に移し、室温で振盪しながら30分間インキュベートした。この取り組みによって、PCR生成物のNcoI及びNotI部位の上流又は下流に隣接するビオチン化DNAが除去され、選択したペプチド配列を含有する小DNA断片の回収が可能になる。上清をフェノール/クロロホルム抽出し、前述のようにエタノール沈殿させた。沈殿したDNAを水10 µl に溶解した。切断したプラスミド及びNcoI及びNotI オーバーハングの両者を有する選択したペプチド配列を含有する単離小DNA断片はQuick連結キット (New England Biolabs, Beverly, MA, U.S.A.) を使用して製造者の指示に従って連結し、次にフェノール/クロロホルム抽出し、前述のようにエタノール沈殿させた。沈殿したDNAを水10 µl に溶解し、製造者の指示に従ってエレクトロコンピテントTG1細胞にエレクトロポレーションし、2xTY、アンピシリン100 µg/ml、及び2% グルコースを有するプレートで選択した。

【0135】

選択したクローンの抗V5抗体ELISAスクリーニング。88個のクローンを2xTY、2% グルコース及びアンピシリン100 µg/ml、400 µl に採取し、300 r

10

20

30

40

50

pmで振盪しながら37℃で一晩増殖させた。一晩培養したもの50μlを2xTY、2%グルコース及びアンピシリン100μg/ml、1mlに移し、300rpmで振盪しながらOD0.5になるまで増殖させた。次に細胞を1000xgで10分間遠心した。上清を廃棄し、ペレットを2xTY、0.4Mスクロース、アンピシリン100μg/ml及びIPTG 1mM、600μlに再懸濁し、300rpmで37℃で4時間増殖させた。インキュベーション後、細胞を1000xgで10分間遠心した。上清150μlをELISA試験で使用した。NUNC Maxisorpプレートを1xPBSに溶かした抗ヒトカッパ領域抗体又は抗V5抗体1μg/ml又はBSA 50μg/ml、100μl、室温で7時間コーティングした。もう1枚のプレートは盲検用に残し、PBSのみでコーティングした。ウェルはPBSで2回洗浄し、その後1xPBSに溶かした4%Marvel、0.1%Tween 300μlで室温で1時間ブロックした。ウェルをPBSで2回洗浄し、次に上清150μl及び1xPBSに溶かした4%Marvel、0.1%Tween 20、150μlをウェルに添加し、室温で1時間インキュベートした。次にウェルをPBS、0.1%Tween 20で2回、PBSで2回洗浄した。西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)に結合させた2次抗体抗ヒトカッパ領域抗体(最終濃度1.6μg/ml)を4%Marvel、0.1%Tween 20、1xPBSで500倍に希釈し、ウェルに添加して、室温で1時間インキュベートした。次にウェルをPBS、0.1%Tween 20で4回、PBSで2回洗浄した。HRPシグナルはTMB基質を200μl添加することによって検出した。反応は0.5M硫酸100μlで停止させた。吸光度は450nmで読み取った。88個のクローンのうち35個は、抗ヒトカッパ領域抗体に対するスクリーニングで明瞭に判定できるクローンのHRPシグナルを示した。これら35個のクローンのうち7個は、抗V5抗体に特異的な結合性を示したので、V5ペプチドの濃縮は5000分の1から5分の1に、すなわち濃縮係数は1000になった(図6)。

【実施例4】

【0136】

CISディスプレイライブラリーの構築。バシルス グロビギ(Bacillus globigii)による選択及びスクリーニング
ライブラリー構築

ライブラリーDNAを作製するためには、プロモーターライブラリーDNA断片及びRepA-CIS-ori断片を作製し、次に消化連結によって一緒に結合しなければならない。P2A-HAベクターのtacプロモーターをこの実施例で使用したが、多くの利用可能なプロモーターを使用することができ、当業者には周知である。Rep-CIS-oriの最初のPCR及びTAC断片をBsp120I部位及びランダムライブラリー/NotI部位それぞれに付加する。2つのマスターミックスを調製した。

【0137】

1:50に希釈したP2A-HAプラスミドDNA(25ng/反応液)10μlは、dNTP 200μM、1xNEBポリメラーゼ増幅緩衝液(KCl 10mM、(NH₄)₂SO₄ 10mM、20mM Tris-HCl pH8.8、MgSO₄ 2mM、0.1%TritonX-100)を含有し、94℃、40秒、60℃、40秒、72℃、60秒を25回、その後72℃で5分間伸長するためのTACFARUP(配列番号23)プライマー及びNTERM18MER(配列番号28)プライマーそれぞれ10pmol並びにTaqDNAポリメラーゼ:ディープベントポリメラーゼ20:1混合物(NEB)2単位を含む反応量20x50μlでPCR増幅した。反応生成物20μlは1%アガロース/TAEゲルで電気泳動して撮影し、一方残りはQIAGENカラムで水200μlに精製した。

【0138】

Bsp120I修正Rep-CIS-oriDNA(50ng/反応液)10μlは、dNTP 200μM、1xNEBポリメラーゼ増幅緩衝液(KCl 10mM、(NH₄)₂SO₄ 10mM、20mM Tris-HCl pH8.8、MgSO₄ 2m

M、0.1% Triton X-100) を含有し、94℃、40秒、60℃、40秒、72℃、90秒を25回、その後72℃で5分間伸長するためのBSPREPAFOR（配列番号29）プライマー及びORIREV（配列番号02）プライマーそれぞれ10 pmol 並びに Taq DNAポリメラーゼ：ディープベントDNAポリメラーゼ20：1混合物（NEB）2単位を含む反応量10x50μlでPCR増幅した。反応生成物20μlは1%アガロース／TAEゲルで電気泳動して撮影し、一方残りはQIAGENカラムで水120μlに精製した。

【0139】

次にライブラリー-TAC生成物をNotI（NEB）（100u）10μlで反応量300μl中、37℃で1時間消化し、次いでQiaGenカラムで水120μlに精製した。次に、制限連結によってこの2種類の生成物を以下のように結合した。

10

【0140】

【表1】

10xNEB 緩衝液4	17μl
100mM ATP (SIGMA)	15μl
10mg/ml アセチル化 BSA (NEB)	1μl
RepA DNA	40μl
TAC-ライブラリー DNA	40μl
Bsp120I (10u/μl Fermentas)	5μl
NotI (10u/μl NEB)	5μl
T4 DNA リガーゼ (400u/μl NEB)	5μl
水	39μl

20

【0141】

反応は、37℃で2時間実施した。20μlをゲル電気泳動で評価し、30μlは10x50μl反応液で直接PCR増幅し、残りはゲル精製して、ライブラリーのバンドを切り出し、QiaGenカラムで精製して、プライマーTACFAR4（配列番号30）及びORIREV（配列番号02）を含む20x50μl反応液で、94℃、40秒、60℃、40秒、72℃、90秒を30回、その後72℃で5分間伸長してPCR増幅した。DNAは4本のQiaGenカラムでゲル精製し、溶出液200μlをITT反応／選択用に収集した。

30

【0142】

1回目の選択

2x200μl ITT反応を設定し、室温で以下のように1時間インキュベートした。

40

【0143】

【表 2】

反応	1
ライブラリー DNA	56 μ l (7 μ g)
2.5x 緩衝液	80 μ l
100mM メチオニン	2 μ l
S30 抽出物	60 μ l

10

【0144】

ブロック緩衝液 1 ml を各反応液（ブロック緩衝液は、4% Marvel、剪断サケ精子 DNA 100 μ g/ml、0.1% Tween 20、ヘパリン 2.5 mg/ml の TBS 溶液）に添加し、10,000 g で 2 分間遠心し、新しいチューブに移し、その後氷上に置いた。

【0145】

バシラス グロビギ (*Bacillus globigii*) (Bg) の孢子懸濁液 100 μ l を TBS/0.1% Tween 20 1 ml で 2 回洗浄し、ブロック緩衝液 100 μ l に再懸濁した。次に、これをブロック緩衝液に添加し、混合しながら室温で 1 時間

20

【0146】

次にこの混合物を 16,100 g で 1 分間遠心して、孢子ペレットは遠心前にピペットで混合しボルテックスすることによって TBS/0.1% Tween 20 で 6 回洗浄した。該ペレットを最後に TBS 1 ml で洗浄し、上清を廃棄した。

【0147】

DNA は、0.5 M 酢酸ナトリウム pH 5.5 120 μ l 中で該孢子を 10 分間ミキサー上でインキュベートすることによって溶出した。該孢子は 16,100 g で 1 分間遠心し、上清は Tris pH 8.0 120 μ l を添加することによって中和し、次にフェノール/CHCl₃ で 16,100 g で 5 分間抽出した。DNA は、担体グリコーゲン 20 μ g 及び 2.5 倍量のエタノールで沈殿させた。DNA は 16,100 g で 20 分間でペレットにして、該ペレットを 70% エタノール 0.75 ml で 3 回洗浄して、各洗浄の間に 16,100 g で 3 分間遠心し、次に空気乾燥して、水 20 μ l に再懸濁した。

30

【0148】

回収した DNA 10 μ l は、94°C、40 秒、60°C、40 秒、72°C、90 秒を 30 回、その後 72°C で 5 分間伸長するためのプライマー C I S R E V（配列番号 19）及び T A C F A R 5（配列番号 31）並びに Taq DNA ポリメラーゼ：ディープベント DNA ポリメラーゼ 20:1 混合物（NEB）2 単位を含む 10 x 50 μ l 反応液で PCR 増幅した。該 DNA を精製し、エタノールで沈殿させ、水 10 μ l に再懸濁した。5 μ l は、前記の条件を使用するが、プライマー N O T R E C R E V 2（配列番号 32）及び T A C F A R 5（配列番号 31）を使用して 10 回 PCR することによってさらに増幅した。該生成物を Qiagen PCR 精製キットを使用して精製し、5 mM Tris pH 8.0 50 μ l に溶出した。

40

【0149】

制限-連結

これは、反応液 30 μ l で 37°C で 1 時間実施し、さらに選択を重ねるために RepA-C I S-o r i DNA を回収したペプチドに再度結合させた。

【0150】

【表 3】

10xNEB 緩衝液 4	3 μ l
100mM ATP (SIGMA)	1.5 μ l
10mg/ml アセチル化 BSA (NEB)	0.3 μ l
RepA DNA	2 μ l
TAC-ライブラリー DNA	10 μ l
Bsp120I (10u/ μ l Fermentas)	1.5 μ l
NotI (10u/ μ l NEB)	1.5 μ l
T4 DNA リガーゼ (400u/ μ l NEB)	1.5 μ l
水	8.7 μ l

10

【0151】

20 μ l は、プライマー TACFAR5. 1 (配列番号 33) 及び ORIREV (配列番号 02) を有する 10 x 50 μ l 反応液で直接、94℃, 40 秒、60℃, 40 秒、72℃, 90 秒を 20 回、その後 72℃ で 5 分間伸長して PCR 増幅した。DNA は 1 Qiagen カラムでゲル精製し、溶出液は 2 回目の ITT 反応／選択用に使用した (R2 では 58 μ l を使用した)。

20

【0152】

2 回目

2 回目の選択は、1 回目のように実施したが、以下の通り変更した。投入した DNA の約 3 μ g を使用した。ブロック緩衝液は、TBS に溶かした 2% ウシ血清アルブミン、1% ゼラチン、剪断サケ精子 DNA 100 μ g/ml、ヘパリン 2.5 mg/ml であった。各選択では、洗浄胞子 10 μ l を使用した。回収 PCR では、TACFAR5. 2 (配列番号 34) プライマー及び NOTRECREV2 (配列番号 32) プライマーを使用した。最後に、TACFAR5. 2 (配列番号 34) プライマー及び ORIREV (配列番号 02) プライマーを 10 回使用した PCR を行った。

30

【0153】

3 回目

3 回目の選択は、2 回目のように実施したが、以下の通り変更した。投入 DNA は約 2.5 μ g 使用した。回収 PCR では、TACFAR6 (配列番号 35) プライマー及び NOTRECREV2 (配列番号 32) プライマーを使用した。最後に、TACFAR6 (配列番号 35) プライマー及び ORIREV (配列番号 02) プライマーを 10 回使用した PCR を行った。

【0154】

4 回目

4 回目は、選択用に投入 DNA 約 2 マイクログラムを使用したこと以外は 3 回目のように実施した。回収 PCR では、TAC3 (配列番号 09) プライマー及び NOTRECREV2 (配列番号 32) プライマーを使用した。最後に、TAC3 (配列番号 09) プライマー及び ORIREV (配列番号 02) プライマーを 10 回使用した PCR を行った。

【0155】

5 回目

5 回目は 4 回目のように実施した。

【0156】

NcoI - NotI 断片をクローニングするために、5 回目から回収した保存 DNA を

40

50

ビオチン化TAC6（配列番号26）プライマー及びNOTRECREV2（配列番号32）でPCR増幅した。NotIで消化した後、Qiagen PCR精製キットを使用して精製し、NcoIで消化した後ストレプトアビジンでコーティングしたプレートでインキュベートした。フェノール/CHCl₃精製及びエタノール沈殿後、消化したDNAを同様に消化したpVIIIFaージミドベクターに連結し、ER2738大腸菌（E. coli）に形質転換し、2%グルコース、2xTY、アンピシリン100 µg/mlプレートに播種し、37℃で一晩インキュベートした。

【0157】

個々のコロニーを2%グルコース、2xTY、アンピシリン100 µg/ml培地200 µlを入れた96ウェルプレートに採取し、37℃/200 rpmで6時間増殖させた。100 µlを、2%グルコース、2xTY、アンピシリン100 µg/mlを100 µl及びウェル当たりM13K07ヘルパーファージ10 µlを含有するウェルの深いプレートに移し、振盪せずに37℃で1時間インキュベートした。ウェル当たり2xTY、アンピシリン100 µg/ml、カナマイシン25 µg/ml、20 µM IPTG培地500 µlを添加し、インキュベーションは37℃/200 rpmで一晩実施した。

【0158】

ELISAスクリーニング

丸底96ウェルプレートにTBS/0.1%Tween20のPBS溶液に溶かした4%Marvelで室温で1時間ブロックした。採取したファージ培養物を3000 gで5分間遠心して、ファージ上清をELISAでアッセイした。各ウェルで、ファージ上清50 µlを4%ウシ血清アルブミン、1%ゼラチンのTBS溶液50 µlに溶かしたBg孢子5 µlと混合し、振盪しながら室温で1時間インキュベートした。4%牛血清アルブミン、1%ゼラチンのTBS溶液に溶かした西洋ワサビペルオキシダーゼ結合抗M13抗体0.2 µg/mlでインキュベーションする前に、該ウェルをTBS/0.1%Tween20 200 µlで、洗浄それぞれの間に3000 gで5分間遠心することによって5回洗浄した。孢子は室温で1時間振盪しながらインキュベートした。次に、ウェルをTBS/0.1%Tween20で5回洗浄し、孢子を新しいプレートに移した。次に、孢子をTMB基質で発色させる前に前述のようにTBSで1回洗浄した。発色は0.5M H₂SO₄で停止し、該溶液を新しい平底プレートに移し、450 nmで読み取った。選択したペプチドの結合データを図7に示す。

【実施例5】

【0159】

CISディスプレイライブラリーの構築、抗V5抗体による選択及びスクリーニング

ライブラリー構築は実施例4で説明したように実施した。

【0160】

1回目の選択

1x200 µlのイン・ビトロでの転写/翻訳反応液（ITT）反応液を設定して、実施例4で説明したように室温で1時間インキュベートした。ブロック緩衝液1 mlを各反応液（ブロック緩衝液は、5%脱脂粉乳、剪断サケ精子DNA 100 µg/ml、ヘパリン2.5 mg/mlのTBS溶液）に添加し、その後氷上に置いた。

【0161】

第1回目ライブラリー選択のために、70x11 mm NUNC Maxisorpイムノチューブ（Life Technologies、Paisley、Scotland U.K.）をPBSに溶かした抗V5ペプチドポリクローナル抗体（Harlan-Seralab）10 µg/mlの1 mlを用いて、37℃で1時間コーティングした。該チューブをPBSで3回洗浄し（注いでは捨てる）、ブロック緩衝液3 mlを用いて37℃で1時間ブロックして、前記のように洗浄した。ブロック緩衝液に溶かしたライブラリータンパク質-DNA複合体を添加し、室温で1時間静置してインキュベートした。該チューブをPBS/0.1%Tween20で5回洗浄し、その後PBSのみでさらに5回洗浄した。

【0162】

DNAをブラッドミキサー上で1M酢酸ナトリウムpH5.2 500 µlに10分間溶出し、1M Tris-HCl pH8.0 100 µlを用いて中和し、その後フェノール/CHCl₃を用いて16, 100 gで5分間抽出した。DNAは、担体グリコーゲン20 µg、1/2倍量の7.5M酢酸アンモニウム及び3倍量のエタノールで沈殿させた。DNAは16, 100 gで20分間かけてペレットにして、該ペレットを70%エタノール0.5 mlで、16, 100 gで5分間洗浄して、真空乾燥して、水20 µlに再懸濁した。

【0163】

回収したDNA 10 µlは、94℃, 40秒、60℃, 40秒、72℃, 90秒を30回、その後72℃で5分間伸長するためのプライマーNOT1RECREV2（配列番号32）及びTACFAR4（配列番号30）並びにTaq DNAポリメラーゼ：ディープベントDNAポリメラーゼ20：1混合物（NEB）2単位を含む1x50 µl反応液でPCR増幅した。反応生成物50 µlを1%アガロース/TAEゲルで電気泳動し撮影して、次にGeneCleanで水10 µlに精製した。DNAはRepADNAに再結合して、実施例4で説明したようにTACFAR5プライマー（配列番号31）及びORIREVプライマー（配列番号02）を使用して2回再増幅した。

【0164】

2回目の選択は、実施例4で説明したのと同じプライマーの組み合わせを使用して、以下の変更を加えて1回目のように実施した。抗V5抗体コーティング濃度は5 µg/mlに減少させた。投入したDNAは約4 µgであった。3回目の選択は、2回目のように実施したが、以下の通り変更した。投入DNAは約4 µgを使用した。回収PCRでは、TACFAR5.1（配列番号33）プライマー及びNOTRECREV2（配列番号32）プライマーを使用した。最後に、TACFAR6（配列番号35）プライマー及びORIREV（配列番号02）プライマーを10回使用したPCRを行った。4回目は3回目のように実施した。

【0165】

NcoI-NotI断片としてクローニングするために、4回目から回収した保存DNAをビオチン化（配列番号26）TAC6プライマー及びNOTIREPRECREV2（配列番号32）プライマーでPCR増幅し、pV111ファージミドベクターにクローニングして、実施例4で説明したようにエレクトロコンピテントTG-1大腸菌（E. coli）にエレクトロポレートした。

【0166】

個々のコロニーを2%グルコース、2xTY、アンピシリン100 µg/ml培地200 µlを入れた96ウェルプレートに採取し、37℃/200 rpmで6時間増殖させた。100 µlを、2%グルコース、2xTY、アンピシリン100 µg/ml、100 µl及びウェル当たり10⁹ krのM13K07ヘルパーファージを含有するウェルの深いプレートに移し、振盪せずに37℃で1時間インキュベートした。ウェル当たり2xTY、アンピシリン100 µg/ml、カナマイシン25 µg/ml、20 µM IPTG培地400 µlを添加し、ファージ増幅は200 rpmで振盪しながら37℃で16時間継続した。細菌培養をベンチトップ遠心機においてマイクロタイタープレートキャリアで4℃で2000 gで10分間回転させ、細菌をペレットにして、培養上清をELISA用に使用した。

【0167】

NUNC Maxisorp ELISAプレートは、PBS 100 µl/ウェルに溶かした抗V5ペプチド抗体100 ng/ウェルで37℃で1時間コーティングした。該プレートはPBS 200 µl/ウェルで2回洗浄し、2%BSA/PBS 200 µl/ウェルで37℃で1時間ブロックし、次にPBS 200 µl/ウェルで2回洗浄した。ファージ培養上清50 µlを50 µl/ウェルの4%BSA/PBSを含有する各ウェルに添加し、室温で1時間結合させた。該プレートは、PBS/0.1%Tween20

10

20

30

40

50

200 μ l / ウェルで2回、次いでPBS 200 μ l / ウェルで2回洗浄した。結合したファージは、2% BSA / PBSで1:5000に希釈した抗M13-HRP複合体 (Amersham-Pharmacia) 100 μ l / ウェルで室温で1時間検出し、前記のように該プレートを4回洗浄した。該プレートは、TMB (3, 3', 5, 5'-テトラメチルベンジジン) 基質緩衝液100 μ l / ウェルで室温で5分間発色させた。反応は0.5 N H₂SO₄ 100 μ l / ウェルで停止させ、450 nmで読み取った。次に、ELISA陽性クローンのファージミドDNAは、標準的なpUCフォワードプライマー及びリバースプライマーで配列決定した。単離したこれらクローンのアミノ酸配列を以下に示す。4個のELISA陽性クローンを培養量10 mlで増殖させ、ファージ粒子をPEG-NaClで沈殿させ、PBS 1 mlに再懸濁して、50 μ lを前記のようにELISAで再試験した。抗V5抗体及び対照抗ACTHペプチド抗体に対するOD450 nmのシグナルを図8に示す。

10

【0168】

選択後に単離されたペプチド配列

P1C12 (配列番号36) CGCPTMAARVRPVLNSKH

P2H1 (配列番号37) MTTVPVLMISV

P1B5 (配列番号38) T L S T R H H N V I D R F N L R N F

P2B8 (配列番号39) S I R T L T G S T P A Q F D A T A D

【実施例6】

【0169】

20

CISディスプレイライブラリーからのオボアルブミン結合ペプチドの選択

いずれの選択方法についても、重要なことは、選択及びスクリーニングの最中に、関与した担体分子とは関係なく、選択物が選択した標的に結合できることである。この実施例では、標的結合の確認を可能にするために選択ペプチドを選択し、合成する。無作為な12量体 (12mer) ペプチドライブラリーの構築は、実施例3で説明したように実施する。実施例4で説明したように、オボアルブミン (SIGMA、Dorset、UK) 100 μ g / mlでコーティングしたイムノチューブで選択を4回実施した。

【0170】

NcoI-NotI断片としてクローニングするために、実施例4で説明したように、4回目から回収したDNAをビオチン化TAC6プライマー (配列番号26) 及びNOTI REPRECREV2プライマー (配列番号32) でPCR増幅し、pVIIIFファージミドベクターにクローニングして、エレクトロコンピテントTG-1大腸菌 (E. coli) にエレクトロポレートした。

30

【0171】

個々のコロニーを2% グルコース、2xTY、アンピシリン100 μ g / ml培地200 μ lの入った96ウェルプレートに採取し、37℃ / 200 rpmで6時間増殖させた。100 μ lを2% グルコース、2xTY、アンピシリン100 μ g / ml、100 μ l及び10⁹ krU M13K07ヘルパーファージ / ウェルを含有するディープウェルプレートに移し、振盪せずに37℃で1時間インキュベートした。ウェル当たり2xTY、アンピシリン100 μ g / ml / カナマイシン25 μ g / ml / 20 μ M IPTG培地400 μ lを添加し、ファージ増幅を200 rpmで振盪しながら37℃で16時間継続した。培養した細菌をベンチトップ遠心機中、マイクロタイタープレートキャリアで4℃、2000 gで10分間遠心して、細菌をペレットにして、培養上清をELISA用に使用した。

40

【0172】

NUNC Maxisorp ELISAプレートは、PBS 100 μ l / ウェルに溶かしたオボアルブミン100 μ g / ウェルを用いて4℃で1晩コーティングした。該プレートは200 μ l / ウェルのPBSで2回洗浄し、2% BSA / PBS、200 μ / ウェルを用いて37℃、1時間ブロックし、次に200 μ l / ウェルのPBSで2回洗浄した。4% BSA / PBS 50 μ l / ウェルを含有する各ウェルにファージ培養上清50

50

μlを添加し、室温で1時間結合させた。該プレートは、PBS/0.1%Tween 20 200 μl/ウェルで2回、次いでPBS 200 μl/ウェルで2回洗浄した。結合したファージは、2%BSA/PBSを用いて1:5000に希釈した抗M13-HRP複合体 (Amersham-Pharmacia) 100 μl/ウェルを用いて室温で1時間検出し、前記のように該プレートを4回洗浄した。該プレートは、TMB (3, 3', 5, 5'-テトラメチルベンジジン) 基質緩衝液 100 μl/ウェルを用いて室温で5分間発色させた。反応は0.5N H₂SO₄ 100 μl/ウェルで停止させ、450 nmで読み取った。次に、ELISA陽性クローンのファージミドDNAは、M13 RE Vプライマーで配列決定した。単離したこれらのクローンのアミノ酸配列を以下に示す。

10

【0173】

C1 (配列番号40) ANLWRIVLHGWW
 C4 (配列番号41) VSFMLLGPHRR
 C6 (配列番号42) LVLHWLSLGSR
 C8 (配列番号43) SNQVVLILHLRP
 対照 (配列番号44) AESWLHQSWIHL

【0174】

4種類の代表的なELISA陽性クローンのペプチド配列を合成し (SIGMA-Genosys Ltd)、ELISAで検出するためにC末端にビオチンを添加した。これらのペプチドは、B. グロビギ胞子に対するファージディスプレイ選択によって既に単離した対照ペプチドと共に、ELISAでオボアルブミンについて試験した。NUNC Maxisorp ELISAプレートをPBS 100 μl/ウェルに溶かしたオボアルブミン 100 μg/ウェル又はPBSに溶かした抗V5ポリクローナル抗体 200 ng/ウェルを用いて4℃で一晩コーティングした。該プレートをPBS 200 μl/ウェルで2回洗浄し、2%脱脂粉乳/PBS 200 μl/ウェルで37℃で1時間ブロックして、次にPBS 200 μl/ウェルで2回洗浄した。希釈したペプチド 1 μgを2%BSA/PBS 100 μl/ウェルで各ウェルに添加し、室温で1時間結合させた。該プレートをPBS/0.1%Tween 20 200 μl/ウェルで2回洗浄し、次いでPBS 200 μl/ウェルで2回洗浄した。結合したペプチドを、2%BSA/PBSで1:2000に希釈したストレプトアビジン-HRP複合体 (Pierce) 100 μl/ウェルを用いて室温で1時間検出して、該プレートを前記のように4回洗浄した。該プレートをTMB (3, 3', 5, 5'-テトラメチルベンジジン) 基質緩衝液 100 μl/ウェルを用いて室温で5分間発色させた。この反応は、0.5N H₂SO₄ 100 μl/ウェルで停止し、450 nmで読み取った (図9)。

20

30

【実施例7】

【0175】

CISディスプレイ系における1本鎖Fv抗体 (scFv) 断片のディスプレイ

tac-scFv-RepA-CIS-ori構築物は、本質的に実施例1で既に説明したようにPCR重複伸長によって構築した。抗mecoprop scFv DNA (Haptogen Ltd, Aberdeen, UK) は、dNTP 200 μM、1x NEBポリメラーゼ増幅緩衝液 (KCl 10 mM、(NH₄)₂SO₄ 10 mM、20 mM Tris-HCl pH 8.8、MgSO₄ 2 mM、0.1% Triton X-100) を含有し、94℃、40秒、60℃、40秒、72℃、80秒を30回、その後72℃で5分間伸長するためのTACMECOFOR (配列番号45) プライマー及びREPAMECOBAK (配列番号46) プライマーそれぞれ10 pmol並びにTaq DNAポリメラーゼ：ディープベントDNAポリメラーゼ20:1混合物 (NEB) 2単位を含む反応量 50 μl x 20でPCR増幅した。生成物は1%アガロース/TAEゲルで電気泳動し、GeneClean IIキットで水20 μlに精製した。これは、94℃、40秒、60℃、40秒、72℃、80秒を30回、その後72℃で5分間伸長するためのTAC3 (配列番号09) プライマー及びORIREV (配列番号02) プライマーそ

40

50

れぞれ10 pmol並びにTaq DNAポリメラーゼ：ディープベントDNAポリメラーゼ20：1混合物（NEB）2単位を含むdNTP 200 μM、1xNEBポリメラーゼ増幅緩衝液（KCl 10mM、(NH₄)₂SO₄ 10mM、20mM Tris-HCl pH8.8、MgSO₄ 2mM、0.1% Triton X-100）を含有する反応量50 μl中で、ORIREV408（配列番号20）及びMECOREPAFOR（配列番号47）で作製したRepA-CIS-ori DNA並びにTACFARUP（配列番号23）及びMECOTACBAK（配列番号48）で作製したTacプロモーターDNAと組み合わせた。生成物は1%アガロース／TAEゲルで電気泳動し、GeneClean IIキットで水20 μlに精製した。

【0176】

DNAは、94℃、40秒、60℃、40秒、72℃、80秒を30回、その後72℃で5分間伸長するためのTAC3（配列番号09）プライマー及びORIREV（配列番号02）プライマーそれぞれ10 pmol並びにTaq DNAポリメラーゼ：ディープベントDNAポリメラーゼ20：1混合物（NEB）を2単位を含むdNTP 200 μM、1xNEBポリメラーゼ増幅緩衝液（KCl 10mM、(NH₄)₂SO₄ 10mM、20mM Tris-HCl pH8.8、MgSO₄ 2mM、0.1% Triton X-100）を含有する反応量50 μlで再増幅した。生成物は1%アガロース／TAEゲルで電気泳動し、GeneClean IIキットで水100 μlに精製した。

【0177】

次に、ScFv DNAを以下の2種類の反応条件で翻訳した。

【0178】

【表4】

反応	1	2
Tac-ScFv-RepA DNA	28μl (1μg)	28μl (1μg)
2.5x 緩衝液	40μl	40μl
10mM メチオニン	1μl	1μl
H ₂ O	1μl	-
S30 抽出物	30μl	30μl

【0179】

反応は、30℃で30分インキュベートし、次に0.25Mオキシグルタチオン1 μlを反応2に添加し、30℃でさらに30分インキュベーションを継続した。ブロック緩衝液1 mlを各反応液に添加し（ブロック緩衝液は1%ゼラチン、剪断サケ精子DNA 100 μg/ml、ヘパリン2.5 mg/mlのTBS溶液である）、10,000 gで2分間回転させ、その後氷上に置いた。

【0180】

NUNC starイムノチューブは、BSA-mecoprop複合体10 μg/ml、0.5 ml又はPBSに溶かしたBSA 10 μg/mlで37℃で1時間コーティングした。チューブはPBSで2回洗浄し、次にブロッキング緩衝液3 mlを用いてブラッドミキサー上、室温で1時間ブロックし、次にチューブをPBSで2回洗浄した。

【0181】

希釈した各ITT 0.5 mlをブロックしたBSAコーティング又はBSA-mecopropコーティングチューブのいずれかに添加し、室温で1時間インキュベートした。チューブをTBS/0.1%Tween 20で5回、TBSで5回洗浄した。

【0182】

結合したDNAは、0.5M NaCl/10mM Tris pH8、EDTA 1mM 0.5mlを用いて室温で10分間溶出し、次にフェノール/クロロホルム0.5mLで抽出し、担体グリコーゲン20μg、1/2量の7.5M酢酸アンモニウム及び3倍量のエタノールで沈殿させた。DNAは14,000gで20分間でペレットにして、該ペレットを70%エタノール0.5mlを用いて14,000gで5分間洗浄し、真空乾燥し、水20μlに再懸濁した。

【0183】

回収したDNAは、94℃、40秒、60℃、40秒、72℃、80秒を30回、その後72℃で5分間伸長するためのTACMECOFOR（配列番号45）プライマー及びREPAMECOBAK（配列番号46）プライマーそれぞれ10pmol並びにTaq DNAポリメラーゼ：ディープベントDNAポリメラーゼ20：1混合物（NEB）2単位を含むdNTP 200μM、1xNEBポリメラーゼ増幅緩衝液（KCl 10mM、(NH₄)₂SO₄ 10mM、Tris-HCl 20mM pH8.8、MgSO₄ 2mM、0.1% Triton X-100）を含有する反応量50μlでPCR増幅した。生成物は、1%アガロース/TAEゲルで電気泳動し、撮影した。抗体標的上での選択によってBSAコーティングしたチューブから回収するよりも多くのDNAが認められ、機能的scFv-RepA-DNA複合体が選択されたことが示された（図10）。

【0184】

配列の簡単な説明

配列番号1から11、19から23、26から35及び45から47は実施例で使

用したプライマーを示す。
配列番号12は、TAC-MYC-CK-RepA-CIS-ORI構築物の配列を示し、配列番号13は、TAC-MYC-V5-RepA-CIS-ORI構築物の配列を示し、配列番号24はTAC-V5-RepA-CIS-ORI-408構築物の配列を示し、配列番号25はTAC-NNB-RepA-CIS-ORI-408構築物の配列を示す。

配列番号14は、エストロゲン受容体標的認識配列を示す。

配列番号15及び16は、incFII不適合群のR1プラスミドのrepA遺伝子のDNA及びアミノ酸配列を示す。配列番号17及び18は、cisDNA要素の配列を示し、同系のori配列を形成する。

配列番号36から39は、実施例5で選択した後、単離したペプチドの配列を示す。配列番号39及び43は、実施例6で単離したクローンの配列を示す。

【図面の簡単な説明】

【0185】

【図1】本発明のDNA構築物がコードするペプチドに結合することができる方法の概略図である。

【図2】DNA結合タンパク質をシス作用DNA結合タンパク質に変換することができる本発明の方法の概略図である。

【図3】標的配列特異的DNA結合タンパク質を本発明のライブラリーから単離する方法を示した概略図である。

【図4】ライブラリータンパク質がシス作用及び二特異的な結合分子の使用によってそのコーディングDNAに結合する方法を示した概略図である。

【図5】いずれかの抗体で選択した大きさの異なる2種類の投入DNA（CK-RepA又はV5-RepA）の1：1混合物のシス活性を示す。1-マーカーDNA、2-抗ヒトCK抗体で選択した後のPCR増幅物、3-抗V5ペプチド抗体で選択した後のPCR増幅物。

【図6】抗V5抗体を結合するクローンの特異性を示す。抗V5抗体に対する特異的結合を示す7個のクローン（1～7）の450nMで読み取ったELISAスクリーニング。ひとまとまりの4本の棒グラフは、左から右へ、抗ヒトカッパ領域抗体、抗V5抗体、BSA及び盲検に対してスクリーニングしたクローンのELISA値を表す。CKもV5も

10

20

30

40

50

発現しない陰性対照もまた示す(8)。

【図7】実施例4でバシラス グロビギ (*B. globigii*) 胞子で5回選択した後、回収されたペプチドの培養上清のELISA OD450nmの値を示す。A=クローン1e、B=クローン1f、C=クローン1g、D=クローン8a、E=クローン10c、F=クローン10e、G=陰性対照。


【図8】実施例5で抗V5抗体で4回選択した後、単離されたペプチドのOD450nmの値を示す。A=P1C12、B=P2H1、C=P1B5、D=P2B8。ペプチドローファージを抗V5及び抗ACTHペプチド抗体で試験した。

【図9】オボアルブミンで4回選択した後、単離された合成ペプチドのOD450nmの値を示す。A=C1、B=C4、C=C6、D=C8、E=陰性対照。オボアルブミン、
抗V5抗体及びブロックした(プラスティック)プレートでペプチドを試験した。


【図10】BSA又はBSA-メコプロップで選択した後のscFvDNAのPCR回収を示す。A. BSA、ox-グルタチオン2.5mMで選択した抗メコプロップscFv、B. メコプロップ-BSA、ox-グルタチオン2.5mMで選択した抗メコプロップscFv、C. ox-グルタチオンなしで、BSAで選択した抗メコプロップscFv、D. ox-グルタチオンなしで、メコプロップ-BSAで選択した抗メコプロップscFv。

10


【図1】




【図2】



【図 3】



【図 4】



【図 5】




Figure 5

【図 6】




Figure 6

【図 7】






Figure 7

【図 8】



【図 9】



【図 10】




Figure 10

【配列表】

0004664677000001.xml

フロントページの続き

(31)優先権主張番号 0304657.0

(32)優先日 平成15年2月28日(2003.2.28)

(33)優先権主張国 英国(GB)

(72)発明者 マクレガー、ダンカン

イギリス国、ケンブリッジ、フーパー ストリート 21

(72)発明者 オーデグリッブ、リチャード

スウェーデン国、ストックホルム、ハントフェルカルガタン 60

(72)発明者 フィッツジェラルド、ケヴィン

イギリス国、エセックス、ヘンプステッド、ハイ ストリート、ザ カップ

(72)発明者 ヘデレー、ローズマリー

イギリス国、ケンブリッジ、1シー モートロック アヴェニュー

(72)発明者 エルドリッジ、ビル

イギリス国、エセックス、サフラン ウォールデン、リトル ウォールドレン ロード 19

(72)発明者 ウルマン、クリス

イギリス国、ケンブリッジ、クランリー クローズ 10

(72)発明者 クールマン、フィリップ

イギリス国、ケンブリッジシア、セント アイヴス、ラウリー クローズ 3

(72)発明者 カーンバー、デーヴィッド

オーストラリア国、ニューサウスウェールズ、オレンジ、ウォーリゲル プレース 6

審査官 佐々木 大輔

(56)参考文献 国際公開第98/037186 (WO, A1)

CULL M G, PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE OF USA, 米国, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE, 1992年 3月 1日, V89 N5, P1865-1869

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

C12N 15/00-15/90

BIOSIS/MEDLINE/WPIDS(STN)

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamII)