



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103330928 B

(45) 授权公告日 2015. 06. 17

(21) 申请号 201310283117. 0

(22) 申请日 2013. 07. 08

(73) 专利权人 冯丹

地址 234000 安徽省宿州市埇桥区南关街道
办事处淮海南路 215 号

(72) 发明人 高燕飞 贾久丽 冯丹

(74) 专利代理机构 北京市金栋律师事务所
11425

代理人 朱玲

CN 102091279 A, 2011. 06. 15, 说明书第 1 页
第 0004-0005 段.

CN 102988648 A, 2013. 03. 27, 说明书第 1 页
第 0004-0010、0020 段.

CN 102188614 A, 2011. 09. 21, 全文.

CN 1546066 A, 2004. 11. 17, 说明书第 1 页第
3-4 段.

CN 101766782 A, 2010. 07. 07, 全文.

审查员 庄崧

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

A61K 35/644(2015. 01)

A61K 35/24(2015. 01)

(56) 对比文件

CN 102631615 A, 2012. 08. 15, 说明书第 1 页
第 0002、0004-0006 段.

CN 101983716 A, 2011. 03. 09, 说明书第 1 页
第 0004、0007 段.

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗胃溃疡的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗胃溃疡的中药组合物及其制备方法,由如下重量份的原料药制成:桑寄生 10-20 份、白头翁 10-20 份、白芍 10-20 份、木瓜 10-20 份、土豆 10-20 份、蜂蜜 10-20 份、黄芪 5-9 份、党参 5-9 份、延胡索 5-9 份、白芷 5-9 份、枳实 5-9 份、五灵脂 5-9 份、浙贝母 5-9 份、连翘 5-9 份、甘草 5-9 份、桔梗 6-14 份、仙鹤草 6-14 份、陈皮 6-14 份、三七 2-4 份、白及 2-4 份、桂枝 2-4 份、生姜 2-4 份、槟榔 2-4 份。本发明具有疗效显著、副作用小、制备方法简单等优点。

1. 一种治疗胃溃疡的中药组合物,其特征是:由如下重量份的原料药制成:桑寄生 10-20 份、白头翁 10-20 份、白芍 10-20 份、木瓜 10-20 份、土豆 10-20 份、蜂蜜 10-20 份、黄芪 5-9 份、党参 5-9 份、延胡索 5-9 份、白芷 5-9 份、枳实 5-9 份、五灵脂 5-9 份、浙贝母 5-9 份、连翘 5-9 份、甘草 5-9 份、桔梗 6-14 份、仙鹤草 6-14 份、陈皮 6-14 份、三七 2-4 份、白及 2-4 份、桂枝 2-4 份、生姜 2-4 份、槟榔 2-4 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗胃溃疡的中药组合物,其特征是:由如下重量份的原料药制成:桑寄生 15 份、白头翁 15 份、白芍 15 份、木瓜 15 份、土豆 15 份、蜂蜜 15 份、黄芪 7 份、党参 7 份、延胡索 7 份、白芷 7 份、枳实 7 份、五灵脂 7 份、浙贝母 7 份、连翘 7 份、甘草 7 份、桔梗 10 份、仙鹤草 10 份、陈皮 10 份、三七 3 份、白及 3 份、桂枝 3 份、生姜 3 份、槟榔 3 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗胃溃疡的中药组合物的制备方法,其特征是:由权利要求 1 或 2 所述中药组合物按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

一种治疗胃溃疡的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,特别是涉及一种治疗胃溃疡的中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 胃溃疡是指胃肠黏膜被胃消化液自身消化而造成的超过粘膜肌层的组织损伤,胃溃疡是消化性溃疡中最常见的一种。

[0003] 目前,用于治疗胃溃疡的药物较多,主要有阿莫西林、西咪替丁和奥美拉唑等;这些药物存在毒副作用大、治疗效果差等不足。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是:为解决现有技术的不足,本发明提供了一种治疗胃溃疡的中药组合物及其制备方法,本发明具有疗效显著、副作用小、制备方法简单等优点。

[0005] 一种治疗胃溃疡的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:桑寄生 10-20 份、白头翁 10-20 份、白芍 10-20 份、木瓜 10-20 份、土豆 10-20 份、蜂蜜 10-20 份、黄芪 5-9 份、党参 5-9 份、延胡索 5-9 份、白芷 5-9 份、枳实 5-9 份、五灵脂 5-9 份、浙贝母 5-9 份、连翘 5-9 份、甘草 5-9 份、桔梗 6-14 份、仙鹤草 6-14 份、陈皮 6-14 份、三七 2-4 份、白及 2-4 份、桂枝 2-4 份、生姜 2-4 份、槟榔 2-4 份。

[0006] 所述的治疗胃溃疡的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:桑寄生 15 份、白头翁 15 份、白芍 15 份、木瓜 15 份、土豆 15 份、蜂蜜 15 份、黄芪 7 份、党参 7 份、延胡索 7 份、白芷 7 份、枳实 7 份、五灵脂 7 份、浙贝母 7 份、连翘 7 份、甘草 7 份、桔梗 10 份、仙鹤草 10 份、陈皮 10 份、三七 3 份、白及 3 份、桂枝 3 份、生姜 3 份、槟榔 3 份。

[0007] 所述的治疗胃溃疡的中药组合物的制备方法是:由所述中药组合物按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

[0008] 用法及用量:本发明的中药组合物以汤剂为主,每日 1 付,分 3 次服用,早、中、晚各服用 1 次,15 天为 1 个疗程,一般 2-4 个疗程即可治愈;也可将其制成浓缩丸或浓缩胶囊。

[0009] 本发明与现有技术相比所具有的有益效果是:本发明是在传统中医理论和临床经验指导下,精选出各原料药及其配比,具有理气和中、消肿止痛、收敛止血、化瘀生肌的功能,实现治疗胃溃疡的目的;本发明具有疗效显著、副作用小、制备方法简单等优点,经临床验证,本发明治疗胃溃疡有效率为 95%。

具体实施方式

[0010] 实施例 1:

[0011] 一种治疗胃溃疡的中药组合物,由如下重量份的原料药制成:桑寄生 15 份、白头翁 15 份、白芍 15 份、木瓜 15 份、土豆 15 份、蜂蜜 15 份、黄芪 7 份、党参 7 份、延胡索 7 份、白芷 7 份、枳实 7 份、五灵脂 7 份、浙贝母 7 份、连翘 7 份、甘草 7 份、桔梗 10 份、仙鹤草 10

份、陈皮 10 份、三七 3 份、白及 3 份、桂枝 3 份、生姜 3 份、槟榔 3 份。

[0012] 所述的治疗胃溃疡的中药组合物的制备方法是：由所述中药组合物按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

[0013] 实施例 2：

[0014] 一种治疗胃溃疡的中药组合物，由如下重量份的原料药制成：桑寄生 10 份、白头翁 10 份、白芍 10 份、木瓜 10 份、土豆 10 份、蜂蜜 10 份、黄芪 5 份、党参 5 份、延胡索 5 份、白芷 5 份、枳实 5 份、五灵脂 5 份、浙贝母 5 份、连翘 5 份、甘草 5 份、桔梗 6 份、仙鹤草 6 份、陈皮 6 份、三七 2 份、白及 2 份、桂枝 2 份、生姜 2 份、槟榔 2 份。

[0015] 所述的治疗胃溃疡的中药组合物的制备方法是：由所述中药组合物按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

[0016] 实施例 3：

[0017] 一种治疗胃溃疡的中药组合物，由如下重量份的原料药制成：桑寄生 20 份、白头翁 20 份、白芍 20 份、木瓜 20 份、土豆 20 份、蜂蜜 20 份、黄芪 9 份、党参 9 份、延胡索 9 份、白芷 9 份、枳实 9 份、五灵脂 9 份、浙贝母 9 份、连翘 9 份、甘草 9 份、桔梗 14 份、仙鹤草 14 份、陈皮 14 份、三七 4 份、白及 4 份、桂枝 4 份、生姜 4 份、槟榔 4 份。

[0018] 所述的治疗胃溃疡的中药组合物的制备方法是：由所述中药组合物按常规方法制成汤剂、浓缩丸或浓缩胶囊。

[0019] 实验例：

[0020] (1) 临床资料：本发明共治疗胃溃疡患者 75 例，其中男 44 例，女 31 例，年龄为 26-72 岁。

[0021] (2) 治疗方法：本发明的中药组合物以汤剂为主，每日 1 付，分 3 次服用，早、中、晚各服用 1 次，15 天为 1 个疗程；也可将其制成浓缩丸或浓缩胶囊。

[0022] (3) 疗效评价标准：

[0023] 治愈：症状消失，实验室检查正常；

[0024] 好转：症状明显改善，实验室检查有改善；

[0025] 未愈：主症未改善，实验室检查未改善。

[0026] (4) 治疗结果：本发明共治疗胃溃疡患者 75 例，经过 2-4 个疗程的治疗，治愈 65 例，占 87%，好转 6 例，占 8%，未愈 4 例，占 5%，有效率为 95%。

[0027] (5) 典型病例：

[0028] 1、杨某某，男，54 岁，患胃溃疡 2 年，主要症状为胃胀、泛酸、饥饿时隐痛，经胃镜检查，诊断为胃溃疡；服用本发明的中药组合物 2 个疗程后好转，服用 4 个疗程治愈；随访 2 年未复发。

[0029] 2、江某，男，41 岁，患胃溃疡 3 年，主要症状为上腹疼痛、呕吐、口干等，经胃镜检查，诊断为胃溃疡；服用本发明的中药组合物 2 个疗程后好转，服用 4 个疗程治愈；随访 1 年未复发。