

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200610172691.9

[51] Int. Cl.

A61K 36/804 (2006.01)

A61P 1/10 (2006.01)

[43] 公开日 2007 年 7 月 18 日

[11] 公开号 CN 100998686A

[22] 申请日 2006.12.28

[21] 申请号 200610172691.9

[71] 申请人 江军锋

地址 311501 浙江省桐庐县桐君街道乔林路
898 号

[72] 发明人 江军锋

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称

一种治疗习惯性便秘的内服中药

[57] 摘要

一种治疗习惯性便秘的内服中药，涉及治疗习惯性便秘的中草药配方，其药物是由下述重量份的原料制成的：白术 70 - 80 克，生地 50 - 55 克，升麻 3 - 4 克。本发明的特点是取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

1、一种治疗习惯性便秘的内服中药，其特征在于该药物是由下述重量份的原料制成的：白术 70-80 克，生地 50-55 克，升麻 3-4 克。

一种治疗习惯性便秘的内服中药

技术领域:

本发明涉及中草药领域,尤其是涉及防治习惯性便秘效果十分理想的一种治疗习惯性便秘的内服中药。

背景技术:

便秘是指由于大便在体内停留时间过长,以致大便干结、排出困难或不尽的一种疾病,其基本症状为排便次数明显减少,大便干燥或者秘结不通,排便后没有正常的舒快感。引起便秘的原因很多,有因体质衰弱使排便动力降低,有因进食过少、水份缺乏使大便干结,有因患肠梗阻等疾病使肠蠕动减弱等。习惯性便秘的症状表现为:除便秘基本症状外,伴见以较长时间所形成的一种习惯性便秘为主导的明显症状。目前,国内外治疗习惯性便秘的方法较多,如西药治疗法,常用药有硫酸镁、山梨醇、开塞露等;如中药治疗法,常用药有麻子仁丸、苏子降气汤、温脾汤等。但是,在治愈率、治疗手段、治疗费用等方面难以达到满意的效果。

经检索未发现与本发明相同的配方。

发明内容:

本发明采用的治疗方法为中草药汤剂治疗法。

本发明的目的在于克服目前在治疗习惯性便秘上的不足之处,并提供一种取材容易、制备方便、费用低廉且治愈率较高的治疗习惯性便秘的中草药汤剂药物及制备方法。

本发明的技术方案是这样实现的:

一种治疗习惯性便秘的内服中药,其药物是由下述重量份的原料制成的:白术 70-80 克,生地 50-55 克,升麻 3-4 克。

一种治疗习惯性便秘的内服中药,其药物的制备方法为:先将配比量白术、

生地、升麻等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

本发明内服中药里：白术具有补脾健胃、燥湿利水作用；生地具有清热凉血、润燥生津作用；升麻具有清热解毒、散风热、升阳作用。上述中草药经有机组合、辩证配伍和相互辅佐，增强了该药物健脾泄热、生津滑肠的功效，从而达到治愈习惯性便秘的目的。

使用本发明的治疗习惯性便秘的内服中药治疗习惯性便秘有如下特点：取材容易、制备方便、费用低廉、见效快。

服用方法：

- 1、药量：每日一剂。将头煎、二煎两次煎成的汤剂混合后，分两次服用。
- 2、服药时间：上、下午各一次，在饭后两小时服药。
- 3、药温控制：温服。

禁忌事项：

治疗、服药期间禁忌食油炸粘腻、寒冷固硬、不易消化及有刺激性的食物。

具体实施方式：

实施例 1：一种治疗习惯性便秘的内服中药的原料配方：白术 70 克，生地 50 克，升麻 3 克。药物的制备方法为：先将配比量白术、生地、升麻等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去药渣，取汤剂即成。

实施例 2：一种治疗习惯性便秘的内服中药的原料配方：白术 80 克，生地 55 克，升麻 4 克。药物的制备方法为：先将配比量白术、生地、升麻等中草药放入煎药器具内，加入符合生活饮用水标准的洁净水，加水量以超过药面 2-3cm 为度。入煎前将上述中草药浸泡半小时，使其充分湿润，以利药汁充分煎出。然后，用武（猛）火煮沸再改用文（微）火煎熬。当煎熬 15 分钟左右停止，除去

药渣，取汤剂即成。

治疗效果：

疗效标准：一种治疗习惯性便秘的内服中药治疗习惯性便秘之疗效判断主要依据于习惯性便秘症状是否消失。服药 15 天为 1 个疗程。具体疗效分以下三级：治愈——习惯性便秘症状全部消失；好转——习惯性便秘症状部分消失和减轻；无效——服药 1 个疗程后，习惯性便秘症状毫无消失。

效果：用该药物治疗习惯性便秘患 24 例，治疗 1 个疗程，其中治愈 18 例，好转 6 例，治愈率为 75%，有效率为 100%。

典型病例：

汪某某，男，45 岁，工人。2002 年 4 月就诊。患者自述患便秘已有多年，经常医治后康复一段时间，但又会复发，反反复复好几次了。诊查发现患者并无其他疾病症状。诊断为习惯性便秘。采用本发明内服中药，先服 7 剂，习惯性便秘症状明显改善，续服 8 剂，习惯性便秘症状全部消失。6 个月后随访，未见复发。