

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2006-500937

(P2006-500937A)

(43) 公表日 平成18年1月12日(2006.1.12)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 1 2 N 5/10 (2006.01)	C 1 2 N 5/00 Z N A B	4 B O 2 4
C O 7 K 16/00 (2006.01)	C O 7 K 16/00	4 B O 6 4
C 1 2 P 21/08 (2006.01)	C 1 2 P 21/08	4 B O 6 5
C 1 2 N 15/09 (2006.01)	C 1 2 N 15/00 A	4 H O 4 5

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 52 頁)


(21) 出願番号	特願2004-540785 (P2004-540785)	(71) 出願人	505123882
(86) (22) 出願日	平成15年10月6日 (2003. 10. 6)		プロバイオゲン アーゲー
(85) 翻訳文提出日	平成17年6月3日 (2005. 6. 3)		ドイツ連邦共和国, 13086 ベルリン
(86) 国際出願番号	PCT/EP2003/011027		, ゴエセシュトラーセ 54
(87) 国際公開番号	W02004/031383	(74) 代理人	100092783
(87) 国際公開日	平成16年4月15日 (2004. 4. 15)		弁理士 小林 浩
(31) 優先権主張番号	02022194.1	(74) 代理人	100095360
(32) 優先日	平成14年10月4日 (2002. 10. 4)		弁理士 片山 英二
(33) 優先権主張国	欧州特許庁 (EP)	(74) 代理人	100093676
			弁理士 小林 純子
		(74) 代理人	100120134
			弁理士 大森 規雄

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ヒトの糖鎖付加パターンを有する遺伝子産物の発現のための高収量異種発現細胞系

(57) 【要約】

本発明は、ヒトの糖鎖付加パターンを有する組換え遺伝子を安定的に、高収量で発現できる細胞を確立し、任意の標的遺伝子を挿入できる安定普遍前駆細胞を確立するための偏在／普遍的な方法に関する。本発明はさらに、前記方法により得られうる細胞に関する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ヒトの糖鎖付加パターンを本質的に有する標的遺伝子産物を安定的に高収量で発現できる細胞を調製する方法で、その方法が

(a) ヒト細胞またはヒトの雑種細胞（元の細胞）には必須ではない、元の遺伝子産物を安定的に高収量で発現できる元の細胞を選択すること；

(b) 元の細胞ゲノム内の元の遺伝子産物の座をスクリーニングすること；

(c 1) 元の遺伝子産物をコードする遺伝子を、機能化前駆細胞を得るために、一つ以上のリコンビナーゼ認識部位（RRS）を含む第一の機能DNA配列に置き換えること；および

(d) 標的遺伝子産物をコードするDNA配列を含む第二の機能DNA配列を、ステップ(c 1)で得られた機能化前駆細胞に、第一の機能配列で取り込まれたRRSを認識するリコンビナーゼを用いて挿入すること、または

(c 2) 元の遺伝子産物をコードする遺伝子を、標的遺伝子産物をコードするDNA配列を含む機能DNA配列に直接置き換えること、を含む方法。

【請求項 2】

請求項 1 記載の方法であって、

(i) 元の細胞が元の遺伝子産物を、好ましくは少なくとも0.3 fmol/細胞/日のポリペプチド量、および、より好ましくは1 fmol/細胞/日以上で量分泌し；および／または

(i i) 元の細胞が初代不死化または融合細胞、またはその遺伝的改変細胞であり；および／または

(i i i) 元の細胞がヒトの雑種細胞であるならば、元の遺伝子産物はヒト遺伝子であり；および／または

(i v) 元の遺伝子産物が分泌タンパク質、例えば抗体、サイトカイン、ホルモン、酵素、移送タンパク質等から選択される、方法。

【請求項 3】

請求項 2 記載の方法であって、元の細胞がBリンパ球、好ましくはヒトミエローマまたはハイブリドーマ、またはヒトのヘテロハイブリドーマ、および、より好ましくはヒトマウスのヘテロハイブリドーマH-CB-P1 (DSM ACC 2104)である方法。

【請求項 4】

請求項 3 記載の方法であって、機能DNA配列の挿入が前記元の細胞の再編成Ig座で、好ましくは再編成免疫グロブリンH座またはλ座で行われる方法。

【請求項 5】

請求項 1 から 4 のいずれか一つに記載の方法であって、元の遺伝子産物の座が

(i) 既知である、またはマイクロアレイ発現解析、2Dタンパク質ゲル電気泳動、定量的PCR、RNAse保護、ノーザンブロット、ELISA、ウェスタンブロットおよびそれらの組み合わせを含むスクリーニング手順により決定される；および／または

(i i) 本質的にヒトの糖鎖付加パターンを与えるように選択される、方法。

【請求項 6】

請求項 1 から 5 のいずれか一つに記載の方法であって、元の遺伝子の置換が

(i) ワンステップ置換法により行われる、ここで元の細胞は第一の機能配列を含むベクター構築物に接触し、前記第一の機能配列が元の遺伝子産物をコードする遺伝子を置換する；または

(i i) 2 または複数ステップ法により行われる、ここで第一の遺伝子産物をコードする遺伝子が削除または不活化され、および続いて第一の機能配列を含むベクター構築物に接触し、前記第一の機能配列が削除または不活化された元の遺伝子産物の部位で取り込まれ

10

20

30

40

50

る、
方法。

【請求項 7】

請求項 1 から 6 のいずれか一つに記載の方法であって、第一の機能配列が

(i) loxP、f r t、ラムダ様ファージの attL および attR 部位、およびレソルバーゼまたはファージ C 3 1 インテグラーゼの認識部位から選択される一つ以上の R R S、好ましくは一方向の挿入ができる R R S、例えば改良 loxP 部位、f r t 部位等を含み；および／または

(i i) さらに、マーカー配列、分泌タンパク質、プロモーター、エンハンサー、スプライシングナル、ポリアデニル化シグナルおよび I R E S 因子から選択される機能配列を含み；および／または

(i i i) 標的遺伝子または隣接する配列に相同な配列でベクターにつながっている、
方法。

【請求項 8】

請求項 1 から 7 のいずれか一つに記載の方法であって、

(i) 第二の機能 D N A 配列の挿入が、第二の機能配列の送達とともに、その直前、もしくはその直後に、第一の機能配列中に存在する R R S を認識するリコンビナーゼを送達することにより行われ；

(i i) インテグラーゼが C r e、F l p、Φ C 3 1 インテグラーゼ、レソルバーゼ等から選択され；

(i i i) 標的遺伝子産物が酵素、ホルモン、サイトカイン、受容体、抗体、抗体ドメイン、前記遺伝子産物を含む融合タンパク質等から選択され；

(i v) 第二の機能 D N A 配列がさらに、プロモーター配列、マーカー配列、スプライスドナーおよびアクセプター配列、第一の機能配列の R R S とは異なるリコンビナーゼ認識配列等から選択される機能配列を含む、
方法。

【請求項 9】

請求項 1 から 6 のいずれか一つに記載の方法であって、元の遺伝子産物をコードする遺伝子が直接、標的遺伝子産物をコードする D N A 配列を含む機能 D N A 配列と置き換えられる、方法。

【請求項 10】

請求項 1 から 6 記載のステップ (a) から (c 1) を含む機能化細胞の調製方法。

【請求項 11】

請求項 10 記載の機能化細胞。

【請求項 12】

請求項 1 から 9 記載の方法により得られうる標的遺伝子産物を高収量発現できる細胞。

【請求項 13】

標的遺伝子産物が抗体、好ましくは細胞が P B G 0 4 (D M S A C C 2 5 7 7) である、請求項 12 記載の細胞。

【請求項 14】

H - C B - P 1 (D S M A C C 2 1 0 4) に由来する、請求項 11、12 もしくは 13 記載の細胞。

【請求項 15】

さらに不活化された、または同一標的遺伝子産物または異種標的遺伝子産物をコードする遺伝子で置換されたその軽鎖を有する、請求項 13 または 14 記載の細胞。

【請求項 16】

請求項 12 から 15 のいずれか一つに記載の細胞を培養することを特徴とする標的遺伝子産物の高収量発現方法。

【請求項 17】

請求項 14 または 15 記載の細胞を培養することにより得られうる標的遺伝子産物。

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ヒトの糖鎖付加パターンを有する組換え遺伝子を安定的に、高収量で発現できる細胞を確立し、任意の標的遺伝子を挿入できる安定普遍前駆細胞を確立するための偏在／普遍的な方法に関する。本発明はさらに、前記方法により得られうる細胞に関する。

【背景技術】

【0002】

組換えタンパク質の生産は異なる用途にとって重要である。タンパク質の構造研究（合理的な薬剤の設計および薬剤の最適化はそれらに基づくものである（Antivir. Chem. Chemother., 12 Suppl., 43-49 (2001)））、タンパク質（酵素）の工業用途および組換えタンパク質の臨床用途は、その効果的な生産の必要性を増加させる。2000年2月現在で、米国製薬工業協会の調べによれば、20個のモノクローナル抗体を含む122個の生物製剤が第三相試験またはFDA認可待ちのいずれかの状態にあった（K. Garber, 2001, Nature Biotech. 19, 184-185）。

【0003】

用途に応じて、組換えタンパク質の未変性構造および翻訳後修飾（例、グリコシル化）が必須である。バイオテクノロジーの「ペット」生物である大腸菌（E. coli）のような原核生物は、翻訳後修飾を導入する能力を欠いている。真核細胞のみが、機能的に活性のあるタンパク質を生産するためにしばしば必要とされる、翻訳と同時に、および翻訳後に必要な細胞の機構を有している。各種の異種タンパク質の生産のための各種の真核生物によるシステムが存在する。例えば、サッカロマイセス（Saccharomyces）属、カンジダ（Candida）属、ピキア（Pichia）属、ハンセンラ（Hansenula）属、アスペルギルス（Aspergillus）属、またはクリベロマイセス（Kluyveromyces）属由来の真菌の発現システムが確立している（HollenbergとGelissen (1997)、Current Opinion in Biotechnology 8, 554-560）。時折、真菌で遭遇するプラスミドの不安定性の問題を回避するために、異種タンパク質をコードする配列が、相同組換えにより、真菌の染色体に理想的に組み込まれる。さらに、真菌の発現システムで遭遇する問題は、異種タンパク質の過剰グリコシル化と、不正なオリゴマー化および不十分なリガンドの取り込みのような不正なフォールディングである。昆虫細胞における異種タンパク質の発現－異種タンパク質をコードするDNAはまた、組換えにより染色体に取り込まれるが－は、これらの問題を回避する。しかし、昆虫細胞はシアル酸とシアルグリカンを生産する能力を欠いている。末端のシアル酸残基は、多くの複合糖質において様々な生物学的役割を果たしている。植物はまた、組換えタンパク質の生産に用いることができる。しかし、これらの異種発現システムでは、抽出と精製が困難であることが現実に障害となっている。

【0004】

哺乳動物発現システム、培養細胞、ならびにトランスジェニック動物にはこれらの不都合はない。組換えタンパク質を培養哺乳動物細胞で一過的に、あるいは構成的（安定的）に生産できる。組換え体の一過性発現では、組換えタンパク質をコードするベクターDNAを細胞に導入し、一般的には細胞DNAに組み込まない。組換えタンパク質の発現力価は初期では高い。しかし、ベクターDNAが複製されないので、ベクターDNAはそれぞれの細胞増殖で希釈され、それゆえ、発現力価は低下する。ベクターDNAまたはベクターDNAの一部だけが非正統的に細胞のゲノムDNAと組み換わることは殆ど無く、組換えタンパク質をコードする遺伝子は安定的にゲノムに組み込まれる。組換えタンパク質をコードする遺伝子が選択マーカーと結合している場合、このカセットをもつ細胞を安定形質転換細胞として同定、単離することができる。安定形質転換体は、異種タンパク質が連続的に生産される利点を有する。発現力価は主として、プロモーターコンストラクトの強

さ、染色体中の組み込み部位、コピー数および問題の組換えタンパク質の型により決定される。多くの強力なプロモーターが市販されているが、それらの転写活性は関連する転写因子の細胞レベルと組み込まれる部位のクロマチン構造に依存して変化する。例えば、染色体DNAのスキュフォールド、またはマトリックス接着領域（S/MARエレメント）内での組み込みにより、プロモーター活性—それにより異種遺伝子の発現—が増大し、隣接するクロマチンによる不活性化から保護されることになる。それゆえ、特異的な細胞において高活性のプロモーターを選択し、染色体の活性部分へ組み込むことが非常に望ましい。好ましくは、低コピー数の異種遺伝子が一般に、多コピー遺伝子よりも安定に発現するので、単一の組み込みが望ましい。

【0005】

単一の、予め選択された高活性の座における組み込みは相同組換えにより達成できる。この方法は、典型的にはマウス胚性幹細胞に適用されるのだが、ヒト起源の体細胞では極めて効率が悪く、大規模のスクリーニングの努力が必要である。その上、殆どのヒト永久細胞系は、これらの細胞系が通常は倍数体であり、2個所以上の同一座を標的とすることが困難となるので、完全に所与の標的遺伝子の発現が止まることが望まれる場合、適用できない。リコンビナーゼ、例えばCre、flp、C13、とそれぞれの標的部位（RRS）を用いた部位特異的組換えが実行可能な代替案である（Feng, Y. Q. et al., *Journal of Molecular Biology*, vol. 292 (4), p. 779-785 (1999); Schlake, T. et al., *Biochemistry*, Am. Chem. Soc., vol. 244 (1-2), p. 185-193 (October 2000); Fussenegger, M. et al., *Trends in Biotechnology*, vol. 17 (1), p. 35-42 (January 1999); Groth, A. C. et al., *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA*, vol. 97 (11), p. 5995-6000 (May 2000)）。このアプローチでは、単一のRRSをもつプラスミドを染色体に単一のRRSをターゲットするために用いることができる。この方法には、しかし、ある限定がある：すなわち、逆反応、プラスミドの切り出しが分子間の組換えで、組み込みよりも高速に起きるので、全く効率が悪い。第二に、細菌の遺伝子を含む全プラスミドが組み込まれる。第一の問題を解決するために、例えば、flpとcreの両者に対する異種特異的な標的部位を用いて、一方向性を確立した。これらのRRSをそれぞれのリコンビナーゼは認識するが、組換えを成功させるためには同一部位が必要であり、切り出し反応は排除される（Karremans S. et al., *Nucleic Acids Res.*, vol. 24 (9), p. 1616-1624 (1996); Trinh, K. R. et al., *J. of Immunol. Methods*, vol. 244, p. 185-193 (2000)）。しかし、ターゲティングプラスミドはそれでも染色体の単一の好ましい位置に組み込まれなければならない。そのようなまれな組み込みを見出すための大規模なスクリーニングの努力が必要である。これらのクローンはしばしば二つ以上のコピーのプラスミドを含み、不完全なコピーを含み、細菌の配列を組み込みから排除することができない。これらの細菌の配列は、標的領域をしばしば不活性化する哺乳動物細胞により認識される。それとは別に、ターゲティングカセットをレトロウイルスベクターにより組み込むことができる（Karremans S. et al., *Nucleic Acids Res.*, vol. 24 (9), p. 1616-1624 (1996)）。これらのベクターは染色体内の活性部位を標的とし、完全長のカセットのみが組み込まれ、単一の組み込み部位を作出するように感染量が調節される。しかし、ITRsに隣接する発現ユニットはまた、非活性化される。さらに、このシステムの使用は、発現するタンパク質の治療用途を排除するように政府発表機関に制限される。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

10

20

30

40

50

上記を考慮すると、組換えヒト糖タンパク質を高収量で産生する細胞を得るための対象の産物をコードする任意の遺伝子をもつ細胞系の形質転換／変換の方法、特に厄介なスクリーニング操作を必要としないか、ほとんど必要としない方法が望まれている。驚いたことに、高収量でヒト翻訳後修飾の特性を有する組換え糖タンパク質を発現する細胞が、ヒトまたは基本的にヒト雑種細胞（以下、単に「元の細胞（starting cell）」と称する）で非必須の高発現する細胞遺伝子（以下、単に「元の遺伝子（starting gene）」と称する）を最初に同定し；第二に、元の遺伝子を、部位特異的組み込みのためのリコンビナーゼ認識部位（RRSS）と随意に各種の機能配列を含有する「代替」遺伝子を含む第一のDNA配列と（例えば、適当なターゲティングカセットを用いることにより）、相同組換えにより直接的に置換し、この前駆発現細胞（機能化細胞）の安定クローンを選択／単離し；第三に、標的遺伝子産物（タンパク質）をコードする対象遺伝子（これ以後、「標的遺伝子」と称する）を、第一のターゲティングカセットに含まれるRRSSを認識するリコンビナーゼを用いた部位特異的組み込みにより導入し；最後に、大量の組換えタンパク質を産生できる安定発現細胞を選択／単離することにより取得し得ることを見出した。元の遺伝子を標的遺伝子産物をコードするDNA配列を含む機能DNA配列と直接的に置換することもできる。

【0007】

上記方法に適した元の細胞が、ヒトミエローマおよびハイブリドーマ細胞、およびヒトのヘテロハイブリドーマ細胞（H-CB-P1のようなヒトマウスのヘテロハイブリドーマ細胞を含む）のような特定の哺乳動物細胞であり、基本的にヒトのグリコシル化パターンを有するタンパク質を生産することをさらに見出した。

【0008】

本発明を用いると、対象の組換えタンパク質をコードするいかなる遺伝子も前記の特定の哺乳動物細胞に安定的に導入することが可能である。本発明を用いると、組換えタンパク質をコードする対象の遺伝子は、高発現する細胞遺伝子座に、好ましくは染色体の活性部分の高活性細胞プロモーターに近接して組み込まれる。本発明を用いると、RRSSで囲まれた代替遺伝子を有する各種起源の前駆細胞系を作製することができる。本発明を用いると、代替遺伝子を、適当なリコンビナーゼにより触媒されるRRSSでの部位特異的組換えにより、組換えタンパク質をコードする対象遺伝子と交換でき、結果として最終の高収量発現細胞を生ずる。

【0009】

最後に、ヒトマウスのヘテロハイブリドーマが非常に明確なヒトのグリコシル化パターンを提供することを見出した。

【課題を解決するための手段】

【0010】

より具体的には、本発明は、

(1) ヒトの糖鎖付加パターンを本質的に有する標的遺伝子産物を安定的に高収量で発現できる細胞を調製する方法で、その方法が

(a) ヒト細胞またはヒトの雑種細胞（元の細胞；starting cell）には必須ではない、元の遺伝子産物（starting gene product）を安定的に高収量で発現できる元の細胞を選択すること；

(b) 元の細胞ゲノム内の元の遺伝子産物の座をスクリーニングすること；

(c1) 元の遺伝子産物をコードする遺伝子を、機能化前駆細胞を得るために、一つ以上のリコンビナーゼ認識部位（RRS）を含む第一の機能DNA配列に置き換えること；および

(d) 標的遺伝子産物をコードするDNA配列を含む第二の機能DNA配列を、ステップ(c1)で得られた機能化前駆細胞に、第一の機能配列で取り込まれたRRSを認識するリコンビナーゼを用いて挿入すること、または

(c2) 元の遺伝子産物をコードする遺伝子を、標的遺伝子産物をコードするDNA配列を含む機能DNA配列に直接置き換えること、

を含む方法；

(2) (1)の方法の好ましい実施態様であって、上記の元の細胞がBリンパ球由来の不
死化細胞である(好ましくは、ヘテロハイブリドーマH-CB-P1(DSM ACC
2104)のようなヒトマウスのヘテロハイブリドーマであって、機能DNA配列の組
み込みがIg座(好ましくは、前記細胞の再編成されたヒトIg座)で行われる)；

(3) 上記(1)または(2)の方法により得られうる標的遺伝子産物を高収量発現でき
る細胞；

(4) 上記(1)または(2)で定義される、工程(a)から(c1)を含有する機能化
細胞を調製する方法；

(5) 上記(4)に定義される前駆細胞；

(6) 上記(3)に定義される細胞を培養することを含有する、標的遺伝子産物を高収量
発現する方法；

(7) H-CB-P1由来の細胞を培養することにより得られうる標的遺伝子産物、
を提供する。

【発明を実施するための最良の形態】

【0011】

本発明は元の哺乳動物細胞、特にヒト細胞またはヒト雑種細胞を安定高収量発現細胞に
形質転換する方法を提供する。連続的な組換え体の発現を達成するために、組換え産物を
コードする遺伝子を細胞のゲノムDNAに組み込む。細胞DNAへの組換え遺伝子の組み
込み部位により発現レベルを高度に決定する。それゆえ、ここで表される方法は組換え遺
伝子の細胞中のゲノムの高度に転写活性を有する部分への組み込みを含む。組換えタン
パク質をコードする対象遺伝子を非常に強力な組換えプロモーターの支配下に置くか、また
は高活性の細胞プロモーターの下流に該遺伝子を組み込むことにより、高活性の細胞プロ
モーターの支配下に置くことができる。

【0012】

本発明の方法(1)の好ましい実施態様において、元の細胞は元の遺伝子産物を、好ま
しくは、少なくとも0.3 fmol/細胞/日の量のポリペプチド鎖(約90 kdのタン
パク質に関して30 pg/細胞/日に等しい)で、より好ましくは、1 fmol/細胞/
日以上(約90 kdのタンパク質に関して100 pg/細胞/日に等しい)で分泌す
る。そうでなければ、元の細胞が元の遺伝子産物を分泌しない場合では、高発現する、好
ましくは非必須の細胞内または膜タンパク質、または高発現する非コードRNAをコード
する遺伝子を選択する。

【0013】

別の好ましい実施態様では、元の細胞は初期の、不死化または融合細胞、もしくはその
遺伝的に修飾された細胞である。それゆえ、元の細胞は初期細胞、不死化細胞(例えば、
Bリンパ球由来の不死化細胞)または腫瘍細胞、もしくはその遺伝的に修飾された細胞、
雑種細胞、一般的にタンパク質製造に用いられる、HEK293、遺伝的不死化または不
死化細胞系との融合により初期細胞から作製されるPER.C6ヒト細胞系のような細胞
系から選択され、好ましくはヒトのハイブリドーマまたはヘテロハイブリドーマ細胞(例
えば、ヒトマウス、ヒトラットなど)であり、もっとも好ましくは、ヒトマウスの
ヘテロハイブリドーマH-CB-P1(DSM ACC 2104; ZIM517として
以前に引用した)である。

【0014】

元の細胞がヒト細胞またはヒトのヘテロハイブリドーマ(例えば、上記定義のような細
胞)であるなら、前記雑種細胞またはヘテロハイブリドーマは少なくとも一つのヒト染色
体含有し、および/または、ヒトの翻訳後修飾ができることが好ましい。元の遺伝子産
物がヒト遺伝子であることが特に好ましい。

【0015】

元の遺伝子産物は好ましくは、抗体、サイトカイン、ホルモン、酵素、移送タンパク質
、貯蔵タンパク質、構造タンパク質などのような分泌タンパク質から選択される。元の遺

10

20

30

40

50

伝子産物はあるいは、選択された元の細胞の主要産物である。非常に安定な I g M の発現が H - C B - P 1 で観察され、あるいはスクリーニング法で選択される。スクリーニングは、マイクロアレイ発現分析、2 D タンパク質ゲル電気泳動、定量的 P C R、R N A s e 保護、ノーザンブロット、E L I S A およびウェスタンブロットを含む個々の、または複合の方法に基づくものである。これらの個々の方法の能力と感度は当業者には既知である。

【0016】

本発明の方法により任意の組換えタンパク質を産生することができる。好ましい標的遺伝子産物として、酵素、特にプロテアーゼ、プロテアーゼ阻害剤、ホルモン、サイトカイン、レセプターまたはその可溶型（例えば、膜透過ドメインまたは細胞内ドメインを欠くレセプター）、全長の抗体または抗体ドメイン、およびこれらのタンパク質群のドメインを合わせた融合タンパク質があげられるが、これに限定されない。

10

【0017】

工程（a）、（b）、（c1）および（d）を含む実施態様（1）の最初の選択肢において、元の遺伝子の置き換えはワンステップ置き換え法により行われ、ここで元の細胞は第一の機能配列を含むベクター構築物と接触し、前記第一の機能配列は不活性化し、部分的または完全に元の遺伝子産物をコードする遺伝子と置き換わる。あるいは、置き換えは二工程または複数工程法により行われ、元の遺伝子産物をコードする遺伝子は削除、または不活性化され、続いて第一の機能配列を含むベクターと接触する。前記第一の機能配列は削除された／不活性化された元の遺伝子産物の部位に組み込まれる。

20

【0018】

元の遺伝子の場所への第一の機能配列の特異的組み込みは、標的配列または近接する配列に相同な、ベクター中の第一の機能配列に隣接する配列により促進される。これらの隣接配列は、元の細胞のラムダ、コスミド、p a c または b a c ライブラリーから得られるか、元の細胞の D N A を鋳型として用いた P C R により生成される。標的遺伝子の場所への第一の機能配列の特異的組み込みから得られる細胞クローンの割合（パーセンテージ）は、二重選択法を用いることによりさらに増加する。ここで、陽性選択マーカーとして第一の機能配列の一部を含み、陰性選択マーカーは相同隣接配列により第一の機能配列から分離される。相同交換により、陰性選択マーカーなしで、陽性選択マーカーを組み込むことができる。要請選択マーカーの例としては、ハイグロマイシン、ブラストサイジン、ネオマイシン、あるいはグルタミン合成酵素遺伝子があげられ、H S V t k またはシトシンデアミナーゼが陰性選択マーカーである。マーカーおよびこれらの適用方法は当業者に既知である。

30

【0019】

相同交換から得られた細胞クローンを、第一の機能配列から発現される遺伝子産物の要素の存在と元の遺伝子の少なくとも一つの対立遺伝子不活性化により同定した。これらの細胞クローンは機能化前駆細胞を表す。

【0020】

第一の機能配列は、l o x P、f r t、ラムダ様ファージの a t t L と a t t R、レゾルバーゼまたはファージ C 3 1 インテグラーゼの認識部位から選択される一つ以上の R R S (s) を含有する。前記認識部位により、例えば修飾された l o x P および f r t 部位だけでなく、Φ C 3 1 インテグラーゼの（野生型の）認識部位により得られる、一方向の組み込みが提供されることが好ましい。第一の機能配列はさらに、マーカー配列、分泌タンパク質遺伝子、プロモーター、エンハンサー、スプライスシグナル、ポリアデニル化シグナル、I R E S エlement等から選択される配列を含むことができる。

40

【0021】

標的遺伝子産物の産生細胞を作製するために、機能化前駆細胞（実施態様（1）の第二の選択肢の工程（c2）で得られるような産生細胞がまだない場合は、以下を参照せよ）、例えば、P B G 0 3 クローン D 3（D S M A C C 2 5 7 7）を次いで、第二の機能配列を含む第二のベクターと接触させる。第二の機能配列は、第一の機能配列中に存在する

50

標的遺伝子および前記リコンビナーゼのRRS(s)を含有する。第二の機能配列はさらに、プロモーター配列、マーカー配列、第一の機能配列のRRSとは異なるリコンビナーゼ認識配列等を含有する。

【0022】

第二の機能DNA配列の組み込みを、アクセサリタンパク質（例えば、Cre、Flp、ΦC31インテグラーゼ、レソルバーゼ等）の存在、または非存在下でのリコンビナーゼのRRSの認識により、行った。これらのリコンビナーゼとアクセサリタンパク質、これらのタンパク質をコードするmRNA、もしくは、一過性発現をするためのウイルスまたは非ウイルスベクターが、第二の機能配列の供給とともに、その直前に、もしくは、その直後に供給される。

10

【0023】

元の遺伝子の場所に第二の機能配列を含むクローンの純粋な集団を、再構築機能選択マーカー遺伝子を用いた選択により得ることができる。例として、第一の機能配列を用いて導入した不活性化ATG欠失選択マーカー遺伝子を、活性プロモーターと第二の機能配列をもつインフレームATGコドンの供給により再構築できる。

【0024】

本発明の実施態様(1)の第二の選択肢(工程(a)、(b)および(c2)を含有する)において、元の遺伝子産物をコードする遺伝子を直接(すなわち、前駆細胞の供給なしに)、標的遺伝子産物をコードするDNA配列を含む機能DNA配列(以降、簡単に「第三のDNA配列」と称する)と置き換えることができる。前記第三のDNA配列を前述のように、一工程または複数工程の方法で取り込むことができる。第三のDNA配列はさらに、前述の第一および第二のDNA配列と同様の(プロモーター、マーカー等のような)機能配列を含む。本発明の実施態様(1)の第二の選択肢は、たった一つの標的遺伝子産物が産生され、その結果、前駆細胞の産生が必要ないならば、特に好ましい。

20

【0025】

本発明の好ましい実施態様(2)において、元の細胞は好ましくは、ヒトーマウスのヘテロハイブリドーマ細胞、好ましくはヘテロハイブリドーマ細胞HCB-P1(DSM ACC2104)である。機能DNA配列の組み込みを、Ig座で、好ましくはハイブリドーマ細胞のヒト再編成Ig座(例えば、重鎖または軽鎖(λまたはκ))の一つで行うことができる。再編成免疫グロブリン座は、ハイブリドーマを生じるBリンパ球の成熟過程で生殖系列の染色体構造から修飾された機能Ig遺伝子(重鎖λまたはκ)周辺のゲノム配列である。IgH座は染色体14q32.33に位置する。HCB-P1において、この場所は、μイントロンを介してCμ配列(DD 296 102 B3)に隣接した、D遺伝子を介してJH 6遺伝子に隣接した、再編成され、アフィニティ成熟したVH1-2遺伝子により形成される。HCB-P1-IgH座の再編成VDJ領域の配列を配列番号:12に規定する。

30

【0026】

本発明の実施態様(3)および(5)の細胞はHCB-P1(DSM ACC2104)に由来することが好ましい。さらに、本発明の実施態様(3)において、標的遺伝子産物は抗体であることが好ましい。そのような場合、細胞は好ましくはPBG04(DSM ACC2577)である。特に、抗体の発現に用いられる上記細胞において、軽鎖が不活性化され、同一の、または異なる標的遺伝子産物をコードする遺伝子で置き換えられていることが適している。

40

【0027】

その上、前記のように、HCB-P1由来の細胞系の発現により得られうる標的遺伝子産物は、独特の、基本的なヒトグリコシル化パターンを有している。

【0028】

治療用途のための糖タンパク質、特に抗体は、N結合グリカンのような翻訳後修飾は哺乳動物のみで生じ、それらはこれらのタンパク質の薬学的特性に実質的な影響をもつので、典型的には哺乳動物細胞で製造される。完全に処理されたNグリカンは、コアとしてフ

50

コースを、末端にシアル酸をもつ二触角（バイアンテナリー；biantennary）構造を形成する（図15）。生理的条件下で、大部分のタンパク質は、完全な構造の先が切り取られた形をしている。グリコシル化が完了する程度は、細胞型だけでなく、培養条件にも依存する。

【0029】

シアル化、末端シアル酸のグリカンへの付加の程度は変化し、ヒト血液中の抗体で、30－40％である。しかし、シアル化されたタンパク質が高いパーセンテージであると、血液中で治療タンパク質の半減期は増加する。H－C B－P 1由来の細胞系、例えばP B G 0 4は、実施例5に見られるように、糖タンパク質の製造に広く用いられているC H O細胞およびN S 0細胞に比べ、高度にシアル化された糖タンパク質を産生する。治療用糖タンパク質について、ガラクトース添加前の末端のグリカン（G 0構造）が低含量であることが好都合である。そのため、G 0糖タンパク質は二量体化しやすく、補体に依存した細胞毒性を調節する抗体の能力が減退する。P B G 0 4の遺伝的組成により、G 0構造が低いもの（ローラボトル工程でレプチン－F cの4. 3％）を用いて、より完全なプロセシングが起きる。

10

【0030】

一般的なバイアンテナリー構造は全ての哺乳動物で形成される一方、いくつかの特異的な構造（個々の糖の間の結合）はヒトに特異的、あるいはヒトが完全に除外される。これらの構造は同様に生物学的特性に影響する。それゆえ、ヒト特異的な修飾を生成するために必要な酵素を供給し、特殊な結合の原因であるヒト細胞には存在しない酵素を欠損する、治療用途の糖タンパク質を製造するために、細胞を用いることは好適である。そのような細胞は全くヒト由来であるか、またはヒト染色体の一部を含んでいる。後者の細胞において、ヒト特異的なグリコシル化酵素がヒトに存在しない細胞を支配することが重要である。

20

【0031】

ノイラミン酸がN-アセチルノイラミン酸またはN-グリコリルノイラミン酸として付加されると、後者はマウス細胞の主たる構造となる。N-グリコリルノイラミン酸は旧世界猿とヒトのグリカンには存在しない。それらは免疫原性であり、治療用タンパク質に対する抗体の形成をもたらす。

【0032】

さらに、マウス細胞はもう一つのグリコシル化酵素であるアルファ1, 3ガラクトシルトランスフェラーゼを含んでいる。これはg a l残基をグリカンの露出したg a l残基に転移する反応を仲介する。そのような結合はまた、酵母に見出され、防御として、ヒトはこの構造に対する抗体を予め有している。認識により、免疫複合体が形成され、その結果、腎障害を起こす。レプチン－F c由来のP B G 0 4の1. 3％だけがアルファ1, 3g a lを含んでいる。

30

【0033】

ほんの一握りのヒトタンパク質が分岐したN-アセチルグルコサミンを含んでいる。それ自体、生物学的特性に影響はしないが、酵素複合体がコアのフコシル化を仲介する別の酵素を阻害する。しばしば、分岐したN-アセチルグルコサミンをもつタンパク質において、コアのフコースがなくなり、より効果的なF c－ガンマ受容体の結合と、抗体に依存した細胞性細胞毒性（A D C C）の促進をもたらす。それゆえ細胞は、コアでないフコシル化タンパク質の割合を増加するための（1, 4）－N-アセチルグルコサミントランスフェラーゼI I Iを発現するように操作された。（米国特許第6, 602, 684号）

40

【0034】

コアのフコースのない高含量の糖タンパク質はまた、マウス細胞で得られる。しかし、これらのタンパク質はマウスタンパク質に特徴的な、不利な特性を含む。ヒトと、正しい染色体組成細胞をもつマウスの特異的な雑種細胞は両者の有利な特性を合わせることが可能である。P B G 0 4のようなH－C B－P 1由来の細胞系はそのような細胞系である。

【0035】

50

本発明はさらに、以下の実施例により説明されるが、これらは発明を限定するものではない。

【0036】

細胞系H-CB-P1は、ベルリン・ブーフ（Berlin Buch）、ロベルト・レスル通（Robert o-Rossle-Str.）10（DDR-1115）の「ドイツ民主共和国自然科学アカデミー微生物学中央研究所（Zentralinstitut für Molekularbiologie, Akademie der Wissenschaften der DDR）」に、1990年3月16日に、ZIM-0517として寄託され、ドイツ、ブラウンシュバイク（Braunschweig）38124、マシュローダー・ヴェーク（Maschrodere Weg）13のDSMZ（ドイツ微生物細胞培養コレクション（Deutsch Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH））に、2000年12月12日に移管され、受託番号DSMZ ACC2104を付与された。PBG03クロンD3（pVHCμCEShobFcb las）をPBG04とリネームし、DSMZに2002年9月18日に、DSMZ ACC2577として寄託した。

【実施例】

【0037】

材料と方法

材料：

DNAクローニング法

ゲノムDNAの単離： T25 cm² フラスコの細胞をトリプシン処理し（下記「トリプシン処理」の章を参照せよ）再懸濁した細胞ペレットを1.5 ml エッペンドルフチューブに移し、200 μl のPBSを添加した。チューブを5分間、13,200 rpmで遠心し、上清を捨て、ペレットを2 ml の溶液Aに再懸濁した。懸濁液をファルコンチューブ（15 ml）に移した後、133 μl の10% SDSと333 μl のプロテアーゼKを添加した。55℃で3時間のインキュベーション、または室温で一晩のインキュベーションを続けて行った。懸濁液を607 μl の6 M NaClと混合し、遠心（4300 rpm、4℃、20分）前に15秒間ボルテックスで攪拌した。上清をファルコンチューブ（15 ml）に移し、2.5 ml の100% エタノールと混合した。界面に形成された糸状のDNAの沈殿をピペットチップで取り、1/2 TE緩衝液に再懸濁した。DNAを4℃で保存する前に、56℃で完全に溶解した。

【0038】

PCR： PCR法をゲノムDNA配列の単離（調製用PCR）、またはあるDNA配列の検出（分析PCR）のために用いた。

【0039】

調製用PCR： 調製用PCR反応（50 μl）をExpand High Fidelity PCRキット（ロッシュ（Roche））を用いて、製造者の指示に従って準備した（20-30 ngの鋳型、5 μl の15 mM MgCl₂ 緩衝液（10×）、5 μl のdNTPミックス、0.5 μl のそれぞれのプライマー（30 nM）、0.5 μl のポリメラーゼを水で50 μl にした）。PCR産物をQIAquick purification kit（キアゲン（QIAGEN））を用いて精製した。

【0040】

分析PCR： 分析PCR反応（10 μl）をTaqポリメラーゼキット（キアゲン）を用いて、製造者の指示に従って準備した（10 ngの鋳型、1 μl の10×緩衝液、0.5 μl のdNTPミックス、0.1 μl のそれぞれのプライマー（30 pM）、0.1 μl のTaqポリメラーゼを水で10 μl にした）。

【0041】

PCRサイクルのプログラムは、プライマーのアニーリング温度（表2を参照せよ）と予想されるPCR産物の長さ（伸長時間と温度が決定される；表1を参照せよ）により、

それぞれの産物により変化する。

【表 1】

表 1：増幅断片の長さが伸長時間を決定する

パラメーター	長さ、時間 温度	長さ、時間 温度	長さ、時間 温度	長さ、時間 温度	長さ、時間 温度
断片の長さ	< 750 bp	1.5 kb	<3 kb	> 3 kb	6 kb
伸長時間	45 秒	1 分	2 分	3 分 + 15 秒 (各ステップ後)	4 分 + 15 秒 (各ステップ後)
温度	72°C	72°C	72°C	68°C	68°C

10

【表 2】

表 2：プライマーのアニーリング温度

プライマー/配列番号：	配列 (アニーリング温度 [°C])	製造元
VHpromF/1	ATACTAGTCGGCCG CAGGCACATCCACAGTCAC (55)	GIBCO BRL
VHpromR/2	TCCC6GGTATCGATGGAGCTCTCAGGGGATTC (55)	GIBCO BRL
CpintV/3	CATCGATCCGCTACTACTACTACATGG (55)	GIBCO BRL
CpintR/4	CGGCCACGCTGCTCGTAT (55)	GIBCO BRL
CpMitteR/5	AGCTCACCTGGTGCAACT (54)	GIBCO BRL
CpMitteF/6	GACCTAAGCTGACCTAGAC (54)	GIBCO BRL
V5/7	TCCCTC-CAAAAGCTGTAG (52)	TIB
V6/8	ATGGCGGTAATGTTGGAC (52)	TIB
V7/9	CACAAGAATCCGCACAGG (54)	TIB
EBVtestR/10	CCTGATATTGCAGGTAGG (52)	GIBCO BRL
EBVtestF/11	TACCGACGAAGGAAC TTG (52)	GIBCO BRL

20

太字：制限部位

【0042】

プラスミド DNA の増幅、単離および定量： 大腸菌形質転換体を 1 ml、30 ml、または 100 ml 培養で生育させ、プラスミド DNA をそれぞれ Mini-、Mid i-、または Maxi-プラスミド精製キット（キアゲン）を用いて単離した。製造者の指示に従った。DNA 濃度を分光光度計で、260 nm と 280 nm の吸収を測定することにより定量した。

30

【0043】

制限酵素による消化： プラスミド DNA を、1 μg の DNA あたり 1 単位の適当な制限酵素で、業者の推奨する緩衝液と温度を用いて消化した（表 3 を参照せよ）。分析に二つ以上の制限酵素が必要ならば、可能ならば、反応を同時消化で行った。さもなければ、反応液のカラム精製工程（キアゲン）を介在させて、経時的に単一の消化を行った。

【表 3】

表 3：使用した制限酵素

酵素	濃度	温度	緩衝液	不活性化	製造元	製品番号
BamHI	20 U/μl	37°C	2°	65°C	BioLabs	R0136L
BglIII	40 U/μl	37°C	M	65°C	Boehringer	1175068
BsaBI	10 U/μl	60°C	2	80°C	BioLabs	R0556S
BsiWI	10 U/μl	55°C	3	80°C	BioLabs	R0136L
Bst11071	5 U/μl	37°C	3 + BSA	80°C	BioLabs	R0553S
BstBI	20 U/μl	65°C	4 + BSA	80°C	BioLabs	R0519S
ClaI	10 U/μl	37°C	H	65°C	Roche	404217
DraIII	20 U/μl	37°C	3 + BSA	65°C	BioLabs	R0510L
EagI	10 U/μl	37°C	3 + BSA	65°C	BioLabs	R0505S
EcoRI	40 U/μl	37 °C	H	65°C	Roche	200310
HincII	10 U/μl	37°C	3 + BSA	65°C	BioLabs	R0103S
HindIII	40 U/μl	37°C	B	5°C	Roche	798983
KpnI	10 U/μl	37°C	L	65°C	Roche	899186
MfeI	10 U/μl	37°C	4	65°C	BioLabs	R0589S
NotI	10 U/μl	37°C	3 + BSA	65°C	BioLabs	R0189L
PmeI	10 U/μl	37°C	4 + BSA	65°C	BioLabs	R0560L
PstI	10 U/μl	37°C	H	80°C	Roche	621633
PvuII	5 U/μl	37°C	3 + BSA	65°C	BioLabs	R0150S
SacII	20 U/μl	37°C	4 + BSA	65°C	BioLabs	R0157S
SalI	10 U/μl	37°C	H	65°C	Boehringer	567663
ScaI	10 U/μl	37°C	H	80°C	Roche	775266
SmaI	20 U/μl	37°C	4 + BSA	65°C	BioLabs	R0141S
SpeI	10 U/μl	37°C	2 + BSA	65°C	BioLabs	R0133L
SspI	5 U/μl	37°C	2 + BSA	65	BioLabs	R0182L
StyI	10 U/μl	37°C	H	65°C	Roche	85111023
SwaI	10 U/μl	25°C	3 + BSA	65°C	BioLabs	R0604L
XbaI	10 U/μl	37°C	H	65°C	Boehringer	674265

a. 特別な緩衝液

【0044】

5' 突出末端をもつ DNA の末端修復： EcoRI で作られるような 5' 突出を「平滑」にするために、消化した DNA を製造者の指示に従って、クレノウ（Klenow）断片（ロッシュ）で処理した。末端を埋める反応を熱不活性化工程（65°C、20分）により停止し、DNA をエタノール沈殿するか、または直接ゲル精製にかけた。

【0045】

ベクター DNA の脱リン酸化： 直鎖化したベクター DNA が適合する末端と自己ライゲーションすることを防ぐために（下記の「ライゲーション」を参照せよ）、DNA を製造者の指示に従い、アルカリホスファターゼ（AP）（ロッシュ）を用いて脱リン酸化した。AP を熱により不活性化し（65°C、15分）、ライゲーション反応に用いる前に、DNA をゲル精製した（電気泳動については、下記の「アガロースゲル電気泳動」を参照せよ）。

【0046】

TOPO クローニング： PCR 増幅産物をインビトロジェンの TOPO ベクターにクローニングした。TOPO クローニングキットの指示に従い、精製された PCR 産物（0.

10

20

30

40

50

25-2 μl)を塩溶液(0.5 μl)と混合し、水を加えて容量を2.5 μl とした後、T O P Oベクター(0.5 μl)を添加した。室温で30分間のインキュベーションの後、反応チューブを氷上に移し、反応液の2 μl を「ワンショット化学的コンピテント大腸菌(one shot chemically competent E. coli)」に添加し、細胞を氷上で30分間インキュベートした。細胞に熱ショック(42℃、30秒)を与え、直ちに氷上に戻し、室温のS O C培地を250 μl 添加した。混合液をカナマイシンまたはアンピシリンのいずれかを含むL Bプレートに播く前に、形質転換反応液を37℃で1時間、振盪(300 r p m)しながらインキュベートした。プレートを37℃で一晩インキュベートした。

【0047】

ライゲーション： 全てのライゲーション反応を、0.1-1 μg の脱リン酸化ベクターと過剰量のインサートを用いて、10 μl の容量で行った。反応液は2 μl のT4ライゲーション緩衝液(G i b c o B R L)と1 μl のT4リガーゼ(ロッシュ)を含み、16℃で2時間、または4℃で一晩インキュベートした。ライゲーション反応液を細菌に形質転換した。

【0048】

不要な非組換え体のレベルを下げるために、自己ライゲーションしたベクターに唯一の制限部位があるならば、ライゲーション反応液を適切な制限酵素で反応後消化した。消化後、ライゲーション反応液を、再溶解したD N Aを再び形質転換反応に用いる前に、アクリルアミド存在下で、エタノール沈殿した(4℃、14,000 r p m、15分の遠心)。

【0049】

コンピテント細菌の形質転換： コンピテント大腸菌X L 2 (-70℃で保存)を氷上で融解し、ライゲーション反応液(氷上保存、上記「ライゲーション」を参照せよ)または1-100 n gのプラスミドD N A(再形質転換)のいずれかと混合し、氷上で20分間インキュベートした。続いて、形質転換反応液を熱ショック(30-60秒、42℃)に付し、チューブを氷上に戻した。205 μl のS O C培地(抗生物質なし)を添加し、反応液を37℃で45分間、振盪(300 r p m)しながらインキュベートした。形質転換反応液を抗生物質(カナマイシン(40-60 $\mu\text{g}/\text{ml}$)またはアンピシリン(50-100 $\mu\text{g}/\text{ml}$)のいずれか)を含むL Bプレートに播き、37℃で一晩インキュベートした。細菌のコロニーをカウントし、形質転換反応の効率を計算した。

【0050】

アガロースゲル電気泳動： D N A断片をその長さに従って、0.7-1.5% アガロースゲルで分離した。アガロースを1×T A E緩衝液に溶解し、2 μl の臭化エチジウム/100 m lのアガロースを添加した。アガロースを溶解し、トレイに注いでセットした。D N A試料をローディング緩衝液オレンジG(O r a n g e G)と混合し、水平ゲルにのせ、ランニング緩衝液として1×T A Eを用いて、40-90 Vで泳動した。D N A/臭化エチジウム複合体をU V光で可視化した。

【0051】

D N A断片のゲル精製： D N Aをアガロースゲルで分離し(40-80 V)、対象のD N Aバンドをメスで切り出した。Q I A q u i c kゲル抽出キット(キアゲン)を用いて、製造者の指示に従って、D N Aをアガロースブロックから抽出した。

【0052】

細胞培養

トリプシン処理： 接着細胞をトリプシンを用いて回収した。まず培地を除去し、細胞単層をクエン酸緩衝液(予め37℃に暖めておく)で洗浄した。少量のトリプシンを直接細胞単層に添加し、37℃で3-5分間インキュベートした。5% F C Sを添加したP B G 1.0 培地を添加することにより、トリプシン処理を停止させた(表4を参照せよ)。細胞懸濁液をファルコンチューブ(50 m l)に移し、10分間遠心した(800 r p m、30℃)。細胞ペレットを新鮮な培地に再懸濁し、該細胞を電気穿孔法または

10

20

30

40

50

さらなる実験に用いた。

【表 4】

表 4：異なるフラスコで生育した細胞のトリプシン処理に用いたクエン酸、トリプシン、及び5% FCSを添加した PBG 1.0の量

組織培養フラスコ	クエン酸緩衝液 (ml)	トリプシン (ml)	PBG 1.0/5%FCS (ml)
T25	1.0	0.5	4.5
T85	2.0	1.0	9.0
T180	5.0	2.0	8.0

10

【0053】

細胞のカウンティング

細胞をトリプシン処理した後、ノイバウワーチャンバー（ヘマトサイトメーター）でカウントした。少量の細胞懸濁液をチャンバーに入れ、該チャンバーを顕微鏡下に置いた。チャンバーの四つの四角のうちの一つの中の細胞だけをカウントし、mlあたりの細胞数を得るために、細胞数を 10^4 倍した。生細胞と死細胞を区別するために、カウント前に細胞をトリパンブルーで染色した。死細胞は青くなり、一方生細胞は色素を取り込まなかった。

20

【0054】

形質転換

H-CB-P1細胞の電気穿孔法：標準的な電気穿孔法の反応では、 $10\ \mu\text{g}$ の直鎖化したプラスミドDNAを用いた。培養培地を除去し、H-CB-P1単層をクエン酸緩衝液で洗浄し、トリプシン処理した（上記「トリプシン処理」を参照せよ）。細胞ペレットをOpti-MEM（予め 37°C に暖めておく）に再懸濁し、mlあたり 3×10^6 細胞とした。 $700\ \mu\text{l}$ の細胞懸濁液を電気穿孔法用キュベット（peqLab; EQU BIO 4mm）に移し、直鎖化したDNA（ $10\ \mu\text{g}$ ）を添加した。細胞を250 V、 $1500\ \mu\text{F}$ で電気穿孔し、直ちに予め暖めた、5% FCSを添加したPBG 1.0 培地を入れたT75ボトルに移し、 37°C 、5% CO_2 でインキュベートした。

30

【0055】

選択

H-CB-P1細胞の選択：電気穿孔したH-CB-P1細胞を2日間、 37°C 、5% CO_2 で培養した。2日目、培養培地を除去し、非接着細胞を培養培地の遠心により回収した。1 mlの培養培地（上清）を後の一過性発現試験のために凍結した。トリプシン処理した細胞単層と遠心により培養培地から回収した細胞を合わせて、沈殿とした。細胞を5% FCSを添加したPBG 1.0 培地に再懸濁し、 1×10^6 細胞/ml、 1×10^5 細胞/ml、 1×10^4 細胞/mlの希釈液を作製した。それぞれの希釈液に $5\ \mu\text{g}/\text{ml}$ または $10\ \mu\text{g}/\text{ml}$ のブラストサイジン、または $200\ \mu\text{g}/\text{ml}$ または $400\ \mu\text{g}/\text{ml}$ のハイグロマイシンを添加した。選択培地を4日目、7日目、10日目に交換し、H-CB-P1クローンの生育を顕微鏡下で制御した。8日目と10日目の間に、生細胞が目視できた。13日目、クローンをトリプシン処理により回収し、細胞を96ウェルのプレートに播いたときに、ウェルに5細胞または1細胞が含まれるように、細胞ペレットをPBG 1.0 培地に懸濁した。選択圧（ $5\ \mu\text{g}/\text{ml}$ または $10\ \mu\text{g}/\text{ml}$ のブラストサイジン、または $200\ \mu\text{g}/\text{ml}$ または $400\ \mu\text{g}/\text{ml}$ のハイグロマイシン）をその間維持した。10日目、陽性細胞クローンと陰性細胞ク

40

50

ローンを区別するために、細胞を免疫染色した。細胞培養培地を除去し、細胞により産生される組換えタンパク質を認識する蛍光標識された抗体 ($2 \mu\text{g}/\text{ml}$) を添加した標準培地に置き換えた。抗体懸濁液を 5% FCS を添加した OptiMem 1 に置き換える前に、4 時間、細胞単層上に置いた。細胞単層を蛍光顕微鏡で観察した。テキサスレッド結合抗体を用いる場合、 $470-480 \text{ nm}$ のスペクトルを透過する UV フィルター (WG) の顕微鏡を用いた。励起したテキサスレッド標識抗体は 590 nm のスペクトルの光を放出する。 $330-355 \text{ nm}$ のスペクトルを透過する UV フィルター (WU) を AMCA に結合した抗体を可視化するために用いた。励起 AMCA の放射光は青色のスペクトル (420 nm) を生じた。大きく、強い蛍光のクローンのみを考慮した。一つのウェルに単一のクローンのみとし、該細胞をさらにひろげた。一つのウェルに一つのクローン以上がある場合、個々のクローン (細胞) をマイクロキャピラリーでつり上げさらにひろげるために、新しい 96 ウェルプレートに移した (以下の「マイクロキャピラリーによるつり上げ」を参照せよ)。

【0056】

マイクロキャピラリーによるつり上げ: マイクロキャピラリーピッキング装置として、ジョイスティックにより制御される可動アームについているキャピラリーを用いた。マイクロキャピラリーとアームをフードの内側に、ジョイスティックを外側から制御した。対象のクローンを免疫染色法 (上記「H-CB-P1 の選択」の項に記載) により同定する場合、マイクロキャピラリーをクローンの上に置き、真空ポンプでキャピラリー内を陰圧にし、対象の細胞塊をキャピラリーに吸引した。アームを 96 ウェルプレートの新しいウェル上へ動かし、細胞をその中に注入した。

【0057】

凍結保存: 長期間、細胞を保存するために、トリプシン処理した細胞を 1×10^6 から 1×10^7 細胞/ ml で再懸濁した。細胞を遠心 (700 rpm 、10 分) により沈殿させ、上清を除去した。細胞を冷却した前ならし培地 ($900 \mu\text{l}$) に再懸濁し、凍結バイアルを $180 \mu\text{l}$ の DMSO と $720 \mu\text{l}$ の FCS で満たし、 $900 \mu\text{l}$ の細胞懸濁液を DMSO/FCS 溶液中に移した。凍結バイアルを 24 時間、特別な凍結容器で保存し、緩やかに細胞を凍結させた。長期間の保存のために、凍結バイアルを液体窒素タンクへ移した (-196°C 保存)。

【0058】

タンパク質産物の検出

EC-ウェスタンブロット (増強化学発光): h o b F C 抗体の検出のために、 $20 \mu\text{l}$ の細胞培養上清を $10 \mu\text{l}$ の 5% SDS と混合し、2 分間、 97°C でインキュベートした。細胞培養培地は IgM 抗体を含むと予想されるので、培養培地は処理しなかった。メンブタン (アマシャム-ファルマシア (Amersham-Pharmacia) ; ハイボンド-P) を最初にメタノールでリンスし (1 分)、水で 3 回洗浄し (1 分)、ブロットトランスファー緩衝液に浸した 3 MM 濾紙片に置く前に、メンブタンをブロットトランスファー緩衝液に浸した。 $5 \mu\text{l}$ の前処理した培養培地 (h o b F C 抗体) または $5 \mu\text{l}$ の未処理の (IgM 抗体) 培養培地をメンブタンにスポットし、1 分間インキュベートした。メンブタンをブロッキング緩衝液に置き、振盪しながら、30 分間インキュベートし、T-PBS での 5 分間の洗浄を 3 回行った。ブロッキングしたメンブタンを検出抗体溶液 (IgG 1:2000、および IgM 1:5000) に置き、2 時間インキュベートした。T-PBS での 2 分、5 分および 10 分のさらなる洗浄を続けた。メンブタンを現像液 (アマシャム-ファルマシア、ECL) 中に置き、1 分間インキュベートした。最後に、水分をどかし、3 MM 濾紙に載せ、乾燥しないようにセロファンでラップした。放射光を暗室で観察した。

【0059】

実施例 1: H-CB-P1 細胞の IgM 領域に特異的なターゲティングベクターの調製

抗体が高発現し、タンパク質が分泌されることがよく知られているので、組換え遺伝子を IgM 配列領域に挿入した。それゆえ、最終的なターゲティングベクターには標的とさ

れるゲノム I g M 配列と 1 0 0 % 相同性を有する配列が必要である。基本のターゲティングベクター p V H C μ では、長さが 2 k b の V H 領域と 7 . 4 k b の C μ イントロン領域を選択した（図 3 を参照せよ）。両者を校正活性をもつポリメラーゼ（プルーフスタート・ポリメラーゼ（キアゲン））を用いた P C R の断片として単離し、p C R 4 B l u n t T O P O ベクター（インビトロジェン）にサブクロニングし、最終的に p V H C μ と命名した一つのベクターに合わせた（図 3 を参照せよ）。

【 0 0 6 0 】

プラスミド p V H C μ C E S H h o b F c と p V H C μ H h o b F c の調製： 基本のターゲティングベクター p V H C μ は内在性カセットをもたない。C E プロモーター、代替遺伝子 h o b F c 、三つの F R T 組換え部位、さらにハイグロマイシン耐性遺伝子および A T G 欠失ネオマイシン遺伝子を含む内在性カセットをベクター p C E S H h o b F c から B s t D I - S w a I 断片として単離した。断片の末端を K l e n o w ポリメラーゼで埋め、P m e I で消化し、脱リン酸化した基本のターゲティングベクター p V H C μ とライゲートした。得られたターゲティングベクターを p V H C μ C E S H h o b F c とした。

10

【 0 0 6 1 】

C E S プロモーター構築物を欠くが、内在性カセットのその他の部分を全て含む第二のベクター p V H C μ H h o b F c をさらに構築した。B s t B I - B s t l 1 0 7 I 断片を p C E S H h o b F c から単離し、末端を埋めた。p C E S H h o b F c の B s t l 1 0 7 I 制限部位は、f r t w t 部位とそれに続く h o b F c 遺伝子のすぐ上流にあり、それゆえ単離した B s t l 1 0 7 I - B s t b I 断片はプロモーターを欠いている。断片を前に P m e I で消化した p V H C μ ベクターにライゲートし、得られたベクターを p V H C μ H h o b F c とした。p V H C μ C E S H h o b F c と p V H C μ H h o b F c の両ベクターにおいて、内在性カセットの活性のある耐性マーカー遺伝子はハイグロマイシン耐性遺伝子であった。ハイグロマイシン遺伝子の代わりにブラストサイジン遺伝子を含む別のセットのベクターも作製した。

20

【 0 0 6 2 】

p V H C μ C S H h o b F c b l a s と p V H C μ h o b F c b l a s の構築： 内在性カセット中のマーカー遺伝子としてブラストサイジン遺伝子をもつターゲティングベクターを作製するために、ベクター p c D N A T R D をブラストサイジン遺伝子のドナーとして用いた。最初の工程として、ハイグロマイシン遺伝子とブラストサイジン遺伝子の交換があげられる。このために、ブラストサイジン遺伝子を E c o R I - S a l I 断片として、p c D N A T R D から単離した。内在性カセットベクター p c E S H h o b F c も E c o R I - S a l I を用いて開環し、これによりハイグロマイシン遺伝子を A T G 欠失ネオマイシンの部分とともに除去した。ブラストサイジン遺伝子を含む断片を開環した p C E S H h o b F c にライゲートし、得られたベクターを p C E S h o b F c b l a s d e l e t e d と命名した。

30

【 0 0 6 3 】

第二工程は、偶然に除去された A T G 欠失ネオマイシン遺伝子の再挿入であった。そのために、A T G 欠失ネオマイシン遺伝子を包含する断片を p C E S H h o b F c から単離し、開環したベクター p C E S h o b F c b l a s d e l e t e d に挿入した。得られたベクターを p C E S h o b F c b l a s とした。このベクターをブラストサイジン遺伝子のドナーベクターとして、p V H C μ C S H h o b F c と p V H C μ H h o b F c に用いた。B a m H I - S a l I 断片を p C E S H h o b F c b l a s から単離し、B a m H I - S a l I で開環したベクター p V H C μ C E S H h o b F c に挿入し、p V H C μ C E S H h o b F c b l a s を生じさせた。C E S プロモーターを欠く対照ベクター p V H C μ h o b F c b l a s を作製するために、ベクター p V H C μ H h o b F c もまた、B a m H I - S a l I で消化し、再び p C E S h o b F c b l a s から単離した B a m H I - S a l I 断片をそこにライゲートした。

40

【 0 0 6 4 】

50

実施例 2 : h o b F c クロンの選択

電気穿孔法 : H - C B - P 1 細胞をプラスミド p V H C μ C s h o b F c b l a s、p V H C μ h o b F c b l a s、p V H C μ H h o b F c および p C S h o b F c b l a s を用いて、電気穿孔法で処理した。トランスフェクション効率を調べるために、細胞をプラスミド p G F P N 1 V A でトランスフェクトし、模擬対照として、細胞を水試料を用いて、電気穿孔処理した。トランスフェクション効率は約 20 % であることが明らかとなった。電気穿孔処理後 2 日目に、トランスフェクトしたプラスミドに応じて、ハイグロマイシンまたはブラストサイジンのいずれかを培養培地に添加した。模擬トランスフェクト細胞が全て死滅した場合、他のトランスフェクション反応の細胞を集め、96 ウェルプレートのウェルあたり 1 細胞または 5 細胞のいずれかの密度で再度播いた。細胞を、適当な抗生物質を添加した培地で培養し続けた。

【0065】

選択条件を最適化するために、細胞を電気穿孔処理後 2 日目に、T75 フラスコ中 20 ml に対して 10^4 細胞、 10^5 細胞、または 10^6 細胞播いた。培地には、5 μ g / ml または 10 μ g / ml のブラストサイジン、または 200 μ g / ml または 400 μ g / ml のハイグロマイシンを添加した。14 日目、 cm^2 あたりのクローン数を調べた。クローンの最高数は、CES プロモーターを欠くプラスミド (p V H C μ h o b F c b l a s) でトランスフェクトした 1×10^6 細胞を播いたフラスコで得られた。細胞を CES プロモーターをもつプラスミドでトランスフェクトすると、1 / 3 のクローン数となった。さらに、これらのクローンの生育は CES プロモーターをもたないものよりも悪かった。

【0066】

抗生物質がもつ、タンパク質産生クローンの選択に対する効果 : T75 フラスコのクローンの拡張に続き、クローンをトリプシン処理し、96 ウェルプレートに 5 細胞 / ウェルで再度播いた。培養培地には、5 μ g / ml または 10 μ g / ml のブラストサイジン、または 200 μ g / ml または 400 μ g / ml のハイグロマイシンのいずれかを添加した。播種後 10 日目に、細胞をテキサスレッドを結合した抗 Ig G 抗体と AMC A 標識した Ig M に対する抗体を用いて染色した。ブラストサイジンを用いて培養した細胞では、高濃度の抗生物質を用いると、陽性クローンは減少するという結果を示した。10 μ g / ml のブラストサイジンを用いると、5 μ g / ml の場合に比べて、100 % 以上の h o b F c の陰性クローンを観察した。しかし、10 μ g / ml のブラストサイジンを用いて培養した細胞を含む 96 ウェルプレートの最初の 3 列をカウントし、プレート全体の結果を出したが、5 μ g / ml のブラストサイジンを用いて培養した細胞を含む 96 ウェルプレートは全ての列をカウントした。

【0067】

蛍光標識した抗体を用いた選択の利点 : 免疫蛍光染色法を用いて、多数のクローンを迅速にスクリーニングできる。直接免疫法を用いて得られた結果は、標的配列のゲノム DNA への正しい組み込みの最初の兆候であった。発現しないクローンをこの方法で容易に検出した。免疫蛍光染色法は技術的に容易で、メチルセルロース染色法よりも低濃度の抗体を必要とし、細胞の生育に障害を与えない。顕著な傷害なしに、トリプシン処理や細胞を新しい培養器に移すためのマイクロキャピラリーつり上げの前に、細胞を免疫染色することができる。

【0068】

実施例 3 : I g M 座への相同な挿入の検出

ターゲティングベクターをデザインするため、再編成した免疫グロブリン重鎖座を、抗体の c DNA 配列とヒトゲノム配列の情報を基に、組み立てた。I g M の産生がターゲティング法によりだめになることを確実にするために、A T G を含む完全なリーダー配列、V、D および J 遺伝子をターゲティングベクターから除き、1 回の相同組換え事象によりゲノムから削除した。それゆえ、置き換え型のターゲティングベクターは I g M 座と同一の遺伝子型の配列を含み、h o b F c 遺伝子、ブラストサイジンおよび A T G 欠失ネオマ

イシン耐性遺伝子と直接交叉できる。第14番染色体上に唯一の再編成された活性のある I g M座が元の細胞系H-C B-P 1に存在するので、相同組換え事象は、蛍光抗体染色と抗 I g M抗体を用いた上清のイムノブロッティングにより検出される I g Mの発現を完全に止めてしまう。

【0069】

I g Mと I g Gのウェスタンブロット（ドットブロット）：ドットブロット法を、直接免疫染色法で得られた結果を検証するために用いた。これらのクローンの上清（培地）について、I g Mと I g Gが存在するかを試験した。上清において I g M陰性、I g G陽性であれば、相同組換えが起きたと結論できた。

【0070】

組み込まれた標的配列の検出のための P C R：ターゲティングカセットが I g M座に組み込まれたかを検証するために、フォワードプライマー V 5（配列番号：7）およびリバースプライマー V 6（配列番号：8）または V 7（配列番号：9）と、鋳型として細胞クローンから単離したゲノム D N Aを用いた P C R反応を準備した。プライマー V 5は、ターゲティングベクターに存在する V h p r o m断片の外側のゲノム V 遺伝子プロモーター配列に結合し、リバースプライマー V 6は、C E Sプロモーター内側に結合し（それゆえ、C E Sプロモーターをもつプラスミドでトランスフェクトした細胞の場合のみ用いられる）、プライマー V 7は h o b F c 遺伝子の内側に結合する。記載したプライマーの組合せを用いると、P C R産物の存在は両方のプライマー結合配列がともに局在すること、すなわち相同組換えに完全に依存する。P C Rアッセイの感度を増加するために、一回目の P C R産物を鋳型として、プライマー V H p r o m F（配列番号：1）と V H p r o m R（配列番号：2）を用いたネスト P C R反応に用いた。最終的なネスト P C R産物を H i n c I Iと D r a Iの制限酵素消化にかけ、得られた配列が正しいことを確認した。これら全てのアッセイから、P B G 0 3クローン H 6（p V H C μ h o b F c b l a s）、D 4（p V H C μ h o b F c b l a s）、E 1 1（p V H C μ h o b F c b l a s）、D 3（p V H C μ C E S h o b F c b l a s）および G 8（p V H C μ h o b f c b l a s）には正しく標的配列が組み込まれていた。クローン D 3（p V H C μ C E S h o b F c b l a s）を P B G 0 4とリネームし、ドイツ微生物・細胞培養コレクション（D S M Z）に寄託した。

【0071】

実施例 4：標的細胞クローンを作製するための組換え

クローン p V H C μ C E S h o b F c b l a s D 3（P B G 0 4）を、第二の機能配列（f r t w t、G F P O R Fおよびポリアデニル化シグナル、A T Gと f r t 5に続く最小プロモーター）を含有するベクター 2、および f l pリコンビナーゼの機能発現ユニットを含有するプラスミド p f l pで、トランスフェクション試薬エフェクテン（e f f e c t e n e）（キアゲン）を用いて、トランスフェクトした。ベクター 2は G F P 発現ユニットを動かすプロモーターを含まない。機能化細胞（P B G 0 4）は、200 μ g / m lからのジェネティシン選択に感受性である。ベクター 2は、ジェネティシン耐性を賦与するネオマイシン耐性遺伝子がない。予想されるように、緑色蛍光はトランスフェクション後1-4日では検出できなかった。ジェネティシンを用いた選択の2週間後、G F Pを強く発現する個々の安定クローンを検出できた。G F Pの発現は、機能プロモーターに近接して組み込まれるかに依存する。ジェネティシン耐性は、ベクター 2の A T Gに続くネオ耐性遺伝子の再構築に依存する。全ての場合において、f r t wと f r t F 5の間の配列を置き換え、機能的に C E Sプロモーターと G F Pをリンクするとともに、A T G欠失ネオマイシン遺伝子を A T Gとリンクしたと結論する。

【0072】

実施例 5：レプチン F c のグリコシル化パターンの研究

P B 6 0 4のレプチン F cをローラーボトル培養で産生し、アフィニティークロマトグラフィ、ゲル濾過および膜濾過を含む一般的な工程で精製した。タンパク質をトリプシンで消化し、得られたペプチドを P N G a s e F 消化により脱グリコシル化した。グリカン

10

20

30

40

50

を2-アミノベンズアミドで標識し、Phenomenex Hypersil APS-2カラムのHPLCで分離した(図16)。さらに、表5に示した個々の画分の特徴を調べるために、脱シアル化した、標識試料をMALDI-TOF-MS(BRUKER BIFLEXTM)にかけた。

【0073】

Fc上の単一のN-グリコシル化部位は、37%がシアル化された複合オリゴ糖構造をもち、この値はヒト血液中の抗体のシアル化の平均に近似する。シアル酸をさらにシアリダーゼ処理、DMB標識、およびBischoff Hypersil-ODSカラムによる分離により調べ、シアル酸リファレンスパネル(オックスフォード糖質科学(Oxford GlycoSciences))と比較した。主として、N-アセチルノイラミン酸を見出した。2%だけが、マウスミエローマ細胞で支配的な型である、免疫原性であることが示された、N-グリコリルノイラミン酸であった(Noguchi, A. et al., J. Biochem, 17(1): p. 59-62 (1995))。ヒト細胞では作られず、前から存在する抗体によりクリアランスが増加することが知られている、 $\alpha 1, 3$ Gal構造はグリカンの1.3%にだけ見出された。上記の結果を表6に要約した。

【表5】

表5: Phenomenex Hypersil APS-2カラムの画分をMALDI-TOF-MS分析にかけた結果として同定されたオリゴ糖

ピーク	領域 (%)	モノアイソトピック質量 (<i>m/z</i>)	提示される構造
1	1,2	1256,9	Man3HexNAc1
2	1,4	1402,9	Man3HexNAc1Fuc
3	8,0	1378,4 Main	High Man5
4	1,6	1377,9 1419,0	High Man5 Man3HexNAc1Hex1
5	4,3	1606,5	Man3HexNAc2Fuc
6	3,1	1565,5	Man3HexNAc1Hex1Fuc
7	2,7	1540,7 Trace 1581,7 Main	HighMan6 Man5HexNAc
8	4,7	1540,5 1581,5 Main 1622,7	HighMan6 Man5HexNAc Man3HexNAc2Hex1
9	9,3	1768,8	Man3HexNAc2Hex1Fuc
10	6,6	1743,8 Main 1784,9 Trace	Man5HexNAc1Hex1 Man3HexNAc2Hex2
11	8,7	1784,7	Man3HexNAc2Hex2
12	1,6	1784,5 1889,7 1930,7 Trace	Man3HexNAc2Hex2 Man5HexNAc1Hex1Fuc Man3HexNAc2Hex2Fuc
13	10,9	1930,8	Man3HexNAc2Hex2Fuc
14	3,0	1664,5 1946,9 Trace 2093,0	Bi - 2AB Man3HexNAc2Hex3 (Bi + Gal*) Man3HexNAc2Hex3Fuc (Bi+Fuc+Gal*)
15	25,7	2150,0	Man3HexNAc3Hex3
16	3,2	N.D.	
17	2,8	N.D.	
18	0,9	2031,2 2514,2	Tri - 2AB Man3HexNAc4Hex4

【表 6】

表 6：ヒト血液、ハムスター CHO、マウス NS0、又はヘテロハイブリドーマ PBG-04 から
単離したタンパク質中の N 結合オリゴ糖の特性のまとめ

特性	影響	PBG-04	CHO	NS0	ヒト
シアル化 N acetyl- N glycolyl- 2-6 linkage	↓ proteol. Sens./Clearance wanted 免疫原性 unknown	37% 98% 2%	可変 高 低 no	可変 低 高 no (>50%)	35-40 100% no 可変
1-3 alpha.gal.	Preexist. Ab: clearance	1,3%	可変	高	no
Bisecting GlcNAc コアのフコースなし	? → ↓ コアのフコシル化 ↑ ADCC, Fcγ 結合	no 60%	no 5%	no 10-50%	10% 5%
G0- 構造	↑ 二量体化, G2 → ↑ CDC	4,3%	可変	可変	低

10

【0074】

実施例 6：PBG04 の軽鎖ラムダ座に対するターゲティングベクターの調製

再編成したラムダ鎖座の構造を既知のラムダ遺伝子の cDNA とヒトゲノム配列をアラインすることにより同定した。遺伝子は、可変遺伝子、すでに合体している J および H セグメントからなる。V3-19 が可変遺伝子として同定された。

【0075】

この方法は定常遺伝子座が 100% 同一の遺伝子コピーを含むために、該遺伝子を同定するには不適當であった。PCR は、既知のリーダー配列と定常領域遺伝子間にある独特の介在配列のプライマーに基づく。プライマー V81、V83（それぞれ、配列番号：13 と 14）は、予想される制限パターンを示し、それゆえ、H-CB-P1 の再編成されたラムダ遺伝子を構成する遺伝子（配列番号：21）として J2 to H2 を同定できる、正しいサイズの PCR 産物をもたらした。この情報に基づき、再編成された座の配列を提示し、ターゲティングベクターを構築した。

20

【0076】

可変遺伝子 V3-19 のコーディング配列の 5' 上流に隣接する領域を、Proves t a r t ポリメラーゼ（キアゲン）を用いて、プライマー V89 と V94（それぞれ、配列番号：15 と 18）で作製した。4 kb 断片を pPCR4b l u n t t o p o（インビトロジェン）にクローニングした。3 プライム隣接領域を 2 工程で増幅した：重複 PCR 産物をプライマー V90 V91 と V115 V116（それぞれ、配列番号：16、17、19 および 20）を用いて作製し、両断片に存在する一個所の Sph I 部位を介して並べた。隣接配列を単一ベクター P V L C L にクローニングした（配列番号：22）。

30

【0077】

重鎖座の挿入とは独立に遺伝子の挿入を行うために、類似ではあるがヘテロ特異的な f r t に基づく交換システムを設計した。5' 3' の方向に、ヒトアルファ（1）アンチトリプシン遺伝子、ハイグロマイシン耐性マーカー、w t f r t 部位、および A T G 欠失ヒスチジノール耐性マーカーに続く、f r t F3 部位、CMV E F1 アルファ雑種プロモーターを含む。これらのエレメントを p V L C L にクローニングし、p V L C L a a t h y g を作製した。

40

【0078】

f r t w t と F5 の部位は組換えを起こさないの、特異的な交換ベクターは重鎖座と軽鎖座を排他的に標的とすることができ、それぞれ、ネオマイシン耐性マーカーとヒスチジノール耐性マーカーに対するプロモーターと開始コドンを提供する。選択性を増加させるために、交換ベクターは f r t 部位に対して異なるオープンリーディングフレームの開始コドンを含む。結果として、ベクターの誤った f r t 部位への取り込みは、それぞれの抗生物質への耐性を生じない。

【0079】

50

P V L C L a a t h y g を電気穿孔法を用いて、P B G - 0 4 にトランスフェクトした。細胞を T 7 5 フラスコに播き、 $200 \mu\text{g}/\text{ml}$ のハイグロマイシンで選択をした。3 週間で得られたクローンを希釈クローニング法で単離し、相同交換で得られたクローンを、蛍光標識した抗ヒト ラムダ鎖抗体を用いて、免疫蛍光シグナルなしで同定した。得られた細胞クローンを、アルファ 1 アンチトリプシンの発現で解析した。これらのクローンは高レベルで発現される二つの独立のトランスジーンを共発現するのに適している。好ましくは、これらの遺伝子は抗体の重鎖および軽鎖の遺伝子である。f l p リコンビナーゼを用いた単一の交換反応で、重鎖および軽鎖の遺伝子をそれぞれの場所に組み込むことができる。

【図面の簡単な説明】

10

【0080】

【図 1】概念の概観、遺伝子の f r t 部位における I g H 座への部位特異的挿入を含む高収量発現細胞系を作出するための多段階工程。H - C B - P 1 の I g H 座を図 1 a および図 1 b の上側の図式で表す。I g H 座は可変遺伝子プロモーター、続いてタンパク質リーダー配列および、再編成され次にエンハンサー E μ 、M A R および C μ コーディング配列をもつ特異的 V、D および J 遺伝子を含んでいる。相同組換えの標的配列を大理石模様で示す。ベクター 1 (ターゲティングベクター) の隣接配列因子「V h p r o m」と「C μ 」、およびゲノム DNA との相同組換えを介して、隣接配列の間にある第一の機能化配列がゲノム DNA に導入され、組換え P B G 0 3 ゲノムが得られる。第一の機能化配列は、f r t 部位 (f r t F 5、f r t F 3 および f r t w t)、人工強力プロモーター C E S (図 1 a) または追加プロモーターなし (図 1 b) を第一の発現遺伝子 (h o b F c) の上流に含有する。加えて、ブラストサイジンまたはハイグロマイシン耐性遺伝子、および A T G 欠損ネオマイシン遺伝子が第一の機能化配列の一部である。組換えゲノムは染色体 DNA に組み込まれた第一の機能配列を有する。F L P リコンビナーゼは、組換え H - C B - P 1 ゲノムの f r t F 5 と f r t F 3 部位、または f r t w t と f r t F 3 部位、およびベクター 2 (真の目的の遺伝子が導入され、人工の、または内在性の V H プロモーターから発現される) との組換えを触媒する (それぞれ図 1 a および図 1 b)。f r t w t と f r t F 3 との間にある第一の機能化配列の部分は、組換え後に A T G 欠損ネオマイシン遺伝子と同一のオープンリーディングフレームを有する A T G が続く弱いプロモーターに置き換えられる。得られたゲノムは h o b F c 遺伝子およびブラストサイジンまたはハイグロマイシン耐性遺伝子を消失し、代わりに目的の遺伝子 (標的遺伝子) および機能 n e o 遺伝子を有する。

20

30

【図 2】ターゲティングベクターの内在カセット (C E S h o b F c b l a s)。C E S プロモーター、h o b F c 融合遺伝子、ブラストサイジン耐性遺伝子および開始コドン (A T G) 欠損ネオマイシン遺伝子を含む内在カセットの詳細な構造を示す。より詳細には、内在配列は改良 f r t 部位 (f r t F 5)、続いて初期 C M V プロモーター/エンハンサーエレメントおよび延長因子アルファ遺伝子の第一イントロンを含むハイブリッドプロモーター構造を含む。次の要素は、f r t 野生型部位、続いて h o b F c 融合遺伝子 (h o b F c) および S V 4 0 ポリアデニル化シグナル (S V 4 0 P A) である。ブラストサイジン耐性遺伝子の発現を制御する弱い S V 4 0 プロモーターが続く。最後の要素は、改良 f r t 部位 (f r t F 3) およびそれに続く A T G 欠損 n e o 遺伝子である。改良 f r t 部位 F 3 および F 5 は同一部位で組換えを起こすが、野生型 f r t 部位および F 5 または F 3 それぞれでは組換えを生じない。f r t F 3 部位は A T G を欠く隣接するオープンリーディングフレームを形成するように n e o 遺伝子の上流に位置する。

40

【図 3】隣接領域 V h p r o m と C μ を含む中間体ベクター p V C μ のクローニング法。

2 k b の V H プロモーター配列を、P B G 0 3 細胞のゲノム DNA から、フォワードプライマー V H p r o m F (配列番号: 1) とリバースプライマー V H p r o m R (配列番号: 2) を用いて増幅した。P C R 産物 V H p r o m を p C R 4 B l u n t T O P O ベクター (インビトロジェン) にクローニングし、得られたベクターを p V H と命名した。7. 4 k b の C μ 領域を H - C B - P 1 のゲノム DNA から、二つの重複断片、すな

50

わちC μ M i t t e RとC μ M i t t e Fとして増幅した。プライマーC μ i n t V（配列番号：3）とC μ M i t t e R（配列番号：5）から産物C μ M i t t e Rが生じ、プライマーC μ M i t t e F（配列番号：6）とリバースプライマーC μ i n t R（配列番号：4）から断片C μ M i t t e Fが生じる。両断片をpC R 4 B l u n t T O P Oベクター（インビトロジェン）にクローニングし、得られたベクターをpC μ M i t t e RおよびpC μ M i t t e Fとした。両方のベクターを制限酵素S p e IとD r a I I Iで開環し、pC μ M i t t e RのS p e I-D r a I I I断片を開環したpC μ M i t t e Fに連結することにより、完全長のC μ 配列を再構築した。得られたpC μ は完全長のC μ 領域（C μ イントロン）を有する。V Hプロモーター配列およびC μ 配列を、pV HおよびpC μ の両者を制限酵素S p e IとP m e Iで消化し、分離したV h p r o mのP m e I-S p e I断片をホスファターゼ処理した開環ベクターpC μ に挿入することにより、一つのベクターpV H C μ に結合した。

【図4】ターゲティングベクターpC E S H h o b F cおよびpV H C μ H h o b F cのクローニング法。高活性プロモーターC E Sとh o b F c融合遺伝子を含むターゲティングベクターpV H C μ C E S H h o b F cを、pC E S H h o b F cから単離した末端を埋めたS w a I-B s t B I断片を、P m e Iで消化し、脱リン酸化したpV H C μ ベクターにライゲートすることにより作製した。h o b F c融合遺伝子を有し、C E Sプロモーターを持たないターゲティングベクターpV H C μ H h o b F cを、pC E S H h o b F cから単離した末端を埋めたB s t 1 1 0 7-B s t B I断片を、P m e Iで消化し、脱リン酸化したpV H C μ ベクターにライゲートすることにより作製した。

【図5】ブラストサイジン耐性をもつターゲティングベクターpV H C μ C E S h o b F c b l a sおよびpV H C μ h o b F c b l a sのクローニング法。プラスミドp c D N A T R Dをブラストサイジン遺伝子のドナーとして用いた。ハイグロマイシン遺伝子配列をベクターpC E S H h o b F cからF R T 5およびネオマイシン配列とともに除去するために、ベクターをE c o R IとS a l Iで消化し、脱リン酸化した。ブラストサイジン耐性遺伝子配列を含むpC D N A T R DのE c o R I-S a l I断片を前に開環したpC E S H h o b F cベクターにライゲートし、得られたプラスミドをpC E S h o b F c b l a s d e l e t e dと命名した。F r t F 5配列とA T G欠失ネオマイシン配列をpC E S H h o b F cからS a l I-S a l I断片として単離し、pC E S h o b F c b l a s d e l e t e dのS a l I部位に再挿入した。得られたプラスミドpC E S h o b F c b l a sをpV H C μ C E S H h o b F cと共にpV H C μ C E S h o b F c b l a sを作製するために用いた。h o b F c配列とブラストサイジン遺伝子を含むB a m H I-S a l I断片をpC E S h o b F c b l a sから単離し、B a m H IとS a l Iを用いて開環したベクターpV H C μ C E S H h o b F cに挿入し、pV H C μ C E S h o b F c b l a sを得た。ベクターpV H C μ h o b F c b l a sを、h o b F c遺伝子とブラストサイジン遺伝子を含むB a m H I-S a l I断片を、B a m H IとS a l Iで消化したベクターpV H C μ H h o b F cにライゲートすることにより作製した。

【図6】H-C B-P 1クロンの免疫染色。pV H C μ C E S H h o b F c b l a sをもつH-C B-P 1細胞のトランスフェクションにより得られたH-C B-P 1クロンを、テキサスレッド結合抗ヒトI g G、ヤギのF γ 断片特異的抗体またはA M C A結合抗ヒトI g M、ヤギのF c γ 5 μ 特異的抗体を用いて免疫染色した。左カラムはテキサスレッド結合抗体で染色し、U V W Gフィルターで可視化した二つのH-C B-P 1クロンを示す。右カラムには、A M C A結合抗I g M抗体で染色し、U VフィルターW Uにより可視化した後の同一クロンを示した。上部パネルのクロンではI g Gのみの染色が明らかであり、下部パネルのクロンでは両抗体による染色が観察される。最初のクロンは相同組換えから得られ、他のクロンは機能配列の非正統的挿入を含んでいる。

【図7】H-C B-P 1クロンの直接免疫染色とクロンのさらなる拡張。細胞の生存度を危険にさらすことなしにH-C B-P 1クロンが免疫染色されること、および続いて、染色された細胞の拡張が可能であることが示されている。96ウェルプレートで10日間培養されたH-C B-P 1クロンをテキサスレッド結合抗I g G抗体で免疫染色した

。通常の光学顕微鏡で可視化した免疫染色前のクローンの写真を最上部左パネルに示した。テキサスレッド結合抗 I g G 抗体で免疫染色した同一クローンを最上部右パネルに示した。下部パネルはトリプシン処理後のウェルの写真である。下部左パネルに示したように、通常の光学顕微鏡下で写真を撮影すると、細胞は観察されない。右パネルは U V フィルター W U を通した同一ウェルを示している。細胞は完全にウェルからはがされ、蛍光抗体の沈殿がウェルに残り、細胞表面には接着していない。

【図 8】個々のクローンの細胞培養上清の抗 I g M ドットブロット。以下のクローン、
1 : p V H C μ h o b F c b l a s - D 6 ; 2 : p V H C μ h o b F c b l a s - G 8 ;
3 : p C E S h o b F c b l a s - A 3 ; 4 : p V H C μ C E S h o b F c b l a s - B
4 ; 5 : p V H C μ C E S h o b F c b l a s - D 3 ; 6 : p V H C μ C E S h o b F c 10
b l a s - G 8、の上清をメンブラン上にスポットし、E C R 染色法を行った。最初の細胞集団は均一に I g M を産生するので、I g M 発現を検出できないクローンは、ターゲティングベクターにより調節される I g M H 遺伝子の不活性化の結果である。相同隣接配列を欠く p C E S h o b F c b l a s のトランスフェクションにより生じたクローン A 3 は I g M 座を標的とすることができず、I g M を発現する。

【図 9】個々のクローンの細胞培養上清の抗 I g G ドットブロット。以下のクローン、
1 : p V H C μ h o b F c b l a s D 6 ; 2 : p V H C μ h o b F c b l a s D 6 (1 : 2 希釈) ; 3 : p V H C μ h o b F c b l a s - G 8 ; 4 : p V H C μ h o b F c b l a s G 8 (1 : 2 希釈) ; 5 : p C E S h o b F c b l a s A 3 ; 6 : p V H C μ C E S h o b F c b l a s B 4 ; 7 : p V H C μ C E S h o b F c b l a s D 3 ; 8 20
: p V H C μ C E S h o b F c b l a s D 3 (1 : 2 希釈) ; 9 : p V H C μ C E S h o b F c b l a s D 3 (1 : 10 希釈) ; 10 : p V H C μ C E S h o b F c b l a s G 8 ; 11 : h o b F c 標品 500 n g / m l ; 12 : h o b F c 標品 50 n g / m l I g G、の上清をメンブラン上にスポットし、抗 I g G 抗体を用いて E C R 染色法を行った。

【図 10】PCR による相同組換えの検出。相同組換え事象が (ターゲティング) ベクターと H - C B - P 1 細胞の I g 座の間で起きているかを試験するために、PCR 法を適用した。組換えにより、A T G 欠損ネオマイシン遺伝子に続く、h o b F c 遺伝子および耐性遺伝子 (ハイグロマイシンまたはブラストサイジン) がゲノム V 遺伝子プロモーター配列とエンハンサー E μ の間に組み込まれる。V h p r o m 断片の外側のゲノム V 遺伝子 30
プロモーター配列に結合するフォワードプライマー V 5 (配列番号 : 7) を、最初の機能配列内に特異的に結合するプライマー V 6 または V 7 (それぞれ配列番号 : 8 と 9) と組み合わせた。PCR 産物の存在は両方のプライマーが結合する配列の共存、すなわち相同組換えに強く依存する。陽性であることを確認するために、陽性と推定される PCR 産物を、プライマー V h p r o m F と V h p r o m R (それぞれ配列番号 : 1 と 2) を用いたネスト PCR 反応に用いた。a : プライマーの位置、b : PCR 産物の電気泳動分析左 : 第一の PCR V 5、V 7 レーン 1 : 1 k b ラダー (インビトロジェン) ; レーン 2 : クローン p V H C μ h o b F c b l a s H 6 ; レーン 3 : クローン p V H C μ C E S h o b F c b l a s B 10 ; レーン 4 : クローン p V H C μ h o b F c b l a s D 4 ; レーン 5 : クローン p V H C μ h o b F c b l a s D 8 ; レーン 7 : 陰性コントロール 40
H - C B - P 1 右 : ネスト PCR レーン 1 : 1 k b ラダー (インビトロジェン) ; レーン 2 : 陰性コントロール H - C B - P 1 ; レーン 3 : クローン p V H C μ C E S h o b F c b l a s H 6 ; レーン 4 : クローン p V H C μ h o b F c b l a s D 4 ; レーン 5 : クローン p V H C μ h o b F c b l a s E 11

【図 11】選択圧なしでの h o b F c の発現。細胞を 3 ヶ月間選択圧なしで培養した。発現を調べるために、細胞を 10^5 細胞 / m l の密度で播種した。24 時間後、細胞培養上清を集め、抗ヒト F c 抗体を用いたウェスタンブロット (ドットブロット) にかけた。上清を左から右へ、無希釈、1 : 2 希釈および 1 : 10 希釈の順にフィルターにのせた。左 : クローン p C E S h o b F c b l a s A 3 (ランダム挿入)、中央上 p V H C μ h o b F c b l a s G 8 ; 中央下 p V H C μ h o b F c b l a s G 8 ; 右 p V H 50

C μ CEShobFcb1as D3発現はhobFc遺伝子を含む機能化配列の相位的挿入の結果得られるクローンにおいて安定である。

【図12】モデル標的遺伝子としてGFPを用いた標的細胞クローンの生成。クローンpVHC μ CEShobFcb1as D3 (PBG04と改名)を第二の機能配列 (frtwt、GFPオープンリーディングフレームおよびポリアデニル化シグナル、ATGおよびfrtF5に続く最小プロモーター)を含有するベクター2、およびflpリコンビナーゼの機能発現ユニットを含有するプラスミドpflpでトランスフェクトした (注:ベクターは、発現させるための機能プロモーターが欠失しているので、元の細胞ではGFPを発現できない)。G418を用いた選択の2週間後、GFPを高発現する個々の安定クローンを検出できる。G418耐性同様、GFP発現は相同組換え事象に依存する。 10

【図13】ヘテロハイブリドーマH-CB-P1における再編成の同定。H-CB-P1由来の軽鎖遺伝子および重鎖遺伝子のcDNAの配列を決定し、データベースの配列と比較した。重鎖遺伝子を構成するゲノム遺伝子は、相同性から、再編成されていないゲノム配列と同一であった。V1-2、D1、J6および μ の同定を基に、再編成された座のゲノムマップを構築した。この情報を用いてPCRプライマーを設計し、5'から可変遺伝子V1-2プロモーターを伸長し、D、Jおよび μ イントロン配列を含むが、可変遺伝子のATGは含まれないそれぞれの断片を増幅し、ターゲティングベクターを構築するために用いた。ラムダ軽鎖可変遺伝子V3-19を同様に相同性検索により同定した。座が100%同一の遺伝子コピーを含んでいるので、このアプローチは定常遺伝子を同定するには不適であった。定常領域遺伝子間の介在配列のプライマーに基づくPCRから、H-CB-P1の再編成されたラムダ遺伝子を構成する遺伝子として、J2およびH2が同定された。 20

【図14】H-CB-P1の染色体分析。GTGバンディング、左パネル68-94染色体、が見出された。大部分はスペクトル核型分析でマウスの染色体として同定された (中央および右パネル)。H-CB-P1内のヒト染色体を、特異的に標識したヒト染色体ライブラリーを用いたハイブリダイゼーションにより同定した。8本の完全なヒト染色体、すなわち4、5、7、10、14、17、18、22番染色体、さらに、4、8、9、10、11、14、16番染色体の断片を同定した。ヒトIGH座特異的なプローブを用いたハイブリダイゼーションの結果、完全な14番染色体上に単一のIGH座があることが明らかとなった。 30

【図15】哺乳類糖タンパク質のN結合オリゴ糖構造の概略図。レプチン-Fc分子は二つのN結合オリゴ糖、Fcドメインのそれぞれの鎖の一つを含む。

【図16】レプチンFcのアミノ相-HPLC。PBG-04のレプチンFcをローラボトル培養で産生し、アフィニティークロマトグラフィ、ゲル濾過および膜濾過を含む一般的な方法により精製した。タンパク質をトリプシンで消化し、得られたペプチドをPNGase F消化により脱グリコシル化した。グリカンに2-アミノベンズアミドで標識し、Phenomenex Hyperasil APS-2カラムのHPLCにより単離した。ピーク番号は、MALDI-TOF-MS分析で用いた画分を表す。

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> PROBIOGEN AG

<120> High Yield Heterologous Expression Cell Lines for
Expression of Gene Products with Human Glycosylation
Pattern

<130> 032353wo/JH

<140>

<141>

<160> 22

<170> PatentIn Ver. 2.1

10

<210> 1

<211> 33

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer VHpromF

<400> 1

atactagtcg gccgcaggca catccacagt cac 33

<210> 2

<211> 32

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

20

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer VHpromR

<400> 2

tcccgggtat cgatggagct ctcaggggat tc 32

<210> 3

<211> 27

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

30

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer C_μintV

<400> 3

catcgatccg ctactactac tacatgg 27

<210> 4

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer C_μintR

<400> 4

40

cggccacgct gctcgat

18

<210> 5

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer
CμMitter

<400> 5

agctcacctg gtgcaact

18

10

<210> 6

<211> 19

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: primer
CμMitterF

<400> 6

gacctaaagt gacctagac

19

<210> 7

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer V5

<400> 7

tccctccaaa agctgtag

18

20

<210> 8

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: primer V6

<400> 8

atggcggtaa tgttggac

18

30

<210> 9

<211> 18

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: primer V7

<400> 9

cacaagaatc cgcacagg

18

40

<210> 10
 <211> 18
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Primer
 EBVtestR

<400> 10
 cctgatattg caggtagg 18

<210> 11
 <211> 18
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Primer
 EBVtestF

<400> 11
 taccgacgaa ggaacttg 18

<210> 12
 <211> 377
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<400> 12
 cagctggtgc agtctggggc tgaggtgaag aagcctgggg ctcagtgaa ggtctcctgc 60
 aaggcttctg gatacacctt cacoggctcc tatatgcact gggcgcgaca ggccccctgga 120
 caaggccttg agtggatggg acggatcaat cctaacagtg gtggcacaaa ctatgcacag 180
 aaatttcagg gcagggtcac catgaccagg gacacgtcca tcagcacagc ctacatggag 240
 ctgagcaggc tgagatctga cgacacggcc gtgtattact gtgcgagaga caagctttcc 300
 cggtcagaag taccagctgg ccgctactac tactacatgg acgtctgggg caaagggacc 360
 acggtcaccg tctcctc 377

<210> 13
 <211> 18
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Primer V81

<400> 13
 agcttcgggt caacacag 18

<210> 14
 <211> 18
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Primer V83

10

20

30

40

<400> 14
gccttacctg cagagatg

18

<210> 15
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer V89

<400> 15
agtatacccc agaactctgc tt

22

10

<210> 16
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer V90

<400> 16
ggcgcgtgcg gccggaagat gaggctgact

30

<210> 17
<211> 25
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

20

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer V91

<400> 17
agcggccgct tgcaggacaa tatga

25

<210> 18
<211> 18
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer V94

30

<400> 18
ttgcgtgaca ggctcagt

18

<210> 19
<211> 18
<212> DNA
<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Description of Artificial Sequence: Primer V115

<400> 19
atcacacggc acttctcg

18

40

<210> 20
 <211> 25
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Primer V116

<400> 20
 gagatatcgg cttctggagg acact

25

<210> 21
 <211> 14000
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

10

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Proposed
 sequence of the arranged light chain locus

<400> 21
 ctctccagca aggggataag agaggcctgg gaggaacctg ctcaagtctgg gctaaggaa 60
 gcagcactgg tgggtgcctca gccatggcct ggaccgttct cctcctcggc ctctctctc 120
 actgcacagg tgatccccc aggggtctcac caacctgccc agcccaaggg ttctgggtcc 180
 agcgtgtcct tgattctgag ctcaaggagg ccttctctgt ggtggggcagg atgtcatga 240
 cctgtctgca ggggtgggagg ctgggtggggc tgaactcccc ccaactctg ctcaaaggct 300
 tgtgagagcc tgaggggactg cactgcccag gagagagtag tgagttttca gttcaaagtc 360
 tccatacaac aggaagtcga tgggcccactg gggctggggc tgattgcagg ggataccctg 420
 aggggttcaca gactctctctg agcttgtctg ggacagcagg gcaagggatt tcataagaag 480
 catctttcac ctgcaagcca acctctctct tatttattta tttatttatt ttttattta 540
 tttatttatt tttatctttg caggctctgt gacctctat gtgctgactc agccaccctc 600
 ggtgtcagtg gcccaggac agacggccag gattacctgt gggggaaaca acattggaag 660
 taaaagtgtg cactggtacc agcagaagcc aggccaggcc cctgtgctgg tcgtctatga 720
 tgatagcagc cgccctcag ggatccctga gcgattctct ggtcccaact ctgggaacac 780
 ggccaccctg accatcagca gggtcgaagc cgggatgag gcgactatt actgtcaggt 840
 gtgggatagt agtagtgatc atcccacggt gacacaggca gatgaggaag tgagacaaaa 900
 acaccctccc agcctcggtc acctctctgc tccagccccc ggaagcctgt tgataaagcc 960
 atgagtgaat ctggcccagt tcacctggat ctgagccttt cagggttgcct tccctccag 1020
 cccctccag gagtctctac agaagataca tcaggcataa atatggcctg gaagggccag 1080
 aatcatctgg tgacttgggg ctgttgtgtg agttagagaa tgaaggcttg ggtggaaaga 1140
 cagacagagg caacctctgt ccactgtcct acctctggat ggtcatatgg tggggacagg 1200
 gcaagtcctt agaccaactg tctggatcag gcccagaac tactgcccag ttctgtctgag 1260
 gtcttgccc ccaggctgtg tggcagcctg tgattccaa cagagcaaac cagaggaatg 1320
 gacactgtga agtctgccc gatccctcc tcaatgtgac ccacctggca ctgctgagaa 1380
 gcccagcagc tcagagctgt gccctcactg ggaagtgtct ttggttgagc aaagcttctc 1440
 caagtttgtg tcccttttca gagggggtct gtttaataca ccaagatctc aaatccttgc 1500
 ctcaatttaa gatgccactg aatgaagggc ctcccagctc cagagctccc tgtgtggata 1560
 cctgaggcct caatgtcaac tccatcacga gtcagggtct ccttctgccc cgtgttgctc 1620
 cccccactcc ctctgaatc ttctgtgcat ggacatctct attgcagagt tagcttccag 1680
 agaaccccat ctaagatggc cagctgtccc caacatgggt catcaggagc ctgagttagc 1740
 cactataaac tgaaaactct ggtttctgtc caaatttgca gagtaaatgt tgaaatgccc 1800
 aatctgatgg ttcttgaat ttttatggaa tgaaaaggga gcctgacatg ccagggtgctc 1860
 tgggttgagg gattgttgga gtcagatctc cctgcaggaa agcccggggc agggggagca 1920
 gcctcaccoc tcacaggaaac cacagataca cccacaagggt gagctgcagg atggatgctg 1980
 cccacctcca cctccacat cctctgtaaa tgttgctcct ttctacaact ccaaccagat 2040
 atgtagatgt ggcgaaactac gtaaaatacg gatcattcat cacatcaaaa cccactgcag 2100
 gacaccctgg tcaacaaaga acccaatcac atcccatca actacatagt ttccaaattt 2160
 tccatctcca gaaaaataac aataacaata tacatgaaaa tcgatgtaat ttatctcata 2220
 cataatttca tgttgataac gtgaaaatga tagtattttg ctctactgaa ataaataaaa 2280
 tatatatata tatctgaatt tatttgcctt atcttttcat atttaagtgt gtgactagac 2340
 actaggggggt cacaggagga tctgtgcata ccactatggg acagagctcc tcacaactct 2400

20

30

40

```

ttcaggtgac aggtactgtt gagtaacctg ctgcaagcat ccccatctcc accagaccat 2460
ataagtgatga acccaggaag aggcactgga acaatagaga gaaaaacctg cttgtgcaga 2520
agacgggtgcc cttgagccct gctcctgctc catcctacgg gtgccacatt catctcatgg 2580
tgtaatatatt cgtgccctgc ctgagcttat gaccgagggg atatggcagg tctgactgtg 2640
tggttactgg tgtctcatga ggttctggat gtaacaaagc cctcgaaat agaaagaggtt 2700
gttttcaaaa ggaaataatt atctactgca catgacatag acttgttgct aaatcccatg 2760
cgtctacact aggtattctcc tctgaagcct tgccttaagc acaagggttc agttcctatg 2820
tccagttcct ctattatggg agagtctgct agtttctctg gcccaatagc aggacactca 2880
ctccccacc tgcacctgct gcagagcctt tctactcttg gccccaaaac actgggtgac 2940
acagttctca gacccatgat ttatagtgtc agtattcagg cctcaggggt ccctgatggc 3000
ttctctggct ccaagtctgg aaacacagcc tccatgacca tctctgggtt ccaggctgag 3060
gatgaggctg attattactg caactcacat aggagaggtg gcactttcca ccgtgggtcca 3120
agttcatggg gaattgagac ccaaacctgc cctgggctct cagcctctct cttgttctga 3180
agatgcttcc tcacctgtg caaggggctt cttgcagcac tgccttgaga atttccctc 3240
tcccagctcc tctcctttct caccaggaag tccaaaagga aacctgctct gtgatttctc 3300
atccaggaca gtgacagctt cctgatgctt gtgtgctgtg gtccctgaat gtgcaactct 3360
tcttagctgt tcgaatgagc gcacatagtg agaaaagctg cctgactggg gcattcactg 3420
ctgtttttta ggatgtcctc acccaaaatg catcctctct ccaaatgtg aagaacaatc 3480
tggaacagagg tcattacagg gagtttcaag aaactgcac ttattcaatt gtgtccacca 3540
tggtctggta aagatggccc tcctggatgg actattcctc tgcattgtctg tcctgaagca 3600
gttgacactgt tgagaagatt tgaacatgtt tgtgaggtat taaggacgag aggaaactgt 3660
tggttttatt attcttttgt tttgtttttt gaaaacaaact tttgtcttgt cgccaggctg 3720
gagtgacgtg gcagaatctt ggcttactga aatctcagcc tcccaggctc taccaatgct 3780
ccctgcctca gcctcccgaa gagctgggat aacaggtgac caccaccatg cctggctgat 3840
ttttgtatat tttagtaga cgggatttca ccatgttggc caggctggtc ttgaactcct 3900
gatctcaggt gatgcaccca cctcggcctc tcaaaagggat gggaatacac acaggagcca 3960
ctgcatctgg cagtgttttt tttatttttg ctctcctct tgcctcaat acctcaggtt 4020
gctgagctgg ggagattttg cgtgacaggc tcagtgtctc ctcaaaatcc tcccgctctc 4080
attcgtctgg gccctgtcct ggaaactccc caaaagtgga tgggtgtccct ataggttggg 4140
agtttccaaa atggcccccac agggaaagat taacgtgagt ccattccttc ttccctattg 4200
acatccagca tttgtaattt ccatgggtgt caatactttt gtagctgaaa tctttcttaa 4260
tctactaaag gtgagaatga atttaataaa tattcagaca ttagtgtcat ccaatattta 4320
aattttatga gtcaattggg agacatagcc attattatat ataatttagg cttcataaac 4380
tttgattata taggttttat taaaaacaaa gtaaccattt tattatgtgt tttagctata 4440
tcaacatggt gtgtacctga aatatccaca agaaaatata tttcaaaaac caaattgtat 4500
ttattgtcta ttgttgcata aaaattgtct cctaattttt agcatggtaa gagaacacgt 4560
gtttgtgatc ttgtcacttc ggtgcatctg gaattgagag cagcttagtt ttgtggttct 4620
ggttctgggt ttgtcatgca gttgcagcca agctgtcagg ccagggtgca ttcagaggcc 4680
agagcaggtg gccaggccca gcctgagggg cttccactgt ccttaacpctg tttgtctgat 4740
gtggaaaatc tcagaggaaa aggagagagt gaagtgtgag gcacctgtcc cagtccccct 4800
tgtcaaaggc catcccatc ctgcaccatt tcttattctt tccctggggcg tcataggcat 4860
agagcactgc ccattcattc taacgtgtga gagtattctg tagtaggatt tttagccatg 4920
agcctotaat ggttatcacc atgattttga tcttacaat cacactgcag caagcatccc 4980
tgtgcagact cctttgagtt catgtgtgca tatcaccata ggataaattt ccagaagtgg 5040
aattgtctgg tcaaaaggat gtgcattttt aacttttctc cattgttttc atattcccc 5100
ccagttctac cagtttaca taccagccct aaatattgat tggaaattcat tggtgaaagt 5160
gcaagtttgt gccaacctat cagatatata aagtattctt gttacacatt tatttttgat 5220
ttctcctatt ttgcttgagg ttgagcattt actcaaatat ttcagtgtc attatgtttt 5280
aggatttggg aaaccgtttc ttcaatgcct cggtaaagag tatttttagt tttgccatgc 5340
acaagacaa gttgggataa tatgtatgtt ctgatacacc atctacaacg taatcattaa 5400
aacatataaa aaccactatc agttctgggg ccattaaaaa aattgggtgc aggccaggga 5460
tgtccacag gatgtggttt aacggctctc ggtttctagg gttatttgaa gtttgaacat 5520
tgcaaccgca tatgttctat gtggagatct ctttgtgagg gacactgtaa ttcacctcct 5580
ctaggggcct gaggtccttc tttggataag aacctacctg taccatgtgt ttgattggat 5640
cttgtgtctg ctcaagacag cctgtgttca caagctcatg actttcatct tcabccattt 5700
gctctgtttt gtgagagctt cagtatatca ggaatagaga ttcctccgag gtgaaaaatt 5760
agaggcagag ggaggggcaa atgggcaagg aagcttgac caagtcggga gtgatccagt 5820
gtaggctgag agaaaaaagg tcttaaaac agccttgtag ctgaaaccaa aaacacacaa 5880
gatggttggg gttctgagca tcattaacaa atgataaatg aagttgaact tttaaatgta 5940
ttgcaaat tttataaagca agtagatcgt taaactcaga atgcaacaat ggaataaaga 6000
agagagtttg agatgttttt aaaatttatt tattttttta tttatttttg agatggagtc 6060
tcaactctgt gccaggctgg agtgacgtgg cacaatcgcg gctcaactgca acatccacct 6120
cccgggttca agaaattctc ctgcctcagc ctcccaagta gctgggatta caagctctcg 6180

```

10

20

30

40

```

ccatcatgcc aggctaattt ttgtattttt tgtagagaca tggtttcaca atgttgacca 6240
ggatgggtgc aatctcctga cctcatgac caccogtcto ggcotcccaa agtgctggga 6300
ttacaggcat gaactacogt gcttggtga gtttgagatt ttaactgtaa gtctccaac 6360
taagtgtcca tgacaagaac agggatgat agagtggaaa tatgttatcc tgcaattat 6420
cgttttatgt aaaagaatat ttccctctt ttaggtaaa gaaatattct ctggagcacc 6480
ttctctctga ctatcaaac accattaagc cacaaataaa ctgtaacatg aagtaggaaa 6540
caactgccct tttatataac cattgagagg tggctttata tgcataccaa aatgttgatg 6600
ctcaatgcta aaattggatt tagtaattta atatgcctac aagaaattaa tttcttttg 6660
attatattat ttctgtgtac gatattatct agttaacttg gaaatattct gctctaaaa 6720
caactcttgt tttttgggtt atattttctg tatcaactat agctcttttc caaatgctgt 6780
cagagatagc ccatggctac tgatcacaaa attcaatttt atggcattta aattattcta 6840
tactctaaat tattttaaaa gtgcacagat gtgaattttt cacatctgac tcaaaaatgt 6900
tgctgatgtt gactcacattt tttatttcaa tcttattgaa gtaggagttt acttttctgg 6960
aacctggatg ataacaggag actggagagg aaaccccca aattgttttc ctttaaaccc 7020
tcaggatgaa tcatcctgga taatcaccca cacttgattt gggtgatata taaatgagag 7080
ttgggtctta gagtaggtgc tgagttagtt taggacttgc gctgttgga tgagttgaat 7140
gtttttacaa gctgcacattt ttattttcaa tcttattgaa gtaggagttt acttttctgg 7200
tgaattaagt ccccaaaaat gtatgcattg aagctgtaac acacaatatg tgactgaaat 7260
tgtgcatagg gtctttaaag aggtgactaa gtgaaaatga aaaaattagg gtggattctt 7320
ctcaaatgg actgatgtcc tcttaggaag aagaaatttg cacacacaga aatgaggcac 7380
cagagggtgag gctgcagaga aaagaccagg tgaggattca gcaaggaggt agcaacctgc 7440
aagccaagga gagagtctc aggggaaacc aaacccacta ccacctttat ctgggtttt 7500
ccagcttcag aactgtgaga aaatatgttt ctgccatttc ggtcactaat tctttcctat 7560
cttctgtgtg gagctctagc aaaaacaaga gggaccocaa agaccttga tgaggagaa 7620
ggaggagatg gagcagggtg caggagcggg tgcaggaagg gctggaagg tggggtctg 7680
aggtgcatct cctgggtgga atcttgactc cactccctat tctgtggag acttgggaa 7740
aacatttaac ctctaataat tcaactacta ataaagatgg gcttgaagca caaggctccc 7800
catcatccta ttctatatta caaaagtctt cttgaggtaa cacttgtaaa actctcgcta 7860
atgcatctgg catgtattat ggactcataa gtacccttc tgagtgtatc agtgatgtgc 7920
agaaaatggc attcatgtg tgtgcacagg ggggactgt gaggtttagt ctgaggcccc 7980
taatgagtc aagccctag taatgtcaa gggcgaagag cctgactgtt gcttctatg 8040
aggcccttc tagtgggtaa atctgaaaat gcacttggcc cttcttctga tcttgagaaa 8100
ttactcagag aaggccatca ggctcagggc tcagacaaga accaggacaa atgttttagg 8160
gaatggagaa cagatttgca tccactgtc accagagcca cctaacgacg acacaagaat 8220
aaaggaagta gatgtgcatg aagagacttc ccttctatg ataagagagg cctggagggt 8280
cctccttagc tgtgggtcga gaagcagagt tctgggtgt ctccaccatg gcctggacc 8340
ctctctggct cactctctc actctttgca taggtgtgc ctcccagggc tcaaccccat 8400
attatcatgc tagctgtgccc aacctggccc tgagcttcgg ctcaacacag ggagtagtgt 8460
aggggtgtgg actctaggcg tgaaacocct atcctcacct cttctgtcct cttttgcata 8520
ggttctgtgg tttcttctga gctgactcag gacctgtctg tgtctgtggc cttgggacag 8580
acagttagga tcacatgcca aggagacagc ctcaagact attatgcaag ctggtaccag 8640
cagaagccag ggcaggcccc tatactgtc atctatgata aaaacaaccg gccctcaggg 8700
atcccagacc gatgttttgg ccccagctca ggaacacacag cttccttgac catcactggg 8760
gctcaggcgg aagatgaggc tgactattac tgttaactccc gggacagcag tggtcaccgt 8820
gtgggtttcg gcgaggggac caagctgacc gtcttaggtg agtctcttct cccctctcct 8880
tcccgtctct tgggacaatt tctgtgttt ttgtttgttt ctgtatcttg tctcaacttg 8940
tggtcagcct ttctccctgc atcccaggcc tgagcaagga cctctgccct cctgttccag 9000
acccttgctt gcctcagcag gtcactacaa ccacttcacc tctgaccaca ggggcagggg 9060
actagataga atgacctact gagcctcgtc tgtctgtctg tctgtctgtc tctctgtttg 9120
tctctctgtc tctctgtttg tctctctgac tgtctgacag ggcagggctg ggtctctaag 9180
ccttgttctg tcttgccctc ctcagtctgg gttcttctgc gaacagcttt gtcttgggt 9240
tacctgggtt ccatctcctg gggaaattggg aacaagggggt ctgagggagg cacctcctgg 9300
gagactttag aaggaccag tgccctcggg gctgatgtc gggaaatcaca gagctgggac 9360
ccagagccag gatccagacc cagaatgagg taggaggttg aggggctgcc ctgggctct 9420
gggggctgcc agggactgag cctcagacca gcctgagact caggaaaccc cgtcaggagg 9480
gagaagggag aagcagactc tggacaccag aaagccaggg gaagggtcac aaaaggagt 9540
gatgtgacgg aaggcgggc tctgggtct cttcagaaca tatcccctgt gccaggggg 9600
atcagagggg cagagtccac tgcgtgaaag cccactgct atgaccaggt agccgggag 9660
tggggtggat gccagaaaag actccacgga ataagagaga gccagggaca gcaggcaggc 9720
tctccgatcc cccaggccc ttgcccata cacgggctcc agaacacaca tttggctgga 9780
acagcctgag ggacaaaag gccccagtat cccacagagc tgaggagcca ggcagaaaa 9840
gtaaccccag agttcgctgt gcaggggaga cacagagctc tctttatctg tcaggatggc 9900
aggaggggac agggtcaggg cgtgagggt cagatgtcgg tgttgggggc caaggcccg 9960

```

10

20

30

40

agagatctca ggacaggtgg tcaggtgtct aaggtaaaac agctccccgt gcagatcagg 10020
 gcatagtgga aaacaccctg acccctctgc ctggcataga ccttcagaca cagagccctt 10080
 gaacaagggc accccaacac ctcatcatat actgaggtca ggggctcccc aggtggacac 10140
 caggactctg acccctgtcc cctcatccac ccgcaggtc agcccaaggc tgccccctcg 10200
 gtcactctgt tcccgccctc ctctgaggag cttcaagcca acaaggccac actggtgtgt 10260
 ctcataagtg acttctaccc gggagccgtg acagtggcct ggaaggcaga tagcagcccc 10320
 gtcaaggcgg gagtggagac caccacaccc tccaaacaaa gcaacaacaa gtacgcggcc 10380
 agcagctatc tgagcctgac gcctgagcag tggaaagtc acagaagcta cagctgccag 10440
 gtcacgcctg aagggagcac cgtggagaag acagtggccc ctacagaatg ttcataaggtt 10500
 ctcaaccctc acccccaccc acgggagact agagctgcag gatcccaggg gaggggtctc 10560
 tcctccacc ccaaggcacc aagcccttct ccctgcactc aataaaccct caataaatat 10620
 tctcattgtc aatcagaaat cttgttttat ctcatTTTTT cttttctcac atataattcc 10680
 tagcctttcc tgggttctca atttgtggtg gaaagaaccc tgaaccaggt gggaaagttg 10740
 cctatgtgaa ggggttctca gtccctggg catctctgca ggtaaggcct tcctcaccca 10800
 gacacccctt cctcagctct ccactgtacc cctgagccac cagcctcgcc tggctgggac 10860
 cagggggggtg tcacactctc ctgattctgt cctttcaaca gaaacctaac cacgcatcac 10920
 acggcacttc tgcctgcct tctgtgtctg ctccagtctc tgggctaaag agttgctggt 10980
 ccgggacagg ggataggtcc gctcttggtc agatgccagg tcctgcccag ggcacccctg 11040
 accctatgca acaagccagt gactctgggt agctctctgt gtcaggagaa tccatgatcc 11100
 agagtttcat attgtcctgc aagcatctgg tgggctgtag ctcttgccaa actgggaaat 11160
 accatggccc agcatcagga tgcaggacag tccggagagg gaaatcagga gaagtgaagg 11220
 ggtctctgga gggccagat gtgggctaga ggcagaagta aggggtgaaga gcacctatga 11280
 gtcaatgtca tgggtctcagc aggaacacag ttgaaaatcc ccattccaca caagaccgtt 11340
 tagcaggaaa ggagtccata cttgtgtctg caccaggatg tcctgagaag ccttgagaa 11400
 tgaacatac aggtgcattt cctagacttg acaatgcacg ttagccaagt aaaggcaatg 11460
 aaaagtcttc tactagggaa ataatttctc gtggtaaagc ttagcttatg taaagtcaca 11520
 tttatccatc tggcacctct aaaagcccca taatttctg caagatacta gtatgtcatg 11580
 gaagtgttt atgaacata aagtgtgatt taagaacaaa gatgttacgg gtgtatgata 11640
 agatggctac aggtcaggg tcaggtctga ggagtgaagg aggcctgtc aaattcatga 11700
 caagagttgg agctgggcca ggctgggtca gggctgtgtg aatgcagaca gagggctaca 11760
 ggcaaggtca tgcagccatg aacactcagc tcccccagac cctctgccc actgggacct 11820
 tcgcccctcc ttggtccagc tgggtggagc ttctaccaca aacctctatg gaggcctgg 11880
 atgactgtgc gttcttagtg ccacgcacaa cttagactcc ctgtctctgc ctccagcaca 11940
 tcaggaatgt ggcagctgag ttccaccagag ctgctgggtg gtcccgacag gccagggaca 12000
 gagcccgcaa agacaggaag ctctgcagtc acaatgaggc agagaaatgg ccccttggtg 12060
 cttgatcaca gccacccctg atccaaatcc cagcctctga attagaagaa ggctaaaagg 12120
 ttctagtggc cagagtcct gtctaagccc atttcacaaa tgagaaaact aagaccacc 12180
 aaggaggggc agttacgtag gcctgtgggt tacaaggcca aggtctactt cacaccacg 12240
 agctgtccaa agactgagct gtgtcataag tttatattat gaagaactct gaacatataa 12300
 ataaggagac agaaaaataa cagtgtccca tgtctcatc acccagcact caaaataagc 12360
 aattcacaga tgatgcccag ccacccacag caaaataaat tctcccttac acaacattta 12420
 gaaagaaata caagacatca gatctgttca gctgtaagta ctccattact gtcttggaat 12480
 gacatggacc ttaaaataac tataatatca ctaccaaacc taaatagaaa ttatcactaa 12540
 ttccctaata tgcagaaata agcagggtct cctcaaatgc atcagaaaca ccagaagtgc 12600
 tttggcttag ttacatgttg gtgtgttggt tatttggggg ttttaagttta tatgaggagc 12660
 aatatgacat caaatggtga tgggtgcatg tgccatcagg ctggttgtca ctggtgaata 12720
 tttcctcaat tgctctagag cctcccgcca aggcaggagc tgaggagct gagagctgtc 12780
 tggagaactt cccctggctg ctatacagcc acgctcctg gagcaggaac ctagggtctc 12840
 cctcagcttt tttttctctg gaaaatgatt ctagcatgaa ggggattaac ttgattcaga 12900
 ttggacattg caaaatagct tgcaaggaca gggagctgct accagcagag tcacccatgt 12960
 cagactgcca ctctgtagt aatgttagct gcataggatg gtcaatagct acatccctca 13020
 gaagggaagg aaggcagagg gttgaggctt cagttcacct ccttctcatg agtgtgcag 13080
 agtgtctgtg atgtcagagg tctgagctg ggctctgtt acccaggagt gtgcttcatg 13140
 ctctaggaag gagccactt gcacacagaa gatccggggc ccagccatcc ttcagggtg 13200
 aacaattcat gcttctctc atggtgaact ctaggattca agccatctaa tgcttttgaa 13260
 gccactgtca ttatatata ttgatgatga caggtggcca ccaatgatga atattttccc 13320
 agggggagtc tccccagtg gcttcagact toctcacatg gcccagggg attaaatggc 13380
 toctgattac tcagaggata agaggttctg tcttatcatg ttcctttctt atttgtctta 13440
 tgtgtcttcc ctgcccagg cctgggatcc ccactgatc tcccttccct tagtgagagg 13500
 tgatatttgg agaccacatt ctggaggctc cctcatgtcc cccatttgaa aaagacaaag 13560
 gcagcctcca ccttagctgt cccacccaac atgaggccag attcagggtg gcagggatgc 13620
 tcccaagggt accctaacag atgtgactgg cacttcatat tgggaccagc caggcctcac 13680
 tgaccaggcc tatccaaact gaactactcc agaagggtgg gctgaaaccc accaaggttc 13740

10

20

30

40

```

ccagaacact gcactctagg gcaatcagcc tctgcatggg aggagaggag caccctctgc 13800
accaccccat ggtgttacca aaagttgaac catgggttgg ttcaactttg cagagaagag 13860
accacctatc ccatctgtgg aaattcactc cttagcgaca ctaatgcctt ctaataaatt 13920
caatcctggg cctgagtgat ggttggtgca aaaaacaaat tcaagatccc agtgtcctcc 13980
agaagcctgg atttccaggg                                     14000

```

<210> 22
 <211> 13685
 <212> DNA
 <213> Artificial Sequence

<220>
 <223> Description of Artificial Sequence: Vector pVLCI

```

<400> 22
ctagtctctgc aggtttatcg gcttctggag gacactggga tcttgaatth gttttttgca 60
ccaaccatca ctcaggccca ggattgaatt tattagaggg cattagtgtc gctaaggagt 120
gaattttccac agatgggata ggtggtctct tctctgcaaa gttgaaccaa cccatgggtc 180
aacttttggg aacaccatgg ggtggtgcag aggggtgctc tctcctccca tgcagaggct 240
gattgcctta gactgcagtg ttctgggaac ctgtgtgggt ttcagcccca ccttctggag 300
tagttctagt tggataggcc tggtcagtga ggcttggtg gtcccaatat gaagtgccag 360
tcacatctgt tagggttaacc ttgggagcat ccttgacccc ctgaatctgg cctcatgttg 420
ggtgggacag ctagggtgga ggctgcctgt gtctttttca aatgggggac atgaggggagc 480
ctccagaatg tggctctcaa atatcacctc tcactaaggg aaggagagtc agtgggggat 540
cccaggcctg gggcaggaaa gacacataag acaaataaga aaggaacatg ataagacaga 600
acctcttctc ctctgagtaa tcaggagcca tttaatcccc tggggccatg tgagggaagtc 660
tgaagccact tggggagact cccctgggga aaatatctat cattggtggc cacctgtcat 720
catcaattaa atataatgac agtggcttca aaagcattag atgggttgaa tcttagagtt 780
caccatgaga gaagacatga attgttcacc ctggaaggat ggctggggcc cggatcttct 840
gtgtgcaaaag tggctccttc cttagacatg aagcacactc ctgggtgaac agagccagc 900
tgcagacctc tgacatcaca gacactctgc agcactcatg agaaggaggt gaactgaagc 960
ctcaaccctc tgccttctct ccttctctgag ggatgtagct attgaccatc ctatgcagct 1020
aacattacta caagagtggc agtctgacat ggggtgactct gctggttagca gctccctgtc 1080
cttgcaagct attttgcaat tctcaatctg aatcaagtta atcccttca tgctagaate 1140
attttccagg aaaataaaag ctgaggggaag ccctagggtt ctgctccagg aggcgtggct 1200
gtatagcagc cagggggaagt tctccagaca gctctcagct cctgcagctc ctgcttggc 1260
gggaggtctc agagcaattg aggaatatat caccagtgc aaccagcctg atggcacatg 1320
caccatcatc catttgatgt catattgtct ctcataataa cttaaacccc caaataccaa 1380
cagcaccaac atgtaactaa gccaaagcac ttctggtgtt tctgatgcat ttgaggagac 1440
octgtttatt tctcgatatt agggaaattg tgataatttc tatttaggtt tggtagtgat 1500
attatagtta ttttaaggtc catgtcattc caggacagta atggagtact tacagctgaa 1560
cagatctgat gctctgtatt tctttctaaa tgtgtgttaa gggagaatth attttgtctg 1620
gggtgggtcg gcatcatctg tgaattgctt attttgagtg ctgggtgatg agaacatggg 1680
acactgttat ttttctgtct ccttatttat atgttcagag ttcttcataa tataaactta 1740
tgacacagct cagtcttttg acagctgctg ggtgtgaagt agaccttggc cttgtaccca 1800
gcaggcctac gtaactggcc ctcttgggtt ggtcttagtt ttctcatttg tgaaatggg 1860
ttagacaggg actgtggcca ctagaacctt ttagccttct tctaattcag aggcgtggat 1920
ttggatcagg ggtggctgtg atcaagcacc aaggggccat ttctctgcct cattgtgact 1980
gcagagcttc ctgtcttttg gggctctgtc cctggcctgt cgggaccacc cagcagctct 2040
ggtgaactca gctgccatct tctgatgtg ctggaggcag agacaggag tctaagtttg 2100
cgtgggcact aagaacgcac agtcatccag ggctccata gaggtttggg taggaaggct 2160
ccaccactgt gaccaaggga gggcgaaggc cccagtgggc aggagggctt gggggagctg 2220
agtgttcag gatgcctgac ctgacctgta gcctctgtc tgcattcaca cagccctgac 2280
ccagcctggc ccagctccaa ctcttgtcat gaatttgaca cggcctcctt cactcctcga 2340
gcttgacctt gagcctgtag ccatcttctc atacaccgt aacatctttg ttcttaaatc 2400
tcactttatg tttcataaac tacttccatg acatactagt atottgcaga atattatggg 2460
gcttttttag gtgcccagat gataaatgtg actttacata agctaagctt taccacagga 2520
aattatttcc ctagtagaga acttttctat gcctttactt ggctaacgtg cattgtcaag 2580
tctaggaatc gcacctgtat gtttcttctt ccaaggcttc tcaggacatc ctggtggcag 2640
cacaagtatg gactccttct ctgctaaacg gtcttgtgtg gaatggggat tttcaactgt 2700
gttctgtctg agacctgac attgactcat aggtgctctt cacccttact tctgcctcta 2760
gcccacatct gggctcccca gagacctctt cacttctctt gatthccctc tccggactgt 2820

```

10

20

30

40

cctgcacccct gatgctgggc catgggtatct cccagtttgg caagagctac agcccaccag 2880
 atgcttgcag gacaatatga aactctggat catggattct cctgacacag agagctcacc 2940
 agagtccact gcttgttgca tagggtcagg gatgccatgg cagggacctg gcatctgacc 3000
 aagagcggac ctatcccttg tcccgacca gcaactcttt agcccagaga ctggagcaga 3060
 cacagaaggc atgcgagaag tgcggtgtga tgcggtgtta ggtttctgtt gaaaggcaga 3120
 atctaggaga gtgtgacacc cccctggtcc cagccaggcg aggctggtgg ctcaggggta 3180
 cagtggagag ctgagggaagg ggtgtctggg tgagggaaggc cttacctgca gagatgccc 3240
 gggaactgag aaccccttca cataggcaac ttccactg ggttcagggt tctttccacc 3300
 acaaattgag aaccaggaa aggctaggaa ttatatgtga gaaaagaaaa aatgagataa 3360
 aacaagattt ctgattgaca atgagaatat ttattgaggg ttattgagt gcagggagaa 3420
 gggcttgatg ccttgggggt ggaggagaga cccctccctt gggatcctgc agctctagtc 3480
 tcccggtgtg ggggggtgagg gttgagaacc tatgaacatt ctgtaggggc cactgtcttc 3540
 tccacggtgc tcccttcctg cgtgacctgg cagctgtagc ttctgtggga cttccactgc 3600
 tcaggcgtca ggctcagata gctgctggcc gcgtacttgt tgttgcctttg tttggagggt 3660
 gtgggtgtct ccactccgc cttgacgggg ctgctatctg ccttccaggc cactgtcacg 3720
 gctcccggtt agaagtcaat tatgagacac accagtgtgg ccttgttggc ttgaagctcc 3780
 tcagaggagg gcgggaacag agtgaccgag ggggcagcct tgggctgacc tgcgggggtg 3840
 atgaggggca ggggggtcaga gtccctggtg ccacctgggg agcccctgac ctcagtatat 3900
 gatgagggtg tgggggtgccc ttgttcaggg gctctgtgtc tgaaggctta tggcaggcag 3960
 aggggtcagg gtgttttcca ctatgcccgt atctgcacgg ggagctgttt taccttagac 4020
 acctgaccac ctgtcctgag atctctcggg gccttggccc ccaacaccga catctgacc 4080
 tcagcgcctt gacctgtcc cctctgcca tccctgacaga taaagagagc tctgtgtctc 4140
 ccttgacacag cgaactctgg ggttactttt ctggcctggc tccctagctc tgtgggatac 4200
 tggggccttt tgggtccctca ggctgttcca gccaaatgtg tgttctggag cccgtgtatg 4260
 gggcaagggc ctggggggat cggagagcct gcctgctgtc ctgggctctc tcttattccg 4320
 tggagctctt tctggcatcc accccacgtc ccggtacctt ggctcatagc gtgggcttt 4380
 cacgcagtgg actctgcccc tctgatcccc ctgggcacag gggatatgtt ctgaagagac 4440
 ccaggagccc gcccttccgt cacatccact ccttttgtga ccttccctt ggcttctgtg 4500
 tgtccagagt ctgtcttctc cttctccctc ctgacggggg ttccctgagtc tcaggctggc 4560
 tcagggtcga gtccctggca gccccagac gccccctcac cctctacctc 4620
 attctgggtc tggatcctgg ctctgggtcc cagctctgtg attcccgagc atcagccccg 4680
 agggcactgg gtcccttctaa agtctcccag gagggtgcct cctcagaccc cttgttccca 4740
 attccccagg agatggaacc caggtaaccc aaggacaaag ctgttccgac aagaacccag 4800
 actgaggagg ccagaaacaga acaaggctta gagaccagc ctgcgcctgt cagacagtca 4860
 gagagacaaa cagagagaca gagagacaaa cagagagaca gacagacaga cagacagacg 4920
 aggtcagta ggtcattcta tctagtcccc tgccctgtg gtccagagggt aagtgttgt 4980
 agtgacctgc tgaggcaagc aagggtctga acagggaggg cagaggctct tgcctaggcc 5040
 tgggatgcag ggagaaaggc ttgagacaag atacagaaac aaacaaaaac 5100
 agcagaaatt gtcccaagag cggggaagga gaggggagaa gagactcacc taggacggct 5160
 agcttgggtc ctccgcccga aaccacacgg tgacctgct tgtccggga gttacagtaa 5220
 tagtcagcct catcttccgg ccgcagcggc caagggcgaa ttccggggc ctaaatcaa 5280
 ttccgcttat agtgagtcgt attacaattc actggccgtc gttttacaac gtcgtgactg 5340
 ggaaaacctt ggcgttacct aacttaactc ccttgacaga catccccctt tccagcgtg 5400
 gcgtaatagc gaagaggccc gcaccgatcg ccttcccaa cagttgcgca gcctatacaa 5460
 acgaattcgc ccttagtata cccagaaact ctgcttctga gccacagct aaggaggaa 5520
 ctccaggcct ctcttatcat aggaaggga gtctcttcat gcaaatctac ttctttatt 5580
 cttgtgtcgt cgttaggtgg ctctgggtgag cagtggatgc aaatctgttc tccattccct 5640
 aaaacatttg tctgtgttct tgtctgagcc ctgagcctga tggccttctc tgagtaattt 5700
 ctcaagatca gaagaagggc caagtgcatt ttcatgatta cccactagaa ggggcctcat 5760
 aggaagcaac agtcaggctc ttccgcccctg agcattacta ggggcttggc ctcatagggt 5820
 gctcagact aaacctcaca gtgcccctg gtgcacacag catgaatgcc attttctgca 5880
 catcactaga tcaactcagaa gggctactta tgagtcata atacatgcca gatgcattag 5940
 cgagagtttt acaagtgtta cctcaagaag acttttgtaa tatagaatag gatgatggg 6000
 agccttgtgc ttcaagccca tctttatttag tgagtgaata ttaggaggtt aaatgtttt 6060
 cccaagtctt ccagacaata gggagtggag tcaagattcc acccaggaga tgcacctcag 6120
 agcccgacct tccagccctt tctgcacog cctcctgcac cctgctccat ctcctcctc 6180
 tccctcatcc aaggctcttg ggttccctct tgttttctgt agagctccca caagaagata 6240
 ggaaagaatt agtgaccgaa atggcagaaa catattttct cacagtctctg aagctggaaa 6300
 acccaagata aagggtgttag tgggttttgt ttccctgag gactctctcc ttggcttgca 6360
 ggttgcctac tcttgcctga atcctcacct ggtctttct ctgcacgctc acctctggtg 6420
 cctcatctct gtgtgtgcaa atttcttct ctaggagga catcagtcga atttgagaag 6480
 aatccacctt aattttttca ttttacttta gtccactct taaagacct atgcacaatt 6540
 tcagtcacat attgtgtgtt acagcttcaa tgcatacatt ttgggggact taattcagcc 6600

10

20

30

40

aataaccccc caccctctgg actccaaaaa actcatgtct ttctcacttg taaaaacatt 6660
caactcattc caacagcgca agtctaaac taactcagca cctactctaa gacccaactc 6720
tcatttagat atcaccocaaa tcaagtgtgg gtgattatcc aggatgattc atcctgaggg 6780
tttaaaggaa aacaatttgg ggggtttcct ctocagtctc ctgttatcat ccagggtcca 6840
gaaaagtaaa ctcttacttc aataagattg aaataaaaaa gtgagtcac atcagcaaca 6900
tttttgagtc agatgtgaaa aattcacatc tgtgcacttt taaaataatt tagagtatag 6960
aataatttaa atgccataaa attgaatttt gtgatcagta gccatgggct atctctgaca 7020
gcatttggaa aagagctata gttgatacag aaaatataac ccaaaaaaca agagttgttt 7080
ttagagcaga atatttccaa gtttaactag ataaatcgta cacagaaata atataatcca 7140
aagaaaatta abttcttcta ggcataatga attactaaat ccaattttag cattgagcat 7200
caacattttg gtatgcataa aaagccacct ctcaatgggt atataaaagg gcagttgttt 7260
cctacttcat gttacagttt atttgtgggt taatgggtgt ttgatagtca gagagaagggt 7320
gtcccgagaa atgcttccaa tacctaaaag agggaaaata ttcttttaca taaaacgata 7380
atgtgcagga taacataatt ccactctcat catcctgtgt cttgtcatgg caacttagtt 7440
ggaggactta cagttaaaat ctcaaactca gccaggcacg gtagttcatg cctgtaatcc 7500
cagcactttg ggaggccgag acgggtgggt catgagggtca ggagattgac accatcctgg 7560
tcaacattgt gaaacctatg ctctacaaaa aatacaaaaa ttagcctggc atgatggcga 7620
gagcttgtaa tccacgtcac ttgggagggt gaggcaggag aatttcttga acccgggagg 7680
tggtgttgc agtgagccgc gattgtgcca ctgcactcca gcctggcaac agagtggagc 7740
tccatctcaa aaataaataa ataaataaat aaattttaaa aacatctcaa actctctct 7800
ttattccatt gttgcattct gagtttaacg atctacttgc ttataaaaaa ttgcaatac 7860
atttaaaagt tcaacttcat ttatcatttg ttaatgatgc tcagaacacc aacctcttg 7920
tgtgtttttg gtttcagcta caaggctgat tttaagacct ttttctctc agcctacact 7980
ggatcactcc cgacttgggt caagcttccct tgcctcttgc cccctccctc tgcctctaat 8040
ttttcacctc ggaggaatct ctattcctga tatactgaag ctctcacaaa acagagcaaa 8100
tggatgaaga tcaacttcat gagcttgtga cacagggtgt tcttgagcag acacaagatc 8160
caatcaaaac catggtacag gtaggttctt atccaaagaa agacctcagg cccctagagg 8220
aggtgaatta cagtgtccct cacaagagga tctccacata gaacatatgc ggggtgcaatg 8280
ttcaaacttc aaataacccct agaaaccaga gaccgttaaa ccacatcctg tgggacatcc 8340
ctggcctgcc accaattttt ttaatggccc cagaactgat agtgggtttt atagtgttta 8400
atgattacgt tgtagatggg gtatcagaac atacatatga toccaacgtt gtcttctgca 8460
tggcaaaagc taaaatccct cttaccgagg cattgaagaa acgggtttacc aaatcctaaa 8520
acataatgag cactgaataa tttgagtaaa tgctcaacct caagcaaaat aggagaaatc 8580
aaaaataaat gtgtaacaag ataactttgt atactctgata ggttggcaca aacttgcact 8640
ttcaccaatg aattccaatc aatatttagg gctggtattg taaactggta gaactggagg 8700
ggaatatgaa aacaatggat aaaagttaaa aatgcacatc cttttgaccc agcaattcca 8760
cttctggaaa tttatcctat ggtgatatgc acacatgaac tcaaaggagt ctgcacaggg 8820
atgcttgcct cagtgtgatt tgtaagatca aaatcatggt gataaccatt agaggctgca 8880
tggctaaaat ctaactacag aatactctac agcgttagaa tgaatgggca gtgctctatg 8940
cctatgacgc cccaggaaaag aataagaaat ggtgcaggta tgggatggcc tttgacaagg 9000
gggactggga caggtgcctt acacttccact ctctcctttt cctctgagat ttccacatc 9060
agacaaacag gttagggaca gtggaagccc ctgaggtgg gcctggccac ctgctctggc 9120
ctctgaatgc agcctggcct gacagcttgg ctgcaacttc atgaccaacc cagaaccaga 9180
accacaaaac taagctgctc tcaattccag atgcaccgaa gtgacaagat cacaacacag 9240
tgttctctta ccatgctaaa tattaggagg caatttttat gcaacaatag acaataaata 9300
caatttgggt tttgaaatat attttcttgt ggtatattca ggtacacaac atgttgatat 9360
agtctaaaac cataataaaa tggttacttt gtttttaata aaacctatit aatcaaagt 9420
tatgaagcct aaattatata taataatggc tatgtctacc aattgactca taaaatttaa 9480
atattggatg caactaatgt ctgaatattt attaaattca ttctcacctt tagtagatta 9540
agaaagattt cagctacaaa agtattgaca cccatggaaa ttacaaatgc tggatgtcaa 9600
tgaggagaat ggaatggact caggttaact ctccctgtg gggccatttt ggaactccc 9660
aacctatagg gacaccatcc acttttgggg agtttccagg acaggggccc agcgaattga 9720
gacgggagga ttttgaggga gactgagcc tgtcacgcaa aaggggcaat tcgcgccgc 9780
taaatccaat tgcctcataa gtgagtcgta ttacaattca ctggccgtcg ttttacaacg 9840
tcgtgactgg gaaaacccct gcgttaccac acttaatcgc cttgcagcac atccccctt 9900
cgccagctgg cgtaaatagc aagaggcccg caccgatcgc ccttcccaac agttgcgcag 9960
cctatacgtg cggcagttta aggtttacac ctataaaaga gagagccgtt atcgtctgtt 10020
tgtggatgta cagagtgtga ttattgacac gccggggcga cggatgggtg tccccctggc 10080
cagtgcacgt ctgctgtcag ataaagtctc ccgtgaactt taccgggtgg tgcataatcg 10140
ggatgaaaagc tggcgcatga tgaccaccga tatggccagt gtgcccgtct ccgttatcgg 10200
ggaagaagtg gctgatctca gccaccgcga aatgacatc aaaaacgcca ttaacctgat 10260
gttctgggga atataaatgt caggcatgag attatcaaaa aggatcttca cctagatcct 10320
tttcacgtag aaagccagtc cgcagaaacg gtgctgaccc cggatgaatg tcagctactg 10380

10

20

30

40


ggctatctgg acaagggaaa acgcaagcgc aaagagaaa caggtagctt gcagtgggct 10440
 tacatggcga tagctagact gggcggtttt atggacagca agcgaaccgg aattgccagc 10500
 tggggcgccc tctggtaagg ttgggaagcc ctgcaaaagta aactggatgg ctttctcgcc 10560
 gccaaaggatc tgatggcgca ggggatcaag ctctgatcaa gagacaggat gaggatcggt 10620
 tcgcatgatt gaacaagatg gattgcacgc aggttctccg gccgcttggg tggagaggct 10680
 attcggctat gactgggcac aacagacaat cggctgctct gatgccgcgc tgttccggct 10740
 gtacgcgcag gggcgcccggt ttctttttgt caagaccgac ctgtccggtg ccctgaatga 10800
 actgcaagac gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg accggcggtt cttgcgcagc 10860
 tgtgctcgac gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg ctattgggcg aagtgcgggg 10920
 gcaggatctc ctgtctctc acccttgctcc tgccgagaaa gtatccatca tggctgatgc 10980
 aatgcggcgg ctgcatacgc ttgatccggc tacctgccc aagcgaaca 11040
 tcgcatcgag cgagcacgta ctccgatgga agccggtctt gtccatcagg atgatctgga 11100
 cgaagagcat caggggctcg cgccagccga actgttcgcc aggtcgaagg cgagcatgcc 11160
 cgacggcgag gatctcgtcg tgaccatgg cgatgcctgc ttgccgaata tcatggtgga 11220
 aaatggccgc ttttctggat tcatcgactg tggccggctg ggtgtggcgg accgctatca 11280
 ggacatagcg ttggctaccc gtgatattgc tgaagagctt ggccggcaat gggctgaccg 11340
 cttcctcggt ctttacggta tcgccgctcc cgattcgag cgcatcgct tctatcgct 11400
 tcttgacgag tcttctctga ttattaacgc ttacaatttc ctgatcggtt attttctcct 11460
 tacgcatctg tgcggatttt cacaccgcat acaggtggca cttttcgggg aaatgtgcgc 11520
 ggaacccta tttgtttatt ttctaaata cattcaaata tgtatccgct catgagaca 11580
 taacctgat aaatgcttca ataatttga aaaaggaaga gtatgagtat tcaacatttc 11640
 cgtgtcgccc taattccctt ttttgcggca ttttgccttc ctgtttttgc tcaccagaa 11700
 acgctgggta agtaaaaga tgcataagat cagttgggtg cagcagtggt ttacatcgaa 11760
 ctggatctca acagcggtaa gatccttgag agttttcgcc ccgaagaacg ttttccaatg 11820
 atgagcactt ttaaagtctt gctatgtggc gccgtattat ccgctattga cgccgggcaa 11880
 gagcaactcg gtcccgcat acactattct cagaatgact tggttgagta ctaccagtc 11940
 acgaaaaagc atcttaacga tggcatgaca gtaagagaat tatgcagtgc tgcataacc 12000
 atgagtgaat acactgcggc caacttactt ctgacaacga tcggaggacc gaaggagcta 12060
 accgcttttt tgcacaacat gggggatcat gtaactcgcc ttgatcggtt ggaaccggag 12120
 ctgaatgaag ccataccaaa cgacgagcgt gacaccagca tgctgtagc aatggcaaca 12180
 acgttgcgca aactattaac tggcgaacta cttactctag cttcccgca acaattaata 12240
 gactggatgg aggcggataa agttgcagga ccacttctgc gctcggccct tccggtggc 12300
 tgggtttatt ctgataaatc tggagcgggt gagcgtgggt ctcccggtat cattgcagca 12360
 ctggggccag atggtaagcc ctcccgatc gtatgtatct acacgacggg gagtcaggca 12420
 actatggagc aacgaaatag acagatcgct gagatagggt cctcactgat taagcattgg 12480
 taactgtcag accaagttta ctcatatata ctttagattg atttaaaact tcatttttaa 12540
 tttaaaagga tctaggtgaa gatccttttt gataatctca tgacccaaat cccttaacgt 12600
 gagttttcgt tccactgagc gtcagacccc gtagaaaaga tcaaaaggatc ttcttgagat 12660
 cttttttttc tgccgctaatt ctgtgcttg caaacaaaaa aaccaccgct accagcgggt 12720
 gtttgtttgc cggatcaaga gctaccaact ctttttccga aggttaactgg cttcagcaga 12780
 gcgcagatac caaatactgt ccttctagt tagccgtagt taggccacca cttcaagaac 12840
 tctgtagcac cgcctacata cctcgtctct ctaactcctgt taccagtggc tgctgccagt 12900
 ggcgataagt cgtgtcttac cgggttggac tcaagacgat agttaccgga taaggcgcag 12960
 cggtcgggct gaacgggggg ttctgtgcaca cagccagct tggagogaac gacctacac 13020
 gaactgagat acctacagcg tgagctatga gaaagcgcca cgcttccga agggagaaa 13080
 gcggacaggt atccggttaag cggcagggtc ggaacaggag agcgacagag ggagcttcca 13140
 gggggaacg cctggtatct ttatagtcct gtcgggtttc gccacctctg acttgagcgt 13200
 cgatttttgt gatgtcgtc agggggcg agcctatgga aaaaagccag caacggggcc 13260
 tttttacgggt tcctgggctt ttgtggcct tttgtcaca tgttttttc tgcgttatcc 13320
 cctgattctg tggataaccg tattaccgcc tttgagttag ctgataccgc tcgcgcagc 13380
 cgaacgaccg agcgcagcga gtcagttagc gaggaagcgg aagagcgccc aatacgcaaa 13440
 ccgctctccc ccgcgcgttg gccgattcat taatgcagct ggcacgacag gtttcccgac 13500
 tggaaagcgg gcagttagcg caacgcaatt aatgtgagtt agctcactca ttaggcaccc 13560
 caggctttac actttatgct tccggtcgt atgttgtgtg gaattgtgag cggataacaa 13620
 tttcacacag gaaacagcta tgaccatgat tacgccaagc tcagaattaa ccctcactaa 13680
 aggga 13685

10


20

30


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【 図 4 】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】





【図 9】




【図 10】




(b)




【図 1 1】




【図 1 2】




【図 1 3】




【図 1 4】



【図 1 5】



【図 16】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/EP 03/11027

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C12N15/09 C12N15/11 C12N15/85 C12N15/90 C12N5/10 C12P21/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C12N A01K C12P		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, BIOSIS, MEDLINE		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	ESPERET CORINNE ET AL: "Non-erythroid genes inserted on either side of human HS-40 impair the activation of its natural alpha-globin gene targets without being themselves preferentially activated." JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, vol. 275, no. 33, 18 August 2000 (2000-08-18), pages 25831-25839, XP002225659 ISSN: 0021-9258 page 25835, column 1, last paragraph -page 25836, column 2, paragraph 1 --- -/--	1-3, 5-12, 16, 17
☒ Further documents are listed in the continuation of box C. ☒ Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
5 March 2004		15/03/2004
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo.nl Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Aslund, J

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.
PCT/EP 03/11027

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>TRINH K R ET AL: "Site-specific and directional gene replacement mediated by Cre recombinase" JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.,AMSTERDAM, NL, vol. 244, no. 1-2, 20 October 2000 (2000-10-20), pages 185-193, XP004218458 ISSN: 0022-1759 cited in the application page 193</p>	11,12,17
X	<p>KARREMAN S ET AL: "ON THE USE OF DOUBLE FLP RECOGNITION TARGETS (FRTS) IN THE LTR OF RETROVIRUSES FOR THE CONSTRUCTION OF HIGH PRODUCER CELL LINES" NUCLEIC ACIDS RESEARCH, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, GB, vol. 24, no. 9, 1 May 1996 (1996-05-01), pages 1616-1624, XP000616161 ISSN: 0305-1048 cited in the application the whole document</p>	12,17
X	<p>WO 00 63410 A (EINSTEIN COLL MED ;LEBOULCH PHILIPPE (US); MASSACHUSETTS INST TECH) 26 October 2000 (2000-10-26) the whole document</p>	11
A	<p>WO 02 08409 A (OW DAVID W ;US OF AMERICA AS REPRESENTED B (US)) 31 January 2002 (2002-01-31) figure 1; examples 1,2</p>	1-17
A	<p>FENG Y-Q ET AL: "SITE-SPECIFIC CHROMOSOMAL INTEGRATION IN MAMMALIAN CELLS: HIGHLY EFFICIENT CRE RECOMBINASE-MEDIATED CASSETTE EXCHANGE" JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY, LONDON, GB, vol. 292, no. 4, 1999, pages 779-785, XP000929622 ISSN: 0022-2836 cited in the application page 784; figure 1A -& WO 00 63410 A (EINSTEIN COLL MED ;LEBOULCH PHILIPPE (US); MASSACHUSETTS INST TECH) 26 October 2000 (2000-10-26) figure 4C</p>	1-17

-/--

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 03/11027

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>FUSSENEGGER M ET AL: "Genetic optimization of recombinant glycoprotein production by mammalian cells" TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 17, no. 1, January 1999 (1999-01), pages 35-42, XP004155532 ISSN: 0167-7799 cited in the application page 36, column 2</p>	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No.

PCT/EP 03/11027

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0063410	A	26-10-2000	US 6534314 B1	18-03-2003
			AU 4343300 A	02-11-2000
			WO 0063410 A1	26-10-2000
WO 0208409	A	31-01-2002	AU 7707601 A	05-02-2002
			BR 0112633 A	16-09-2003
			CA 2416701 A1	31-01-2002
			CN 1455817 T	12-11-2003
			EP 1309709 A2	14-05-2003
			JP 2004504055 T	12-02-2004
			WO 0208409 A2	31-01-2002
			US 2002123145 A1	05-09-2002

フロントページの続き

(81)指定国 AP(GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IT,LU,MC,NL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

(72)発明者 サンディグ, ヴォルカー
ドイツ連邦共和国, 13086 ベルリン, ゴエセシュトラッセ 54, プロバイオゲン アーゲー内

(72)発明者 ウィンクラー, カルステン
ドイツ連邦共和国, 13086 ベルリン, ゴエセシュトラッセ 54, プロバイオゲン アーゲー内

(72)発明者 マルクス, ウィー
ドイツ連邦共和国, 13086 ベルリン, ゴエセシュトラッセ 54, プロバイオゲン アーゲー内

(72)発明者 ウェルメリンゲル, トビアス
スイス国, ツェーハー 8820 ワーデンスワイル, ポスト オフィス ボックス 335, ホッシュール ワーデンスワイル

Fターム(参考) 4B024 AA20 BA07 BA41 CA04 CA07 DA02 EA04 FA10 GA04 GA11
HA12 HA15
4B064 AG27 CA10 CA19 CA20 CC24
4B065 AA93X AA94X AB01 AB02 AC14 BA02 BA08 CA25
4H045 AA11 AA20 DA75 FA72 FA74